

Klinische Homöopathie in der Kinderheilkunde

Farokh Master



Narayana-Verlag

5. Auflage

FAROKH MASTER

KLINISCHE HOMÖOPATHIE
IN DER
KINDERHEILKUNDE

5. AUFLAGE



Farokh Master
Klinische Homöopathie
in der Kinderheilkunde

Titel der englischen Original-Ausgabe:
Clinical Observations of Children's Remedies
Third Expanded Edition 2006

sowie das Werk
Lesser known remedies in Pediatrics 2009

1. deutsche Auflage 2006
2. erweiterte Auflage 2007
3. komplett überarbeitete und erweiterte Auflage 2010
4. erweiterte Auflage 2013
5. Auflage 2021

ISBN 978-3-941706-34-7

© 2006, Narayana Verlag
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, 79400 Kandern
Tel.: +49 7626 9749700
E-Mail: info@narayana-verlag.de
Homepage: www.narayana-verlag.de

Coverabbildung © istockphotos

Übersetzt von Silke Burzlaff und Heidi Bart
Bearbeitet von Ulrich Welte

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form - mechanisch, elektronisch, fotografisch - reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.

Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, geltendie entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).

Die Empfehlungen in diesem Buch wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.

Der Verlag schließt im Rahmen des rechtlich Zulässigen jede Haftung für die Inhalte externer Links aus. Für Inhalte, Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Qualität und/oder Verwendbarkeit der dargestellten Informationen auf den verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Erkenntnisse in der Medizin unterliegen einem laufenden Wandel durch Forschung und klinische Erfahrungen. Autor und Übersetzer dieses Werkes haben große Sorgfalt darauf verwendet, dass die in diesem Werk gemachten therapeutischen Angaben (insbesondere hinsichtlich Indikation, Dosierung und unerwünschten Wirkungen) dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Das entbindet den Nutzer dieses Werkes jedoch nicht von der Verpflichtung, anhand einschlägiger Fachliteratur und weiterer schriftlicher Informationsquellen zu überprüfen, ob die dort gemachten Angaben von denen in diesem Werk abweichen und seine Verordnung in eigener Verantwortung zu treffen.

INHALT

- Vorwort der Herausgeber zur dritten Auflage.....8
- Vorwort von Farokh Master zur zweiten Auflage.....9
- Danksagung..... 11

TEIL I - THEORIE

- Einleitung 14
- Verhaltensstörungen 15
- Die Kunst und Wissenschaft homöopathischer Pädiatrie..... 20
- Die Fallaufnahme 22
- Beobachtung von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern 24
- Körperliche Untersuchung 31
- Wie unterscheidet sich die homöopathische Anamnese und körperliche Untersuchung eines Kindes von der eines Erwachsenen? 45
- Markierungspunkte und Warnsignale in der kindlichen Entwicklung 46
- Verdacht auf Zerebralparese 47
- Klinisch-diagnostische Untersuchung 47
- Punkte, an die man denken sollte..... 47
- Wie man mit Neugeborenen richtig umgeht 49

TEIL II - ARZNEIMITTELLEHRE

- Abelmoschus* 54	- Androctonus amurreuxi hebraeus* 90
- Abrotanum 55	- Anisum stellatum* 91
- Adenosinum monophosphoricum* 58	- Anthemis nobilis* 92
- Aethusa cynapium.....59	- Antimonium crudum..... 93
- Agaricus muscarius.....66	- Antimonium tartaricum 102
- Agathis australis* 75	- Antipyrinum* 114
- Agraphis nutans*.....77	- Apis mellifica..... 115
- Ailanthus glandulosa*.....78	- Apium graveolens* 123
- Alcoholus*.....79	- Aranea diadema* 124
- Aloe socotrina*.....80	- Aranea ixobola..... 125
- Alumen* 81	- Arbutus menziesii* 128
- Ambra grisea.....82	- Argemone mexicana*..... 129
- Ammonium bromatum*.....87	- Arsenicum album 130
- Amphisbaena vermicularis* 88	- Artemisia vulgaris* 146
- Anantherum muricatum*.....89	- Asa foetida*..... 147

* In 3. Auflage hinzugefügte Mittel

- Asarum europaeum*.....	148	- Cina maritima.....	320
- Atrax robustus*.....	149	- Cinnabaris*.....	328
- Atropinum sulphuricum*.....	150	- Coccus cacti*.....	329
- Aurum metallicum.....	151	- Coffea cruda.....	330
- Bacillinum Burnett.....	159	- Colibacillinum*.....	335
- Badiaga*.....	164	- Copaiva officinalis*.....	336
- Baptisia tinctoria*.....	165	- Corallium rubrum*.....	337
- Barium carbonicum.....	166	- Crotalus cascavella*.....	338
- Barium muriaticum*.....	176	- Cuprum metallicum.....	339
- Barium phosphoricum.....	177	- Cypridium pubescens*.....	351
- Barium sulphuricum.....	179	- Desoxyribonucleicum acidum*....	352
- Belladonna.....	184	- Diphtherinum*.....	353
- Bellis perennis*.....	195	- Diphtherotoxinum*.....	354
- Benzoicum acidum*.....	196	- Elaps corallinus**.....	355
- Bismuthum subnitricum*.....	197	- Elaterium*.....	365
- Borax veneta.....	198	- Equisetum hyemale*.....	366
- Bovista lycoperdon*.....	206	- Eucalyptus globulus*.....	367
- Bromium*.....	207	- Ferrum aceticum*.....	368
- Bryonia alba.....	208	- Ferrum metallicum.....	369
- Bufo rana.....	218	- Filix mas*.....	376
- Calcium aceticum*.....	234	- Flavus*.....	377
- Calcium bromatum*.....	235	- Flor de piedra*.....	378
- Calcium carbonicum.....	236	- Folliculinum**.....	379
- Calcium causticum*.....	247	- Gambogia*.....	384
- Calcium hypophosphoricum*.....	248	- Graphites.....	385
- Calcium laeticum*.....	249	- Hecla lava*.....	390
- Calcium muriaticum.....	250	- Hedera helix*.....	391
- Calcium phosphoricum.....	252	- Heloderma suspectum*.....	392
- Calcium picricum*.....	260	- Hippomanes*.....	393
- Calcium silicatum.....	261	- Hyoscyamus niger.....	394
- Capsicum.....	267	- Ictodes foetida*.....	405
- Carcinosinum.....	272	- Ignatia amara.....	406
- Castoreum canadense*.....	278	- Indigo tinctoria*.....	417
- Causticum.....	279	- Iodoformium*.....	418
- Chamomilla.....	289	- Jaborandi*.....	419
- Chenopodium anthelminticum*...	297	- Jalapa*.....	420
- China officinalis.....	298	- Jatropha curcas*.....	421
- Chironex fleckeri*.....	309	- Kalium bromatum.....	422
- Chloralum hydratum*.....	310	- Kalium carbonicum.....	427
- Chlorpromazinum.....	311	- Kalium chloricum*.....	438
- Chiorum*.....	313	- Kalium muriaticum.....	439
- Cicuta virosa.....	314	- Kalium phosphoricum.....	444

- Ketoglutaricum acidum*	449	- Phosphorus	618
- Kreosotum.....	450	- Pinus silvestris*	628
- Lac caninum	457	- Pituitaria anterior*	629
- Lac caprinum*	464	- Platinum metallicum.....	630
- Lac delphinum	465	- Plumbum metallicum	635
- Lac felinum*	468	- Psorinum	644
- Lac humanum.....	469	- Pulsatilla pratensis.....	652
- Lac leoninum	473	- Rheum palmatum	663
- Lac vaccinum defloratum**	476	- Ribonucleinicum acidum*.....	667
- Lachesis muta	481	- Saccharum album*	668
- Laeticum acidum*	492	- Saccharum officinarum	669
- Laurocerasus*	493	- Sambucus nigra*	676
- Lycopodium	494	- Sanicula aqua	678
- Magnesium carbonicum	505	- Scutellaria lateriflora*	684
- Magnetis poli ambo*	514	- Senna*	685
- Magnetis polus arcticus*	515	- Sepia officinalis.....	686
- Magnetis polus australis*	516	- Silicea terra	695
- Malandrinum*	517	- Squilla maritima*.....	707
- Mancinella*.....	518	- Staphisagria	709
- Medorrhinum	519	- Stramonium	718
- Mercurius cyanatus*	532	- Sulphur.....	727
- Mercurius dulcis*	533	- Sulphur iodatum	738
- Mercurius solubilis	534	- Syphilinum.....	744
- Millefolium*	545	- Tarentula hispanica	752
- Moschus.....	546	- Teucrium marum verum*	763
- Mygale lasiodora	552	- Theridion curassavicum.....	765
- Naja Tripudians**	556	- Thiosinaminum*.....	769
- Naphtalinum*	562	- Thuja occidentalis.....	770
- Natrium muriaticum.....	563	- Thyreoidinum*	779
- Natrium silicium	572	- Tuberculinum avis*	780
- Natrium sulphuricum.....	577	- Tuberculinum bovinum.....	781
- Nitricum acidum.....	583	- Tuberculinum marmoreck*	790
- Nux vomica	591	- Vaccine attenuue bilie*	791
- Oenanthе crocata*	600	- Veratrum album.....	792
- Oleander*	601	- Vinea minor*	799
- Oleum animale aethereum*	602	- Viola odorata*	800
- Oleum jecoris aselli*	603	- Viola tricolor*	801
- Opium	604	- Zincum metallicum.....	802
- Palladium metallicum**	612		

VORWORT DER HERAUSGEBER

ZUR VIERTEN AUFLAGE

Die starke Nachfrage und die kurzen Abstände der Neuauflagen dieses Buches sprechen für sich. Es ist zu einem Bestseller der homöopathischen Kinderheilkunde geworden. Beständige Überarbeitung und Erweiterung formten seit der Erstfassung 2006 ein umfassendes Nachschlagewerk. Farokh J. Master gehört zu den erfahrensten Kollegen weltweit - er weiß um die Notwendigkeit in der Fülle der homöopathischen Literatur wichtiges, klinisch relevantes, Wissen von Unwichtigem zu trennen. Das wird in diesem Buch deutlich. Jeder Arzneieintrag ist sorgfältig erarbeitet - eine Verschreibung nach diesem Symptomenkatalog wird mit großer Wahrscheinlichkeit gelingen.

Umso mehr freuen wir uns über die fünf neuen, ausgewählten Arzneien, die diese 4. Auflage beinhaltet:

- Elaps corallinus
- Folliculinum
- Lac vaccinum defloratum
- Naja tripudians
- Palladium metallicum

Mögen sie dem Leser und Praktiker von Nutzen sein und ihm viele Heilerfolge in der Praxis bescheren.

Kandern, im Oktober 2013

Die Herausgeber

VORWORT DER HERAUSGEBER

ZUR DRITTEN AUFLAGE

Die „Klinische Homöopathie in der Kinderheilkunde“ erfreut sich seit ihrem ersten Erscheinen im Jahre 2007 ungebrochener Beliebtheit. Die vorliegende neue und deutlich erweiterte 3. Auflage wurde komplett überarbeitet und mit 108 neuen Mitteln ergänzt. Dies sind vor allem „kleinere“ weniger bekannte Mittel, die sich in Farokh Masters Praxis bei Kindern besonders bewährt haben. Oft sind es nur kurze aber prägnante Arzneimittelbilder, die wertvolle Schlüsselsymptome für diese leicht zu übersehenden Mittel liefern. Es beinhaltet auch Symptome, die speziell die Probleme unserer heutigen Zeit betreffen sowie differentialdiagnostische Hinweise zu anderen homöopathischen Mitteln.

Wir finden Mittel wie *Agraphis nutans*, welches sich u.a. bei Nasenpolypen bewährt hat, *Apium graveolens* bei Wachstumsschmerzen, *Arbutus menziesii* bei teilnahmslosen Kindern, *Artemisia vulgaris* bei Epilepsien, *Bromum* bei Akne, *Chloralum hydratum* bei Zahnen mit Nachtschreck, *Hedera helix* bei Hydrocephalus, *Jatropha curcas* bei cholera-artigen Durchfällen, *Laeticum acidum* bei juvenilem Diabetes, *Laurocerasus* bei zyanotischen Herzerkrankungen, *Squilla maritima* bei Heuschnupfen und *Viola tricolor* bei Impetigo. Die neuen Mittel wurden im Inhaltsverzeichnis mit einem Sternchen gekennzeichnet. Acht bereits vorhandene Mittel wurden erweitert. Damit enthält die 3. Auflage nun 187 Mittel, die sich besonders bei Kindern bewährt haben.

Farokh Masters Hauptwerk besticht nach wie vor mit seinem besonderen Reiz der Originalität. Der bekannte indische Arzt aus Berufung verfügt über eine ungeheure Fülle an klinischer Erfahrung, welche er in die Arzneimittelbilder einfließen lässt. So entstehen sehr lebendige Beschreibungen, die einem in der täglichen Praxis von großem Wert sind.

Beliebt ist auch das erste Kapitel des Werks, welches wertvolle Tipps zur Fallaufnahme wie der Vorgeschichte der Mutter und spezielle Hinweise zur Anamnese bei Neugeborenen und Säuglingen gibt. Durch genaue Beobachtung können bereits die Art des Schreiens, Stillgewohnheiten, Appetit, Gestik, Spielverhalten, Reaktionen auf Geräusche, Vorlieben beim Baden und Schlafen als wichtige Symptome bei der Mittelfindung eingesetzt werden. Ausführlich wird auch die körperliche Untersuchung beim Kind beschrieben.

Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir bereits Kinder erfolgreich homöopathisch behandeln, kann dies sonst oft lebenslang bestehende chronische Krankheiten verhüten. Wir hoffen, mit dieser erweiterten Ausgabe viele neue Anregungen für diese vielversprechende Heilmethode bei Kindern geben zu können.

VORWORT VON FAROKH MASTER

ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Ich habe mich sehr über die überwältigenden Reaktionen auf die erste Auflage gefreut, die ich sowohl von praktizierenden Homöopathen als auch von Homöopathiestudenten in Indien und aus der ganzen Welt erhalten habe, die das Buch als sehr nützlich empfanden. Durch dieses Feedback von Ihnen allen war ich inspiriert, diese neue, völlig überarbeitete zweite Ausgabe meiner „Klinischen Homöopathie in der Kinderheilkunde“ herauszubringen.

Besonders gegenüber den jungen Homöopathen betone ich immer wieder die wichtige Rolle, die die exakte Fallaufnahme und detaillierte systematische Untersuchung spielt, was ganz besonders für Kinder gilt.

Während meiner Vorträge und Seminare versuche ich, diese „Kunst der Beobachtung“ zu lehren, weil die sorgfältige Beobachtung oft die ausschlaggebende Information bringt, die zur erfolgreichen Verschreibung führt.

Die „Symptome“ dieses Buches sind im Gegensatz zu jeder üblichen Materia Medica nicht auf Arzneimittelprüfungen zurückzuführen, sondern basieren ausschließlich auf meiner Erfahrung, meiner eigenen klinischen Beobachtung (oder Bestätigung), die ich innerhalb von 23 Jahren praktischer Arbeit im Krankenhaus und in meiner eigenen, gut besuchten Klinik gesammelt habe (es arbeiten und lernen dort mehrere Homöopathen unter meiner Leitung). Deshalb decken die beschriebenen Arzneimittel nicht unbedingt die ganze Materia Medica anderer Textbücher ab.

Verglichen mit der ersten Ausgabe sind die klinische Untersuchung und die einführenden Kapitel überarbeitet worden. Im weiteren Text habe ich einige neue persönliche Beobachtungen und hilfreiche Referenzen eingefügt. Es sind einige neue Arzneimittel dazu gekommen, so dass die gesamte Anzahl in dieser zweiten Ausgabe 76 Mittel beträgt.

Die Arzneimittel sind in diesem Buch in einem völlig neuen Format beschrieben. Jede Beschreibung wurde eingeteilt in zwei Abschnitte: A. Charakteristische Merkmale und B. Weitere wichtige Symptome. Jeder dieser beiden Hauptteile ist wiederum eingeteilt in geistige und körperliche Symptome. Dazu eine kurze Erklärung.

Charakteristische Merkmale:

Ich habe absichtlich die geistigen Symptome bei den charakteristischen Merkmalen an den Anfang gestellt, weil es einfach ist, ein Kind anhand seiner besonderen geistigen und körperlichen Symptome zu erkennen.

- Die Symptome in diesem Teil sind der psychischen Analyse von Kindern entnommen und mit Hilfe der klinischen Psychologie gewonnen worden.

- Das Kapitel beinhaltet auch Symptome, die aus Fällen meiner pädiatrischen Patienten entstammen; dazu gehören Familienstrukturen, schulische Leistungen, Geisteszustand der Mutter während der Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit, Geisteszustand des Kindes usw.
- Es beinhaltet auch Symptome, die wiederholt in meiner Praxis während der letzten 23 Jahre bestätigt wurden. Etwa ein Viertel sind geistige und körperliche Symptome, die auf meinen persönlichen Beobachtungen beruhen.

Weitere wichtige Symptome:

Dies sind Symptome, die ich meistens erst dann nutze, wenn die charakteristischen Merkmale bestätigt wurden. Dieser Teil enthält viele klinische und pathologische Daten, wie körperliche Untersuchung, Röntgen, Computer- und Kernspintomographiebefunde, routinemäßige Urin- und Stuhluntersuchung, großes Blutbild, Speicheluntersuchung, Blutkulturen usw. Sie werden im Kopf-zu-Fuß-Schema beschrieben. Schlüsselsymptome („Keynotes“) sind **fett** gedruckt. Es sind dies Symptome, die dieses eine Mittel im Ausschluss zu anderen identifizieren helfen. Sie sind wie ein Schlüssel, der nur ein bestimmtes Schloss und kein anderes öffnen kann. Ich empfehle Studenten und Praktikern ausdrücklich, bei dem Kind auf diese fettgedruckten Symptome zu achten.

Die normal gedruckten Symptome sind keine Schlüsselsymptome, sind aber trotzdem wichtige Symptome des Mittels, welche die Schlüsselsymptome weiter bestätigen können und die Wahl der Arzneimittel damit viel zuverlässiger machen.

Wo immer möglich habe ich in runden Klammern () andere Mittel genannt, bei denen die gleiche Beobachtung gemacht werden kann. An einigen Stellen habe ich eine detailliertere Differenzierung zu anderen wichtigen, in Betracht kommenden Mitteln in Tabellenform vorgenommen.

Dieses Buch sollte nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Wie jede klinische Materia Medica ist sie immer offen für Ergänzungen durch ernsthafte, ehrliche und detaillierte Beobachtungen. Ich bin offen für jede Anmerkung und jeden Vorschlag bezüglich des Inhalts dieses Buches, so dass ich zukünftige Auflagen weiter vervollständigen kann. Die beste Art dieses Buch zu benutzen ist, es zum Krankenbett mitzunehmen und zu versuchen, Entsprechungen zu den angegebenen Symptomen zu finden. Man sollte also die klinischen Daten des Patienten, seine pathologischen Auffälligkeiten, Labordaten usw. mit den klinischen Beobachtungen des Buches vergleichen. Der Homöopath kann dem Patienten auch Fragen aus diesem Buch stellen, um ein mögliches Mittel zu bestätigen.

Ich bin zuversichtlich, dass auch die zweite Ausgabe homöopathische Studenten und Ärzte ermutigen wird, exakte (objektive) klinische Beobachtungen bei ihren pädiatrischen Patienten zu machen, ohne dabei die menschliche Nähe aufzugeben.

DANKSAGUNG

Es war mir eine große Freude, zusammen mit Pinky Bilimoria zu arbeiten, die mir hingebungsvoll und gewissenhaft half, diese zweite Ausgabe zu erstellen. Desweiteren möchte ich besonders Jayesh Dhingreja und Girish Soni danken, die zu späten Nachtzeiten arbeiteten und dabei ihren Nacken und die Augenmuskeln strapazierten und das aus reiner Liebe zur Homöopathie und zu mir. Ich möchte Roxanna Mirza dafür danken, dass sie meine Bitte, die Manuskripte zu korrigieren, so bereitwillig angenommen hat. Ich danke Rene Otter für alles, was er für mich getan hat und für seine Hilfe beim Herausgeben und Verlegen dieser Arbeit. Frau Sunita Shah danke ich für ihre Unterstützung beim Recherchieren im Radar-System und der Encyclopedia Homeopathica. Peter Wright übernahm die Verantwortung, das Manuskript mit seinen Adleraugen zu lekturieren.

Ganz besonders dankbar bin ich meiner Frau Dilnavaz, meinen lieben Töchtern, Mahaziver und Rukshin, und meiner Schwester Aban.

Auf der ganzen Welt gibt es Menschen und Freunde, denen ich auf die eine oder andere Weise dankbar bin. Freunde, die mich in ihr Haus oder ihre Klinik eingeladen haben, Freunde, die von mir gelernt haben, Freunde, mit denen ich fruchtbare homöopathische Diskussionen führen durfte oder die ihre homöopathische Erfahrung mit mir geteilt haben. Ich kann ihnen nicht allen persönlich danken, aber ich kann ihre Namen hier kurz erwähnen:

Ajay Jain, Alfons Geukens, Alize Timmerman, Ameet Panchal, Andre Saine, Anne Vervarcke, Antoinette van Hees, Asa Hershoff, Benaifer Adajania, Binal Shah, Britta Gudjons, Carlo Rezzani, Camilla Holmstrom, Cees Baas, Chaim Rosenthal, Chemla Chantal, Christian Ozanon, Corine Terstegge, Dale Emerson, Denis Laforgue, Didier Grandgeorge, Edward Mills, Elizabeth Weisz, Erik van Woen- sel, Erwin Doeuvre, Farhad Adajania, Farzana Furniturewala, Frederik Schroyens, Guy Kokelenberg, Harsha Sidhu, Horvath Katalin, Jawahar Shah, Jean-Francois Vermeire, Jean-Pierre Jansen, Jeno Ebert, Kim Elia, Kuldeep Jain, Manfred Braig, Mansi Gor, Matthias Meder, Marina Afanasieva, Maurice Gregoire, Mihail Kostadi- nov, Micki Elia, Mira Dorcsi, Nandkishor Sonawane, Patricia Le Roux, Peter Vint, Phil Edmonds, Philippe Vois, Pooja Bagree, Priya Jani, Rob Willemse, Reinhard Rose, Stephen Waters, Saba Khan, Saudamini Suryawanshi, Sigrid Kruse, Sunny Sidhu, Taruna Thakkar, Varsha Vora und all die anderen Freunde, die ich in dieser Aufzählung vergessen haben könnte.

Widmung

Bhagwan Shri Sathya Sai Baba

Dafür, dass er mich die Religion der Menschlichkeit gelehrt hat,
so dass ich sie mein Leben lang
ausüben kann.

Farokh J. Master

TEIL I

THEORIE

EINLEITUNG

Die Entwicklung eines Menschen gibt Aufschluss über viele eindeutige und wichtige Details. Ein Kind wird sowohl durch die „Natur“ (vererbte biologische Charakteristik) als auch durch die „Erziehung“ (Umwelteinflüsse) beeinflusst.

Die Entwicklungspsychologie erforscht die Veränderungen des Körpers, des Verhaltens, der Wahrnehmung und der Persönlichkeit, die ab dem Zeitpunkt der Zeugung, während der Kindheit und darüber hinaus stattfinden. Sie lehrt uns, dass es eine Grundstruktur bestimmter **elementarer Emotionen** gibt, die die Kinder von klein auf ausdrücken. Der erste Ausdruck einer solchen kindlichen Emotion bezieht sich auf die körperlichen oder biologischen Bedürfnisse oder Ziele, z. B. körperlicher Schutz oder Überleben. Wenn die Kinder älter werden, beginnen sie auch komplexere Emotionen wie Traurigkeit, Ärger, Angst usw. auszudrücken.

Diese emotionalen Reaktionen sind oft vorübergehender Natur, aber wenn sie stark genug sind oder lang genug anhalten, können sie sich zu einem emotionalen „**Zustand**“ verfestigen und zur „**Stimmungslage**“ werden. Dieser „Zustand“ beeinflusst dann langsam die Art und Weise, wie das Kind die Welt wahrnimmt und mit ihr umgeht. Wenn diese Emotionen eine dominante Charakteristik der Persönlichkeit des Kindes werden, so bilden sie oft die wichtigste Quelle von Symptomen, die auf das homöopathische Simillimum verweisen.

Es ist sehr wichtig, dass der homöopathische Arzt gut vertraut ist mit den emotionalen Eigenschaften, die allen Kindern gemein sind (durch sein Studium der Entwicklungspsychologie), um die „normalen“ von den „sonderlichen“ Symptomen unterscheiden zu können. Nur dann kann er die charakteristischen Symptome herausgreifen, die die Individualität des Patienten ausmachen und zu einer erfolgreichen Verschreibung führen.

Die gesunde geistige Entwicklung eines Kindes drückt sich im Alltagsverhalten aus, in einer altersgerechten Entwicklung des Kindes und durch eine insgesamt zufriedene Gemütsverfassung. Geistige Zufriedenheit zeigt sich durch die Art, wie das Kind mit seinen Gefühlen, Gedanken und Wünschen umgeht, die wiederum durch die körperlichen, psychischen und sozialen Erfahrungen entstehen, die das Kind im Laufe seines jungen Lebens macht. Wenn man Entwicklungspsychologie studiert und in der Praxis viele Kinder miteinander vergleicht, wird man fähig, einfacher zu entscheiden, was normales und was abnormales Verhalten ist.

Ein (kleines) Kind ist durch seine natürliche Abhängigkeit und Unreife nicht fähig, sich an die Fakten und Erfahrungen zu erinnern und uns mitzuteilen, die oft essenziell für die Auswertung sind. Deshalb ist es die Aufgabe des Arztes, das zu nutzen, was er selbst beobachten kann, was von anderen beobachtet wurde und die Beschreibung des Verhaltens und der Vorgeschichte durch die Eltern abzuschätzen und auszuwerten.

VERHALTENSSTÖRUNGEN

Die folgende Aufzählung von abnormalen Verhaltensweisen kann in den genannten Entwicklungsstadien beobachtet werden.

NEUGEBORENE (0-1 MONAT)

- „Syndrom des schwierigen Kindes“: Es wird charakterisiert durch Unregelmäßigkeiten des Schlafes, der Ernährung und der Ausscheidungsfunktionen, die einen frühen Hinweis auf zukünftige pathologische Zustände geben können.
- Andere Verhaltensweisen sind: Schwierigkeiten, das Kind zu beruhigen, Widerstand gegen das Stillen, Abwehrreaktionen auf Schmerz, laute Geräusche und helles Licht und schwacher Muskeltonus.
- Die Eigenschaften der Persönlichkeit des Babys können an seinem Temperament erkannt werden.

SÄUGLINGE (1-12 MONATE)

• INFANTILER AUTISMUS

- Aggressivität ohne Grund (unprovokiert).
- Im normalen Wachstum zurückgeblieben, Ambidextrie (Beidhändigkeit, keine Seite beginnt zu dominieren).
- Kein Lächeln als Reaktion auf die Gesichter oder Stimmen von Menschen; zeigt kein Zeichen von Verbundenheit.
- Echolalie. Das Kind brabbelt immer eine bedeutungslose Wiederholung von Wörtern, die man ihm vorspricht, statt auf die Stimmlage des Sprechers und die Aussage zu antworten.
- Unfähig zu gutem Augenkontakt.
- Schlafstörungen, anhaltendes Bettnässen und/oder Einkoten.
- Keine erhöhte Temperatur während Infektionskrankheiten. Kein Klagen über Schmerzen, weder verbal noch durch Gesten. Kein Unbehagen während Krankheiten. Es kann sogar sein, dass sich das Verhalten des Kindes während Krankheiten bessert.
- Selbstverletzung.

FRÜHE KINDHEIT

- AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT-HYPERAKTIVITÄTS-STÖRUNG (ADHS)

Bei Kleinkindern

- Ein frühes Zeichen kann eine erhöhte Reizempfindlichkeit sein, die zu undifferenzierten, deutlichen Abwehrreaktionen führen kann.
- Normalerweise klettert das Kleinkind sehr früh selbstständig aus dem Kinderbett und lässt sich davon durch seine Eltern nicht ohne weiteres abhalten.

Bei Kindern

- Antwortet für andere und ist redselig.
- Kann sich nicht auf mehr als einen Reiz konzentrieren und auf keinen Reiz länger als zehn Sekunden.
- Kontinuierliche Aktivität, die sich nicht stoppen lässt, wo es gefordert wäre.
- Störung in der Unterscheidung von rechts und links, Lesen der Uhr, visuelle oder auditive Wahrnehmung, Hand-Auge-Koordination.
- Explosive Reizbarkeit bei Kleinigkeiten, emotionale Labilität, Lachen abwechselnd mit Weinen. Unberechenbares Verhalten.
- Magenübersäuerung.
- Hastig; lässt beim Schreiben oft Wörter aus. Arbeiten werden unsauber und achtlos ausgeführt.
- Impulsiv, unfähig Angenehmes auf später zu verschieben, unfallgefährdet.
- Zwanghafte Beschäftigung mit Wasser und sich drehenden Objekten.
- Rastlos, schnelles Wachstum.
- Kurze Aufmerksamkeitsspanne, lässt sich leicht ablenken.
- Sehr launisch.

- KINDLICHE NEUROSEN
- Angst vor dem eigenen Tod oder dem Tod anderer durch falsche Vorstellungen vom Tod.
- Besteht darauf, sich die Hände zu waschen, nachdem es etwas angefasst hat, was es für schmutzig hält, aus Angst, der Schmutz könne ihm etwas anhaben.
- Phobien: Die Ängste sind so irrational, beharrlich oder intensiv, dass sie signifikant die normalen Funktionen stören, z. B. Angst vor Tieren, Menschen, Donner usw.
- Trennungsängste: Das Kind hängt sich an die Eltern, wenn es eine Trennung erwartet, hat Angst verloren zu gehen oder allein zu bleiben, bekommt Heimweh. Dies ist begleitet von Rivalität zu Gleichaltrigen und Geschwistern und von gestörten sozialen Verhaltensmustern.

- ABWEHRREAKTIONEN
- Gestresste Kinder können sich gegen die Untersuchung wehren, schieben die Hand des Arztes weg, treten ihn oder zeigen ihre Abwehr indirekt, indem sie die Aggression gegen andere richten, z. B. gegen Spielzeuge, andere Kinder usw.

- REAKTIVE BINDUNGSSTÖRUNG BEI SÄUGLINGEN UND IN DER FRÜHEN KINDHEIT
- Vermindertes Interesse an der Umwelt und mangelhafter Spieltrieb.
- Fehlen der normalen Blickfixierung von Augen und Gesichtern, Fehlen typischer Erwidierungsmimik, mangelnde Aufmerksamkeit.
- Gewichtsverlust, schwacher Tonus, mangelnde Beweglichkeit, schwache Reflexe beim Greifen und Füttern, schwache Stimme, erhöhte Schläfrigkeit.

- „SPEIKINDER“
- Gereiztheit und Hunger wechseln mit Episoden des Hochwürgens von Nahrung.
- Wiederholtes Ausspeien unverdauter Nahrung mit Gewichtsverlust abwechselnd mit Episoden normaler Funktion ohne Übelkeit oder andere gastrointestinale Störungen.
- Befriedigung durch das Hochwürgen.

- SPRACHPROBLEME
- Episodische Stummheit: Dies kann eine Reaktionsform des Kindes auf Problemsituationen sein.
- Stottern und Stammelzen.
- WUTANFÄLLE
- Kinder von 2-3 Jahren haben noch nicht gelernt, ihre Gefühle von Ärger oder Frustration zu kontrollieren. Sie können ihre Bedürfnisse noch nicht effektiv mitteilen. Sie können auch Zornausbrüche bekommen, wenn sie sich müde, gelangweilt oder einfach unwohl fühlen. Dies kann auch nur dazu dienen, Aufmerksamkeit zu erheischen. In extremer Form kann es in der Wut zu Spasmen mit Atemnot kommen.

SPÄTERE KINDHEIT

- KINDLICHE PSYCHOSEN
- Abnorme Fixierung auf bestimmte Spielzeuge, Objekte oder Menschen, Monomanie.
- Atypische und unberechenbare Reaktionen auf Sinneseindrücke.
- Verzerrtes oder bizarres motorisches Verhalten: auf dem Boden sitzend lang andauerndes Vor- und Zurückschaukeln oder wiederholte flügelartige Bewegungen mit den Händen.
- Gestörtes Sprechmuster: zeitweise stumm, dann wieder bizarre oder bedeutungslose Phrasen, Echolalie usw.
- Fasziniert von bestimmten Bewegungen, z. B. einem Ventilator, drehenden Objekten usw.
- Schwierige Sozialisation: Rückzug, Abkehr und Vermeiden von Augenkontakt.
- In der frühen Kindheit fällt auf, dass antizipierende Gesten fehlen, z. B. die Arme hochzunehmen, um hochgehoben zu werden, den Eltern durch das Haus zu folgen oder ihnen entgegen zu rennen, wenn sie heimkommen. Sie gehen bei Schmerzen oder Aufregung nicht zu den Eltern, um sich trösten zu lassen. Sie küssen und schmusen nicht und erwidern Verhaltensweisen nicht.
- Unpassender Umgang mit Gefahr: Setzt sich Gefahren aus oder gefährlich desinteressiert.
- Intellektuelle Retardierung mit normalen oder sogar überdurchschnittlichen Fähigkeiten in Teilbereichen.
- Widerstand gegen Veränderungen in der Umwelt.
- Ist sich offenbar der persönlichen Identität nicht bewusst und hat irrige Körpervorstellungen. Erforscht und untersucht seinen Körper oder will sich selbst verletzen.
- MANISCH-DEPRESSIVE EPISODEN IN DER KINDHEIT
- Atypische und unberechenbare Reaktionen auf Sinneseindrücke.
- Kinder sehen hoffnungslos in die Zukunft, werden lustlos und passiv, entwickeln gestörte Ess- und Schlafgewohnheiten, haben ein geringes Selbstwertgefühl und neigen zu Selbstvorwürfen.
- Verzerrtes oder bizarres motorisches Verhalten: auf dem Boden sitzen und Vor- und Zurückschaukeln über einen längeren Zeitraum oder wiederholte flügelartige Bewegungen mit den Händen.

- Fixierung auf bestimmte Spielzeuge, Objekte oder Menschen, Monomanie.
- Während der Depression herrscht eine ernste, allgemein unglückliche Stimmung.
- Unangemessener Umgang mit Gefahr, exzessive oder fehlende Angst.
- Intellektuelle Retardierung mit normalen oder sogar überdurchschnittlichen Fähigkeiten in Teilbereichen.
- Manie (mit den gleichen Symptomen wie im Abschnitt oben über kindliche Psychosen).
- Anhaltend gehobene, überglückliche, impulsive oder reizbare Stimmung.
- Widerstand gegen Veränderungen in der Umwelt.
- Ist sich seiner persönlichen Identität nicht bewusst und hat falsche Vorstellungen von seinem Körper. Erforscht und untersucht seinen Körper oder will sich selbst verletzen, indem er z. B. den Kopf an Gegenstände schlägt.
- VERHALTENSSTÖRUNGEN
- Aggressives Verhalten mit Hyperaktivität.
- Beschuldigt oder tyrannisiert andere; grausames, aufsässiges Verhalten, Wut, Feindseligkeit und Beschimpfungen.
- Bei der nicht-aggressiven Form fühlt sich der Patient schwach, verlassen, miss handelt, wertlos, hilflos und hoffnungslos.
- Fehlende Sorge um andere; gefühllos.
- Unangepasstes, antisoziales Verhalten; prahlend; narzisstische Einstellung.
- Anhaltendes Bettnässen.
- Ständiges Lügen, Ungehorsam, häufiges Schwänzen, Stehlen, Vandalismus oder sexuelle Zurschaustellung, selbst öffentlich.

Die Verhaltensstörungen können zwei Mustern folgen:

- Angstvoll und scheu; lügnerisch; manipulativ; emotional unreifes, kindisches Verhalten; z. B. winselnd, fordernd, Wutausbrüche, misstrauisch.
- Selbstsüchtiges, ausbeutendes, manipulatives, gekünsteltes Verhalten.

- DYSLEXIE/LEGASTHENIE

- Schwierigkeiten beim Lesen. Häufig auch Lern-, Sprach-, Mathematik- und Artikulationsstörungen.

- RENITENTES VERHALTEN

- Häufig beobachtete Begleitsymptome: Bettnässen, Einkoten, zeitweilige Stummheit, Weglaufen, Schule schwänzen, Ess- und Schlafprobleme.
- Im Extrem wird das Kind streitsüchtig, rebellisch, kampflustig bis zu kriminellem Verhalten. Dies führt zum Verlust der Freunde und zur Entwicklung unbefriedigender Beziehungen. Schließlich lassen die schulischen Leistungen nach und das Sozialverhalten des Kindes wird immer schwieriger.
- Starrsinn, Aufschieben, Ungehorsam, Sorglosigkeit, Negativismus, Trödelei, Provokation, Widerstand gegen Veränderungen, geht Regeln aus dem Weg.
- Ständige Verweigerungshaltung und Ungehorsam gegenüber allen Autoritäten.
- Diese Störung bildet sich in der Phase, in der das Kind seine wachsende Autonomie ausdrücken will. Es zeigt sich im Trotz gegen die Eltern, in übertriebener Aggression bei Wahrnehmung von Gefahr sowie bei der Suche nach seiner Rolle unter Gleichaltrigen.

- PSYCHOSOMATISCHE STÖRUNGEN

- Asthma.
- Konversionsneurose.
- Essstörungen.
- Krankhafte Essgelüste: können ausgelöst sein durch eine gestörte Mutterbeziehung, bei der die oralen Bedürfnisse des Kindes nicht befriedigt wurden.
- Colitis ulcerosa.

- PSYCHOSOZIALE WACHSTUMSHEMMUNG

- Autostimulierendes Verhalten wie schaukeln, den Kopf anstoßen, urinieren, an der Haut zupfen usw.
- Vermindertes Längenwachstum bei steigender Gewichtszunahme.
- Ängstlicher Gesichtsausdruck.
- Hypokinesie, Dumpfheit, Lustlosigkeit und verminderte Aktivität.
- Fehlende Erwidern oder verminderte Reaktion auf Reize.
- Unterernährung.
- Hervorstehender Bauch, faul riechende Stühle, Marasmus, schwacher Muskeltonus, Haut kalt, blass und marmoriert.
- Trauriger, unglücklicher, freudloser und bedauernswerter Ausdruck.

- SCHULÄNGSTE

- Das Kind gerät in Panik und zeigt körperliche Reaktionen wie Erbrechen bei dem Gedanken, zur Schule gehen zu müssen. Bei jüngeren Kindern bedeutet dies Trennungsangst. Bei älteren Kindern kann es wegen Problemen im Elternhaus sein, wegen mangelnder schulischer Leistungen oder Beziehungsproblemen zu Mitschülern oder aus Angst vor Autoritäten.

DIE KUNST UND WISSENSCHAFT

HOMÖOPATHISCHER PÄDIATRIE

PERSÖNLICHKEITSPROFIL EINES HOMÖOPATHISCHEN KINDERARZTES

Dr. Meharban Singh, einer der führenden Kinderärzte Indiens, beschreibt die Qualitäten eines homöopathischen Arztes sehr schön in seinem Buch „Pediatric Clinical Matters“; dies inspirierte mich, die folgenden Punkte zu notieren.

Gewisse Qualitäten und Eigenschaften sind für einen homöopathischen Arzt unumgänglich, wenn er ein Kind behandeln will:

- Obwohl die Homöopathie ein therapeutisches medizinisches System ist und professionell betrieben wird, sollte man sie dennoch als Dienst am Göttlichen ausüben. Gott begegnet uns in jedem Kind und in jedem Elternteil, der das Kind begleitet. Das Leben ist unermesslich kostbar und das Leben eines Kindes sollte nicht nach materiellen Maßstäben bewertet werden.
- Der Arzt muss über wissenschaftlichen Verstand verfügen und dabei eine logisch aufgebaute Fragetechnik benutzen, aber er sollte nicht zum Sklaven einer Fragetechnik um ihrer selbst willen werden. Er sollte immer Schüler bleiben, ständig versuchen, die Wahrheit zu erkennen und falsche Vorstellungen abzulegen, um so sein Wissen in Weisheit zu transformieren.
- Er sollte ein sehr sorgsamer Beobachter sein und jedes Detail im Verhalten und in der Einstellung des Kindes und der Eltern bemerken. Seine Beobachtungen sollten auf gesunden Prinzipien beruhen und nicht auf Hypothesen und Theorien.
- Er sollte in der Lage sein, bei den Eltern Vertrauen in seine Kompetenz zu erwecken, da die meisten Eltern mit Mythen und falschen Vorstellungen von den Möglichkeiten der Homöopathie bei verschiedenen Kinderkrankheiten vorbelastet sind. Zu viele Homöopathen haben durch mangelnde Erfahrung und fehlendes Wissen traumatische Erfahrungen bei den Eltern hinterlassen, die ihr Schicksal in deren Hände gelegt hatten.
- Er sollte Vertrauen, Geduld und Höflichkeit ausstrahlen.
- Er sollte sich auf menschliche Weise nähern.
- Er sollte eine angenehme Persönlichkeit und einen liebevollen Blick haben, damit sich das Kind bei ihm wohl fühlt und keine Angst entwickelt.
- Er sollte aufrichtige Liebe zu Kindern empfinden.
- Er sollte nicht dogmatisch sein und die Grenzen der Homöopathie und seines eigenen Wissens kennen. Er sollte niemals zögern, einen Fall entweder an einen erfahreneren Homöopathen oder einen Kinderarzt abzugeben.
- Sein übergeordnetes Motiv sollte immer - und zwar vor allen anderen Gesichtspunkten wie z. B. dem eigenen Ego und dem finanziellen Gewinn - das Wohl des Kindes sein.
- In der Kinderklinik oder in der Ambulanz sollte der Homöopath gute kollegiale Beziehungen unterhalten. Es ist seine Pflicht, am Krankenbett korrektes Verhalten zu zeigen und gegenüber seinen Studenten ein Vorbild zu sein.

QUALITÄTEN EINES HOMÖOPATHISCHEN ARZTES

Ein guter homöopathischer Arzt sollte über folgende Qualitäten verfügen, bevor er einen Patienten untersucht:

- Die flinke Schnelligkeit eines Hasen (schnell entscheiden und prompt reagieren).
- Die Ausdauer einer Schildkröte (Arzneimittel nicht zu oft wechseln, wenn kein zwingender Grund vorliegt).
- Das Gedächtnis eines Elefanten (die Materia Medica und das Repertorium kennen).
- Die scharfen Sinne eines Tigers (exakt beobachten).

Während der letzten Jahrzehnte hat sich in der Wissenschaft der Homöopathie eine gewaltige Revolution vollzogen, durch welche die Materia Medica um viele **neue Mittel** ergänzt worden ist und viele aktuelle klinische Beobachtungen von gebräuchlichen und seltenen Arzneimitteln publiziert wurden.

Anstatt von vornherein für oder gegen die Anwendung von etwas Neuem zu sein, sollten wir vollen Nutzen aus dem Verfügbaren ziehen und Vor- und Nachteile abwägen. Zudem sollten wir nicht überehrgeizig sein und aus diesem Grund etwa Informationen verheimlichen oder gar falsche Behauptungen aufstellen.

Das Wissen des Homöopathen resultiert vor allem aus:

- Seiner akademischen Ausbildung.
- Seiner klinischen Erfahrung.
- Seiner Intuition.

Das Wissen über die Krankheit ergibt sich aus:

- Dem Bericht des Patienten.
- Der körperlichen Untersuchung.
- Zusätzlichen Untersuchungen (Labordaten, bildgebende Verfahren usw.).

Indem man seine Erfahrung in Homöopathie, Allgemeinmedizin und Krankheitsbildern kombiniert, wird eine systematische Analyse möglich. Sie führt zu einer Diagnose und letztlich zu verschiedenen therapeutischen Optionen, wie z. B.:

- Alleinige Gabe homöopathischer Mittel.
- Alleinige Gabe allopathischer Mittel.
- Allopathische Mittel kombiniert mit homöopathischen Mitteln.
- Operation (als einzige Maßnahme oder in Kombination mit anderen Behandlungsformen).
- Homöopathie und Psychotherapie.
- (Gebete um die Gnade Gottes).

FALLAUFNAHME: DIE VORGESCHICHTE

Die Vorgeschichte sollte zwei Teile berücksichtigen: Die Vorgeschichte der Mutter und die Vorgeschichte des Kindes.

DIE VORGESCHICHTE DER MUTTER

Die meisten Krankheiten, die sich bei einem Kind in den ersten Lebensjahren zeigen, sind direkt oder indirekt mit dem körperlichen und emotionalen Zustand der Mutter während der Empfängnis, der Schwangerschaft und der Geburt verbunden.

DAZU GEHÖREN FOLGENDE FRAGEN:

- Die Persönlichkeit der Mutter.
- Die Gründe, warum sie schwanger werden wollte.
- Die Umgebung während ihrer Schwangerschaft und etwaige Erlebnisse schlechter Nachrichten oder andere Einflüsse auf ihre Gemütsverfassung (z. B. Entführungen, Terrorismus, Krieg, Aufruhr, Religionskriege usw.).
- Ihr Gefühl und ihre Gemütsverfassung (besonders starke Gefühle wie Trauer, Schock, Furcht, Enttäuschung, Hass, Vernachlässigung usw.) während der Schwangerschaft und Geburt.
- Alle physischen Verletzungen während der Schwangerschaft.
- Medizinische Probleme wie pränatale oder postnatale Komplikationen.
- Abtreibungsversuche.
- Sozioökonomischer und kultureller Hintergrund.
- Die unmittelbaren Gefühle, als sie das Baby nach der Geburt zum ersten Mal hörte oder sah.
- Die Gefühle beim Stillen.

DIE VORGESCHICHTE DES KINDES

Die meisten Krankheiten, die das Kind in den allerersten Jahren seines Lebens entwickelt, haben eine direkte oder indirekte Verbindung zum Zustand der Mutter während der Zeit der Empfängnis, der Schwangerschaft und Geburt. Die folgenden Fragen sind immer nützlich:

- Finden Sie immer heraus, ob es sich um eine lokale oder eine systemische Krankheit handelt.
- Untersuchen Sie immer gründlich die durch den Krankheitsprozess betroffenen Organe und Systeme.
- Man sollte immer versuchen herauszufinden, ob die Krankheit akut, subakut oder eine akute Manifestation einer chronischen Krankheit ist.
- Der Beginn, die Entwicklung und der Verlauf der Krankheit sollten immer im Detail festgehalten werden.
- Ethnische oder genetische Faktoren sind wichtig, weil oft umweltbedingte und soziale Charakteristika den Krankheitsprozess beeinflussen.
- Die psychologischen, sozialen, geographischen und ökologischen Faktoren, die den Krankheitsprozess beeinflussen, sollten identifiziert werden.

GOLDENE REGELN

- Eine gute Fallaufnahme ist der halbe Weg zur Heilung.
- Keine Beobachtung der Mutter oder des Vaters, so dumm, trivial oder unwichtig sie auch scheinen mag, sollte ignoriert werden, selbst wenn sie nicht völlig in Ihre Diagnose oder Symptomen-Gesamtheit passt. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass solche Beobachtungen fast immer zum Lösen auch der schwierigsten Fälle sehr nützlich gewesen sind.

BEOBACHTUNG VON NEUGEBORENE, SÄUGLINGEN UND KLEINKINDERN

Diese Gruppen von Patienten sind am schwierigsten zu beobachten, aber im Laufe von vielen Jahren wurden die folgenden Beobachtungen gemacht, die sich für mich als sehr nützlich erwiesen haben und die ich deshalb weitergeben möchte. Sobald eine Beobachtung festgehalten wird, versuche ich eine passende Rubrik im Repertorium zu finden. Die Wahl der richtigen Rubrik ist auch ein sehr wesentlicher Schritt zum Erfolg in der homöopathischen pädiatrischen Praxis.

Folgende Beobachtungen habe ich oft verwendet:

- **Fühlt sich das Neugeborene wohl im Schoß seiner Mutter?**

Zum Beispiel:

- **Fühlt sich nicht wohl in den Armen der Mutter:** Thuja.
- **Fröhlich und glücklich, wenn es auf dem Schoß der Mutter liegt:** Ant-t, Bism-sn, Cham, Gels, Kali-c, Lyc, Phos, Puls, Sanic.
- **Wie schreit das Neugeborene?**
 - Der **Hungerschrei**, der **schmerzhaft** Schrei und der **Schrei, um Aufmerksamkeit** zu bekommen, sollten unterschieden und die Rubriken entsprechend ausgewählt werden.
 - Das Schreien aus **Schmerz** ist ein lauter Schrei, gefolgt von einer Pause und dann erneut ein kräftiger Schrei.
 - Das Schreien wegen **Hunger** steigert sich von kleinen Schluchzern langsam zu kräftigem Schreien.
 - Das Schreien des Babys nach **Aufmerksamkeit** besteht nur aus kleinen, weinerlichen Tönen.
 - Beachten Sie, dass es bei schmerzhaften Schreien immer Tränen gibt, während Sie beim Hungerschrei meist keine Tränen sehen.
- **Arten des Schreiens:**
 - **Weicher, Mitleid erregender Schrei:** Puls.
 - **Gereizter Schrei:** Cale, Cham, Ipec., Sep usw.
 - **Häufiges Schluchzen:** Cham, Cupr, Hell, Hyos, Ign, Lyc, Op, Stram usw.
 - **Winselt und wimmert unaufhörlich:** Bell, Borx, Bry, Cham, Cina, Cupr, Nux-v, Rheum, Stram.
- **Welche Seite der Brust wird bevorzugt?**
 - Die Rubriken in *Allgemeines; Seite - rechts- oder linksseitige Beschwerden* sollten entsprechend berücksichtigt werden.
- **Saugt das Kind langsam oder kräftig?**
 - Für **langsames Saugen** sollte man unter *Gemüt; Langsamkeit - essen und trinken* nachsehen: Cale, Hell, Sulph.
 - Für **kräftiges Saugen** sollte man unter *Gemüt; Eile - Essen, beim und Trinken, beim* nachschlagen: Caust, Hep, Lyc, Zinc.

- **Wie oft wird nach Nahrung verlangt?**

- Einige Neugeborene brauchen nur kurz gestillt zu werden und sind sofort zufrieden, während andere längere Zeit saugen und dann, nach wenigen Minuten, wieder heftig danach verlangen, angelegt zu werden. Andere wollen nicht wirklich saugen, sondern brauchen die Brustwarze im Mund zur Beruhigung.
- **Ist nach dem Stillen sofort wieder hungrig:** Cale, Cic, Iod, Lyc, Mere, Phos, Psor, Sil.
- **Sehr wenig Appetit:** Alum, Bar-c, Cina, Lac-def, Lac-h, Tub.
- **Befriedigt schon nach einigen Schlucken:** Am-c, Cina, Lyc, Rheum, Sil.

- **Schläft das Kind beim Stillen ein oder ist das Kind dabei fröhlich, weint es oder wird es unruhig?**

- *Schlaf; Schläfrigkeit, übermächtige - Essen, nach:* Cale, Carbo-veg, Lyc, Nux-v usw.
- *Schlaf; Schläfrigkeit - Trinken, nach dem:* Nux-m, Ph-ac.
- *Schlaf; Einschlafen - Essen, nach dem:* Arum-t, Bov, Calc-p, Graph, Lyc.
- *Gemüt; Ruhelosigkeit - Essen:* Borx, Petr.
- *Gemüt; Fröhlich - Essen, nach:* Puls.
- *Gemüt; Weinen - Essen, nach:* Iod, Puls.
- *Gemüt; Weinen - Essen, beim:* Bell, Staph.
- *Magen; Schluckauf - Essen, beim:* Lac-h, Mag-m, Mere, Samb.

- **Schwitzt das Kind beim Stillen?**

- *Schweiß; Essen, beim:* Ant-t, Bar-c, Cale, Carbo-veg, Kali-c, Mere, Nat-m, Puls, Sep, Sil usw.

- **Weigert sich das Kind zu saugen?**

- *Abneigung gegen die Muttermilch:* Borx, Calc-sil, Cina, Mere, Sil usw.

- **Lässt das Kind Flatus, Urin oder Stuhl während oder nach dem Stillen?**

- *Rektum; Stuhldrang - Essen, beim:* Sanic.
- *Rektum; Flatus - Essen, nach dem:* Aloe, Ant-c, Op.

- **Wie wirkt Baden auf das Neugeborene?**

- Neugeborene werden nach der Geburt normalerweise in lauwarmem Wasser gebadet.
- Wenn das Kind beim Baden **schreit, in Konvulsionen fällt oder steif wird**, verwenden Sie die Rubrik *Allgemeines; Baden - heißes Baden - agg:* Apis, Bell, Bry, Gels, Iod, Lach, Nat-m, Sulph usw.
- Einige Kinder **baden nicht gern**, auch nicht, wenn sie größer werden. *Allgemeines; Baden - Abneigung gegen Baden:* Am-c, Ant-c, Bell, Borx, Cham, Psor, Puls, Sep, Sulph, Zinc.
- Einige Kinder **baden und spielen gern im Wasser:** *Fröhlich - Baden, beim oder Verlangen, mit Wasser zu spielen:* Calc-s, Lac-del, Lac-Leo, Tarent.
- Für Kinder, die sich **vor dem Baden fürchten**, können Ant-c oder Sulph nützlich sein.
- Nach dem Bad werden die Neugeborenen wie eine ägyptische Mumie in ein Tuch eingewickelt. Babys, die **frösteln, lieben** solche **Wärme und Geborgenheit**, z. B. Sil, Calc, Hep und Psor. Babys, die **heißblütig** sind, strecken zunächst

langsam den einen, dann den anderen Arm heraus und **wickeln sich** dann in wenigen Minuten **aus**. Med, Iod und Sulph gehören zu dieser Kategorie.

• **Wie sehen die Augen aus?**

- Augen sind die Spiegel des Gemüts. Eine Untersuchung der Augen offenbart dem Homöopathen viele Informationen.
- Während eines **Schrecks** werden die Augen groß und starren mit erweiterten Pupillen. *Augen; Pupillen - erweitert:* Acon, Bell, Cale, Cupr, Gels, Hyos, Lac-c, Lyss, Op, Stram, Stry, Tarent.
- Bei einem **traurigen Kind** sehen die Augen klein, trübe und matt aus und die Pupillen sind verengt. Siehe *Augen; Stumpfe, trübe Augen:* Ant-t, Bapt, Bar-c, Mere, Nux-v, Sulph.
- Bei einem **fröhlichen und angeregten** Kind sind die Augen leuchtend und groß. *Augen; Glänzend:* Bell, Camph, Op, Stram.

• **Wie ist der Gesichtsausdruck des Neugeborenen, während es gebadet, angekleidet (besonders mit einem Pullover) oder aus dem Bettchen gehoben wird?**

- Alle diese Beobachtungen sind wichtig und können so manche Information offenbaren, die notwendig ist, um das richtige Heilmittel auszuwählen. Stram- und Calc-Kinder haben eine ausgeprägte **Furcht vor Wasser im Gesicht** und lassen sich folglich nicht baden oder sie weinen und schreien laut, wenn man sie badet oder ihnen Wasser ins Gesicht spritzt.
- Neugeborene, die sich gegen Kleidung mit hochgeschlossenem Kragen wehren, brauchen Lach.
- Ein Borx-Kind **weint** wegen seiner Angst vor Abwärtsbewegungen, wenn es **in die Wiege gelegt oder aus der Wiege gehoben** wird.
- Cale und Lyc weinen gleichfalls, wenn sie **aus der Wiege gehoben** werden, aber hier aus ihrer Angst zu fallen.

• **Welche Schlafposition sieht man?**

Die häufigsten Positionen mit den entsprechenden Rubriken:

- **Schläft auf dem Bauch:** Abrot, Bell, Cale, Calc-p, Lac-c, Lyc, Med, Nat-m, Phos, Puls, Stram, Sulph, Tub.
- Cupr liegt auch auf dem Bauch, aber neigt dazu, im Schlaf **spastisch mit dem Becken nach oben zu zucken**.
- **Schläft zusammengerollt wie ein Hund:** Ars, Bapt, Bry, Psor.
- **Schläft wie ein Frosch oder mit an die Brust gezogenen Knien (Knie-Brust-Lage):** Calc-p, Care, Lyc, Med, Phos, Tub.
- **Ändert oft seine Position:** Ars, Lyc, Mosch, Phos, Sil, Tub.
- **Schläft mit angezogenen Beinen:** Cham, Hell, Merc-c, Puls, Stram.
- **Spreizt die Beine:** Plat, Cham.
- **Bohrt den Kopf ins Kissen:** Apis, Bell, Hell, Verat.
- **Knirscht das Kind während des Schlafes mit den Zähnen, sabbert es, schwitzt es, weint es, schreit es, lacht es oder zuckt es mit den Gliedern?**
- **Knirscht mit den Zähnen:** Ars, Bac, Bell, Bry, Cina, Hell, Hyos, Mere, Stram, Tub, Verat.

- **Reichlicher Speichelfluss:** Lyc, Mere, Phos, Puls.
- **Schwitzt reichlich:** Bell, Calc, Cham, Hyos, Plat, Puls, Rhus-t, Sil, Sulph, Thuj.
- **Wimmert oder weint:** Bar-c, Cham, Ipec., Merc, Op.
- **Schreit:** Apis, Calc-p, Puls, Rheum, Sulph, Tub.
- **Lacht:** Bell, Hyos, Lyc, Sil, Stram, Sulph.
- **Zuckt unwillkürlich mit den Gliedern:** Cupr, Kali-c, Sil, Zinc.
- **Konvulsionen nachts im Schlaf:** Bufo.
- **Es ist sehr wichtig, den Schweiß eines neugeborenen Kindes zu beobachten.**

Das Schwitzen an einem bestimmten Körperteil kann uns wichtige Hinweise auf das Heilmittel geben.

- **Schweiß auf der Nase:** Bac, Bell, Cina, Hell, Nat-m, Rheum, Tub.
- **Schweiß auf der Oberlippe:** Med, Rheum, Thuj. Rheum hat auch Schweiß auf der Unterlippe.
- **Schweiß um die Augenlider und Augenbrauen, besonders im Schlaf:** Calc-p.
- **Schwitzt auf dem Kopf, besonders nachts:** Calc, Med, Mere, Sanie, Sil.
- **Schwitzt überall, außer auf dem Kopf:** Bell, Rhus-t, Samb, Thuj.
- **Schwitzt auf dem Bauch:** Ambr, Anac, Arg-met, Cic, Phos, Thuj.
- **Schwitzt am Hals:** Bell, Cham, Mang, Rhus-t, Samb, Sulph.
- **Man sollte auch Verfärbungen der Wangen erfassen.**
- **Bläulich verfärbt:** Cham.
- **Blass:** Anac, Ant-t, Bufo, Cale, Camph, Carbo-veg, Cina, Cupr, Graph, Med, Op, Puls, Rheum, Tub.
- **Umschriebene Rötung der Wangen:** Ant-t, Camph, Caps, Cina, Ferr, Iod, Lyc, Phos, Puls, Sulph, Tub.
- **Beachte auch etwaige Falten oder Runzeln auf der Stirn.**
- **Runzlige Stirn:** Bry, Cham, Caust, Graph, Hell, Lyc, Nux-v, Rheum und Stram.
- **Runzlige Stirn bei Gehirnbeschwerden:** Hell, Stram.
- **Achte auf etwaige unwillkürliche Bewegungen.**
- **Unwillkürliches, rasches Vor- und Zurückschnellen der Zunge:** Cupr, Elaps, Lach, Lyc, Mere, Sanic.
- **Nystagmus:** Agar, Cale, Cupr, Gels, Nux-v, Sulph.
- **Pendelartige Bewegung der Augen:** Agar, Bell, Cupr, Gels, Hyos, Stram.
- **Unwillkürliche Bewegung eines Armes und Beines:** Apoc, Cocc, Hell.
- **Unwillkürliche Bewegung der unteren Extremitäten:** Mere, Stram.
- **Unwillkürliche Bewegungen jeglicher Art, die im Schlaf verschwinden:** Mygal, Agar.
- **Unwillkürliches Zucken der Glieder im Schlaf** - wurde schon früher erwähnt und kann auch hier angewandt werden.
- **Wie ist der Gesichtsausdruck des Kindes?**
- **Besorgt:** Acon, Aeth, Ars, Bell, Borx, Cale, Camph, Coloc, Cupr, Verat.
- **Geistig behindert:** Agar, Bufo, Cale, Cic, Laur, Stram.
- **Altes Aussehen:** Abrot, Op, Sars, Sil.
- **Leerer Blick:** Anac, Bell, Camph, Hell, Ph-ac, Stram.
- **Leidend:** Ant-t, Ars, Kali-c, Lyss, Mang, Puls, Sil, Sulph.

- **Beachte die Haarfarbe.**
- **Rot:** Calc-p, Ferr, Lach, Phos, Puls, Rhus-t, Sep.
- **Braun:** Ars, Carc, Iod.
- **Dunkel:** Lach, Lyc, Nat-m, Sep.
- **Beachte die Farbe, den Geruch und die Konsistenz des Stuhls.**
- **Schwarz:** Ars, Merc, Op, Plb, Stram, Verat.
- **Lehmfarben:** Cale, Card-m, Dig, Gels, Iod, Mere, Nat-s, Podo, Sil.
- **Grün:** Aeth, Agar, Borx, Cham, Cupr, Mere, Nat-m, Nat-s, Phos, Plb, Puls, Sanic, Sulph, Verat.
- **Gestank nach faulen Eiern:** Cale, Cham.
- **Gallig:** Crot-h, Mere, Nat-s, Podo, Puls und Verat.
- **Veränderlich:** Cham, Dulc, Puls, Sanic, Sulph.
- **Geronnen:** Cale, Nit-ac, Rheum, Sanic.
- **Fettig oder schmierig:** Iod, Phos.
- **Schaumig:** Borx, Cale, Graph, Iod, Kali-bi, Merc, Op, Rheum, Sil, Sulph.
- **Erst hart, dann weich:** Aeth, Bov, Cale, Lyc.
- **Klein, wie Kugeln:** Alum, Calc-p, Mag-m, Med, Mere, Nat-m, Op, Plb, Sil, Sulph.
- **Farbe und Geruch des Urins beurteilen.**
- **Blutig:** Bufo.
- **Ausscheidung von hyalinen Zylindern (Mikroskopie):** Borx.
- **Bräunlich:** Ars, Bry, Chel, Hell, Merc-c, Phos, Puls.
- **Grünlich:** Camph, Cina, Iod, Merc-c, Rheum.
- **Milchig:** Agar, Apis, Calc, Cina, Lyc, Phos, Sep.
- **Intensiver Geruch nach Ammoniak:** Cale, Iod, Mosch, Petr, Tub.
- **Saurer Geruch:** Cale, Graph, Merc, Sep.
- **Hinterlässt braunes Sediment:** Ambr, Apis, Lach.
- **Hinterlässt kaffeesatzartiges Sediment in der Windel:** Apis, Hell.
- **Welcher Teil des Körpers ist bei Fieber heiß oder kalt?**
- **Heißer Bauch bei Fieber:** Apis, Ars, Bry, Cham, Cic, Ferr, Graph, Ipec., Lyc, Sil.
- **Heiße Ohren bei Fieber:** Alum, Calc, Merc, Puls.
- **Heißer Kopf und kalte Extremitäten bei Fieber:** Arn, Bell, Bry, Ferr, Ipec., Stram.
- **Hitze besonders am Hals, bei Fieber:** Bar-c, Calc, Mere, Nux-v, Puls, Sulph.
- **Heiße Fußsohlen bei Fieber:** Cupr, Ferr, Graph, Sulph.
- **Kälte, die von den Füßen ausgeht:** Bar-c, Rhus-t, Sulph.
- **Kalte Nase bei Fieber:** Bell, Nux-v, Verat.
- **Zeichen von Furcht oder Angstreaktionen.**
- Mit ungefähr vier Monaten weiß das Kind, wer zur Familie gehört und wer nicht. Wenn sich bei einem Kind eine **Furcht vor Fremdem** entwickelt, kann man an Ambr, Bar-c, Bufo, Cupr, Puls, Sil und Thuj denken.
- **Beobachte die Reaktion des Kindes auf Geräusche wie Bohrmaschine, Waschmaschine usw.**
- **Erschrickt beim kleinsten Geräusch:** Borx, Calc, Cic, Kali-c, Med, Mere, Nat-c, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Op, Phos, Sil.

-
- **Erwacht erschreckt vom kleinsten Geräusch:** Nux-v.
 - **Empfindlich auf schrille Geräusche:** Bar-c, Cale, Iod, Lyc.
 - **Empfindlich auf das Geräusch von spritzendem Wasser:** Brom, Lyss, Stram.
 - **Wir haben auch Ängste vor Masken, Ballons und Stofftieren beobachtet.**
 - **Starke Furcht vor Masken oder abscheulichen Gesichtern:** Bar-c, Bell, Cale, Phos.
 - **Furcht vor dem Anblick glänzender oder leuchtender Gegenstände:** Lyss, Stram.
 - **Ekel vor weichen und flauschigen Spielsachen oder Teddys:** Calc, Carc, Med, Puls, Tub.
 - **Beachte auch die Gesten des Kindes im Wachen und im Schlaf.**
 - **Verkrampft die Daumen:** Aeth, Apis, Bufo, Cham, Cic, Cupr, Merc.
 - **Spielt die ganze Zeit mit den Fingern:** Bell, Cale, Hyos, Tarent, Ther.
 - **Nimmt andauernd die Finger oder Gegenstände in den Mund:** Cale, Cham, Ipec., Lyc, Med, Mere, Sacch, Sil, Sulph, Tarent.
 - **Verlangt permanent nach seinem Schnuller. Heult und jammert, wenn er weggenommen wird:** Cham, Med.
 - **Verbirgt das Gesicht in den Händen und schaut durch die Finger hindurch:** Bar-c.
 - **Hält sich im Schlaf an der Mutter fest:** Borx.
 - **Zieht andere an den Haaren:** Bell.
 - **Stampft oft mit den Füßen:** Cham, Cina, Op, Stram.
 - **Tritt im Schlaf mit den Füßen:** Bell, Ign.
 - **Spielt dauernd mit den Knöpfen seiner Kleidung:** Mosch.
 - **Wie verhält sich das Kind auf dem Weg von zu Hause zur Krippe oder in den Kindergarten?**
 - **Trennungsangst:** Cale, Bar-c, Puls.
 - **Geht gern in die Schule oder zur Tagesmutter:** Calc-p, Tub.
 - **Welche Spiele oder Spielsachen werden bevorzugt?**
 - **Spielt viel mit den Händen:** Cale.
 - **Gras:** Elaps.
 - **Versteckspiel:** Bell, Stram, Tarent.
 - **Kriegsspiele:** Bell, Stram, Tub.
 - **Räuber-und-Gendarm oder Pistolen:** Agar, Bell, Cupr, Tub.
 - **Puppen:** Aeth, Bar-c, Calc-p, Puls.
 - **Lego:** Cale, Lyc, Phos, Sil.
 - **Videospiele:** Bufo, Cale, Sil, Tarent, Tub.
 - **Scrabble:** Calc-p, Calc-sil, Lyc, Sil, Sulph.
 - **Gibt es irgendwelche besonderen Vorlieben in Bezug auf die Kleidung?**
 - **Tupfen-Muster werden bevorzugt:** Calc-p, Phos, Sep.
 - **Kleine Mädchen wollen jugenhafte Kleidung tragen:** Nat-m, Plat, Staph.
 - **Kinder, die oft vor dem Spiegel stehen und prüfen, wie sie ausschauen:** Pall, Plat, Puls, Stram, Verat.

- **Spielt das Kind gerne mit anderen Kindern?**
- **Ist es lieber allein und mag die Gesellschaft anderer Kinder nicht:** Bar-c, Cale, Cham, Cic, Nat-m.
- **Spielt nicht gerne; sitzt in einer Ecke herum:** Bar-c, Rheum.
- **Mag Gesellschaft und nimmt leicht Kontakt zu anderen auf:** Ars, Hyos, Lac-c, Lyc, Phos, Puls, Stram.
- **Verspielt und schelmisch:** Anac, Bell, Bufo, Cham, Cina, Cupr, Lach, Mere, Stram, Tarent, Tub, Verat.
- **Berüchtigt dafür, anderen Kindern oder Lehrern gemeine Streiche zu spielen:** Lach, Zinc.

KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG

Die körperliche Untersuchung offenbart uns den Gesundheitszustand des Kindes zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Genauigkeit der Untersuchung hängt hauptsächlich von der Erfahrung, Sachkenntnis und Gründlichkeit des Homöopathen ab. Während der körperlichen Untersuchung sollte sich der Homöopath besonders freundlich verhalten und mit dem Kind spielen, um sein Vertrauen und seine Mitarbeit zu gewinnen. Sie müssen sich bemühen, dem Kind echte Liebe zu zeigen, die es fühlen kann.

Gleichzeitig muss der Arzt in seinem Vorgehen systematisch bleiben. Für einen weniger erfahrenen Arzt ist es ratsam, mit der körperlichen Untersuchung am Kopf zu beginnen und sich systematisch zu den Füßen vorzuarbeiten.

Als erstes gilt es festzustellen, ob das Kind gesund, leicht erkrankt oder sehr krank ist. Einfache Beobachtungen, die Sie während des Gespräches mit den Eltern machen, werden Ihnen viele Dinge verraten. Zum Beispiel kann ein Kind, das bequem auf dem Rücken liegt und leuchtende Augen hat, nicht krank sein. Ein Kind, das sich bequem im Bett zusammengerollt hat oder mit angezogenen Beinen und mit dem Daumen im Mund schläft, kann nicht ernstlich krank sein. Ein Kind aber, das ruhelos und reizbar ist, wenn es gehalten wird, das schlaff ist, das schrill schreit oder stöhnt, stöhnend atmet oder nicht auf dem Rücken liegen kann, ist ernsthaft krank.

KÖRPERHALTUNG

Die Körperhaltung kann wertvolle Hinweise auf die Diagnose geben.

- Reizbarkeit und Atemnot in Rückenlage kann **kongestive Herzschwäche** anzeigen.
- Ein **asthmatisches** Kind sitzt oft auf der Bettkante und lässt die Beine baumeln, mit vorgelehntem Oberkörper und hochgezogenen Schultern, die Hände aufgestützt. Es hat einen Faszthorax und setzt die Atemhilfsmuskulatur ein.
- In Fällen von **kolikartigen Bauchschmerzen** wird das Kind ruhelos und rollt sich vor Schmerz hin und her oder hält seine Hände über den Bauch.
- Ein gestreckter Nacken, abgewinkelte Schultern und Ellbogen, ein einwärts gedrehter Unterarm mit gestreckten Beinen charakterisieren die **Haltung bei Dezerebration** (Ausfall der Großhirnfunktionen infolge Entkoppelung von Hirnteilen).
- Die **Dekortikationshaltung** wird charakterisiert durch die Beugung der Ellbogen und Handgelenke, eingeschlagene Daumen und gestreckte Beine. Patienten mit Rückenmarksverletzungen und angeborenem, fehlendem Muskeltonus haben Glieder, die wie Dreschflegel herabhängen und sie liegen mit abgespreizten Gliedmaßen auf dem Rücken wie ein anatomischer Frosch, dem das Rückenmark durchtrennt wurde.

- Ein Kind, das in einer Position mit geschlossenen Augen still liegen will, kann unter **Schwindel** leiden.

REAKTIVITÄT

Des Weiteren sollten Sie die Reaktivität des Kindes beobachten.

- Ein **blindes** Kind reagiert besonders empfindlich auf Töne und schreckt durch ein plötzliches Geräusch leicht auf. Ein blindes Kind ist an folgenden Eigenheiten erkennbar: Ein leerer Blick in die Ferne, leichtes Oszillieren des Augapfels und ungewöhnliche Schreckhaftigkeit bei Geräuschen.
- Ein auf visuelle Eindrücke sehr empfindliches Kind hingegen ist wahrscheinlich **taub**.
- Ein **autistisches** Kind stellt keinen Augenkontakt her.
- Ein Kind, das **schon in verschiedenen Pflegeheimen** war, ist oft in einem verträumten Zustand, obwohl es wach ist.
- Säuglinge mit einem **sensorischen Deprivationssyndrom** nehmen eine Haltung an, die charakterisiert ist durch eine „tonische Starre“ der Arme, mit angewinkelten Ellbogen, der Oberarm abgewinkelt und nach außen rotiert und die Hände einwärts gedreht.

ERNÄHRUNG

Den allgemeinen Ernährungszustand des Kindes erkennt man schon, bevor die systematische körperliche Untersuchung beginnt. Man muss erkennen, ob das Kind übergewichtig, mager, unterernährt oder dehydriert ist.

GERUCH

Achten Sie am Anfang der Untersuchung direkt auf charakteristische Gerüche beim Patienten, die bei der Diagnose helfen können. Bekannt sind z. B. der Geruch nach Azeton im Atem bei **Diabetes mellitus**, der fruchtig-süßliche Geruch bei **Diphtherie** und - bei Vergiftung - der Geruch nach dem entsprechenden **Toxin** (z. B. Kerosin). Andere Gerüche von diagnostischer Bedeutung werden in der

Krankheiten, die von einem charakteristischen Geruch des Atems, der Haut oder des Urins des Kindes begleitet werden	
KRANKHEIT	GERUCH
Diabetes Mellitus	Azeton
Diphtherie	Süßlich-fruchtig
Ahornsirup-Krankheit	Karamellartig (Ahorn)
Phenylketonurie	Moschusartig (Mäusegeruch)
Oasthouse-Krankheit (Methionin-Malabsorption)	Getrocknetes Malz (Brauerei)
Hypermethioninämie	Ranzige Butter

Tabelle aufgeführt. Außerdem können erfahrene Kliniker E. Coli-Durchfälle in einem Kinderzimmer riechen, sowie den charakteristischen Geruch von Pseudomonas bei einer infizierten Wunde.

GANG

Wenn das Kind hereinkommt, kann schon das Gangbild aufschlussreich sein. Ein Blick auf die abgenutzten Teile der Schuhe gibt viele Hinweise auf die Diagnose.

- Ein Schuh, der vorne abgenutzt ist, ohne irgendwelche Abnutzungsspuren an der Ferse zu zeigen, weist auf eine **Verkürzung der Achillessehne (Steppergang)**, wie bei der Zerebralparese zu beobachten) oder einen **Fallfuß** hin. Beim Fallfuß hat auch die Schuhspitze Kratzer vom Kontakt mit dem Fußboden.
- Kinder mit **Arthritis** und Schmerz an den Mittelfuß-Gelenken verlagern ihr Gewicht auf die Außenseite des Fußes, so dass der Schuh an der Außenseite stärker abgenutzt wird.
- Einige Kinder gehen sehr wild mit ihrem Schuhwerk um und brauchen alle zwei oder drei Monate neue Schuhe, während andere sie mindestens so lange behalten, bis sie in die nächste Größe hineinwachsen.
- **Einige Abnormitäten, die im Stehen entdeckt werden können, sind:**
 - Übermäßiger seitlicher Fußkontakt weist auf eine **Pronationsschwäche** des Wadenbeins hin (Peroneus).
 - Starke Lordose weist auf eine **Kontraktur des Hüftbeugers** hin.
 - **X-Beine.**
 - Ein überstrecktes Knie weist auf eine **Überanspannung des Quadrizeps** hin.
 - Eine seitliche Beugung des Rumpfes zu der das Gewicht tragenden Seite weist auf eine **Schwäche des Gluteus medius** der gleichen Seite hin. Die Ursache kann eine Erkrankung der Hüfte oder der Muskeln sein, z. B. bei Dermatomyositis.
 - Überstreckung des Rumpfes nach hinten weist auf eine **Lähmung des Gluteus maximus** hin.
 - Klatschender Kontakt des Fußes mit dem Fußboden, bei dem die Zehe den Fußboden vor der Ferse berührt, weist auf eine Tibialis-anterior Schwäche hin.
- **Einige Abnormitäten, die beim Gehen beobachtet werden, sind:**
 - Vorgebeugte Haltung des Rumpfes weist auf eine **Schwäche des Quadrizeps** hin.
 - Ein Federn nach oben und unten mit zu starker vertikaler Bewegung der Hüfte ober- und unterhalb einer gedachten Linie durch den Nabel deutet auf eine **Schwäche des Hüftbeugers oder der Kniesehne** hin und unterscheidet sich vom Hüftgang dadurch, dass dabei die vertikale Bewegung nur oberhalb der Nabellinie stattfindet, ohne nach unten zu federn, um dem Boden auszuweichen.
 - Zirkumduktionsgang, der bei **halbseitiger Lähmung** gesehen wird, entsteht bei Schwäche von Kniesehnen oder Beugern.
 - Das dreschflügelartige Baumeln des Fußes weist auf eine **Tibialis-anterior-Schwäche** hin; die Ursache kann in einer isolierten Erkrankung der peripheren Nerven oder in einer allgemeinen Schwäche der Beinmuskeln, wie sie bei Polio oder Meningomyelozele auftritt, bestehen.

- Der Hüftgang (senkrecht Heben der Hüfte) weist auf eine **asymmetrische Beinlänge** hin. Das Bein ist auf der Seite des Hüftgangs länger bzw. auf der entgegengesetzten Seite kürzer. Hüftgang kommt auch bei Spasmus des Hüftbeugers oder schwachen Kniesehnen vor.
- Ungenügendes Abstoßen. Hier verlässt der komplette Fuß den Boden gleichzeitig, anstatt zuerst die Ferse, gefolgt durch den Mittelfuß und zuletzt die Zehen. Dies kommt bei einer **Wadenmuskel-Schwäche** und dem **Fußschmerz-Syndrom** vor.
- Seitliches Ausweichen der in der Schwungphase befindlichen Seite zeigt einen **schwachen Gluteus medius** auf der belasteten Seite an.

KÖRPERGRÖßE

Die Körpergröße sollte bei Säuglingen und Kindern unter drei Jahren im Liegen (Länge) und bei älteren Kindern im Stehen (Statur) gemessen werden. Es ist sehr wichtig, beim Messen im Stehen auf die richtige Haltung und Position des Kindes zu achten: Füße zusammen, Rücken gerade (Hinterkopf, Rücken und Ferse berühren die Messlatte) und die Augen schauen geradeaus, so dass eine Linie von den Gehörgängen zum unteren Rand der Augenhöhlen parallel zum Fußboden verläuft.

GESICHT UND GESICHTSAUSDRUCK

Der Gesichtsausdruck gibt nicht nur wertvolle Hinweise auf die Gefühle des Kindes, sondern ist auch eine Diagnosehilfe. Er setzt sich zusammen aus Bewegungen von verschiedenen Gesichtsmuskeln, der Öffnung der Augenlider und der Farbe und Größe der Pupillen. Ein besorgtes, böses oder glückliches Gesicht spricht eine deutliche Sprache.

- Ein bläulich verfärbtes Gesicht mit Petechien und Blutungen unter der Haut weist auf ein **obstruktives Geschehen im Brustkorb** aufgrund zahlreicher Ursachen hin, z. B. eine verlagerte erste Rippe, Nabelschnur um den Hals, Keuchhusten usw.
- Ein Naevus flammeus auf einer Seite des Gesichtes wird beim **Sturge-Weber-Syndrom** gesehen.
- Ein einseitig abgeflachtes Gesicht mit weiter Lidspalte, Enophthalmus und Ptose wird beim **Horner-Syndrom** gesehen.
- Ein ausdrucksloses, leeres, maskenartiges Gesicht ist die Folge einer **Überdosis von Beruhigungsmitteln**.
- Violette Verfärbung (wie Amethyst) der Augenlider ist bei **Dermatomyositis** zu beobachten.
- Beim **systemischen Lupus erythematodes** sieht man den schmetterlingsförmigen Ausschlag auf den Wangen, charakterisiert durch die Verfärbung, Trockenheit, die Schuppung und die akneartig verstopften Follikel auf beiden Seiten der Nasenwurzel.
- Seit Jahren weiß man, dass Beschwerden der **Kopf- und Halsregion** sich durch Falten im oberen Teil des kindlichen Gesichts zeigen, während Falten der unteren Gesichtshälfte auf Beschwerden in der **Brust- oder Bauchregion** hinweisen.

- Verkrampfung der Kiefer- und Gesichtsmuskeln beim **Wundstarrkrampf** führt zu einem Gesichtsausdruck mit zusammengepressten Zähnen, stark geschürzten Lippen und einem Hochziehen der perioralen Muskeln (Risus sardonicus).
- Die Wangen sind bei normalen, gesunden Kindern rosa. Bleiche Wangen sind oft ein Hinweis auf **Furcht, Anämie oder Aortenklappeninsuffizienz**.
- Die hervorstehenden Augen bei **Schilddrüsenüberfunktion**, die weit auseinanderstehenden Augen mit hervorstehender Stirn bei der **Crouzon-Krankheit (Dysostosis craniofacialis)**, das pfeifende Gesicht des **Freeman-Sheldon-Syndroms** und die rundlichen Backen beim **Morbus Cushing** sind weitere typische Beispiele dafür, wie das Aussehen des Gesichts zur Diagnose führen kann.

HAUT

- Es ist eine gute Angewohnheit, schon zu Beginn der Untersuchung nach **Ausschlägen** zu suchen, so dass man bei Verdacht auf eine ansteckende Krankheit schnell Vorsorge treffen kann, bevor andere Kinder in der Klinik oder Praxis angesteckt werden.
- Untersuchen Sie außerdem auf **Ödeme** der Extremitäten, besonders auf der vorderen Seite der Unterschenkel und der Füße. Beidseitige Ödeme weisen auf eine generalisierte Krankheit wie **Herzinsuffizienz, Nierenkrankheit oder Eiweißmangel** hin.

HAND

Während der allgemeinen Untersuchung sollte auch die Hand im Hinblick auf klinische Zeichen betrachtet werden.

- **Uhrglasnägel** (konvex gewölbte Nägel bei Trommelschlegelfingern) können familiär bedingt oder auf eine Leberzirrhose, eine obstruktive Lungenerkrankung o. Ä. zurückzuführen sein.
- **Zyanose** zeigt sich an den Fingerspitzen.
- **Blässe und Gelbsucht** werden auch in den Handlinien sichtbar.

ZWEI ROUTINEUNTERSUCHUNGEN: „HÜFTE“ UND „AORTA“

Zwei Dinge, die während dieser Phase der allgemeinen Untersuchung besonders bei Säuglingen nicht vergessen werden sollten, sind die Untersuchung der Hüftgelenke auf **Dislokation** und das Tasten der Oberschenkelpulse, um eine **Verengung der Aorta** zu diagnostizieren.

WEINEN

Viele diagnostische Eindrücke erschließen sich schon allein dadurch, dass man dem Weinen lauscht. Der reizbare Schrei kranker Neugeborener kann mit etwas Übung leicht erkannt werden.

- Normale Gereiztheit vermindert sich, wenn ein Baby hochgenommen wird und man sich mit ihm beschäftigt.

- Im Gegensatz dazu werden die Gereiztheit und der Schrei bei **Gehirnreizung** mit dem Berühren nicht besser, sondern sogar intensiver. Bei **Schmerzen des Skelettsystems und der Gelenke** schreit das Kind auch bei Berührung.
- Der Schrei ist schrill, kreischend und hochfrequent bei **Erkrankungen des zentralen Nervensystems**, sehr schwach bei **neuromuskulärer Lähmung**, stimmlos bei **Stimmbandlähmung** oder nach **Tracheotomie**, er erinnert an eine Katze beim **Cri-du-chat-** (Katzenschrei-) **Syndrom** und ist heiser bei einer **Laryngotracheobronchitis** und bei **rezidivierender Kehlkopflähmung**.

TEMPERATUR

Temperaturen zwischen 36,6°C und 37,4°C werden als normal betrachtet. Temperaturen zwischen 37,5 und 38°C werden als subfebril bezeichnet. Fieber herrscht vor, wenn die Temperatur über 39,5°C liegt und Hyperpyrexie liegt vor bei einer Temperatur über 41 °C.

Es gibt drei klassische Muster des Fiebers:

- Andauerndes Fieber (Continua), in dem die täglichen Schwankungen nicht mehr als 1°C betragen.
- Intermittierendes Fieber, bei dem die Körpertemperatur während mehrerer Stunden pro Tag normal ist.
- Remittierendes Fieber, bei dem tägliche Schwankungen über mehr als 2°C vorkommen, aber die Körpertemperatur niemals Normalwerte erreicht.

BLUTDRUCK

Um den Blutdruck eines neugeborenen Kindes zu messen, sollte man eine 2,5 cm breite Manschette benutzen. Der Untersucher muss sich möglicherweise allein mit der Messung des systolischen Drucks mithilfe der Flush-Methode zufrieden geben. Dabei wird die Handfläche der Extremität, an der gemessen wird, vorsichtig gedrückt und dann die Manschette aufgeblasen, während der Druck auf die Handfläche beibehalten wird. Die Handfläche sieht dann blass aus. Der Druck in der Manschette wird langsam reduziert, während auf das erste Erröten der Handfläche gewartet wird. Der Wert des Manometers liegt in diesem Moment ungefähr zwischen dem systolischen und dem diastolischen Wert.

Um den richtigen Druck bei älteren Kindern zu messen, sind Blutdruck-Manschetten in den Größen 3, 5, 8, 12 und 18 cm erhältlich.

ATMUNG

Zählen Sie die Atemzüge eine volle Minute lang, nachdem das Kind ein paar Minuten ruhig gewesen ist oder während es schläft. Die weiteren Eigenschaften, auf die man bei der Atmung achten sollte, sind der Rhythmus, die Tiefe, unbequeme Körperhaltungen, auftretende Geräusche und der Geruch des Atems.

KOPF

- Achten Sie auf charakteristische anormale Formen wie:

Flacher Hinterkopf (wie bei gesunden Neugeborenen, wenn sie nur in einer Position liegen und bei geistig behinderten Kindern, die ausschließlich auf dem Rücken liegen).

Eine vorstehende Stirn wie bei Rachitis, Crouzon-Syndrom (Kraniofaziale Dysmorphie) und Hurler-Syndrom.

Hervorstehender Hinterkopf.

- Untersuchen Sie auch die **Schädelnähte**. Die Nähte überlappen sich meist beim Neugeborenen wegen des Drucks in der Austreibungsphase. Bei älteren Kindern können manchmal die Nahtlinien (besonders die Kranznaht) hervorstehen. Die Nahtlinien sollten nach 5-6 Monaten tastbar sein. Ungewöhnlich weite Nahtlinien nach 5-6 Monaten können auf einen Krankheitsprozess wie z. B. Hydrocephalus hinweisen.
- Als nächstes sollte man nach **Vertiefungen und Defekten der Schädelknochen** suchen, die anormal (wie bei einem Bruch) oder normal (wie bei den Fontanellen) sein können.
- Es gibt sechs **Fontanellen** bei der Geburt, die alle tastbar sein können oder auch nicht. Die beiden wichtigsten sind die große und die kleine Fontanelle. Die große Fontanelle ist mit 3 Monaten knapp 3 x 3 cm groß. Dann verkleinert und schließt sie sich; die meisten Fontanellen schließen sich zwischen dem 9. und 18. Monat. Die kleine Fontanelle ist schon bei der Geburt klein (ungefähr die Größe einer Fingerspitze) und schließt sich bereits mit 2 Monaten.
- Der nächste Schritt in der Untersuchung des Kopfes ist das Abtasten der **Mastoidknochen hinter den Ohren**. Normalerweise sind diese Knochen erst im Alter von 2-3 Jahren vollständig entwickelt. Tasten Sie nach Schwellungen, Temperatur und Schmerzempfindlichkeit.

STIRN

Die senkrechte Höhe der Stirn ist bei Wasserkopf, Morbus Crouzon und Apert-Syndrom vergrößert. Die Stirn steht bei Rachitis, Osteogenesis imperfecta und Hurler-Syndrom vor.

AUGENBRAUEN

Der Ausfall der Augenbrauen kann Teil eines generalisierten Haarausfalls sein, wie er z. B. bei Schilddrüsenunterfunktion vorkommt.

TRÄNEN

- Trockene Augen durch Tränenmangel kommen beim Riley-Day-Syndrom und beim Sjögren-Syndrom vor.
- Übermäßiger Tränenfluss kommt bei lokalen Irritationen des Auges, Allergien und natürlich beim Weinen vor.

BINDEHAUT

- Die Bindehaut ist blass bei Anämie.

- Auffällige Injektion (Rötung) mit eitrigen Absonderungen wird bei bakterieller Bindehautentzündung beobachtet.

SKLEREN

- Blaue Skleren sind bei zahlreichen Gesunden, aber auch bei Osteogenesis imperfecta und beim Ehler-Danlos-Syndrom zu beobachten.
- Schwarze Flecken auf der Sklera können entweder auf Naevi zurückzuführen sein oder auf zu dünne Skleren, wobei die Farbe der Aderhaut durchscheint.
- Gelbfärbung der Skleren weist auf Gelbsucht hin.

PUPILLEN

- Die normale Pupille ist rund und liegt zentral.
- Eine „Stecknadelpupille“ verleiht dem Kind einen scharfen, misstrauischen Blick, während „weite“ Pupillen Kinder angenehm aussehen lassen.
- Bilateral verengte Pupillen können normal sein oder auch auf eine pontine Myelolyse (wie z. B. bei der MS) hinweisen.

NASE

- Eine kleine oder kurze Nase kann auf ein Krankheitsbild hindeuten, z. B. Apert-Syndrom.
- Die „Stupsnase“ des Neugeborenen ist allgemein bekannt und vielleicht eine Anpassung an den Stillvorgang.

OHREN

- Ausfluss aus dem Ohr kann wässrig (zerebrospinale Flüssigkeit), eitrig (Gehörgangsentzündung, Mittelohrentzündung) oder blutig sein (Otitis externa, Otitis media, Fremdkörper, Trauma).
- Suche immer auch nach Fremdkörpern wie Insekten, Spielzeugteilen und Erbsen.

MUND

- Die Farbe der Lippen kann auf Anämie, Zyanose oder Kohlenmonoxid-Vergiftung hinweisen.
- Die Lippen können groß sein (rassisch bedingt, Hurler-Syndrom, angioneurotisches Ödem) oder ungewöhnlich geschürzt („whistling face“ bei Freeman-Sheldon Syndrom).

ZUNGE

- Die relative Trockenheit der Zunge ist ein ausgezeichneter Indikator für das Ausmaß der Dehydratation, besonders bei Säuglingen.
- Eine bleiche Zunge findet man bei Anämie.

- Die Zunge ist blau bei zentraler Zyanose.
- Eine Zunge, die wie rohes Fleisch aussieht und mit pilzförmigen Papillen besetzt ist, wird Erdbeerzunge genannt (beobachtet in späteren Stadien von fiebrigen Erkrankungen und bei Scharlach).
- Man sollte daran denken, dass einige Kinder statt am Daumen an ihrer Zunge lutschen. Dies ist leicht zu erkennen, wenn man Bewegungen am Mundboden bemerkt und die Zungenspitze zwischen den Schneidezähnen gehalten wird.

ZAHNFLEISCH

Bei einer durch Phenytoin ausgelösten Zahnfleisch-Hypertrophie ist das Zahnfleisch rot.

ZÄHNE

- Es gibt 20 Milchzähne. Sie sollten bis zum 24. Monat durchgebrochen sein. Der sogenannte 6-Jahr-Molar ist der erste bleibende Zahn, der herauskommt.
- Vollständiges Fehlen einzelner Zähne ist oft mit lokalen Störungen wie einer Gaumenspalte oder einer lokalen Sklerodermie des Gesichtes verbunden.
- Schwarze Zähne werden bei Kindern gesehen, die orale Eisenpräparate einnehmen; gelbliche Verfärbung tritt bei Kindern auf, denen im Säuglingsalter Tetracyclin verabreicht wurde.

WANGENSCHLEIMHÄUTE

Suchen Sie nach:

- Einer rötlichen Erhebung um die Öffnung des Stensen-Gangs (Ductus parotideus) bei Mumps.
- Koplik'sehen Flecken (kleine bläulich-weiße Punkte, umgeben von einer rötlichen Zone, in der Region der Backenzähne) in der Prodromalphase bei Masern.
- Soor.

GAUMEN

Der normale Gaumen ist insgesamt gleichmäßig gewölbt, ein „gotischer Bogen“ (spitz gewölbter Gaumen) dagegen wird mit verschiedenen angeborenen Missbildungssyndromen assoziiert.

MANDELN

Die Mandeln können vergrößert erscheinen und sich in der Mitte treffen. Wenn das der Fall ist, so finden Sie heraus, ob dies auf eine echte Vergrößerung der Mandeln (rezidivierende Mandelentzündung) zurückzuführen ist oder ob das Gewebe um die Mandeln herum diese zur Mitte drängt, wie dies bei peritonsillarem Abszess

(„Halsbräune“) der Fall ist. Gelegentlich können große Tonsillen das Frühsymptom eines Lymphosarkoms sein. Untersuchen Sie auch den übrigen Rachenraum.

HALS

- Der Hals kann verkürzt sein aufgrund von Wirbelanomalien oder wegen eines Ullrich-Turner-Syndroms (UTS) mit Flügelfell, tiefer Haargrenze im Nacken und inversem Haaransatz.
- Beim Schiefhals wird das Hinterhaupt zu einer Seite und das Kinn zur entgegengesetzten Seite gekippt. Bei lang anhaltendem Schiefhals kommt es zur Atrophie von Gesichtsstrukturen, die zur Gesichtsasymmetrie führt.
- Bei einer stark ausgeprägten atlanto-axialen Subluxation muss das Kind beim Sitzen das Kinn mit der Hand abstützen.

RACHEN

- Granuläre Schwellungen entlang der hinteren Rachenwand finden sich bei chronischer Pharyngitis und bei allergischen Personen mit entzündeten Nasenpolypen.
- Bei chronischer Mandelentzündung und entzündeten Polypen kann das Kind die folgenden Eigenschaften des „adenoiden Gesichtes“ zeigen: offener Mund, Ränder unter den Augen, eine charakteristische nasale Stimme, nächtliches Schnarchen und die Unfähigkeit, Wörter auszusprechen, die mit „ng“ enden (z. B. „Ring“).

BRUST

- Die Atemhilfsmuskulatur ist normalerweise nicht aktiv. Kommt es jedoch zu einer Verlegung der oberen Luftwege (Krupp, Diphtherie) oder der unteren Luftwege (Asthma), werden die Hilfsmuskeln mit benutzt.
- Seitliche Einziehungen entlang des Zwerchfellansatzes (Harrison-Furche) werden bei Rachitis und chronisch-obstruktiven Lungenstörungen beobachtet.
- Bei einer Verlegung der oberen Luftwege kommt es zur suprasternalen Einziehung, während bei einer Verlegung der unteren Luftwege eher die unteren Zwischenrippenräume eingezogen sind.
- **Normale Atemgeräusche** unterscheiden sich in vesikuläres und bronchiales Atmen. Vesikuläre Atemgeräusche sind die normalen Töne, die man über der gesamten Brust hört, besonders in Höhe der Achseln und zwischen den Schulterblättern. Bronchialatmung hört man normalerweise, wenn man mit dem Stethoskop über der Luftröhre und über der Mittellinie der oberen vorderen Brust abhört.
- Das Vorstehen einer Seite des vorderen Thorax weist auf Rippen-Anomalien, Skoliose oder ein Herzproblem hin.
- Ein Vorstehen des Brustbeins („Hühnerbrust“) wird bei Rachitis und Osteomalazie vorgefunden.

HERZ

Der Herzspitzenstoß entspricht dem tiefsten und äußersten Punkt des Herzschlags. Die Auskultation sollte systematisch durchgeführt werden, angefangen über der Mitrallengend und dann mit oder gegen den Uhrzeigersinn zu allen vier Hauptgebieten entsprechend den vier Herzklappen. Herzgeräusche, die man bis in den Rücken hört, sind organische Geräusche; funktionelle Herzgeräusche pflanzen sich vom Punkt ihrer maximalen Intensität nicht so weit fort. Die Intensität des ersten Herztons ist erhöht bei Fieber, Hyperthyreose und Mitralkstenose. Der pulmonale zweite Ton wird bei Lungenhypertonie betont.

Herzgeräusche	
Typische Ursachen, Lokalisation und Zeitpunkt	
URSACHE	HERZGERÄUSCH

Aortenklappeninsuffizienz	Aortenklappe, diastolisch
Vorhofseptumdefekt	Zweiter und dritter linker Zwischenrippenraum, parasternale Linie
Mitralinsuffizienz	Mitralklappe, systolisch
Mitralkstenose	Mitralklappe, diastolisch
Persistierender Ductus arteriosus	Hin und her unterhalb des linken Schlüsselbeins
Pulmonalstenose	Pulmonalklappe, systolisch
Ventrikelseptumdefekt	Dritter bis fünfter linker Zwischenrippenraum, Parasternalraum, Parasternallinie

ABDOMEN

- Fühlt sich der Bauch hart und gespannt an, so weist das gewöhnlich auf eine Entzündung im Bauchraum hin. Ein brettharter Bauch zeigt eine Bauchfellentzündung (Peritonitis) an. Diffuse Festigkeit kann eine thorakale Erkrankung oder Muskelspasmen wie z. B. bei Wundstarrkrampf anzeigen.
- Erweiterte Venen im Epigastrium können auf eine Verlegung der unteren Vena cava hindeuten, prall gefüllte Bauchwandvenen um den Nabel herum können sich im Rahmen eines Pfortaderhochdrucks zeigen.
- Ein sehr flacher Bauch zeigt sich bei normal schlanken Kindern, bei Unterernährung, Gedeihstörungen und bei Anorexia nervosa.
- Beim Neugeborenen ist der Bauch normalerweise gerundet; ein flacher Bauch deutet auf eine Zwerchfellhernie hin.
- Normalerweise bewegt sich die Bauchwand mit dem Atemrhythmus; sie weitet sich beim Einatmen und fällt beim Ausatmen zurück.
- Normalerweise fällt die Nabelschnur innerhalb von 6-8 Tagen nach der Geburt ab.

- Gelegentlich kommt es nach der Geburt zu Absonderungen aus dem Nabel. Achten Sie darauf, ob sie wässrig, eitrig oder serös-blutig sind.
- Die Leber liegt normalerweise rechts, ihre Größe variiert mit dem Alter und der Größe des Kindes.
- Die Milz liegt normalerweise auf der linken Seite. Sie ist gewöhnlich nicht tastbar, wenn sie nicht mindestens um das Dreifache vergrößert ist.
- Gewöhnlich gibt es bei der Geburt einen kleinen Defekt der Bauchwand in der Nabelregion, der zu einem unbedeutenden Bruch führt.

ANUS UND REKTUM

- Bei bestimmten angeborenen Missbildungen des Rektums kann die Öffnung zu weit vorne, in der Nähe der Geschlechtsorgane, liegen.
- Schauen Sie auch nach Madenwürmern oder Bandwurmsegmenten in der Nähe der Analöffnung.
- Mekonium, das durch die Scheide oder die Harnröhre austritt, weist auf eine rektourethrale oder rektovaginale Fistel hin.

GESCHLECHTSORGANE

- Beim neugeborenen Mädchen sind die Geschlechtsorgane stark pigmentiert und ödematös, besonders nach einer Beckenendlage; auch die kleinen Schamlippen sind direkt nach der Geburt groß.
- Normalerweise sollte jeder ausgereifte, neugeborene Junge einen gut ausgebildeten Penis und Hodensack haben.
- Der Hodensack ist beim Neugeborenen stark pigmentiert. Beide Hoden befinden sich im ca. 1 cm großen Hodensack des Neugeborenen.

HAUT

- Die übermäßige Blässe einer Extremität kann durch eine arterielle Verlegung bedingt sein.
- Die übermäßige Rötung der gesamten Haut kann bei Fieber, nach körperlicher Anstrengung, nach der Einwirkung von Sonnenlicht, in frühen Stadien von Scharlach und bei Vergiftung mit Tollkirschen beobachtet werden.

MUSKELN

Bestimmte Anhaltspunkte in der Vorgeschichte geben wichtige Hinweise auf eine bestehende Muskelerkrankung.

• **Neugeborenenperiode**

- Neonatale Atembeschwerden.
- Schwacher Saugreflex.
- Eingeschränkte Beweglichkeit der Gliedmaßen.
- In der Schwangerschaft schwache Kindsbewegungen im Mutterleib.
- Ungleiches Umklammerungsreflex, der dann auf eine Armlähmung hinweist, wenn ein Arm nicht bewegt wird.

- Ältere Säuglinge und Kleinkinder

- Verzögerte Entwicklung.
- Doppeltsehen am Ende des Tages.
- „Schlaffes Kind“.
- Entstellte Sprache nach dem Essen kalter Speisen (Myotonie).
- Muskelschmerzen (spontan oder nach Anstrengung).
- Patient ermüdet leicht.
- Patient stolpert und fällt oft.
- Schwierigkeiten zu schlucken.
- Schwierigkeiten, Treppen zu steigen und aus sitzender Position aufzustehen.
- Schwierigkeiten, Gegenstände loszulassen.
- Schwierigkeiten beim Gehen oder Laufen.

GELLENKE UND KNOCHEN

Gelenkschmerzen sind das häufigste Symptom, das ein Kind in medizinische Behandlung bringt. Kinder fallen und verletzen sich so oft, dass die Vorgeschichte von Traumata für die Diagnose meist nicht hilfreich ist.

ZENTRALNERVENSYSTEM**• Erscheinung**

- Ein Kind mag normal sprechen können, doch es kann sein, dass es den Mund in Anwesenheit Fremder oder im Sprechzimmer nicht aufbringt. Wenn ein Kind bis zum 18. Monat noch kein Wort sprechen oder im Alter von 3 Jahren noch keine sinnvollen Sätze bilden kann, ist das als anormal zu betrachten. Völliges Fehlen von Sprache wird als Stummheit bezeichnet und kann auf Taubheit, Imbezillität oder Autismus hinweisen.
- Ein Kind mit Enthirnungsstarre hält die Beine voll gestreckt. Auch Schultern und Ellbogen sind gestreckt, die Unterarme nach innen gedreht und die Daumen eingeschlagen.
- Ein Kind mit Hirnhautentzündung oder Subarachnoidalblutung will nicht angefasst werden, es reagiert gereizt, legt sich mit fest geschlossenen Augen hin und wendet den Kopf vom Licht ab.
- Ein komatöses Kind antwortet nicht und ist sich seiner Umgebung nicht bewusst.
- Ein völlig gelähmtes Kind antwortet vielleicht auch nicht, ist sich aber seiner Umgebung bewusst.
- Ein normales, gesundes Kind zeigt gleichmäßig spontane Bewegungen aller Körperteile.
- Ein normales Kind ist angemessen erfreut oder abgeneigt, von einem Menschen berührt zu werden, den es nicht kennt. Kinder zwischen 9 und 24 Monaten haben Angst, von Fremden angefasst zu werden. Aber misshandelte Kinder können Angst vor jeglichem menschlichen Kontakt haben.
- Manche Kinder sind sich nach einer Kopfverletzung oder Hirnhautentzündung zwar ihrer Umgebung bewusst, können aber nichts dazu sagen.

- Bei einer starken Hirnhautreizung und bei Wundstarrkrampf ist das Kind opisthotonisch und bohrt den Hinterkopf ins Kissen.
- Die meisten normal entwickelten Kinder können mit 6 Jahren rechts und links am eigenen Körper unterscheiden und mit etwa 9 Jahren am Körper eines anderen.
- Der leere Blick eines zurückgebliebenen oder eines blinden Kindes ist mit etwas Erfahrung leicht zu erkennen.

- **Entwicklungsreflexe**

Bei allen Kindern zeigen sich bestimmte nervale Reflexe und Reaktionen im Laufe der Entwicklung, bis die typisch menschliche Fortbewegung auf zwei Beinen erlernt ist. Es gibt verschiedene Mechanismen, den Körper automatisch in die richtige Lage zu bringen und balancierende Reflexe, die helfen, das Gleichgewicht beim Gehen zu behalten. Einige dieser Reflexe werden vom Rückenmark, andere vom Stammhirn, vom Zwischenhirn und von der Hirnrinde gesteuert. Sie entwickeln sich von der kaudal gesteuerten zur zephal gesteuerten Kontrollebene.

In der natürlichen Entwicklung sind die Rückenmarksreflexe sofort nach der Geburt vorhanden und verschwinden innerhalb von 1 - 2 Wochen. Die Stammhirnreflexe erscheinen ungefähr ab der zweiten Woche des Lebens und sollten bis zum sechsten Monat wieder verschwinden. Die Zwischenhirnreflexe zeigen sich ungefähr ab dem vierten Monat, werden dann aber nach 2 Jahren durch Einflüsse der Hirnrinde unterdrückt.

Mit anderen Worten: **Rückenmark- und Stammhirn-Reflexe sind primitive Reflexe und sollten nach 6 Monaten verschwinden. Die Persistenz dieser Reflexe nach Ablauf dieser Zeitspanne weist auf einen möglichen Hirnschaden in utero oder in den ersten Lebensmonaten hin.**

WIE UNTERSCHIEDET SICH DIE HOMÖOPATHISCHE ANAMNESE UND KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG EINES KINDES VON DER EINES ERWACHSENEN?

- Neugeborene oder Säuglinge können nicht sprechen und folglich ihre Probleme nicht artikulieren. Besonders in Indien sind wir sehr von der Bildung und Intelligenz der Eltern und ihren Fähigkeiten abhängig, das Verhalten des Kindes genau zu beobachten. Anmerkung: Manchmal sind weniger gebildete Eltern die besten Beobachter der Symptome ihres Kindes, die gebildeten ignorieren manchmal das Offensichtliche oder modifizieren die Symptome und geben aufgrund ihrer eigenen Schlussfolgerungen ein falsches Bild.
- Ein Säugling wird am besten während des Stillens auf dem Schoß der Mutter untersucht.
- Die Schilderung der Geburt und belastende Ereignisse während der Schwangerschaft sind in pädiatrischen Fällen äußerst nützlich.
- Die Atmung ist bei Säuglingen beschleunigt und zeigt sich als Bauch- und Brustatmung. Das Einziehen der Zwischenrippenräume und des supraster- nalen Bereichs ist verbreitet. Die Brust eines Kindes ist bei der Perkussion resonanter. Die Enge der Luftwege ist für das häufige Auftreten von Krupp, pfeifender Atmung, Schnarchen und Atelektasen verantwortlich. Beim Auskultieren des Thorax können die normalen Atemgeräusche hohl oder stark vesikulär klingen. Außerdem können aufgrund des geringen Volumens der Brust zusätzliche Geräusche von der einen Seite auf die entgegengesetzte übergeleitet werden.
- Der Blutdruck von Kindern, gemessen mit der richtigen Manschettengröße, ist gewöhnlich eher niedrig. Es kann notwendig sein, die Flush- oder Doppler-Methode zu benutzen, um den Blutdruck eines Säuglings zu messen.
- Da Mangelzustände bei Kindern viel häufiger auftreten, sollte man diese sehr gut studieren. Bei unterernährten Kindern findet man oft nicht die klassischen Untersuchungsergebnisse und die typischen Vorgeschichten der allgemeinen Kinderkrankheiten können fehlen.
- Funktionelle systolische Herzgeräusche und venöses Summen sind bei Kindern normal.
- Die Untersuchung des Augenhintergrunds zeigt eine blasse Sehnervenpapille. Papillenödeme treten erst bei Kindern über 3 Jahren auf, wenn sich die Schädelnähte geschlossen haben.
- Die Beobachtung des Wachstums- und Entwicklungsverlaufs ist sehr wichtig.
- Impfkomplicationen sollten beachtet werden.
- Hyperplasie des lymphatischen Gewebes ist in der Kindheit sehr verbreitet, besonders die Schwellung der Mandeln, Nasenpolypen usw.
- Neurologische Zeichen werden auch bei metabolischen Störungen und anderen, nicht ZNS-bezogenen Störungen beobachtet.
- Die primitiven automatischen Reflexe (Moro-Reflex, palmarer Greifreflex, tonischer Hals-Reflex usw.) sind angeboren und verschwinden im Alter von 5-6 Monaten. Wenn sie danach noch bestehen, können sie auf eine Störung des ZNS hinweisen. Verspätetes Auftreten des sozialen Lächelns, Persistenz der automati-

sehen Reflexe, geballte Fäuste, erhöhter Muskeltonus und die Unfähigkeit, sich einem Gegenstand zu nähern, sind sämtlich frühe Zeichen der Zerebralparese. Gesteigerte Sehnenreflexe sind bei Säuglingen häufig, auch der Kremaster-Reflex ist verstärkt. Die Fußsohlen können bei Kindern bis zu zwei Jahren an beiden Seiten gestreckt werden. Ein einseitiger Streckmuskel-Fußsohlenreflex ist in diesem Alter verbreitet.

- Der Puls schlägt bei Säuglingen sehr schnell und ist schwierig zu tasten. Sinusarrhythmien sind häufig.
- Die Weigerung, zu kooperieren und die Furcht vor Ärzten, Injektionen, Nadeln und der Klinikatmosphäre können eine körperliche Untersuchung unmöglich machen. Kinder, die bei körperlichen Untersuchungen besonders unkooperativ sind, können Aeth, Arn, Cale, Ign, Lac-f, Mere, Nat-m, Nux-v, Phos, Sil, Stram, Thuj oder Tub benötigen.
- Eine Hypertrophie der rechten Herzkammer tritt eher bei Neugeborenen auf; die Hypertrophie der linken Herzkammer kommt eher bei Erwachsenen vor.
- Der Bauch ist bei Säuglingen gedehnt und weich, manchmal sieht man auch eine Nabelhernie. Die Leber fühlt sich beim Abtasten weich an und ist während der Kindheit bis zu 2 cm unter dem Rippenbogen tastbar. Die Milzspitze kann bis zu einem Alter von 3 Monaten palpiert werden.
- Der Herzspitzenstoß ist im vierten Zwischenrippenraum oder leicht außerhalb der Medioclavicularlinie lokalisiert. Eine Aufspaltung des zweiten Herztons ist normal und P2 ist bei Säuglingen lauter als A2.
- Der Puls der Vena jugularis ist bei Säuglingen wegen ihres kurzen Halses schwierig zu untersuchen.

Da die Homöopathie bei Müttern als ein harmloses System der medizinischen Therapie sehr populär ist, ist es äußerst wichtig, dass der Homöopath seine Aufgabe als Heiler nicht nur erfüllt, indem er die richtige Medizin gibt, sondern auch jede Abnormalität in frühen Stadien erkennt und damit die Gefahr späterer Komplikationen verringert.

„Das Auge des Adlers und das Gedächtnis des Elefanten.“

Jeder praktizierende Homöopath sollte sofort den Verdacht einer Entwicklungsverzögerung bei einem Kind haben, wenn die folgenden Meilensteine der Entwicklung nicht innerhalb der normalen Zeitperiode erreicht sind.

MARKIERUNGSPUNKTE UND WARNSIGNALE IN DER KINDLICHEN ENTWICKLUNG!

- Abwesenheit des sozialen Lächelns noch im Alter von 2 Monaten.
- Mangelnde Stabilität des Kopfes nach über 4 Monaten.
- Erkennt die Mutter noch im Alter von 6 Monaten nicht.
- Kann noch nicht frei sitzen nach 8 Monaten.
- Kann noch nicht krabbeln nach 9 Monaten.
- Kann noch nicht frei stehen nach 9 Monaten.
- Kann noch nicht frei gehen nach 18 Monaten.
- Fehlender Pinzettengriff nach 12 Monaten.
- Fehlende Sprachversuche im Alter von einem Jahr.

- Kann noch keine sinnvollen Sätze formulieren mit 3 Jahren.

VERDACHT AUF ZEREBRALPARESE

Zerebralparese ist eine weit verbreitete Störung, die den Homöopathen von besorgten Eltern in aller Welt präsentiert wird; wir müssen darauf achten, diese zur Behinderung führende Störung rechtzeitig zu diagnostizieren.

- Fehlendes Zappeln mit 2 - 3 Monaten.
- Asymmetrie der Haltung, Bewegung, des Tonus.
- Verkrampfte Daumen und geballte Fäuste über den 2. Lebensmonat hinaus.
- Übermäßiges Weinen.
- Schmatzen der Lippen.
- Anhaltende tonische Haltung des Halses über die 6. Lebenswoche hinaus.
- Spontaner Umklammerungsreflex (Moro-Reflex).

KLINISCH-DIAGNOSTISCHE UNTERSUCHUNGEN

Weitere klinische Untersuchungen sind gegebenenfalls anzuraten, um die Diagnose zu bestätigen, eine Prognose zu erstellen und den Grad der Ausbreitung der Erkrankung zu beurteilen.

• **Goldene Regeln**

- Seien Sie nie ein Sklave der Untersuchungsergebnisse; bleiben Sie immer Herr der Lage.
- Die Informationen der Anamnese und der körperlichen Untersuchung sind wichtiger einzustufen als ein Laborbericht.
- In Indien gehört es zur Routine, jedem zu mageren Kind mit Entzündungen der Halslymphknoten Tuberkulostatika zu geben. Solche Gewohnheiten gehören abgeschafft, da dies gegen das Grundprinzip der Untersuchung und damit die Sicherung einer Diagnose verstößt. Gleichzeitig können rechtzeitig durchgeführte Untersuchungen das Leben eines Kindes retten, z. B. in einem Fall von Kopfweh mit Krämpfen, in dem eine Lumbalpunktion äußerst nützlich ist, um eine Meningitis von einer Epilepsie zu unterscheiden.

PUNKTE, AN DIE MAN DENKEN SOLLTE

• **Sie sind ein guter Homöopath, wenn Sie**

- die Eltern über die positive Prävention von Krankheiten aufklären.
- den Eltern begreiflich machen, dass es ein Mythos ist, dass Impfungen Krankheiten verhindern können.
- Ihr Ego vergessen und einen erfahreneren Kollegen fragen oder mit ihm einen Fall besprechen, der sich nicht zu bessern scheint.
- sich des Umfangs und der Grenzen Ihrer Sachkenntnis in der Homöopathie bewusst sind.
- eine gute körperliche Untersuchung durchführen und die notwendigen klinischen Untersuchungen veranlassen.

- Kontakt aufnehmen mit den vorherigen Homöopathen des Patienten, um die notwendigen Informationen zur Vorgeschichte zu bekommen.
 - das Kind beobachten, wie es Ihre Praxis betritt, wie es im Wartezimmer sitzt und ins Behandlungszimmer hereinkommt.
 - zur richtigen Diät raten.
 - den Fall rechtzeitig an einen Kinderarzt überweisen.
 - das Kind rechtzeitig ins Krankenhaus einweisen.
 - wissen, wie man die Symptome in Repertoriumsrubriken umwandelt.
 - Ihre Arzneimittel kennen und die Materia Medica immer zur Hand haben.
 - ausreichend Zeit damit verbringen, das Problem des Patienten zu verstehen und es vernünftig zu analysieren.
-
- ***Sie handeln töricht, wenn Sie***
 - voreingenommen sind.
 - nicht zu klinischen Untersuchungen raten, wenn sie notwendig sind.
 - einen Patienten nicht untersuchen.
 - das Kind nicht ins Krankenhaus einweisen, wenn dies nötig ist.
 - die Homöopathie nicht studieren und Ihre Kenntnisse nicht aktualisieren.
 - das Gefühl haben, so schlau zu sein, dass Sie keine Bücher und Repertorien brauchen, um einen Fall zu lösen.
 - keine Geduld haben und einen Fall verwirren.
 - es sich zur Gewohnheit machen, seltene Arzneimittel bei seltenen Indikationen zu geben.

WIE MAN MIT NEUGEBORENEN RICHTIG UMGEHT

Das Kind kommt voller Vertrauen und Unschuld in diese Welt.

Kinder, deren Bedürfnisse in dieser entscheidenden Lebensphase befriedigt werden, können sich besser anpassen, schreien nicht übermäßig und haben weniger Symptome während des ersten Lebensjahres.

Wenn dem Kind dieses Geborgenheitsgefühl fehlt, entstehen Symptome.

Wird auf die Bedürfnisse des Babys nicht eingegangen, kann sein Verhalten den Eltern das Leben zur Hölle machen.

Es ist dies eine abhängigkeitsbedingte Überlebensstrategie des Organismus.

Das Neugeborene ist uneingeschränkt fähig, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken.

Körperhaltung und Position, Gesichtsausdruck und Augen sind Zugänge zum Reich der Gefühle.

Das Neugeborene kann Zorn, Trauer und Angst ebenso ausdrücken wie Gefühle von Abscheu, Kummer oder Verlassenheit.

Das Kind entwickelt Interesse an seiner Umgebung und ist empfänglich für Reize wie Licht, Geräusche und Bewegung.

Es reagiert auf sein Umfeld in vielfältiger Weise; es kann z. B. aufmerksam sein, erschrecken, weglaufen oder einschlafen.

Wenn man den Fall eines Kleinkindes aufnimmt, muss man vor allem sein familiäres Umfeld verstehen.

Wenn das Kind noch gestillt wird, existiert eine Direktverbindung in der emotionalen Kommunikation: Die Gefühle, die die Mutter empfindet, werden an den Säugling weitergegeben und können bis ins Kleinkindalter weiterwirken.

Wenn die Mutter z. B. aufgebracht ist, spiegelt das Kind oft ihren Unmut wider und zeigt es in Form von Anspannung, Tränen, Zorn etc.

Die Erlebnisse und der Verlauf während der Geburt können Hinweise auf das Simillimum geben. Es ist wichtig, das Verhalten der Mutter während der Geburt in Erfahrung zu bringen.

Falls die Mutter große Angst, Schmerzen oder ein anderes Trauma erlitten hat, kann sich das auf das Kind ausgewirkt haben.

Weitere wichtige Punkte sind:

- Wie lange dauerten die Wehen? Waren sie sehr schmerzhaft? Wie ging die Mutter damit um?
- Wie war der Zustand der Mutter aus medizinischer Sicht?
- Wer begleitete sie bei der Geburt und wie war das Verhalten dieser Person(en)?

- Gab es medizinische Eingriffe wie geburtseinleitende Medikamente, Saugglocke oder Kaiserschnitt?
- Wie war die Verfassung des Kindes bei der Geburt (APGAR-Schema)?

Der Körperkontakt zur Mutter nach der Geburt ist eines der wichtigsten Elemente für die Entwicklung kindlichen Vertrauens. Wenn dieser Kontakt nicht gewährleistet ist, können Symptome und Beschwerden entstehen.

Der Körperkontakt kann gestört sein durch:

- Zeitweilige oder längere Trennung von Mutter und Kind nach der Geburt.
- Krankheit der Mutter oder des Kindes.
- Gefühle der Unzulänglichkeit und nervlichen Belastung bei einem Elternteil oder beiden.

Man achte auf die Interaktion zwischen Mutter und Kind:

- Wie geht die Mutter mit dem Kind um?
- Wie eng ist der Kontakt, wie intensiv ist die Kommunikation zwischen Mutter und Kind?
- Wie reagiert das Kind auf die Mutter?
- Ist das Kind entspannt, fühlt es sich wohl in den Armen der Mutter, mag es ihre körperliche Nähe?

Ferner muss die Kontaktfähigkeit des Kindes mit anderen Menschen und mit der Außenwelt beachtet werden.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt der Untersuchung ist, den Ausdruck in den Augen eines Kindes zu beobachten. Auch so findet der sensible Behandler Zugang zum emotionalen Zustand des Kindes.

- Zorn zeigt sich in zusammengekniffenen oder nur einen Spalt weit geöffneten Augen.
- Furcht kann die Augäpfel hervortreten lassen.
- Traurigkeit kann sich in seltenem Lidschiag, starrem Blick und Reaktionsmangel zeigen.

Auch das Weinen eines Babys ist ein Mittel, uns seinen emotionalen Zustand mitzuteilen. Wir können lernen, die eine Art des Weinens von der anderen zu unterscheiden, seine jeweilige Bedeutung zu verstehen, um dann zu entscheiden, ob das Weinen ein Symptom darstellt oder nicht.

- Das Weinen aus Hunger erkennt man an sanft klagenden Tönen, die bei Nichtbeachtung langsam in kräftiges Schreien übergehen.
- Wütendes Schreien ist meist von Anfang an laut. Meist wird das Kind ganz rot, wenn es so seinen Zorn ausdrückt (Hyos, Sulph).
- Weinen vor Schmerz beginnt mit einem Schrei, der von einer langen Pause zum Atemholen gefolgt ist und dann mit erneuter Kraft einsetzt.
- Es gibt auch ein vorgetäushtes Weinen oder Aufgeregtsein, das sich nach dem ersten Lebensmonat einstellt, wenn das Kind seine Forderung nach Zuwendung ausdrücken will (Med).
- Bei manchen Babys ist das Weinen eher ein Quengeln (Calc-p).

Alle Kinder empfinden Ängste in bestimmten Lebensphasen und Säuglinge sind da keine Ausnahme. Die homöopathische Mittelwahl richtet sich bei Neugeborenen danach, ob sie ängstlich werden bei plötzlichem Wechsel der Situation oder bei extremen Reizen wie

- großem Lärm,
- hellen Lichtquellen,
- schneller Bewegung.

Kinder können instinktiv Angst haben, fallen gelassen zu werden (Borx, Phos). Manche Babys haben Angst, an- oder ausgezogen zu werden (Sulph, Med). Manche Kinder reagieren ganz verstört auf einen Wechsel in der täglichen Routine oder auf eine Umstellung in ihrer gewohnten Umgebung. So etwas wird als Vertrauensbruch erlebt.

- Hierzu gehört, wenn z. B. ein Elternteil eine Maske aufsetzt (Cale, Med).
- Unruhe und Angst können auch durch den Vater ausgelöst werden, wenn er Rasierschaum auf dem Gesicht hat (Phos, Med).

Phos-, Carc- und Calc-Babys haben furchtbare Angst vor Schmerzen.

Je nach Arznei kann man verschiedene Reaktionen auf äußere Reize sehen:

- So hat z. B. das Calc-Baby vor dem Staubsauger Angst, während das Sulph-Baby ohne jede Furcht auf ihn zugeht.
- Manche Kinder wollen fest in Decken eingehüllt werden (Ars, Psor, Puls).
- Andere wieder wünschen sich mehr Bewegungsfreiheit (Med, Sulph).
- Wieder andere Kinder möchten lieber eingehüllt sein, weil sie Zugluft vermeiden wollen (Nux-v, Calc-p).

Das Kind kann schon sehr früh Zeichen von Trennungsangst zeigen. Es weint und schreit den Eltern hinterher und verhält sich so, als müsse es ohne ihre Gegenwart sterben (Phos, Cale, Med, Calc-p, Lyc, Sil).

Manche Kinder entwickeln schon früh Angst vor Fremden (Bar-c, Cale). Normalerweise entwickelt sich die Angst im Alter von 6 Monaten.

Einige Kinder schreien und kreischen laut, als ob ein Monster sie erschreckt hätte (Med) oder sie verstecken ihr Gesicht unter der Bettdecke (Bar-c, Cale).

Der Homöopath muss die Wurzel des Problems erfassen und das Mittel muss so gewählt werden, dass es das Problem an eben dieser Wurzel packt.

Um das Baby in seinen Wachzeiten zu verstehen, sollte der Homöopath es an der Brust der Mutter beobachten.

- Wie gut saugt es an der Brust?
- Wie lange möchte das Kind gestillt werden?
- Mag es lieber „kleine Snacks“ oder „ausgedehnte Mahlzeiten“?
- Einige wichtige Rubriken:

Allgemeines; Essen - Sättigung, bis zur

Allgemeines; Essen, schnelles

Magen; Appetit - Heißhunger, Essen, nach dem Essen, bald

Magen; Appetit fehlend - kehrt nach dem geringsten Bissen wieder

- Mag das Kind eine Brust lieber als die andere? [*Allgemeines; Seite*]
- Einige Babys mögen lieber die linke Brust (Sulph), andere die rechte (Lyc, Nux-v).
- Ist das Kind an der Brust schläfrig?
- Ist es nach den Mahlzeiten müde? [*Allgemeines; Müdigkeit - Essen, nach*]
- Geht es dem Kind nach dem Essen besser? [*Allgemeines; Essen, nach - amel.*]

Der Schlaf liefert uns wertvolle Informationen zur Mittelwahl.

- Viele Babys schlafen nachts nicht durch.
- Es gibt viele Gründe für das Wachliegen: Hunger, Zahnung, Blähungen, nasse Windeln, dem Kind ist es zu kalt oder zu warm.
- Manchmal wacht das Baby auf, weil ihm der Schnuller aus dem Mund rutscht (Med, Cale).
- Auch die Schlaflage kann ein Symptom sein: Die Knie-Brust-Lage (genupektoral), die man bei manchen Kindern sieht, kann auf Carc, Lyc, Med oder Tub hinweisen oder diese Mittel bestätigen.
- Ruhelosigkeit im Schlaf ist ebenfalls ein charakteristisches Symptom für Mittel wie Ars, Bar-c, Cina, Lyc, Med, Rhus-t, Sulph.
- Ein sehr tiefer Schlaf kann Mittel wie Bell oder Puls indizieren.
- Der Zeitpunkt des Einschlafens wie auch des Aufwachens kann wichtige Aufschlüsse über die Konstitution des Kindes geben.
- Sulphur- und Medorrhinum-Patienten sind gern Nachtmenschen. Sie bleiben lange auf.
- Cyripedium-Kinder bleiben ebenfalls lange wach. Sie erwachen mitten in der Nacht und wollen spielen.
- Ist das Kind nach dem Nacht- oder Mittagsschlaf erfrischt oder nicht?
- Unerquickender Schlaf ist charakteristisch für Mittel wie Lach, Nux-v, Med, Tub.
- Kinder, die im Schlaf aufschrecken, sind Bell, Borx, Caust, Tub.
- Kinder, die Geräusche im Schlaf machen, sind Bufo, Calc-p, Hyos.
- Kinder, die oft mit halb offenen Augen schlafen, sind Sulph, Cham.

Im ersten Lebensjahr hat das Kind ein großes Kommunikationsbedürfnis. Der Homöopath sollte daher herausfinden, ob die Mutter mit dem Baby spricht. Wenn eine Mutter mit ihrem Baby spricht, beruhigt es sich durch den Klang ihrer Stimme und fühlt sich getröstet, weil es ihre Aufmerksamkeit bekommt. Dies begünstigt die Entwicklung von Selbstvertrauen und Verschreibungen wie Lyc oder Anac können dann oft ausgeschlossen werden.

Wieviel Zeit die Mutter mit dem Kind verbringt, hat entscheidende Bedeutung für die Entwicklung von Gesundheit und Wohlbefinden des Kindes. Kinder, die von Anfang an in einer ruhigen Atmosphäre von Liebe und Geborgenheit heranwachsen, sind voller Hoffnung, sind unerschrocken und leben in Harmonie mit sich selbst. Daher brauchen sie vielleicht gar kein Mittel.

Die Fähigkeit, Gefühlsäußerungen zu beobachten und zu deuten, sowie Sensibilität im Erfassen des inneren Zustandes des Organismus sind von überragender

TEIL II

ARZNEIMITTELLEHRE

ABELMOSCHUS

(Bisameibisch - Abel.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Ungemeine Angst.** In dieser Beziehung kann man es mit Phos., Cale, oder Crot-c. verwechseln. Die Kinder sind völlig überwältigt von Ängsten aller Art, wie Angst vor Tieren allgemein, vor giftigen Tieren, vor Fliegen, Insekten, Skorpionen, Schlangen oder Spinnen. Die Angst ist so stark, dass das Kind sich versteckt und sich selber schützen will; es verschließt Fenster und Türen oder manchmal kann es auch vorkommen, dass es die ganze Nacht bis zur Morgendämmerung wach bleibt. Nachts, in der Dunkelheit und beim Alleinsein wird die bereits vorhandene Angst vor Tieren und Insekten noch größer. Die Kinder sind außerdem höchst nervös, ängstlich und furchtsam, wenn sie sich unter vielen Menschen befinden, wie z. B. auf belebten Plätzen oder im Kino.
- ▶ Morgens extrem lustlos und träge, aber abends dann sehr lebhaft. Sobald die Dunkelheit einsetzt wieder viel Angst; wird dann matt und träge.
- ▶ Nasenbluten.
- ▶ Viel Appetit besonders auf kalte Speisen und kalte Getränke.

HERKUNFT

- Wird auch Hibiskus genannt und gehört zur Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Dr. D. Legeritt aus Mexiko hat uns eine Reihe von wunderschönen Symptomen dieses Mittels geliefert.

ABROTANUM

(Artemisia abrotanum - Eberraute - Abrot.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Mürrisch und reizbar.
- ▶ Ungeschickt und plump.
- ▶ Das Kind widersetzt sich jeder Einflussnahme und will auch nicht angefasst werden.
- ▶ Widerspenstig.
- ▶ Klagt, stöhnt und jammert furchtbar.
- ▶ Hartnäckig.

KÖRPER

- ▶ Kann den Kopf nicht hochhalten.
- ▶ Generalisierte schnell fortschreitende Abmagerung, besonders an den Beinen, bei sehr gutem Appetit.
- ▶ Blaue Ringe um die stumpf blickenden und hohlen Augen.
- ▶ Kalte Finger, besonders die Fingerspitzen und kalte Füße.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Zorn und Gereiztheit bei Kindern mit Wurmbefall.
- Dumpfheit bei Kindern.
- Leicht verängstigt.
- Berührungsempfindlich.

KOPF

- **Kann seinen Kopf** wegen der Schwäche der Halsmuskeln **nicht hochhalten**.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hydrozephalus.
 - Die Gefäße auf der Stirn und an den Schläfen sind geschwollen.

AUGEN

- **Kann die Augenlider nicht öffnen**, aufgrund einer Schwäche der Augenmuskeln.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue Ringe um stumpf blickende, eingesunkene, hohle Augen.
 - Verengung des Tränenkanals.

NASE

- Trockenheit der Nase und **Nasenbluten** mit hellrotem Blut

GESICHT

- **Ausbreitung von Mumps auf Hoden oder Brustdrüsen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hämangiom im Gesicht.
 - Runzlige, kalte, trockene und blasse Haut, wie ein alter Mensch erscheinend.

MUND

- Der Mund ist heiß und trocken.
- Wunde Zunge.

MAGEN

- **Heißhunger; das Kind schreit ständig nach Nahrung.**
- **Erbrechen großer Mengen übelriechender Flüssigkeit.**
- Abneigung: Süßigkeiten.
- Verlangen: Gekochte Milch, Brot und **in Milch gekochtes Brot.**
- Untersuchungsergebnis:
 - Pylorusstenose bei Neugeborenen.

ABDOMEN

- **Verzögerte Heilung des Nabels, nachdem die Nabelschnur abgefallen ist.**
- Tuberkulöse Bauchfellentzündung und Tabes mesenterica.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aszites.
 - Aufgebläht und aufgedunsen.
 - Vergrößerte mesenteriale Lymphknoten.
 - Harte Klumpen sind in verschiedenen Regionen des Abdomens tastbar.
 - Heraussickern von Blut und Feuchtigkeit aus dem Nabel von Neugeborenen.

REKTUM

- **Diarrhoe, die mit Verstopfung abwechselt.**
- Diarrhoe, die mit Rheumatismus abwechselt.
- Plötzlich unterdrückte Diarrhoe, gefolgt von heraustretenden Hämorrhoiden.
- Untersuchungsergebnis:
 - Stuhl-Untersuchung: **Spulwürmer** und Madenwürmer.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- **Hydrozele nach Scharlach oder unterdrückten Hautausschlägen.**
- Schwellung der Hoden nach Mumps.

ATEMWEGE

- Behinderte Atmung.
- Atemwegserkrankungen durch unterdrückte Hautausschläge.

HERZ

- **Akute Endokarditis.**
- **Folgeerscheinungen** von Gicht oder Rheumatismus am Herzen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Kleiner und schwacher Puls.

RÜCKEN

- **Der Hals ist schwach und ausgezehrt; er kann den Kopf nicht hochhalten.**
- Spinale Meningitis und Myelitis.
- Untersuchungsergebnis:
 - Kernig-Zeichen +.

EXTREMITÄTEN

- **Ungeschickt und plump** mit der Neigung, Dinge leicht fallen zu lassen (Apis).
- **Folgeerscheinungen** von Gicht oder Rheumatismus am Herzen.
- **Verkürzung von Muskeln und Sehnen.**
- **Neigt zum Liegen wegen der Wundheit und Schwäche aller Muskeln.**
- Arthritische Knoten (juvenile Arthritis und Still-Syndrom).
- Rheumatismus nach plötzlich unterdrückter Diarrhoe.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kälte der Finger, besonders der Fingerspitzen und Füße.
 - Gang: Chorea-artig, unkoordiniert.
 - Gichtige Schwellung der Hand- und Knöchel-Gelenke.
 - Marasmus der unteren Extremitäten, der sich aufwärts ausbreitet.

HAUT

- Beschwerden durch unterdrückte Hautausschläge.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Auswüchse, Blutschwämmchen.
 - Naevi.

BLUT

- **Hämolytische Anämie.**
- **Eisenmangel-Anämie.**
- **Vitamin B12-Mangel- oder megaloblastäre Anämie.**

SCHLAF

- **Liegen mit angezogenen Beinen.**
- Ruheloser Schlaf; das Kind erlebt schreckliche Träume und wacht zitternd auf.

ALLGEMEINES

- **Anaphylaxie nach BCG-Impfung.**
- **Widersprüchliche und abwechselnde Zustände.**
- **Stillstand in der Entwicklung.**
- **Generalisierter und schnell fortschreitender Marasmus besonders der unteren Extremitäten, bei sehr gutem Appetit.** (Nash weist darauf hin, dass Abrot von unten aufwärts abmagert - im Gegensatz zu Lyc, Nat-m und Sanic, die von oben abwärts abmagern.)
- **„Metastasierung“ entweder spontan oder durch irgendeine manipulierende lokale Behandlung:** z. B. ein rheumatisches Fieber wird von Halsschmerzen abgelöst oder eine Angina greift auf das Herz über oder das Halsweh bessert sich und das Kind bekommt darauf Rheuma. Kinder, die mit Tuberkulostatika falsch behandelt worden sind, entwickeln später Arthritis oder Rheumatismus.
- **Sehr fröstelig** und verschlechtert durch Kälte und Feuchtigkeit.

ADENOSINUM MONOPHOSPHORICUM

(Adenosinmonophosphat - AMP)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Sehr nervös und ängstlich.
- ▶ Mangel an Selbstvertrauen und deshalb Nägelkauen und häufige Kopfschmerzen.
- ▶ Ziemlich aktiv und lebhaft, aber wenig Selbstvertrauen, da durch Erziehungsfehler das Ego geschwächt ist.
- ▶ Kopfschmerzen schlimmer morgens beim Aufwachen.
- ▶ Rissige Lippen sind ein weiteres wichtiges klinisches Symptom.
- ▶ Verlangen nach Fleisch, Orangen, Süßigkeiten und Eiern, aber Kartoffeln in jeder Form verschlechtern.
- ▶ Verstopfung.
- ▶ Schlaf in Bauchlage.
- ▶ Psoriasis auf der Haut, besonders rissige Finger.

AETHUSA CYNAPIUM

(Hundspetersilie - Aeth.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Sieht alt aus, wirkt stumpf und dumm.
- ▶ Liebt Spielzeugtiere (Carc., Lac-leo., Phos.) und ist allgemein tierlieb (Cale., Calc-p., Lac-del., Med., Nat-m.); hat viel Gefühl, Liebe und inniges Verständnis für sie; wünscht sich ein Tier zum Geburtstag (Phos.).
- ▶ Reservierte Kinder; nehmen nicht aktiv an einfachen Gesellschaftsspielen teil; tun lieber alles allein; sie leben in ihrer eigenen Welt (könnte auch ein Hinweis auf Autismus sein: Helium).
- ▶ Ängstlichkeit begleitet verschiedene körperliche Leiden, z. B. Kolik, Dehydratation, Diarrhoe, Epilepsie und Gastritis.
- ▶ ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom): Kann nicht konzentriert denken oder die Aufmerksamkeit halten.
- ▶ Qualvolle Angst, mit Weinen (Guernsey).
- ▶ Beeinträchtigung der sozialen Aktivitäten und Kommunikation mit Familienmitgliedern und Freunden; wenig oder kein Interesse, Freundschaften zu schließen; unfähig, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzunehmen (Cic., Nat-c., Stann.).
- ▶ Spricht mit sich selbst (Staph) und nimmt nichts um sich herum wahr (eine wichtige autistische Eigenschaft).

KÖRPER

- ▶ Charakteristische **Symptomensprache von Aeth**: Sorgenvolles, von Schmerzen gezeichnetes Gesicht, weit geöffnete Nasenflügel, Erschöpfung, Schläfrigkeit und Erbrechen von geronnener Milch (dies lässt sich so leicht erkennen, dass auch Homöopathie-Neulinge das Mittel rasch finden).
- ▶ **Verdauungsstörungen während der Zahnung**; charakterisiert durch heftiges plötzliches Erbrechen einer schaumigen, milchartigen Substanz, gefolgt von geronnener Milch (Cale., Sil., Valer.) und käseartigen Massen ODER ein Hochwürgen der Nahrung etwa eine Stunde nach dem Stillen.
- ▶ Dr. Kent sagt, dass das **Gesicht** uns hilft, Aeth.-Kinder zu identifizieren: „Ein bleiches, hippokratisches Gesicht mit weißlich-bläulicher Blässe um die Lippen und **eingesunkene Augen**.“ (Ich habe die Blässe um die Lippen in meiner Praxis nicht beobachtet.)
- ▶ Kann wegen **ausgeprägter Schwäche** den Kopf nicht halten (Abrot., Calc-p., Sil.) oder stehen.
- ▶ **Allgemeine Verschlimmerung durch Milch** (Mag-c., Nat-c.; denken Sie auch an eines der Milchmittel, entweder Lac-c. oder Lac-d.).

Verträgt Milch in keiner Form; sie wird unmittelbar nach dem Trinken in großen Klumpen wieder erbrochen, gefolgt von **Schwäche** und **Schläfrigkeit**.

- ▶ Völlige Durstlosigkeit (Apis, Gels., Nux-m., Puls.).
- ▶ Heißes Sommerwetter kann zahlreiche Erkrankungen beim Kind auslösen.
- ▶ Vielfältige körperliche Erkrankungen während der Zahnung.
- ▶ Schwäche mit Schläfrigkeit nach Erbrechen (Ars., Bell., Cupr., Ipec.), nach Stuhlgang (Elaps., Sulph.) oder nach Krämpfen (Cic., Stram.).

Aeth. hat große Ähnlichkeit mit Ant-c. und Cale, (bei Bauchbeschwerden) und mit Cic. (bei Krämpfen).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Ungeschickte** Kinder (Apis, Bov., Ign., Nat-m.).
- Babys, die **beim Stillen weinen** (Lac-c., Puls.).
- Kinder, die **große Schwierigkeiten** haben **zu weinen**, **obwohl** sie **traurig** sind (Ign., Nat-m.).
- Extreme Angst, die Familienangehörigen zu verlieren (Sacch), zeigt Symptome von Verwirrung, Krämpfen, Diarrhoe, Ohnmacht, Erbrechen usw.; extreme **Angst vor Prüfungen**, aufgrund von Erwartungsspannung; Angst zu versagen (Anac., Arg-n., Cupr., Nux-v., Sil., Thu.).
- **Fasziniert von Haustieren**, besonders Hunden und Katzen (Cale., Carc., Med.).
- Zu **Scherzen** aufgelegt; Neigung, **Späße in unpassenden Situationen** zu machen (Cact.) [*Rubrik - Spaßen, Witzig*]
- **Weich**, verlegen, langsames Sprechen.
- Möchte sich gerne im sozialen Bereich engagieren, z. B. nach Blut- oder Arzneimittelspendern suchen, Geld für medizinische Zwecke sammeln.
- Verlangen, den ganzen Tag lang an etwas zu knabbern.
- Angst vor Erstickern im Dunkeln (Chin., Lyc., Puls.).
- Geistreiche Kinder (Op.).
- Kinder, die sich schon in frühen Jahren völlig in schulisches Wissen vertiefen und dabei ihre Kräfte überschätzen, was auf Dauer ihrer Konzentration schadet (Kali-p., Pic-ac.) und zu Verwirrung führt.

KOPF

- Periodisch auftretende Kopfschmerzen, begleitet von Übelkeit, Erbrechen und Schluckauf, mit quälenden Nackenschmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kann den Kopf nicht halten (Cale., Calc-p., Op., Sil.) wegen einer Schwäche der Halsmuskeln (Abrot.); der Kopf fällt immer wieder nach hinten.

AUGEN

- Verdrehte und **rollende Augenbewegung während des Schlafs** (Apis).
- Photophobie.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blepharitis.
 - Konjunktivitis.
 - Erweiterte Pupillen bei epileptischen Anfällen (Bell., Cina).
 - Verklebte Augen.
 - Glänzende Augen (Bell.).
 - Augen sind bei Krämpfen nach unten gedreht.
 - Glasiges Aussehen der Augen (Op., Ph-ac.).
 - Hervorstehende Augen (Nat-m., Stram.).
 - Pupillen reagieren nicht auf Licht (Hyos., Op.).
 - Starrende Augen bei Bewusstlosigkeit.
 - Strabismus.
 - Schwellung der Meibomschen Drüsen.

OHREN

- Untersuchungsergebnis:
 - Gelbliche, eitrige Otorrhoe.

NASE

- Schnupfen, wenn das Kind an die frische Luft geht.
- Vergebliche Anstrengung, zu niesen.
- Die Nase ist morgens beim Aufwachen verstopft (Cale.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Hautausschläge (Caust: mehr auf der Nasenspitze).

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalter Schweiß** des Gesichts (Camph., Spong., Verat.).
 - Neugeborene mit faltigem, alt aussehendem (Cale., Nat-m., Op.), **verkniffenem** (Cina, Verat.), hippokratischem Gesicht (Abrot.); mit einem leidenden Ausdruck (Ars., Kali-c.).
 - **Auffällige Nasolabialfalte** (ein Zeichen von Schmerz und Sorge) (Cina, Phos., Stram.).
 - Aufgesprungene Lippen.
 - Blasses, aufgedunsenes Gesicht; Blässe besonders um die Lippen herum (Cina, Stram.).
 - Trismus (Cic., Nux-v., Op.).

MUND

- Extrem **trockener Mund** (Ars., Bry.).
- Schwierige Zahnung.
- Speichelfluss während des Schlafes.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Saubere oder **weißlich belegte** Zunge, mit Aphthen.

- Bei Krämpfen kommt weißlicher, milchiger Schaum aus dem Mund (Cic., Cupr., Hyos., Lach.).
- Das Gaumensegel ist rot und angeschwollen.
- Soor (Borx., Kali-chl., Merc.).

HALS

- Chronisches Halsweh, schlechter bei kalter Luft und feuchtem Wetter, charakterisiert durch ein heißes, unbehagliches Gefühl; nach Tonsillektomie.
- Ständiger Drang zu schlucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Entzündete, vergrößerte Halslymphknoten (Cist.).
 - Retronasaler Schleimfluss.
 - Geschwollenes, entzündetes Zäpfchen.
 - Der Hals ist rot und entzündet.

MAGEN

- **Tödliche Übelkeit** beim Anblick von Essen.
- **Verstärkter Appetit nach dem Erbrechen** (Cina, Colch., Podo.).
- **Milchintoleranz**, besonders bei Neugeborenen und Säuglingen: die Milch wird fast augenblicklich nach dem Schlucken mit plötzlicher, krampfhafter Kraft erbrochen (Ipec., Sanic.), fast geronnen (gelegentlich nicht geronnen).
- **Durstlosigkeit bei Fieber** (Puls.).
- Erbrechen von geronnener Milch (Ant-c., Cale., Nat-m., Sil., Valer.) und einer käsigen Substanz bei Säuglingen, die in großen Mengen kurz nach dem Füttern wieder kraftvoll ausgeworfen wird (Ars., Tab., Verat.), danach fällt das Kind in einen **tiefen Schlaf** (Ant-t., Bell., Ipec.).
- Erbrechen bei der Zahnung (Ant-c., Bry., Ipec.), bei Diarrhoe (Ant-t., Apis).
- Verdauungsstörungen aufgrund von häufigem Knabbern, emotionaler Aufregung (Bry., Cham., Nux-v.) und geistiger Erschöpfung durch zu große Anstrengung beim Studieren.
- Aufstoßen innerhalb einer Stunde nach dem Essen (Sulph).
- Krampfhafter Schluckauf.
- Plötzliches, heftiges, grünliches, schaumiges Erbrechen bei Fieber, besonders nach dem Verzehr von Milch oder üppig-fettem Essen.
- Verschlimmerung: **Milch** (Sil, Valer).
- Abneigungen: Kaffee, Fett, Früchte und Milch.
- Verlangen: Käse, Delikatessen, mehlhaltiges, salziges Essen und Süßigkeiten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Gastroskopie: Angeborene Pylorusstenose (Dys-co.).
 - Tympanitis (Carbo-veg., Chin., Lyc.).

ABDOMEN

- Darmkatarrh bei Säuglingen, in der Nabelgegend (Verat.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Fühlt sich kalt an.
 - Dehydratation: Grad 2 mit Hyponatriämie und Tachycardie mit kleinem, fast nicht wahrnehmbarem Puls.
 - Berührungsempfindlichkeit.
 - Tympanitis +.

REKTUM

- **Diarrhoe, fast immer als Begleitsymptom einer Dehydratation.**
- Stühle: Dünn und grün; große Anstrengung vor und während des Stuhlgangs, gefolgt von einem **Kollaps** (Ars., Camph., Verat.).
- Säuglingsdiarrhoe (Bry., Nux-v., Op.), mit Ausscheidung von unverdaulichem, dünnem, wässrigem (Gamb., Grat.), hellgelbem (Chel.) oder grünem, galligem Stuhl, besonders nach Mitternacht; bei warmem Wetter, durch Erwartungsangst (Gels., Ph-ac.), während der Zahnung.
- Hartnäckige Verstopfung bei Kindern, die gestillt werden.
- Schläfrigkeit nach dem Stuhlgang (Nux-m.).
- Stuhl mit dem Aussehen geronnener Milch, der 1-2 Stunden nach dem Füttern druckvoll entleert wird.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Virale Gastroenteritis durch **Rotaviren** (Ars., Cupr-ar., Verat.) oder **Vibrio cholerae** (Calc., Calc-p., Guaj., Sal-ac.).
 - Spasmen des Dickdarms.
 - Okkultes Blut im Stuhl (Haemoccult® positiv) ++.

HARNWEGE

- Chronisches Bettnässen (Lac-c.).
- Weißliches Sediment in der Windel.
- Versiegen des Urins aufgrund von Dehydratation (Ars., Chin.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Hämaturie bei routinemäßiger Urinuntersuchung.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Häufige Stimmlosigkeit.

ATMUNGSORGANE

- Asthma, immer verschlimmert in einem dunklen Zimmer, mit starker **Furcht zu ersticken**; das Kind will, dass die **Türen und Fenster offen** stehen (Apis, Arg-n., Lach., Puls., Sulph.).
- Asthma und Husten machen das Kind völlig **sprachlos** (Apis).
- Untersuchungsergebnis:
 - Atmung: ächzend und kurz; Schnarchen.

HUSTEN

- Trockener Reizhusten **nachts** (Cina, Kali-c.) aufgrund von Kehlkopfreizung.
- Kurzer, trockener, anfallsweise auftretender Husten nach dem Abendessen.

BRUST

- Untersuchungsergebnis:
 - Geschwollene, empfindliche Achseldrüsen.

EXTREMITÄTEN

- **Ungeschicklichkeit** der Glieder (Agar., Hell.); fortgesetztes Fallenlassen von Gegenständen.

- **Wachstumsschmerzen in den Oberschenkeln und Waden**, besser durch Reiben oder Massieren.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Zusammengeballte** Finger (Bell., Cupr., Hyos.) mit nach innen gezogenem Daumen (Cupr., Merc.).
 - **Rötung** der Handflächen (Fl-ac.).
 - Verschrumpelte Haut der Hände.

SCHLAF

- Häufiges Erwachen aufgrund von **Hunger** (Ant-c., Lyc., Psor.).
- Intensive oder überwältigende **Schläfrigkeit** mit Schwäche, während und nach dem **Stuhlgang** (Nux-m., Sulph.), nach dem **Erbrechen** (Ipec.) oder nach Konvulsionen (Cic., Cur.).
- **Knochenschmerzen** hindern am Schlaf (Ph-ac., Merc.).
- Furchtbare Alpträume, die ihn aus dem Schlaf schrecken.
- Ruheloser Schlaf mit **Muskelzuckungen** (Cham., Cina) und Rollen der Augen.
- Schläfrigkeit während des ganzen Tages, außer an der frischen Luft.

FIEBER

- Frost-Stadium: Heftiger Schüttelfrost mit äußerlicher Kälte während des Schlafes, besonders am Bauch; **rotes Gesicht**; überhaupt kein Durst.
- Hitze-Stadium: **Kein Durst**, nicht mal auf einen Tropfen Wasser; Schaudern.
- Schweiß-Stadium: **Reichlicher Schweiß beim Einschlafen** (Ars., Merc.); kann es in dieser Phase nicht ertragen, aufgedeckt zu werden (Acon., Nux-v.); alle Beschwerden bessern sich in dieser Phase.
- Das Fieber beginnt, sobald das Kind am Morgen aufsteht und sich bewegt.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Gutartige, aseptische Choriomeningitis.
 - Virale Meningitis.

HAUT

- Leichtes **Wundreiben** der Haut (Calc-s., Graph., Merc., Petr.) durch die Windel, den Slip, die Unterwäsche, Reibung der Schenkel.
- Schwitzt bei der geringsten Anstrengung.
- Jucken, verschlechtert durch das Warmwerden im Bett, wenn der Körper warm wird (Nat-m.), in warmem Klima oder im warmen Zimmer.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalte, klamme** Haut als Begleitsymptom der meisten Beschwerden (besonders bei Diarrhoe, Dehydratation und Erbrechen).
 - Neurodermitis.
 - Die Haut ist absolut trocken, ohne jede Tendenz zu schwitzen, selbst nicht nach Anstrengung (familiäre oder angeborene Eigenschaft).

KONVULSIONEN

- Beschwerden: durch Zahnung, beim Einschlafen (Sulph.) oder nach tiefem Schlaf, nach Erbrechen (Cupr.).
- Während der Krämpfe: **Eingeschlagener** Daumen (Bufo, Caust, Cic.), kalte Gliedmaßen, die Augen sind nach unten oder seitlich nach rechts oben

gerichtet; starre, erweiterte Pupillen (Bell., Cina); **Schaum** vor dem Mund (Bufo, Op.); wahnsinniges, wütendes Delirium, rotes Gesicht (Cic., Glon.); kleiner, flacher Puls und heftige Spasmen mit Stupor und Delirium.

- Nach den Krämpfen: Ausgeprägte Schwäche, Erschöpfung und Schläfrigkeit.

ALLGEMEINES

- Milchzucker-Intoleranz (Calc-p.).
- Ernährungsprobleme bei Kindern, die mit **künstlichen Milchpulvern** oder künstlichen Nahrungsergänzungen gefüttert werden.
- **Plötzliche Erschöpfung** nach akuten Krankheiten, Konvulsionen, Stuhlgang oder nach Erbrechen, mit Kälte und Schläfrigkeit.
- Kind **überisst sich** oft (Nat-p.).
- **Heftigkeit und Gewaltigkeit** bei allen Zuständen: Gewaltsame Konvulsionen, Delirium, Schmerzen, Erbrechen etc.
- Anasarka.
- Kollapsneigung (Camph.).
- Verhärtete Drüsen.
- Reaktionsmangel (Tub.).
- Puls: Beschleunigt und klein, fast nicht wahrnehmbar.
- Sommerbeschwerden von Säuglingen und Kindern.

HERKUNFT

- Familie der Doldenblütler (Apiaceae/Umbelliferae)

AGARICUS MUSCARIUS

(Fliegenpilz - Agar.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Geistesabwesende und **verträumte** Kinder (Nat-m., Op., Phos.), die sich tief in ihre Phantasien vergraben.
- ▶ **Ungeschickt**, geistig und körperlich (Apis, Nux-v.).
- ▶ Kinder, die gern **übertreiben**: ihr Leiden, ihre Fähigkeiten, ihre Bedürfnisse (Cann-i., Plat., Stram.) etc.
- ▶ Kinder, die morgens ziemlich faul und träge sind, die aber **am Abend** bei zunehmender geistiger Aufhellung **fröhlich** werden (Lach., Sulph.).
- ▶ Kinder und Jugendliche, die wenig oder **keine Kontrolle über ihre Suchttendenzen** nach Alkohol, Kokain oder Opium haben; wiederholter Drogenmissbrauch, der durch Schuleschwänzen zu Leistungsabfall mit schlechten Noten führt und letztendlich mit einem Schulverweis endet.
- ▶ **Abhängig** von anderen.
- ▶ **Fasziniert** von **Trommeln**; spielt gern Schlagzeug; der Rhythmus von Trommeln tut seiner Psyche gut.
- ▶ Angst vor Geistern, Räubern und Wasser; kann aber auch **furchtlos** sein (Bell., Cocain., Op., Sil.). Durch diese Furchtlosigkeit hält sich das Kind für einen großen Helden und ist überzeugt, so stark wie Superman zu sein [Rubrik: *Gemüt; Wahnideen - vergrößert; Wahnideen - leicht - er sei leicht; Wahnideen - Offizier - er sei ein*]. Ein Teufelskerl; will sich wie Superman oder Spiderman benehmen.
- ▶ **Hyperaktiv** (Spinnen-Gruppe).
- ▶ Das Kind ist **boshaft** und **droht** anderen; es bewegt sich völlig unkümmert an den gefährlichsten Orten (kein Sinn für Gefahr: Falco-pe., Merc., Op., Stram., Tub.) (siehe Verwegenheit), z. B. am Fenster, lehnt sich gegen die Balkonbrüstung, klettert auf Bäume etc.
- ▶ Negativ bis ins Mark.
- ▶ **Alberne Ausgelassenheit** (Bufo, Hyos.).
- ▶ Liebt Spiele, die viel **körperliche Kraft** und Ausdauer verlangen. Aggressiv und wild beim Sport (Fußball, Rugby, Volleyball).
- ▶ Sehr **neugierig** (Verat.), will alles wissen.
- ▶ Meidet Verantwortung (Lyc.).
- ▶ Kinder, die es sich im Schutze anderer zu bequem machen (typischerweise als Einzelkind in einer reichen Familie).
- ▶ Kinder, die gern Kriegsspiele mit Soldaten, Gewehren und Pistolen spielen (Cupr., Stram.).
- ▶ Leicht stimulierbar: gesteigerte Fröhlichkeit, Redseligkeit und übertriebene Phantasien; redselig (Lach.), weicht aber gestellten Fragen aus.

- ▶ Neigung zum Delirium bei Fieber oder Schmerzen (Bell.); murmelt.
- ▶ Großer Egoismus.
- ▶ Lasziv, präpubertäre Kinder wollen küssen.
- ▶ Faule Kinder, Abneigung zu arbeiten.
- ▶ Tobt gern herum und liebt es, auf eine besonders groteske Weise zu tanzen.
- ▶ Geistige Behinderung mit stereotypem oder selbstverletzendem Verhalten.
- ▶ Geistig zurückgebliebene Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit- Syndrom (ADS), weigern sich zu lernen, können sich beim Lernen nicht konzentrieren und haben eine Abneigung gegen jede geistige Anstrengung.
- ▶ Neurologische oder Verhaltensstörungen bei kleinen Kindern, nachdem sie von Gleichaltrigen oder Familienmitgliedern bestraft oder lächerlich gemacht wurden oder als Sündenbock herhalten mussten.
- ▶ Schwache Willenskontrolle.
- ▶ Absichtliche, situationsbezogene Stummheit mit Zwangshandlungen und Wutanfällen.
- ▶ Stereotype Bewegungsstörungen, charakterisiert durch wiederholtes, scheinbar getriebenes und nicht zweckgebundenes motorisches Verhalten.
Zum Beispiel:
 - sich selbst beißen (Elaps., Hura, Lyss.).
 - unwillkürliche Gesten der Hand, als ob er nach etwas greift.
 - unwillkürliche Gesten der Hände, als ob er etwas zu einem Knäuel aufspule.
 - Gesten, Tics.
 - verletzt sich bei Wutanfällen selbst (Lyss.).
 - rollt den Kopf von einer Seite zur anderen (Apis).
 - Neigung, Dinge zu zerreißen (Bell., Stram.).
- ▶ Starrsinnige Kinder (Bry., Cham., Nux-v.).
- ▶ Talentierte Kinder, die Verse schreiben und urkomische lustige Lieder singen können.
- ▶ Ungewöhnlicher Wunsch, Kranke in Krankenhäusern zu besuchen [Rubrik: *Gemüt - Liebevoll; Wohlwollen*], bei chirurgischen Eingriffen zuzusehen und auf Beerdigungen zu gehen.
- ▶ Heftiger Zorn mit Demonstration großer Kraft, bedrohliche Zerstörungswut.

KÖRPER

- ▶ **Zappelig** von Kopf bis Fuß (Merc.).
- ▶ **Stinkende** Absonderungen (Stuhl, Aufstoßen, Atem).
- ▶ Die Wirbelsäule ist empfindlich gegen Berührungen (Ther.).
- ▶ Ausgeprägte **tuberkuläre Diathese**; Tuberkulose in der Vor- oder Familiengeschichte oder Vorliegen eines Primärkomplexes.
- ▶ **Gähnen** vor einem epileptischen Anfall oder in Erwartung von Schmerzen.

- ▶ Einzelne Körperteile sind äußerst empfindlich gegen Druck und kalte Luft.
- ▶ Kinder mit hellem Haar, heller Haut und schlaffen Muskeln.
- ▶ Häufige Nebenwirkungen durch Neuroleptika (Zinc.).
- ▶ Unwillkürliche Bewegungen im Wachen, die im Schlaf verschwinden.
- ▶ Lernt spät gehen (Cale.) und sprechen (Nat-m.).
- ▶ Nachtschweiß.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch **Schreck** (Gels., Phos., Verat.), **Bestrafung** (Dig.) und **Vorwürfe** (Staph.).
- **Beißt sich**, wenn er sich über sich selbst **ärgert** (Cur., Op., Plb.).
- Bulimie.
- Launische und zänkische Kinder.
- Das Kind ist außer Stande zu antworten, wenn es in seinen Gefühlen verletzt wurde.
- Kinder mit einem sehr schlechten Gedächtnis; sogar dafür, was sie gerade gehört, getan oder gedacht haben.
- Frivol (Merc., Puls.).
- Hass gegen diejenigen, die ihn in irgendeiner Weise beleidigt haben, mit der Tendenz, Rachepläne zu schmieden (Nat-m.).
- Falsches Abschätzen von Entfernungen und der Größe von Objekten.
- Lautes, unwillkürliches Lachen (Borx., Ign., Nat-m.) und Scherzen über Bagatellen.
- Macht viele Fehler beim Schreiben und Sprechen.
- Zieht seltsame Grimassen und nimmt merkwürdige Haltungen und Positionen ein.
- Nervöse Kinder, die sehr wenig Urin ausscheiden (das Ign.-Kind scheidet sehr viel Urin aus).
- Von Natur aus schlau (Tarent.) und betrügerisch.
- Verschwenderisch im Umgang mit Geld (Verat.).
- Nächtliche Angst vor dem Ersticken, besonders während des ersten Schlafes.

KOPF

- Kopfschmerz: Ausgelöst durch kaltes Wetter (mit Schnupfen), zu viel Lesen oder Fernsehschauen; gezwungen, die Augen zu schließen (Bell., Sil.); besser durch Schließen der Augen (Bry., Sep., Sulph.), Einhüllen des Kopfes, Gehen oder Bewegung des Kopfes, nach der Miktion, nach Stuhlgang; verschlechtert nach Schlaf und beim Aufstehen am Morgen; bei Nasenbluten.
- Meningitis (Bell., Hell., Stram., Zinc.).
- Migräne bei Kindern, die unter Chorea mit Verwirrung leiden (Bry.); nach jeder Anstrengung der Augen oder aufgrund nervlicher Ursachen.
- Den Kopf von einer Seite zur anderen rollen, begleitet von Schmerzen (Chin., Kali-
: \

- Untersuchungsergebnisse:
 - Kann den Kopf nicht aufrecht halten; neigt dazu, ihn aufgrund einer Schwäche der Halsmuskeln nach hinten fallen zu lassen (Camph., Cic., Op., Tarent.).
 - Ständige, unwillkürliche Bewegungen des Kopfs (Agar., Hell., Zinc.), besonders nach hinten und vorne (Cina).
 - Stirn (Ars., Zinc.) und Scheitel (Calc-p., Verat.) sind bei Berührung eiskalt.
 - Kopf ist auf die Seite gelegt, als ob er auf den Schultern ruhen würde (Hydrac.).
 - Heißer Kopf mit kaltem Körper (Ars., Bufo).
 - Kernig-Zeichen +.
 - Schweiß auf der Stirn (Nat-c., Phos.).
 - Schorfige oder schuppige, herpesartige oder ekzematöse Ausschläge der Kopfhaut, die intensiv jucken.
 - Kopfhaut ist berührungsempfindlich (Bell., Nux-v.).

AUGEN

- Alle Augenbeschwerden bessern sich durch Anwendungen von kaltem Wasser.
- Asthenopie (Cina, Jab., Ruta) durch anhaltende Überanstrengung der Augen (T. F. Allen).
- Das Kind hat Schwierigkeiten, die Augen zu öffnen oder sie offen zu halten, entweder aufgrund einer Verklebung oder eines spastischen Verschlusses der Augenlider.
- Diplopie beim Lesen (Graph.).
- Tränenfluss bei Schnupfen (Euph.), Husten (Nat-m.) und Kopfweh (Puls.).
- Photophobie bei künstlichem Licht (Con., Nat-m.).
- Zucken von Lidern und Augenmuskeln (Cod.) beim Lesen (Kali-bi.) und vor einem epileptischen Anfall; gebessert durch Waschen der Augen mit kaltem Wasser.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Häufiges, unwillkürliches **Blinzeln** (Bell., Euph.).
 - **Unwillkürliches** (Cale., Mag-p.), **konvulsives** (Hyos., Stram.) Rollen oder pendelartige Bewegung der Augäpfel, von einer Seite zur anderen (Cupr., Gels.), nur gebessert während des Schlafens.
 - **Lider stehen halb offen** (Bell., Cupr., Op.).
 - **Starrender Blick** (Stram.).
 - Lidkrampf (Jab.).
 - Divergierendes Schielen (Nat-m.).
 - Augen sind nach oben gedreht (Bufo, Cupr., Op.).
 - Häufiger Drang, über die Augen zu wischen oder sie zu reiben (Cale., Puls.).
 - Rötung der inneren Augenwinkel.
 - Tränendrüsenfisteln (Puls., Sil.).
 - Lateraler Nystagmus (Cupr., Gels.).
 - Muskuläre Asthenopie.
 - Kurzsichtigkeit (Phos.).
 - Lähmung des inneren M. rectus (Morph., Nat-m.).
 - Pupillen ziehen sich bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen abwechselnd zusammen und dehnen sich aus (Hell).
 - Spasmen der Lider und der Ziliarmuskeln

OHREN

- Schmerz in den Ohren, wenn er **kalter Luft** ausgesetzt war (Hep.); gebessert durch Bohren mit dem Finger im Ohr (Mez.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bohrt mit den Fingern im Ohr (Arund., Cina, Sil.).
 - Vermehrtes Ohrenschmalz (Carbo-veg.).
 - Rote Ohren (Acon.).

NASE

- **Nasenbluten bei Kopfschmerzen** und durch Putzen der Nase früh am Morgen (Ambr., Bry.).
- Häufiges oder anfallsartiges **Niesen beim morgendlichen Aufwachen** (Am-c., Nux-v.), bei **Sonnenexposition** (Merc., Sang.), während und **nach dem Husten**.
- Überempfindlichkeit gegen starke Gerüche (Bell., Coff.).
- Reichlicher, tropfender Schnupfen, der im linken Nasenloch beginnt und auf das rechte Nasenloch übergeht.
- Trockenheit in der Nase mit einem Fremdkörpergefühl, welches das Kind zum häufigen Putzen der Nase zwingt, aber ohne Absonderungen (Stict).
- Heuschnupfen mit anfallsweisem Niesen durch ein Kitzeln im rechten Nasenloch, den Ohren und im Gaumen, mit Reizung im Kehlkopf.
- Die Nase neigt zu nächtlicher Verstopfung.
- Schmerz an der Nasenwurzel bei Kopfweh.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Rötliche** Verfärbung der Nasenspitze.
 - Krusten- oder Schorf-Bildung in den Nasenlöchern (Lac-c.).
 - Wundheit der Nasenlöcher (Arum-t.).

GESICHT

- Ständiges Lecken (Nat-c., Stram.) der trockenen Lippen und Schmatzen führt dazu, dass sich rund um die Lippen Pickel bilden (Leckekzem).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bläulich-rote Verfärbung des Gesichtes und der Lippen, besonders um die Augen und den Mund, bei Fieber (Acon., Bell., Stram.) und Kopfweh (Glon.).
 - Zusammengebissene Kiefer.
 - Rissige Lippen, besonders in der Mitte der Unterlippe (Nat-m.).
 - Verzerrung des Mundes beim Sprechen.
 - Dystonie.
 - Ausfall der Augenbrauen (Caust, Nit-ac.).
 - Fettiges Gesicht (Nat-m., Thuj.).
 - Eiskaltes Gesicht durch kalten Schweiß.
 - Idiotischer Gesichtsausdruck (Cale., Lyc.).
 - Blasses, eingefallenes Gesicht.
 - Zucken der Gesichtsmuskeln und der Oberlippe (Carbo-veg., Zinc.).

MUND

- Der Mundwinkel hängt herab (Bell. Lähmung); unwillkürlicher Speichelfluss aus

- Brennen der Zungenspitze bei Fieber (Calc-p., Nat-s.).
- Sprachschwierigkeiten bei Kindern, die unter Chorea leiden.
- Häufiges, unbeabsichtigtes Beißen auf die Zunge (Bell., Bufo).
- Stottern durch Aufregung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen an der Zungenspitze (Bry.).
 - Blutendes Zahnfleisch.
 - Trockene (Ars., Bell.) Landkarten-Zunge mit aufrechten Papillen.
 - Dystonie.
 - Schaum vor dem Mund (Cupr., Hyos.).
 - Landkarten-Zunge (Bac.).
 - Lähmung der Zunge (Both.).
 - Weißer Belag auf der Zunge.
 - Gelbe Verfärbung der Zungenbasis.

HALS

- Ständiger Drang, zu schlucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Vergrößerte Halsdrüsen.
 - Verhärtete Mandeln (Cham., Plb.).

MAGEN

- Verstärkter Appetit nach dem Essen (bzw. nach dem Stillen) (Lyc., Phos.).
- Erbrechen von Geronnenem nach dem Trinken von Milch.
- Auftreibung nach dem Essen.
- Würgen und Brechreiz durch Husten (Cina) und nach dem Essen.
- Heißhunger am Abend (Nat-m.).
- Permanenter Durst.
- Verschlimmerung: Kaltes Wasser.
- Abneigungen: Eier, Brot und Fleisch.
- Verlangen: **Eier** und Salz.

ABDOMEN

- **Reichliche Blähungen** (Carbo-veg., Lyc.).
- Neugeborenenkolik, begleitet von exzessiven Blähungen, gebessert nach Stuhlabgang (Coloc., Nat-s.) oder durch das Tragen des Kindes an frischer Luft. Während dieser Koliken ist die **Nabelregion empfindlich** (Plb., Verat.).
- Blähungen beim Stuhlgang.
- Flatus mit einem widerwärtigen, nach Knoblauch riechenden Geruch (Mosch., Ph-ac., Phos.).
- Gluckern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Borborygmus (kollernde und gurrende Darmgeräusche).
 - Vergrößerte Leber.
 - Knapp tastbare Milz.
 - Tympanitis +.

REKTUM

- **Diarrhoe** mit **grasgrünen** (Ipec., Mag-c.), wässrigen (Chin., Podo.) widerwärtig stinkenden Stühlen; Diarrhoe durch Sonnenhitze (Camph., Carbo-veg.), am Morgen nach dem Aufstehen (Aloe, Podo., Rumx., Sulph.) und bei nassem Wetter (Nat-s., Dulc.), mit stinkenden Blähungen und Stuhl.
- Verstopfung nach dem Missbrauch von Abführmitteln (Coloc., Nux-v.); Stuhlgang an jedem zweiten Tag (Nat-m.).
- Stuhl: Zuerst hart und später flüssig (Bov); grün, teigig, dünn, gefolgt von hartem Stuhl.
- Untersuchungsergebnis:
 - Wundheit, reibt den After bis er wund ist (Carbo-veg., Graph.).

HARNWEGE

- Unwillkürlicher Harnabgang aufgrund von Aufregung (Gels.).
- Milchiger Urin (Apis, Hep.).
- Urinretention.
- Spärlicher und seltener Urinabgang.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Untersuchungsergebnis:
 - **Kehlkopfstridor** (Bell., Chlor., Mosch.).

ATMUNGSORGANE

- Untersuchungsergebnisse:
 - Häufiges Seufzen (Ign.).
 - Rasselnde und tiefe Atmung.

HUSTEN

- **Husten endet im Niesen** (Bell., Carbo-veg., Squil.) oder wird begleitet von Niesen (Cina, Nat-m.).
- **Heftige Hustenanfälle zwingen das Kind, sich zusammenzukrümmen** (Ther).
- Allergischer Husten, plötzlich (Squil.) und anfallsartig, bei dem die Anfälle einander schnell folgen (Cor-r., Dros.), gefolgt von reichlichem Schleim (Arg-n., Coc-c.); verschlechtert beim Erwachen am Morgen (Thuj.), beim Zubettgehen (Lach., Lyc.) und bei Berührung des Gehörgangs (Lach.); muss beim Husten aufrecht sitzen (Bry., Con., Phos.).
- Weißer Auswurf.

BRUST

- Reichlicher Nachtschweiß (Cale.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Knisterndes Rasseln in der Rückenlage.
 - Röntgen: Primärkomplex (Anmerkung: Eine klinische Bezeichnung für eine Art der Lungentuberkulose, bei der in die Alveolen eingeatmete Tuberkulosebakterien eine sub-pleurale entzündliche Schädigung und Infektion regionaler Lymphknoten verursachen, die gewöhnlich mit der lokalen Kalzifikation, d. h. der Tuberkelbildung, wieder abklingt).

RÜCKEN

- Schwäche des Nackens nach körperlicher Anstrengung (Kali-c., Sil.).
- Untersuchungsergebnis: Steifheit der Halsmuskeln.

EXTREMITÄTEN

- **Wachstumsschmerzen** (Calc-p.).
- **Zucken**, besonders der unteren Glieder, beim Einschlafen (Ars., Kali-c., Zinc.).
- **Stolpert beim Gehen** (Caust., Ipec.).
- Sehr **plump** und **ungeschickt** (Cale., Ipec.). Lässt oft Dinge aus der Hand fallen und stolpert beim Gehen.
- Nächtlicher Schweiß an den Beinen (Calc., Merc.).
- Zucken der unteren Gliedmaßen beim Einschlafen (Arg-met., Ars.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ataxie (Alum., Con.).
 - Athetosis +.
 - Gesäß fühlt sich bei Berührung kalt an (Cale.).
 - Choreaartige Bewegungen +.
 - Verstärkte Sehnenreflexe (Lath., Nux-v.).
 - Dystonie +.
 - Bündelung von Muskeln +.
 - Eiskalte Füße (Camph., Carbo-veg., Sil.).
 - X-Beine (Cocc.).
 - Myoklonien.
 - Schmerzhaftes Hühneraugen an den Händen und Fußsohlen.
 - Ruhelose Finger (Kali-br., Med.) und Hände (Tarent.).
 - Empfindlichkeit des Schienbeins (Lach.).
 - Tourette-Syndrom.

SCHLAF

- **Baby schläft während** (Calc-p., Kali-c., Phos.) **oder nach dem Stillen ein** (Nux-v.).
- Schlaflosigkeit aufgrund von Aufregung (Coff.), **Jucken** (Neurodermitis) (Apis, Merc., Sulph.) oder **Schmerzen in den Beinen** (Kali-bl., Mez., Syph.).
- Häufiges, anfallsweise auftretendes, krampfhaftes Gähnen.
- Kreischen im Schlaf.
- Erschrickt beim Einschlafen.

FIEBER

- Frost: Frösteln in frischer Luft oder durch die geringste Bewegung.
- Hitze: Hitze im Oberkörper. Hyperpyrexie.
- Schweiß: Reichlich während des Schlafes. Kalter Schweiß auf dem Gesicht, dem Hals und der Brust.

HAUT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Angioneurotisches Ödem (Quincke-Ödem) (Antip.).
 - Neurodermitis, charakterisiert durch exzessives, heftiges Jucken; das Kind kratzt, bis die Haut wund wird und blutet (Graph., Petr.).

CHOREA

- Chorea durch **Masturbation** (Calc., Cina) und **Bestrafung** (Ign., Nat-m., Staph.); verschlechtert durch kalte, frische Luft und durch Gemütseregungen (Ign., Op., Phos.) wie Entsetzen (Caust.); gebessert während des **Schlafs** (Cupr., Hell., Mygal.).
- **Chorea mit ausgeprägten Muskelzuckungen** (Hyos., Mygal.).
- **Sydenham-Chorea** (Agarin., Art-v., Ziz.).

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Enzephalitis oder Meningitis, Aufregung (Hyos., Op.), Furcht (Cale., Kali-br.), **Hyperpyrexie** (Nux-v., Stram.), Verletzungen (Arn.), **Bestrafung** (Cham., Cina) oder **Vorwürfe** (Ign.), Schock (Op.), unterdrückte Hautausschläge (Cupr., Sulph.) und Ärger (Cupr., Staph.).
- Bei Konvulsionen: **Zyanotisches Gesicht** (Cic., Verat.), Schaum vor dem Mund und erhöhte körperliche Kraft.
- Typ: Grand Mal, Petit Mal oder einfache Konvulsionen durch Fieber.
- Modalitäten: **Konvulsionen werden durch Erbrechen gebessert** (viele Symptome von Agar werden durch Absonderungen gebessert, wie bei Lach., Phos., Puls, und Sulph.) [*Allgemeines; Konvulsionen - Erbrechen - während: Cupr., Ipec.*].
- Die Konvulsionen des Agar-Kindes sollten nicht durch Phenobarbitol, Valproat, Carbamazepin, Clobazam, Clonazepam, Lamotrigin oder Primidon unterdrückt werden, da solche Unterdrückungen zu noch aggressiveren Konvulsionen führen (Absin., Caust., Mill.).

ALLGEMEINES

- Die meisten Beschwerden werden am **Meer** gebessert (Med., Tub.).
- Schweiß verfärbt die Wäsche **grün** (Cupr.).
- **Zucken** eines einzelnen oder einer Gruppe von Muskeln (Zinc.).
- Empfindlich gegen kalte Luft (Cale., Kali-c., Psor.).
- Schlechter durch Gehen an der frischen Luft, besser durch Bettwärme.

AGATHIS AUSTRALIS

(Kaurifichte - Agath-a.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Die Gemütssymptome sind der Schwerpunkt dieses Mittels. Das Kind entwickelt aus einem Gefühl von Scham oder Peinlichkeit heraus eine Menge physischer Probleme. Aus dem schmerzlichen Gefühl heraus, bei anderen nicht mehr beliebt zu sein, aufgrund von unangemessenem Verhalten von Eltern oder Lehrern oder immer dann, wenn das Kind etwas Beschämendes oder Blamables erlebt, entsteht Scham oder Peinlichkeit. Als Folge davon ist die Konzentrationsfähigkeit des Kindes beim Lernen stark beeinträchtigt, sein Selbstvertrauen ist gering, und die Gedanken schwirren durcheinander. Das Kind wird mehr und mehr niedergeschlagen, sondert sich ab und wird mutlos. Stumpfsinnig und gleichgültig gegenüber Menschen (Familie und Freunde). Verliert das Interesse am Spielen mit anderen Kindern oder an der Schule.
- ▶ Ein Gefühl von Hilflosigkeit mit großen Problemen beim Sprechenlernen: macht Fehler beim Sprechen, stellt Worte an die falsche Stelle, verdreht Worte, benutzt falsche Worte. Fehler beim Schreiben: schreibt falsche Buchstaben, falsche Zahlen oder vertauscht Wörter.
- ▶ Weinen bei Kleinigkeiten.
- ▶ Ähnliche Situationen kommen auch in den Träumen vor. Träume von sinkenden Booten, davon wie sie geschlagen werden, von Gefahr, von drohender Gefahr, von Feuer oder von anderen schrecklichen Dingen.
- ▶ Dieser depressive Zustand kann zu Bulimie mit Heißhunger führen. Um die verlorene Liebe oder das verlorene Ansehen zurückzugewinnen, verhält sich das Kind manchmal völlig gegensätzlich. Es ist dann sehr fröhlich, sehr nett, sehr ausgelassen, sehr herzlich oder sehr lieb. Diese Kinder können den Menschen, die sie wirklich verletzt haben, niemals verzeihen oder ihr Verhalten entschuldigen. Der Hass und Kummer bleibt lange Zeit in ihrem Gedächtnis.
- ▶ Manchmal nehmen sie Zuflucht zum Singen oder Tanzen, um vorübergehend ihre emotionale Verletzung zu vergessen. Seltsame Grimassen und Faxen können dann wichtige Hinweise auf den versteckten Kummer sein.
- ▶ Höchst anfällig für Kopfschmerzen. Drückender Schmerz, wie durch ein Band. Lichtempfindlich bei den Kopfschmerzen.
- ▶ Runzliges Gesicht.
- ▶ Allergien auf Pollen oder Hausstaub mit häufigem Niesen. Permanentes Niesen und wässriges Sekret aus der Nase.
- ▶ Großes Verlangen nach Brot, Schokolade und Obst.

- ▶ Bauchbeschwerden, Rumpeln, Gluckern oder Blähungen und Durchfall mit weichem breiigem Stuhl.
- ▶ Gestörter Schlaf durch Gedanken und Träume.
- ▶ Reichliches Schwitzen.

HERKUNFT

- Familie der Araucariaceae. Es bestehen zwei Prüfungen, eine von Misha Norland (England 1993) und eine von Alastair Gray (Australien 1995).

AGRAPHIS NUTANS

(Sternhyazinthe - Agra.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Verlegung der Nase durch Polypen.
- ▶ Polypen mit vergrößerten Tonsillen, besonders während der Zahnung. Mund steht immer offen. Schwerhörigkeit durch vergrößerte Tonsillen, wie bei Mere, und Kali-bi.
- ▶ Sinusitis begleitet von sehr hartnäckigen Nasenpolypen.
- ▶ Extrem empfindlich auf kalte Luft, auf kalte Zugluft und auf kalte Getränke.
- ▶ Durchfall nach kalten Getränken.

HERKUNFT

- Wird auch Hasenglöckchen genannt und gehört zur Familie der Liliengewächse (Liliaceae).

AILANTHUS GLANDULOSA

(Chinesischer Götterbaum - Ail.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Während des Deliriums murmelt das Kind vor sich hin, ist ruhelos und nimmt niemand um sich herum wahr.
- ▶ Dunkelrotes Gesicht.
- ▶ Augen gefüllt mit Tränenflüssigkeit.
- ▶ Blutige, wund machende, dünne, wässrige Absonderungen aus der Nase, die übermäßig viele Krusten bilden.
- ▶ Halsschmerzen bei Windpocken, Masern, Mumps oder anderen virusbedingten oder bakteriellen Infektionen wie z. B. durch Streptokokken oder Epstein-Barr-Virus.
- ▶ Rachenentzündung mit hohem Fieber, stuporösem Delirium und dunklem, miliarem Hautausschlag. Geschwollener, entzündeter Hals, dunkel, violett und rot. Vergrößerte, dunkle Tonsillen mit winzigen Geschwüren. Braun belegte Zunge, trocken, rissig und wie ausgedörrt. Aasartiger widerwärtiger Geruch aus Mund und Nase.
- ▶ Beim Leerschlucken heftige Schmerzen im Hals, die sich zu den Ohren erstrecken.
- ▶ **Begleitende Erschöpfung** ist das Schlüsselsymptom dieses Mittels. In dieser Beziehung ist Ail. sehr ähnlich zu Carb-ac. und Merc-cy.
- ▶ Anhaltend kränklich und geschwächt nach einem fieberhaften Hautausschlag, einer Infektion mit Streptokokken oder nach Mononukleose.

HERKUNFT

- Kommt aus China und wird auch Himmelsbaum genannt (Familie der Simaroubaceae).

ALCOHOLUS

(Weingeist - Alco.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Ethylalkohol ist sehr wirksam in Fällen von

- ▶ **Lernstörungen:** Fehlende Konzentration; macht Fehler beim Schreiben; kann sich das Gelernte schlecht merken.
- ▶ **Sprachstörungen:** Beeinträchtigung beim Reden und Sprechen gekennzeichnet durch konfuses, hastiges und zusammenhangloses Reden.
- ▶ **ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung):** charakterisiert durch überhöhte Aktivität; versucht zu fliehen; möchte Gegenstände in Brand stecken; rücksichtslos; aufspringen; unmäßiges Lachen; ruhelos; kreischen und singen.
- ▶ **unsozialem Verhalten** mit Beschimpfungen; Grausamkeit; Fluchen; Lügen; Bössartigkeit; Zorn und Gewalttätigkeit.
- ▶ **neurologischen Störungen** bei Kindern charakterisiert durch Unbeholfenheit der unteren Extremitäten; Stolpern beim Gehen;
- ▶ Verlangen nach unmäßig viel Senf und Pfeffer im Essen.

ALOE SOCOTRINA

(Gewöhnliche Aloe - Aloe.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Verhaltensprobleme** sind neben **Durchfall** ein wichtiger Schwerpunkt dieses Mittels.
- ▶ Das Charakteristische beim Verhalten dieser Kinder ist übertriebene geistige Beschäftigung z. B. beim Spielen, Basteln, Rechnen etc., die mit Gleichgültigkeit, Müdigkeit und mentaler Erschöpfung abwechselt. Das Kind schwankt wie ein Pendel zwischen Zufriedenheit und heftiger Unzufriedenheit hin und her. Gelegentlich kann das Kind plötzlichen Missmut und Verdrießlichkeit entwickeln. Streit ist dann oft die Folge. Dieser Zustand wird durch emotionale Erregung des Kindes hervorgerufen.
- ▶ Ärgerlich, zornig, reizbar und launisch schon bei geringsten Schmerzen oder Beschwerden, wie z. B. bei Verstopfung.
- ▶ Geistige Unsicherheit. Zum Beispiel Angst beim Alleinsein; Angst in Menschenmengen; Angst vor dem Arzt; Angst vor dem Tod; Angst zu versagen; Ängstlichkeit wegen Kleinigkeiten; Angst vor der Zukunft.
- ▶ Auch auf der Ebene des Rektums herrscht Unsicherheit; **Durchfall** schlimmer durch Säuren und Obst, nach Überhitzung, Ärger und Austern.
- ▶ Entzündliche Kolitis bei Jugendlichen in der Pubertät. Das wichtigste Symptom ist das Gefühl von **unwillkürlichem Stuhlabgang bei Flatulenz**.
- ▶ Großer Durst auf erfrischende Getränke, speziell auf Fruchtsäfte.

ERKUNFT

Auch Aloe ferox genannt, gehört zur Familie der Liliengewächse (Liliaceae).

ALUMEN

(Alaun - Alumn.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Faulheit [Rubriken: Abneigung gegen alles; Verlangen im Bett zu bleiben; Langeweile].
- ▶ Schikaniert beständig nahe stehende Menschen, wie Eltern, Freunde und Nachbarn.
- ▶ Chronische Nasenpolypen besonders linksseitig.
- ▶ Vergrößerte und verhärtete Mandeln durch wiederkehrende Tonsillitis, dadurch auch vergrößerte, empfindliche Halslymphknoten.
- ▶ Sehr frostig und anfällig für wiederkehrende Mittelohrentzündung mit Sinusitis. Ausgelöst durch frische oder kalte Luft.
- ▶ Ungewöhnlich harter und schwieriger Stuhl, fast so wie Steine. Stuhl nur in großen Abständen z. B. ein- oder zweimal wöchentlich. Schmerzhaftes, empfindliches Rektum und der Anus schmerzt noch lange nach dem Ausscheiden dieser harten Klumpen. Sep. und Plb. haben eine ähnliche Art von Verstopfung.
- ▶ Verlangen nach kaltem Wasser, Obst und unverdaulichen Dingen. Warmes oder heißes Essen bessert gewöhnlich viele der körperlichen Beschwerden.
- ▶ **Morbus Hirschsprung oder Kretinismus.**
- ▶ Familienanamnese mit viel Krebs und Diabetes.

AMBRA GRISEA

(Exkret aus dem Darm des Pottwals - Ambr.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Kann nicht an Aktivitäten teilnehmen, bei denen er in Anwesenheit anderer etwas vorführen muss** (z. B. im Hof spielen, Sport in der Gruppe); er würde lieber zu Hause bleiben und sich mit Computerspielen, Karten oder Schach beschäftigen oder Bücher lesen.
- ▶ Äußerst **ungeschickt** (Apis, Caps., Nux-v.) in Bewegungen und persönlichem Auftreten; immer fallen ihm Dinge aus der Hand oder er kollidiert mit Menschen oder Möbeln, während er geht, sitzt oder andere Dinge tut.
- ▶ Körperliche und emotionale Probleme, die von einem **Schock oder Kummer** über den Tod der Eltern oder Großeltern herrühren.
- ▶ **Empfindlich auf Musik**, besonders auf klassische und instrumentale Melodien, die ihn emotional belasten, indem sie Schwermut und Weinen hervorrufen.
- ▶ Bei Bestrafung in der Schule oder zu Hause entwickeln sich komplexe emotionale und körperliche Störungen.
- ▶ Wenig Selbstvertrauen, hält sich für wertlos; schüchtern, feige und rasch verlegen.
- ▶ Langsame Auffassungsgabe beim Lesen oder Schreiben, besonders, wenn der Geist auf Themen wie Wissenschaft, Physik, Mathematik usw. gelenkt wird.
- ▶ Kleine Kinder erröten leicht, sobald über sie gesprochen wird oder sie gelobt werden.
- ▶ Wird rasch und bei jeder Kleinigkeit verlegen. Vermeidet es, bemerkt zu werden und fühlt sich befangen in Handlungen und Benehmen. Meidet deshalb öffentliche Veranstaltungen und Bühnenauftritte, meldet sich nicht in der Klasse.
- ▶ Schulkinder sind ständig besorgt, was andere (Eltern, Freunde, Lehrer und Verwandte) über sie denken. Diese Befangenheit führt zu einem kontrollierten Benehmen, bei dem jedes Wort und jede Handlung so bedacht werden, dass keine negativen Meinungen entstehen können. Die Meinung anderer hat immer höchste Priorität.
- ▶ Zu furchtsam und schüchtern, um für sich selbst einzutreten, selbst in Situationen von sexuellem Missbrauch. Schüchternheit und Zaghaftigkeit führen zu feidem Verhalten.

KÖRPER

- ▶ Allergisches Asthma und andere Allergien der oberen Atemwege, die durch Verhaltensmuster wie Schüchternheit, Ungeschicklichkeit und Verlegenheit entstehen.
- ▶ Magere, dünne, ausgezehnte Kinder, die sich leicht erkälten.
- ▶ Das Kind geht nicht gern auf die Toilette in Anwesenheit von Fremden, Verwandten, Freunden und manchmal sogar von Familienmitgliedern. Es wartet, bis es allein ist und erst dann geht es zur Toilette. Fühlt sich scheu und wird verlegen, wenn man merkt, dass es zur Toilette geht.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Kauen an den Fingernägeln.**
- **Geistig zurückgebliebene** (Calc-p., Cic., Op.) Kinder ohne organischen Gehirnschaden. Die Retardierung entsteht hauptsächlich aus Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen, insbesondere durch schlechte Konzentration, besonders beim abstrakten Denken (z. B. Geometrie) und durch schlechtes Sprachvermögen. Muss den gleichen Text immer wieder durchlesen, um die Information zu verstehen.
- Leicht erregbar und nervös in der Anwesenheit von Fremden, was viele körperliche Symptome wie Husten, Ungeschicklichkeit usw. erzeugt.
- Erschrickt leicht.
- Liebe zu Tieren.
- Überempfindliche Kinder, die leicht unter den Einfluss anderer geraten.
- Verabscheut Leute mit lächelnden Gesichtern und frivolem Auftreten; hat ständig das Gefühl ausgelacht und verspottet zu werden.

KOPF

- Frühes Ergrauen der Haare ab der Pubertät.
- Untersuchungsergebnis:
 - Milchschorf auf der Kopfhaut (Dulc., Hep.).

AUGEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Erweiterte Gefäße in den Skleren.

NASE

- **Die Nase ist nachts verstopft** (Am-c., Lyc.); er muss durch den Mund atmen.
- Ständiger Drang, die Nase zu putzen (Borx., Kali-bi.).
- Nasenbluten am Morgen beim Waschen des Gesichts (Ars., Calc-s.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Trockene Nasenlöcher.
 - Gräulich gefärbte Absonderungen aus der Nase.

GESICHT

- **Schweiß auf einer Seite des Gesichtes** (Bar-c., Nux-v., Puls.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zusammengepresste Kiefer (Bell., Oena., Stram.) oder **Trismus bei Neugeborenen**.
 - **Die linke Wange ist rot** (Phos.).
 - Mundwinkelrhagaden.
 - Verlegener Blick.
 - Zucken der Gesichtsmuskeln, besonders der Lippen- und Masseter-Muskeln.

MUND

- Saurer Geschmack im Mund nach dem Trinken von Milch.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Ranula** (Calc.).
 - Blutendes Zahnfleisch.
 - Karies der Zähne.
 - Ständiges Zusammenpressen der Zähne (Hyos., Lyc.).
 - Mundgeruch.

HALS

- Erstickungsgefühl beim Räuspern (Arg-n., Nux-v.).
- Ständiger Drang, sich zu räuspern.

MAGEN

- Nach dem Stillen oder Essen hustet und würgt das Kind (ein nützlicher Hinweis auf eine Ösophago-Trachealfistel).
- Aufstoßen bei oder nach heftigem, konvulsivem Husten.
- Durstlosigkeit.
- Warme Milch verursacht Verdauungsstörungen (Aeth., Mag-m.), sauren Geschmack und Aufstoßen.
- Verlangen: Salz.

ABDOMEN

- Geblähter Bauch nach jedem Bissen oder Schluck.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufgeblähtes, tympanitisches Abdomen.
 - Leber vergrößert und empfindlich beim Abtasten.
 - Schweiß auf dem Bauch (Cic., Phos.).

REKTUM

- Verstopfung bei Kindern (Cale., Op.), besonders wenn sie nicht zu Hause sind.
- Häufiger, ergebnisloser Stuhldrang, der das Kind besorgt und verlegen macht.
- Jucken am After, besser durch Reiben des Anus.
- Untersuchungsergebnis:

HARNWEGE

- **Kann nur urinieren, wenn er allein im Raum ist** (Hep., Lyc., Nat-m.).
- Häufige Miktion nachts und am **Morgen** nach dem **Aufstehen** (Phos.).
- **Urin riecht sauer** (Calc., Sep.).
- Tendenz zur Entwicklung eines Nephrotischen Syndroms.
- Uriniert mehr, als ertrinkt (Bell., Coloc., Nux-v.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Braunes oder rotes, kaffeesatzartiges Sediment in der Windel, ein Symptom bei Alkaptonurie.
 - Blasensteine.
 - Urin: Albumin ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Unerträgliches Jucken der Geschlechtsorgane.
- Neigung, zu masturbieren.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Lichen simplex chronicus der Haut des Scrotums.
 - Tinea cruris.

ATMUNG

- Asthmatische Atmung nach **Emotionen** (Gels., Ign.) oder Aufregung.
- Untersuchungsergebnis:
 - Röchelnde, pfeifende oder keuchende Atmung.

HUSTEN

- Husten in Gesellschaft anderer, beim Hören von **Musik** (Kali-c.) und beim **lauten Lesen** (Dros., Phos.).
- **Husten nur nachts** (Caust., Petr.).
- **Aufstoßen löst Husten** aus (Lob., Staph.).
- Bläulich-weißer, salziger Auswurf.
- Husten führt beim Kind zu Atemnot.
- Husten bei Auszehrung.

EXTREMITÄTEN

- **Ungeschicklichkeit** (Bov., Ipec.); **stolpert beim Gehen** (Agar., Caust., Ipec.).
- **Zittern der Extremitäten beim Gespräch.**
- Nächtliches Zucken der Extremitäten (Kali-i.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Eiskalte Hände** (Nux-m., Verat.), besonders die linke.
 - Spröde Fingernägel.
 - Zusammenziehung von Muskeln und Sehnen.
 - Wundwerden zwischen den Schenkeln.
 - Muskeldystrophie.
 - Schweiß an den Oberschenkel-Innenseiten.

SCHLAF

- Besorgte und ärgerliche Träume.
- Schläft mit gebeugten Ellbogen und Knien.
- Spricht im Schlaf.

FIEBER

- Husten erhöht das Fieber.
- Anstieg des Fiebers besonders am Abend.

ALLGEMEINES

- Diabetes insipidus.
- Ein Raum voller Menschen verschlimmert alle Beschwerden.
- Spasmen und Muskelzucken.
- Warme Milch verschlimmert; kaltes Essen und Getränke bessern.
- Schwaches, quengeliges und geistig unterentwickeltes, dünnes und abgemagertes Kind; es sieht aus wie ein kleiner, ausgetrockneter alter Mann.

AMMONIUM BROMATUM

(Ammoniumbromid - Am-br.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Nervös und befangen; fehlendes Selbstvertrauen und Abneigung gegen die Anwesenheit von Fremden.
- ▶ **Akute Kehlkopfentzündung oder Keuchhusten.** Beim Husten Gefühl zu ersticken und deshalb extreme Angst, sobald die Hustenanfälle losgehen.
- ▶ Tiefer, lockerer, kurzer und plötzlicher Husten, schlechter morgens, beim Aufstehen und beim Liegen im Bett. Schlimmer durch jegliche Anstrengung der Stimme. Verschlimmerung der meisten Husten- und Kehlkopfsymptome zwischen 2-4 Uhr.
- ▶ **Epilepsie.**
- ▶ Nägelkauen wegen einer permanenten Hautreizung unter den Fingernägeln.

AMPHISBAENA VERMICULARIS

(Doppelschleiche - Amph.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Akne, wenn gleichzeitig Obstipation, Leisten- oder Nabelbruch vorhanden sind.
- ▶ Neigung zu wiederkehrender Tonsillitis, bei der das Schlucken des Speichels unmöglich ist.
- ▶ Fest zusammengebissene Zähne wegen anhaltender Anspannung.

HERKUNFT

- Dr. Benoit Mure aus Brasilien hat die Doppelschleiche (Gattung: Echsen), deren Schwanz einem zweiten Kopf täuschend ähnlich sieht, in die Homöopathie eingeführt. Potenziert werden die Kiefer der Schlange.

ANANTHERUM MURICATUM

(Kuskusgras - Anan.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Egoistisch und hochmütig. Die Kinder wollen mit ihrer grotesken Art sich zu kleiden Eindruck schinden und ziehen so die Aufmerksamkeit auf sich.
- ▶ Sehr ausgeprägtes Verlangen zu reisen.
- ▶ Exzessive **Masturbation**, Masturbation aus extremer Eifersucht.
- ▶ Geschwächte Lebenskraft durch exzessive Masturbation, was dann zu Epilepsie, Herpes, Pickeln, Nesselsucht, Ekzemen und wiederkehrenden Abszessen an den Extremitäten führen kann.
- ▶ Anhaltende Neigung, die Zähne zusammen zu beißen.
- ▶ Ausgeprägter Appetit (Bulimie) aufgrund von Eifersucht.
- ▶ Unstillbarer Durst auf aromatische Getränke, kaltes Wasser und saure Getränke.
- ▶ Neigung zu Nagelpilzinfektionen, was zu deformierten Nägeln führt.
- ▶ Offensiver Fußschweiß.

HERKUNFT

- Familie der Gräser (Gramineae). Stammt von den Ostindischen Inseln.

ÄNDROCTONUS AMURREUXI HEBRAEUS

(Skorpion - Androc.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Bipolare Störungen, Borderline-Syndrom oder andere soziale Persönlichkeitsstörungen, Anpassungsstörungen und Gemütsstörungen.
- ▶ Familiäre Situationen (allein erziehende Eltern; das Kind lebt in einer häuslichen Angstsituation; jegliche Art von physischem, emotionalem oder sexuellem Missbrauch) erzeugen bei den Kindern Wut.
- ▶ Die Persönlichkeit wird sehr gewalttätig, zerstörerisch, verachtend, diktatorisch und zornig. Schon durch eine Unterbrechung kann sehr schnell Zorn entstehen. Im Zorn kann das Kind mit Gegenständen werfen oder auch sehr ausfällig werden.
- ▶ Die Kinder sind sehr kritisch und haben immer das Gefühl, dass die Leute, die Lehrer, die Gesellschaft oder die Eltern nur dazu da sind, sie zu quälen. Eigentlich leben sie mit der Vorstellung, sie wären ein Opfer.
- ▶ Diese Kinder haben wenig emotionale Beziehung zu Gleichaltrigen. Sie streiten immerzu, sind sehr impulsiv und ungeduldig von Natur aus. Wenn es ausufert, können sie manchmal extrem gewalttätig werden und ihr Gegenüber sogar körperlich verletzen.
- ▶ Sehr wichtiges Mittel bei **Morbus Asperger**. Das Kind ist sehr ruhelos, ungeschickt und kann sich besonders beim Lesen oder Schreiben schlecht konzentrieren. Im Kopf ist immer ein Zustand von Verwirrung.
- ▶ Freunde sind für diese Kinder sehr wichtig, da sie von ihnen abhängig sind. Sehr oft tun sie etwas nur aus Angst davor, die Freunde zu verlieren. Trotzdem ist ihre soziale Kommunikation sehr dürftig. Oftmals endet alles im Streit und deshalb sind sie nicht sehr beliebt bei ihren Freunden.
- ▶ Diese Kinder sind sehr sportbegeistert. Sie fahren sehr gerne mit dem Auto. Schon im jugendlichen Alter von 12 Jahren wollen sie Auto fahren und genießen den Nervenkitzel beim Autorennen.
- ▶ Tanzen ist etwas, was sie sehr gut können.
- ▶ **Migräne**, besonders wenn der Kopf beim Schlafen und nach Aufenthalt in der Sonne weh tut. Besser in frischer Luft.
- ▶ Stottern beim Sprechen.
- ▶ Kleine Kindern, die Eier nicht verdauen können. Übelkeit und Erbrechen sobald sie Eier essen.
- ▶ Verlangen nach Orangensaft, Brot und Schokolade.
- ▶ Sehr durstig.
- ▶ Frostig, friert sehr schnell, liebt aber gleichzeitig den Wind.

ANISUM STELLATUM

(Sternanis - Anis.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Trockene Lippen.
- ▶ Sehr anfällig für **Aphten auf der Zunge**.
- ▶ **Flatulenz und dadurch verursachte Kolik.** Kolik durch Amöbeninfektionen, Würmer oder enterovirale Infektionen. Schlimme krampfartige Schmerzen im Abdomen mit Flatulenz. Diese durch Blähungen verursachten Schmerzen sind periodisch. Sie kommen jeden Tag zur selben Zeit wieder.
- ▶ Verlangen nach Brot, besonders Roggenbrot.

HERKUNFT

- Dieses kleine Mittel gehört zur Familie der Sternanis-Gewächse (Schisandraceae). Es wurde 1845 von Dr. Benoit Mure geprüft.

ANTHEMIS NOBILIS

(Römische Kamille - Anth.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Allergischer vasomotorischer Schnupfen.**
- ▶ Sehr klare, wässrige und durchsichtige Absonderungen aus der Nase, meistens links mit Niesen und Tränenfluss. Schnupfen schlimmer in warmen Räumen.
- ▶ **Amöbeninfektionen oder Wurmbefall**, speziell Spulwürmer, mit heftigen Bauchkoliken mit Krämpfen. Vergrößerte und empfindliche Leber und bei Wurmbefall oder anderen Infektionen meistens mit Durchfall.
- ▶ Heftiger Juckreiz am Anus. Dunkler, breiiger, weißer, gelber und blasser Stuhl.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae/Compositae) und wurde von Dr. Berridge in die Homöopathie eingeführt. Aus den Blüten wird Tee hergestellt.

ANTIMONIUM CRUDUM

(Antimonsulfid - Ant.-c.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Abneigung gegen jede Berührung mit großer Angst** (Arn., Bell., Cham.). Dieser Zustand wird meist von der Mutter auf das Kind übertragen, wenn sie während der Schwangerschaft Enttäuschungen erlebt hat.
- ▶ Ausgeprägte Abneigung gegen das Baden (Sulph.).
- ▶ **Mürrisch, ohne Aggression** (im Gegensatz zu Cina, Cham., Cur., Stram., Tub.).
- ▶ Wut und Gereiztheit als Reaktion auf jede freundliche Geste.
- ▶ Bulimie durch Enttäuschung oder Kummer (Ign., Nat.-m.).
- ▶ Kinder sind so beschäftigt, dass sie vergessen, zur Toilette zu gehen, weil sie so vertieft sind; andererseits sind sie einfach zu faul aufzustehen.
- ▶ Die Kinder sind dumpf und haben kein Interesse am Lernen; stattdessen lesen sie lieber Bücher, Romane oder Comics.
- ▶ Die Kinder können ein Asperger-Syndrom entwickeln. Beachten Sie folgende Rubriken:
- ▶ Wut über jede kleine Zuwendung.
- ▶ Angst davor, berührt zu werden.
- ▶ Bittet um nichts.
- ▶ Abneigung gegen Liebkosungen.
- ▶ Abneigung gegen Gesellschaft.
- ▶ Abneigung gegen alles.
- ▶ Unzufrieden mit allem.
- ▶ Will nicht gestört werden.
- ▶ Furcht vor Annäherung anderer.
- ▶ Furcht, berührt zu werden.
- ▶ Reizbarkeit, weil er angeschaut wird.
- ▶ Reizbarkeit, weil er angesprochen wird.
- ▶ Reizbarkeit durch Berührung.
- ▶ Menschenfeindlich.
- ▶ Widerwärtige Stimmung.
- ▶ Schreit auf, wenn er berührt wird.
- ▶ Mürrisch.
- ▶ Plumpe und ungeschickte Kinder (Agar., Merc., Nat.-m., Apis).
- ▶ Zu Tränen geneigt, weint beim geringsten Anlass (Puls.).
- ▶ Ausgeprägte Phantasie; lebt lieber in einer illusionären Idealwelt; sehnt sich nach Dingen, die er vermisst oder die ihm weggenommen wurden.
- ▶ Durch ihre starke Phantasie übt Poesie eine große Faszination auf sie aus. Sie können spontan Gedichte schreiben (Chin.).

- ▶ Beeinträchtigt in sozialen Kontakten und in der Kommunikation.
- ▶ Äußerst mürrische Kinder; sie sagen jedem, dass er sie nicht berühren, küssen, umarmen oder stören soll; tatsächlich verabscheuen sie jeden Kontakt oder jede Zuwendung; immer in „Fass mich nicht an“-Laune.
- ▶ Reizbar, begrüßt niemanden im Haus; versteckt sich irgendwo im Haus oder schließt sich in sein Zimmer ein.
- ▶ Präpubertäre Kinder, die lieber in ihrer eigenen imaginären Welt überzogen romantischer Gefühle leben, in der sie starke Emotionen empfinden und sich romantische Szenen aus dem Kino und aus Romanen vorstellen, sich Geschichten ausdenken und diese Phantasien intensiv leben (Nat-m., Staph.).
- ▶ Feine, empfindliche Kinder; sehr leicht emotional aufgebracht, brechen in Tränen aus, wenn sie gefühlsmäßig berührt sind.
- ▶ Überempfindliche Kinder (Staph.); es ist sehr schwierig für die Eltern, sie aufzuziehen und mit ihnen zu leben.

KÖRPER

- ▶ Den Kindern fehlt die normale klare, helle, wohlklingende Stimme; ihre Stimme ist eher hart und heiser, sie klingt von Geburt an unangenehm.
- ▶ Blähungskinder, die ständig Winde ablassen (Chin., Lyc., Myric.).
- ▶ Empfindlich gegen jeden Kälteeinfluss (Getränke, Zugluft, Essen, Wetter).
- ▶ Kinder neigen zum Übergewicht und werden in der Pubertät dick (Cale.).
- ▶ Kinder mit familiärer Disposition zu Rheuma, Arthritis und Gicht (Lith-c., Med.).
- ▶ Frösteln, verträgt aber trotzdem keine Sonnen- oder Feuerwärme und hält sich nicht gern in schlecht belüfteten Räumen auf.
- ▶ Angeborene Tendenz zu Verdauungsstörungen nach Genuss von Brot (Bry., Puls.) und Gebäck (Lyc., Phos.).
- ▶ Verdauungsstörungen und Magenprobleme als Folge von Mangel an Liebe und Zuneigung.
- ▶ Rezidivierende Infekte der oberen Atemwege durch übermäßiges Baden, Schwimmen usw. (Am-c., Calc-s.).
- ▶ Starkes Verlangen nach sauren Speisen, z. B. Essiggurken und sauer Eingelegtes (Hep., Verat.).
- ▶ Hautverdickungen wie Schwielen, Hühneraugen und Ähnliches (Cale., Lyc., Sep., Sil.), besonders an Handflächen und Fußsohlen.
- ▶ Trias des Ant-c.-Gesichts: Aufgesprungene Lippen, bleiches Gesicht und rote Wangen.

DIFFERENZIERUNG VON ANT-C. UND CHAM.

Ant-c. und Cham, ähneln sich und müssen deshalb gut unterschieden werden. Die **gemeinsamen Symptome** sind:

- Wut oder Gereiztheit bei Berührung.
- Bissige Antworten.

- Abneigung zu baden.
- Baden verschlimmert.
- Kann es nicht ertragen, angeschaut zu werden.
- Duldet keinen Widerspruch.
- Verlangen nach sauren Speisen.
- Furcht vor dem Baden.
- Rotes Gesicht.
- Angst, berührt zu werden.
- Furcht vor Annäherung anderer.
- Gastrisches Fieber.
- Gereizt, wenn er angeschaut wird.
- Milch verschlimmert.
- Starrsinnige Kinder.
- Rissige Haut.
- Süßigkeiten verschlimmern.
- Weiß belegte Zunge.

Cham ist hauptsächlich bei folgenden Symptomen angezeigt:

- Kein Phantasieren oder Tagträumen.
- Beleidigend, ungeduldig (Ant-c ist fauler) und unverschämt (Ant-c ist sentimentaler).
- Verlangen nach Brot (Ant-c mag lieber saure Gurken).
- Runzelt die Stirn.
- Große Angst vor Wind.
- Das Gesicht wird rot im Zorn.

DIFFERENZIERUNG VON ANT-C. UND SULPH.

Da Ant-c. Schwefel enthält, zeigen sich viele Ähnlichkeiten zwischen den zwei Mitteln.

Die **gemeinsamen Symptome** sind:

- Nägelkauen.
- Kann es nicht ertragen, angeschaut zu werden.
- Will getragen werden.
- Unzufrieden mit allem.
- Abneigung, berührt zu werden; sehr kitzelig.
- Will nicht angesprochen werden.
- Ekstase.
- Angst vor Berührungen.
- Will nicht beobachtet werden.
- Angst in engen Räumen.
- Gesten, mit den Füßen stampfen.
- Träge, achtlos und faul.
- Leicht verletzt.
- Sentimental.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Das Kind scheint **geistesabwesend und in einem verträumten Zustand zu sein**.
- **Faule Kinder** (Graph., Sulph.), die alles verschieben und keine Aktivität wünschen.
- Entwicklungsstillstand bei Kindern (Cale., Bac., Op.).
- Nägelkauen aus Angst und emotionaler Unsicherheit (Med.).
- Die Kinder verweigern die Nahrungsaufnahme vollständig; dies ist als Zeichen des Rückzugs aufgrund eines tiefgehenden emotionalen Aufruhrs zu werten.
- Unhöfliche, verzogene Kinder, die bissig antworten, an den Haaren ziehen, treten und aus Wut Dinge werfen (Chin., Rheum., Staph.).
- Erschrickt und schreit auf beim geringsten Geräusch, besonders bei Glockenläuten (Kali-c., Nat-c., Sil.) und während des Schlafes.
- Weint über Bagatellen (Caust.).

KOPF

- **Gastrische Kopfschmerzen** nach dem Essen von Süßigkeiten, Zitrusfrüchten (Bell.), nach kalten Getränken, besonders Cola-Getränken wie Coca-Cola und Pepsi (Bry., Kali-c.) oder fettigen Speisen wie Kuchen, Fetakäse, Aufläufen (Carbo-veg., Ipec., Puls.) und nach Früchten, besonders sauren Früchten.
- Kopfschmerzen nach unterdrücktem Schnupfen (durch Verwendung von Antihistamin-Sirup, Nasentropfen oder Nasensprays) (Dulc., Nux-v.) und nach dem **Waschen des Kopfes** oder einem Bad (besonders einem kalten Bad) (Nux-m., Rhus-t., Sep.); besser durch Hinausgehen an die frische Luft (Phos.).
- Migräne mit Tendenz zu Haarausfall (Nit-ac., Sep., Sil.), Nasenbluten, Übelkeit und Erbrechen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Krustige, schorfige Hautausschläge** (Clem., Graph.).
 - Offene Fontanellen (Cale., Ipec., Sil.).

AUGEN

- Verklebte Lider.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blepharitis +.
 - Konjunktivitis +.
 - Risse in den Augenwinkeln (Lyc., Nat-m.).
 - Entzündung des Tränensacks.
 - Eingefallene Augen (Cina).

OHREN

- Untersuchungsergebnis:
 - Feuchte Hautausschläge hinter den Ohren (Graph.).

NASE

- Chronisches Schnüffeln (bei verstopfter Nase) (Lyc., Nux-v.); **Schnupfen wird durch jede Art von Wärme verschlimmert**, besonders in einem heißen, stickigen Zimmer (All-c., Puls., Sil.).

- Nasenbluten beim Putzen der Nase.
- Schmerzen in der Nasenhöhle durch ständiges Schnäuzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kälte der Nasenspitze (Apis).
 - Nasenlöcher sind wund (Mere), trocken und krustig (Kali-bi., Lac-c.).

GESICHT

- Akne durch Magenbeschwerden (Carbo-veg., Nux-v., Puls.) mit intensivem Jucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Risse in den Mundwinkeln und Lippen.
 - Impetigo (dieses Symptom wird am häufigsten beobachtet) (Crot-t., Viol-t.), charakterisiert durch gelbliche, krustige, schorfige, ekzematöse, an getrockneten Honig erinnernde Hauterscheinungen.
 - Eingefallenes Gesicht (Verat.).

MUND

- Schwierige Zahnung.
- Essen schmeckt während des Fiebers bitter (Chin.).
- Empfindliche Zähne; weint, heult und schreit während der Zahnreinigung, beim Ziehen eines Zahnes oder einer Operation (Ign., Mag-c., Staph.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthöse Geschwüre.
 - Landkarten-Zunge (Tarax.) oder dicker, milchig-weißer oder gelber Belag (Bry) auf dem hinteren Drittel der Zunge, mit sauberen Seiten.
 - Reichlicher, stinkender Speichel.
 - Schwammiges Zahnfleisch, das sich leicht von den Zähnen löst und stark blutet.

HALS

- Gefühl, ein Klumpen oder Fremdkörper stecke im Hals, durch Schlucken nicht gebessert.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schwellung und Verhärtung der oberflächlichen und tiefen Halsdrüsen.
 - Dicke, gelbe, retronasale Absonderungen.

MAGEN

- **Das Kind spürt jede emotionale Erregung** (Entsetzen, Kummer, Schmerz) **gewöhnlich im Magen** (Cale., Cham., Coloc., Nux-v., Phos.); z. B. Kolik, Verstopfung, Diarrhoe, Flatulenz, Verdauungsstörung und Übelkeit.
- **Leicht entstehende und hartnäckige Übelkeit** seit der Geburt bei Kindern mit schwacher Verdauung und einer Tendenz zu Hepatitis A; der Geruch von und der Gedanke an Essen verursachen Übelkeit; Übelkeit entsteht nach dem Essen von Brot (Zinc.), Milch, Gebäck und schwerem, fettigem Essen (Ipec., Puls.) und durch furchteinflößende Erfahrungen wie z. B. einen Horrorfilm anzuschauen (Bry., Nux-v.).
- Verdauungsstörung nach Milch (Chin., Mag-m.) und sauren Speisen (Nux-v.) und bei jenen Kindern, die zum Überessen neigen (Iod.).

- Magenschmerzen mit Übelkeit und einem aufgeblähten Abdomen, durch den Verzehr von Brot (Bry., Caust.), Milch (Ambr.), schwerem Essen und sauren Speisen (Asaf.) oder Zitrusfrüchten.
- Schmerzhafte Aufblähung des Epigastriums nach Aufregung (Cham., Coloc.); schlechter durch Druck und Berührung.
- Heißhunger am Morgen.
- Langsame, gestörte Verdauung mit Abscheu vor dem Essen bei warmem Wetter.
- Durstlos während des Fiebers, aber durstig nach dem Schwitzen und während des Frost-Stadiums.
- Erbrechen: Tritt sofort nach dem Stillen auf (Nat-c., Sil.) oder nach dem Trinken von Milch; Erbrechen direkt nach den Mahlzeiten (Mittag- und Abendessen) (Ars., Ferr., Kali-bi.); bei Kindern während der Zahnung und während der Masern; das Erbrochene hat die Konsistenz von geronnener Milch (Aeth., Cale., Sil.).
- Verschlimmerung: Brot, Butter, Kirschen, kalte Getränke, mehlig und fettige Speisen, Muttermilch, Gebäck, Essiggurken, Schweinefleisch, schweres Essen, saure Speisen und Früchte, Erdbeeren, Süßigkeiten und Essig.
- Abneigung: Brot, Buttermilch, Gurken, Eier, Früchte und saure Speisen.
- Verlangen: Zitrusfrüchte, kalte Getränke, Gurken, Gebratenes, Unverdauliches, mariniertes Fleisch, Essiggurken, rohes Gemüse, saure Speisen, Gewürze, Süßigkeiten und Essig.
- Untersuchungsergebnis:
 - Gastroskopie: Gastritis, Helicobacter-pylori-Infektion.

ABDOMEN

- Furchtbar stinkende Blähungen (Arn., Carbo-veg., Sulph.).
- Lautes Poltern und Gurgeln im Bauch, mit blockierter Flatulenz.
- Bauchschmerzen mit tympanitischer Auftreibung durch Zorn (Cham., Sulph.) oder Empörung (Nux-v., Puls., Staph.) und sofort nach dem Stillen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Harte, geschwollene, druckempfindliche Leber (Chin., Lyc.).
 - Verhärtete Schwellungen der Leberdrüsen.
 - Stammfettsucht (Am-m., Cale., CheL).
 - Nabel ist empfindlich auf Berührung (Rhus-t.).

REKTUM

- **Jucken aufgrund von Wurmbefall.**
- Verstopfung nach Missbrauch von Abführmitteln (Bry., Nux-v., Op.), jeden zweiten Tag.
- Dehydratation nach Diarrhoe (Ars., Chin., Cupr., Verat.).
- Diarrhoe des Kindes nach dem Stillen (Crot-t.); durch emotionale Auslöser wie Zorn, Furcht (Gels., Sep.) oder Aufregung (Arg-n., Op.); nach der geringsten Unvorsichtigkeit beim Essen, besonders Brot, kaltes Essen (Dulc., Nat- s.), kalte Getränke (Ars., Bry.), fettes Essen (Carbo-veg., Puls.), Limonade, Schweinefleisch, saure Speisen (Aloe, Ph-ac.) und bei warmem Wetter.
- Die Diarrhoe ist verbunden mit Übelkeit und verstärktem Speichelfluss.
- Abgang von feuchtem, stinkendem Flatus nach dem Essen.

- Stuhlgang: Reichlich, kräftig, unverdaut und klumpig.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundheit des Afters.
 - Prolaps.
 - Stuhl-Untersuchung: Oxyuris vermicularis.

HARNWEGE

- Reichliche Miktion während der Nacht.
- Häufige, reichliche Miktion während des Fiebers.
- Unwillkürlicher Harnabgang beim Husten oder Niesen.
- Rotes, grobkörniges Sediment im Urin.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Urin: wolkiges Aussehen, Albumin +, Epithelzylinder ++, Leukozyten +++, Erythrozyten ++.
 - Ultraschallbild: Verkalkung der Nebennieren: Morbus Addison.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Jucken an der Penisspitze und den Seiten des Skrotums.
- Untersuchungsergebnis:
 - Ekzem am Skrotum.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Reiche, scharfe, dünnflüssige Leukorrhoe, die die Beine herunterläuft.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Das Kind leidet aufgrund verstärkter Sekretionen im Nasenrachenraum unter Erstickungsgefühlen.
- Schmerzlose Heiserkeit, nach Überhitzung in einem warmen Zimmer oder an der Sonne oder nach einem kalten Bad; gebessert durch den Gebrauch der Stimme.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kehlkopfentzündung +.
 - Stridor +.

ATMUNG

- Asthmatische Atmung nach den Mahlzeiten, **durch Unterdrückung von Hautausschlägen** (besonders Warzen, Hühneraugen, Impetigo), beim Hinlegen und in einem warmen Zimmer.
- Neugeborenenasphyxie.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Seufzende Atmung.
 - Krampfartige und rasselnde Atmung.

HUSTEN

- Husten nach Windpocken oder Masern (Hyos., Puls., Sulph.).
- Husten scheint aus dem Abdomen zu kommen (Bry, Sep.).
- Anfallsweise auftretender, trockener Reizhusten, besonders am frühen Morgen (5 Uhr), bei dem der stärkste Anfall zuerst kommt, gefolgt von schwächeren

- Kurzer, trockener, kitzelnder, krampfhafter Husten durch Wut, kalte Getränke, Fieber, Nasswerden im Regen, aus der frischen Luft in ein warmes Zimmer kommen und beim Verzehr von Milch oder saurem Essen (besonders Essig); gebessert an der frischen Luft.

BRUST

- Schmerz in der Brust beim Husten.

EXTREMITÄTEN

- Akute rheumatische Schmerzen, schlechter nach einem Bad, saurem Essen oder beim Waschen mit kaltem Wasser; besser durch warme Anwendungen.
- Schwäche in den Händen beim Schreiben.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Schwielen** unter den Nägeln (Graph), auf den Zehen und Fußsohlen.
 - **Nägel:** spröde, deformiert, abgeblättert, fallen ab, **verhornt, gespalten, dick**; wachsen nur langsam.
 - Kalter Schweiß der Hände.
 - Rissige Haut an den Fingerspitzen, besonders um die Nägel herum.
 - Eiskalte Füße während der Nacht (Elaps, Phos).
 - Schmerzhafte empfindlich, verhornt, mit entzündeten Hühneraugen oder Warzen auf den Fußsohlen.
 - Dicke Haut der Fußsohlen (Sep).

SCHLAF

- Häufiges nächtliches Erwachen aufgrund von Hunger (Ign., Lyc., Ph-ac.).
- Zähneknirschen im Schlaf.
- Schläfrigkeit bei Fieber, heißem Wetter und nach dem Essen.
- Schläft auf dem Rücken (Bry., Puls.).

FIEBER

- Beschwerden durch übermäßigen Konsum von gekühlten, mit Kohlensäure versetzten Getränken (Hep) oder **beim Schwimmen in kaltem Wasser während der Sommermonate**, durch Sonnenhitze.
- Frost:
 - Schüttelfrost, besonders am Mittag, mit **Durstlosigkeit** (Apis, Chin., Puls.), galligem Erbrechen, Zähneknirschen, eiskalten Füßen, Schweiß und Schläfrigkeit.
 - Die Kälte ist so ausgeprägt und tiefreichend, dass sogar das Zudecken des Kindes oder das Heizen des Raumes nicht bessert.

- Starkes Verlangen nach sauren Speisen, Essiggurken und saurem Essen während der Fieberhitze.
- Schlechter nachts.
- Schweiß:
 - Schweiß tritt fast gleichzeitig mit der Hitzeperiode auf oder auf die Hitzeperiode folgt kalter Schweiß (der nachts reichlich ist, mit einem widerwärtigen Gestank) und Durst.
- Ant-c. ist immer in jenen Fieberfällen nützlich, in denen Puls, und Ipec. versagt haben, obwohl sie angezeigt waren.
- Es ist auch bei gastrischen und mit Hautausschlägen verbundenen (eruptiven) Fieberzuständen (Masern, Windpocken) ein nützliches Arzneimittel.
- Verschlechterung: Aufenthalt in einem warmen Zimmer oder Sitzen an einem warmen Ofen.
- Verbesserung: frische Luft.

HAUT

- Neurodermitis in Verbindung mit Magenbeschwerden, mit dicken, honigartigen Absonderungen, harte, hornige Schuppen bildend.
- Knötchenartige Urtikaria mit intensivem Jucken während der Nacht, wenn das Bett warm wird; muss sich kratzen, bis die Haut wund ist.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Windpocken.
 - Sommersprossen.
 - Harte, hornige Warzen.
 - Impetigo.
 - Masern.
 - Krätze.
 - Dicke, harte Haut (Rhus-t., Sep.).

ALLGEMEINES

- Beschwerden durch Masturbation und unterdrückte Hautausschläge (Windpocken, Masern, Krätze usw.).
- Abneigung gegen das Baden, welches die Beschwerden verschlimmert (sowohl kalte als auch warme Bäder).
- Verlangen, an der frischen Luft zu sein, weil das die Beschwerden bessert (Alum., Nat-s.).
- Absonderungen der Schleimhäute sind scharf, klebrig, zäh, gelb.
- Die Haut an den Körperöffnungen ist trocken und rissig.
- Schwäche durch Schweiß (Arn., Samb.).

- Kurzer, trockener, kitzelnder, krampfhafter Husten durch Wut, kalte Getränke, Fieber, Nasswerden im Regen, aus der frischen Luft in ein warmes Zimmer kommen und beim Verzehr von Milch oder saurem Essen (besonders Essig); gebessert an der frischen Luft.

BRUST

- Schmerz in der Brust beim Husten.

EXTREMITÄTEN

- Akute rheumatische Schmerzen, schlechter nach einem Bad, saurem Essen oder beim Waschen mit kaltem Wasser; besser durch warme Anwendungen.
- Schwäche in den Händen beim Schreiben.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Schwielen** unter den Nägeln (Graph), auf den Zehen und Fußsohlen.
 - **Nägel**: spröde, deformiert, abgeblättert, fallen ab, **verhornt, gespalten, dick**; wachsen nur langsam.
 - Kalter Schweiß der Hände.
 - Rissige Haut an den Fingerspitzen, besonders um die Nägel herum.
 - Eiskalte Füße während der Nacht (Elaps, Phos).
 - Schmerzhaft empfindlich, verhornt, mit entzündeten Hühneraugen oder Warzen auf den Fußsohlen.
 - Dicke Haut der Fußsohlen (Sep).

SCHLAF

- Häufiges nächtliches Erwachen aufgrund von Hunger (Ign., Lyc., Ph-ac.).
- Zähneknirschen im Schlaf.
- Schläfrigkeit bei Fieber, heißem Wetter und nach dem Essen.
- Schläft auf dem Rücken (Bry., Puls.).

FIEBER

- Beschwerden durch übermäßigen Konsum von gekühlten, mit Kohlensäure versetzten Getränken (Hep) oder **beim Schwimmen in kaltem Wasser während der Sommermonate**, durch Sonnenhitze.
- Frost:
 - Schüttelfrost, besonders am Mittag, mit **Durstlosigkeit** (Apis, Chin., Puls.), galligem Erbrechen, Zähneknirschen, eiskalten Füßen, Schweiß und Schläfrigkeit.
 - Die Kälte ist so ausgeprägt und tiefreichend, dass sogar das Zudecken des Kindes oder das Heizen des Raumes nicht bessert.
- Fieberhitze:
 - Während der Fieberhitze: Trockener Husten, Bauchschmerzen mit Appetitverlust, Übelkeit und Erbrechen, Diarrhoe, **Abgang von lautem, stinkendem Flatus**, Dysurie mit reichlichem, häufigem Urinieren, **durstlos**, milchig-weiß belegte Zunge, weinerlich und schläfrig.

- Starkes Verlangen nach sauren Speisen, Essiggurken und saurem Essen während der Fieberhitze.
- Schlechter nachts.
- Schweiß:
 - Schweiß tritt fast gleichzeitig mit der Hitzeperiode auf oder auf die Hitzeperiode folgt kalter Schweiß (der nachts reichlich ist, mit einem widerwärtigen Gestank) und Durst.
- Ant-c. ist immer in jenen Fieberfällen nützlich, in denen Puls, und Ipec. versagt haben, obwohl sie angezeigt waren.
- Es ist auch bei gastrischen und mit Hautausschlägen verbundenen (eruptiven) Fieberzuständen (Masern, Windpocken) ein nützliches Arzneimittel.
- Verschlechterung: Aufenthalt in einem warmen Zimmer oder Sitzen an einem warmen Ofen.
- Verbesserung: frische Luft.

HAUT

- Neurodermitis in Verbindung mit Magenbeschwerden, mit dicken, honigartigen Absonderungen, harte, hornige Schuppen bildend.
- Knötchenartige Urtikaria mit intensivem Jucken während der Nacht, wenn das Bett warm wird; muss sich kratzen, bis die Haut wund ist.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Windpocken.
 - Sommersprossen.
 - Harte, hornige Warzen.
 - Impetigo.
 - Masern.
 - Krätze.
 - Dicke, harte Haut (Rhus-t., Sep.).

ALLGEMEINES

- Beschwerden durch Masturbation und unterdrückte Hautausschläge (Windpocken, Masern, Krätze usw.).
- Abneigung gegen das Baden, welches die Beschwerden verschlimmert (sowohl kalte als auch warme Bäder).
- Verlangen, an der frischen Luft zu sein, weil das die Beschwerden bessert (Alum., Nat-s.).
- Absonderungen der Schleimhäute sind scharf, klebrig, zäh, gelb.
- Die Haut an den Körperöffnungen ist trocken und rissig.
- Schwäche durch Schweiß (Arn., Samb.).

ANTIMONIUM TARTARICUM

(Brechweinstein, Kaliumantimonyltartrat - Ant-t.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Abneigung, berührt oder angeschaut zu werden** (Ant-c., Sanic.), mit Gereiztheit.
- ▶ Starkes **Klammern**; selbst wenn das Kind bewusstlos ist, ergreift es die Hand, den Finger oder die Kleidung des Begleiters, der Krankenschwester oder des Arztes (Kali-c., Puls., Stram.).
- ▶ Will nicht bei seinen momentanen Aktivitäten gestört werden (Bry., Nux-v.).
- ▶ Leicht zu entmutigen und immer unzufrieden (Cham., Cina).
- ▶ Sehr unsichere Kinder, die Gesellschaft brauchen (Bism., Puls., Sil.).
- ▶ Erschrocken über Bagatellen, das Kind fürchtet sich davor, allein gelassen zu werden.
- ▶ Große Furcht vor der medizinischen Untersuchung (Stram.) aus seiner starken Angst vor Berührung.
- ▶ Wenn das Kind irritiert wird, kann es Asthma bekommen; es neigt zu häufigen Bronchopneumonien und Bronchitis.

KÖRPER

- ▶ **Unwiderstehliche Neigung zu schlafen** (Nux-m., Op.).
- ▶ **Durstlosigkeit** bei vielen Beschwerden oder trinkt wenig und oft (Chin., Ipec., Sep.).
- ▶ Trias: Schläfrigkeit, Schweiß und Schwäche.
- ▶ Ekel vor Essen, Milch und allen möglichen Nahrungsmitteln (Kali-m.).
- ▶ Sehr erleichtert durch Aufstoßen (Carbo-veg., Lyc.).
- ▶ Häufiges Gähnen begleitet die meisten Beschwerden (Lyc.).
- ▶ Lungen- und Herzdekompensation mit Atemnot und Zyanose bis zum Schockzustand (Ant-ar.).
- ▶ Pulsierende Blutgefäße (Bell., Glon.).
- ▶ Puls: langsam, kaum wahrnehmbar (Camph.), zeitweilig aussetzend oder Tachykardie.
- ▶ Körperlich empfindlich gegen jede Berührung (Kali-c., Med.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Beschwerden aufgrund von Wut bei Säuglingen** (Cham.).
- **Antwortet korrekt, wenn er befragt wird, aber der Stupor kehrt nach dem Antworten schnell zurück** (Arn.).

- **Nägelkauen** (Kali-br.).
- Aphasie: Kann nicht sprechen, wenn er nicht atmen kann.
- Das Kind klammert sich die ganze Zeit an der Mutter oder seinem Begleiter fest, besonders wenn es krank ist.
- Leicht durch Kleinigkeiten zu erschrecken.
- Furcht vor Erstickung, aufgrund nächtlicher Atemnot.
- Faul und schläfrig während des Tages.
- Murmeln im Delirium während des Fiebers (Bell., Hyos., Op., Stram.).
- Starrsinnige Kinder mit der Tendenz, immer zu widersprechen und das Gegenteil von dem zu tun, worum sie gebeten wurden (Tub.).
- Quengelge, weinerliche und stöhnende Kinder.
- Ruhelose, heulende Babys, die nur beruhigt werden können, wenn sie die ganze Zeit getragen werden (Ars., Cina., Puls.), besonders in aufrechter Position (das wäre mit ihrer Atemnot zu erklären).
- Stampft vor Wut mit den Füßen (Stram.).
- Stupor oder Bewusstlosigkeit bei meningeealer Beteiligung.
- Weint oder kreischt vor Wut, wenn er angeschaut oder berührt wird oder wenn sich jemand nähert; er will allein gelassen und nicht angesprochen werden.
- Gereiztes Wimmern Neugeborener beim Erwachen am Morgen (Kali-c., Lyc., Tub.).

KOPF

- Kopfweg, begleitet von Übelkeit und Erbrechen; besser durch kalte Anwendungen und durch aufrechtes Sitzen im Bett (Cic., Gels.).
- Schwerer Kopf, kann ihn nicht aufrecht halten; er fällt immer wieder nach hinten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Furunkel (Narc-ps.).
 - Kalter Schweiß auf der Stirn, besonders bei Husten oder Fieber.
 - Krustige, schuppige, ekzematöse Ausschläge auf der Kopfhaut.
 - Milchschorf.
 - Plica polonica (Borx., Lyc., Tub.).
 - Schütteln oder Zittern des Kopfes während eines Hustenanfalls.

AUGEN

- **Das Kind neigt dazu, seine Augen immer geschlossen zu halten.**
- Bindehautentzündung, entstanden aus katarrhalischen Infekten der oberen Atemwege oder während einer Lungenentzündung.
- Photophobie.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bindehaut rot und blutunterlaufen.
 - Dunkle Ringe um die Augen.
 - Stumpfer Blick.
 - Halb geöffnete Augen.
 - Augen sind nach oben gerichtet.
 - Kurzsichtigkeit.
 - Herabhängen des Oberlids.
 - Enge Pupillen (Miosis).
 - Starrende Augen.

- Gerstenkörner.
- Eingesunkene Augen.

NASE

- Fließschnupfen mit Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns.
- Niesen bei Fließschnupfen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Nasenflügelatmung**, besonders bei Neugeborenen mit Lungenentzündung (Lyc., Phos., Sulph.).
 - Hellrotes Nasenbluten bei Schnupfen.
 - Eingedrückte Nase (eingezogen und eingesunken).
 - Rußfarbene Nasenlöcher.
 - Eingesunkene Nase.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalter Schweiß auf dem Gesicht** (Verat.).
 - **Auffällige Nasolabialfalte.**
 - Ständiges Zucken des Gesichtes und Unterkiefers (wird oft bei Kollaps beobachtet).
 - Zyanotisches Gesicht mit umschriebener bläulich-roter Verfärbung und bläulichen Lippen.
 - Ödematöse Schwellung des Gesichtes mit trockenen, aufgesprungenen und verschrumpelten Lippen, deren Haut sich leicht abpellt.
 - Hippokratisches, blasses und eingefallenes Gesicht, mit krankem und leidendem Ausdruck.
 - Zittern der Unterlippe.
 - Runzliges Gesicht.

MUND

- Schwierige Zahnung.
- Geschmacksverlust beim Essen, bei Schnupfen.
- Neigung, mit den Zähnen zu klappern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Trockene, rissige, ausgedörrte Zunge mit einer bräunlich-roten oder weißlichen Verfärbung in der Mitte und roten, aufgerichteten Papillen (Erdbeerzunge): Die **Spitze und die Seiten sind sauber, feucht und rot.**
 - Landkartenzunge mit Zahnabdrücken.
 - Reichlicher, klebriger und dicker Speichelfluss.
 - Schwammiges, gerötetes Zahnfleisch.
 - Soor.
 - Oberlippe hochgezogen.
 - Verstärkte Faltenbildung am Gaumen.

HALS

- Das Kind neigt zu Erstickungszuständen.
- Mandelentzündung mit erschwerten und schmerzhaftem Schlucken.

- Untersuchungsergebnis:
 - Halsdrüsen tastbar und berührungsunempfindlich.

MAGEN

- **Entweder völlig durstlos oder er trinkt wenig und oft.**
- **Heftiger Schluckauf beim Neugeborenen.**
- Sodbrennen und Aufstoßen **nach Milch** in jeder Form.
- Das Kind erbricht zuerst Schleim, dann aber kommt es aufgrund der starken Anstrengung zu galligem Erbrechen.
- Faulig riechendes Aufstoßen nach dem Trinken von Milch, nachts und nach dem Essen.
- Es ist eine Folter für das Kind, sich zu erbrechen, ebenso wie das Würgen und die Übelkeit unerträglich sind.
- Übelkeit mit großem Abscheu vor dem Essen.
- Heißhunger nach einem Spaziergang im Freien.
- Der Gedanke an Essen verstärkt die Atemnot, die Übelkeit, den Abscheu vor dem Essen und das Leiden allgemein.
- Erbrechen: Erbricht alles, was in den Magen gelangt; dabei zittern die Extremitäten; gefolgt von Müdigkeit, Erschöpfung und Schläfrigkeit; dies kann in eine Schocksituation führen, mit eiskalten Händen und Füßen (Verat.); das Erbrochene ist schaumig, grün und wässrig ODER klebrig, schleimig, zäh und dick, mit weißem Schleim, der in großen Mengen ausgeschieden wird.
- Verschlimmerung: Äpfel, Brot, Butter, mehlhaltiges Essen, Fett, saure Speisen, Erdbeeren und Essig.
- Verbesserung: Kalte Getränke und kalte Speisen.
- Abneigung: Äpfel, Gurken, Fett, Muttermilch, saure Speisen und Essig.
- Verlangen: **Äpfel**, Buttermilch, kalte Getränke, **Gurken** (Phos., Verat.), Früchte (saure und saftige), saftige Dinge, Essiggurken, **erfrischende Dinge** und saures Essen.

ABDOMEN

- **Krampfartige, zwickende Schmerzen in der Nabelgegend aufgrund von Flatulenz.**
- Kolik bei Stillkindern, mit intensiver Ruhelosigkeit.
- Auftreibung des Abdomens nach jeglichem Essen oder Trinken; gebessert durch Abgang von Flatus.
- Gastroenteritis (Cholera, E. coli, Rotavirus, Shigella), charakterisiert durch:
 - Kalter Schweiß auf der Stirn.
 - Tiefe, azidotische Atmung.
 - Eingezogene Fontanellen.
 - Trockener Mund.
 - Schneller, flacher Puls.
 - Kahnbauch (kahnförmige Einziehung des Bauches z. B. bei Meningitis tuberculosa, Cholera oder Bleivergiftung, Anm. d. Ü.).
 - Eingefallene Augen.
 - Verstärkte Darmgeräusche.

- Poltern im Abdomen mit schneidenden, zwickenden Schmerzen, gefolgt von Durchfall.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Tympanitische Auftreibung des Abdomens.**
 - Aszites.
 - Vergrößerte Leber.

REKTUM

- **Rasche Dehydratation durch reichliche, wässrige Stühle, verbunden mit eiskalten Händen und Füßen.**
- Diarrhoe: bräunlich-gelb, stinkend und reichlich; mit Übelkeit, Erbrechen und intensiver Ruhelosigkeit; verschlechtert durch das Essen von Früchten, kalten Speisen und Getränken im Sommer; Dehydratation (Grad 2) bei niedrigem Kalium-Spiegel.
- Harte Stühle, die sich mit weichen abwechseln.
- Infektiöse Diarrhoe bei mit der Flasche ernährten Babys (*E. coli*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Staphylococcus aureus*).
- Unwillkürlicher Stuhlabgang.
- Übelriechender Flatus.
- Reiswasser-Stühle bei *Cholera infantum*, mit weißlichem Belag auf der Zunge und kaltem Schweiß auf dem Gesicht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Stuhl-Kultur: *Vibrio cholerae*, *E. coli*, *Shigella*.
 - Stuhl-Untersuchung: *Entamoeba vermicularis*.

HARNWEGE

- Reichlicher, unwillkürlicher Urinabgang nachts.
- Milchiger oder dunkelroter Urin oder sehr streng riechend.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Albumin +, Epithelzellen ++, Glukose und Erythrozyten ++.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heisere oder schwache Stimme.
- Schmerz in der Kehle beim Husten, der das Kind an seinen Hals greifen lässt.
- Kitzeln in Kehle und Luftröhre, das zu häufigem Räuspern und Aushusten führt.
- Untersuchungsergebnis:
 - **Rasselnder Schleim** in Kehle und Luftröhre.

ATMUNG

- Atemnot mit Husten **nach Mitternacht** (besonders nach 3 Uhr); kann beim besten Willen nicht liegen; fühlt sich **besser, wenn ihm Luft zugefächelt wird**, wenn er Schleim aushusten kann, auf der rechten Seite liegt oder aufrecht sitzt.
- Stocken der Atmung beim Husten.
- Atemlosigkeit, die das Kind dazu veranlasst, seine Abdominal- und anderen Atemhilfsmuskeln einzusetzen.
- Gleichzeitiges Husten und Keuchen.
- Nach Luft schnappen während der Einatmung, gefolgt von langsamer, lauter, verlängerter Ausatmung.

- Stöhnende Atmung.
- Neugeborenenasphyxie mit zyanotischer Gesichtsfarbe.
- Rasseln oder nach Luft schnappen, nach Husten und beim Hinlegen; der Atem fühlt sich kalt an; Kälte der unteren Extremitäten.
- Sekrete füllen die Bronchien, aber dem Kind fehlt die Kraft, sie auszuhusten.
- Plötzliche, nächtliche Asthmaanfälle durch kaltes, nasses Wetter, unterdrückten Husten und Auswurf; gebessert, wenn der Auswurf herausgebracht werden kann.
- Untersuchungsergebnisse:
 - ZNS-bedingte Hyperventilation.
 - Keuchen oder ungleichmäßige, irreguläre Atmung während des Schlafes.
 - Pfeifende oder röchelnde Atmung.

ASTHMA

- **Starkes Rasseln, aber sehr wenig Auswurf** (Kali-s.: Übermäßiges Rasseln, aber keine Erschöpfung und Schläfrigkeit).
- Nach Luft schnappen zu Beginn jedes Husten-Anfalls.
- Durstlosigkeit bei Asthma.
- Die Stimme ist sehr schwach und unhörbar.
- Modalitäten:
 - Besserung durch **Herumgetragenwerden in aufrechter Position**; Aufsitzen und frische Luft bekommen; Aufdecken oder **lockere Kleidung um Brust und Hals**.
 - Verschlimmerung: 22 Uhr, **nach Mitternacht, 3-4 Uhr morgens** (Kali-bi., Kali-c.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalter Schweiß auf der Stirn.**
 - **Nasenflügelatmung.**
 - **Eiskalte Hände und Füße.**
 - Blutgasanalyse: Der Partialdruck von O₂ ist vermindert; der Partialdruck von CO₂ erhöht; respiratorische Azidose.
 - Blasser Wangen.
 - Gesicht: Blass und zyanotisch mit roten oder blauen Lippen.
 - Offenstehender Mund.
 - Schmale spitze Nase mit erweiterten Nasenlöchern.
 - Ausgetrocknete Zunge.
 - Puls: schnell, schwach, klein.
 - Atmung: keuchend, rasselnd, sägend, pfeifend.
 - Das Kind macht den Eindruck, als sei es vergiftet.

NEUGEBORENE NASPHYXIE

- Beschwerden durch: Eklampsie, Schwangerschaftshypertonie, Schwangerschaftsdiabetes, Frühgeburt (häufiges Problem), Lageanomalien oder Missverhältnis zwischen Größe des kindlichen Kopfes und Beckenweite, Placenta praevia, Einnahme von Pethidin ein paar Stunden vor der Geburt.
- Asphyxie aufgrund von respiratorischer Insuffizienz (RDS - respiratory distress syndrome)

- Zum Zeitpunkt der Geburt ist das Kind blass (wie bei Chin.; wenn das Kind blau ist: Laur. und Op.; wenn es rot ist: Acon.) und atemlos, selbst wenn die Nabelschnur noch pulsiert.
- Komatös oder schläfrig.
- Viel Schleim im Mund-Rachenraum und in der Luftröhre.
- Modalität: Schlechter durch kaltes Baden.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Apgar-Wert zwischen 4 und 7.
 - Apnoe +.
 - Blutgasanalyse: Der Partialdruck von O₂ ist vermindert; der Partialdruck von CO₂ erhöht; respiratorische Azidose.
 - Zyanose ++, zentral sowie peripher.
 - Gesicht: Blass oder dunkelrot mit blauen Lippen.
 - Keuchende Atmung.
 - Rasseln von Schleim in Lungen und Hals.
 - Tachykardie, gefolgt von Bradykardie.
 - Fadenförmiger Puls.

HERZ-KREISLAUF-VERSAGEN

(Schließen Sie Ars., Hydr-ac. und Laur. aus, die sehr ähnlich aussehen.)

- Absolute Durstlosigkeit.
- Die Ursache ist für gewöhnlich eine Lungenentzündung oder angeborene zyanotische Herzkrankheit mit Shuntumkehr.
- Modalitäten:
 - Verschlimmerung durch Schwüle oder heißes Wetter.
 - Kinder brauchen eine leicht kühle Raumtemperatur, aber die Luft sollte stehen und nicht zirkulieren (im Gegensatz zu Carbo-veg.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Röntgen/Thorax: Lungenödem.
 - Zyanose ++: Zentral und peripher.
 - Diffuse Rasselgeräusche an der Lungenbasis.
 - EKG: Herzarrhythmien.
 - Echokardiographie: Niedrige Auswurfleistung der Herzkammern.
 - Beinödeme.
 - Elektrolyte: Niedrige Kalzium-, hohe Kaliumwerte.
 - Nasenflügelatmung.
 - Offenstehender Mund.
 - Schmale, spitze Nase mit erweiterten Nasenlöchern.
 - Oberflächliche Atmung.
 - Das Kind macht den Eindruck, als sei es vergiftet.
 - Dicker, weißer Belag auf der Zunge, der eingetrocknet und trocken ist.

LUNGENENTZÜNDUNG

- Ständiges Stöhnen.
- Besonders angezeigt in den späteren Stadien der Krankheit.
- Ältere Kinder können über Übelkeit klagen.
- Lungenentzündungen, die zu Herzinsuffizienz führen können.

- Rasselnder Husten mit spärlichem Auswurf.
- Schwerkranke Kinder.
- Starker Abscheu vor Essen; jedes erzwungene Füttern, sogar Stillen, führt zu Erbrechen.
- Das Kind möchte nicht gestört, angesprochen oder angeschaut werden.
- Das Kind weist jedes Bedecken - einschließlich Bettlaken und Bettdecken - auf Brust und Hals zurück.
- Durstlos trotz Trockenheit der Lippen und der Zunge.
- Modalitäten:
 - Verschlimmert in einem stickigen heißen Zimmer wegen des starken Verlangens nach frischer Luft.
 - Das Kind zieht es vor, mit Kissen abgestützt im Bett zu sitzen, da Atemnot und Husten sich im Liegen verschlimmern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Einsatz der Atemhilfsmuskulatur.
 - Hörbares Knistern.
 - Röntgen/Thorax: Rechts- oder linksseitige Lobärpneumonie oder Bronchopneumonie.
 - Leidender Gesichtsausdruck.
 - Das Gesicht ist blass und schmal.
 - Fingerspitzen und Nägel sind zyanotisch.
 - Nasenflügelatmung.
 - Unregelmäßiger Puls.
 - Trockene Lippen.
 - Offener Mund.
 - Nase: Spitz, schmal, Nasenflügelatmung.
 - Keuchende Atmung.
 - Ausgetrocknete Zunge.
 - Haut: Leichte bläuliche Verfärbung mit kaltem Schweiß.
 - Das Kind macht den Eindruck, als sei es vergiftet.
 - Dicker Belag auf der Zunge.

PULMONALE INFEKTION BEI NEUGEBORENEEN UND SÄUGLINGEN

Lungenentzündung und Bronchitis bei bronchopulmonalen Missbildungen, Mekoniumaspiration und Wilson-Mikity-Syndrom.

- Häufig beobachtete Erreger: E. coli, Enterobacter, Pseudomonas, Staphylokokken und Streptokokken der Gruppe B.
- Der **Husten klingt locker**, doch der **Säugling hustet keinen Schleim ab**. In der Folge wird das Kind schläfrig und entwickelt reichlichen Kopfschweiß. **Wenn die Schläfrigkeit zunimmt, lässt der Husten nach und es kommt zur Zyanose**. Der Puls wird schwach und nicht mehr wahrnehmbar; die Atmung wird flach.
- Das saugende Neugeborene lässt plötzlich die Brustwarze los und weint laut, als ob es außer Atem sei; es geht ihm nur dann besser, wenn es aufrecht gehalten und umhergetragen wird.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Annoe.

- Zyanose.
- Exspiratorischer Stridor.
- Feine Krepitationen (Knistergeräusche der Pleura).
- Grunzende Atmung.
- Subcostale Einziehungen.
- Tachypnoe.

HUSTEN

- Asthmatischer Husten Tag und Nacht **mit Schläfrigkeit**.
- Husten durch Zorn, vor (22 - 23 Uhr) und nach Mitternacht (2-3 oder 4 Uhr), Windpocken, Schreien, während des Zahnens, durch Trinken von Milch, Hunger, im Winter und während des Redens; besser durch Aufstoßen, Auswurf, aufrechtes Sitzen, Umdrehen, um auf der rechten Körperseite zu liegen.
- Husten scheint aus dem Magen zu kommen.
- Husten mit Niesen und Gähnen.
- Essen verursacht immer Husten, der sich zum Erbrechen von Schleim und Essen steigert, mit Schweiß auf der Stirn.
- An den Hals greifen während des Hustens.
- Anfälle von kurzem, erstickendem Husten, wobei die Anfälle einander schnell folgen; muss aufrecht sitzen, wenn die nächste Hustenattacke beginnt.
- Weinen vor und während der Hustenattacke.

Vergleich von Ant-t. und Ipec. bei allergischen und infektiös bedingten Störungen der oberen und unteren Atemwege	
ANTIMONIUM TARTARICUM	IPECACUANHA
Beschwerden: • Zorn bei Kindern. • Masern. • Impfungen.	Beschwerden: • Unterdrückte Neurodermitis, durch lokal aufgebrachte Salben.
Geist: • Teilnahmslosigkeit. • Verlangen, in aufrechter Position getragen zu werden. • Quengelig, weinerlich, will nicht angeschaut oder berührt werden. • Will allein gelassen werden.	Geist: • Launisch. • Schwierig zufrieden zu stellen.
• Beschwerden bei kaltem Wetter.	• Beschwerden bei warmem, nassem Wetter.
Husten: • Extreme Übelkeit, Würgen beim Husten, was zu Erbrechen führt. • Anfallsartiger Husten, aus kurzen Attacken bestehend.	Husten: • Extreme Übelkeit, Würgen beim Husten, kann aber nicht erbrechen. • Lang anhaltende Hustenanfälle. • Erstickender, unaufhörlicher Husten, das Kind wird steif und blau oder rot.

Atmung: • Bauchatmung. • Neugeborenenasphyxie mit kaltem Atem und Zyanose im Gesicht. • Zeitweilig aussetzend, irregulär, unregelmäßig. • Laut, lang, stöhnend.	Atmung: • Langsame, verlängerte Ausatmung • Seufzend • Röchelnd
ANTIMONIUM TARTARICUM	IPECACUANHA
Modalitäten: Schlechter • 2 - 4 Uhr morgens. • Liegen auf der linken Seite. • Trinken von Milch. • Warmer Raum. Besser: • Aufstoßen und Auswurf. • Drehen, um auf der rechten Seite zu liegen. • Will gefächelt werden oder im klimatisierten Zimmer sein (im direkten Luftstrom sein).	Modalitäten: Schlechter • Abends. • Hinlegen. • Essen von Früchten. • Warmer Raum. Besser: • Nach dem Essen. • Frische Luft. • Aufrecht sitzen. • Will Türen und Fenster offen haben (möchte sogar Durchzug im Zimmer).
Begleiterscheinungen: • Kalter Atem und kalte Extremitäten. • Zucken des Gesichts. • Nasenflügelatmung. • Durstig. • Zunge: dicker, weißer Belag.	Begleiterscheinungen: • Durstlos. • Zunge: Sauber, rot, spitz, mit Speichelfluss.

BRUST

- Akute Lungenentzündung oder Bronchitis bei Säuglingen mit trockener, brauner Zunge.
- Schmerz in der Brust beim Husten mit erschwerter Atmung.
- Lungenentzündung, die zu respiratorischer Insuffizienz führt (Camph, Laur, Op).
- Rheumatische Herzkrankheit mit Herzentzündung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zyanose.
 - Röntgen: Eingefallene Lunge (Atektase), Herzdilatation, Hepatisation der Lungen und Lungenödeme.

CHRONISCHE HERZINSUFFIZIENZ (CHF)

- Beschwerden durch: Rheumatische Herzerkrankung.
- Extreme Nahrungsmittelintoleranz; Essen verursacht Husten, das in Würgen und Erbrechen endet.
- Schwäche, Atemnot schlechter in einem warmen Zimmer, besser in der frischen Luft.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue Lippen und Fingernägel.
 - Zyanose.
 - Eindrückbare Ödeme der Beine und Knöchel.
 - Rasselnde Atmung.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Schweiß in der Zervikalregion.

EXTREMITÄTEN

- Wadenkrämpfe im Schlaf und bei Kindern, die unter Diarrhoe leiden (Hypokaliämie).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Eiskalte Hände, besonders die Fingerspitzen.
 - Kalter Schweiß in den Handflächen.
 - Zyanose mit bläulicher Verfärbung der Hände.
 - Daumen sind nach innen gezogen.

SCHLAF

- Schläfrigkeit und tiefe Erschöpfung bei den meisten Beschwerden (z. B. während und nach dem Husten, beim Stuhlgang oder Erbrechen, bei Diarrhoe, Fieber, Bauchschmerzen oder Lungenentzündung).
- Während des Schlafes: Wadenkrämpfe, Zähneknirschen, unregelmäßige Atmung oder Keuchen, Stöhnen, Murmeln und Kreischen.
- Ruhelosigkeit mit Umherwerfen im Bett.
- Aufschrecken vom Schlaf wie aus Entsetzen über einen schlechten Traum oder aus dem Gefühl zu ersticken.

FIEBER

- Beschwerden durch: Feuchte Witterung, virale oder bakterielle Infektion, gewöhnlich während des Winters oder zu Beginn des Frühlings.
- Frost:
 - **Gänsehaut und eiskalte Haut.**
 - Während des Fieberfrosts: Schläfrigkeit, nach Luft schnappen, bleiches Gesicht, Durstlosigkeit, Schwäche in den Gliedmaßen.
 - Schlechter durch Bewegung, frische Luft (Ars.) und am Nachmittag (nach 15 Uhr).
- Hitze:
 - Gemütssymptome: Das Kind **klammert** sich fest an seine Begleiter, **verlangt, getragen zu werden**, weint grundlos und erlaubt es dem Arzt oder der Krankenschwester nicht, in seine Nähe zu kommen.
 - Körperliche Symptome: Kalter Schweiß auf der Stirn, starkes Verlangen nach sauren Dingen und Fruchtsäften, Kopfschmerz, Murmeln im Delirium, Ruhelosigkeit, betäubender Schlaf, Tachykardie und **Durstlosigkeit trotz ausgetrockneter Zunge mit roten Rändern.**
 - Verschlimmerung durch Husten (Husten verstärkt das Fieber), Anstrengung, Bewegung und Schlaf (trockene Hitze treibt ihn aus dem Bett).

- Schweiß:
 - **Entkräftendes Schwitzen.**
 - Reichlicher, kalter, klammer oder klebriger Schweiß.

HAUT

- Beschwerden durch **unterdrückte Läsionen** bei Neurodermitis und Krätze.
- Nützlich in Fällen von Windpocken und Masern, bei denen es **nicht zum Ausschlag kommt.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Sommersprossen.
 - Gänsehaut.
 - Eiskalte, zyanotische Haut.
 - Impetigo.
 - Wundreiben.
 - Papillom.
 - Vitiligo.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Gehirnhautentzündung, unterdrückte Ekzeme.
- Während der Konvulsionen: Zyanose, Kreischen, Daumen sind nach innen gezogen, Weinen.
- Epileptiforme Konvulsionen mit Verlust des Bewusstseins.

ALLGEMEINES

- **Mattigkeit, schwacher Puls und zitternde Schwäche** bei den meisten akuten Beschwerden (während des Hustens, bei Fieber, Diarrhoe, Übelkeit, Schmerz, Erbrechen).
- Beschwerden durch: Wetterwechsel; kaltes, nasses Wetter, Masern und Impfungen.
- Anämie.
- Angiome.
- Kollaps und Zyanose bei Säuglingen.
- Verlangen, angefächelt zu werden, was die Beschwerden bessert.
- Periphere Ödeme aufgrund von Nierenerkrankungen.
- Hydrogenoide Konstitution; es kommt zu Infektionen der oberen und unteren Atemwege, wenn er kaltem, nassem Wetter ausgesetzt wird.
- Hypothermie mit Mangel an Lebenswärme, aber Wärme verschlimmert.
- Puls: Unregelmäßig, klein, weich, fadenförmig, zitterig, schwach, fast nicht wahrnehmbar.
- Nützlich in Fällen von Septikämie und anaphylaktischem Schock.
- Wenn Erkrankungen wie Masern, Windpocken, Impetigo und eitrige Hauterkrankungen mit lokalen Salben und systemischen Antibiotika behandelt werden, was später dazu führt, dass das Kind respiratorische Allergien, Epilepsie, Chorea und Dumpfheit mit Verwirrung beim Lernen entwickelt.
- Schlechter durch jegliche Form von Kälte.

ANTIPYRINUM

(Phenazon - Antip.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Ein Kohlenstoffderivat, das auch als Phenazon bekannt ist.
- ▶ Allergien, die primär die Haut oder die oberen Atemwege befallen. Sehr oft mit Belladonna oder Chloralum zu verwechseln.
- ▶ **Nesselsucht oder angioneurotische Ödeme**, die plötzlich erscheinen und verschwinden und von heftigem Jucken begleitet sind.
- ▶ **Innerliches Frieren.**
- ▶ Seltene Fälle von Sepsis mit Schocksymptomatik. Sehr niedrige Körpertemperatur, verminderte Atemfrequenz, schwacher Kreislauf und starkes Schwitzen kann begleitet sein von spärlichem Urin und generalisierter Wassereinlagerung im Körper. Rotes, aufgequollenes, ödematöses und geschwollenes Gesicht. Wenn das Bild genau so aussieht wie bei Bell, oder Apis, muss man auch an Antip. denken.
- ▶ Allergischer vasomotorischer Schnupfen oder Heuschnupfen, mit anhaltendem heftigem Niesen, 20 - 40-Mal hintereinander, begleitet von wässrigem Schleim aus der Nase und Tränenfluss. Manchmal mit Beteiligung der Nebenhöhlen.
- ▶ Schlimmer Husten mit starkem Schwitzen.

HERKUNFT

- Phenazon ist ein Arzneimittel mit analgetischen (schmerzlindernd) und antipyretischen (fiebersenkend) Eigenschaften.

APIS MELLIFICA

(Gift der Honigbiene - Apis)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Ungeschicklichkeit durch Hast**; lässt häufig Gegenstände fallen und lacht dann nervös, weil es peinlich ist.
- ▶ Sehr **aktive** Kinder, die **gerne beschäftigt** sind; das geht so weit, dass sie sogar sinnlose Tätigkeiten ausüben (Iod., Merc., Tarent.).
- ▶ Furcht vor Berührung, vor Vögeln, vor **Spritzen und Nadeln**.
- ▶ Permanentes Verlangen nach Gesellschaft; Angst vor Alleinsein.
- ▶ Wettbewerbsorientierte, ehrgeizige Kinder mit starkem Ego (Lyc.).
- ▶ Eifersüchtig und besitzergreifend; möchte seine Spielsachen nicht teilen oder will nicht, dass die Mutter von anderen Kindern angefasst wird.
- ▶ Pubertätskomplex, bei dem der Jugendliche am liebsten alle animalischen Freiheiten innerhalb der menschlichen Gesellschaft hätte.

KÖRPER

- ▶ **Ödematöser Erguss** bei Herz- oder Nierenkrankheiten. Ödeme entwickeln sich rasch und treten vorzugsweise im Oberkörper und im Gesicht auf. Wassersucht mit Oligurie bei Neugeborenen und Säuglingen.
- ▶ **Rötung, Brennen und ödematöse Schwellung** sind die Charakteristika dieses Arzneimittels.
- ▶ Große Empfindlichkeit gegen Hitze und Berührung.
- ▶ Eiseskälte der Füße mit Hitze im Gesicht und an den Händen.
- ▶ Nephrotisches Syndrom und andere immunologische Störungen, die besonders durch Unterdrückung von Neurodermitis, Schuppenflechte etc. nach Salbenbehandlung entstehen.
- ▶ Rechtsseitige Symptome.
- ▶ Symptome beginnen plötzlich und breiten sich rasch aus.
- ▶ Durstlosigkeit.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- In der Schule: Geistesabwesend, spielt den anderen Kindern Streiche, zerreißt Papier, schwache Konzentration, albernes Benehmen, unachtsam bei den Hausaufgaben, Unbeständigkeit bei den Hobbys, faul, will alles auf den nächsten Tag verschieben.
- Beißt plötzlich und unwillkürlich zu.
- Zerstörerisch; zerbricht Sachen.

- Dumpfheit bei Mädchen in der Pubertät.
- Furcht vor Injektionen, deshalb Angst vor Arztbesuchen.
- Lachen mit einem dummen Gesichtsausdruck.
- Schlägt vor Wut den Kopf gegen die Wand.
- Unternimmt viele Dinge, bringt aber nichts zu Ende.

KOPF

- Chronischer Kopfschmerz mit Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, wobei das Kind seinen Kopf halten muss.
- Stauung und Völlegefühl des Kopfes, besonders in einem warmen Zimmer.
- Die Fontanellen öffnen sich bei 6 bis 10 Monate alten, sehr ruhelosen Kindern erneut; das Kind legt ständig seine Hände an den Kopf.
- Kopfschmerzen durch Husten, Heißwerden oder in einem warmen Zimmer; besser durch Gehen an der frischen Luft.
- Tuberkuläre oder basiläre Meningitis, nach Impfungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bohrt bei Meningitis den Kopf ins Kissen und kreischt.
 - Ödeme der Kopfhaut.
 - Fontanellen sind groß und eingezogen, besonders die anteriore.
 - Der Kopf wird bei meningealer Beteiligung in den Nacken gelegt.
 - Heißer Kopf, besonders die Hinterhauptregion.
 - Kernig-Zeichen +.
 - Stößt mit dem Kopf gegen Dinge oder das Bett oder schlägt ihn gegen die Wand.
 - Großer Kopf mit großen, hervorstehenden Augen.
 - Läuse.
 - MRT: Vergrößerte Hirnventrikel; Hirnödern; verwaschene Darstellung der vorderen und hinteren Hörner der seitlichen Hirnventrikel; Gliome des Gehirns (Sammelbezeichnung für maligne Hirntumoren); Zyste im Gehirn; Hirnabszess.
 - Muffig riechender, heißer Schweiß der Kopfhaut.
 - Rollt bei Hydrozephalus den Kopf von einer Seite zur anderen.

AUGEN

- **Katarrhalische Entzündung der Augen durch Erkältung;** gebessert durch kalte Anwendungen.
- Die Augen scheinen geschlossen zu sein; Schwierigkeiten, sie zu öffnen aufgrund der **ödematösen Schwellung der Lider.**
- Nächtliche Verklebung der Augenlider.
- Brennender Tränenfluss bei Kopfschmerz oder Fieber.
- Häufiges Verlangen, die Augen zu reiben und zu drücken.
- Unwillkürlicher Tränenfluss.
- Schmerz in den Augen durch Lesen, im warmen Zimmer, durch Blick auf den Schnee oder ins Feuer.
- Photophobie, kann trotzdem seine Augen nicht bedeckt halten.
- Nützlich in Fällen von chemischen Verbrennungen der Augen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akute Augenentzündung bei Säuglingen.

- Strahlende Augen mit erweiterten Pupillen.
- Verformte und entzündete Iris.
- Nach außen gedrehte Lider (Ektropium), besonders das untere Lid.
- Ausfall der Wimpern.
- Hypertrophie der Bindehaut.
- Entzündung des Auges mit Geschwürbildung in den Augenwinkeln.
- Tränenkanalfistel.
- Lider sind geschwollen, rot, heiß und nach außen gedreht wie eine Masse roten Fleisches.
- Lähmung des rechten oberen Augenlides.
- Rote Augen voller hervortretender Blutgefäße der Bindehaut.
- Kurzsichtigkeit.
- Schielen.
- Gerstenkörner.
- Trachom.
- Geschwürbildung oder Narben auf der Hornhaut.

OHREN

- Während einer Mittelohrentzündung führt das Kind bei jedem Schrei die Hand zur Rückseite des Ohres.
- Hörschwäche bei oder nach typhoidem Fieber.
- Schmerz im Ohr beim Schlucken, bei Halsschmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Die Lymphknoten vor und hinter den Ohrmuscheln sind vergrößert und druckempfindlich.
 - Geschwollen, rot und heiß.

NASE

- Chronischer Katarrh mit Krusten und Schorfbildung in den Nasenlöchern.
- Kälte der Nasenspitze (einer Halsentzündung vorangehend).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bohrt ständig mit dem Finger in der Nase.
 - Polypen, besonders im linken Nasenloch.
 - Angeschwollene, rote, heiße Nase.

MUND

- **Akute Zungenentzündung** mit plötzlicher, schneller und beunruhigend starker Schwellung der Zunge; **Angioödem**.
- Schwierige Zahnung, mit Diarrhoe.
- Geschmacksverlust.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kann die Zunge nicht problemlos herausstrecken, weil sie zittert und sich an den Zähnen verfängt.
 - Saubere Zunge bei akuter Nierenentzündung.
 - Trockene Zunge, besonders in der Mitte, mit feuchten Seiten.
 - Leicht entstehendes Bluten und Schwellung des Zahnfleisches, mit wässrigem Aussehen.
 - Fieberblasen auf den Lippen.

- Feuerrote oder hellgelbe und rissige Zunge, mit Blasen auf den Seiten.
- Schaumiger Speichel.
- Zähneknirschen.
- Verwaschene Sprache.
- Heraushängende Zunge bei Erkrankungen des Gehirns.

GESICHT

- Kinder lieben es, ihr Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Angioödem.
 - Bläuliche Verfärbung des Gesichts, besonders der Lippen, beim Husten oder aufgrund einer angeborenen Herzerkrankung.
 - Eitrige Geschwüre auf der Nasenspitze.
 - Risse in den Mundwinkeln und trockene, aufgesprungene Lippen.
 - Verformtes Gesicht.
 - Herabhängender Unterkiefer.
 - Ödematöse, glänzende Schwellung des Gesichtes, besonders um die Augen und die Lippen herum.
 - Erysipel auf Gesicht und Kopfhaut, oft rechts beginnend und sich nach links ausbreitend oder es breitet sich vom Hals zum Körper aus.
 - Ausdruck: Glücklich oder starr vor Schreck.
 - Rechtsseitige Bell.-Lähmung.

HALS

- **Kann keine enge Bedeckung des Halses ertragen.**
- **Trockenheit des Halses; hat trotzdem kein Verlangen, Wasser zu trinken.**
- Der Schmerz im Hals **bessert sich durch kalte Getränke** und wird schlechter von warmen Dingen und wenn er nicht schluckt.
- Schwierigkeiten, feste Nahrung zu schlucken.
- Schlucken ist aufgrund der Lähmung oder des Gefühls von Schwellung im Hals unmöglich.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Feuerrote Verfärbung** des Rachens, der Mandeln und des Zäpfchens, **ausgeprägter rechts**, nach außen ausstrahlend.
 - Angioödem.
 - Lähmung der Schluckmuskeln aufgrund von Beteiligung der Hirnnerven IX (Nervus glossopharyngeus), X (Nervus vagus) und XI (Nervus accessorius).
 - Eiterung der Mandeln und tiefe Geschwüre im Hals.
 - Das Zäpfchen ist verlängert und angeschwollen wie ein Wassersack.

MAGEN

- **Durstlosigkeit** bei den meisten Beschwerden, besonders während des Fiebers und in Fällen von Aszites oder Anasarka (Auch Acet-ac. ist ein nützliches Heilmittel gegen Aszites und Anasarka, aber ein Acet-ac.-Kind hat großen Durst und ein wächsernes Gesicht).
- Schaumiges Erbrechen nach jeglichem Essen.
- Würgen mit Husten oder nach Erbrechen.

- Abneigung: Wasser.
- Verlangen: Kalte Milch, Eis und saure Speisen.

ABDOMEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Aszites.**
 - **Sich ausbreitende Geschwüre am Nabel bei Neugeborenen.**
 - Blinddarmentzündung.
 - Leistenbruch, mit einer länglichen Schwellung in der rechten Leiste.
 - Heraussickern von Blut und Feuchtigkeit aus dem Bauchnabel.
 - Bauchfellentzündung, bei der die geringste Berührung unerträglich ist.
 - Einziehung des Abdomens.
 - Schwellung der Leistendrüsen, besonders auf der rechten Seite.
 - Große Berührungsempfindlichkeit des Colon transversum und des Colon descendens.

REKTUM

- Diarrhoe mit schleimigem Stuhl, der an **Tomatenketchup** erinnert ODER stinkender, grünlicher oder gelblicher Stuhl; der Stuhlgang ist schmerzlos und mit Eiterflocken durchsetzt.
- Diarrhoe bei geschwächten Kindern und Kindern mit Hydrozephalus, schlechter am Morgen.
- Diarrhoe der Kleinkinder und Cholera infantum mit Durstlosigkeit, trockener Zunge und trockener, heißer Haut.
- Unwillkürlicher Stuhlabgang mit weit geöffnetem Anus; der Stuhlabgang kann sogar beim Urinieren nicht zurückgehalten werden.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Diarrhoe begleitet von einer weißen Verfärbung der Zunge.
 - Wundheit des Rektums nach Stuhlgang.
 - Blutung aus dem Anus.
 - Rektumprolaps.

HARNWEGE

- **Akute parenchymatöse Nierenentzündung; das Kind schreit vor und während des Urinabgangs.**
- **Urinretention bei Neugeborenen und Säuglingen.**
- Spärlicher, stinkender und **milchiger Urin** bei Kindern mit Hydrozephalus, bei Bewusstlosigkeit oder Delirium.
- Häufiger, ergebnisloser Harndrang, besonders während des Fiebers.
- Unwillkürlicher Harnabgang beim Husten.
- Nephrotisches Syndrom.
- Nächtliches Bettnässen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rotes, Kaffeesatz-ähnliches Sediment in der Windel.
 - Verengung der Harnröhre.
 - Urin: Albumin +++, granulierte Zylinder ++, Erythrozyten +.
 - Urin riecht nach Veilchen.

MÄNNLICHE UND WEIBLICHE GENITALIEN

- Frühe Neigung zu masturbieren.
- Untersuchungsergebnis:
 - Hydrozele.

KEHLKOPF

- Untersuchungsergebnis:
 - Ödeme des Kehldeckels und des Kehlkopfes.

ATEMWEGE

- **Asthmatische Atmung nach unterdrückten Hautausschlägen.**
- Kann besser an frischer Luft atmen. Will Fenster und Türen geöffnet haben oder möchte angefächelt werden; Keuchen, wenn er überhitzt ist oder sich in einem warmen Raum befindet.
- Unmöglich, sich hinzulegen, aufgrund von Husten und Atemlosigkeit.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Keuchende Atmung.
 - Rasselnde, röchelnde Atmung; mit Abgestumpftheit und Aufschreien wie von einem scharfen Schmerz.

HUSTEN

- Trockener Husten bei Fieber; schlechter durch Hinlegen; weckt ihn vom Schlaf auf.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszess in der Achselhöhle.
 - Empyem.
 - Lungenödem.
 - Empfindlichkeit des rechten vierten Zwischenrippenraums.

HERZ UND KREISLAUF

- Herzentzündung bei Nierenentzündung.
- Disposition zur Entwicklung von Herzinsuffizienz durch eine Sepsis, die von gram-negativen Erregern ausgelöst wurde.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Exzentrische Hypertrophie des Herzens.
 - Mitralklappeninsuffizienz.
 - Murmelnde Herzgeräusche.
 - Perikarditis mit Erguss.
 - Puls weich, schwach und fadenförmig.

RÜCKEN

- Zerebrospinale Meningitis.
- Der Hals ist steif und schwach.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Erysipela über den Schultern.

- Opisthotonus.
- Prickelnde Hitze oder Urtikaria auf dem Rücken.
- Empfindlichkeit des rechten dritten Halsnerven entlang der Wirbelsäule.
- Krampfhaftes Ziehen im zervikalen oder dorsalen Bereich.
- Schwellung der Halsdrüsen.

EXTREMITÄTEN

- Kinderlähmung oder Zerebralparese nach starkem emotionalem Stress, Enttäuschung oder Entsetzen, welche die Mutter während der Schwangerschaft erlebte.
- Schmerzhaftes Synovitis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Ödematöse Schwellung der Gelenke und Extremitäten, besonders der Füße und Knöchel.**
 - Abmagerung der unteren Gliedmaßen.
 - Erysipel-artige Entzündung mit rötlichen und bläulichen Streifen.
 - Die Finger werden beim Versuch, Gegenstände zu halten, spastisch abgespreizt.
 - Heiße Handflächen.
 - Eiskalte Füße mit heißem Gesicht und Händen.
 - Rote Hände und bleiche Füße.
 - Romberg-Zeichen +.
 - Zucken oder Schnellen von Gliedern auf einer Körperseite bei Lähmung der anderen Seite.
 - Panaritium.

SCHLAF

- Augenlider sind im Schlaf halb geöffnet.
- Schläfrigkeit bei Kindern während der Masern.
- Schläft mit dem Kopf ins Kissen gebohrt.
- Schnarchen bei Fieber.
- Schreckt häufig entsetzt aus dem Schlaf auf.
- Betäubender Schlaf oder absolute Schlaflosigkeit bei Fieber.

FIEBER

- Frost:
 - Fieberfrost beginnt im Bauch oder in der Brust.
 - Während des Froststadiums: Atemnot und Zähneknirschen.
 - Schlechter um 3 - 4 Uhr und durch Wärme in jeder Form; besser nur an der frischen Luft und durch Abdecken.
- Hitze:
 - Das Kind ist bei absoluter Durstlosigkeit äußerst schläfrig.
- Schweiß:
 - Das Schweiß-Stadium ist in Fällen von intermittierendem Fiebern fast gar nicht vorhanden, wenn es auftritt, dann mit einem Moschusgeruch.
 - Nützlich in Fällen von eruptiven Fiebern (wie Masern oder Scharlach), hartnäckigen Malaria-Fällen und septisch bedingten Fieberzuständen.

HAUT

- **Große Empfindlichkeit gegen Hitze und Berührung.**
- Deutliches Brennen und Jucken, das **durch kaltes Baden verbessert** wird oder durch Auflegen von Eispackungen.
- **Urtikaria bei asthmatischen Störungen** oder nach Insektenstichen; rote und weiße Flecken, die schrecklich jucken; verschlechtert durch die geringste Änderung des Wetters und nachts.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bläuliche oder rötliche Ekchymosen (fleckenförmige).
 - Ödematöse, bleiche Schwellung der Haut; sie ist so gespannt, dass es scheint, die Haut würde reißen.
 - Trockene Haut fast ohne Schweiß.
 - Ekzem, das sich auf dem Höhepunkt in Richtung einer Zellulitis verändert.
 - Lichen planus.

ALLGEMEINES

- **Allergische Kinder**, die konstitutionell zur Entwicklung von Neurodermitis und extrinsischem Asthma neigen.
- **Große Empfindlichkeit und Intoleranz gegen Wärme oder Hitze in jeder Form, sowie auf Druck oder Berührung.**
- Verschlimmerung am Nachmittag.
- Angioneurotisches Ödem.
- Abneigung gegen heiße Bäder.
- Ödem mit rosarotem Farbton und stechenden, brennenden Schmerzen oder Ödem mit weißlichem, wächsernen, durchsichtigem Aussehen, bei Durstlosigkeit und spärlichem Urin.
- Auszehrung und ausgeprägte Erschöpfung.
- Entzündung von Drüsen mit Verhärtung von Zellgewebe; der betroffene Teil lässt sich eindrücken.
- Adenitis, Lymphangitis und Periostitis.
- Eine Hälfte des Körpers zuckt, die andere ist gelähmt.
- Die Schmerzen sind brennend, wund und ziehend; sie wandern plötzlich von einem Körperteil zum anderen.
- Kind macht sich steif bei Berührung.
- Oberflächliche oder leichte Brandwunden mit großen Blasen und deutlichem Schmerz, Rötung und Schwellung (Canth. ist bei kleinen Blasen nützlich).
- Schlechter in einem warmen, geschlossenen Raum und durch Hitze in jeder Form.

APIUM GRAVEOLENS

(Sellerie - Ap-g.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Wachstumsschmerzen** von Kindern ähnlich wie bei Conch. (Perlmutter).
- ▶ Großes Verlangen nach Äpfeln.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Doldenblütler (Apiaceae/Umbelliferae).

ARANEA DIADEMA

(Kreuzspinne - Aran.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Wird auch Gartenspinne genannt.
- ▶ Malaria und Dengue-Fieber sind verbreitete tropische Krankheiten in Indien. Kinder mit Malaria, die seit dem letzten Anfall nie mehr richtig gesund sind, leiden an durch Malaria bedingter Dyskrasie (krankhafte Blutzusammensetzung).
- ▶ Wichtigste Symptome bei Dyskrasie sind: Abgeschlagenheit, Schwäche, druckempfindlicher Magen, vergrößerte Leber, permanentes Frieren und Unverträglichkeit von feuchtem Wetter.
- ▶ Wohlauf, zufrieden und fröhlich an sonnigen Tagen, aber krank sobald das Wetter feucht wird. Während der Verschlechterung Frost, als ob die Knochen aus Eis wären oder heftige Knochenschmerzen begleitet von geringfügig erhöhter Temperatur. Diese Kombination von Frost, Knochenschmerzen und Anfälligkeit bei feuchtem Wetter tritt im Allgemeinen jeden Tag zur selben Zeit, jede Woche oder in ganz bestimmten regelmäßigen Abständen auf.
- ▶ Missbrauch von Chinin bei Kindern.
- ▶ Verlangen nach Milch, die auch bessert.

ARANEA IXOBOLA

(Schwarze Kreuzspinne - Aran-ix.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Extreme Ruhelosigkeit mit dauerndem Bewegungsdrang.
- ▶ Ärgert gern andere Kinder in der Klasse oder die Geschwister zu Hause.
- ▶ **Gewitzt** und schnippisch.
- ▶ Geistesabwesende Kinder.
- ▶ Hinterlistig.
- ▶ Konzentrationsmangel beim Lernen.
- ▶ Impulsiv und neugierig.
- ▶ Sehr geräusch- und geruchsempfindlich.
- ▶ ADD (Attention Deficit Disorder) und Ruhelosigkeit bei Kindern. Der wichtigste Hinweis auf dieses Mittel ist, dass die Kinder während des Gesprächs sehr witzig und geistreich sind.
- ▶ Macht sich gerne über andere Kinder oder über Familienangehörige lustig.
- ▶ Extrovertierte Persönlichkeiten. Wollen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und beim genaueren Nachfragen wird man feststellen, dass diese Kinder zu wenig geliebt werden.
- ▶ Diktatorisch gegenüber Mitschülern und Gleichaltrigen.
- ▶ Neidisch.
- ▶ Erledigt alles hastig.
- ▶ Geistig sehr aktiv. Häufig schreckliche Träume und diese handeln oft von Gewalt.
- ▶ Unverschämt und unhöflich.

KÖRPER

- ▶ Abneigung und Verschlimmerung durch fettes und schweres Essen.
- ▶ Krämpfe, Zittern und klonische Spasmen.
- ▶ Überempfindlichkeit.
- ▶ Übergewichtige Kinder.
- ▶ Spastische Kontraktur gestreifter und glatter Muskeln.
- ▶ Tonische Krämpfe bei Epilepsie.

Weitere wichtige Symptome

KOPF

- Untersuchungsergebnisse:
 - Akne entlang des Haaransatzes auf der Stirn.
 - Schuppenflechte der Kopfhaut.

MUND

- Blutende Zahnfleischentzündung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen.
 - Aufgesprungene Lippen.
 - Klebriger, weißer Belag auf der Zunge.

NASE

- Empfindlich gegen den geringsten Geruch.

HALS

- Ständiges Kratzen im Hals mit grau-weißem Sputum.
- Toxisches Adenom der Schilddrüse, subakute Thyreoiditis mit Kropf und Hashimoto-Thyreoiditis.
- Untersuchungsergebnis:
 - Vergrößerte Schilddrüse.

MAGEN

- Abneigung gegen und Verschlimmerung durch fette und schwere Speisen. Fett kann nicht verdaut werden.
- Verlangen: Käse, süße Speisen (die gut vertragen werden) und starkes Verlangen nach **Tabak** bei Kindern.

ABDOMEN

- Dem Kind geht es besser, wenn es mit seiner Faust Druck auf den Bauch ausübt.
- Untersuchungsergebnis:
 - CT: Zystische Fibrose der Bauchspeicheldrüse (bei Mukoviszidose).

REKTUM

- Blass-gelbliche Diarrhoe mit abstoßendem Geruch.
- Die Stuhlentleerung erfolgt explosiv und hinterlässt das Gefühl, den Darm nicht ganz entleert zu haben.
- Untersuchungsergebnis:
 - Stühle mit hohem Fettgehalt: Steatorrhoe.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Chronische Luftröhrenentzündung.
- Trockenheit der Luftröhre mit starkem Durst auf kalte Getränke.

HUSTEN

- Chronischer, asthmatischer Husten.
- Beharrlicher, trockener Reizhusten.

HERZ

- Aortenklappenerkrankungen.
- Puls wird in der Halsschlagader und der Bauchorta gefühlt, besonders im Liegen.

HARNWEGE

- Polyurie.

RÜCKEN UND EXTREMITÄTEN

- Rheumatische Schmerzen in allen Gelenken, besonders am rechten Arm, an den Beinen und in den Schultern.

HAUT

- Jucken der Haut, schlechter durch Kratzen oder Druck.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufgesprungene Finger.
 - Erythem mit dem Aussehen von Flohbissen.
 - Lupus erythematodes.
 - Pityriasis rosea, charakterisiert durch Pickel mit einem Haar im Zentrum.

SCHLAF

- Schlaflosigkeit durch Ruhelosigkeit oder spätes Einschlafen mit Gedankenandrang und innerer Unruhe.

ALLGEMEINES

- Frösteln, aber besser an frischer Luft; frösteln speziell an den Füßen, die immer kalt sind.
- Das Trinken von Kaffee führt meist zu Besserung.
- Ruhelosigkeit mit ständigem Verlangen, in Bewegung zu sein.
- Unterfunktion der Nebenschilddrüsen und Tetanie.

ARBUTUS MENZIESII

(Pazifischer Erdbeerbaum - Arb-m.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Stumpfsinnige, faule, teilnahmslose Kinder.** Große Abneigung gegen Lernen, Schule und Hausarbeit.
 - ▶ Sehr niedergeschlagen und ruhig.
 - ▶ Erschöpfung schon nach einfacher geistiger Anstrengung.
 - ▶ Zu faul, um Aufgaben im Haushalt zu erledigen, wütend und gereizt, wenn die Eltern Druck ausüben.
 - ▶ Schwaches Selbstvertrauen.
 - ▶ Probleme mit Mathematik, da Schwierigkeiten beim Zählen.
 - ▶ Langsam, schüchtern und sehr unordentlich.
 - ▶ Das Einzige, was sie gerne machen, ist ans Meer gehen und dort baden. Das tut ihnen richtig gut und macht sie fröhlich und glücklich.
-
- ▶ Ausgesprochene Abneigung gegen Fleisch und Gemüse.

HERKUNFT

- Dieser immergrüne Baum von der Westküste Nordamerikas kommt aus der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae) und wurde von Steven Olsen aus Nordamerika in die Homöopathie eingeführt.

ARGEMONE MEXICANA

(Stachelmohn - Arge.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Bei Farrington eines der wichtigsten Mittel bei **Wurmbefall**.
- ▶ Wie die meisten Mohngewächse sehr hilfreich bei **kolikartigen Krämpfen und Spasmen des Darms**.
- ▶ Verminderter Appetit.
- ▶ Übelkeit nach dem Essen oder Trinken.
- ▶ Verminderter Durst.
- ▶ Krämpfe im Abdomen speziell beim Erwachen.
- ▶ Jucken im Rektum.
- ▶ Flatulenz bei Durchfall.
- ▶ Brennende Schmerzen im Rektum.
- ▶ Schlammiger, unverdauter Stuhl enthält viel Schleim.

HERKUNFT

- Auch mexikanischer Mohn genannt, stammt aus der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae).

ARSENICUM ALBUM

(Arsenige Säure; weißes Arsenoxid - Ars.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Angst vor Allem und Jedem.** Leicht erschrocken und verängstigt; alles Ungewohnte verängstigt sie. Die Ängste entstehen meist aus lebhafter Einbildungskraft.
- ▶ **Änstlich-nervöse Kinder,** die man zu nichts drängen oder zwingen kann; sie bekommen dann Migräne, Asthma oder Muskelzucken.
- ▶ **Pedantisch ordentliche Kinder;** sie halten ihr Schreibpapier, ihre Spielsachen und Bücher immer peinlich in Ordnung.
- ▶ Angst und körperliches Unbehagen sind direkt proportional verbunden.
- ▶ Gerät nachts in Panik.
- ▶ Arsen-Kinder vergeuden niemals Zeit mit Nichtstun.
- ▶ Belastet sich furchtsam mit ahnungsvollen Ängsten.
- ▶ Diese Kinder sind ein paar Stunden lang sehr aktiv und lesen Bücher, malen, spielen und laufen umher, doch dann sind sie plötzlich völlig erschöpft, werden blass und müde und wollen auf den Schoß der Mutter.
- ▶ Anziehendes Verhalten, kann Altersgenossen, Ältere und Freunde leicht für sich einnehmen.
- ▶ Sehr penibel in Bezug auf ihr Aussehen und ihre Kleidung.
- ▶ Schon als Säugling oder Kleinkind regen sie sich auf, wenn sie Speisen oder Getränke verschütten und sich schmutzig machen. Sie wollen, dass sofort wieder alles sauber und in Ordnung gebracht wird. Oft steht ihre peinliche Not in keinem Verhältnis zur Ursache.
- ▶ Geistig ruhelos und körperlich schwach.
- ▶ Nervös-unruhige Kinder, die von der Mutter zum Vater und dann zum Kindermädchen wollen, um schließlich doch wieder in die Arme der Mutter zurückzukehren.
- ▶ Überängstlich bei Allem.
- ▶ Schnelle Bewegungen, krabbeln schnell, sehr lebhafte Kinder.
- ▶ Kleinkinder werden beim geringsten Erschrecken nervös; sie haben das Gefühl, bald krank zu werden und wollen die Mutter oder den Vater in ihrer Nähe.

KÖRPER

- ▶ **Ätzende, übelriechende** (Merc., Nit-ac.), **spärliche und dünne Sekretionen.**
- ▶ Empfindung von Brennen, besser durch heiße Getränke und heiße Anwendungen.
- ▶ Völlig erschöpft.

- ▶ Zart wirkende Kinder.
- ▶ Isst selten, aber in großen Portionen.
- ▶ Extremer Durst, trinkt aber ungern, weil der Magen es nicht annimmt; die Flüssigkeit (besonders kaltes Wasser) liegt im Magen wie ein Stein oder großer Durst auf kaltes Wasser und kalte Getränke; trinkt häufig, aber nur in kleinen Schlucken. Vereinzelt sieht man auch völlige Durstlosigkeit.
- ▶ Wird krank nach Verzehr von eisgekühlten oder gefrorenen Speisen bei heißem Wetter.
- ▶ Die meisten akuten Krankheitsbilder, die Arsen benötigen, beginnen nach Mitternacht bis um 2 Uhr oder nach dem Abendessen. Typisch sind Gastroenteritis, Asthma und kardio-respiratorische Leiden.
- ▶ Viele Symptome zeigen sich beim Kind während der Ruhe und sind besser durch Stehen oder Bewegung.
- ▶ Rasches Nachlassen der Leistungsfähigkeit vitaler Organe.
- ▶ Das Kind fühlt sich nie erschöpft oder entkräftet, solange es still liegt, aber es wird überraschend schnell schwach, sobald es sich bewegt.
- ▶ Dünne, blasse und magere Kinder.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Unruhig und ängstlich bei Kleinigkeiten, mit kaltem Schweiß auf der Stirn;** besorgt über die Gesundheit von Familienmitgliedern; Ängste, etwas Schreckliches werde mit ihnen geschehen und sie werden sterben; unruhig, böse und beleidigend bei Schmerzen.
- **Das Kind kann nicht beruhigt werden, außer wenn es getragen und schnell von einem Zimmer in ein anderes gebracht wird.** Es mag nur von nahen Familienmitgliedern gehalten oder getragen werden.
- **Voller Ängste:** Allein zu sein, Todesangst (bei Erbrechen, Fieber oder Atemnot), vor allem Schwarzen, vor Bösem und Geistern nachts, Misserfolg in Prüfungen, Spritzen, Insekten (bildet sich sogar ein, Insekten im Zimmer zu sehen), Messern oder irgendwelchen spitzen Dingen, engen Orten, irgendetwas zu unternehmen und vor Würmern.
- Beschwerden durch: Wut mit Empörung, Vorahnung, Tod von geliebten Menschen und Unstimmigkeiten zwischen seinen Freunden oder Eltern.
- Abneigung gegen dunkle oder düstere Farben.
- Beißt beim Essen in seinen Löffel oder beim Trinken in seinen Becher.
- Nägelkauen.
- Launenhaftigkeit.
- Das Kind kann es nicht ertragen, angeschaut zu werden oder wenn man sich ihm nähert; es kreischt und hat im Zorn Wutanfälle.
- Kinder mit boshafter Veranlagung, sehr undankbar und hartherzig.

- Klammern mit dem Verlangen, von anderen abhängig zu sein.
- Delirant bei Fieber und Schmerzen, mit Murmeln; Ruhelosigkeit, springt plötzlich vom Bett auf.
- Schmutzige Kinder mit einer schmutzigen Haut.
- Pflichtbewusst.
- Genau (Lyc., Sil.).
- Wird ärgerlich über Kleinigkeiten, mit Atemnot, besonders beim Aufwachen am Morgen und wenn er gezwungen wird zu essen.
- Gierig.
- Hortet und sammelt gerne viele Dinge (Stram., Sulph.), egal wie nutzlos sie sind und will sie nicht wieder hergeben.
- Möchte beschäftigt bleiben, auch wenn die Tätigkeit nutzlos ist.
- Macht gerne viele Pläne und liebt es, alles im Voraus zu programmieren (z. B. legt er immer die Schulbücher für den nächsten Tag bereit, bevor er schlafen geht, ordnet seine Kleidung im Schrank danach, was er in einer Woche anziehen wird und weiß genau, welches Teil wo im Schrank aufbewahrt wird).
- Spotten mit böswilligen Scherzen.
- Mürrische Kinder, die niemals zu lächeln oder zu lachen scheinen.
- Obsessiv-zwanghafte Störung: Prüft immer wieder Dinge und hat einen Putzfilmel; wäscht sich ständig die Hände.
- Schnelles Reden.
- Offenbart Geheimnisse im Schlaf.
- Selbstverletzung: Schlägt den Kopf gegen Dinge, verstümmelt seinen Körper (Lil-t., Lyss.) und rollt im Zorn auf dem Fußboden umher.
- Überempfindlich in Bezug auf die Meinung anderer und auf Rügen.
- Kreischen bei Schmerzen.
- Konkurrenz unter Geschwistern (Hyos.) und Eifersucht (Apis, Puls.).
- Lampenfieber (Arg-n., Gels.).
- Neigt sehr zu Prahlerei.
- Mangel an moralischem Gefühl; stiehlt.
- Lernschwäche; findet es schwierig, sich zu konzentrieren; schreibt schlecht.

KOPF

- Kopfweh mit Unverträglichkeit von Geräuschen, Licht oder Störungen jeder Art, besser durch kalte Anwendungen und schlimmer durch Zugluft eines Ventilators oder einer Klimaanlage.
- Empfindliche Kopfhaut, kann das Haar nicht bürsten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Impetigo.**
 - Trockenes Haar, das sich leicht verheddert und leicht bricht, wenn es gekämmt wird.
 - Hydrozephalus.
 - Eiskalte Stirn mit Hitze im Gesicht, bei Kopfweh.
 - Feuchte ekzematöse Hautausschläge, die das Haar zu überwuchern scheinen.
 - MRT: Gehirnblutung.
 - Unfähig, den Kopf zu halten; Kopf fällt seitwärts.

AUGEN

- Ätzende, brennende Tränen.
- Das Kind reibt den ganzen Tag sein Auge, was dazu führt, dass es rot unterläuft.
- Getrübte Sicht beim Lesen.
- Tränenfluss aus den Augen, nachts und bei Schnupfen.
- Kurzsichtigkeit.
- Photophobie im Sonnenlicht und beim Blick auf Schnee.
- Pustelartige Bindehautentzündung nach Katarrh bei Säuglingen, mit gelblichen, eitrigen Absonderungen, die eine Verklebung der Lider verursachen, besonders am Morgen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Bindehaut ist rot und voller dunkler Gefäße.**
 - Glänzende Augen.
 - Hornhauttrübung oder Geschwürbildung.
 - Trockene, rote und schuppige Lider am Ansatz der Wimpern (Blepharitis).
 - Ödematöse Schwellung unter den Lidern.
 - Exophthalmus.
 - Verklebte Lider, besonders an den äußeren Augenwinkeln.
 - Haarausfall an den Augenwimpern.
 - Ikterus.
 - Halb offene Lider während des Schlafs.
 - Zellulitis der Augenhöhlen.
 - Pendelartige Bewegung der Augäpfel von einer Seite zur anderen.
 - Gesichtsfeld: Horizontale Halbseitenblindheit.
 - Pterygium.
 - Ptosis, besonders des linken oberen Augenlides.
 - Pupillen werden ohne Wechsel der Lichtverhältnisse abwechselnd zusammengezogen und erweitert.
 - Schielen.
 - Gerstenkörner.
 - Eingefallene Augen.
 - Trachom.

OHREN

- Katarrh der Eustachischen Röhre.
- Ohrenschmerzen in kalter Luft; Ohren sind sehr empfindlich auf den geringsten Windhauch.
- Hörminderung nach einer Erkältung oder nach Typhus.
- Gefühl des Verschlusses der Ohren beim Schlucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bläschenartige oder ekzematöse Hautausschläge um die Ohren.
 - Gelbliche und sehr übelriechende Otorrhoe des rechten Ohres.

NASE

- Erkältungssyndrom: **Beginnt als akuter Schnupfen mit wässrigen, wund machenden Absonderungen, heftigen Niesanfällen und rasch absteigender Bronchitis**, die zum Asthma führen kann. Wenn das Kind heiser zu weinen

beginnt, ist das ein sicheres Anfangssymptom, dass der Schnupfen in die Brust gewandert ist (eindeutiger Beginn von Bronchitis). Einige Kinder entwickeln statt des heiseren Weinens plötzliche Atemschwierigkeiten, welche sich später in einen echten Anfall von schwerem Bronchialasthma verwandeln.

- Katarrh bei kaltem Wetter, der sich bis in die Stirnhöhlen ausbreitet.
- Heftige Anfälle von fließendem, ätzendem, wund machendem Schnupfen beim Aufwachen, im Freien, durch Kaltwerden bei Überhitzung oder bei Fieber.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Geschärfter Geruchssinn für kochende Speisen.
 - Kälte der Nasenspitze.
 - Krusten und Schorf innerhalb der Nase, die schwer zu lösen sind; die Stelle wird wund und blutet; die Krusten bilden sich schnell wieder, wenn sie gelöst wurden.
 - Nasenflügelatmung.
 - Häufiges, heftiges, anfallsweises Niesen an der frischen Luft oder bei der geringsten Wetteränderung und beim Erwachen am Morgen.
 - Heuschnupfen mit asthmatischer Atmung.
 - Verstopfte Nase und Schniefen bei Säuglingen, besonders nachts im Schlaf.
 - Ozäna.
 - Spitze, rote Nase.

GESICHT

- Das Kind zupft und pellt ständig an seinen Lippen.
- Entzündung und Eiterung der Ohrspeicheldrüse, zur Abszess-Bildung neigend, die dann zu den Hoden metastasiert.
- Zucken der Lippen beim Einschlafen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akne rosacea.
 - Kalter Schweiß auf dem Gesicht.
 - Krustige, schorfige, sich abschuppende Hautausschläge im Gesicht, besonders auf der Stirn.
 - Zyanose: Aschfarbenes Gesicht mit bläulicher Verfärbung um Mund und Augen.
 - Trockene, aufgesprungene Lippen.
 - Das Gesicht wird blass während des Kopfwehs oder beim Fieber.
 - Hippokratisches, runzliges, alt aussehendes Gesicht mit einem unruhigen Ausdruck wie leidend oder in großer Qual.
 - Impetigo.
 - Kiefer zusammengepresst oder herunterfallend.
 - Gedunsenes Gesicht.
 - Wächsernes oder fettiges Gesicht.
 - Gelbe, kränkliche Gesichtsfarbe.

MUND

- Das Kind trinkt nicht und beißt beim Füttern nur in das Glas.
- Das Kind findet es wegen der Schwere der Zunge schwierig, sich auszudrücken und zu sprechen oder seine Zunge für die Untersuchung herauszustrecken.

- Das Kind knirscht mit den Zähnen im Schlaf, während des Fieberfrosts und wenn es sehr böse ist.
- Schwierige Zahnung.
- Reichliche Blutung mit schwarzem Blut aus dem Zahnfleisch nach dem Zähneziehen.
- Dicker Speichel mit Brechreiz oder Husten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zunge: Zahnabdrücke; sauber oder Landkartenzunge mit einem dicken, weißen Belag an der Basis, **roten Seiten und roter Spitze**; hervorstehende Papillen; ein roter Streifen läuft in der Mitte der Zunge hinunter, wunde Spitze.
 - Aphthöse Geschwüre im Mund mit rissiger, eiskalter Zunge bei Kindern.
 - Mundgeruch.
 - Schnelle, vorzeitige Karies der Zähne.
 - Skorbut mit schwammigem, schnell blutendem Zahnfleisch.
 - Soor.

HALS

- Schmerz im Hals beim Schlucken nach kalten Getränken; beim Husten, mit Schwierigkeiten beim Schlucken; besser durch warme Getränke.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Gurgelnde Geräusche, die beim Trinken aus dem Hals kommen.
 - Rötliches, entzündetes Zäpfchen und Mandeln.
 - Eiterung der Mandeln.

MAGEN

- **Kein Verlangen zu essen, aber unstillbarer Durst auf Wasser.**
- Tödliche Übelkeit und Erbrechen bei Autoreisen; vom Anblick, Geruch oder Gedanken an Speisen; beim Fieber.
- Verdauungsstörung nach Ärger; nach auswärtigem Essen oder Wassertrinken; nach kalten Getränken, Fettem, Früchten, Eis, Milch, schwerem Essen, Suppe; besser durch Trinken warmer Getränke oder gesüßter Milch.
- Heftiges, erfolgloses Würgen beim Husten und nach Erbrechen.
- Erbrechen von Speisen, gefolgt von schwarzgrüner Galle, sofort nach dem Essen oder dem Trinken selbst kleinster Mengen.
- Erbrechen während Diarrhoe.
- Verschlimmerung: Äpfel, Bohnen, Butter, Kohl, kalte Speisen und Getränke, gekochtes Essen, Gurken, Fett, blähende Speisen, Früchte, Eis, Eiscreme, Melonen, Gebäck, Erbsen, Pfeffer, Essiggurken, rohe Speisen, schwere Speisen, Salat, der Anblick oder Geruch von Essen beim Kochen, saure Speisen, verdorbenes Essen (alter Käse, Fleisch, Fisch oder Würste), Erdbeeren, Süßigkeiten, Tee, Gemüse, Essig.
- Besserung: Milch, warmes oder heißes Essen.
- Abneigungen: Bohnen, Fleischbrühe, Butter, Getreideflocken, gekochte Speisen, mehlig-haltige Speisen, Fett, Mehl, Früchte, Fleisch, Melonen, Milch, Gebäck, Erbsen, Hafergrütze, Pudding, Würste, der Anblick und Geruch von Speisen, Suppe, Zucker und Süßigkeiten.
- Verlangen: Speck, Schokolade, Kaffee, kalte Speisen und Getränke, Eis,

Scharfes, Erfrischendes, Salz, saure Speisen und Früchte, Gewürze, Süßigkeiten, Gemüse, Essig, **warme oder heiße Speisen und Getränke** (warme Milch).

ABDOMEN

- Bauchschmerzen nach jeglichem Essen oder Trinken, besonders von **kalten Getränken und Eiscreme**; besser durch Zusammenkrümmen, warme Anwendungen und durch Trinken gesüßter, warmer Milch.
- Akute Gastroenteritis und Colitis.
- Kälte im Bauch mit Schmerz nach kalten Getränken.
- Poltern im Bauch mit Kolik beim Erwachen am Morgen, nach dem Essen und vor diarrhoischem Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aszites.
 - Vergrößerte und verhärtete Mesenteriallymphknoten.
 - Schlaffer Bauch mit Schwäche der Bauchmuskeln.
 - Vergrößerte Milz.
 - Hepatitis mit einer vergrößerten, verhärteten, druckempfindlichen Leber.
 - Darmverschlingung.
 - Darmverschluss.
 - Bauchfellentzündung.
 - Eingezogener Nabel.
 - Einklemmter oder entzündeter Leistenbruch bei Kindern, mit heftigem Erbrechen und extremer Empfindlichkeit des Körperteils.
 - Tabes mesenterica.
 - Druckempfindlicher, tympanitischer Bauch mit eingeklemmten Blähungen.

GASTROENTERITIS

- Beschwerden durch: **Kalte trockene Luft**; übermäßigen Genuss **wässriger oder saftiger Früchte wie Wassermelonen**, Erdbeeren, Ananas, Orangen, süße Limonen oder **gefrorener Speisen** wie Eiscreme (Obstsalat mit Eiscreme ist für Ars.-Kinder am gefährlichsten).
- **Alle Ausscheidungen sind äußerst übelriechend.**
- **Frühe Dehydratation** ist hoch charakteristisch (bei akuter Gastroenteritis sind niedrige Potenzen von Ars ziemlich unwirksam, folglich sind gewöhnlich Potenzen über 10 M empfehlenswert).
- Bei Kolik gibt das Kind die Magengrube und die Gegend um den Nabel als die druckempfindlichsten Stellen an. Der Schmerz wird durch warme Getränke oder warme Anwendungen besser.
- Verstärkter Durst auf kalte Getränke, aber diese verschlimmern die Diarrhoe, das Erbrechen und die Kolik.
- Das Erbrechen und die Diarrhoe führen gewöhnlich nach jedem Stuhlgang oder Erbrechen zu schneller Erschöpfung.

DEHYDRATATION

- Kolik vor und während des Stuhlgangs.
- Kollaps.

- Aufgesprungene Lippen.
- Trockene Lippen.
- Wundheit des Afters.
- Große Entkräftung.
- Intensiver Durst.
- Reichlicher Schweiß nach jedem Stuhlgang.
- Ruhelos.
- Stühle übelriechend, wässrig, verschiedene Farben, aber spärlich.
- Sehr kühl, möchte gut zugedeckt werden.
- Erbrechen nach Speisen oder Getränken.
- Runzliges Gesicht.

REKTUM

- Cholera infantum mit Reisswasserstühlen.
- Diarrhoe bei Kindern, die unter Typhus oder Septikämie leiden.
- Unwillkürlicher Harnabgang bei Diarrhoe.
- Jucken um den After.
- Schmerzlose Diarrhoe nach Zorn oder Angst, nach der geringsten Unvorsichtigkeit beim Essen (besonders nach Früchten, Eiscreme und Gemüse), Trinken von Wasser oder Milch, während der Zahnungsperiode, bei warmem oder nassem Wetter, durch kalte Speisen oder Getränke; besser durch lokale Wärme.
- Scheidet reichliche, ätzende, dunkle oder schwärzliche, dünne, unverdaute Stühle mit fauligem, eitrigem Geruch aus.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundwerden im Dammbereich durch ätzende Stühle.
 - Feuchtigkeit um den After.
 - Rektumprolaps.
 - Stuhl-Untersuchung: Ausscheiden von Madenwürmern, Spulwürmern und Segmenten von Bandwürmern.

HARNWEGE

- Häufiger, reichlicher, schaumiger oder sehr spärlicher Urin bei erfolgloser Anstrengung, bei Fieber.
- Unwillkürlicher, tröpfelnder Harnabgang bei Tag und Nacht.
- Unwillkürlicher Harnabgang, während des Erbrechens oder nach dem Stuhlgang.
- Geringe Durchblutung der Niere führt zu einer geringen Urinmenge, wie bei niedrigem Blutdruck, Schock und Dehydratation.
- Kein Drang zu urinieren, trotz überfüllter Blase.
- Glomerulonephritis nach Streptokokkeninfektion.
- Retention des Urins bei Neugeborenen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Urin enthält roten Sand, der sich in der Windel absetzt.
 - Urin: Albumin ++, Gallensalze und Gallenfarbstoffe ++, Epithelzellen ++, Erythrozyten ++ und Nierenzylinder ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Hydrozele bei Kindern.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heisere, unregelmäßige Stimme während eines Schnupfens; laute Stimme wechselt mit schwacher Stimme ab.
- Kehlkopf ist empfindlich auf kalte Luft und auf den Druck der Kleidung.
- Rauheit und Brennen im Kehlkopf durch Husten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Glottisödem.
 - Kehlkopfstridor.

ATMUNG

- Atemnot nach Demütigung oder Ärger, nach kalten Getränken, durch Flatulenz oder Bauchschmerzen, durch Staub und bei kaltem, nassem oder stürmischem Wetter.
- Atemnot ist schlechter nach Mitternacht (besonders nach 2 Uhr); schlechter durch Husten, Lachen, im Bett liegen oder drehen, geringste Anstrengung, Sprechen und an der frischen oder kalten Luft. Das Kind kann nur besser atmen, wenn es im Bett sitzt, entweder aufrecht oder vornüber gebeugt.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Heißer Atem.
 - Unregelmäßige, röchelnde, rasselnde oder seufzende, stöhnende Atmung.
 - Pfeifende Ausatmung.

ASTHMATISCHER SYMPTOMENKOMPLEX

- **Asthma, das mit Hauterscheinungen, besonders Ekzemen, abwechselt.**
- Die Kinder neigen dazu, einen Anfall **früh am Nachmittag**, gegen 13 bis 15 Uhr oder früh am Morgen, d. h. zu jeder Zeit **nach Mitternacht**, zu bekommen.
- Das asthmatische Atmen wird von Engegefühl und Schmerz in der Brust und von Durst begleitet.
- Die frühzeitige Untersuchung der Lunge ergibt wegen der sehr schwachen Ventilation keine Nebengeräusche, aber wenn der Anfall abklingt, füllt sich die Lunge mit Schleim.
- Extremes Entsetzen und Schreck begleiten den Anfall so lange, bis er abklingt.
- Plötzliche Anfälle spastischen Asthmas nach Aufenthalt in kaltem Wetter, durch Zorn oder Ärger, Wetterwechsel, durch Trinken kalter Getränke im Sommer, durch Heu, nach unterdrückten Hautausschlägen; muss im Bett aufrecht sitzen.

HUSTEN

- Asthmatischer Husten, der mit Hauterscheinungen abwechselt.
- Hustet schaumigen, blutdurchzogenen, eitrigen, sehr übelriechenden Schleim aus; nur am Tage.
- Das Kind fängt an, in der Anwesenheit von Fremden spastisch zu husten.

- Erstickender Husten nach Mitternacht (2-3 Uhr), der das Kind erschöpft; es muss im Bett sitzen oder sich auf die rechte Seite drehen.
- Heftiger, trockener, kitzelnder Husten am Morgen beim Aufwachen, durch Zorn, kalte Getränke, Weinen, Staub, geistige Anstrengung, beim Essen, beim Gehen an der frischen Luft, beim Umdrehen im Bett; gebessert durch Sitzen im Bett und Trinken warmer Getränke.

BRUST

- Bronchitis bei Säuglingen.
- Kongestive Herzerkrankungen mit enormer Schwäche.
- Lungenentzündung nach Typhus.
- Rheumatische Herzerkrankung mit Glomerulonephritis.
- Krämpfe in der Brust beim Husten.
- Nützlich in Fällen von verschleppter Lungenentzündung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszess in der Achselgegend.
 - Blutblasen.
 - Bläuliche Verfärbung der Haut in der Nähe des Schlüsselbeins.
 - Kälte.
 - Empyem.
 - Lungenödem.
 - Rheumatische Endokarditis oder Perikarditis.

LUNGENENTZÜNDUNG

In meiner Praxis habe ich selten Indikationen für Ars. während der anfänglichen oder akuten Phase der Lungenentzündung gesehen. Typischerweise habe ich damit eher die Komplikationen der Erkrankung behandelt, besonders Lungenentzündung mit Kollaps, wobei ich das Folgende beobachtet habe:

- In der Regel sieht das Kind **blass oder zyanotisch** aus, mit sehr **blauen Lippen**.
- Extremer Grad der **Angst**. Das Kind will sich an den Begleiter oder die Mutter klammern und will ständige Aufmerksamkeit. Es hat Angst davor, allein gelassen zu werden.
- Häufige Anfälle von erstickendem Husten, die das Kind aufsitzen lassen.
- Oft zeigt die Auskultation des kardiovaskulären Systems Unregelmäßigkeiten, z. B. Arrhythmie, Vorhofflimmern, Galopp-Rhythmus und Extrasystolen.
- Körperliche Ruhelosigkeit ist am Anfang offensichtlich, aber wenn das Kind schwächer wird, verschwindet die Ruhelosigkeit.
- Die Haut ist kalt, klamm und schweißig; mit dem Verlangen, warm zugedeckt zu werden.
- Die Herz- oder Atmungskomplikationen der Lungenentzündung kommen gewöhnlich in den frühen Morgenstunden zwischen 1 und 3 Uhr.
- Das Kind beklagt sich ständig bei den Eltern, dass es nicht atmen kann.
- Das Kind hat nicht genügend Kraft, um zu husten; der Husten ist schwach, ohne jeglichen Auswurf.
- Das Kind beginnt bei dem geringsten kalten Luftzug zu zittern.

- Der Mund ist ausgedörrt und trocken, mit ständigem Durst auf kleine Schlucke von eiskaltem Wasser (trotz der Kälte wollen sie, dass das Wasser möglichst kalt ist).
- Die Zunge ist trocken und rot.

HERZSCHWÄCHE

Charakterisiert durch:

- Unruhe oder Angst.
- Kalte Extremitäten.
- Gestaute Lungen.
- Vergrößerte, druckempfindliche Leber.
- Verstärkter Puls der V. jugularis.
- Blasse, zyanotische Lippen.
- Will gut zugedeckt sein.
- Niedriger Blutdruck.
- Körperliche Ruhelosigkeit.
- Schmale, spitze Nase.
- Schwacher Puls.
- Plötzliches Herzversagen durch subakute bakterielle Endokarditis.
- Das Kind fühlt, dass es nicht genug Luft bekommen kann und hat äußerste Angst zu ersticken.
- Das Kind fühlt sich besser beim Sitzen mit vorgebeugtem Oberkörper und auf den Knien abgestützten Händen.
- Durst auf kleine Schlucke eiskalten Wassers.

RÜCKEN

- Schmerz in der Halsregion beim Anheben des Kopfes am Morgen.
- Spinale Meningitis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kernig-Zeichen +.
 - Schweiß der Halsregion nachts im Bett.
 - Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

- **Ruhelosigkeit der Beine nachts vor dem Schlafengehen.**
- Kalter Schweiß an den Händen und Füßen.
- Ödematöse Schwellung der unteren Gliedmaßen bei Kindern, die unter Nierenentzündung leiden.
- Trockenheit von Händen und Füßen.
- Eiskalte Hände, Füße und Knie, wobei Zudecken oder lokale Wärme nicht verbessert.
- Zucken der Beine im Schlaf.
- Spontanes Ausrenken von Gelenken.
- Stolpern beim Gehen wegen der Ungeschicklichkeit der unteren Gliedmaßen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zusammenpressen von Daumen und Fingern.

- Risse an den Fersen und um die Fingernägel sowie Risse der Finger- und Zehennägel.
- Abmagerung der unteren Gliedmaßen.
- Nägel: Spröde, quer gewellt, zyanotisch mit bläulicher Verfärbung, verformt, hart, rau und verkrüppelt.
- Spastische Kontraktion der Wadenmuskeln.
- Druckempfindliche, verhornte Hühneraugen oder verhärtete Schwielen auf den Fußsohlen.
- Wunden an den Fingern, die leicht septisch werden.

SCHLAF

- Kann nicht auf der linken Seite schlafen.
- Komatöser Schlaf bei Kindern, die unter Urämie leiden.
- Während des Schlafes: Zucken von Muskeln, unwillkürliche Bewegungen der Hände zum Kopf, Ächzen, Murmeln, ruheloses Umherwerfen, Seufzen, Zucken der Lippen, Wimmern.
- Häufiges, spastisches Gähnen beim Sich-Strecken, während aller Phasen des Fiebers.
- Schlaflosigkeit oder sehr ruheloser Schlaf bei Kindern, durch Träume oder die leiseste geistige Anstrengung; durch ängstliche Unruhe nach Mitternacht (nach 3 Uhr); und während der Schweißphase bei Fieber.
- Wacht erschreckt von schrecklichen Träumen auf: schwarze Schemen oder Geister, schlammiges schwarzes Wasser oder tote Menschen.

FIEBER

- Frost:
 - Beschwerden durch: Nasswerden im Regen, Gehen an der frischen Luft.
 - Während des Frostes: Stauung des Kopfes; Verlangen nach warmen Getränken; Diarrhoe; eisige Kälte des Körpers; verstärkter Appetit mit weniger Durst (der Durst nimmt nach der Frostphase zu); ausgeprägte Zyanose mit bläulicher Verfärbung der Finger- und Zehennägel; Übelkeit und Gallenbrechen; Schmerz in den Gliedern.
 - Schlechter: Nachmittags, nach Mitternacht (1 Uhr), vor Stuhlgang, durch Trinken (kann nur warme oder heiße Getränke trinken), an der frischen Luft.
 - Besser: Nach dem Essen, durch äußerliche Wärme und in einem warmen Zimmer.
- Hitze:
 - Beschwerden durch: Gehen an der frischen Luft, während des Sommers, nach Mitternacht (besonders von 2-3 Uhr).
 - Während der Hitze: Unruhig, Delirium; Verlangen, sich aufzudecken; trockener Husten und schwierige Atmung, Schluckauf, kalter Körper, Übelkeit und Gallenbrechen, heftiges Schlagen des Herzens, ruhelos oder stuporös, Zittern, heftige Anfälle von Fließschnupfen, unlösbarer Durst auf kleine Schlucke von Wasser, Gähnen und Strecken.
 - Schlechter: durch Husten, der die Hitze vergrößert.

- Schweiß:
 - Alle Symptome werden schlechter während des Schwitzens, das nach der Hitze- oder Kältephase oder überhaupt nicht auftritt.
 - Während des Schwitzens: Reichlicher, kalter, klammer, schwächender, saurer oder übelriechender Schweiß, der die Wäsche bräunlich-gelb färbt.
 - Schlechter beim Einschlafen, besser beim Aufwachen.
- Katarrhalisches Fieber.
- Häufiges, krampfhaftes Gähnen mit Strecken während aller Stufen des Fiebers.
- Gastrisches Fieber.
- Hitze- oder Kältephase, die mit Frösten abwechselt; kein Schweiß.
- Septisches Fieber.
- Typhusfieber mit Nasenbluten; stinkender, fauler Geruch des Stuhls; braune oder schwarze, rissige, ledrig aussehende, zitternde Zunge und extreme Entkräftung.

HAUT

- **Übelriechende, fressende Absonderungen bei Hautkrankheiten, die das Haar zerstören.**
- Akute Hautentzündung.
- Beschwerden durch Unterdrückung von Krätze, Ekzemen, Allergien, Urtikaria und Kontaktdermatitis.
- Brandwunden und Verbrühungen charakterisiert durch oder auftretend mit:
 - Diarrhoe.
 - Große Ruhelosigkeit.
 - Entkräftung.
 - Starker Schmerz.
 - Tendenz der Wunde zur Gangrän.
 - Tendenz zu Septikämie, wenn Bläschen schwarz werden.
- Intensiv brennendes Jucken der Haut, besonders nachts; er kratzt die Stelle, bis sie roh wird und blutet.
- Regelmäßig wiederkehrende Eitergeschwüre.
- Ausschlag nach Essen von Fisch.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Eiskalte Haut.
 - Wundreiben.
 - Masern.
 - Flechtengrind (Ringworm).
 - Die Haut macht durch ihr wächsernes, verwelktes und verrunzeltes Aussehen einen alten Eindruck.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Fieber oder Schmerz, Septikämie, unterdrückte Hautausschläge oder Ausschläge, die nicht herauskommen, Urämie, Ärger (bei Säuglingen) oder Wurmbefall.
- Bei Konvulsionen: Angst, Husten, Schaum vor dem Mund, Opisthotonus, blasses Gesicht, Wut, Bewusstlosigkeit mit fixierten, starrenden Augen (erwacht häufig, aber nur für eine kurze Zeit), steifen Gliedern, tetanischer Starrer, tonischer

- Nach Konvulsionen: Zusammenhanglose Rede, Stupor und Erbrechen.
- Schlechter: durch Bewegung, kalte Zugluft, am Abend (nach 20 Uhr).

BLUTVERGIFTUNG

Dieser Zustand findet sich besonders bei Kindern, deren Mütter Fieber während der Wehen entwickelten oder deren Blasensprung länger andauerte:

- Aufblähung des Unterleibs.
- Anormal ruhiger Säugling.
- Apnoe.
- Kalte, marmorierte Extremitäten.
- Verringerte Aktivität und Lethargie.
- Starke Schläfrigkeit.
- Übermäßiges Schreien.
- Fieber.
- Schlaffheit.
- Hypothermie.
- Gereiztheit.
- Gelbsucht.
- Metabolische Azidose.
- Anhaltendes Erbrechen.
- Petechien.
- Schlechte Ernährung.
- Geringer Urinabgang.
- Frühreife Kinder, infolge eines unreifen Immunsystems.
- Erhöhter CRP-Wert (C-reaktives Protein).
- Atmungsbeschwerden: Apnoe oder leichte Tachypnoe.
- Sklerom (Verhärtung des subkutanen Gewebes).
- Anfälle.
- Septikämie bei Infektion mit hämolysierenden Streptokokken der Gruppe B, Staphylokokkus aureus, E. coli, Haemophilus influenzae usw.
- Temperaturinstabilität.
- Terminales Versagen verschiedener Organsysteme.
- Erbrechen.
- Leukozytenzahl ist niedriger als 5.000 oder höher als 20.000.
- Polymorphe weniger als 2.000 oder mehr als 10.000.
- Zunahme der Anzahl von Band-Formen.
- Anwesenheit toxischer Granulozyten.

MENINGITIS (HIRNHAUTENTZÜNDUNG)

- Veränderte Sinneswahrnehmung.
- Apnoe.
- Beule in der vorderen Fontanelle.
- Beteiligung der Hirnnerven.
- Äußerliche Starrheit.
- Gereiztheit.
- Nackensteife.
- Anfälle

ALLGEMEINES

- **Allergisch** auf Staub (sogar in minimalen Mengen) und auf Katzen.
- **Brennende Schmerzen** treten sehr häufig auf, **besser durch lokale Hitzeanwendung** oder warmes Zudecken.
- **Überempfindlich** auf alles; Haare kämmen, Aufregung (führt zu Albträumen), Lärm (macht nervös, unruhig), Geruch (macht krank, z. B. Übelkeit und Erbrechen) und Berührung.
- **Sehr verfroren** und **schlechter durch Kälte in jeder Form**: Kaltes Zimmer, eindringende, kalte Luft, kalte Getränke, an der Meeresküste usw.
- Beschwerden durch den Missbrauch von allopathischen Arzneimitteln oder Missbrauch von Eisen.
- Zyanose bei Säuglingen, mit Scheintod.
- Trotz der Verfrorenheit Verlangen, an der frischen Luft zu sein.
- Neigung zu Ohnmachtsanfällen mit Schläfrigkeit und Übelkeit; vor und nach dem Erbrechen oder Stuhlgang; bei Herzerkrankung (Endokarditis); durch Asthma; Flüssigkeitsverlust; bei Husten, Schmerzen oder Fieber.
- Abgezehrter Körper mit angeschwollenen Drüsen.
- Äußerliche Ödeme durch Nieren- oder Herzerkrankung, unterdrückte Hautausschläge oder Fieber; mit einer hellroten Zunge.
- Hypothermie.
- Juveniler Diabetes.
- Spätes Laufenlernen.
- Leukämie.
- Lymphangitis.
- Übler Körpergeruch.
- Schmerzhaftes, gangränöse Entzündung und Cellulitis, besser durch warme Anwendungen.
- Puls: Ungleichmäßig und fast nicht wahrnehmbar.
- Schnell abmagernde Kinder mit heißhungrigem Appetit.
- Plötzlicher Kollaps, der sich aus Dehydratation wegen reichlicher Diarrhoe und Erbrechen ergibt.
- Tendenz, sich leicht zu erkälten, bei Sinusitis.
- Tendenz zu Runzeln, z. B. Lippen, Haut und Schleimhäute.
- Tuberkulose.
- Nützlich für Beschwerden während der Rekonvaleszenz nach dem Gebrauch von Antibiotika.
- Nützlich in Fällen von Bissen giftiger Tiere oder Insekten (tollwütige Hunde, Schlangen usw.).
- Schlechter: Wetterwechsel (besonders von Wärme zu Kälte); Kälte in jeder Form (kalte Luft oder Wind, kalte Getränke, kalte Anwendungen, nasses Wetter, Winter usw.); Nasswerden oder Durchwaten von Wasser; im Liegen; gekrümmtes Sitzen.
- Besser: aufrecht oder mit hochgezogenen Knien sitzen (und Kopf und Arme auf den Knien aufgelegt); Stehen; schnelle und heftige Bewegung

Gegenüberstellung von Ars. und Acon. bei Angst, Schreck und Unruhe	
ARSENICUM	ACONITUM
Unruhe: Ängstlich, wenn irgendetwas von ihm erwartet wird. Schlechter am Abend und in der Nacht, durch Geräusche, Erbrechen, wenn er alleine ist. Besser in Gesellschaft.	Angst: Ängstlich mit rotem Gesicht. Schlechter nach dem Stuhlgang, vor und während des Harnabgangs, während des Hustens, am Vormittag, in Gesellschaft oder in einer Menschenmenge und durch Ärger. Besser durch Verzehr kalter Getränke.
Fröstelnder Patient.	Heißer Patient.
Penibel und wählerisch +++.	Weniger anspruchsvoll.
Furcht: vor Alleinsein, besonders beim Zubettgehen; allem Schwarzen; Freunden; hochgelegenen Plätzen; Insekten; Räubern, Schlangen.	Furcht: vor dem Überqueren einer Straße, überfüllten Orten, Musik, durch Tunnels oder über enge Brücken zu gehen.

ARTEMISIA VULGARIS

(Beifuß - Art.v.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Epilepsie, Konvulsionen, Chorea** und anderen Störungen des Bewegungsablaufs.
- ▶ **Vergesslichkeit** ist ein wichtiges Symptom dieses Mittels. Vergisst alles, was gelesen wurde. Hauptsächlich aufgrund der wiederholten epileptischen Anfälle kann sich das Kind nicht mehr konzentrieren.
- ▶ Während der Schwangerschaft hat die Mutter einen großen Schreck, plötzliche schlimme Nachrichten oder einen Kummer erfahren, der später nun, wenn das Kind heranwächst, in Form der Epilepsie wieder auftritt.
- ▶ Eines der besten homöopathischen Mittel bei **Sydenham-Chorea (Chorea minor)**.
- ▶ Einseitige Konvulsionen, meistens rechts. Konvulsionen auf einer Seite und Lähmungen auf der anderen Seite. Anfälle zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber meistens Konvulsionen nach Verdruss. Krampfartige Konvulsionen schlimmer durch jegliche Anstrengung, während der Zahnung oder nach dem Trinken. Epileptische Anfälle ausgelöst durch Ärger, Aufregung, Kummer, Schreck, Kopfverletzungen oder Masturbation. Nervös und gereizt vor dem Anfall.
- ▶ Schreien bei den Konvulsionen, die sehr plötzlich auftreten und von großer Steifigkeit begleitet werden. Unwillkürlicher Harnabgang bei den Konvulsionen.
- ▶ Konvulsionen als Begleiterscheinung bei tuberkulöser oder fieberiger Meningitis.
- ▶ Wurmbefall ist sehr oft die Hauptursache für die Epilepsie oder die Konvulsionen.
- ▶ Eines der besten **Entwurmungsmittel**.
- ▶ Absonderungen mit Knoblauchgeruch, besonders von Schweiß, Urin und Stuhl.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae/Compositae).
- Sehr ähnlich zu Bell, Cupr. und Hyos.

ASA FOETIDA

(Stinkasant - Asaf.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Starke Abneigung gegen Schreibarbeiten. Will nicht schreiben, sondern lieber lesen. Wenn man diese Kinder aber zum Schreiben zwingt, dann bekommen sie emotionale Probleme.
- ▶ Heikel, launenhaft und unzufrieden.
- ▶ Hysterische Kinder, die Mitleid erregen wollen und ihre Symptome übertreiben, wenn sie in die Klinik kommen. Unbedeutende Dinge werden aufgebauscht und manchmal fallen sie in Ohnmacht, nur um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
- ▶ Kränklich, empfindlich und hysterisch.
- ▶ Dicke und wabbelige Kinder.
- ▶ Fortwährende Kaubewegungen wie bei wiederkäuenden Kühen.
- ▶ Voller Blähungen, viel Flatulenz und viel Aufstoßen.
- ▶ Sehr starker Druck nach unten durch die Blähungen im Bauch, so als ob eines schönen Tages das Abdomen platzen könnte.
- ▶ Trias der gastrischen Beschwerden: lautes Rumpeln, explosives Aufstoßen und schwieriger Stuhl.
- ▶ Boger beschreibt dieses Mittel sehr gut, indem er sagt, dass sich bei diesen Kindern nach dem Essen enorm viel Luft im Abdomen ansammelt.
- ▶ Blähungen drücken das Zwerchfell nach oben Richtung Kehle. Das kann zu keuchender Atmung, verzerrten Gesichtsmuskeln und sogar zu Ohnmacht führen.
- ▶ Dr. Farrington beschreibt wunderschön den Durchfall des Asa-foetida-Kindes. Der Stuhl ist speckig, grün, reichlich, breiig und weich. Der kleinste Diätfehler verursacht Durchfall. Reichlich offensive Flatulenz, wobei auch Stuhl abgeht.
- ▶ Chronischer Durchfall verursacht durch Malabsorption.
- ▶ Wachstumsschmerzen und Osteomyelitis (Knochenentzündung). Entzündung der langen Knochen und dort besonders der Knochenhaut. Knochenschmerzen, als ob die Knochen mit einem scharfen Messer abgeschabt würden, schlimmer nachts, bei Berührung und besser durch Druck.

HERKUNFT

- Gewinnung dieses Gummiharzes durch Einritzen der Wurzel einer lebenden Pflanze, die auch „Teufelsdreck“ genannt wird und zur Familie der Doldenblütler (Apiaceae/Umbelliferae) gehört.

ASARUM EUROPÆUM

(Europäische Haselwurz - Asar.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Kinder von alkoholabhängigen Eltern.
- ▶ Häufige ungerechtfertigte Maßregelung durch die Eltern verursacht beim Kind eine erhöhte Empfindlichkeit auf der körperlichen und seelischen Ebene.
- ▶ Ehrgeizig, jedoch nervös und ängstlich.
- ▶ Schon bei kleinsten Geräuschen ängstlich und nervös. Sehr gereizt, wenn jemand in der Nähe Geräusche macht wie Papierrascheln oder Geräusche beim Kauen z. B. eines Apfels.
- ▶ Abneigung gegen Berührung oder Zuneigung jeder Art. Z. B. können sie es nicht leiden, wenn jemand sie küsst oder berührt. Sie stoßen die jeweilige Person sofort weg.
- ▶ Zurückhaltend und ernst. Es dauert eine Weile bis sie sich anderen Kindern anschließen, aber wenn sie einmal mitspielen, dann genießen sie geradezu die Gemeinschaft.
- ▶ Intelligent und frühreif.
- ▶ Konzentrationsschwierigkeiten, die Gedanken schwinden während des Sprechens, Schreibens, Lesens oder bei jeder anderen geistigen Betätigung. Schlechtes Gedächtnis; Ausnahme sind Eigennamen, die sie sich gut merken können.
- ▶ Ein Gefühl von Leere beim Lesen oder Lernen macht es geradezu unmöglich, sich etwas zu merken.
- ▶ Dr. George Vithoulkas beschreibt diese Kinder als sehr konkurrenzbetont, begabt und geistvoll, jedoch spröde wie Kristallglas, das womöglich zerspringen kann.
- ▶ Migräne durch Anstrengung der Augen, erleichtert durch Waschen der Augen mit kaltem Wasser. Dieses Symptom hat sich wiederholt in meiner Praxis bestätigt.
- ▶ Sogar bei größter Sommerhitze kalte Hände, Füße, Knie und Bauch.
- ▶ Das Verdrehen der Hände ist eine wichtige Geste, die man oft bei Asarum-Kindern sieht.
- ▶ Eine Art von kaltem Schauer über den ganzen Körper bei emotionalen Störungen.
- ▶ Frostige Patienten, denen weder Wärme noch warmes Anziehen hilft.
- ▶ Großes Verlangen nach Nüssen, Essig und Obst.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Osterluzeigewächse (Aristolochiaceae).

ATRAX ROBUSTUS

(Sydney-Trichternetzspinne - Atra-r.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Viele Allgemeinsymptome der Spinnenmittel, wie Aufspringen, Ruhelosigkeit, Tanzen und Quirlig sein. Das am meisten charakteristische und maßgebliche mentale Symptom dieses Mittels ist Klugheit. Atrax-robustus-Kinder sind sehr listig, schlau und gerissen wie Bufo, Lachesis, Tarentula und Moschus.
- ▶ Kinder, die sehr lebhaft sind, sie springen fanatisch und sind immer gereizt und unruhig.
- ▶ In der Schule große Probleme beim Lernen, weil sie ein bisschen verwirrt sind und nicht schreiben können. Schreiben ist für ein Atrax-robustus-Kind sehr schwer, weil beim Schreiben sofort Unruhe, Angst und Aufregung entsteht.
- ▶ **Mittelohrentzündung auf der linken Seite.**
- ▶ Sinusitis, wenn die Absonderungen aus der Nase dick, gelb und klebrig sind. Typischer Kopfschmerz im Stirnbereich genau über dem linken Auge.
- ▶ Anhaltende oder unwillkürliche Bewegung der Lippen oder zuckende Lippen. Das sind sehr hilfreiche diagnostische Merkmale dieses Mittels.
- ▶ Häufiges Spucken durch reichlichen Speichelfluss.
- ▶ **Halsschmerzen besonders linksseitig**, wie bei Lach., Naja und Sul-ac. Halsschmerzen schlimmer nach Mitternacht, durch kalte Getränke und durch leeres Schlucken. Durch die heftigen Halsschmerzen wird manchmal das Schlucken geradezu unmöglich.
- ▶ **Wurmbefall.** Typische, abdominale Koliken besonders im Nabelbereich, schlimmer morgens, bei Bewegung, beim Rückwärtsbeugen, beim Hinlegen und nach dem Frühstück; besser beim Aufrechtsitzen und Krümmen.
- ▶ Fieberhafte Konvulsionen mit Zucken verschiedener Teile des Körpers. Bei Fieber sind die Extremitäten, besonders Hände und Füße, kalt.
- ▶ Sehr frostig mit Verlangen nach viel heißem Kaffee, der lindert.
- ▶ Gegen Abend immer sehr lebhaft und geschäftig, morgens beim Aufwachen jedoch müde und schlapp.

ATROPINUM SULPHURICUM

(Atropinsulphat - Atro-s.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Atro-s. ist Cod. sehr ähnlich.
- ▶ Unruhig und gereizt wegen der Schmerzen.
- ▶ **Funktionsstörungen der Bauchspeicheldrüse oder der Gallenblase,** die Bauchkoliken verursachen.
- ▶ Kolik oft nach dem Essen besonders nach Milchgenuss.
- ▶ Im Frühstadium von Darmverlegungen und Invagination hilft Atro-s. in sehr niederen Potenzen.

AURUM METALLICUM

(Gold - Aur.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Depressive Störungen bei Kindern**, besonders in Verbindung mit schweren Erkrankungen wie Krebs, Nieren versagen oder angeborenen Herzfehlern, wenn das Kind die Aussichtslosigkeit seiner Krankheit begriffen hat (Psor.).
- ▶ **Ein Gefühl der Leblosigkeit und des Elends mit völligem Verlust der Initiative**; eine Art Konzentrationsschwäche, die meist aus Kummer über den Verlust einer Freundschaft oder durch den plötzlichen Verlust der Eltern entsteht; sie tritt besonders dann auf, wenn ihnen damit eine plötzliche Verantwortung aufgebürdet wird, wie z. B. auf die jüngeren Geschwister aufpassen zu müssen oder der Zustand tritt auf, wenn die Integrität des Kindes angezweifelt wird.
- ▶ Hat Angst davor, im Riesenrad oder in einem hohen Karussell zu sitzen, in dem man tief hinunter sehen muss.
- ▶ Kinder, die äußerst schmerzempfindlich sind (Cham., Hep., Lyc.).
- ▶ Kinder, deren Mutter während der Schwangerschaft eine Enttäuschung ihrer Liebe erleben musste (Ign., Nat-m., Ph-ac.).
- ▶ Pflichtbewusste und verantwortungsvolle Kinder (Cale., Kali-c., Nat-s.).
- ▶ Selbstgefällige Kinder (Cale., Lach., Lyc., Med., Nux-v.) mit großem Stolz; hohe Selbsteinschätzung (empfindlich gegen jede Kritik); jeder Widerspruch lässt sie aufbrausen und erzeugt Zorn und Wut.
- ▶ Schrecklich empfindlich über jede Enttäuschung (Nat-m., Staph.); grämt sich tagelang bei Enttäuschungen.
- ▶ Große Sorge um die Familie (Caust., Cocc., Rhus-t.), besonders um die Eltern; tut sein Bestes, sie nicht zu enttäuschen und ihrer würdig zu sein.
- ▶ Kinder, die dauernd Musik hören wollen und von ihr wie berauscht sind; Säuglinge werden ruhig, sobald Musik gespielt wird; Kinder hören gern Musik bei den Hausaufgaben oder dem, was sie gerade tun; sie haben immer ein tragbares Radio oder einen Walkman dabei, mit dem sie auch unterwegs Musik hören können; bevor das Kind schlafen geht, muss die Mutter unbedingt noch Musik machen oder ihm ein Lied singen (Bufo, Croc., Lac-leo., Nat-m., Tarent., Tub.).
- ▶ Lebhaftes, extrovertierte Kinder, ähnlich wie Phos.; sie können aber auch reserviert und introvertiert wie Ign. sein.
- ▶ Nicht wählerisch beim Essen, es muss nichts Außergewöhnliches sein; es muss nur gut zubereitet sein; isst gern Hausmannskost; akzeptiert auch einfache Mahlzeiten wie Brot und Milch; hat auch nichts dagegen, wenn das Essen schon kalt geworden ist.
- ▶ Gut organisierte, pünktliche Kinder (Ars., Carc., Nux-v.).

- ▶ Höflich zu allen.
- ▶ Altkluge Kinder (Calc., Lach., Med., Merc., Verat.).
- ▶ Ernst, lächelt jedoch beim Sprechen unwillkürlich.
- ▶ Schluchzt im Schlaf ohne aufzuwachen.
- ▶ Will der Beste sein; starkes Verlangen, sich einen Namen in der Gesellschaft zu machen.

KÖRPER

- ▶ Die **Knochen** sind **fast immer** am Krankheitsgeschehen **beteiligt** (Calc., Merc., Ph-ac., Puls., Sil.), z. B. verkümmertes Wachstum, verspäteter Schluss der Fontanellen, Knochenhautentzündung, Wachstumsschmerzen, rezidivierende Periostitis, juvenile rheumatoide Arthritis oder Knochentumoren wie Exostosen, Osteoklastome, Sarkome. Charakteristisch sind folgende knöcherne Missbildungen: Syndaktylie, Polydaktylie, Klinodaktylie, Kyphose und Skoliose.
- ▶ Die **Knochen** sind **schmerzhaft empfindlich gegen Kälte** (Merc., Mez., Sil.).
- ▶ **Dysmorphie:** Die am häufigsten beobachteten dysmorphischen Syndrome sind:
 - Carpenter-Syndrom.
 - Cri-du-Chat-Syndrom.
 - Down-Syndrom (Trisomie 21).
 - Edward-Syndrom (Trisomie 18).
 - Holt-Oram-Syndrom.
- ▶ **Angeborener Herzfehler** (offener Ductus Botalli und Aortenstenose) und angeborener zyanotischer Herzfehler (Ventrikelseptumdefekt mit Shuntumkehr, hypoplastischer rechter Herzkammer und Pulmonalklappenstenose).
- ▶ **Infiltration und Metastasen im Knochenmark** (Bar-c., Bar-i., Beryl., Calc-f., Hecla., Merc-k-i., Syph.) und in der Knochenrinde, bis zu Nekrosen.
- ▶ **Schwächliche Jungen ohne Saft und Kraft.**
- ▶ **Eigenwillig im Geschmack** (verlangt nach Delikatessen); will sein Essen nur auf ganz bestimmte Weise zubereitet haben; z. B. muss die Frikadelle gut durchgebraten sein, das Fleisch darf nicht zu zäh sein, das Ei muss punktgenau stimmen und darf weder zu weich noch zu hart sein (Chin., Ipec., Lyc., Tub.).
- ▶ Entwicklungsstillstand besonders bei Jungen, bei denen die Hoden mit erkrankt sind.
- ▶ Lymphatische und retikuloendotheliale Erkrankungen, primär oder sekundär bei Krankheiten der Lymphknoten, Hepatosplenomegalie usw.
- ▶ Rezidivierende Tonsillitis mit Hypertrophie der Tonsillen.
- ▶ Sanguinische Kinder, mit frischem rotem Teint, schwarzem Haar und schwarzen Augen.
- ▶ Aur. ist Mere, sehr ähnlich und sollte mit diesem verglichen werden.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- In der Schule stellen die Kinder dem Lehrer **schnell** und **häufig Fragen**.
- Fühlt sich angezogen und ist fasziniert von der Farbe **Rot**, besonders ausgeprägt bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren; bevorzugen rote Farbstifte, Schachteln, Buchumschläge, Aufkleber, Etiketten, Radiergummi usw. (Ign., Phos., Tarent.).
- Vermeidet **überfüllte Plätze**, entwickelt auf öffentlichen Plätzen, Bahnstationen, Messen usw. starke Erstickungsgefühle und Angst.
- Die Kinder werden in sehr frühem Alter **religiös** und beginnen täglich zu beten (Ars., Cale., Stram., Sulph.).
- Fühlt sich **verlassen** und hat Angst, von Familienmitgliedern und Freunden **zurückgewiesen zu werden** (Nat-m.).
- Intelligente Kinder mit **starker Wissbegierde** (Verat.).
- **Selbstkritisch** (Nux-v., Thuja.), entwickelt Schuldgefühle bei geringem Anlass (Brom., Carc., Kali-br., Staph.); gottesfürchtige Kinder mit **sehr strengen Moralvorstellungen**.
- **Sentimental**: weint oft, wenn er Filme sieht, in denen Familiendramen und starke Gefühle dargestellt werden.
- Ringt ständig die Hände (Kali-p., Phos., Stram.).
- Schüchtern.
- Hyperaktiv, ruhelos, will ständig beschäftigt sein, kann aber die Dinge nicht schnell genug erledigen, was in Ungeschicklichkeit endet.
- Seufzen im Schlaf (Kali-p.).

KOPF

- Das **Entblößen** des Kopfs verschlimmert die meisten Beschwerden (Bell., Hep., Nux-v.).
- Migräne, schlechter von geistiger Anstrengung (Lesen, Studieren), durch starke Gerüche; besser durch heiße Anwendungen oder Einhüllen des Kopfes.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Exostosen** (Calc., Merc.).
 - **MRT: Angeborenes Beerenaneurysma** im circulus arteriosus der arteria cerebialis (Bar-c., Syph.), zerebrovaskuläres Trauma, Hydrozephalus.
 - Alopecia areata (Calc., Morg-p., Tub.).
 - Vor- und Zurückbewegungen des Kopfes (Cham., Cina).
 - Hervortretende große Fontanelle.
 - Kopfhautekzem.
 - Heißer Kopf (mit kalten Extremitäten) und rotem Gesicht bei Fieber.
 - Makrozephalie.

AUGEN

- Katarrhalische Entzündung des Auges durch eine Infektion der oberen Atemwege.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Hemianopsie**: vertikal (Lyc., Mur-ac.) und horizontal (Ars., Lith-c.).
 - **Sonnenuntergangsphänomen +** (Hell., Zinc.).

- **Starrende, hervortretende Augen** (Guaj.).
- Blaue Skleren (Ars., Plb., Stram.).
- Angeborene Hornhauttrübung.
- Krustige, schuppige Hautausschläge an den Lidrändern.
- Kennedy-Syndrom.
- Haarausfall an den Augenwimpern (Rhus-t., Sei.).
- Hypertelorismus.
- Unregelmäßig geformte (Hyos., Merc.) oder verengte Pupillen (Op., Thuj.).
- Lähmung des VI. Hirnnerven (Caust., Gels.).
- Hervortreten des Augapfels (Nat-m.).
- Retinoblastom (Syph.).
- Roberts-Syndrom.
- Skleritis, Episkleritis (Kalm., Thuj.).
- Gerstenkörner.
- Trachom.

OHREN

- Chronische Mittelohrentzündung, mit gelber, eitriger, **übelriechender** Absonderung.
- **Hörminderung** wegen vergrößerter und **hypertrophierter Tonsillen** (Agra., Barc., Calc-p.).
- Schmerz mit **Rötung** und Schwellung hinter dem Ohr, besser durch **kalte Anwendungen** (Merc., Puls.) und an der **frischen Luft** (Acon., Puls.).
- Neurologische Beschwerden, wie Epilepsie und Migräne, durch den übermäßigen Gebrauch von antibiotischen und entzündungshemmenden Ohrentropfen gegen Mittelohrentzündung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Mastoid berührungsempfindlich** (Cham.).
 - **Perforation** des Trommelfells (Hydr., Kali-bi., Tub.).
 - Abszess hinter dem Ohr (Merc.) mit faulig riechenden Absonderungen.
 - Feuchte Hautausschläge hinter den Ohren.
 - Rötliche Verfärbung (Agar., Chin.).
 - Röntgenuntersuchung: Zerstörung spongiöser Zellen im Mastoid (Caps., Hep., Phos., Sil.).

NASE

- **Snuffles** (chron. Schnupfen bei Babys) bei säugenden Babys mit verstopfter Nase, die ihnen das Trinken an der Brust erschwert (Kali-bi., Lyc., Nux-v., Samb.).
- Schnupfen, besser im Freien (All-c., Calc-s.).
- Nasenbluten beim Naseputzen (Lach., Phos.).
- Beim Versuch zu schlucken kommen Flüssigkeiten aus der Nase heraus (Lähmung des IX. (Nervus glossopharyngeus) und X. (Nervus vagus) Hirnnervs (Carbn-s., Crot-h.).
- Niesanfälle bei Sonnenschein (Agar., Merc.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Eingesunkener oberer Nasenrücken** (Ant-t., Hep.) bei Down- Syndrom, Dysostosis multiplex oder ethnisch.
 - **Rote, knorrfartige Nasenspitze** (Calc.)

- Ständiges Nasebohren mit den Fingern (Arum-t., Cina).
- Übelriechender Geruch.
- Nasenpolypen (Form.).
- Retronasaler Katarrh, besonders am Morgen.
- Gelblicher, dicker, stinkender, eitriger Schnupfen, der austrocknet und trockene, harte Krusten formt (Kali-bi., Lac-c., Nit-ac.).

GESICHT

- Entzündung der **Parotis**, die zu Orchitis führt (Puls., Rhus-t.).
- Akne rosacea, besonders nach Missbrauch von Vitamin-A-Salben wie Retinol.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalter Schweiß** im Gesicht (Ars., Carbo-veg.).
 - **Glühendes, rotes Gesicht** (Bell., Cina.), besonders bei Kopfweh.
 - **Glänzendes, fettiges** (Thuj.), glitzerndes Gesicht.
 - Gedunsenes Gesicht (Ars.).
 - Aufgesprungene Lippen.
 - Zyanose (Nat-m.).
 - Parotiden +.
 - Ödematöses Gesicht.
 - Oberkieferspeicheldrüsen vergrößert und druckempfindlich.

MUND

- **Reichlicher Speichelfluss während des Schlafes** (Lyc., Puls., Rhus-t.).
- Mundgeruch.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rissige Zunge, gelb belegt, mit roter Spitze.
 - Dunkelrotes Zahnfleisch, das schnell blutet; Zahnfleischentzündung.

HALS

- Brennender Schmerz im Hals beim Schlucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Verlängertes Zäpfchen** (Bar-m., Hyos.).
 - **Pulsieren der Karotiden** (Bell., Glon.).
 - Kropf mit Exophthalmus.
 - Der äußere Hals ist bei Fieber heiß.
 - Kropf (Iod., Spong.).
 - Tonsillen vergrößert und entzündet.

MAGEN

- **Bulimie mit Traurigkeit** (Ign.).
- **Verstärkter Appetit während des Fiebers** (Phos.).
- Brennender, gewaltiger Durst (Acet-ac., Tarent.).
- Magenschmerzen, besser nach dem Essen (Graph., Chel.).
- Langsame Verdauung.
- Abneigungen: **Fisch** (Graph., Nat-m., Phos.) und Fleisch.
- Verlangen: Kaffee, Delikatessen (Ipec., Lyc., Tub.), **trockenes und altbackenes Brot**, Teigwaren, unverdauliche Dinge, Milch, Gebäck, Gewürze, Süßigkeiten.

ABDOMEN

- Gallengangsatresie.
- Gelbsucht nach Ärger (Cham., Nux-v.).
- Nächtliche, blähende Koliken bei Säuglingen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Harte, vergrößerte Leber, besonders bei kongestiver Herzschwäche** (Dig., Mag-m.).
 - Vergrößerung der Leistenlymphknoten (Merc.).
 - Indische kindliche Leberzirrhose (Nat-s., Hydr.).
 - Schmerzhafter, eingeklemmter Leistenbruch bei Kindern (Nux-v., Verat.), besonders rechts.
 - Das Ultraschall-Bild zeigt vergrößerte Mesenteriallymphknoten (Bar-c.).

REKTUM

- **Nächtliche Diarrhoe** (Chin.).
- Übelriechende Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schweiß um den After und das Perineum.
 - Rektumprolaps (Ruta).

HARNWEGE

- Schaumiger, stark riechender, milchiger Urin.
- Leber- und Nieren-Versagen im Endstadium der Leberzirrhose (Ars., Op., Zinc.).
- Unwillkürlicher Harnabgang nach dem Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Roter Sand in der Windel.
 - Urin: Albumin ++ (wegen Herzmuskelschwäche).

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kryptorchismus** (Iod, Sil), die Hoden befinden sich entweder im Abdomen oder in der präpubischen Region (Thyr.).
 - Chronische Orchitis.
 - Hydrozele (Abrot.).
 - Schweiß auf dem Skrotum (Sulph., Thuj.).
 - Hodenhochstand (Plb., Zinc.).

WEIBLICHE GENITALIEN

- Verspätete Menarche (Puls.).

ATMUNG

- **Asthma in der regnerischen Jahreszeit** (Chin., Dulc., Nat-s.).
- Asthmatische Atmung aufgrund von **Linksherz-Insuffizienz** (Ant-ar.) oder aufgrund rheumatischer Herzerkrankung (Rechtsherz-Insuffizienz) (Stry-ar.).
- Atemnot macht es unmöglich, sich hinzulegen; schlechter an der **kalten frischen Luft** (Nux-v., Psor.); besser durch Expektoranten und durch das Sitzen mit nach vorne gebeugtem Oberkörper (Ars., Kali-c.).

HUSTEN

- Der Husten ist so heftig, dass es die **Brust schüttelt** (Lact-v., Phos.).
- Trockener, spastischer Husten, regelmäßig jede Nacht, beginnend am Abend bis zum Morgen, mit erschwerter Atmung.

BRUST

- **Angeborener zyanotischer Herzfehler** (Dig.) und angeborene Aortenstenose (Syph.).
- **Rheumatische Herzerkrankung** (Kalm.), zusammen mit Atemschwierigkeiten.
- Nützlich in Fällen von verschleppter Lungenentzündung (Lyc.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - EKG: Vorhofflimmern, Extrasystolen.
 - Linksherz-Hypertrophie bei starker kardialer Beanspruchung (Ars-i.).
 - Herzgeräusche.
 - Perikarditis und Perikarderguss.
 - Rheumatische Endokarditis.
 - Rechtsherz-Hypertrophie bei starker kardialer Beanspruchung (Naja).
 - Subakute bakterielle Endokarditis.
 - Herzklappenfehler, wie angeborene Aortenstenose (sehr häufig) oder Aortenklappenfehler als Folge von rheumatischem Fieber.
 - Röntgenuntersuchung: Lungenentzündung, prominenter Aortenknopf.

RÜCKEN

- Steifheit und Spannung in der Halsregion.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Röntgenuntersuchung: **Krümmung der Wirbelsäule** (Merc-c., Sulph.); Kyphose (Calc-f.).
 - Kalter Abszess im Rücken (Sil.).

EXTREMITÄTEN

- **Wachstumsschmerzen** während der Nacht (Conch., Ferr-act., Guaj.).
- **Periostitis** (Syph.), die besonders die Knochen der unteren Gliedmaßen betrifft.
- Wandernde, rheumatische Schmerzen in den Gelenken, besonders nachts, **die ihn aus dem Bett treiben** (Cham., Merc., Verat.), besser durch Bewegung.
- Akuter Rheumatismus im Wechsel mit Herzbeschwerden (Kalm.).
- Hüftgelenkserkrankung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Zyanose** mit bläulichen Fingernägeln.
 - **Eiskalte Hände** und Füße (Carbo-veg., Elaps., Sil.), nachts im Bett, während des Fieberfrostes.
 - Arthritische Knoten.
 - Knochige Tumoren des Schienbeins (Calc-f.).
 - Aufgesprungene Hände.
 - Wundheit zwischen den Schenkeln, verursacht durch das Tragen von Windeln (Bar-c.).

SCHLAF

- **Einschlafen während des Lesens** (Nat-m.).
- Unmöglich, auf der **rechten Seite** zu schlafen (Borx., Acet-ac.).
- **Schlaflos** durch **Knochenschmerzen** in der Nacht (Kalm., Merc., Plb.).
- Ächzen und Schluchzen im Schlaf (Cham.).
- Vom Schlaf überwältigt nach dem Abendessen (Carbo-veg., Kali-bi., Laur.).
- Schläfrigkeit bei Kindern sofort nach dem Füttern (Agar., Nux-v.).

HAUT

- **Wiederkehren von Warzen** nach Kauterisation mit flüssigem Stickstoff (Nit-ac.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Angeborene Ichthyosis (Ars-i., Syph.).
 - Trockene, rissige Haut.
 - Gänsehaut (Nux-v.).

KONVULSIONEN

- Konvulsionen nach Zorn, bei Säuglingen (Cham., Cupr., Nux-v.).

ALLGEMEINES

- Atrophie und **Verhärtung von Drüsen** (Cale., Calc-i., Iod.).
- **Ödeme durch Herz- und Nierenerkrankung** (Colch., Sal-ac., Solid.).
- **Mangel an Lebenswärme.**
- **Disposition zu angeborenen Aneurysmen** (Bar-c., Carbo-veg., Thuj.).
- Das Kind hat eine deutliche Familiengeschichte von Erkrankungen der Aorta, zerebrovaskulären Traumen, Hypertonie und ischämischen Herzfehlern.
- Beschwerden verschlimmern sich nachts (besonders nach 3 oder 4 Uhr).
- Zarte, empfindliche, ausgezehnte, schwächliche, kränkliche Säuglinge.
- Haarausfall nach jeglichen akuten Krankheiten (Carbo-veg.).
- Liebt es, in kaltem Wasser zu baden, was die Beschwerden verbessert (Apis., Calc-s.).
- Puls: unregelmäßig (Chin., Lach.), schwach, beschleunigt, klein (Ars., Laur.).
- Kinder mit krummen Schultern (Cale., Phos., Sulph.).
- Tendenz zu Abszessen in Knochen (Lyc., Merc.) und Drüsen (Calc-s., Sil.).
- Schwäche und Erschöpfung vom Lesen oder Lernen, schon nach kurzer Zeit (Pic-ac., Sumb.).

BACILLINUM BURNETT

(Tuberkulose-Nosode: Mazeration von tuberkulärem Lungengewebe - Bac.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Das Bacillinum-Kind weigert sich, ein „Nein“ als Antwort zu akzeptieren; es reagiert mit Wutanfällen, schlägt den Kopf gegen die Wand etc.
- ▶ Verlangen zu reisen.
- ▶ Zerstörerische Tendenz; geht mit seinen Spielsachen, Büchern, Schreibzeug, Kleidung etc. achtlos um.
- ▶ Angst vor Hunden und Katzen.
- ▶ Ruhelose Kinder, die Tag und Nacht ständige Aktivität brauchen.
- ▶ Wortkarg, mürrisch, gereizt, verdrießlich, kränklich; wimmert und beklagt sich.

KÖRPER

- ▶ Symptome sind unbeständig, besonders bei akuten Infektionen.
- ▶ Verfrorene Kinder mit Mangel an Lebenswärme; sie meiden den Luftzug von Ventilatoren oder Klimaanlage.
- ▶ Chronische Diarrhoe oder hartnäckige Verstopfung bei Kindern.
- ▶ Abmagerung bei Heißhunger.
- ▶ Anfällig für Erkältungen und Halsentzündung, die sie leicht bekommen, sich aber nur langsam erholen.
- ▶ So schnell und intensiv die Symptome auftauchen, so schnell sind sie auch wieder weg.
- ▶ Drüsenschwellungen mit Entzündung, besonders Nasenpolypen, Leisten- und Mesenterialdrüsen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Kretinismus.**
- **Geistig frühreif, aber körperlich schwach.** Antworten schnippisch oder weigern sich zu antworten.
- Körperlicher und intellektueller Entwicklungsstillstand des Kindes nach akuten Infektionen des Zentralnervensystems wie Gehirnhautentzündung, Gehirnentzündung usw.
- Starke Angst und Unruhe in der Dunkelheit.

KOPF

- **Kopfweg bei Kindern im Schulalter;** schlechter vom Lernen oder von der geringsten geistigen Anstrengung; eine Brille bessert nicht.

- **Tuberkuläre Gehimentzündung.**
- Akute zerebrale oder basale Gehirnhautentzündung, mit drohendem Erguss.
- Unerträgliche Schmerzen; das Kind schreit, reißt an seinen Haaren, schlägt seinen Kopf mit der Faust und versucht, ihn gegen die Wand oder den Fußboden zu schmettern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kahlheit oder stellenweiser Haarausfall bei kleinen Jungen.
 - Herpes tonsurans (Trichophytie) auf der Kopfhaut.
 - Hydrozephalus.
 - Unwillkürliches Schütteln des Kopfes.
 - Läuse.
 - Plica polonica.
 - Flechten auf der Kopfhaut.

AUGEN

- Tendenz, in frühem Alter Kurzsichtigkeit zu entwickeln.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blepharitis.
 - Entzündliches Lidrandekzem.
 - Geschwürbildung der Hornhaut.

OHREN

- Otitis nach Halsentzündungen.

NASE

- **Ansammlungen von kleinen schmerzhaften Eitergeschwüren**, die grünen, übelriechenden Eiter absondern.
- **Schweiß auf der Nase.**
- Ständige Anfälligkeit, sich zu erkälten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Vergrößerte Nasenpolypen.**
 - Atrophie der Nasenschleimhaut mit faulem Geruch.

MUND

- **Verspätete Zahnung.**
- **Übermäßiger Zahnstein auf den Zähnen.**
- Zähne empfindlich gegen Luftzug.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufgesprungene Lippen.
 - Verkümmerte, gezackte, unvollständig entwickelte Zähne.
 - Grünlich-gelbe Verfärbung der Zähne.
 - Landkartenzunge.
 - Frühzeitig kariöse Zähne bei kleinen Kindern.
 - Eiterfluss.
 - Sordes auf den Zähnen.
 - Erdbeerzunge, mit aufrechten Papillen.

GESICHT

- **Schmerzlose, entzündete Pickel auf der linken Wange, die von Zeit zu Zeit ausbrechen und viele Wochen fortbestehen.**
- Schmerz unter dem rechten Auge.
- Untersuchungsergebnisse:
 - „Fledermausflügelartiges“ Aussehen (eine Art Pterygium) der Verbindung zwischen Nase und Wange.
 - Bräunliche Punkte oder Flecken im Gesicht.
 - Ekzematöse Ausschläge im Gesicht, begleitet von Impetigo.

HALS

- Untersuchungsergebnisse:
 - Halslymphknoten vergrößert und druckempfindlich.
 - Schwellung der Tonsillen.

MAGEN

- **Abneigung gegen und Verschlimmerung durch Hühnerfleisch.**
- **Durst auf große Mengen Wasser.**
- **Erbrechen durch Husten.**
- Krampfhaftes Würgen und Erbrechen, bis der Magen leer ist.
- Tendenz, Rotavirus- und Helicobacter-Infektionen zu entwickeln.
- Abneigung gegen Essen trotz Hungers.
- Verlangen: Kalte Milch, Delikatessen, Eier, Fett, Schinken, Eiscreme, **Senf**, Essiggurke, Schweinefleisch, **Salz**, Geräuchertes, Süßigkeiten und **Essig**.
- Untersuchungsergebnis:
 - Gastroskopie: Verhärtung des Pylorus.

ABDOMEN

- Aufblähung und Vorwölbung des Bauches, hauptsächlich wegen Schwäche der Bauchmuskeln.
- Tuberkulöse Erkrankung der Mesenterialdrüsen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Trommelbauch, bei dem sich die Milzregion ausbeult.
 - Leiste voll von kleinen, sichtbaren, verhärteten Drüsen.
 - Die Sonographie des Bauches zeigt tuberkuläre Kalzifikation der Mesenterialdrüsen.

REKTUM

- **Chronische Diarrhoe bei Kindern**, die unter Laktoseintoleranz oder Malabsorptionssyndrom leiden.
- **Morgendiarrhoe, die plötzlich und mit großem Druck ausgeschieden wird.**
- **Hartnäckige Verstopfung mit Untätigkeit des Rektums und Abgang von stinkenden Blähungen bei Säuglingen.**
- Cholera infantum.
- Periodische Blutungen des Afters.
- Vorfall von Hämorrhoiden mit Schmerz beim Husten.
- Untersuchungsergebnisse:

- Koloskopie: Hämorrhoiden, rektale Polypen und Colitis ulcerosa.
- Ekzematöse Hautausschläge um den After.
- Rötung der Analregion.

HARNWEGE

- Morbus Addison.
- Bettnässen.
- Unwillkürlicher Harnabgang während des Hustens.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Erniedrigtes Serum-Cortisol.
 - Urographie: **Tuberkuläre Kalzifikation der Nebennieren.**

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Aphonie.

ATMUNG

- Erstickungsanfälle nachts mit nur schwer sich lösendem Husten.
- Feuchtes Asthma.
- Untersuchungsergebnis:
 - Bauchatmung, beschleunigt und behindert.

HUSTEN

- **Das Kind wird nachts vom Husten geschüttelt, wacht aber trotzdem nicht auf.**
- Das Kind **spuckt immer weniger** mit dem Husten aus; es scheint, als ob es letztendlich daran erstickt.
- Trockener, stoßweiser Husten mit reichlichem Schweiß und Gewichtsverlust.
- Erstickende Hustenanfälle drinnen, besser draußen.

BRUST

- **Katarrhalische bzw. Bronchopneumonie.**
- Bronchiektasen.
- Chronische Bronchitis, bei der der Husten trotz Behandlung bleibt.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bronchialatmung in der Region der linken Lungenspitze.
 - Röntgenuntersuchung der Brust: Verdichtung, Lymphknoten am Hilus vergrößert, wabenartiges Aussehen der Lunge, Infiltration der linken Lungenspitze, Pleuraerguss.
 - Flach, eng oder hohlbrüstig mit hervorstehenden Rippen und Schlüsselbeinen und nach vorn geworfenen Schultern.
 - Schleimig-eitriger Auswurf.
 - Lungenödem.
 - Rasselgeräusche.

RÜCKEN

- Wirbelsäulentuberkulose.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Die Computertomographie der Lendenwirbelsäule zeigt Knochenzerstörung

- Kernig-Zeichen +.
- Kyphoskoliose.
- Die Kernspintomographie von Hals- und Lendenwirbeln zeigt einen kalten Abszess.
- Ostitis oder Karies der Wirbel.
- Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

- Tendenz, Osteomyelitis zu entwickeln.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hände blau.
 - Zitternde Hände.

SCHLAF

- **Knirscht mit den Zähnen im Schlaf.**
- Spricht oder schreit auf im Schlaf.

HAUT

- **Reichlicher Schweiß nachts.**
- **Tendenz, rezidivierende Eitergeschwüre zu entwickeln.**
- Ekzematöse Hautausschläge mit intensivem Jucken nachts beim Ausziehen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Herpes circinatus.
 - Impetigo.
 - Pityriasis versicolor.
 - Flechten.

ALLGEMEINES

- **Unbeständigkeit der Symptome.** Die Beschwerden betreffen erst ein Organ, dann ein anderes (Lunge, Gehirn, Nieren, Leber, Magen, Nervensystem etc.).
- **Fröstelig und empfindlich gegen kalten Luftzug.**
- Zwergwuchs und **Entwicklungsstillstand** mit **Abmagerung** und Marasmus trotz **Heißhunger**, wegen Assimilationsstörungen.
- **Anfällig für Allergien**, besonders diejenigen, die sich in den Atemwegen manifestieren.
- Häufiges Vorkommen **aller Formen von Tuberkulose** in der Familie oder in der eigenen Vorgeschichte.
- Passt zu hellhäutigen, engbrüstigen Kindern mit blauen Augen, die schnell wachsen und aktiv sind, aber schnell abmagern.
- Empfänglichkeit für Schnupfen und Halsentzündungen, die sie leicht bekommen, aber von denen sie nicht schnell genesen.
- Tendenz bei der kleinsten Verletzung stark zu bluten

BADIAGA

(Flussschwamm - Bad.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Skrofulöse Diathese** oder skrofulöse Konstitution, d. h. anfällig für Vergrößerungen, Entzündungen und Verhärtungen sowohl von endokrinen wie auch von exokrinen Drüsen, z. B. Halslymphknoten, Tonsillen, Schilddrüse oder Bauchspeicheldrüse.
- ▶ Fettleibigkeit bei Kindern.
- ▶ Migräne begleitet von Entzündungen der Augen. Kopfschmerzen besser nachts, aber nach dem Schlaf kommen sie heftig wieder.
- ▶ Hering verordnete dieses Mittel Kindern mit Kopfschuppen bei leichtem Juckreiz. Halsschmerzen oder Mandelentzündung nach dem Genuss von Süßigkeiten wie z. B. Bonbons oder Lutscher. Schmerzhafte Schlucken, häufiges Ausräuspern von klebrigem Schleim.
- ▶ Lockerer Husten, anfallsartig und krampfhaft. Husten schlimmer durch jegliches Zuckerwerk (Bonbons, Konfekt), besser durch warme Anwendungen.
- ▶ Weinen, wenn der Husten beschwerlich und chronisch wird, wie bei Hep.
- ▶ Sehr durstig.

HERKUNFT

- Badiaga, ein Süßwasserschwamm, wird auch *Spongilla lacustris* genannt. Badiaga ist Cale, sehr ähnlich.

BAPTISIA TINCTORIA

(Wilder Indigo - Bapt.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Halsschmerzen (normale Streptokokken-Infektion) und Mandelentzündung. Toxisches Aussehen, geschwollenes Gesicht, heiße, feuchte Haut und schrecklicher Mundgeruch. Schmutzige oder bräunlich-gelblich belegte Zunge, die völlig trocken sein kann. Mandeln neigen dazu, schon sehr schnell zu eitern. Dicker, pappiger, klebriger Speichel im Mund. Klebrige Absonderungen aus dem Hals. Vergrößerte und empfindliche Halslymphknoten. Dunkelroter Hals. Jeglicher Versuch Speisen oder Flüssigkeiten zu schlucken ist unmöglich. Hals schmerzt bei Berührung.
- ▶ Wunder Mund voller Aphten. Rissige Lippen.
- ▶ Es ist schwer, das Fieber von Bapt. und Gels, zu unterscheiden. Der grundlegende Unterschied ist, dass Bapt.-Patienten immer toxischer sind als Gels.-Patienten.
- ▶ Bei Fieber meist Delirium, mit vorangehender extremer Mattigkeit. Die Kinder sind dann verwirrt und es fällt ihnen sehr schwer, sich darauf zu konzentrieren, was sie mit sich selber machen. Im Terminalstadium kann es sein, dass das Kind tatsächlich nicht weiß, wo es sich befindet, mit wem es spricht und was mit ihm geschieht.
- ▶ Bei Fieber starker Schweiß, der sich sehr schnell entwickelt.
- ▶ **Fieber durch Infektionen**, entzündliches und eruptives Fieber.
- ▶ Frostig, jegliche Zugluft ist dem Kind sehr zuwider.
- ▶ Eruptive Infektionen wie **Mumps, Masern, Windpocken und Typhus**.
- ▶ Ein gutes Mittel bei Fieber nach Impfungen.
- ▶ Bapt.-Fieber befällt meist sehr schnell das Gehirn und deshalb entwickeln sich Benommenheit, Lethargie, Gleichgültigkeit, Verwirrung und Delirium sehr viel schneller als bei anderen Mitteln.
- ▶ Durstig, verlangt alle paar Minuten wenige kleine Schlückchen Wasser. ▶ Wurmbefall mit Fieber.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler (Leguminosae).

BARIUM CARBONICUM

(Bariumcarbonat - Bar-c.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Immer **unaufmerksam** in der Klasse; kann sich weder auf die Tafel noch auf den Lehrer konzentrieren. So lernt das Kind heute etwas und hat es morgen wieder vergessen.
- ▶ Ständiges Bedürfnis nach **emotionaler** und körperlicher **Unterstützung**.
- ▶ Hat etwas **Zwergenhaftes**, geistig wie körperlich.
- ▶ Viel zu **schüchternes** Kind; **versteckt sich** hinter der Mutter oder den Möbeln oder hält sich an der Mutter fest, bedeckt sein Gesicht mit den Händen und schaut durch die Finger.
- ▶ **Begriffsstutzig, nimmt nichts Neues auf**; z. B. kann die Mutter ihm ein einfaches Gedicht wie „Eia Popeia“ beibringen und es ein Dutzend Mal wiederholen, nur um dann festzustellen, dass das Kind sie mit völlig leerem Blick anschaut, wenn es das Gedicht eine halbe Stunde später wiederholen soll; es hat alles wieder vergessen. **Lernschwierigkeiten** in der Schule (z. B. Lesen, Mathematik), liegt weit unter dem Altersniveau. Das demoralisiert das Kind auf die Dauer und führt zu geringer Selbstachtung.
- ▶ **Infantilismus** mit schwachem Gedächtnis. Das Kind wirkt unaufmerksam und dumpf. Es lernt nicht richtig spielen oder laufen und nähert sich langsam dem Rand geistiger Behinderung.
- ▶ Abhängige Kinder: Sie werden nervös und können in Panik geraten, wenn man sie bittet, etwas selbstständig zu machen; sie haben einen Horror davor (auch manchmal Albträume), ohne Unterstützung auskommen zu müssen.
- ▶ Mangelnde Aufmerksamkeitsdauer bei Kleinkindern, z. B. bleiben sie bei keinem Spielzeug länger als ein paar Sekunden oder Minuten. Sie lassen das Spielzeug sofort wieder fallen und sehen sich nach etwas anderem um oder sie wollen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die folgenden Charakterzüge im sozialen Umgang identifizieren das Bar-c-Kind:

- ▶ **Nervös bei Fremden**: Verbirgt sich im Nachbarzimmer oder hinter der Mutter oder, wenn nichts anderes verfügbar ist, unter der Bettdecke.
- ▶ **Knabbert** oder **beißt** ständig an den **Nägeln**, um seine Schüchternheit zu verbergen.
- ▶ Sitzt lieber **allein**. Sitzt **in einer Ecke** bei der Tür oder ganz hinten in der Klasse.

- ▶ **Will nicht an Spielen**, Sportarten, kulturellen oder gesellschaftlichen Aktivitäten **teilnehmen**.
- ▶ Junge Mädchen mit **männlichem** Auftreten (Nat.-m., Plat.).

KÖRPER

- ▶ Barium-Konstitution: **Vorzeitig gealtert**, dünn, runzlig, sieht aus wie ein **Zwerg** mit kahlem großen Kopf. Der Arzt bekommt den Eindruck eines unterernährten oder geistig zurückgebliebenen Kindes, das zum Dickwerden neigt, mit kleinen Geschlechtsorganen und Drüsenstörungen.
- ▶ **Desintegrative Störung** (CDD) im Kindesalter, eine dem Asperger Syndrom verwandte Störung mit geistiger Behinderung, charakterisiert durch eine Schwächung im nonverbalen Verhalten; Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen zu entwickeln; Mangel an emotionaler Gegenseitigkeit; eingeschränkte, sich wiederholende stereotype Verhaltensmuster.
- ▶ Kinder mit **häufigen Mandelentzündungen** und rezidivierenden Peritonsillarabszessen.
- ▶ **Speichelfluss** („Sabbern“) ist ein allgemeines Charakteristikum von vielen Kindern, die Bar-c. brauchen. Solche Kinder sind oft leicht oder mäßig geistig behindert.
- ▶ **Zwergenhafte** Kinder, die nicht wachsen (Kinder, die zu schnell wachsen: Calc., Phos., Sulph., Tub.).
- ▶ **Spätentwickler** (Agar., Calc-p., Phos.): Sie lernen spät sprechen und laufen, die Zahnung ist spät, sie nehmen spät an Gewicht zu oder es ist nur eine einzige dieser Entwicklungsstufen retardiert (d. h. alle Meilensteine der Entwicklung sind normal außer einem).
- ▶ **Störungen der motorischen Fähigkeiten**, Schwerfälligkeit, verzögerte motorische Entwicklung, z. B. Laufenlernen, Krabbeln, Sitzen, Puzzle zusammensetzen, Modelle bauen.
- ▶ **Rezidivierende Infektionen** des Halses nach übermäßigem Gebrauch von schweißhemmenden Pudern (Psor., Sil.).
- ▶ Generalisierte Lymphknotenschwellungen („**skrofulöse Diathese**“) mit vergrößerten Halsdrüsen, Leistendrüsen, Mesenterialdrüsen, Hilusdrüsen, Mandeln usw., teilweise auch vereitert.
- ▶ Sehr fröstelige Kinder mit großer Empfindlichkeit gegen kaltes Wetter (Cale., Kali-c., Psor., Sil.).
- ▶ Leicht ermüdet und erschöpft: Jede längere Anstrengung (z. B. auf dem Schulweg, Lesen in der Bibliothek, beim Spielen) macht sie ärgerlich und reizbar, was ihre indirekte Art ist, Erschöpfung auszudrücken.
- ▶ Die kleinste Einwirkung von kalter Luft, kaltem Wetter oder kleine Mengen kalter Getränke und kaltes Essen können zu einer Infektion der oberen Atemwege, Bronchitis, Asthma, Sinusitis usw. führen.
- ▶ Dickbäuchige Kinder mit hartem, geschwellenem Bauch.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Besorgt um die Gesundheit von nahestehenden und geliebten Menschen** (Carc., Cocc.); **Angst, sie zu verlieren** (Verlust der Unterstützung).
- **Ungeschickt aus Schüchternheit** (Ambr.); lässt Dinge aus Nervosität fallen (befangen).
- **Gewissenhaft bei Lappalien** (Carc., Kali-c.).
- **Leichtgläubig** (Bell., Puls.).
- **Angst vor belebten und lauten Straßen**, über Brücken zu gehen, vor **engen und geschlossenen Orten** (Flugzeugen, Zügen, Bussen usw.), vor Leuten, vor Meinungen anderer, vor freien Plätzen, **Fremden** und davor, **irgendetwas Neues zu unternehmen**.
- Geistesabwesende Schulkinder, besonders beim Lesen und wenn sie angesprochen werden.
- Besorgt und ängstlich nachts im Bett (Ars., Rhus-t.).
- Habgier.
- Abneigung gegen das Lesen (Nat-c., Nux-v.).
- Grundloses und übertriebenes Gelächter, manchmal auch bei Tadel (Graph.).
- Kindisches Benehmen und Klammern an Personen oder Möbel (Ars., Stram.).
- Feige Kinder, ohne jeden Mut, ihre eigene Meinung auszudrücken.
- Verlangen zu reisen (Tub.).
- Verlangen zu knabbern.
- Verlangen, andere zu erfreuen (Carc., Staph., Thuj.).
- Entwicklungsstillstand bei Kindern.
- Nimmt in der Schule an keinerlei Aktivität teil (z. B. Rhetorikkurs, Theater-AG, Sportkurse); tut letztendlich gar nichts.
- Dumpfheit durch geistige Anstrengung.
- Leicht verängstigt (Cale.) durch Kleinigkeiten.
- Fühlt sich verlassen und ohne Freunde.
- Meint, sie sehe hässlich aus (geringes Selbstbild: Lac-c.).
- Fixierung auf die Unterstützung der Mutter.
- Leichtsinnig.
- Stellt sich vor, dass sie beobachtet und ausgelacht wird oder dass man sich über sie lustig macht, wenn sie in einer Gruppe oder in einem Haus ist.
- Undeutliche Sprache.
- Unentschlossen bei Kleinigkeiten (Graph., Lyc.).
- Liebe zu Tieren.
- Liebt es, mit Puppen und im Wasser zu spielen.
- Geistige Behinderung nach organischen Gehirnsyndromen, z. B. zerebralem Infarkt, Gehirnblutung, zerebraler Degeneration, Enzephalitis, Meningitis, subakuter sklerosierender Panenzephalitis.
- Stöhnen über Kleinigkeiten und im Schlaf während Fieber.
- Sturheit aufgrund von Schüchternheit und der Angst, irgendetwas Neues zu versuchen.
- Verschlossen (will seine Schwäche nicht zeigen).
- Empfindlich gegen Tadel; ist leicht verletzt.
- Empfindlich gegen das geringste Geräusch

- Von Natur aus sehr behutsam und vorsichtig.
- Mangel an Selbstbewusstsein.
- Kinder mit schwacher Willenskraft.

KOPF

- Kann nicht den geringsten kalten Luftzug durch einen Ventilator oder die Klimaanlage ertragen. Fühlt sich wohl und behaglich, wenn der Kopf bedeckt ist.
- Einseitiges Kopfschmerz bei Schulkindern, wenn sie der Sonne oder Lärm (besonders dem Reden von Leuten) ausgesetzt waren oder nass geworden sind.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schuppen.
 - Frühes Ergrauen der Haare.
 - Ekzematöse Hautausschläge mit trockenem Schorf und Juckreiz.
 - Kopf seitwärts geneigt.
 - Heißer Kopf bei kalten Extremitäten.
 - Hydrozephalus.
 - Impetigo.
 - Offene Fontanellen.
 - Plica polonica.
 - Talgretentionszysten.
 - Angeschwollene Hinterhauptsdrüsen.

AUGEN

- Bindehautentzündung mit Photophobie.
- Tränenfluss an der frischen Luft.
- Angeschwollene Lider am Morgen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blepharitis.
 - Hornhauttrübung.
 - Geschwülbildung auf der Hornhaut.
 - Ptosis des linken oberen Lides.
 - Gerstenkörner auf dem linken oberen Lid.

OHREN

- **Verschlechtertes Hören durch Hypertrophie der Mandeln.**
- Verschlechtertes Hören durch Lähmung des Gehörnervs.
- Gefühl, als ob das Ohr verstopft ist.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krustige, schorfige Ausschläge hinter den Ohren.
 - Mittelohrentzündung mit blutiger, eitriger Absonderung aus den Ohren.
 - Lymphknoten vor den Ohren vergrößert.

NASE

- **Schmerzhafte Trockenheit** in der Nase, die das Kind dazu zwingt, **ständig seine Nase zu schnäuzen.**
- Schnupfen mit Schwellung der Oberlippe und Nase.
- Nasenbluten beim Naseputzen am Morgen.
- Häufiges heftiges Niesen.

- Dicke, gelbe, übelriechende Absonderungen in der Nase, die Krusten oder Schorf bilden, die bis in die Nasengänge hinauf reichen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Nasenpolypen.
 - Retronasaler Katarrh.
 - Geschwürbildung an der Nasenscheidewand.

GESICHT

- Einseitiger Schweiß.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Oberlippe angeschwollen** (Bufo, Cale.).
 - Dunkelrote Lippen.
 - Gesicht wird dunkelrot beim Husten.
 - Fettiges, runzeliges, alt aussehendes Gesicht mit kränklichem Ausdruck.
 - Verhärtung oder Eiterung, mit Empfindlichkeit der Ohrspeicheldrüsen und Unterkieferspeicheldrüsen, besonders rechts.

MUND

- **Undeutliche Sprache.**
- Viel Speichelfluss, besonders während des Schlafes.
- Zahnweh beim Essen und Trinken von irgendetwas Kaltem oder Heißem.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Rezidivierender Abszess des Zahnfleisches**, das leicht blutet und eine Tendenz zur Bildung von Fisteln hat.
 - Mundgeruch.
 - Schneller Verfall der Zähne.

HALS

- **Rezidivierende Mandelentzündung bei jedem Einfall von kaltem Wetter** oder dem Genuss von kalten Speisen und Getränken.
- Rauheit im Hals von Erkältung, besonders beim Schlucken.
- Beim Schlucken das Gefühl eines Klumpens im Hals, als ob das Essen im Inneren stecken geblieben sei.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Vergrößerung und Eiterung der Mandeln**, besonders der rechten.
 - Retronasaler Katarrh.
 - Verhärtung der Mandeln.
 - Submaxillare und submentale Lymphknoten vergrößert und verhärtet.

MAGEN

- Trotz Hungers nach wenigen Bissen Abneigung gegen das Essen.
- Extremer, unlöschbarer Durst.
- Häufiges Erbrechen nach dem Trinken von Milch.
- Verdauungsstörung bei kleinen Kindern, die übermäßig viel masturbieren.
- Heißhunger, trotzdem abgemagert.
- Plötzliche Übelkeit während des Essens mit Abscheu gegen die Speisen.
- Verschlimmerung: Brot, chinesisches Essen, warmes oder heißes Essen und warme Getränke.

- Besserung: Kaltes Essen und kalte Getränke.
- Abneigung: Früchte (besonders Bananen und Pflaumen), Süßigkeiten.
- Verlangen: Eier, Süßigkeiten.

ABDOMEN

- Gasartige Aufblähung mit Stuhldrang; krümmt sich vor Schmerzen zusammen; besser durch warme Anwendungen.
- Gurgeln im Bauch.
- Schmerzhaftes Anschwellen des Bauches bei Kindern mit Marasmus, dabei dünne Beine.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Harter, fester, aufgeblasener, druckempfindlicher Bauch mit eingezogenem Nabel und Abmagerung des Körpers.
 - Verhärtete, angeschwollene Leistendrüsen.
 - Leistenbruch.
 - Ultraschall-Bild zeigt vergrößerte Mesenteriallymphknoten.

REKTUM

- Verstopfung bei Säuglingen mit erfolglosem Drängen und Anstrengen; Stuhl unzulänglich geformt, knotig oder schafkotartig.
- Jucken im After wegen Würmern.
- Schmerzlose Diarrhoe bei Kindern nach Gefühlserregung oder nach kalten Getränken.
- Abgang von reichlichen, übelriechenden Blähungen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Stuhl: Madenwürmer und Spulwürmer.

HARNWEGE

- Urinverhalt.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Lymphozyten +, Erythrozyten +.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Kryptorchismus.
- Frühe Neigung zu masturbieren.
- Wundmachender Schweiß zwischen dem Hodensack und den Schenkeln.
- Untersuchungsergebnis:
 - Verhärtung der Hoden.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Reichliche milchig-weiße Leukorrhoe bei kleinen Mädchen.
- Verspätung der ersten Menses.
- Frühe Neigung zu masturbieren.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heiserkeit und Rauheit der Stimme bei Schnupfen, bei nassem Wetter.
- Schmerzhaftes Rauheit und Wundheit im Kehlkopf wegen des ständigen trockenen Hustens.
- Rasselnder Schleim in den Luftwegen.

ATMUNG

- Asthma bei nassem Wetter und durch den geringsten kalten Luftzug.
- Kind atmet schwierig, wenn es sich abends hinlegt, aufgrund von vergrößerten Mandeln und Nasenpolypen.
- Atemnot mit Husten an der frischen Luft.
- Untersuchungsergebnis:
 - Rasselnde Atmung, als ob die Brust voll von Schleim ist.

HUSTEN

- **Quälender, trockener, kitzelnder Husten** durch Reizung der Luftwege, besonders nachts schlechter, durch Anstrengung, in kalter oder frischer Luft, in **Anwesenheit von Fremden**, bei nassem Wetter, durch kalte Getränke oder warme Speisen, beim Reden, schon beim bloßen **Darandenken** und durch Aufdecken; besser nach dem Frühstück und beim Liegen auf dem Bauch.
- Chronischer Husten bei skrofulösen Kindern.
- Husten wird durch verstärkten Speichelfluss begleitet.
- Husten scheint aus dem Magen zu kommen (Bry., Sep.).
- Rasselnder Husten, als ob viel Schleim in der Brust ist.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Lungenentzündung mit geröteten Wangen.
 - Herzklappengeräusche.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Krümmung der Wirbelsäule in der Dorsalregion.
 - Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

- **Übelriechender und wundmachender Schweiß zwischen den Zehen.**
- Nachts Schmerz in den unteren Extremitäten (Wachstumsschmerzen), der durch warme Anwendungen besser wird.
- Lähmung der Fußbeuger begleitet von Klonus des Fußgelenks (Zerebralparese).
- Stolpern beim Gehen wegen Ungeschicklichkeit der unteren Extremitäten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalte Hände.
 - Risse an den Fingerspitzen.
 - Abgemagerte untere Extremitäten.
 - Übelriechende Fußschweiße.
 - Druckempfindliche Schwielen oder wunde Hühneraugen auf den Fußsohlen.
 - Aufgesprungene Fingerspitzen.
 - Warzen an den Händen.

SCHLAF

- Träume: **Von Abenteuern** (kompensatorisch, während er in Wirklichkeit behindert und zurückgeblieben ist), Feuer (unterdrückte Gefühle, zurückgeblieben) und Missgeschicken (was wegen seiner Behinderung der Realität entspricht).

- Während des Schlags: Körperliche Unruhe und Wimmern.
- Übermäßiges Gähnen bei Kopfschmerzen und nach dem Mittagsschlaf.
- Schläft auf der linken Seite.
- Schreckt wegen schrecklicher Albträume aus dem Schlaf auf.

FIEBER

- Frost:
 - Beschwerden durch: Den leisesten kalten Luftzug, Nasswerden oder von der frischen Luft in ein warmes Zimmer gehen.
 - Einseitiges Schauern mit Gänsehaut (gesträubte Haare).
 - Schlechter: Am Abend und durch das geringste Aufdecken.
 - Besser: In einem warmen Zimmer oder von Hitze in jeder Form.
- Hitze:
 - Äußere Hitze mit Kälte des ganzen Körpers; Verlust des Appetits; Unruhe und Ruhelosigkeit, trotz großer Entkräftung.
 - Verlangen, sich aufzudecken, fröstelt aber sofort. Das Frösteln macht es unumgänglich, sich wieder zuzudecken.
 - Schlechter: Während des Schlags.
- Schweiß:
 - Reichlicher, übelriechender, einseitiger Schweiß.

HAUT

- Das Jucken ist gefolgt von Brennen und wird durch Kratzen nicht besser; kratzt die Haut auf bis es blutet; schlechter im Schlaf.
- Die Haut fühlt sich kalt an, trotz des inneren Gefühls von Hitze.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Neurodermitis.
 - Trockene, krustige, ekzematöse Ausschläge.
 - Gänsehaut.
 - Intertrigo.
 - Talgretentionszysten.
 - Warzen.

ALLGEMEINES

- **Fröstelig** mit Mangel an Lebenswärme. **Kann nicht die geringste Entblößung** eines Körperteils **ertragen**.
- **Tendenz, sich leicht zu erkälten**.
- Schlechter von **Kälte in jeder Form** (kalte Luft, kaltes Bad, kalte Getränke, kaltes Wetter, kalte nasse Anwendungen, Luftzug usw.), Vollmond, Liegen auf der schmerzhaften Seite, **Anwesenheit von Fremden** oder einem Zimmer voll von Leuten, Druck, nassem Wetter.
- Verlangen nach und besser in warmer Luft oder warmer Kleidung.
- Kleinwuchs mit Entwicklungsstillstand.
- Abmagerung trotz Heißhunger bei Säuglingen, mit schmerzhaften Drüsenverhärtungen.
- In der Familiengeschichte Missbrauch von allopathischen Arzneimitteln, Aneurysmen, Aortabeschwerden, Apoplexie, wiederholte Impfungen.

- Vorgeschichte von rezidivierenden Mandelentzündungen.
- Verstärkte Reflexe.
- Reaktionsmangel und Trägheit des Körpers.
- Nie wieder gesund seit Impfung.
- Einseitige Beschwerden: Erst die rechte, dann die linke Seite betroffen.
- Rachitis.
- Ohnmacht im überfüllten Zimmer.
- Wunden neigen zum Eitern und heilen langsam.

GEISTIGE BEHINDERUNG

Im Laufe der letzten 23 Jahre meiner Praxis habe ich folgende allgemeine Faktoren, die zu einer geistigen Behinderung führen können, beobachtet:

- Autismus (3 %).
- Fehlende Sprachanregung (2 %).
- Fehlende mütterliche Liebe und Zuwendung (30 %).
- Down-Syndrom (15 %).
- Fötale Hypoxie (10 %).
- Fötale Unterernährung (4 %).
- Fötale Frühreife (20 %).
- Fötale Trauma (5 %).
- Erblich bedingt (1 %).
- Mütterliche Infektionen (10 %).

Symptome von geistiger Behinderung bei Bar-c-Patienten, wie sie sich in der Praxis zeigen:

- Geistesabwesend.
- In Gedanken versunken.
- Denkt lange nach, bevor er antwortet.
- Abneigung gegen Vergnügen.
- Abneigung zu spielen oder spielt gern mit Puppen.
- Ungeschickt.
- Nägelkauen.
- Kindisches Benehmen.
- Klammern an die Mutter.
- Leichtgläubig.
- Wahnvorstellung, er sei vergesslich.
- Wahnvorstellung, über ihn würde gelacht oder gespottet.
- Wahnvorstellung, er würde beobachtet.
- Erschwerte Konzentration beim Lernen.
- Dumpfheit besonders am Morgen.
- Angst vor Menschenmengen, Straßen zu überqueren, vor Fremden.
- Leicht verängstigt.
- Versteckt sich.
- Kann sich schlecht entscheiden, was er tun soll.
- Übertriebenes Lachen.
- Verlust des Vertrauens.

- Murmeln im Schlaf.
- Ruhelosigkeit nach dem Essen.
- Traurig wegen Kleinigkeiten.
- Lärmempfindlich.
- Vorliebe, still zu sitzen.
- Schreckt während des Schlafs auf.
- Erschrickt bei Lärm.
- Spricht im Schlaf.
- Schüchternheit.

BARIUM MURIATICUM

(Bariumchlorid - Bar-m.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Schüchterne Kinder und deshalb nicht sehr erpicht darauf zu spielen, lieber wollen sie in einer Ecke sitzen und den anderen zusehen.
- ▶ Äußerst empfindlich auf Grobheiten.
- ▶ Feigheit mit Nachgiebigkeit, sie geben lieber nach.
- ▶ Immer wie benommen, lethargisch und Konzentrationsschwierigkeiten beim Lernen.
- ▶ Sehr wertvoll bei **Polypen im Nasen-Rachen-Raum, bei Tonsillitis und allergischem Husten.**
- ▶ In der Vorgeschichte und in der Familienanamnese viel Husten und Erkältungen.
- ▶ Mumps auf der rechten Seite (Brom, bei Mumps auf der linken Seite).
- ▶ Wiederkehrende Mittelohrentzündung besonders rechtsseitig, wenn die Absonderungen reichlich, offensiv und stinkend wie alter Käse sind.
- ▶ Ohrenschmerzen schlechter beim Naseputzen und beim Schlucken von Speisen.
- ▶ Mittelohrentzündung mit Halsschmerzen.
- ▶ Bei Zugluft ist zuerst die Nase betroffen.
- ▶ Die Erkältung beginnt mit häufigem Niesen besonders während des Schlafes; anschließend kommen reichliche, dicke, gelbe, eitrige Absonderungen aus der Nase und aus den Nasennebenhöhlen. Innerhalb weniger Stunden nach Beginn der Erkältung entwickelt sich Fieber. Die Lippen sind trocken. Im weiteren Verlauf setzt sich die Erkältung im Hals fest, wo sich die Nackenlymphknoten, die Unterkieferlymphknoten, die Speicheldrüsen und die vorderen Halslymphknoten vergrößern und entzünden.
- ▶ Weiß belegte Zunge; der Mund steht permanent offen und durch die Absonderungen aus der Nase entsteht penetranter Mundgeruch.
- ▶ Dunkler und entzündeter Rachen, rechts schlimmer. Heftige Halsschmerzen bei jedem Versuch zu schlucken, besser durch kalte Getränke.
- ▶ Vergrößerte und verhärtete Mandeln. **Vergrößerung und Kongestion der Venen** im hinteren Rachenring, der mit viel Schleim belegt ist.
- ▶ Halsbeschwerden beginnen meistens abends und werden im Verlauf der Nacht schlimmer. Morgens, wenn die Temperatur wieder fällt, fühlen sich die Patienten viel besser.
- ▶ Halsschmerzen können nach unten in die Lungen wandern und asthmatische Bronchitis erzeugen.
- ▶ Erschütternder Husten, schlimmer genau vor Mitternacht.
- ▶ Asthma schlimmer beim Hinlegen und besser beim Aufrechtstehen.
- ▶ Äußerst frostige Kinder.

BARIUM PHOSPHORICUM

(Bariumphosphat - Bar-p.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Sehr empfindlich auf autoritäres oder herablassendes Verhalten, besonders wenn es gegen einen behinderten Freund gerichtet ist.
- ▶ Abhängig von den Eltern, Lehrern oder Erziehungsberechtigten, brauchen ständige Ermutigung und Unterstützung.
- ▶ Fühlen sich in der Schule verspottet und lächerlich gemacht.
- ▶ Fühlen sich von den Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht geliebt und vernachlässigt.
- ▶ Kann sich beim Lesen oder Lernen nicht konzentrieren.
- ▶ Sehr sensibel darauf, wie Menschen miteinander umgehen.

KÖRPER

- ▶ Sehr fröstelig, schlimmer durch die geringste Kälteeinwirkung.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Geringes Selbstwertgefühl.**
- **Krankhafter Lauftrieb.**
- **Naiv.**
- Dyslexie.
- Leicht einzuschüchtern.
- Heimweh.
- Beeindruckbar.
- Verzögerte Entwicklung.
- Schüchternheit.
- Mitfühlend.
- Nachgiebiges Naturell.

HALS

- Rezidivierende Mandelentzündungen in der Anamnese.
- Untersuchungsergebnis:
 - Mandeln geschwollen und entzündet.

MAGEN

- Durst auf kalte und kohlensäurehaltige Getränke.
- Verlangen: Süßigkeiten.

BRUST

- Bronchitis.
- Untersuchungsergebnis:
 - Rasselgeräusche ++.

ALLGEMEINES

- **Fröstelig; Kälte in jeder Form verschlechtert.**
- Verzögerte Entwicklung.
- Leukämie im Kindesalter (Ben.).
- Zwergwuchs.
- Drüsenschwellungen.
- Fettleibigkeit.
- Rechtsseitige Beschwerden.

BARIUM SULPHURICUM

(Bariumsulfat - Bar-s.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Feigheit.
- ▶ Von anderen abhängig.
- ▶ Leicht in Verlegenheit gebracht durch den geringsten emotionalen Konflikt, besonders mit Freunden oder in der Familie.
- ▶ Leicht zu erschrecken.
- ▶ Unterwürfige Natur.
- ▶ Sie denken, sie sähen lächerlich aus und fühlen sich daher ausgelacht und von anderen verspottet.
- ▶ Schüchtern beim Auftreten in der Öffentlichkeit.

KÖRPER

- ▶ Heißer Kopf mit kalten Extremitäten.
- ▶ Verhärtung oder Eiterung der zervikalen Lymphknoten.
- ▶ Schlimmer durch Kälte, aber besser in frischer Luft.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Immer in Eile.
- Abneigung gegen jede Form von körperlicher oder geistiger Anstrengung.
- Abneigung gegen Gesellschaft und angesprochen zu werden.
- Launisch.
- Sehr kritisch.
- Geistesverwirrung, die in frischer Luft besser wird.
- Verlangen nach vielen Dingen, manchmal nach mehr, als sie braucht.
- Furcht vor Konversation oder mit jemandem zu reden.
- Furcht vor Menschenmengen.
- Eifersucht.
- Mangel an Selbstvertrauen.
- Stöhnen.
- Misstrauisch.
- Sprechen im Schlaf.
- Neigt dazu, beim Sprechen Worte zu vergessen.

KOPF

- Jucken der Kopfhaut.
- Schweiß am behaarten Kopf.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Krusten oder Schuppenbildung.
 - Heißer Kopf mit kalten Extremitäten.

AUGEN

- Verklebung der Lider am Morgen.
- Lähmung des Sehnervs.
- Photophobie.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Lidentzündung, Bindehautentzündung.
 - Hornhauttrübung.
 - Hervortretende Augen.
 - Rote Augen.

OHREN

- Jucken im Gehörgang.
- Schmerz im rechten Ohr.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blutige Absonderung aus den Ohren.
 - Ausschläge hinter den Ohren.

NASE

- **Schnäuzt sich dauernd.**
- Blutige Absonderungen oder Nasenbluten beim Schnäuzen der Nase.
- Innen trocken.
- Fließschnupfen bei Husten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Trockene, harte Krusten oder Schuppen in den Nasenlöchern.
 - Schniefen.
 - Schwellung der Nase.

GESICHT

- Das Gesicht errötet bei Aufregung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Empfindlichkeit und Verhärtung der submaxillären Lymphknoten.
 - Akne und schmerzhafte Furunkel im Gesicht, besonders an der Nase.
 - Trockene und rissige Lippen.
 - Herpes- oder ekzematöse Ausschläge im Gesicht.
 - Schwellung der Ohrspeicheldrüsen.
 - Zucken der Gesichtsmuskeln.

MUND

- Schwierigkeiten mit dem Sprechen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blutendes Zahnfleisch, das schlaff, geschwollen und von den Zähnen gelöst ist.

- Tröpfelnder Speichelfluss.
- Rissige Zunge mit weißem Belag.
- Mundgeruch.

HALS

- Chronische Halsentzündung.
- Trockenheit mit Neigung zu häufigem Räuspern.
- Getränk läuft beim Schlucken zur Nase heraus.
- Feste Speisen sind schwierig zu schlucken.
- Krämpfe der Speiseröhre erschweren das Schlucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verhärtung der zervikalen Lymphknoten.
 - Die Mandeln sind rot und entzündet, neigen zu Eiterung.

MAGEN

- Kann keinen Hunger ertragen.
- Wechselhafter Appetit.
- Aufstoßen nach dem Trinken von Wasser.
- Schluckauf.
- Unstillbarer Durst.
- Abneigung: Speisen.
- Verlangen: **Schokolade** und Süßigkeiten.

ABDOMEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Vergrößerte Mesenterialdrüsen.
 - Bei Palpation: Aufgetrieben, gespannt und hart.
 - Ultraschallbild: Verkalkung der Mesenteriallymphknoten.

REKTUM

- Verstopfung mit vergeblichem Pressen; harte und knotige Stühle.
- Durchfall nach gewöhnlicher Erkältung (Dulc.).
- Übelriechende Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dauernde Feuchtigkeit am Anus.
 - Hornhautverhärtungen, die zu großer Schmerzhaftigkeit neigen.
 - Äußere Hämorrhoiden.
 - Blutungen aus dem Anus.
 - Setzt mit dem Stuhl Madenwürmer ab.

HARNWEGE

- Plötzlicher Harndrang, muss sich beeilen oder der Harn würde herausspritzen.
- Reichliches Urinieren nachts.
- Nächtliches Bettnässen.
- Harnverhaltung.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Schweiß am Skrotum.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heiserkeit.
- Schleim in der Luftröhre.

ATMUNG

- Asthmatisch.
- Schwierig nachts.
- Untersuchungsergebnis:
 - Rasselnde Atmung.

HUSTEN

- **Fühlt sich von Hustenanfällen gequält.**
- Husten durch Reizung oder Kitzeln in Kehlkopf und Luftröhre.
- Husten durch Sprechen.
- Husten in kalter Luft oder beim Aufstehen am Morgen.
- Spärlicher, klebriger, gelber Schleim, nur unter Schwierigkeiten ausgeworfen.
- Krampfhafter und erstickender Husten.
- Keuchhusten.

BRUST

- Bronchitis.
- Untersuchungsergebnis:
 - Schwellung der Achseldrüsen.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - CT der Halswirbelsäule zeigt einen kalten Abszess.
 - Steifheit und Anspannung der Muskeln in Hals- und Lendenregion.
 - Schwellung und Verhärtung der zervikalen Lymphknoten.

EXTREMITÄTEN

- Zucken der Beine im Schlaf.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Übelriechender Fußschweiß.
 - Kälte von Händen und Füßen.
 - Rissige und trockene Haut an Händen und Fingern.
 - Schmerzhafte Hühneraugen.

SCHLAF

- Ruheloser Schlaf.
- Schlaflosigkeit nachts, schläfrig am Tage.

FIEBER

- Die Temperatur steigt besonders abends an.

HAUT

- Heftiges Jucken, das trotz Kratzen unverändert bleibt.
- Juckreiz beim Warmwerden im Bett.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Fühlt sich kalt an.
 - Herpesausschläge.
 - Kleine Warzen.
 - Eiternde Ausschläge.
 - Urtikaria.
 - Bläschen-Ausschläge nach Kratzen.

ALLGEMEINES

- **Verlangen nach und besser in frischer Luft.**
- Drüsenentzündung.
- Entwicklungsstillstand.
- Kaltes und feuchtes Wetter verschlimmert.
- Zwergwuchs.
- Drüsenerkrankungen: Krebs, Schwellung, Entzündung etc.
- Mattigkeit mit Verlangen, sich ständig hinzulegen.
- Erkältungsneigung.
- Wunden neigen zu langsamer Heilung.

BELLADONNA

(Tollkirsche - Bell.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ AufmerksamkeitsDefizitSyndrom bei Kindern, deren Mutter während der Schwangerschaft vom Ehemann oder den Schwiegereltern verärgert, getadelt, verachtet oder ungerecht behandelt wurde. ADS und Dyslexie bei Kindern sind charakterisiert durch die Symptome: - Achtlos.
 - Aufsässig, dickköpfig.
 - Beißt in Gegenstände und beißt Personen.
 - Chaotisch.
 - Destruktiv.
 - Dämmliches Grinsen.
 - Fehler beim Sprechen, bei der Arbeit.
 - Flüchten, versucht wegzurennen.
 - Fröhlichkeit, albern.
 - Furchtlos.
 - Gedächtnisschwäche für Fakten und für das, was er gelesen hat.
 - Geistige Anstrengung verschlimmert.
 - Impuls, absurde Dinge zu tun.
 - Kleptomanie.
 - Klettern.
 - Kriechen.
 - Leichtsinnig.
 - Mathematik, rechnen, Unfähigkeit zu.
 - Monomanie.
 - Nachahmen.
 - Rennt überall herum, rennt gegen Dinge.
 - Ruhelosigkeit, geschäftig, es treibt ihn von Ort zu Ort, muss sich dauernd bewegen.
 - Schlägt sich und andere.
 - Selbstgespräche.
 - Singen.
 - Springen.
 - Tanzen.
 - Treten.
 - Trotzig.
 - Ungeduld.
 - Verspielt.
 - Zerbricht Dinge.
 - Zerreißt Dinge.
 - Zorn mit rotem Gesicht.

- ▶ Kindliche **Verhaltensstörungen nach Geburtstraumen** (Glon., Nat-s., Op.).
- ▶ **Hochmütige** Kinder, die stolz sind auf ihre vornehme Herkunft; die gerne die besten Kleider tragen und teure Dinge besitzen, die sonst keiner hat.
- ▶ **Frühreife** Kinder (Cale., Lach., Med., Verat.).
- ▶ Hastige Sprache.
- ▶ Eile beim Trinken, Essen und bei Bewegungen.
- ▶ Kleinkinder, die Tag und Nacht grundlos weinen (Syph.).
- ▶ Lebhaft, freundlich und unterhaltsam, wenn es ihnen gut geht. Gewalttätig und delirant, wenn sie krank sind.

KÖRPER

- ▶ **Absonderungen** sind **heiß** und **spärlich** (Tränenfluss, Schnupfen, Urin).
- ▶ **Heißer Kopf**, Hände und **Füße kalt** und blutunterlaufene Augen.
- ▶ Schmerz verursacht **Rötung** von Gesicht und Augen.
- ▶ Schweiß auf der Nase.
- ▶ **Rechtsseitige** Beschwerden.
- ▶ Bell steht für Heftigkeit und Plötzlichkeit des Anfalls (Kopfschmerzen, Fieber, Kolik etc.).
- ▶ Trinkt in kleinen Schlucken.
- ▶ Trockener Mund mit Abneigung gegen Wasser ist die wertvollste Indikation für dieses Mittel, die ich in meiner Praxis beobachtet habe.
- ▶ Helles Haar, blaue Augen, großer Kopf und feines Aussehen mit zarter Haut.
- ▶ Im Entzündungsbereich lokal brennende Hitze, Rötung, Schwellung und Berührungsempfindlichkeit.
- ▶ Überempfindlichkeit aller Sinne; sehr scharfes Gehör.
- ▶ Schmerzen meist im Kopfbereich (Acon.: Herz- und Brustgegend).
- ▶ Schmerzen anfallsweise (Cupr.).
- ▶ Rote, heiße Haut; gerötetes Gesicht, glänzende Augen.
- ▶ Empfindlich gegen Luftzug, besonders bei unbedecktem Kopf, Gesicht und Hals (Acon., Hep., Sil.).

GEMEINSAME MERKMALE VON BELL., HYOS. UND STRAM.

Hyos. und Stram. sollten immer von Bell, unterschieden werden, da sie viele gemeinsame Symptome haben. Einige davon sind:

- Abneigung gegen Wasser.
- Abneigung zu trinken.
- Beißen.
- Delirium bei Fieber.
- Delirium durch Schmerzen.
- Delirium, redselig.
- Destruktivität.
- Durstig im Hitzestadium.
- Eile in der Bewegung.
- Fieberkrämpfe.

- Furcht vor Hunden.
- Furcht vor Wasser.
- Gesichtsschweiß.
- Gesten, macht unwillkürliche, mit den Händen.
- Hastig und albern, redet.
- Heftige Kopfschmerzen.
- Konvulsionen im Schlaf.
- Lautes Lachen.
- Meningitis.
- Nackt, will sein.
- Photophobie.
- Pupillen erweitert.
- Redseligkeit.
- Reichlicher Speichelfluss.
- Rennt herum.
- Rollende Bewegungen des Augapfels.
- Rotes Gesicht.
- Rote Verfärbung der Augen.
- Schimpfen.
- Schlagen.
- Schreck, erwacht wie durch.
- Sehnerv betroffen.
- Singen.
- Sprechen im Schlaf.
- Tanzen.
- Unterdrückung von Urin bei Fieber.
- Zähneknirschen im Schlaf.
- Zusammengepresste Kiefer.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Schimpft** und **flucht**.
- Zorn führt zu **Destruktivität** und **Gewalt**. **Raserei** mit **gesteigerter Körperkraft** (Agar., Hyos.). Zorn und Aggression werden charakterisiert durch:
 - Beißen.
 - Zerschlagen von Gegenständen.
 - Grausamkeit: Liebt es, Tiere und Menschen leiden zu lassen.
 - Tritt, schlägt sich selbst und andere.
 - Zieht an den Haaren von anderen und sich selbst.

- Rotes Gesicht.
- Kreischen.
- Spucken.
- Zerreißen.
- Verlangen, **halbnackt** um das Haus zu streifen; weigert sich, vernünftige Kleidung zu tragen (Hyos., Phos., Verat.).
- Verlangen zu stehlen: **Kleptomanie** (Puls.).
- Furchtsame Kinder, die **schnell zusammenschrecken** (hoher Empfindlichkeitsgrad).
 - Furcht vor Tieren (auch Haustiere), **besonders Hunde (hauptsächlich Furcht, dass der Hund beißt und dass der Hund näher kommt, da das Kind es nicht mag, wenn irgendjemand ihm nahe kommt).**
 - Furcht vor Menschenmengen (wieder die gleiche Furcht, dass ihm jemand nahe kommt).
 - Furcht vor Dunkelheit so stark, dass sie sich nicht sicher fühlen, ehe nicht jede Tür, unter dem Bett, die Fenster und alle Winkel des Hauses auf Räuber oder Geister kontrolliert wurden.
 - Furcht vor hochgelegenen Orten (z. B. Karussells auf dem Jahrmarkt).
 - Furcht vor Geräuschen (hoher Empfindlichkeitsgrad).
 - Furcht vor Berührung, dass ihnen jemand zu nahe kommt (Ant-c.).
 - **Furcht vor Wasser** (kann daher nicht schwimmen lernen, wie Stram.).
- **Laute Persönlichkeit**, ungestüm und dreist beim Reden, lacht laut in seiner Gruppe: kann auch hinterlistig und durchtrieben sein (Verat.).
- **Boshafte** Kinder (Cina, Cham.), die es lieben, an den Haaren der Leute um sie herum zu ziehen oder im Zorn an den eigenen Haaren zu ziehen.
- **Frühreife** Kinder, aber langsam beim Sprechenlernen.
- Sehr **empfindliche Kinder**, bei denen sich die Empfindlichkeit auf emotionale Faktoren bezieht, wie Ermahnung (selbst wenn sie freundlich vorgebracht wird) oder wenn ihnen etwas verweigert wird.
- Abwechselnde Gemütslagen: Manchmal spielen sie den Teufel, manchmal den Engel.
- Einerseits können sie recht herzlich sein, mit sehr scharfen Sinnen, schnelles Lernen, obwohl schwach in Mathematik und Rechnen; andererseits können sie sehr aufbrausend sein, können beleidigend und gewalttätig werden während ihrer Anfälle von Raserei.
- Verlangen, sich zu verstecken; verstecken auch Dinge (Staph., Tarent.) wie Schlüsselbunde, Brieftaschen und Spielzeug.
- Emotionale und geistige Beschwerden, die nach Verletzungen oder Unfällen entstehen (Camph., Cic.).
- Heimweh (kann an langen Schulfahrten nicht teilnehmen).
- Für Kinder, die immer beim Essen weinen (oftmals täuschen sie es vor).
- In Eile; machen Fehler beim Sprechen (Nat-m.).
- Faul, immerzu spät (Hyos., Puls., Stram.).
- Aufsässig und stur; können Ermahnungen nicht annehmen. Sie tun, was sie tun wollen, bis hin zu völliger Leichtsinnigkeit.
- Ruhelos, mit der Tendenz umherzuwandern; fasst alles an.

KOPF

- **Bohrt den Kopf** in das Kissen bei Kopfschmerzen durch Anstieg des intrakraniellen Drucks sowie bei raumfordernden Prozessen oder cerebrovaskulärem Insult.
- Kann es nicht ertragen, **unbedeckt** zu sein, extrem empfindlich gegen Luftzug (Psor., Sil.).
- Die Stirn ist äußerst empfindlich; schließt die Augen bei Kopfschmerzen.
- Migräne nach dem Haareschneiden (Sep.) und durch Haarewaschen (Am-c., Cale.).
 - Erscheint besonders in der Schläfenregion, begleitet von Übelkeit.
 - Erbrechen und Genickschmerzen.
 - Schlimmer: Luftzug, kaltes Baden, Naseputzen.
 - Besser: Schließen der Augen (Sil.), kalte Anwendungen (Aloe).
 - Fließschnupfen (Lach., Stict.).
- Unfähig, den Kopf zu heben (cerebrale Lähmung).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hirnblutung.
 - CT: cerebrales Hämatom.
 - Enzephalitis.
 - Die Haare sind brüchig.
 - Der Kopf wird nach hinten gezogen.
 - Hitze des Kopfes mit Kälte der Extremitäten (Arn., Fern, Sulph.).
 - Hitze des Kopfes mit Durchfall (Apis., Bry.).
 - Kernig-Zeichen ++.
 - Meningitis.
 - MRT: Hydrozephalus.
 - Nackensteifigkeit.
 - Zieht an seinen Haaren (Tarent.).

AUGEN

- **Tränenfluss** bei **Husten** (Euphr, Nat-m.), **Fieber** (Puls.) und **Kopfschmerzen** (Ign., Plat.).
- Ekchymose durch Husten (Arn.).
- Neuritis des Sehnervs.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Augen **rot, injiziert**; dauernder Tränenfluss.
 - Augen nach **innen** gedreht (Ruta) (Paralyse des VI. Hirnnervs - Nervus abducens; wenn nach außen gedreht: Lähmung des III. Hirnnervs - Nervus oculomotorius).
 - Blepharitis.
 - Blaue Skleren.
 - Chemose.
 - Konjunktivitis.
 - Dauernde pendelartige Bewegungen des Augapfels (Agar., Gels.).
 - Augen geöffnet im Schlaf.
 - Starrende Augen beim Erwachen oder bei Kopfschmerzen.

- Keratitis.
- Augenlider verklebt.
- Hornhauttrübung.
- Lähmung der Augenlider (Lähmung des N. oculomotorius und N. facialis).
- Hervortretende Augäpfel (Nat-m., Stram.).
- Enge Pupillen bei Kopfschmerzen, erweitert bei Fieber.
- Retinaeinblutungen.
- Trachom.

OHREN

- **Das Kind erwacht schreiend mit heftigen Ohrenscherzen** (Cham., Ferr-p.).
- Vermindertes Hörvermögen bei Schnupfen (Nux-v., Puls.).
- Die Ohrenscherzen erstrecken sich zum Gesicht und den Zähnen.
- Schmerzen im rechten Ohr, schlimmer nachts und beim Kauen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ohr **rot** (Apis., Puls.) und **heiß** (Acon.).
 - Absonderung: Blutig und eitrig.
 - Hämatom.
 - Otitis media.

NASE

- Nasenbluten **hellrot** (Hyos., Phos.), **heiß** (Acon.), bei Fieber (Op.), bei Kopfschmerzen (Acon., Agar.).
- Scharfer Geruchssinn.
- Schnupfen mit Husten.
- Schnupfen mit Fieber.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Bohrt** mit den Fingern in der **Nase** (Cina, Sil.).
 - Die Nase erscheint **rot** mit **leuchtender Spitze** (Phos.).
 - Dauerndes Reiben der Nase.
 - Absonderungen: Wässrig oder dick, weiß.
 - Nasenpolypen.

GESICHT

- **Dunkelrot** (10 % der Fälle, sonst meistens bei Sulph.-Kindern), bläulich-rot, häufig die Farbe wechselnd, sehr blass beim Hinlegen (Gegenteil von Acon.). Rotes Gesicht, wenn er sich aufsetzt.
- Entzündung der Parotiden metastasiert zum Hirn.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kaubewegungen** (Hell., Stram., Verat-v.).
 - Ausdruck: **Wie betrunken** (Bapt., Gels.), furchtsam, **abgehärmt** (Bry., Kali-c.), dumm und leer.
 - **Scharlachrot** bei Husten, bei Konvulsionen, bei Aufregung, bei Fieber, bei Schmerzen. (Ungefähr 90 % meiner Bell-Patienten haben scharlachrote Gesichter, während ungefähr 10 % dunkelrot sind.)
 - Zusammengepresste Kiefer.
 - Rissige Oberlippe.

- Verzerktes Gesicht mit schmerzvollem, leidendem Ausdruck.
- Faltiges Gesicht.
- Lecken der Lippen (Agar., Lyc., Stram.).
- Rote, nach außen gekehrte Lippen (Apis).
- Submaxillardrüsen und Parotiden vergrößert.
- Zittern oder Zucken der Lippen.

MUND

- Beißt sich die Zunge.
- Schwierige Zahnung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Hellrote** Zunge, rote Streifen in der Mitte.
 - **Verlangen, die Zähne andauernd zusammenzubeißen** (Hyos., Lyc.).
 - **Erdbeerzunge** (Ant-t., Lach., Tub.).
 - Beißt auf das Glas beim Füttern (Cina, Cupr.).
 - Blutendes Zahnfleisch.
 - Zunge mit Rissen.
 - Schaum vor dem Mund, besonders bei Konvulsionen.
 - Zähneknirschen bei Konvulsionen und im Schlaf.
 - Offener Mund.
 - Lähmung der linken Zungenhälfte (Paralyse des N. hypoglossus auf der linken Seite: Plb).
 - Heraustreten der Zunge beim Husten.
 - Schmatzende Zunge (Lyc.).
 - Stottern.
 - Geriffelte Zunge (Nat-ar.).

HALS

- **Erstickungsgefühl** beim Tragen von enger Kleidung (Apis, Lach.) oder beim Schlafengehen (Lach., Nux-v.).
- **Halsschmerzen** gewöhnlich auf der rechten Seite, **erstrecken sich zum Ohr** (Hep., Lac-c., Lach.).
- Wiederkehrende Tonsillitis bei Kindern, wenn sie kaltem Luftzug ausgesetzt sind.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Pulsierende Karotiden** (Cact, Gels., Op.).
 - Halsdrüsen vergrößert.
 - Glänzendes Aussehen.
 - Schweiß am Hals.
 - Retronasaler Katarrh.
 - Tonsillenvereiterung.
 - Hals dunkelrot.
 - Tonsillen sehen bedrohlich aus: dunkel, rot, entzündet und geschwollen (Gins.).
 - Verlängertes Zäpfchen.

MAGEN

- **Akute Gastritis** bei Kindern nach Gebrauch von analgetischem und antipyretischem Sirup.

- **Würgen** (Cina) durch Husten (Dros.).
- **Durstlosigkeit** bei **Fieber** (Apis, Gels., Sep.).
- **Erbrechen durch erhöhten intrakraniellen Druck** (Apis, Cocc., Hell., Zinc.), bei Durchfall, beim Husten, bei Fieber, nach Milch.
- Brennender **Durst**, heftig, extrem, unstillbar, besonders **nach dem Schlaf** (Borx., Ther.), auf große Mengen und häufig (Bry., Nat-m.) oder auf kleine Mengen und häufig (Ars., Chin.).
- Launischer Appetit; hungrig, aber weiß nicht auf was oder weist Dinge zurück, die ihm angeboten werden (Bry., Cina., Puls.).
- Das Kind bittet um Wasser, aber lehnt es ab, wenn es ihm gegeben wird.
- Magenschmerzen durch Husten oder durch Erschütterung beim Autofahren.
- Schwallartiges Erbrechen (Verat.).
- Erbrechen begleitet von Schweiß.
- Verschlimmerung: Apfel, Butter, Milch (sogar nur durch den Geruch), Schweinefleisch, verdorbene Wurst und Zucker.
- Besserung: Kalte Speisen und **Zitronen**.
- Abneigung: Eier, Fette, Fisch und Früchte.
- Verlangen: **Brot** (Ars., Cina., Puls.), Brot und Butter (Ferr., Ign.), kalte Getränke, kalte Speisen, **Zitronen** (Merc., Verat.), Süßigkeiten und warme Speisen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Schweiß auf dem Epigastrium (Sec.).

ABDOMEN

- Das Kind muss sich mit Kolikschmerzen bei Verstopfung oder nach Milch **zusammenkrümmen und zieht die Beine gegen den Bauch** (Coloc., Sep.).
- Das Abdomen ist aufgetrieben und schmerzhaft bei Berührung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Empfindlichkeit** im rechten und linken Hypochondrium und am **McBurney-Punkt**.
 - Borborygmus.
 - CT: Mesenterialdrüsen vergrößert.
 - Leistenbruch.
 - Leber vergrößert und hart.
 - Milz vergrößert.
 - Stuhlkultur: *Vibrio cholerae*.
 - Strangulierter Leistenbruch mit Peritonitis (Lach., Tab., Verat.).
 - Tympanitis +.
 - Nabel gedehnt (Coloc.).

REKTUM

- Ständig stinkende Blähungen mit **saurem** Geruch (Mag-c.).
- Durchfall am Morgen, treibt das Kind aus dem Bett; nach kalten Getränken; bei Zahnung; bei **Hydrozephalus** (Hell., Zinc.).
- Unwillkürlicher Abgang von **normalem** oder hartem Stuhl nachts im Bett (Aloe) oder unwillkürliche Stühle, die durchaus geformt sind (Hyos.), als Folge eines offen stehenden Anus oder nach Operation einer Meningomyelozele oder sonstiger Eingriffe an der Wirbelsäule.
- Stuhl: Grün, schmal, **lang** oder geronnen (Cale., Valer.).

- Untersuchungsergebnisse:
 - Rektumprolaps.
 - Spulwürmer.

HARNWEGE

- Unterdrückung von Urin in Fällen von Septikämie.
- Dauernder Harndrang.
- Harnverhalt nach Schreck bei Kindern (Op) oder Neugeborenen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Albumin (besonders nach Infektionskrankheiten).

GENITALIEN

- Das Kind fasst dauernd an die Genitalien (Merc., Stram., Zinc.).
- Neigung zu masturbieren.
- Untersuchungsergebnis:
 - Hodenhochstand (Puls., Zinc.).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Untersuchungsergebnisse:
 - Stridor (Lach., Op., Samb.).
 - Glottisödem (Brom., Phos., Spong.).
 - Rasseln in Larynx und Trachea (Hep., Ipec.).
 - Die Stimme ist heiser und klingt sehr rau.

ATMUNG

- Asthma bei **warmem, feuchtem** (schwülem) Wetter (Carbo-veg., Syph.), sobald das Kind einschläft oder in einem warmen Raum; fühlt sich besser durch Beugen des Kopfes nach **hinten** (Spong., Verat.) und draußen in der kalten, frischen Luft.
- Neugeborenenasphyxie (Camph., Hydr-ac.).
- Die Atmung wird beim Husten behindert.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Kind fasst sich an den Hals beim Husten (Acon.).
 - Atmung: Stöhnend, keuchend, röchelnd und rasselnd.
 - Röntgen: Verdichtung in der rechten Lunge.

HUSTEN

- **Bellender Husten** nachts gegen 23 Uhr.
- Trockener Husten bei Fieber, durch **Schreck** (Cina), Bewegung (Iod.) oder **Druck auf die Luftröhre** (Lach.); besser durch leeres Schlucken (Verat.).
- Blutiger Auswurf am Morgen und nach dem Essen.
- Der Husten ist begleitet von erhöhtem Speichelfluss und Nasenbluten und endet in einem Niesen.
- Anfallsweise Hustenanfälle, die aus 2-3 kurzen Hustenstößen bestehen.
- Krampfartiger Husten nach Mitternacht (Hyos., Kali-c.).

RÜCKEN

- Spinale Meningitis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Emprosthotonus (Canth., Ipec.).
 - Opisthotonus.
 - Spina bifida (Cale., Sil.).

EXTREMITÄTEN

- Ruhelose Beine nachts im Bett (Rhus-t., Tarent.) und bei Fieber (Cale., Rhus-t.).
- Ungeschicklichkeit: Lässt Dinge aus der Hand fallen oder stolpert beim Laufen (Agar., Caust.).
- Angeborene Hüftgelenksluxation.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Chorea.
 - Kalter Schweiß.
 - Kälte der Füße bei Fieber, Kopfschmerzen oder im Schlaf.
 - Eiskalte Hände und Füße.
 - Morbus Perthes (Hüftkopfnekrose).
 - Daumen nach innen geschlagen (Cupr., See.).

SCHLAF

- **Betäubender Schlaf bei Fieber** (Bapt.).
- Wachkoma.
- Ruheloser Schlaf, gestört durch schreckliche Bilder.
- Schläft auf dem Bauch mit Armen/Händen auf dem Abdomen oder unter dem Kopf oder neigt dazu, seinen Kopf in das Kissen zu bohren.

FIEBER

- Brennende Hitze mit unstillbarem Durst und Delirium.
- Hyperpyrexie mit Betäubung (Nat-m., Op.), bei der das Temperaturmaximum (> 41,5 °C) nachts im Schlaf erreicht wird.
- Intensive Hitze von Kopf und Gesicht, während der Rest des Körpers kalt ist (Ferr-p.).
- Schweißbildung beim Schließen der Augen (Bry., Con.).
- Abneigung, sich bei Fieber aufzudecken.
- Frost durch Schreck (Gels.).
- Schweiß fehlt gewöhnlich bei Fieber.

HAUT

- Furunkel in jedem Frühling (Crot-h., Lach.).
- Trockene, brennende Haut mit Unfähigkeit zu schwitzen.
- Schweiß nach dem Urinieren, durch Husten, bei Durchfall, nach dem Essen warmer Speisen, durch Schreck, im Schlaf; färbt das Bettzeug gelb.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Purpura.
 - Rötung der Haut nach Kratzen.
 - Tinea cruris (Canth.).

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Zahnung, Fieber, Schreck, Schmerz (Coloc., Lyc.), Ärger und Bestrafung (Ign.).
- Während Konvulsionen: Blasses oder rotes Gesicht mit **erweiterten Pupillen** (Cina, Verat-v.), kalte Füße.
- Konvulsionen bei Neugeborenen durch **erhöhten intrakraniellen Druck**.

ALLGEMEINES

- Hervorragendes Mittel bei **Verschlimmerung** der Beschwerden **in den Nachmittags- und Abendstunden**.
- Blutungsneigung, bei der das **Blut hellrot** ist und sich **bei Berührung heiß anfühlt** (Acon., Sabin.).
- Beschwerden durch Verletzungen; Erschütterungen, Verrenkungen und Verstauchungen.
- Zugluft verschlechtert.
- Abmagerung bei Kindern (Acet-ac., Arum-t.).
- Neigung zu Abszessbildung; hilft entweder, den Abszess einzuschmelzen oder die Eiterung zu beschleunigen.
- Nützlich bei Missbrauch von Jod, das z. B. in Hustensirup enthalten sein kann.

HERKUNFT

- Synonym: Atropa belladonna aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae)

BELLIS PERENNIS

(Gänseblümchen - Bell-p.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Prellungen und Verletzungen.**
- ▶ Muskelschmerzen und Lahmheit nach einer Verletzung; das Kind weigert sich zu gehen, sogar noch Wochen oder Monate nach der Verletzung.
- ▶ Nie mehr richtig gesund seit einer mechanischen Verletzung des tieferen Gewebes.
- ▶ Schnupfen, Nasenbluten, Halsschmerzen und Fieber, wenn bei Erhitzung kalte Getränke oder gekühltes Wasser oder eiskalte Drinks konsumiert werden.
- ▶ Akne und atopisches Ekzem im Gesicht.
- ▶ Schlaf meist in Bauchlage.
- ▶ Neigung zur **Masturbation** (Staph., Med.).

HERKUNFT

- Auch Tausendschön genannt, gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae/ Compositae).
- Bei Dr. Burnett, der dieses Mittel sehr oft verordnet hat, kann man viel über die praktische Anwendung von Bellis perennis lernen.

BENZOICUM ACIDUM

(Benzoessäure - Benz-ac.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Viele Fehler in der Schule; beim Schreiben, indem sie Buchstaben und Worte auslassen, und auch beim Sprechen lassen sie Worte aus.
- ▶ Reizbar und deshalb oft lautes Schreien.
- ▶ Kinder wollen auf den Arm und nicht in ihrer Wiege oder ihrem Bett liegen. Auch größere Kinder wollen sich nicht hinlegen, sondern getragen werden.
- ▶ Das Kind zittert, schaudert oder bekommt einen großen Schreck, wenn es Menschen mit Behinderungen sieht.
- ▶ Zystische Tumoren auf den Lidern wie z. B. ein Chalazion (Hirse Korn).
- ▶ Beißt auf die Unterlippe.
- ▶ Niesen bei jeglicher Staubbelastung.
- ▶ Rissige Zunge.
- ▶ **Bettnässen** in der ersten Nachthälfte; hat sich angewöhnt, ständig zu urinieren, und einen permanenten Harndrang entwickelt. Der Urin riecht streng und ist bräunlich oder dunkelbraun; offensiver Urin, der durch die im Urin vorhandene Harnsäure streng nach Ammoniak riecht. Sehr selten Sediment im Urin.
- ▶ Durchfall bei Zahnung. Schaumiger, reichlicher, vergorener Stuhl, wie Seifenlauge oder wie klares schaumiges Wasser; riecht penetrant nach Aas.
- ▶ Rheumatismus bei Kindern mit einer ausgeprägten Familiengeschichte von Sykose mit Gicht, Arthrose und Gonorrhoe. Die Fußgelenke, Finger und Hände sind am meisten betroffen.
- ▶ Schweiß beim Essen.
- ▶ Mehr Schweiß auf der Stirn.

BISMUTHUM SUBNITRICUM

(Wismut - Bism.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Das Bism.-Kind ist das Kind, das am wenigsten geliebt wird.
- ▶ Das Kind ist sehr anhänglich, weil es ständig das Gefühl hat, von den Eltern oder von den Menschen verlassen zu sein.
- ▶ Die Kinder greifen nach den Kleidern der Menschen (der Mutter, der Krankenschwester oder der Geschwister). Die Anhänglichkeit ist so ausgeprägt, dass sie sich weigern allein zu bleiben, nicht einmal für ein paar Sekunden. Ersatzweise können sie sehr an einer bestimmten Sache hängen, wie an einem Schoßhund, einer Katze oder ihrem Lieblingsspielzeug.
- ▶ Total ängstlich und nervös beim Alleinsein. Wenn man sie dazu zwingt, allein zu bleiben, werden sie sehr stumpfsinnig, unzufrieden und schließlich teilnahmslos.
- ▶ Psychische Unsicherheit schlimmer in der Dunkelheit, abends und nachts.
- ▶ Infektionen mit Enteroviren oder Helicobacter Pylori mit gewaltsamem und lautem Aufstoßen, heftigen Schmerzen im Magen, besser durch kalte Getränke und Massage des Rückens und schlechter nach dem Essen und durch Druck. Magenschmerzen begleitet von Übelkeit, schlimmer nach Essen oder Trinken, besser durch kalte Getränke. Übelkeit mit einem Gefühl, alles, was gegessen wurde, wieder zu erbrechen.
- ▶ Extrem durstig auf große Mengen Wasser. Mitunter nach dem Trinken Erbrechen von allem, was getrunken wurde, sogar der kleinsten Menge Wasser. Erbrechen sobald das Wasser im Magen warm geworden ist.
- ▶ Schmerzhaftes Aufblähung des Abdomens aufgrund von Flatulenz.
- ▶ Anfällig für schmerzlosen Durchfall. Durchfall ist so ähnlich wie bei Cholera mit Erbrechen und unwillkürlichem Stuhlabgang. Dünner, wässriger Stuhl.
- ▶ Bei der Zahnung entstehen die meisten der Magen- Darm-Beschwerden bei Kindern.
- ▶ Verlangen nach kalten Getränken und kalten Speisen.

BORAX VENETA

(Natriumborat - Borx.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Zappelig**, wankelmütig und unbeständig.
- ▶ Das Kleinkind schreit und **hält sich** plötzlich ohne ersichtlichen Grund am Kinderwagen oder an der Wiege **fest** (Apis, Cina, Stram.).
- ▶ Nervöse Erregbarkeit und **Überempfindlichkeit** wie bei den Natriums.
- ▶ Neugeborene reagieren **extrem schreckhaft** auf scharfe Geräusche wie: Husten, Niesen, das Weinen eines anderen Kindes, Knallkörper, Räuspern, Kleiderrascheln, ein rasselnder Schlüsselbund, eine zuschlagende Tür.
- ▶ Das Kind **schreit** und **klammert** sich an die Mutter, wenn es herumgeschwungen oder geschaukelt wird, wenn man es in einen Schaukelstuhl oder aufs Pferd setzt, die Treppe hinunter trägt oder auf Jahrmarktsattraktionen wie Schiffschaukel, Karussell und Achterbahn (Lac-c., Sanic.).
- ▶ Das Kleinkind **weint heftig in regelmäßigen Abständen**. Charakteristisch daran ist, dass das Weinen nach ein paar Minuten aufhört und das Kind wieder heiter ist und spielt (nicht mit Cina verwechseln!).
- ▶ Ängstlich, ruhelos, nervös und erregbar (Kent).
- ▶ Heftiges Erschrecken durch plötzliche laute Geräusche (Bell., Kali-c.).
- ▶ Neugeborene und Säuglinge fürchten sich bei Abwärtsbewegungen, z. B. wenn man sie ins Bett oder in den Kinderwagen legt (Cale., Gels.).
- ▶ Abscheu vor der Brust (vielleicht weil die Milch schlecht schmeckt, jedenfalls nicht wegen eines körperlichen Problems beim Kind).
- ▶ Nervöse Erregbarkeit, Aufschreien und Weinen dauern meist bis 23 Uhr; erst danach wird das Kind langsam müde und die Beschwerden verschwinden.

KÖRPER

- ▶ **Plica polonica**: Das Haar verfilzt an den Spitzen und kann nicht glatt gekämmt werden (Fl-ac., Lyc., Psor., Tub., Vine.).
- ▶ **Stomatitis aphthosa** bei Neugeborenen und Kleinkindern. Bei älteren Kindern lösen salzige oder saure Speisen regelmäßig Stomatitis aus.
- ▶ **Scheu vor Abwärtsbewegung** (Calc., Gels., Zinc.) bei fast allen Beschwerden.
- ▶ Das **Haar verfilzt** sehr schnell und erscheint **ungepflegt**.
- ▶ **Rot glänzende Nase** bei Jugendlichen, mit krustigen Nasenlöchern.
- ▶ **Schreit auf** vor dem Urinieren (Lyc., Sanic., Sars.).
- ▶ Die Nerven liegen blank (Kent).

- ▶ Das Kind verweigert das Stillen wegen schwerer Aphthen.
- ▶ Klare, dicke, heiße, ätzende Absonderung aus allen Körperöffnungen.
- ▶ Schmutzige Hautfarbe.
- ▶ Säuglinge, die von Geburt an durch ungenügende Sauerstoffversorgung zyanotisch sind (Laur.).
- ▶ Jucken, Rötung und Reizung in der Vulva und dem unteren Teil der Vagina (Vulvovaginitis) bei kleinen Mädchen (Canth.).
- ▶ Schlecht ernährte, abgemagerte, weiche und schlaffe Kinder.
- ▶ Schrumpelige Haut oder Schleimhäute.
- ▶ Ungesunde Haut, die leicht eitert.

GEMEINSAME MERKMALE VON BAR-C. UND BORX.

Bar-c. kann leicht mit Borx. verwechselt werden, weil sie viele gemeinsame Symptome haben:

- Abmagerung bei Kindern.
- Abneigung gegen Baden.
- Ängstlich bei jeder Kleinigkeit.
- Anklammern.
- Aufschrecken durch Geräusche.
- Empfindlich gegen das geringste Geräusch.
- Faulheit.
- Furcht vor dem Stuhlgang (zeitlich).
- Furcht vor Geräuschen.
- Geistige Anstrengung: Abneigung gegen, verschlimmert, unmöglich.
- Geistige Trägheit.
- Geschärfte Sinne.
- Granulationen auf den Augenlidern.
- Heftiger Zorn.
- Kalte Speisen bessern.
- Kopf, empfindlich gegen kalten Luftzug.
- Kopf, Plica polonica.
- Kopf, Schmerzen durch Geräusche.
- Kopf, Schweiß.
- Krustige Absonderungen aus der Nase.
- Leicht beleidigt.
- Leicht erschreckt.
- Neigung, sich andauernd die Nase zu schnäuzen.
- Quälender Husten.
- Reichlicher Speichelfluss.
- Rote Nase.
- Schafkot-Stuhl.
- Schlaf Lage auf der linken Seite.
- Schlaf Lage sitzend.
- Schmerzloser Durchfall bei Kindern nach dem Essen.
- Schrickt leicht zusammen.
- Schüchternheit.

- Schweiß beim Essen.
- Schweiß im Schlaf.
- Spinnwebengefühl im Gesicht.
- Sprechen, lernt nur langsam sprechen.
- Unzufrieden.
- Verlangen nach frischer Luft.
- Weigert sich zu essen.
- Zärtlich.
- Zusammenzucken durch Schreck.
- Zusammenzucken im Schlaf.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Das Kind hat Angst vor dem Reiten (aus Furcht zu fallen).**
- **Schrickt wegen Kleinigkeiten zusammen** (Kali-c.).
- Abneigung zu baden.
- Das Baby schreit, kreischt und hat Wutanfälle, wenn es gefüttert wird; schon das Befeuchten des Mundes reicht, seinen Hunger zu stillen.
- Das Kind fürchtet sich, Rolltreppen zu betreten oder mit Flugzeug, Auto oder Zug zu reisen.
- Das Kind neigt zum Treten, wenn es wütend ist (Cham., Cina).
- Zwergwuchs mit Entwicklungsstillstand bei Kindern.
- Übermäßige Furcht bei Kindern, begleitet von Schläfrigkeit.
- Furcht vor Gewitter.
- Verdrießlich und gereizt vor dem Stuhlgang (Cale.).
- Hasst Witze (Iod.).
- Nervös und leicht zu erschrecken.
- Fängt vielerlei an, aber gibt auf halbem Wege auf.
- Schweigsam bei Fieber (Gels., Ph-ac.).

KOPF

- Kopfschmerzen durch **Lesen** oder zu viel **Fernsehen** (Nat-m.), besser nach Stuhlgang (Zinc.).
- Enzephalitis mit tiefem Koma.
- Empfindlich gegen Luftzug über den Kopf.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Plica polonica** (Lyc., Vine.).
 - Kann den Kopf nicht hoch halten; scheint nach hinten zu fallen.
 - Der Kopf fühlt sich heiß an.

AUGEN

- **Schläfrig aussehende** Augen (Gels.).
- Konjunktivitis bei Neugeborenen, die per Kaiserschnitt geboren wurden.

- Nach innen gekehrte Lider mit eingewachsenen Wimpern, die die Augen zu reizen scheinen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blepharitis.
 - Dauerndes Reiben der Augen (Puls., Sulph.).
 - Risse in den Augenwinkeln.
 - Ekzeme auf den Lidern (Graph., CheL).
 - Ausfall der Augenbrauen.
 - Verdickung der Lider.

OHREN

- **Empfindliches Gehör** bei Säuglingen, das geringste Geräusch stört, sogar Papierrascheln (Asar., Ferr., Nat-c., Nat-s.); laute Geräusche scheinen weniger zu stören.
- Chronische Entzündung des äußeren Ohres (Sulph.).
- Ohrenschmerzen, besonders links, bewirken, dass das Kind dauernd mit den Fingern in den Ohren bohrt (eingeschlossenes Ohrschmalz).
- Die Schmerzen sind schlimmer durch Druck hinter den Ohren (Bell.).
- Die Schmerzen verschlimmern sich durch kalte Anwendungen (Hep., Sil.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hörtest: auditorisch evozierte Potentiale fehlen (Syph.).
 - Otitis media.
 - Eitrige Otorrhoe.
 - Sensorisch bedingte Taubheit, links mehr als rechts.

NASE

- Absonderung: **Krusten, Schorfe** bilden sich sofort neu, wenn sie abgelöst werden (Ars., Kali-bi., Psor.); wund machend, grünlich-gelb, dick, trocken und hart.
- Bohren mit den Fingern in der Nase (Cina, Sil.).
- Neigung, sich dauernd die Nase zu schnäuzen (Stict., Teuer.), bis es blutet.
- Nasenbluten beim Schnäuzen.
- Verstopfung der Nase mit Tränenfluss.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Kind **reibt** dauernd seine **Nase** oder bohrt mit den Fingern darin.
 - **Trockene, schorfige** Nasenlöcher mit Bildung von **harten, grünen Krusten**, die sich neu bilden, sobald sie abgelöst werden.
 - **Rot** leuchtende Nasenspitze (Phos., Sulph.).
 - Krusten zeigen in der Kultur ein starkes Wachstum von Klebsiella.
 - Nebenhöhlen empfindlich (Kali-bi.).

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Atopisches Ekzem** (Graph.).
 - Ängstlicher Ausdruck, besonders bei Abwärtsbewegung.
 - Rissige Unterlippe.
 - Rötliche Verfärbung um die Augen beim Weinen.

MUND

- Stomatitis aphthosa nach Chemotherapie (Nit-ac.).
- Schwierige Zahnung.
- Übermäßiger Speichelfluss bei Zahnung.
- Zähneknirschen.
- Zahnschmerzen mit erhöhtem Speichelfluss.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Wunder Mund** hindert den Säugling am Trinken (Mur-ac., Sul-ac., Sulph.).
 - Zunge: **Rissig** mit **Fissuren**; **Landkartenzunge** (Tarax.).
 - Frühe Zahnkaries.
 - Geschwüre im Mund und auf der Zunge bilden sich schnell und bluten leicht.

HALS

- **Erstickungsanfall** zwingt das Kind zu schlucken (schwacher Hustenreflex bei neurologischen Störungen: an Lach, denken!).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schwellung und Empfindlichkeit der Halsdrüsen.
 - Geschwüre im Rachen.

MAGEN

- **Extremer Durst** ohne Appetit.
- **Durst nach dem Schlaf** (Bell., Then).
- **Erbrechen nach dem Frühstück** (Carbo-veg., Fern).
- Schluckauf bei Neugeborenen und Kindern ohne jede Ursache (Ign., Nicc., Rat.).
- Übelkeit und Erbrechen beim Reisen im Auto oder mit dem Schiff.
- Würgen beim Husten (Ipec.).
- Saures Erbrechen wenn morgens nüchtern (bei Kindern, die gewöhnlich ohne Frühstück zur Schule gehen).
- „Magenhusten“: Das Kind würgt und hustet, bei Aphthen im Magen.
- Verschlimmerung: Schokolade und Früchte.
- Abneigung: Fleisch und **Muttermilch** (Ant-c., Ant-t., Lach., Merc.).
- Verlangen: Saure Speisen.

ABDOMEN

- Nach dem Stillen ist der Bauch des Kindes gebläht.
- Säuglings-Kolik: Das Kind krümmt sich.
- Eingeklemmte Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abmagerung am Bauch ++ (Cale., Plb., Sulph.).
 - Ultraschallbild: Mesenterialdrüsen vergrößert.

REKTUM

- **Schmerzloser Durchfall** nach Schokolade (Lith-c.), direkt nach dem Frühstück, bei Zahnung oder Essen von Früchten, in warmem Wetter, durch plötzliche Geräusche (Bell.).
- Die Stühle sind **grün** (Merc., Nat-s.), schaumig, unverdaut, mit weißem Schleim und eitrigem Geruch; wie **gekochte Stärke** (Arg-n.).

- Häufige, weiche, gelbe, schleimige Stühle werden Tag und Nacht abgegeben, unter jämmerlichem Weinen bei anhaltender Abmagerung (Cale., Rheum.).
- Jucken um den Anus.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Koloskopie: Entzündliche Strikturen durch Verdickung der Schleimhaut führt zu dünnem, bleistiftartigem Stuhl.
 - Stuhl: Spulwürmer (Sein).

HARNWEGE

- Die Kleinkinder schreien und kreischen vor dem Wasserlassen wegen Aphthen in den Schleimhäuten des Harntraktes (Lyc., Sanic., Sars.).
- Schmerzhafter Drang bei nervösen Kindern; müssen rennen oder der Urin geht ab.
- Sehr stark riechender, stinkender Urin mit Ammoniak-Geruch (Cale., Iod.).
- Häufiges Urinieren nachts, selten am Tag.
- Schmerzhafter Harnverhalt bei Säuglingen (Acon., Camph.).
- Infektionen des Harntraktes mit häufigen, brennenden Miktionen bei jungen Mädchen, bringen sie zum Schreien und Weinen, bevor der Harnfluss beginnt.
- Der Urin hinterlässt kleine rote Partikel auf der Windel (Sep.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rotes, sandartiges Sediment ist in der Windel zu finden.
 - Urin: Zylinder ++.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Dauernde, reichliche, milchige, warme Leukorrhoe (Hydr.) bei jungen Mädchen, macht die betroffenen Stellen wund (Cub., Iod.).

ATMUNG

- **Neugeborenenasphyxie** durch angeborene Herzerkrankung mit Zyanose. Bläuliches Gesicht, Nase, Augen, Fingerspitzen und Zehen; das Kind erstickt und leidet an Entkräftung (Lach., Laur.).
- Aussetzende Atmung bei Säuglingen, wenn sie hochgehoben oder in die Wiege gelegt werden.
- Verlangen, bei Fieber tiefe Atemzüge zu machen (Bry.).
- Atemlosigkeit nach Laufen, beim Reden, nach Anstrengung, beim Treppenherabsteigen (durch hyperdynamische Zirkulation, Herzdekomensation).
- Trockener Husten nach dem Aufstehen am Morgen (Coc-c.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Zyanose.

HUSTEN

- Heftiger, trockener, hackender Husten, **besser durch kalte Getränke** (Caust., Cupr., Coc-c.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Kind hält sich beim Husten die Brust mit beiden Händen (Dros., Phos.).

BRUST

- Das Kind klagt über Schmerzen in den Seiten der Brust beim tiefen Atmen, beim Reden, Husten oder Niesen; besser durch Druck.
- Untersuchungsergebnis:
 - Eiterbeulen in der linken Achsel.

EXTREMITÄTEN

- Ausstrecken oder Ruhelosigkeit der Beine bei Fieber (Cale., Rhus-t.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Die Handflächen fühlen sich heiß an.
 - Schwielen an den Händen.
 - Zyanose mit Kälte, bläuliche Verfärbung der Füße, Fingerspitzen und Zehen.
 - Ekzematöse Ausschläge der Zehen und Finger, begleitet vom Ausfallen der Nägel.
 - Die Extremitäten fühlen sich heiß an bei Fieber, besonders Zehen und Oberarme.
 - Ausfallen oder Abblättern der Nägel.
 - Schweiß an den Oberschenkeln (Ambr., Thuj.).
 - Beschwerden (Schmerz, Schwellung) der Beine und Füße bei Kindern, die in Diskotheken tanzen.
 - Eiterung und Geschwürbildung an den Fersen durch dauerndes Reiben der Schuhe (Paeon.).

SCHLAF

- Schläfrigkeit bei Fieber (Bapt.).
- Das Kind kann nicht auf der rechten Seite liegen.
- Häufiges Erwachen bei Neugeborenen nach 3 Uhr.
- Alpträume, die das Kind häufig aus dem Schlaf wecken.
- Verlängerter Schlaf bei Kindern.
- Schlaflosigkeit bei Kindern nach Überhitzung oder schwieriger Atmung.
- Schlaflosigkeit bei schwieriger Atmung.
- Häufiges Erwachen bei Neugeborenen.

FIEBER

- Verlangen nach kalten Getränken und kalten Speisen bei Fieber.
- Verlangen sich aufzudecken bei Fieber im Hitzestadium, aber will zugedeckt sein im Froststadium.
- Schweigsam bei Fieber (Gels., Puls.).

HAUT

- Jucken besser durch Kratzen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Intertrigo.

ALLGEMEINES

- **Abwärtsbewegung verschlechtert** (Gels., Sep., Sulph.).
- Schweiß beim Schreiben (Kali-c., Sep.).
- Allergische Konstitution.
- Anämische Kinder.
- Wetterwechsel verschlimmert (Dulc., Rhus-t.).
- Abmagerung bei Kindern mit Durchfallneigung.
- Schweiß bei und nach der Fütterung.
- Rechtsseitige Beschwerden.
- Sommerbeschwerden bei Kleinkindern (Ipec., Typh.).
- Zittern durch die geringste Anstrengung, durch Furcht oder bei Fieber.

BOVISTA LYCOPERDON

(Riesenbovist - Bov.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Lernstörungen, Legasthenie und schwierige bzw. fehlende Konzentration. Geistesabwesend und fehlende Aufmerksamkeit im Unterricht.
- ▶ Schlechtes Gedächtnis für das, was sie gerade getan haben. Fehler beim Sprechen, indem Worte falsch angeordnet oder Worte falsch benutzt werden. Beim Schreiben lassen sie Silben einfach weg oder schreiben die Worte falsch. Sie haben ein schlechtes Orientierungsvermögen und meistens sind sie sehr unaufmerksam.
- ▶ Die Sprache ist ebenfalls betroffen, entweder sind ihre Sätze undeutlich oder sie spricht ruckartig oder stammelnd.
- ▶ Ungeschickt. Oft fallen Dinge aus den Händen.
- ▶ Plötzliche Urtikaria nach dem Baden, nach Aufregung, durch Wärme, durch Sportübungen und morgens nach dem Aufwachen.
- ▶ Dermatographismus, d. h. es entstehen Streifen auf der Haut, wenn sie mit einem stumpfen Gegenstand, z. B. mit einer Schere, gekratzt wird.
- ▶ Atopisches Ekzem um und hinter den Ohren, auf dem Handrücken und an den oberen und unteren Extremitäten. Jucken schlechter nachts im Bett oder bei Überhitzung. Kratzen bis es blutet und die Haut wund wird.
- ▶ Dicke, pickelige Absonderung, die Krusten bildet.
- ▶ Akne bei jungen Mädchen, besonders im Sommer und nach der Benutzung von Kosmetika.
- ▶ Kinder, die Bov. brauchen, haben eine empfindliche Haut und jede Art von Puder, Salben, Nagellack, Make-up, Haaröl oder Shampoo kann eine starke allergische Reaktion hervorrufen.
- ▶ Mittelohrentzündung nach Masern, die Absonderungen sind wund machend, stinkend, offensiv oder eitrig.

HERKUNFT

- Ein Pilz aus der Familie der Lycoperdaceae.

BROMIUM

(Brom - Brom.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Brom, ist ein Mittel, das man nicht oft verordnet. Es ist Cale, sehr ähnlich.
- ▶ Die Kinder sind dick, heiter, freundlich und fröhlich. Es gibt aber auch einen anderen Typ von Brom.-Kindern, der zornig und leicht reizbar sein kann.
- ▶ Sehr nervös und ängstlich; Nägelkauen immer bei Angst.
- ▶ Große Angst vor Dunkelheit und Geistern. Angst und Furcht meistens abends (Puls.).
- ▶ Schnupfen breitet sich in die Stirnhöhlen aus und verursacht heftige katarrhalische Kopfschmerzen.
- ▶ Anfällig für chronischen Katarrh der oberen Atemwege. Reichlicher, wässriger, eitriger, weißer Schnupfen, der jede Menge Krusten in der Nase bildet. Schnupfen schlimmer rechts. Starker Juckreiz in der Nase; erst ist die rechte Seite verstopft und dann folgt die linke.
- ▶ Vasomotorischer allergischer Schnupfen mit häufigem Niesen besonders in staubiger oder durch Umweltverschmutzung verunreinigter Luft.
- ▶ Erkältungen neigen dazu, den Hals und die unteren Atemwege zu befallen. Entzündung und Verhärtung der Tonsillen. Die linken Tonsillen sind mehr befallen als die rechten. Der Hals ist rau und schmerzhaft; die Schmerzen erstrecken sich zu den Ohren. Vergrößerte und empfindliche Halslymphknoten.
- ▶ Hals und Kehlkopf extrem empfindlich auf Berührung.
- ▶ Heftiger kruppartiger Husten fast bis zum Ersticken, besser durch kalte Getränke oder frische Luft. Husten schlimmer abends, kurzfristig besser durch Trinken. Heiserer Husten, hohl und hackend.
- ▶ Allergisches Asthma bei Kindern oder Asthma nach Masern; am Meer besser oder schlechter. Staub, Rauch von chemischer Industrie oder Autoabgase und warme Räume verschlechtern, frische Luft bessert.
- ▶ Kinder, die Brom, brauchen, neigen besonders während der Pubertät zu wiederkehrenden **Furunkeln oder Akne** im Gesicht und auf den Schultern.
- ▶ Empfindlich auf Hitze, unbehaglich in der Sonne oder in warmen Räumen, besser an der frischen Luft (Puls.).
- ▶ Verlangen nach Saurem, Schokolade und Austern, aber Austern verursachen Durchfall.

BRYONIA ALBA

(Weiße Zaunrübe - Bry.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Kinder **wollen** im gesunden Zustand **nicht getragen oder über die Schulter gelegt werden** (Bell., Borx., Cham., Coff., Cupr., Sanic.), aber bei Fieber und Kolik wollen sie getragen werden (Ars., Cham., Chel., Cina, Kali-c., Lyc., Verat.).
- ▶ Kinder sind **emotional ebenso trocken wie ihre Schleimhäute**. Dem Kind mangelt es an Gefühlen wie Mitleid sowie überhaupt an Vorstellungskraft oder künstlerischen Neigungen. Diese Kinder **verlangen weniger nach emotionaler Sicherheit, sondern wollen materielle Sicherheiten und Geschenke**, z. B. wollen sie Geld in ihr Sparschwein oder aufs Sparkonto oder sie sammeln Spielzeug, Schuhe, Kleidung und Bücher.
- ▶ Materialistische Kinder: Schon früh spielen sie **wie Geschäftsleute** oder machen Geschäfte mit anderen Kindern. Voller Wünsche bis hin zur Gier [Verlangen, unbestimmt (Puls., Ther.), mehr als er braucht (Ars.), nach unerreichbaren Dingen (Op.)].
- ▶ **Methodische** (Sil.) und **ordnungsliebende** (Nux-v.) Kinder.
- ▶ Das Kind verlangt dringend nach etwas, aber weist es sofort zurück, wenn es ihm angeboten wird.
- ▶ Kinder, die es nie locken würde, ein Buch zu kaufen, einen Roman zu lesen oder ein Gedicht zu schreiben.
- ▶ Im Fieberdelir will das Kind dauernd aus dem Bett und nach Hause (Hys.).
- ▶ Setzen sich voll ein, wirken fast wie erwachsene Workaholics (Träume von harter Arbeit).
- ▶ Sehr nüchterne und zuverlässige Kinder.

KÖRPER

- ▶ Das Kind bekommt sofort Halsweh, Tonsillitis oder eine Infektion der oberen Atemwege, wenn es bei **heißem Wetter etwas Eiskaltes trinkt** oder sich nach dem Sport unterkühlt.
- ▶ So trockene Schleimhäute von den Lippen bis zum Anus, dass **Bryonia** oft „**Dryonia**“ genannt wird (engl. dry = trocken).
- ▶ **Großer Durst auf große Mengen Wasser** (Ars., Nat-m., Phos., Sulph.) in langen (Sulph, Verat) oder kurzen (Acon., Bell., Nat-m., Tarent.) Intervallen.
- ▶ Neuralgien und Koliken schlimmer nachts, bei Bewegung, beim Einatmen, bei Husten; **besser bei absoluter Ruhe und Liegen auf der schmerzhaften Seite**.

- ▶ Von Geburt an anfällig für Gallenkoliken.
- ▶ Kolik und Verstopfung bei Neugeborenen in der Stillzeit, wenn die Mutter zornig ist oder schwer gedemütigt wird (Coloc., Staph.).
- ▶ Verstopfung: Inaktivität des Rektums; manchmal tagelang kein Stuhldrang; der Stuhl ist groß, dunkel und trocken, wie verbrannt (Plat, Sulph).
- ▶ Dunkler Typ, schwarze Haare, dunkle Haut; fest und muskulös.
- ▶ Warmblütige Kinder, schlimmer im Sommer, besser in kalter Luft und durch kalte Getränke.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch **Demütigung** oder **ungerechte Behandlung** in der Klasse oder unter Freunden (Coloc., Staph.).
- **Launische** und fordernde Kinder, die ständig Dinge verlangen oder erbitten, die entweder nicht erhältlich oder in diesem Moment nicht zu beschaffen sind. Ist das Kind im Haus, so will es nach draußen und wenn es draußen ist, will es nach Hause gehen.
- Delirium bei hohem Fieber und im Schlaf; dauerndes Murmeln, dass es nach Hause gehen will; **Zupfen an Nase und Lippen**.
- **Mag nicht angefasst** (Cham., Kali-c., Tarent.) und **nicht gestreichelt** werden von Freunden, Verwandten oder Fremden und mag nicht an neue Orte gehen.
- **Furcht vor Bewegung**, fürchtet sogar das Sprechen, da es einen langen, schmerzhaften Hustenanfall hervorruft.
- **Hassen es**, bei ihren Tätigkeiten oder beim Lernen **gestört zu werden** (Cocc., Nux-v., Sep.).
- Unbelehrbar **schmutzige** (Hyos., Sep.) und unhygienische Kinder, urinieren und koten überall.
- **Selbstsüchtige** und **besitzergreifende** Kinder, die ihre Sachen nicht mit anderen Kindern teilen wollen.
- **Schweigsam** (Gels., Ph-ac., Puls.) und **seufzend bei Fieber** (Arn., Cham.).
- **Heftiger Zorn mit rotem Gesicht** bei kleinen Kindern, **wenn ihnen etwas verweigert wird** (Cham., Cina, Kreos.).
- An der Schule ausgerichtete Kinder, die um ihre Leistung besorgt sind und dazu neigen, sich dauernd um die Zukunft sorgen (Furcht vor Armut).
- Ängstlich bei Fieber.
- Kann es nicht ertragen, ein „Nein“ zu hören (Ichbezogenheit).
- Das Kind gestikuliert beim Reden (Nux-v.).
- Mag es nicht, gestillt zu werden (geringes Bedürfnis nach Zuneigung); das Befeuchten seines Mundes mit Milch ist ihm schon genug.
- Furcht vor Schmerzen jeder Art (Aur., Cale.), daher untröstlich bei körperlichen Verletzungen.
- Furcht vor Gewitter (Nat-c.).

- Fühlt sich ärgerlich und aufgebracht, wenn seine schulische Leistung oder seine Stellung in der Klasse unter seinen Kameraden auch nur ein wenig ins Wanken gerät (starke Unsicherheit).
- Redselige Kinder, die ständig schnell von einem Thema zum anderen wechseln (Phos., Podo., Tub.).
- Stöhnen im Schlaf.
- Frühreife Kinder mit großem Scharfsinn im logischen und rationalisierenden Denken.
- Ruhelose Kinder, die sich im Bett umherwerfen.
- Platzangst, fühlt sich besser, wenn er draußen an der frischen Luft ist (Ars., Cale., Puls.).
- Langsam im Handeln und Sprechen.

KOPF

- Kopfschmerzen nach unterdrückter **Demütigung oder Zorn**, verbunden mit Übelkeit und Erbrechen oder anderen **Magenverstörungen** (Essen von Junkfood).
- Verschlimmert durch:
 - **Trinken kalten Wassers im Sommer** (Kali-c.).
 - Den **geringsten Stoß** (Bell., Glon., Led.) **oder Bewegung**.
 - Wetterwechsel.
 - Kaltes, feuchtes Wetter.
 - Morgens beim Aufstehen.
 - Fahren/Reiten in kaltem Wind (Hep., Rhus-t.).
 - Anstrengung (Pressen), um Stuhl abzusetzen (Con., Sulph.).
 - Sonne.
- Besser durch:
 - **Starken Druck** (Alum., Chin., Mag-p.).
 - Hinlegen mit **geschlossenen Augen**.
 - **Sauren Schweiß** im Schlaf (Cham., Merc.).
 - Einhüllen.
 - Kleinkinder können keine Kopfbedeckung ertragen.
 - Einhüllen des Kopfes (Hep., Rhus-t.).
- Enzephalitis mit spärlichem Urinieren.
- Das Haar ist schmerzhaft bei Berührung (Apis).
- Der Kopf ist empfindlich gegen Bürsten des Haares.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Hält den Kopf mit den Händen beim Husten** (Nux-v.).
 - **Hydrozephalus**: Bohrt den Kopf in das Kissen (Apis).
 - CT und MRT: Hirnblutung.
 - Schuppen.
 - Fettige Haare.
 - Heißer Kopf mit rotem Gesicht und kalten Extremitäten bei Kindern mit Fieber.

AUGEN

- Die Augen sind entzündet und gerötet bei gewöhnlichen Erkältungen.
- Tränenfluss bei Schnupfen, Husten und bei Sonneneinwirkung (Sang., Staph.).
- Schmerzen beim Bewegen der Augen oder beim Lesen, besser durch kalte Anwendungen (Puls., Phos.).
- Rheumatische Iritis (Kalm., Thuja.) oder Konjunktivitis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Chemose** (Acon., Apis).
 - Verklebte Augenlider.
 - Erweiterte Pupillen.
 - Glasiges Aussehen bei Fieber (Bell., Glon., Op.).
 - Iritis und Iridozyklitis.
 - Lider halb geöffnet im Schlaf (Cocc., Lyc.).
 - Gerstenkörner.

OHREN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszess.
 - Furunkel vor (Cale.) und hinter den Ohren (Con.).

NASE

- **Chronisches Nasenbluten:** Beim Schnäuzen der Nase, bei hämolytischer Anämie, beim Erwachen am Morgen, im Schlaf (Merc., Nit-ac.), beim **Waschen des Gesichts** (Arn., Calc-s., Kali-c.) und bei Kopfschmerzen.
- **Der Schnupfen erstreckt sich zu Stirnhöhlen und Brust;** gelblich-grüne Absonderung; Fließschnupfen, der mit heftigem, häufigem Niesen beginnt und schnell zu Heiserkeit führt.
- Chronische Verstopfung der Nase durch häufigen Gebrauch von Nasensprays.
- Heftige und häufige Niesanfälle nach Husten.
- Untersuchungsergebnis:
 - Retronasaler Katarrh.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kaubewegungen** im Schlaf (Cale.), bei Meningitis (Hell.), Enzephalitis (Hell) und Fieberkrämpfen (Hell.).
 - **Rissige Unterlippe** (Puls., Phos., Sep.).
 - Das Gesicht wird **dunkelrot** beim Husten, bei Fieber, bei Kopfschmerzen (Nat-m.), im **Zorn** (Staph.) oder bei **Aufregung** (Ferr., Gels.).
 - **Fettiges Gesicht.**
 - Dauerndes Zupfen an den Lippen (Arum-t, Nux-v.).
 - Zyanose bei Asthma (Op., Stram.).
 - Nach außen gekehrte Lippen (Apis, Bell.).
 - Sommersprossen.
 - Faltige Stirn (Hell.).

MUND

- Schwierige Zahnung.
- Durstlosigkeit oder intensiver Durst mit trockenem Mund.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Aphthen** und Soor bei Neugeborenen und Säuglingen.
 - Trockene, rissige Zunge mit einer dicken, schmutziggelben oder bräunlichen Verfärbung in der Mitte.
 - Skorbutisches und schwammiges Zahnfleisch (Kreos., Merc.).
 - Zittern der Zunge beim Herausstrecken.

HALS

- Die Halsschmerzen erstrecken sich zu den Ohren beim Husten.
- Schmerz in den Tonsillen am Morgen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Pharyngitis und Tonsillitis.
 - Pulsieren der Karotiden (Bell., Gels.).

MAGEN

- Kinder, die Verdauungsstörungen bekommen nach dem Essen von **Brot** (Caust., Merc., Sep.), Früchten (Ars., Chin.), **Austern** (Lyc.) und **Sauerkraut** (häufig bei meinen pädiatrischen Patienten aus den osteuropäischen Ländern) (Petr.).
- **Gastritis nach kalten Getränken** (Rotavirusinfektion).
- **Heißhunger** bei Kindern vor dem Einsetzen einer Krankheit (Phos).
- **Durst auf große Mengen Wasser** in allen Fieberstadien (sehr selten durstlos bei Fieber), mit trockener Zunge, bei Durchfall, nach Essen; auch **Durst auf kleine Mengen** und unstillbarer Durst vor dem Stuhlgang.
- Galleerbrechen sofort nach dem Essen oder Trinken der geringsten Wassermenge, bei Kopfschmerz, in der Zahnungsperiode und bei Fieber.
- Kolikartige Schmerzen im Magen nach Zorn oder durch die geringste Unvorsichtigkeit in der Ernährung, besser durch Aufstoßen, warme Anwendungen und warme Getränke.
- Schluckauf abwechselnd mit Aufstoßen.
- Erfolgloses Würgen bei Husten.
- Kolik beim Säugling durch Verstopfung, besser durch Blähungsabgang (Carbo-veg., Lyc.).
- Erbrechen bei Zahnung; es kommt überhaupt leicht zum Erbrechen.
- Verschlimmerung: Bohnen, Brot, Kohl, Hühnchen, Schokolade; kalte Getränke, wenn sie im Sommer getrunken werden; blähende Speisen, gefrorene Speisen (Ars., Ipec., Puls.), Früchte, heiße Milch, Eis, Öle (Canth, Puls), Austern (Aloe., Lyc.), Gebäck (Ant-c., Puls.), Erbsen, Kartoffeln, Reis (Ign.), reichhaltiges Essen, Sauerkraut.
- Besser: warme Getränke.
- Abneigung: **Kohl**, Eier, Fett.
- Verlangen: **Kalte Getränke und kalte Speisen**, heiße Getränke, Austern, Saures, **starker Kaffee**, Süßigkeiten, warme Milch.

ABDOMEN

- Schmerzen im Abdomen bei Verstopfung, nach Milch (Bell., Cupr.); krümmt sich zusammen vor Schmerzen (Puls., Rheum.).
- Schmerzen im rechten Hypochondrium durch Husten (Nux-v.); fühlt sich besser durch Druck und beim Liegen auf der schmerzhaften Seite (Sep.).
- Schmerzhaftes Auftreibung des Abdomens sofort nach dem Essen (Carbo-veg., Chin.).
- Peritonitis mit qualvollen Schmerzen, die die Atmung behindern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Aszites.**
 - **Paralytischer Ileus** (Op., Rhus-t., Thuj.) gewöhnlich als Sekundärerkrankung bei Peritonitis.
 - Akute Appendizitis (Echi., Lach.) mit drohender Ruptur.
 - Leistenbruch.
 - Intussuszeption (Plb., Verat.).
 - Leber vergrößert, hart und empfindlich bei Palpation.
 - Tympanitis ++.
 - Nabelregion empfindlich (Kali-n., Sacch-l.).

REKTUM

- Verstopfung bei Kindern mit weichem Stuhl; nach Missbrauch von Abführmitteln, nach **Ärger** (Staph.), am Meer (Mag-m.); durch **Trockenheit** des Rektums. Stühle verbleiben für lange Zeit im Rektum ohne Drang (Graph., Sil., Tarent.); sie müssen **mechanisch entfernt** werden (Nux-m., Sep.) und sind hart wie verbrannt (Plat., Sulph.).
- Durchfall bei Säuglingen nach einem **Heißwasserbad**; bei gestillten Kindern (Nux-v., Sulph.); nach Emotionen (wie Zorn oder Demütigung); nach Verzehr von **Früchten** (Chin., Coloc., Verat.), Eiscreme (Ars., Puls.), Milch (Mag-m., Nat-c.) oder Gemüse (besonders Kohl); bei Fieber; im Schlaf (Sulph., Tub.); **im Sommer** (Crot-t., Gamb.) und bei den ersten Bewegungen nach dem Erwachen am Morgen (Nat-s.).
- Heftige, schwallartige Stühle mit vielen Blähungen, mit stinkendem Geruch nach altem Käse und unverdauten Nahrungspartikeln; wie Schleimhautfetzen.
- Unwillkürliche Stühle im Schlaf (Podo., Psor.).
- Jucken um den Anus.
- Kein Stuhlgang möglich, wenn jemand mit im Raum ist.
- Untersuchungsergebnis:
 - Rektumprolaps (Cale., Ign.).

HARNWEGE

- Häufiger und plötzlicher Harndrang, besonders bei Fieber, dem man sofort folgen muss; sonst unfreiwilliger Harnabgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rosa Sediment oder roter Sand in den Windeln des Säuglings.
 - Pyelonephritis.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Hydrozele.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heisere Stimme bei Schnupfen (Carbo-veg., Caust.), draußen im Freien (Mang) oder nach Masern (Dros.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Nasale Stimme (Kali-bi.).

ATMUNG

- Asthma nach **kalten Speisen** (Puls.) und **kalten Getränken** (Ars.).
- Asthmatische Atmung, im warmen Zimmer oder durch die geringste Anstrengung, besser **im Freien** (Ars., Psor.).
- Atemnot durch Bewegung und beim Lachen, besser durch **Rückenlage** (Cact, Kalm) oder Aufenthalt in der **Kälte** (Carbo-veg., Merc.) **oder im Freien**.
- **Keuchen vor einem Hustenanfall** (Brom.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Stöhnende und seufzende Atmung.

HUSTEN

- Husten nach **kalten Getränken, bei Überhitzung**, besonders im Sommer (Carbo-veg., Kali-c., Puls., Sil.).
- Husten, der nach **Zorn** beginnt (Cham., Staph.) oder beim Lachen bei Babys (Chin.).
- Anfälle von erstickendem Husten, die beginnen, sobald er anfängt zu **essen** (Kali-bi., Nux-v.) oder zu **trinken** (Ars., Dros.); **besser nur durch warme Getränke** (Ars., Lyc., Rhus-t.) oder durch frische Luft.
- **Muss sich aufsetzen**, sobald der Husten beginnt (Con., Phos.).
- **Schmerzhafter Husten** zwingt das Kind, beim Husten **seinen Kopf und die Brust zu halten** (Arn., Dros., Nat-s., Phos.).
- Der Husten endet mit Niesen.
- Husten, der nach Masern oder nach einem Grippeanfall begonnen hat.
- Trockener Husten bei Fieber (Ipec., Kali-c.).
- Bekommt einen Hustenanfall bei Wechsel vom warmen Raum in die kalte Luft oder umgekehrt.
- Harter, trockener, anstrengender Husten, der aus dem Magen zu kommen scheint (Sep.).
- Der Hustenanfall ist so heftig, dass der ganze Körper zittert (Cupr., Phos.).

PNEUMONIE

In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe ich erlebt, dass Bry. unzählige Fälle von Pneumonie heilte. Die folgenden Symptome wurden beobachtet und wiederholt bestätigt:

- Das Kind fühlt sich **heiß** an mit reichlichem Schweiß; die Haut ist heiß und feucht.

- **Stirnkopfschmerzen** direkt über den Augen, bei denen jede Art von **Bewegung oder Anstrengung** verschlimmert.
- Schwerer, **dicker, weißer Belag** auf einer trockenen Zunge; der Mund fühlt sich trocken an und das Kind ist sehr **durstig auf kalte Getränke** in großen Intervallen (allerdings macht das Trinken großer Wassermengen manchmal noch kränker); bitterer Geschmack im Mund.
- Die **Lippen** werden **trocken** und **rissig**.
- Man sieht den Blutandrang zum Gesicht; das Kind sieht **schläfrig und schlaftrunken aus**.
- Sie **können sich nicht aufsetzen**, da ihnen **schwindelig** wird und sie ohnmächtig werden können (Acon., Phyt.).
- Sie **wollen einen Raum mit Ventilator** oder **Klimaanlage** und fühlen sich extrem unwohl in einem warmen oder heißen Raum.
- Das Kind **hält sich die Brust** beim Husten.
- Ich verlasse mich nie auf rechtsseitig oder linksseitig als Symptom bei Pneumonie, da beides mit diesem Mittel sehr erfolgreich behandelt wurde.
- Das Kind mag überhaupt nicht gestört werden, lehnt z. B. Kaltwasser- Umschläge, Temperatur messen, Wechsel der Kleidung, Baden oder die ärztliche Untersuchung strikt ab.
- Das Gesicht ist dunkel.
- Die Atmung ist gewöhnlich kurz und keuchend und der Hals ist rot und angeschwollen.
- Die Pneumonien erscheinen gewöhnlich in den Frühjahrs- und Sommermonaten.
- Die Kinder mögen nicht angesprochen werden (Hell., Op., Ph-ac.) und reagieren gereizt und ärgerlich. Immer wenn sie gereizt und zornig werden, verschlimmert dies ihre körperlichen Probleme. (Ich habe wiederholt diesen Punkt in meiner Praxis bestätigt gefunden, sogar in Fällen von Malaria und Typhus, bei denen die Temperatur um ein oder zwei Grad ansteigt, wenn ein Verwandter oder Familienmitglied versucht, das Kind zu stören.)

BRUST

- Schnell fortschreitende Bronchitis sobald der Schnupfen beginnt.
- Untersuchungsergebnis:
 - Röntgen/Thorax: Unschärfe und Obliteration des rechten Rippen- Zwerchfell-Winkels; Hiluslymphknoten +.

RÜCKEN

- Schmerzhafteste Steifheit der Zervikalregion.
- Untersuchungsergebnis:
 - Röntgen: Spina bifida (Cale., Sil.).

EXTREMITÄTEN

- Juvenile rheumatoide Arthritis besonders bei Kindern, die gern große Mengen Fleisch essen; schlimmer durch kaltes Wetter, feuchtes Wetter; besser durch Druck (Form) und warme Anwendungen.
- Neigung zu Fuß- und Hüftgelenksverrenkungen.
- Gelenkbeschwerden abwechselnd mit Konjunktivitis.

- Die Knie schlagen aneinander beim Laufen.
- Steifheit der Glieder nach Schreck.
- Nützlich in Fällen von Verstauchungen und Verletzungen der Bänder und Sehnen besonders nach Tennisspielen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ödematöse Schwellung der Gelenke (besonders der Füße, Knie und Ellenbogen) mit Hitze und Rötung.
 - Synovitis.
 - Empfindliche Hühneraugen (Ant-c.).

SCHLAF

- Schläft zusammengerollt wie ein Hund (Ars., Psor.).
- Das Kind erwacht aus dem Schlaf durch schreckliche Alpträume.
- Schlaf auf der rechten Seite unmöglich (Borx.).
- Gestörter Schlaf durch Schmerzen im Abdomen (Rhus-t.).
- Schlaflosigkeit bei Fieber.

FIEBER

- Frost:
 - Trockener, hackender Husten (Phos., Rhus-t.) mit rotem, heißem Gesicht (Cham., Fern), rote heiße Wangen.
 - Großer Durst auf große Mengen kaltes Wasser, das erleichtert (Ign., Nat-m.).
 - Starkes Verlangen, sich hinzulegen im Froststadium.
 - Schlimmer durch Bewegung und in einem warmen Raum.
- Hitze:
 - Trockener, hackender Husten; Kopfschmerzen; Trockenheit von Mund und Lippen mit dickem, gelbem Zungenbelag.
 - Will Ruhe (Bapt., Op., Ph-ac.) und nicht gestört werden, in jedem Stadium des Fiebers.
 - Brennende Hitze nachts ab 21 Uhr bis Mitternacht.
 - Gesteigerter Durst, aber verglichen mit dem Froststadium weniger.
 - Schlimmer im warmen Raum.
 - Besser im Freien.
- Schweiß:
 - Reichlicher Schweiß am ganzen Körper, besonders auf der Seite, auf der das Kind liegt.
- Besonders indiziert bei katarrhalischem Fieber bei Masern, Typhus, Magen- Darm-Beschwerden, Galle-Beschwerden und Fieber bei Pneumonie.

HAUT

- Schweiß nach dem Essen (Phos., Sep.), besonders warmer Speisen.
- Reichlicher, schwächender Schweiß mit saurem Geruch, besonders im Schlaf oder durch die geringste Anstrengung, färbt das Bettlaken gelb (Merc., Graph.).
- Langsame Entwicklung des Hautausschlages bei Infektionskrankheiten wie Masern oder Windpocken.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Sommersprossen.
 - Molluscum contagiosum (V-a-b.).
 - Skabies.
 - Urtikaria.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Unterdrückte Ausschläge oder Ausschläge, die nicht richtig herauskommen (in Fällen von Infektionskrankheiten).
- Nach Konvulsionen: Schweiß (Sil.).

ALLGEMEINES

- Beschwerden durch **Missbrauch** von allopathischen Mitteln wie **Magnesiamilch**, nasenabschwellenden Mitteln, topischen Salben oder durch Unterdrückung von Ausschlägen (z. B. in Fällen von Masern, wenn unnötige Antibiotika genommen wurden).
- Beschwerden durch **kalten Wind**, durch Nasswerden, kaltes trockenes Wetter und Wetterwechsel von kalt nach warm.
- Verschlimmerung durch die geringste Berührung (Arn., Bell., Rhus-t.) oder durch Bewegung.
- Beschwerden nach dem Abstillen (Bell.).
- Abneigung gegen Baden.
- Das Kind strampelt die Decken weg (Cham., Iod.).
- Fröstelig, obwohl schlimmer durch Wärme.
- Verlangen nach frischer Luft, aber schlimmer durch Luftzug.
- Mangel an Reaktion.
- Erkältungsneigung.

HERKUNFT

Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)

BUFO RANA

(Hautsekret der Erdkröte - Bufo)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Für **Kinder von schwachem Intellekt**, aber gut entwickelter Statur („körperlich groß, geistig klein“), **mit großem Drang zu masturbieren** und sich zurückzuziehen.
- ▶ Geistig unterentwickelte Kinder, die auf einem bestimmten Gebiet sehr talentiert sind, z. B. am Computer, beim Lego-Spielen, Spielzeuge und elektronische Geräte auseinandernehmen und untersuchen, ein bestimmtes Themengebiet oder ein Musikinstrument beherrschen. Auf diesen Gebieten sind Gedächtnis und Lernfähigkeit ausgezeichnet (**partielle Intelligenz**).
- ▶ Kinder von intellektuellen Eltern, die in ihrem Beruf äußerst engagiert sind und ihr eigenes Leben führen.
- ▶ Für **Kinder mit genetisch bedingten geistigen Behinderungen** (z. B. Galaktosämie, Down-Syndrom, Edwards-Syndrom, Syndrom des fragilen X-Chromosoms, Klinefelter-Syndrom, Lesch-Nyhan-Syndrom, Gargoylismus oder tuberöse Sklerose). Im Gegensatz dazu: Geistige Behinderungen, die auf Infektionen der Mutter während der Schwangerschaft wie z. B. Röteln, Toxoplasmose oder Zytomegalie zurückzuführen sind (Zinc-m., Merc-sol. und Cic.).
- ▶ Kinder einer Mutter, die während der Schwangerschaft starke Furcht, Streit oder Enttäuschung in der Liebe erleben musste.
- ▶ Säuglinge und Kinder, die nur langsam lernen und reifen wollen und deren soziale Anpassung ungenügend ist.
- ▶ Stimmungsschwankungen und schwacher Intellekt.
- ▶ Im Verhalten gibt es zwei Seiten: zärtlich-liebevoll und dennoch beißend und schlagend; Verlangen nach Gesellschaft und gleichzeitig nach Alleinsein; Verlangen nach Alleinsein und gleichzeitig Furcht, allein zu sein und verlassen zu sterben, Klagen und Weinen abwechselnd.
- ▶ Das Kind hat Schwierigkeiten sich auszudrücken; versinkt oft in seiner eigenen Welt oder fällt leicht in frühe Abhängigkeit.
- ▶ **Zorn, wenn sie allein sind**, Zorn mit Beißen (Bell., Camph., Cupr., Lyss., Stram.); wird wütend, wenn er etwas sagt und sich dann missverstanden fühlt (Laur., Nicc-met.); Zorn besonders vor Spasmen; Zorn mit Verlangen zu schlagen (Anan., Hyos., Nux-v.) und zu zerstören, beschimpfend, beleidigend, destruktiv und böse mit dem Verlangen zu schlagen (Hyos.).
- ▶ Trotzig, hinterhältig und boshaft, betrügerisch (Agar., Bell., Med., Op., Plb.) und gerissen.
- ▶ Ruhelose, hyperaktive und ungeduldige Kinder.

- ▶ Aber auch: Passive und friedliche Kinder.
- ▶ Lachen ohne Grund (Aether., Carbn-s., Sal-ac., Stram., Syph., Tab.), Kichern (Cann-i., Stry.), macht Gebärden.
- ▶ Nägelkauen und Knabbern an Gegenständen, die in der Nähe sind.
- ▶ Dumpfheit bei extremer sexueller Energie (Bar-m.).
- ▶ Ständige Neigung, mit den Genitalien zu spielen (Hyos., Zinc.) und zu masturbieren (Ust.; Anan. ist ähnlich im unkontrollierbaren Drang nach Masturbation).
- ▶ Schamlos (Hyos., Phos., Stram.), sagt Obszönitäten (Aur., Bell., Lil-t.).
- ▶ Extremes Interesse an pornographischem Material (evtl. mehr Bufo-Patienten als früher, weil Pornographie heutzutage im Internet leicht verfügbar ist).
- ▶ Dümmlisches, einfaches und kindliches Wesen; erbliche Veranlagung zu geistiger Störung, die Generationen von beschränkten und schwachsinnigen Kindern hervorbringt.
- ▶ Tierliebe, die hauptsächlich dadurch entsteht, dass die Kinder geistig zurückgeblieben und von der Familie und der Gesellschaft oft nicht akzeptiert werden; gleichzeitig aber auch große Furcht vor Tieren, vor Vögeln und am meisten vor Hunden.
- ▶ Geistiger Entwicklungsrückstand mit extremer sexueller Energie verbunden.
- ▶ Die Kinder entwickeln keine hohe soziale Kompetenz (Cocain., Laur., Morph.).
- ▶ Weint wegen Geringfügigkeiten (Caust., Kali-br., Op.).
- ▶ Verlangen nach Gesellschaft, aber Furcht vor Menschen (Ars., Clem., Con., Tarent.); schüchtern.
- ▶ Schnell geängstigt durch ein Insekt, einen Schmetterling oder einen Vogel; das Kind schrickt schon zusammen, wenn es sie nur in seiner Nähe fliegen sieht.
- ▶ Leicht hochschreckend durch Furcht (Hyos., Nat-m., Nat-s., Nit-ac.) oder durch Geräusche (Borx., Kali-c., Sil.).
- ▶ Äußerste Reizbarkeit bei Kindern, besonders beim Erwachen (Bell., Cina, Merc-i-r., Lyc., Tub.).
- ▶ Beantwortet Fragen sehr hastig (Carc., Dendr-pol., Lach., Lyc., Rhus-t.).
- ▶ Macht Fehler beim Sprechen, spricht oft nur das halbe Wort aus, stellt die Wörter falsch oder benutzt falsche Wörter (Am-c., Both., China, Lyc., Nux-m.).
- ▶ Furcht vor Tieren, Vögeln und Insekten.
- ▶ Furcht, von den Eltern und der Familie im Stich gelassen zu werden.
- ▶ Furcht vor Spiegeln (Canth., Carc., Lyss., Stram.); sie mögen das hässliche Bild ihres Ichs nicht anschauen.
- ▶ Furcht vor Fremden (Carbo-veg., Cupr., Thuj.).
- ▶ Schreien wie das Heulen von Tieren (Acon., Cham., Verat-v.).
- ▶ Säuglinge fühlen sich nach dem Trinken an der Brust schläfrig und wie berauscht.
- ▶ Säuglinge können beim Windelwechseln Spasmen entwickeln und den ganzen Körper steif machen.

- ▶ Ältere Kinder haben einen benommenen (Bapt., Gels., Lach., Nux-m.), dämmlichen Ausdruck (Bar-c., Phos.), dicke Lippen (Bar-c., Cale., Graph., Med.), borstiges Haar (Laur., Mur-ac., Ran-b., Zinc.) und bohren mit den Fingern in der Nase (Arum-t, Cina, Nat-m, Santin, Zinc).
- ▶ Ständiges Ringen der Hände (Ars., Phos., Psor.) als Symptom von Chorea.
- ▶ Qualvolle Angst während Meningitis (Ars.).
- ▶ Ruhelosigkeit vor epileptischen Anfällen (Ana., Arg-n., Caust., Hyos., Plb.).
- ▶ Schutzloser Schwachsinniger, über den sich alle lustig machen.

KÖRPER

- ▶ **Affinität zum Nervensystem, zu den Sexualorganen und zur Haut.**
- ▶ Unterdrückte Hautausschläge erzeugen Symptome im zentralen und peripheren Nervensystem, meistens in Form von **Konvulsionen und Epilepsie**.
- ▶ Epilepsie als Folgeerscheinung nach Masturbation bei jungen Menschen.
- ▶ Große Probleme beim Stillen der Neugeborenen wegen der dicken Lippen, dem Herausstrecken und wieder Hereinziehen der Zunge oder den Leckbewegungen der Zunge.
- ▶ Äußerst fröstelig.
- ▶ Akute Krankheiten verlaufen in der Regel nicht heftig.
- ▶ Verletzungen der Finger (Hyper.), z. B. nach Quetschung oder Einklemmung.
- ▶ Lymphangitis septischen Ursprungs.
- ▶ Neigung zur Drüsenverhärtung.
- ▶ Rote oder purpurne Streifen auf Nacken und Rücken während Meningitis.
- ▶ Schwellungen und Fisteln der Knochen.
- ▶ **Physische Erkennungszeichen von Bufo:**
 - Neigung zur Fettleibigkeit.
 - Krötenartiges Aussehen, z. B. kurzer Hals, gedrungen.
 - Mund steht ständig offen (Ang., Op., Sulph.).
 - Dicke Lippen, meist halb offen stehend. Die Zunge ist durch den halb offenen stehenden Mund sichtbar.
 - Leckbewegungen der Zunge (Lyc.).
 - Stotternde Sprache.
 - Bohrt mit den Fingern in der Nase (Arum-t, Cina, Nat-m., Santin., Zinc.).
 - Kinder, die dazu neigen, dickblasigen Speichel aus dem Mund zu lassen (Merc., Stram., Graph. - macht Blasen während des Weinens).
 - Ohren tief am Kopf ansetzend.
 - Gesichtsausdruck benommen (Asaf., Bapt., Nux-m.), dumm (Absin., Acon., Arg-n., Kali-br., Lyc., Nux-m.), schwachsinnig.
 - Augenlider geschwollen.
 - Fettiges Gesicht (Aur-m., Kali-c., Plb., Vine.).
 - Abmagerung mit aufgeblähtem Abdomen (Abrot., Bar-c., Cale., Iod., Nat-m., Sanic., Sil., Sulph.).
 - Ausgemergelte, greisenhaft wirkende Kinder (Ambr., Cupr., Lach., Sei., Vip.). - Skoliose.

Weitere wichtige Symptome

KOPF

- Kalter Schweiß der Kopfhaut, besonders auf der Stirn (Carbo-veg., Op., Verat.).
- Reichlicher Schweiß, der ölig ist (Bry., Hera., Merc.).
- Schuppen, Kahlköpfigkeit, Haarausfall.
- Große Empfindlichkeit der Kopfhaut.
- Das Haar wechselt die Farbe und verkümmert.
- Geruch des Haares abstoßend (Lyc., Staph., Sulph., Vine., Viol-t), sauer.
- Kopfschmerzen nach dem Frühstück (Bad., Carbn-s., Iris, Lyc.), schlimmer durch Licht, Lärm, besser durch Nasenbluten (Mag-s., Meli., Psor., Rhus-t.).
- Kissen verursacht Schmerzen am Hinterkopf.
- Zittern des Kopfes (Ant-t., Cic., Op., Plb., Zinc.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kopf zur Seite gezogen vor epileptischem Anfall (Caust., Lyc.).
 - Reichlicher Schweiß.
- Meningitis.

MENINGITIS

Bei Meningitis zeigt Bufo folgende Symptome:

- Qualvolle Angst während Meningitis mit roten oder purpurnen Streifen auf Nacken oder Rücken.
- Blutiger Speichel (Crot-c., Mag-c., Nit-ac., Phos.).
- Brennende Hitze während Fieber (schlimmer nachts).
- Kalter Schweiß der Kopfhaut, besonders auf der Stirn (Hell., Op.).
- Kälte der Füße während Fieber (Iris, Lach., Sulph., Zinc.).
- Beschwerden tief im Gehirn.
- Ständiges Verlangen, die Zähne zusammenzubeißen (Hyos., Lyc., Podo.).
- Konvulsivische (Agar., Kali-br., Zinc.) und rollende Bewegung der Augen (Cic., Gels., Hyos., Zinc.).
- Zunge mit Spalten und Rissen (Fl-ac., Rhus-t., Spig.).
- Delirium während Fieber.
- Erweiterte Pupillen während Fieber (Apis, Atro., Bell., Cina., Hell., Hyos., Merc.).
- Herabhängen des Kiefers.
- Erregung während Frost (Acon., Cham., Cocc., Coff., Teuer.).
- Ausdruck wie benommen und berauscht.
- Bläuliche Verfärbung des Gesichts, bleich mit schwarzen Lippen.
- Fettiges Gesicht.
- Kopfschmerzen begleitet von Nackenschmerzen.
- Hitze begleitet von Schauern.
- Hitze des Kopfes bei Kälte des Körpers und der Extremitäten.
- Gleichgültigkeit gegen die Umgebung (Merc., Mez., Phos., Sei.), nach Koma, während Fieber, mit kalten Füßen, mit heißem Kopf.
- Entzündung der Meningen.
- Injizierte Augen.
- Rucken des Kopfes

- Macht unwillkürliche Bewegungen der Hände, besonders Ringen der Hände (Asar., Kali-p., Ther.).
- Stöhnen im Schlaf (Aur., Bry., Stram.).
- Keuchende Atmung (Phos., Verat-v.).
- Lähmung der Augenmuskeln.
- Schweiß auf dem Rücken.
- Photophobie.
- Herausgestreckte Zunge (Crot-h., Lach., Phyt.).
- Hervorstehen der Augen.
- Schüttelfrost.
- **Kreischen bis zur Bewusstlosigkeit.**
- Schnarchende Atmung mit pustender Ausatmung (Chin., Chlol., Op.).
- Strabismus.
- Stupor mit Unfähigkeit zu sprechen (Phos.).
- Eingesunkene Augen.
- Brennender, heftiger Durst während Fieber.
- Bewusstlosigkeit mit automatischen Handlungsabläufen; häufige Anfälle von Bewusstlosigkeit.
- Erbrechen von streifig erscheinendem, braunem Blut.

AUGEN

- Hält den Anblick glänzender Objekte nicht aus (Bell., Canth., Lyss., Stram.).
- Entzündete Canthi (Arg-n., Borx., Euphr.); die Augen sind injiziert (Arn., Gern., Glon., Merc.).
- Ausschlag hinterlässt Krusten (Arg-n., Aur., Graph., Psor., Sulph.).
- Extremer Tränenfluss.
- Augen injiziert, rot geschwollen, juckend.
- Augen groß, rot, eingesunken, mit Ringen darunter.
- Augen weit geöffnet.
- Augen nach oben und links verdreht vor Konvulsionen.
- Ausfallen der Wimpern.
- Myopie, Presbyopie.
- Gegenstände erscheinen schief (Bell.).
- Ängstlicher, schielender Blick; Augen erscheinen wie blutunterlaufen.
- Lähmung des Nervus opticus (Con., Kali-i., Nat-m., See.) und des Oberlids (Caust., Gels., Nit-ac., Spig.).
- Photophobie.
- Pupillen unempfindlich gegen Licht (Arn., Bell., Cupr., Hyos., Op.).
- Aufwärtsrollen der Augen (Camph., Cupr., Hell., Op.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ständiges Blinzeln (Bell., Mez., Nux-v.).
 - Schuppen über den Augenbrauen (Sulph.).
 - Linkes Lid gelähmt (Caust., Gels.).
 - Kleine Bläschen bilden sich auf den Augen.
 - Hervortreten der Augäpfel (Corn., Ferr-i., Guaj., Nat-m.).
 - Pupillen erweitert (Bell., Cale., Gels., Mang., See.).

- Eingesunkene Augen.
- Zucken der Lider.
- Ulzeration der Cornea (Apis, Cund., Sin-n.).

OHREN

- Abschuppung, Ulzeration und Eiterung der Ohrmuschel.
- Otitis media mit eitrigen und blutigen Absonderungen.
- Schmerzen schlimmer durch kaltes Waschen (Borx., Cham., Dulc., Hep., Sil.).
- Die Symptome des Ohres fallen oft mit denen des Auges und des Kopfes zusammen.
- Sehr empfindliches Gehör (Acon., Coff., Nat-c., Op.); das geringste Geräusch beeinflusst ihn, das geringste Geräusch verstimmt ihn; Musik wird nicht ertragen (Ambr., Nat-c., Nux-v.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszess des Gehörgangs (Calc-s., Crot-h., Hep.).
 - Chronische eitrige Otitis media, eitrige Otorrhoe mit Ulzeration und Bluten des äußeren Ohrs.
 - Risse hinter den Ohren (Chel., Graph., Hydr., Petr.).
 - Eitrige Otorrhoe.
 - Otoskopie: Eiter im Mittelohr; Ruptur des Trommelfells.
 - Geschwollen und schorfig.
 - Ulzerationen (Anac., Puls., Ruta) und Blutungen des äußeren Ohrs.
 - Ulcera im Ohr.
 - Warzenartige Auswüchse an den Ohren.

NASE

- Schnupfen am Morgen (Bar-c., Carbo-veg., Squil.); Absonderungen grünlich, übelriechend, eitrig, gelb, gelb-grün; begleitet von großer Trockenheit der Nase.
- Nasenbluten mit rotem Gesicht und Schmerzen in der Stirn; erleichtert den Kopfschmerz (Brom., Bry., Meli., Psor.).
- **Häufiges Niesen abends beim Zubettgehen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krusten.
 - Ulzera in den Nasenlöchern.
 - Retronasaler Katarrh.
 - Geschwollen, rot und mit Pusteln bedeckt.

MUND

- Kalte Flüssigkeiten verschlimmern alle Symptome des Mundes.
- **Konvulsionen nach Zahnextraktion.**
- Reichlicher Speichelfluss, sehr viel schaumiger Speichel (Apis, Bry., Nux-m.).
- Verlangen, die Zähne zusammenzubeißen.
- Verlangen zu trinken und die Zunge zu befeuchten, obwohl sie von Speichel bedeckt ist.
- Häufiges In-die-Zunge-Beißen (Bell., Ign., 01-an.).
- Ausfallen von Zähnen.
- Mund voll mit dickem Schleim.

- Sprache stotternd (Caust., Merc., Stram.), schwierig (Gels., Op., Stann.); behinderte und unintelligente Sprache (Hyos., Ph-ac., See.).
- Die Zähne verfaulen und brechen leicht ab.
- Das Kind hört, was gesagt wird, ohne fähig zu sein zu antworten oder sich zu bewegen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszess des Zahnfleisches (Hecla, Hep., Sil.).
 - Beißt in die Wangen beim Kauen oder Sprechen (Caust., Ign., Nit-ac.).
 - Beißt in die Zunge bei Konvulsionen (Art-v., Cic., Oena., See.).
 - Schwarze Zunge (Carbo-veg., Chin., Merc.).
 - Blutendes Zahnfleisch, blutende Zunge.
 - Blutiger Speichel.
 - Blasiger Speichel.
 - Zähneknirschen während Konvulsionen (Coff., Hyos., Sulph., Tarent.).
 - Mundgeruch (Arn., Carb-ac., Kali-p., Tub.).
 - Leckbewegungen der Zunge (Lyc.).
 - Mund steht offen.
 - Lähmung der Zunge.
 - Stottern - wird wütend, wenn sein unzusammenhängendes Sprechen nicht verstanden wird (Chorea).
 - Stomatitis, Gingivitis.
 - Zunge: Spalten, Risse, blauschwarz, dick, hart, voll mit kleinen brennenden Pickeln.
 - Zucken um den Mund.
 - Geschwüre im Zahnfleisch.

GESICHT

- Schweißgebadet (Cact, Cina, Spong.).
- Das Kind ist äußerst gereizt, wenn das Gesicht mit Wasser gewaschen wird. Es verabscheut bereits einen nassen Lappen im Gesicht.
- Vergrößerung der Parotis (Bar-c., Brom., Rhus-t.).
- Lippen zusammengezogen, trocken, blutig, aufgesprungen, sehr schmerzhaft.
- Blass, rot.
- Pickel auf der Oberlippe (Bell., Carb-c., Thuj., Zinc.), mit Schnupfen.
- Aufgedunsenes Gesicht mit tief ansetzenden Ohren.
- Geschwollene, dicke, herabhängende Lippen.
- Dünnes, knochiges Gesicht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akne.
 - Schweißgebadet während Spasmen (Cocc.).
 - Aufgedunsen und verzerrt.
 - Verfärbung bläulich, blass.
 - Herabhängen des Kiefers (Lach., Lyc., Mur-ac.).
 - Ausdruck: Dämmlich (Absin., Bar-c., Nux-m.), benommen (Bapt., Cann-i., Sep.), greisenhaftes Aussehen.
 - Eingesunken.
 - Fettig.
 - Großer Unterkiefer.

- Lippen schwarz (Ars., Hyos., Merc-c.).
- Missbildung des Unterkiefers.
- Vorstehender Oberkiefer, Prognathie.
- Schwellung der Submaxillardrüsen und der Parotis.
- Dicke Lippen (Mez., Op., Plat., Syph., Zinc.).

HALS

- Ständige Neigung sich zu räuspern (Caust., Wye.).
- Schmerzen schlimmer durch Schlucken von Speichel oder Speisen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Struma (Calc-i., Nat-m., Thy.).
 - Entzündet.
 - Pharyngitis (Apis., Lac-c., Merc., Wye.).
 - Retronasale Absonderungen, zäher Schleim (Arg-met., Kali-bi., Phyt.).
 - Tonsillen vergrößert, entzündet.

MAGEN

- Abneigung gegen Speisen.
- Verlangen: Delikatessen (Acon-l., Chin., Ipec., Tub.), Milch, Kuchen, gesüßtes Wasser (Arg-n., Cur., Sulph.), Leckereien, Konfekt, saure Früchte.
- Abneigung gegen salzige (Cor-r., Graph.) und scharfe Speisen (Chin., Merc-c.).
- Frisches Brot oder frischgebackener Kuchen verursachen Aufstoßen.
- Extremes Durst auf kaltes gesüßtes Wasser.
- Übermäßiges, unkontrollierbares Aufstoßen, morgens und abends.
- Übermäßiger heftiger Hunger, auch nach dem Essen.
- Äußerst pingelig in seinen Essgewohnheiten.
- Häufiger Schluckauf.
- Milch verursacht Aufstoßen (Cale., Mag-c., Zinc.).
- Heißhunger während Fieber (Ars., Caps., Chin., Phos.).
- Würgen beim Husten (Carbo-veg., Nit-ac., Puls.).
- Durst während des Essens (Am-c., Cocc., Nat-c.), während Fieber (Ars., Merc., Tub.).
- Heftiges Erbrechen unmittelbar nach dem Essen, begleitet von Stuhldrang. Erbrechen nach Trinken von kaltem Wasser; während Husten. Erbrechen von Blut und Galle.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Karzinom des Magens bei jungen Kindern.
 - Große Empfindlichkeit des Epigastriums (Camph., Nux-v., Sulph.).

ABDOMEN

- Beschwerden im Abdomen besser durch warme Milch (Crot-t., Op.).
- Kolik nach Milch (Cupr., Lac-d., Raph.).
- Reichliche Flatulenz morgens nach Rumpeln im Abdomen.
- Große Empfindlichkeit des Abdomens, schon der geringste Druck durch Betttücher verursacht ernste Beschwerden (Apis., Bell., Nux-v.).
- Schmerzen im Abdomen während des Essens, nach Milch und während des Stuhlgangs.
- Pulsierender Schmerz im rechten Hypochondrium. mit Erbrechen.

• Untersuchungsergebnisse:

- Abdomen aufgebläht.
- Vergrößertes und hartes Abdomen.
- Leberabszess (Fl-ac., Hep.).
- Hepatomegalie.
- Leistendrüsen geschwollen (Dulc., Merc-c., Nit-ac.).

REKTUM

- Verstopfung, mit Kälte des Körpers und Hitze des Kopfes.
- Hämorrhoiden, mit Absonderung von hellrotem Blut.
- Unwillkürlicher Stuhlgang während Konvulsionen (Anan., Lach., Oena., Stry., Tarent.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Askariden (Chen-a., Cina, Ferr-s., Spig.).
 - Übelriechender Flatus (Carbn-s., Sulph., Zinc.).
 - Analprolaps (Ign., Mur-ac., Podo., Sep.).
 - Stuhl wie geronnen (Rheum., Stann., Valer.), weich, dünn, gelb, weiß.

HARNWEGE

- Häufige Absonderung von blassem Urin.
- Unwillkürliches Urinieren während epileptischem Anfall (Caust., Hyos., Plb., Zinc.).
- Glomerulopathie, Nephritis.
- Schmerzen in der Niere mit Atemnot und Ohnmacht.
- Harnverhaltung (Meny., Op., Pareir., Ter.).
- Harnsperre (Canth., Laur., See., Stram.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blutiger Urin.
 - Spärlicher Urin.
 - Urin braun, übelriechend.

GENITALIEN

- Spielt ständig mit seinen Genitalien (Hyos.).
- Frühe und übermäßige Masturbation.
- Sucht das Alleinsein, um zu masturbieren.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Hartnäckige Heiserkeit (Arum-t., Stann.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Übermäßige Ansammlung von Schleim in Bronchien und Larynx.
 - Laryngitis.
 - Laryngoskopie: Ulcera im Larynx.

ATEMWEGE

- Asthma, schlimmer nachts, nach Mitternacht, 3 Uhr morgens (Am-c., Ant-t., Cupr., Kali-c., Nat-m., Samb.), besser beim Vorbeugen (Aral., Ars., Lach., Spong.), beim Aufrechtstehen; das Kind bekommt keine Luft und krümmt sich nach der geringsten Anstrengung wie ein Hund.

- Schwierige Atmung, muss sich aufsetzen oder vorbeugen.
- Dyspnoe; keucht wie ein Hund.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Brust: Beidseitiges Rasseln und Giemen; verminderte Luftzufuhr.
 - Keuchende Atmung.
 - Primärkomplex.

HUSTEN

- Nächtlicher Husten nach Mitternacht, gegen 3 oder 4 Uhr (Am-c., Kali-c., Op., Rumx.).
- Husten schlimmer **vor dem Essen**, nach dem Essen (Kali-bi., Nux-v.), durch Gemüts-erregung (Lach., Nux-v.), tagsüber (Euphr., Phos.), im Zimmer (Brom., Coc-c., Spong.); besser **nachts**, durch Diarrhoe (Sang.).
- Trockener Kitzelhusten oder tiefer, hohler Husten.
- Erstickender Husten.
- Heftiger Husten, der Erbrechen hervorruft.

HERZ UND KREISLAUF

- Schnelle Herztätigkeit bei Hyperthyreose.
- Untersuchungsergebnis:
 - Puls langsam, intermittierend, unregelmäßig.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Bläschen auf der Brust.
 - Blut sickert aus den Brustwarzen (Ham., Lyc., Merc., Merc-c., Sep., Sulph.).

RÜCKEN

- Zucken im Nacken, vor Spasmen.
- Faustgroße Knochenaufreibungen.
- Steifheit des Nackens.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Karies der dorsalen Wirbel.
 - Krümmung der dorsalen Wirbelsäule (Cale., Lyc., Puls., Syph.).
 - Schweiß auf dem Sakrum (Coc-c., Hyos., Plan.).

EXTREMITÄTEN

- Krämpfe in den Beinen wecken das Kind.
- Große Schwäche der Beine.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszess der Finger, Zehen.
 - Arthritische Schwellungen.
 - Ungeschicklichkeit der unteren Glieder, stolpert beim Gehen.
 - Blasen auf den Handflächen (Canth., Kreos., Ran-b.) und Fußsohlen (Ars., Bell., Gaert), Blasen auf den Fußsohlen, die eine gelbe Flüssigkeit absondern.
 - Kalte Füße während Fieber (Cocc., Stram., Sulph.), während Kopfschmerz (Gels., Sep.).

- Risse und Fissuren auf den Händen.
- Vergrößerte Leistendrüsen.
- Erysipel auf den Armen (Lach., Rhus-t.).
- Wundreibung zwischen den Gesäßbacken (Graph., Nit-ac., Sep.) und Schenkeln (Hep., Kali-c., Kreos., Merc.) durch Windeln.
- Verletzungen an den Fingern; der Schmerz läuft streifenartig die Arme aufwärts. Nach leichter Prellung des (kleinen) Fingers ziehender Schmerz, mit Röte den ganzen Arm entlang, den Lymphgefäßen folgend bis in die Achselhöhle; dort schmerzhaftes Lymphknotenschwellungen verursachend (v. Lippe).
- Untere Extremitäten geschwollen.
- Übelriechender Fußschweiß (Lyc., Teil., Thuj.).
- Schmerzhaftes Hühneraugen (Calc., Lyc., Rhus-t., Sep.).
- Panaritium (Dios., Iod., Myris.), blauschwarze Schwellung um den Fingernagel herum (Daumen), von Eiterung gefolgt.
- Pemphigus (Lyc., Sep.).
- Schweiß in der Kniekehle (Carb-an., Sulph.).
- Stolpernder Gang (Kali-br., Plb., Zinc.).
- **Ausstrecken der Beine vor epileptischem Anfall.**
- Torkelnder Gang (Con., Pic-ac., Plb.).
- Zittern der Glieder.
- Warzen an der Hand (Dulc., Nit-ac., Thuj.), an den Fingern (Lac-c., Sep.).

SCHLAF

- Große Schläfrigkeit bei Kindern unmittelbar nach dem Stillen; unwiderstehlicher Drang zu schlafen nach dem Essen (Agar., Cale., Nux-v.).
- Schlaflage auf der linken Seite (Mag-m., Phos., Thuj.).
- Sprechen (Bell., Kali-c., Lach.), Stöhnen (Aur., Bry., Calad.) oder Weinen (Castm., Cham., Samb.) im Schlaf.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Komatös nach Konvulsionen (Atro., Cic., Plb.).
 - Erwacht zu früh, wie aus Furcht.

TRÄUME

- Ängstlich.
- Von etwas Großem.
- Albträume.

FIEBER

- Kalte Füße während Fieber (Kreos., Ruta, Sabin.).
- Hitze, mit Apathie (Con., Op., Ph-ac.) oder Delirium (Bapt., Puls., Rhus-t.).
- Heißer Kopf und warmer Körper.
- Öliges Schweiß (Bry., Chin., Mag-c., Merc., Stram., Thuj.).

HAUT

- Abszess mit ausgeprägter Abgrenzung und blauem Hof.
- Aufsteigende Lymphangitis mit roten Streifen, die den Arm hinauflaufen.
- Schmutzige (Ars., Caps., Psor., Sanic., Sulph.), fettige Haut (Bry., Chin., Thuj.).

- Haarsträuben, Gänsehaut (Hell., Par., Verat.).
- Jucken und Brennen.
- Pusteln, Eiterung bei jeder kleinen Verletzung; kleine Wunden eitern sehr.
- Kleine und große Blasen, die aufplatzen und eine rohe Oberfläche hinterlassen, aus der eine ätzende Flüssigkeit austritt.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Beulen.
 - Frostbeulen (Agar., Nit-ac., Petr.).
 - Empfindung, als ob Hautfetzen lose herumhingen (Kreos., Phos., Sabad.).
 - Panaritium mit Schmerz, der den Arm hochläuft.
 - Pemphigus: Gelbe Blasen öffnen sich und hinterlassen eine rohe Oberfläche, aus der gelbliche, ätzende Flüssigkeit austritt.
 - Rote Streifen unter der Haut (Apis, Euph., Ph-ac., Sulph.).
 - Röte der Haut.
 - Scabies.
 - Die Haut wird schnell wund.
 - Die Haut ist feucht oder trocken und von jedem Temperaturwechsel beeinflusst.
 - Thrombophlebitis.
 - Ungesunde Haut (Hep., Petr., Rhus-t.).
 - Gelbe Verfärbung der Haut.

ALLGEMEINES

- **Abmagerung des Körpers, aber Abdomen aufgetrieben;** große Abmagerung bei gutem Appetit.
- Adipositas in der Kindheit.
- Schwitzt schnell bei der kleinsten Anstrengung (Agar., Kali-p., Zinc.).
- Großes Verlangen nach Sport bei jungen Kindern.

AUTISMUS

Bei Autismus zeigt Bufo folgende Symptome:

- Abneigung gegen Gesellschaft.
- Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.
- Epileptische Konvulsionen.
- Ständiges Kichern (Cann-i., Nat-m., Stry.).
- Höchster Grad von Autismus; es ist äußerst schwierig, Kontakt zu dem Kind herzustellen.
- Geistige und physische Entwicklung gehemmt.
- Wut.
- Ruhelosigkeit.
- Geräuschempfindlich.

DOWN-SYNDROM

Beim Down-Syndrom zeigt Bufo folgende Symptome:

- Geistesabwesend.
- Verhaltensprobleme.

- Muskelbeschwerden, besonders Hypotonie und Spannungslosigkeit.
- Angeborene Herzkrankheiten, besonders Klappendefekte.
- Ständiges Zusammenbeißen der Zähne (Lyc., Phyt., Podo.).
- Übermäßige Freude.
- Dämmlicher Gesichtsausdruck.
- Schaumiger Speichel (Apis, Bry., Ipec., Nux-m.), Speichelblasen machend (Ign, Merc.).
- Nägelkauen.
- Spielen mit den Genitalien (Bell., Hyos., Stram., Ust.).
- Gehör empfindlich für Geräusche.
- Schreien, Heulen.
- Geschwätzigkeit.
- Vorliebe für Computer.
- Macht verschiedenartige Gebärden.
- Geistige und physische Retardierung.
- Monomanie (Aloe, Ign., Sil.).
- Auffallende Kopfbewegungen.
- Verspielt.
- Herausgestreckte Zunge.
- Empfindlich für Musik.
- Empfindlich gegen Geräusche, aber Musik bessert.
- Kreischen.
- Sprache schwierig, unartikulierte, langsam und unverständlich.
- Leicht aufschreckend.
- Schüchternheit.
- Weint leicht.

ASPERGER-SYNDROM

Beim Asperger-Syndrom zeigt Bufo folgende Symptome:

- Abneigung gegen Gesellschaft.
- Macht verschiedenartige Gebärden.
- Geistige Retardierung.
- Ruhelosigkeit.

EPILEPSIE

VOR DEM ANFALL

- Aura: Im Abdomen, **unverständliche Sprache**, im Uterus (Cimic.) und von da aus zum Magen ziehend, im Magen (Cic., Hyos., Nux-v., Plb.), vom Solarplexus zu den Genitalien, erweiterte Pupillen, Mund weit offen, Augen nach oben und nach links verdreht, erweiterte Pupillen, die nicht auf Licht reagieren (Arg-n.), von den Sexualorganen ausgehend, Ruhelosigkeit, Taubheit des Gehirns, Zucken im Nacken.
- Alberne, sinnlose und unverständliche Sprache.
- Kopf zur Seite gezogen (Caust., Lyc., Stram.).
- Reizbarkeit und Zorn.
- Zucken der zervikalen Muskeln (Brv.).

- Leckbewegungen der Zunge.
- Lachen (Aether., Camph., Cupr., Plat.).
- **Weit offenstehender Mund.**
- Ruhelosigkeit (Arg-n.) und Kreischen; rennt schreiend durchs Haus, bis er bewusstlos ist.
- **Ruhelosigkeit der Extremitäten.**
- Kreischen.
- Seufzen.
- Steifheit der Extremitäten, besonders der oberen, Daumen nach innen geschlagen.
- **Ausstrecken der Beine.**
- Zucken am ganzen Körper nimmt schnell an Heftigkeit zu, bis das gesamte Muskelsystem in extremem Aufruhr ist.

WÄHREND DES ANFALLS

- Zungenbiss (Absin., Art-v., Cupr., Op.).
- Beißen (Cupr., Tarent.).
- Einschlagen der Daumen.
- Ständige krampfhaftige Bewegung der Augäpfel.
- Konvulsionen beginnen im Abdomen (Aran., Cale.) oder im Gesicht (Hyos., Lach.).
- Konvulsionen mit Hinfallen.
- Konvulsionen in bewusstlosem Zustand (Calc., Plb., Vise.).
- Krampfhaftige Rollbewegung der Augen.
- Neigung zu masturbieren während der epileptischen Konvulsionen (Cale., Lach., Plat., Stram.).
- Epilepsie-ähnliche Konvulsionen.
- Gesicht in Schweiß gebadet (Cocc.).
- Gesicht wird rot (Cic., Glon., Op.).
- Fällt bewusstlos zu Boden, mit Schreien, es folgen Spasmen in den Gliedern und verzerrte Gesichtsmuskeln.
- Knirscht mit den Zähnen (Hyos., Sulph., Tarent.) und beißt sich auf die Zunge (Art-v., Cupr., Op.), blutiger Schaum vor dem Mund.
- Unwillkürliches Urinieren (Hyos., Zinc.).
- Unwillkürlicher Stuhlgang während Konvulsionen (Oena., Stry., Tarent.).
- Lachen.
- Keuchende Atmung.
- Schweiß während Konvulsionen, besonders auf dem Rücken und im Gesicht.
- Der Puls wird immer schneller und fadenförmig, wenn die Krämpfe häufiger werden.
- Hirnerweichung (Caust.).
- Schnarchende Atmung mit puffender Ausatmung.
- Plötzliche heftige Konvulsionen.
- Die Glieder werden kalt, Kopf und Gesicht immer heißer, je häufiger die Krämpfe auftreten.
- Tonische Krämpfe.
- Schwindel (Cale., Hyos.)

- Lachen.
- Lauter schnarchender Schlaf.
- Betäubung zwischen (Aur., Cic., Hell., Hyos., Oena., Op.) den Konvulsionen.
- Bewusstlosigkeit.

MODALITÄTEN

- Konvulsionen schlimmer nachts, besonders gegen Mitternacht (Cina, Zinc.), schlimmer nach Schlaf (Cupr., Lach., Op., Sil.), nach Zorn (Cale., Cham., Cupr., Nux-v., Op.), während des Essens, durch sexuelle Erregung, von sexuellen Exzessen, während des Schweißes, vor und während der Menses, von unterdrückten Menses, durch Furcht (Cale., Hyos., Kali-br., Stram.), **durch Furcht der Mutter, besonders wenn sie das Kind noch stillt** (Cham., Nux-v., Op.), periodisch, jede Woche, bei Neumond (Cupr., Kali-br., Sil.), durch Masturbation (Cale., Lach., Plat.), nach Verletzungen, bei Erregung, im warmen Raum, bei Berührung, **nach Zahnextraktion**, während Eiterung.

BUFO UND HYOSCYAMUS BEI EPILEPSIE UND KONVULSIONEN

GEMEINSAME SYMPTOME

- Aura im Magen gefühlt.
- Konvulsionen schlimmer durch Erregung, Furcht, vor und während Menses, während Schlaf.
- Konvulsionen beginnen im Gesicht.
- Tiefschlaf nach Konvulsionen.
- Schaum vor dem Mund während epileptischer Konvulsionen.
- Zähneknirschen während des epileptischen Anfalls.
- Unwillkürlicher Harnabgang während Konvulsionen.
- Petit mal: Häufige Anfälle von Bewusstlosigkeit.
- Ruhelosigkeit vor Konvulsionen.
- Aufschreien vor Konvulsionen.
- Benommenheit zwischen den Konvulsionen.
- Schwindel während der epileptischen Konvulsionen.

HYOSCYAMUS

- Aura: Beschwerden beim Hören, bläuliches Gesicht, Ohrgeräusche, Beschwerden beim Sehen, Heißhunger, Funken vor den Augen, Schwindel.
- Konvulsionen schlimmer beim Beginn der Menses.
- Konvulsionen nach Schlaflosigkeit.
- Konvulsionen nach Schwindel.
- Konvulsionen von Würmern.
- Konvulsionen mit Kälte des Körpers.
- Konvulsionen mit Lähmung.
- Konvulsionen mit Schreien.

BUFO UND CALCIUM CARBONICUM BEI EPILEPSIE UND KONVULSIONEN

GEMEINSAME SYMPTOME

- Aura vom Solarplexus her.
- Konvulsionen schlimmer während Schlaf.

- Konvulsionen schlimmer durch Furcht.
- Konvulsionen nach Zorn.
- Konvulsionen beginnen im Abdomen.
- Konvulsionen mit Hinfallen.
- Epilepsie durch Furcht.

CALCIUM CARBONICUM

- Aura: Beschwerden beim Hören, Kaubewegungen, Herzklopfen von Kopfschmerzen, Heißhunger, Beschwerden beim Sehen.
- Aura: Gefühl, als würde eine Maus den Arm oder das Bein hochlaufen.
- Konvulsionen nach Ärger.
- Konvulsionen beginnen im Arm.
- Konvulsionen während Zahnung.
- Konvulsionen durch Kränkung.
- Konvulsionen bei Hydrozephalus.
- Kopfschmerzen nach epileptischen Konvulsionen.
- Heißhunger nach epileptischen Konvulsionen.
- Ausstrecken der Gliedmaßen vor Konvulsionen.
- Schwindel nach epileptischen Konvulsionen.
- Erbrechen nach epileptischen Konvulsionen.

CALCIUM ACETICUM

(Essigsäure Kalkerde - Calc-acet.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Beschwerden des Magen-Darm-Traktes und der Lungen.
- ▶ Bronchitis mit lockerem, rasselndem Husten. Auswurf ist fibrin- und membranartig. Schwierige Atmung besser durch Zurücknehmen der Schultern.
- ▶ Durchfall während der Zahnung. Häufig reichlicher, grüner Schleim aus dem Rektum. Sauer riechender Stuhl mit heftigem Jucken um den Anus.
- ▶ Das Schlüsselsymptom ist **Durchfall ohne Schwäche**.

CALCIUM BROMATUM

(Bromcalcium - Calc-br.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Dick, blond, reizbar, ruhelos und korpulent.
- ▶ Schüchternheit.
- ▶ Vergrößerte Lymphknoten.
- ▶ Anfällig für Katarrh der Eustachischen Röhre.
- ▶ Schwerhörigkeit durch Katarrh der Eustachischen Röhre.
- ▶ Schlaflosigkeit bei Kindern besonders während der Zahnung.

CALCIUM CARBONICUM

(Calcarea carbonica, Calciumkarbonat aus den mittleren Anteilen der Austernschale - Cale.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Die Kinder **können Gewalt in keiner Form ertragen**; verstecken sich, wenn andere Kinder streiten; meiden härtere Spiele wie Rugby, Fußball und Hockey; stattdessen fühlen sie sich wohl bei Spielen zu Hause wie beim Kartenspielen, Schach, Lego, Scrabble, Uno etc; extrem **ablehnend gegen Horror- oder Kriegsfilme**.
- ▶ **Schrecken leicht zusammen** bei dem geringsten Geräusch.
- ▶ **Alpträume**: Das Kind erwacht nachts und sieht **schreckliche Gesichter** in der Dunkelheit.
- ▶ Schlimm ist es, wenn sie **verspottet** oder **ausgelacht** werden; dann geben sie oft jede Aktivität auf, um anderen keine Gelegenheit zu geben, über sie zu lachen.
- ▶ **Angst** in der **Dunkelheit**, will nicht alleine im Zimmer schlafen; später genügt ein kleines Licht im Schlafzimmer.
- ▶ **Langsam** in der Schule, **langsam** bei Bewegungsspielen, **tollpatschig** in ihren Handlungen.
- ▶ **Träge** Einstellung; fühlen sich auch glücklich, wenn sie verstopft sind.
- ▶ Große Angst vor dem Zahnarzt oder Kinderarzt, vor Untersuchungen und Impfungen.
- ▶ Plötzliche schlechte Nachrichten in der Schwangerschaft begünstigen die Geburt eines Calc-Säuglings.
- ▶ Sehr bekümmert, wenn sie von der Erkrankung anderer hören oder bei Todesnachrichten etc.; können auch losschreien oder grundlos weinen.
- ▶ Frühreife, intelligente und hart arbeitende Kinder.
- ▶ Langsam beim Sprechen, denkt häufig lange nach, bevor er antwortet.
- ▶ Das Kleinkind hat fast immer die Finger im Mund; jüngere Kinder spielen gern mit den Fingern (Stöckchen zerbrechen, Geld zählen).

KÖRPER

- ▶ **Lufthunger**, Bedürfnis nach frischer Luft, besonders in geschlossenen und schlecht belüfteten Räumen (Puls.).
- ▶ **Kälte** verschiedener Körperteile, z. B. Abdomen, Füße, Kopf, Beine.
- ▶ **Reichlicher Kopfschweiß** im Schlaf (Sanic., Sil.) und auch an den Füßen.
- ▶ **Skrofulöse Diathese** (Neigung zu generalisierten Lymphknotenschwellungen, besonders am Hals und mesenterial).
- ▶ **Weiche Knochen**, vergrößerte Epiphysen, offene Fontanellen, mit Anlage zur Rachitis.

- ▶ Blondes Haar, blaue Augen, helle Haut, heller Typ, besonders Mädchen wachsen oft zu schnell.
- ▶ Das Kind will nicht laufen; möchte ständig von den Eltern oder andern Familienmitgliedern getragen werden, kann sogar Wutanfälle bekommen, wenn ihm das verweigert wird.
- ▶ Charakteristisch sind Kraniotabes, Vorwölbung des Stirnschädels, Makrozephalie bei Kindern mit Rachitis, Hydrozephalus, Osteogenesis imperfecta oder Ehlers-Danlos-Syndrom.
- ▶ Schwierige und verspätete Zahnung.
- ▶ Extrem fröstelnde Kinder, obwohl es ihnen bei der kleinsten Anstrengung wie beim Laufen, Stehen oder Spielen schnell heiß wird.
- ▶ Rasch schwindlig; Kinetose und Seekrankheit.
- ▶ Großer Kopf und dicker Bauch.
- ▶ Milch wird vom Neugeborenen verweigert. Das Kind ist zwar hungrig und schreit, will aber nicht an der Brust saugen.
- ▶ Oft sehen sie fit und gesund aus und doch haben sie wenig geistige und körperliche Energie.
- ▶ Empfindlich gegen Luftzug, besonders gegen kalte und feuchte Luft.
- ▶ Neigung zur Fettsucht mit dickem oder stämmigem Körper, aber extrem schwach. Bei der Untersuchung findet man mehr weiches Fett als Muskelmasse. Schwache Muskeln und Sehnen, verstaucht sich leicht die Fußgelenke.
- ▶ Die Hände eines Calc.-Kindes fühlen sich weich, nachgiebig (schwacher Griff) und etwas kühl an; sie müssen aber nicht unbedingt feuchtkalt sein.
- ▶ Trias des Calc.-Kindes: Schwitzt leicht, Erkältungsneigung, Frösteln.
- ▶ Trias des Calc.-Säuglings: Rotes Gesicht, schlaffe Muskeln, schwitzt leicht.

UNTERSCHIEDUNG ZWISCHEN CALC. UND SIL.

Klinisch sind sich **Calc.** und **Sil.** sehr ähnlich, obwohl eingehendere Studien die unten stehenden **Unterschiede** aufdecken, die die zwei Mittel klar voneinander abgrenzen.

	SILICEA	CALCIUM
Herkunft	Mineralisches Reich.	Tierisches und mineralisches Reich.
Miasmatik	Mehr psorisch.	Mehr syphilitisch.
Konstitution	Kopf und Abdomen sind unproportional groß (wie Calc.), aber der Körper ist klein und abgemagert (niemals fett und plump).	Großer Kopf, der unproportional zum Rest des Körpers ist, mit allgemeiner Fettsucht ODER absoluter Abmagerung mit in Falten hängender Haut, aber mit anormal großem Abdomen.

	SILICEA	CALCIUM
Kälte	Generell kalt und friert leicht; kann nicht warm genug werden trotz äußerer Hitze und Decken. Es gibt gelegentliche Hitzewallungen, aber das Kind kann sogar dann nicht das geringste bisschen Aufdecken ertragen. Muss warm eingepackt sein, besonders Kopf und Füße.	Kälte findet sich entweder im Allgemeinen oder an einzelnen Körperteilen; meist ist es eine innere Kälte oder ein Empfinden, als ob er feuchte Strümpfe getragen hätte. Deutliche Hitzewallungen, mit Blutandrang in Kopf und Brust und brennenden Füßen, die das Kind dazu bringen, die Decken nachts abzuwerfen (Sulph.).
Verstopfung	Bessert nicht.	Das Kind fühlt sich besser, wenn es verstopft ist.
Konvulsionen	Beschwerden durch unterdrückten Fußschweiß und Impfung. Epileptische Anfälle sind schlimmer bei Neumond.	Beschwerden durch Schreck und unterdrückte Ekzeme. Obwohl das Kind generelle Verschlechterung bei Neumond zeigt, ist dies in Fällen von epileptischen Konvulsionen nicht so deutlich.
Nervensystem	Übererregbarkeit und Überempfindlichkeit mit Ruhelosigkeit, trotz Erschöpfung und Depression. Trägheit bei nervösen Beschwerden kontraindiziert Sil.	Schwerfälligkeit, Dumpfheit und Trägheit sind deutlicher.
Schweiß	Gesamter Kopf einschließlich behaartem Kopf, Nacken und Gesicht bedeckt mit übelriechendem Schweiß. Wunde und offene Haut an den Fußsohlen und Zehen durch aggressiven Fußschweiß. Unerträglicher, saurer, aashafter Geruch des Fußschweißes.	Der Schweiß ist beschränkt auf die behaarte Kopfhaut. Keine Wunden und offene Haut an den Füßen. Übelriechender, saurer Schweiß, aber weniger deutlich als bei Sil.
Polypen	Nicht so markant.	Neigung zu Polypenbildung (nasal, aural, intestinal).
Eiterung	Regt die Eiterbildung an und beschleunigt diese. Fremdkörper werden aus dem Organismus entfernt durch die Fähigkeit, Eiter zu bilden.	Begünstigt die Resorption des Eiters und fördert daher auch Steinbildung in verschiedenen Organen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch Erwartungsspannung, **schlechte Nachrichten, Tod geliebter Menschen**, Versagen in Prüfungen, Schreck, Grobheit anderer.
- **Furcht um die Gesundheit geliebter Menschen** (Unsicherheit durch Verlust an Schutz).
- **Tollpatschig** durch **Schüchternheit**, besonders in der Gegenwart anderer; lässt dann Dinge fallen und zerbrechen.
- Von Natur aus **neugierig** und wissbegierig.
- **Von Katzen fasziniert**.
- Durch Kleinigkeiten leicht **erschreckt**; Furcht vor Tieren (besonders Hunde, Ratten und Insekten), ausgelacht zu werden, vor Dunkelheit, Bösem, Geistern, zum Zahnarzt oder Arzt zu gehen, vor hochgelegenen Orten, Nacht, Regen, Schatten und Dämmerung.
- **Dickköpfige** und böartige Kinder, die diszipliniert werden müssen; bekommen Wutanfälle, bei denen sie sich auf dem Boden rollen, kreischen und anderen ins Gesicht spucken, wenn sie zornig sind.
- **Frühreife** Kinder.
- **Sehr pflichtbewusste** oder absolut faule und verantwortungslose Kinder, die dazu neigen, alles auf den nächsten Tag zu schieben.
- **Schwach in Geometrie** und in einfachem **Rechnen**.
- Zärtlich.
- Nägelkauen.
- Kann es nicht ertragen, angeschaut zu werden.
- Kann nichts Schreckliches oder Grausames hören oder ansehen, auch nicht im Fernsehen.
- Lernt nur langsam sprechen.
- Verlangen nach Gesellschaft, schlimmer, wenn sie alleine sind.
- Verlangen, den ganzen Tag über an etwas zu knabbern.
- Sinnlose Beschäftigungen.
- Gutes logisches Denkvermögen.
- Glaubt, Geister oder schreckliche Gesichter in der Dunkelheit oder nachts im Bett zu sehen, was Schlaflosigkeit wegen Angst verursacht.
- Stellt sich vor, dass andere sie die ganze Zeit beobachten und ihre Verwirrung sehen.
- Unentschlossene Kinder.
- Spielt ständig mit seinen Händen und Fingern oder steckt sie oder andere Dinge häufig in den Mund.
- Kleptomanie.
- Spielt gerne mit Legos oder im Wasser (Sulph.); mag nicht mit weichen Teddybären oder flauschigem, fedrigem Spielzeug spielen.
- Tierliebe.
- Macht viele Fehler beim Lesen, Schreiben oder Sprechen; benutzt die falschen Wörter, verdreht sie oder buchstabiert sie falsch.
- Wiegen bessert.

- Empfindlich gegen den geringsten Verweis oder die Grobheit anderer.
- Heult und schreit aus Furcht vor dem Arzt oder Zahnarzt.

KOPF

- Reichlicher saurer Kopfschweiß, besonders der Hinterkopfregeion und der Stirn, **beim Essen** und nachts **im Schlaf**.
- **Empfindlich gegen Zugluft.**
- Katarrhalische Kopfschmerzen durch Verstopfung der Nase.
- Periodische, rechtsseitige Kopfschmerzen bei Schulkindern, bei denen der Schmerz im Hinterkopf beginnt und sich nach oben ausweitet; schlimmer durch Wetterwechsel, Luftzug, Schreck, kaltes feuchtes Wetter, Erschütterung, Licht, geistige oder körperliche Anstrengung, Waschen des Kopfes; besser durch Einhüllen des Kopfes und kalte Anwendungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ekzeme bei Kleinkindern mit feuchten, dicken Schuppen auf der Kopfhaut.
 - Exostose auf der Kopfhaut.
 - Impetigo.
 - Kernig-Zeichen +.
 - Großer Kopf; Hydrozephalus.
 - Meningitis.
 - Milchschorf bei Neugeborenen.
 - Offene und eingesunkene Fontanellen.
 - Talgretentionszysten auf der Kopfhaut.

AUGEN

- **Hypermetropie.**
- Entzündete und schmerzende Augen nach Verletzung (Symph.).
- Tränenfluss beim Hinausgehen in Wind oder frischer Luft.
- Morgendliche Verklebung der Lider.
- Pustuläre Keratokonjunktivitis bei Säuglingen in kaltem, feuchtem Wetter, mit gelblicher, eitriger Absonderung aus den Augen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akkomodative Asthenopie.
 - Blepharitis mit roten, verhärteten Gerstenkörnern an den Lidrändern.
 - Konvergenter Strabismus.
 - Tränendrüsensfistel.
 - Eiterung und Strikturbildung des Tränenkanals.

OHREN

- **Chronische Otitis media mit Hörminderung.**
- Katarrh der Eustachischen Röhre.
- Vermindertes Hörvermögen seit der Geburt oder nach Chinin-Anwendung.
- Empfindung von Wind, der aus dem Ohr kommt.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Cholesteatom.
 - Ekzematöse Ausschläge mit feuchten Absonderungen hinter den Ohren.
 - Eine Öffnung vor dem Ohr aufgrund einer angeborenen, offenliegenden Nebenhöhle (Merc.).

- Vermehrtes Ohrenschmalz.
- Trommelfellperforation (Tub.).
- Weiche, leicht blutende Polypen im Ohr.
- Otitis media mit eitriger, dick-gelber und sehr übelriechender Otorrhoe.
- Schwellung der Lymphknoten vor und hinter den Ohren.
- Drohende Karies des Processus mastoideus.

NASE

- Chronische Verstopfung der Nase durch Nasenpolypen (Phos., Teuer.) oder Kieferhöhlenentzündung; **Verstopfung der Nase nachts** (Lyc.) auf der Seite, auf der er liegt oder beim Erwachen am Morgen.
- Der Katarrh erstreckt sich zu den Stirnhöhlen (Kali-i.) und verursacht Schwere des Kopfes.
- Neigung, sich dauernd die Nase zu schnäuzen.
- Nasenbluten bei kleinen Kindern mit dunkelrotem Blut, besonders aus dem rechten Nasenloch; Nasenbluten am Morgen (Agar., Ambr., Bry.).
- Übelriechende Absonderung aus der Nase.
- Fehlender Geruchssinn.
- Benommen machende Erkältungen mit spärlichen Absonderungen aus der Nase (Stict.).
- Heftiges, anfallartiges Niesen ohne jeden Schnupfen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Adenoide.
 - Nasenpolypen, die schnell zum Bluten neigen.
 - Retronasaler Katarrh.
 - Die Nasenspitze ist rot, glänzend und knubbelig.

GESICHT

- **Gesichtsschweiß, beim Essen und im Schlaf.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akne rosacea.
 - Ängstlicher Gesichtsausdruck des Kindes, wenn es aus der Wiege gehoben wird.
 - Riss in der Mitte der Unterlippe.
 - Grünlich-gelbe, krustige, schuppige Ausschläge im Gesicht.
 - Harte und schmerzhaft Verhärtung der Parotiden (besonders auf der rechten Seite), Sublingual- und Submaxillardrüsen (Arum-t., Aur., Bar-c., Sil.).
 - Impetigo (Ant-c., Graph., Lyc.).
 - Vermehrter Haarwuchs im Gesicht (bei jungen Mädchen).
 - Blasses, kränkliches, wächsernes Gesicht mit bläulichen Ringen um die Augen (Chin, Kali-i., See.) und rissigen Lippen.
 - Schwellung der Oberlippe am Morgen (Apis, Bell.).

MUND

- Die Speisen scheinen geschmacklos bei Schnupfen.
- Milch schmeckt sauer.
- Residierende Eiterung und Abzessbildung am Zahnfleisch

- Die Zähne sind schmerzhaft empfindlich gegen Luftzug und gegen jede Kälte oder Wärme, besonders kaltes Wasser.
- Zahnschmerzen nach Trinken, besonders nach Cola-Getränken (Ant-c., Staph.); die Zahnschmerzen erstrecken sich zu den Ohren, Augen, Kieferknochen, zur Nase oder den Schläfen; mit Schwellung der Wange der gleichen Seite; mit vermehrtem Speichelfluss.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Kind beißt dauernd die Zähne zusammen.
 - Das Kind steckt ständig die Finger in den Mund.
 - Schaum vor dem Mund.
 - Zahnfleisch geschwollen und von den Zähnen abgelöst; blutet leicht.
 - Mundgeruch.
 - Landkartenzunge mit Zahneindrücken, mit weißem Belag (Ant-c., Bry., Merc.).
 - Schläft mit offenem Mund.
 - Ein wunder Mund macht das Saugen für den Säugling schwierig.

HALS

- **Schmerzen von der linken Tonsille strahlen zu den Ohren aus** (Bell., Hep., Kali-bi.).
- **Halsweh durch den geringsten Wetterwechsel** und besonders durch Kälteeinwirkung oder feuchtes Wetter.
- Chronische Pharyngitis.
- Schleim wird aus den hinteren Nasenhöhlen hochgezogen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zervikale Lymphknoten vergrößert und empfindlich.
 - Verlängertes Zäpfchen.
 - Tonsillen vergrößert, besonders auf der linken Seite.

MAGEN

- **Guter Appetit beim Frühstück;** das Auslassen des Frühstücks kann Migräneattacken innerhalb weniger Stunden verursachen.
- **Saures, übelriechendes Erbrechen** unverdauter Nahrung oder geronnener Milch, nach dem Stillen, Essen oder Trinken; schlimmer nachts, bei Zahnung und bei Husten.
- **Allgemeine Abneigung gegen Fleisch.**
- **Schwache Verdauung;** Magen schnell verdorben durch **Milch oder Brot.**
- Gesteigerter Hunger oder Heißhunger vor dem Ausbruch einer Krankheit oder vor Schmerzen (Phos., Psor.), z. B. vor Epilepsie, vor Kopfschmerzen, bei Fieber etc.
- Intensiver, brennender, unstillbarer Durst auf kleine Mengen Wasser, besonders nachts.
- Kinetose: Übelkeit und Erbrechen beim Reisen in Flugzeug, Schiff, Bus oder Auto.
- Übelkeit am Morgen (Nux-v., Puls.) und beim Anblick von Speisen, aber der Appetit nimmt allmählich zu, nachdem er ein paar Bissen zu sich genommen hat oder hat Heißhunger bald nach dem Essen durch ein leeres Gefühl im Magen.
- Erbrechen von Würmern.

- Abneigung: **Kaffee**, schleimige Speisen (Nat-m.), warme Speisen.
- Verlangen: **Eier (hart- oder weichgekocht)**, Mehl, Eiscreme, **unverdauliche Dinge**, Milch, Oliven, Backwaren, **rohe Kartoffeln**, Zucker und Süßigkeiten.

ABDOMEN

- **Laktoseintoleranz:** Hörbares Gurgeln und Rumpeln im Abdomen mit Blähungskolik um den Nabel, besonders nach Milch.
- Die Abdominalregion ist empfindlich gegen Druck, sogar der Kleidung, aufgrund übermäßiger Gasansammlung.
- Krämpfe im Abdomen unter dem Nabel, bei Säuglingen und kleinen Kindern, nach dem Füttern; das Kind krümmt sich vor Schmerzen.
- Tympanitische Auftreibung des Abdomens, besser durch Abgang von Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schlaffes, geschwollenes Abdomen bei abgemagertem Körper und Gliedern, wie bei Marasmus.
 - Abdomen sieht aus wie eine umgedrehte Untertasse.
 - Vergrößerte Leber und Milz.
 - Hervorsickern einer blutigen Flüssigkeit aus dem Nabel (Abrot., Calc-p.).
 - Ultraschallbild: vergrößerte Mesenteriallymphknoten.
 - Nabelbruch.

REKTUM

- Schmerzloser Durchfall nach Aufnahme von künstlicher Babynahrung (bei gestillten Babys), kalten Getränken, Früchten, Milch, Süßigkeiten oder Zucker; **bei Zahnung** (besonders **sofort nach dem Füttern**); während der Sommermonate.
- Verstopfung: Der Stuhl verbleibt lange Zeit im Rektum ohne Drang; mechanische Hilfe ist erforderlich, um den Stuhl zu entfernen (Sei, Sep, Sil).
- Blähungen haben einen sehr sauren Geruch.
- Gastroenteritis bei Kindern mit grünlichen, wässrigen Stühlen.
- Blutung aus dem Anus bei Stuhlgang (Rektumpolypen).
- Unwillkürliche, schaumige Stühle beim Abgang von Blähungen oder Urin.
- Setzt harten Stuhl, dann pastösen und schließlich normalen Stuhl ab.
- Stühle: Hellgelb, milchig-weiß, lehm- oder kreideartig, sauer riechend.
- Wurmbeschwerden mit Jucken um den Anus bei Kindern mit Marasmus.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Stinkender Schweiß um Anus und Perineum mit wunder Haut.
 - Rektumprolaps bei durchfälligen Stühlen.
 - Stuhluntersuchung: Spulwürmer, Madenwürmer und Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Reichliches Urinieren bei Schnupfen.
- Häufiger Harndrang.
- Gesteigerte Häufigkeit des Urinierens; gibt nur ein paar Tropfen auf einmal ab.
- Nephrotisches Syndrom.
- Stark riechender, sehr saurer, ammoniakalischer Urin bei Kleinkindern.
- Untersuchungsergebnisse:

- Urin: Albumin +, Erythrozyten ++, erhöhtes spezifisches Gewicht, Zucker.
- Weißes oder dunkelrotes sandartiges Sediment in der Windel.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Frühe und übermäßige Neigung zu masturbieren.
- Hydrozele.
- Entzündung der Vorhaut.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schweiß am Skrotum.
 - Phimose.
 - Präpubischer Kryptorchismus.
 - Hodenhochstand, besonders links.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Reichliche, hervorsprudelnde, milchige Leukorrhoe bei schwachen und anämischen kleinen Mädchen, mit unerträglichem Jucken, besonders nachts im Bett.
- Neigung zu masturbieren.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Ständiges Räuspern.
- Krupp mit pfeifendem Geräusch aus dem Larynx beim Liegen.
- Schmerzlose Heiserkeit am Morgen, schlimmer durch Reden.

ATMUNG

- Asthma beim Autofahren mit geöffneten Fenstern und Fahren gegen den Wind; besser durch Ziehen der Schultern nach hinten.
- Asthmatische Atmung durch unterdrücktes atopisches Ekzem oder Urtikaria ODER Asthma abwechselnd mit Ekzemen.
- Häufige tiefe Atemzüge.
- Pfeifende Atmung beim Hinlegen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Heißer Atem.
 - Rasselnde Atmung durch Schleim in der Brust beim Ausatmen und besonders im Liegen.

HUSTEN

- Beschwerden durch: kalte Luft, kalte Getränke, bei Zahnung, durch Essen, nach Windpocken.
- Husten: Kurz, aber immer mehrere Stöße in kurzer Folge; besser durch Auswurf.
- Auswurf: Reichlich am Morgen; eitrig, grünlich, blutig; mit stinkendem Geruch; mit salzigem oder saurem Geschmack.
- Heftige, kurze und häufige Hustenanfälle.

BRUST

- **Verschleppte Pneumonie** bei Kleinkindern mit schmutziger Zunge.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Tezthere, verhärtete Achsellymphknoten nach BCG Impfung

- **Rachitischer Rosenkranz** (Rippenknorpelwülste).
- Herzgeräusche.
- Röntgen/Thorax: Primärkomplex +.
- Zyanose.
- Herzhypertrophie durch angeborene Herzerkrankung.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Kyphose, besonders der Dorsalregion.

EXTREMITÄTEN

- Chronische Entzündung der Gelenke mit Schwellung; schlimmer bei feuchtem Wetter.
- Die Finger ermüden leicht beim Schreiben.
- Neigung zu Verstauchungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Genu valgum.
 - Genu varum.
 - Brüchige Nägel.
 - Kalte, feuchte Füße.
 - Coxa vara.
 - Handschweiß.
 - Warzen.

SCHLAF

- Im Schlaf: Zähneknirschen, Stöhnen, offener Mund, Kopfschweiß, Schreien, Reden, Aufdecken der Füße, Weinen.
- Wacht um 3 Uhr auf.

FIEBER

- Beschwerden durch: Spielen in kaltem Wasser.
- Frost:
 - Kälte einzelner Körperteile.
 - Erweiterte Pupillen, Schläfrigkeit, Trägheit, Reizbarkeit, Schweiß auf der Stirn, Ruhelosigkeit, Weinen, mit Durst.
 - Schlimmer am Abend.
- Hitze:
 - Umschriebene Rötung des Gesichtes, Tränenfluss, Kopfschweiß, Durstlosigkeit, weißer Zungenbelag mit bitterem Geschmack im Mund.
 - Die Hitze wird besonders auf dem Kopf gefühlt, mit Kälte der Extremitäten.
 - Neigung, sich aufzudecken bei Hitze, besonders die Füße.
- Schweiß:
 - Heißer Schweiß.
 - Kein Durst.

HAUT

- Die geringsten Hautverletzungen oder Kratzer eitern; z. B. durch zu enge Schuhe oder Fallen auf das Knie beim Spielen.
- Haut der Oberschenkel wird leicht wund.
- Dicke Krustenbildung bei Neurodermitis als Folge von getrockneter Sekretion.

KONVULSIONEN

- Konvulsionen durch emotionale Ursachen wie Furcht, **Schreck**, Demütigung, Ärger und Zorn; **bei Hydrozephalus**; bei Zahnung; durch **Infektionen des ZNS** wie Meningitis und Enzephalitis; bei Husten; **schlimmer in bestimmten Mondphasen**.
- Postiktaler (direkt nach dem Anfall einsetzender) Gedächtnisverlust.
- Schreien vor und während der Konvulsionen.

ALLGEMEINES

- **Entwicklungsverzögerung**; das Knochengewebe entwickelt sich nur sehr langsam; doch bleiben die Knochen zerbrechlich. Knochenverkrümmung ist ein gängiges Phänomen.
- **Starke Abmagerung** bei großem Abdomen und gutem Appetit.
- Generelle **Übersäuerung**: saurer Geruch der Absonderungen wie Schweiß, Durchfall, Erbrechen; saurer Geschmack im Mund.
- Sogar beim Sitzen in einem heißen Raum fühlt sich die Haut feucht an, aber die unteren Extremitäten sind kalt.
- Blass, schwach und schnell ermüdet.

CALCIUM CAUSTICUM

(Kalkmilch - Calc-caust.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Teilnahmslose, lethargische und adipöse Kinder.
- ▶ Tuberkulose in der Familie oder in der eigenen Krankengeschichte.
- ▶ Katarrhe der Eustachischen Röhre und schwerhörig aufgrund von chronischer Mittelohrentzündung.
- ▶ Heiserkeit der Stimme bei normalen Erkältungen.
- ▶ In hohem Maße anfällig für **Wurmbefall**; unbändiger Appetit, alle paar Stunden wollen sie riesige Mengen essen.

CALCIUM HYPOPHOSPHORICUM

(Calciumphosphat - Calc-hp.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Hastige Sprache.
- ▶ Wird sehr schnell zornig.
- ▶ Dürre, dünne, abgemagerte und rachitische Kinder.
- ▶ Wichtiges **tuberkulinisches Mittel** aus der Calcium-Gruppe.
- ▶ Primärkomplex von Tuberkulose des Abdomens bei Kindern.
- ▶ Viel Tuberkulose in der Krankengeschichte.
- ▶ Chronische Mittelohrentzündung mit anhaltendem Katarrh der Eustachischen Röhre, was zu Schwerhörigkeit führt.
- ▶ Verlangt Milch und meistens Besserung durch Milch.
- ▶ Anhaltender Hunger mit unbändigem Appetit.
- ▶ Neigung zu wiederkehrenden Furunkeln und Abszessen überall am Körper, besonders aber in Gelenknähe.
- ▶ Haut eitert bei kleinsten Verletzungen.

CALCIUM LACTICUM

(Calciumlactat - Calc-lac.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Skrofulöse Diathese.
- ▶ Tuberkulose in der Familiengeschichte oder in der eigenen Krankengeschichte.
- ▶ Calc.-Konstitution mit Katarrh der Eustachischen Röhre.
- ▶ Anämie bei fröhlichen, dicken Kindern mit einer Calc.-Konstitution.
- ▶ Ausgeprägte Abneigung gegen Milch.
- ▶ Schlaflage meist auf dem Bauch.

CALCIUM MURIATICUM

(Calciumchlorid - Calc-m.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Viele Fälle, bei denen Calc gegeben wird, brauchten eigentlich Calc-m. (A. Pulford).
- ▶ Empfindlich gegen Kritik.
- ▶ Schüchtern und reizbar.
- ▶ Abhängig von der Meinung anderer.
- ▶ Ich habe in meiner Praxis sehr oft Jan Scholtens Thema für dieses Mittel bestätigt gefunden: „Angst, dass andere sehen könnten, dass sie viel Fürsorge und Aufmerksamkeit brauchen.“

KÖRPER

- ▶ Vorherrschendes Tuberkulose-Miasma.
- ▶ Reichlich kalter Schweiß.
- ▶ Linksseitige Beschwerden.
- ▶ Dicke Kinder.
- ▶ Veranlagung zu wiederkehrenden eitrigen Abszessen und Furunkeln an verschiedenen Körperteilen.
- ▶ Chronische Mittelohrentzündung mit Katarrh der Eustachischen Röhre.
- ▶ Impetigo (Ant-c.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Abhängigkeit von den Eltern bis ins Erwachsenenalter.
- Traurigkeit bei trübem Wetter.
- Trennungsangst, vor allem bei Neueintritt in eine Einrichtung wie Schule oder Sportverein.
- Schüchternheit, Befangenheit.

KOPF

- Kopfschmerz bei Schnupfen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Tinea capitis.**
 - Eiterbeulen auf dem Kopf.

AUGEN

NASE

- Wässrige Absonderungen der Nase.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Entzündung oder chronische Vergrößerung der Parotiden und Submaxillardrüsen.
 - Empfindlichkeit der Nasennebenhöhlen.

HALS

- Untersuchungsergebnis:
 - Chronische Vergrößerung der Halslymphknoten.

MAGEN

- Übelkeit beim Fahren in Zug oder Auto.
- Hartnäckiges Erbrechen; aller Speisen und Getränke.
- Erbrechen, wenn keine Nahrung aufgenommen wurde.
- Verlangen: Schokolade und Süßigkeiten.

ABDOMEN

- Gelbsucht.
- Untersuchungsergebnis:
 - Leber vergrößert und empfindlich.

HARNWEGE

- Untersuchungsergebnis:
 - Acetonurie.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Pleuritis mit Erguss.
 - Empfindlichkeit der Herzregion.

SCHLAF

- Schläft auf dem Abdomen oder der rechten Seite.

HAUT

- Diabetische Furunkel.
- Erleichtert Schmerzen und Schwellung von Eiterbeulen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ekzeme bei Kleinkindern.
 - Fisteln mit Hautgeschwüren.

ALLGEMEINES

- **Drüsenschwellungen:** Dieses Mittel bringt Schwellungen und Verhärtungen zum Erweichen und Verschwinden.
- **Vermehrte Sekretion von Schleim, Schweiß und Urin.**
- Dem Kind geht es schlechter in warmem feuchtem Wetter; es bevorzugt frische Luft

CALCIUM PHOSPHORICUM

(Calciumphosphat - Calc-p.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Kinder, deren Eltern unreif, verantwortungslos oder asozial sind oder unter Drogenmissbrauch, finanziellen Belastungen oder Eheproblemen leiden, die ihre Kinder ablehnen oder geringe Stresstoleranz zeigen. Auch Alleinerziehende können definitiv zur Verursachung eines Calc-p.- Zustandes beitragen.
- ▶ Geistige Anstrengung über längere Zeit fällt ihnen schwer wegen Gedächtnisschwäche.
- ▶ Assimilations- und Essstörungen bei mangelnder Mutterliebe.
- ▶ Unwillkürliches Seufzen bei Kindern weist darauf hin, dass ein Elternteil großen Kummer hat (Ign.).
- ▶ Frühreife Kinder.
- ▶ Starkes Verlangen zu reisen und zu wandern. Das Kind ist immer bereit zu einem Ausflug im Auto und sei es um Mitternacht.
- ▶ Daumenlutschen, meist aus Langeweile.

KÖRPER

- ▶ Anämisch; dunkle Hautfarbe, dunkle Haare, dunkle Augen; zart, schlaksig, dürr; eingesunkener, schlaffer Bauch; lang und dünn wie eine chinesische Nudel.
- ▶ Chronische Amoebiasis, M. Crohn, fibrozystische Erkrankungen, Mukoviszidose, Colitis ulcerosa; Kinder, deren Mutter eine Enttäuschung in der Liebe (Aur., Ph-ac.) erlebt hat, anderen Kummer (Ign.) hatte oder in der Schwangerschaft geschlagen oder sexuell missbraucht wurde.
- ▶ Wachstumsstörungen bei Mangelsyndromen wie Kwashiorkor, Marasmus und Eiweißmangel, ernährungsbedingter Zwergwuchs.
- ▶ Zahnungsbeschwerden.
- ▶ Abmagerung bei körperlichen Erkrankungen wie Durchfall, Infektionen, tuberkulösem Primärkomplex, Malabsorption, Wurmbefall, Giardiasis, Amöbiasis.
- ▶ Extrem fröstelnde Patienten.
- ▶ Veranlagung zu Malabsorptionszuständen wie Zöliakie, Glutenunverträglichkeit oder gluten-induzierte Enteropathie, besonders in der frühen Kindheit.
- ▶ Erbliche und erworbene Muskelerkrankungen; das Kind ist schlaff und wirkt schlapp („floppy infant“), z. B. bei benigner angeborener Muskelschwäche (BCH), Werdnig-Hoffmann-Krankheit, kindliche spinale progressive Muskelatrophie, Myasthenia gravis, zerebrale Lähmung, Down-Syndrom.

- ▶ Darmparasiten bei mangelnder Hygiene oder durch kontaminiertes Wasser, Essen oder Umweltverschmutzung.
- ▶ Linksseitige Beschwerden; das Kind trinkt auch lieber an der linken Brust (Lyc.: rechte Brust).
- ▶ Blutige Flüssigkeit sickert aus dem Nabel des Säuglings (Abrot., Lyc., Nux-m. - austretender Urin durch offenliegenden Urachus: Hyos.)
- ▶ Skrofulöse und tuberkulöse Diathese.
- ▶ Starkes Verlangen nach Eiscreme und kalten Getränken, die aber meist nicht gut vertragen werden.
- ▶ Anlage zu brüchigen, weichen, dünnen und schwachen Knochen; Wachstumsschmerzen, Rachitis, spät schließende Suturen, langsame Knochenheilung nach Frakturen, unvollständige Ossifikation, Kyphose und Skoliose sind alles deutliche Hinweise auf Calc-p.

Vergleiche **Calc.** und **Ph-ac.** immer mit diesem Mittel, weil die Symptome ähnlich sind. **Calc-p.** entsteht durch Einträufeln von verdünnter Phosphorsäure in Kalkwasser.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch **sexuellen oder körperlichen Missbrauch.**
- Wird ängstlich und nervös mit **grundlosen Schuldgefühlen**, wenn ein anderes Kind in der Klasse angeschrien oder getadelt wird (Nat-m., Staph.).
- **Beißt** ständig **seine Nägel** oder steckt die Finger in den Mund.
- **Verlangen, ständig getragen zu werden** (Cina, Cham.).
- Entwicklungsverzögerung.
- Sehr wache Babys und Kinder, die aufmerksam jede Bewegung des Arztes verfolgen (Carc., Phos.).
- Trägheit und Geistesverwirrung durch übermäßiges Lernen, Lesen oder geistige Anstrengung.
- Dyslektische Kinder.
- Ausgesprochen kitzlig (Kali-c.).
- Furcht vor Hühnern, Dunkelheit und Gewittern.
- Unwillkürliches Seufzen (Ign.).
- Liebt Tiere.
- Liebt es, im Wasser, mit Puppen oder Scrabble zu spielen.
- Trägt gern pink- oder violettfarbene Kleidung.
- Macht viele Fehler beim Schreiben und Sprechen, verwendet z. B. die falschen Wörter oder wiederholt Wörter.
- Fühlt sich mit Fremden wohler und enger verbunden als mit Familienmitgliedern (Lac-c.).
- Schulkinder, die schüchtern sind und denen es an Selbstvertrauen fehlt.
- Empfindlich gegen Kritik und die Meinung anderer.
- Schninnisch und beleidigend

- Lampenfieber.
- Weint, wenn ihm Vorhaltungen gemacht werden.

KOPF

- Der Kopf ist **empfindlich gegen Zugluft**.
- Kopfschmerzen bei Schulkindern oder Migräne in der Pubertät; durch **Fernsehen**; besonders über dem Hinterhauptshöcker, über den Augen, **entlang den Suturen**; schlimmer durch Wetterwechsel, kaltes Wetter, **Essen**, geistige oder körperliche Anstrengung, bei Verstopfung; besser durch kalte Anwendungen; begleitet von **Blähungen und Dyspepsie**.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Hydrozephalus**.
 - Alopecia areata der Kopfhaut.
 - Das Kind ist unfähig, den Kopf aufrecht zu halten.
 - Fontanellen, die offen bleiben oder sich abwechselnd schließen und wieder öffnen.
 - Impetigo und ekzematöse Ausschläge der behaarten Kopfhaut.
 - Großer Kopf.
 - Kopfschweiß (aber nicht so viel wie bei Calc. oder Sil.).
 - Dünne und brüchige Schädelknochen.

AUGEN

- Photophobie mit Augenschmerzen beim Lesen in künstlichem Licht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hervortretende Augen.
 - Lange, feine Wimpern.
 - Strabismus.
 - Schweiß auf den Lidern und Brauen.

OHREN

- Ohrenschmerzen schlimmer **nachts**, in kalter Luft, in kaltem oder feuchtem Wetter oder durch **Wasser, das beim Schwimmen in das Ohr dringt**.
- Vermindertes Hörvermögen durch vergrößerte Tonsillen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Katarrh mit Beteiligung der Eustachischen Röhre.
 - Entzündung des Felsenbeines des Os temporale.
 - Ohrenpolypen.
 - Berührungsempfindlichkeit der Ohren.

NASE

- Schnupfen mit wässriger Absonderung und gesteigertem Speichelfluss, schlimmer in einem **kalten, klimatisierten Raum** oder in kalter Luft; besser in einem **warmen Raum**.
- **Jede Erkältung setzt sich in den Tonsillen fest**.
- Der Schnupfen greift auf die Stirnhöhlen über.
- Nasenbluten beim Schnäuzen, besonders am Nachmittag.
- Verstopfung der Nase in einem warmen Raum.
- Ränder der Nasenlöcher sind wund durch dauerndes Naseputzen.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Vergrößerte Adenoide.
 - Nasenspitze eiskalt.
 - Polypen, die leicht bluten.

GESICHT

- Kalter Schweiß auf dem Gesicht im Schlaf, besonders um die Augen.
- Schmerzen in den Kieferknochen und Kieferhöhlen; schlimmer durch Einwirkung von Kälte und Zugluft; besser durch Hitze.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Schwellung der Oberlippe.**
 - Erdiges, schmutzig aussehendes Gesicht mit bläulichen Ringen um die Augen und kränklichem Ausdruck.
 - Schwellung und Eiterung der Parotiden und Submaxillardrüsen.
 - Wächsernes Gesicht.
 - Faltige Stirn.

MUND

- Brot und Wasser schmecken bitter.
- Brennen und Hitze auf der Zungenspitze, besonders bei Fieber.
- Fauliger Geschmack im Mund beim Erwachen am Morgen.
- Vermehrter Speichelfluss bei Schnupfen.
- Langsame und schwierige Zahnung.
- Zähne bröckeln leicht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Die Kinder stecken dauernd ihre Finger in den Mund.
 - Pelzartige weiße Färbung und Risse in der Zunge.
 - Früh auftretende und sich schnell ausbreitende Karies.

HALS

- Häufiges Räuspern und Aushusten beim Sprechen.
- Trockenheit im Hals durch Husten.
- Schmerzhaftes und raues Gefühl im Hals beim Schlucken.
- Halsweh mit Schnupfen und Schmerzen, die zu den Ohren ausstrahlen, beim Erwachen am Morgen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Vergrößertes und rotes Zäpfchen.
 - Vergrößerte Lymphfollikel (Bar-c., Bar-i., Calc., Calc-i., Sulph.).
 - Tonsillenhypertrophie.
 - Schwellung und Verhärtung der Halsdrüsen.
 - Sichtbares Pulsieren der Karotiden.

MAGEN

- Magenbeschwerden bei Schulkindern mit Schmerzen, Aufstoßen und leichtem Erbrechen nach Aufnahme von kalten Getränken, Früchten, **Eiscreme** oder Milch.
- **Leichtes und andauerndes Erbrechen von Muttermilch bei Neugeborenen und Säuglingen**

- **Der Säugling will ständig gefüttert werden.**
- **Heißhunger** am Nachmittag, besonders um ungefähr 16 Uhr, wenn das Kind aus der Schule kommt.
- Sodbrennen und saures Aufstoßen nach den Mahlzeiten.
- Kleinkindliche Verdauungsstörung.
- Lautes Aufstoßen erleichtert die Kolik des Kleinkindes.
- Kinetose mit unerträglicher Übelkeit beim Fahren in Auto und Bus.
- Schwache Verdauung; jeder Bissen schmerzt im Magen.
- Verschlimmerung: Buttermilch, Kaffee, kalte Getränke, gefrorene Speisen, Früchte, Eis und Eiscreme.
- Abneigung: Fisch, **Muttermilch**, Pilze und Süßigkeiten.
- Verlangen: **Speck** (besonders das Fett an dem Speck), Toast, Burger, Käse, Hühnchen, chinesisches Essen, Kaffee, kalte Getränke, **knusprige oder gebratene Speisen**, Eier, Mehlspeisen, Schinkenfett, Fisch, Ghee (aus Büffelmilch gewonnene Butterart), Hotdogs, Eiscreme, unverdauliche Dinge (Kalk, Griffel (= Schiefer), Erde, Kreide, Ton etc.), **Fleisch** (gesalzen oder **geräuchert**), **Pasta**, **Pizza**, Schweinefleisch, **Kartoffeln** (Chips, Pommes frites, Waffeln), rohe Speisen, erfrischende Dinge, Salami, Salz, Würstchen, Schalentiere, **geräucherte Speisen**, Gewürze, Spinat, Süßigkeiten, süße Waffeln.

ABDOMEN

- Krampfende, kniefende Schmerzen bei Schulkindern, nach Verzehr von **kalten Getränken**, Früchten, **Eiscreme** oder Milch, mit Stuhldrang; besser nach Abgang von Blähungen oder Stuhl.
- Blähungen mit tympanitischer Auftreibung des Abdomens.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hitze des Abdomens bei Fieber.
 - Absonderung einer blutigen Flüssigkeit aus dem Nabel bei Neugeborenen.
 - Schlaffes Abdomen (Calc. hat ein vergrößertes Abdomen).
 - Eingezogener Nabel.
 - Schwellung der Leisten- und Mesenterialdrüsen.

REKTUM

- Durchfall: Heiße, wässrige, stoßweise, unverdaute, schleimige Stühle mit sehr üblem Geruch; bei abgemagerten, schwachen Kindern; nach der geringsten Unvorsichtigkeit beim Essen, besonders nach kalten Getränken, Früchten oder Eiscreme; nach jeder Art **emotionaler Erregung** (Zorn, Furcht, Kummer etc.) oder bei Zahnung.
- **Rektumprolaps** bei Stuhlgang.
- Cholera infantum mit grünen, wässrigen Stühlen.
- Durchfall abwechselnd mit Hautausschlägen.
- Blutung aus dem Anus bei und nach Stuhlgang.
- Abgang von vielen stinkenden Blähungen beim Stuhlgang, besonders bei Durchfall.
- Tenesmus im Rektum bei Stuhlgang, besonders bei kaltem Wetter; besser nach Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnis:
 - Feuchtigkeit sickert aus dem Rektum.

HARNWEGE

- M. Addison.
- Reichlicher Urin, verbunden mit enormer Erschöpfung.
- Dunkel gefärbter Urin mit sehr starkem Geruch.
- Häufiges Urinieren bei kaltem oder feuchtem Wetter.
- Spritzender Strahl.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Eiter ++, Erythrozyten +, Sediment (Phosphate), erhöhtes spezifisches Gewicht, Zucker ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Verstärktes sexuelles Verlangen bei Kindern mit Neigung zu masturbieren, mit häufigen Erektionen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Präpubischer Kryptorchismus.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Reichliche albuminöse oder cremige, milde, übelriechende Leukorrhoe bei kleinen Mädchen.
- Verspätete Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale.
- Verspätete erste Menses bei Mädchen mit geringer Körpergröße.
- Gesteigertes sexuelles Verlangen mit häufiger Neigung zu masturbieren bei jungen Mädchen.

ATMUNG

- **Atemnot bei Babys, wenn sie hochgehoben oder aus der Wiege gehoben werden** (Borx.).
- Asthma begleitet von Anämie.
- Muss häufig tief durchatmen.
- Periodische Atemnot mit Husten beim Aufstehen am Morgen, besser beim Hinlegen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Heißer Atem.
 - Hyperventilation.
 - Rasselnde Atmung.
 - Seufzende Atmung.

HUSTEN

- Der Husten wird besser beim Hinlegen; schlimmer bei kaltem Wetter.
- Husten bei Fieber nach kalten Getränken.
- Trockener, hackender Husten Tag und Nacht, aber schlimmer am Morgen (6-7 Uhr) und bei feuchtem Wetter.
- Kitzelhusten am Abend.
- Gelblicher Auswurf am Morgen.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Magerer Brustkorb.

RÜCKEN

- Spasmen im Rücken.
- Steifheit der Zervikalregion durch Luftzug.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verkrümmung der Wirbelsäule.
 - Wirbelsäulen-Tuberkulose.
 - Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

- Wandernde rheumatische Schmerzen in Schulter, Knie und Fingergelenken; schlimmer bei Kälteeinwirkung oder durch Wetterwechsel; besser durch warme Anwendungen.
- Kontraktion der Sehnen und Muskeln an der Kniekehle und der Kniesehne beim Laufen; besser durch kontinuierliches Gehen.
- Zittern der Hände bei Kopfschmerzen und bei Erbrechen.
- Die oberen Glieder sind kälteempfindlich.
- Schwäche und Krämpfe in Fußgelenken und Waden beim Laufen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalte Hände, besonders die Finger.
 - Angeborene Hüftgelenksluxation.
 - Verkrüppelte Glieder nach Poliomyelitis.
 - Gekrümmte und gebogene Gliedmaßen.
 - Exostose der Tibia.
 - Frakturen.
 - Ruhelose Beine.

KNOCHEN UND GELENKE

- Angeborene Coxa vara.
- Entwicklungsbedingte Hüftgelenksdysplasie.
- Exostose.
- Wachstumsschmerzen (Conch., Mag-met.).
- Juvenile rheumatoide Arthritis (Ruta folgt gewöhnlich gut).
- Kyphose und Kyphoskoliose.
- Großer Kopf durch verspäteten Fontanellenschluss, wie bei Hydrozephalus (Zinc, ist häufig Komplement) oder infantile cerebro-makuläre Degeneration (Tay-Sachs-Syndrom).
- Perthes-Calve-Legg-Krankheit.
- Schmerzen entlang den Suturen und Symphysen.
- Schmerzen im Schienbein.
- Rheumatoide Arthritis.
- Langsamer oder verspäteter Zusammenschluss von Frakturen (Symph. folgt gut) und Fontanellen.
- Weiche, dünne Knochen.
- Eitrige Arthritis durch H. influenzae, Streptokokkus und Pneumokokkus.
- Traumatische Arthritis.
- Traumatische Subluxation des Radialköpfchens (durch Zug am Ellenbogen).
- Tuberkuläre Arthritis.
- Vitamin D-Mangel-Rachitis (Sil. folgt gut).

SCHLAF

- Das Kind ist morgens kaum zu wecken.
- Im Schlaf: Kopfschweiß (behaarter Kopf); Umherwerfen durch Ruhelosigkeit.
- Schlaflage: Knie-Brust-Lage oder auf dem Bauch, mit dem Gesicht ins Kissen gepresst.

HAUT

- Atopisches Ekzem; schlimmer bei kaltem, feuchtem Wetter und besser bei warmem, trockenem Wetter. Heißes Bad bringt Erleichterung bei Juckreiz und Hautreizungen.
- Jucken und Brennen der Haut wie von Nesselausschlag, schlimmer nach Essen.
- Urtikaria nach kaltem Baden.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ekzem.
 - Impetigo.
 - Wächsernes Aussehen der Haut.

KONVULSIONEN

- Beschwerden: Nach Essen, **bei Zahnung**.
- Während Konvulsionen: Zyanose, vornüber fallen, tetanische Starre, Schwäche, Bewusstlosigkeit.
- Die Konvulsionen sind schlimmer auf der linken Körperhälfte.

ALLGEMEINES

- Schlimmer in kalter Luft oder Wind, bei kaltem Wetter, Luftzug, frischer Luft, Schneeschmelze, feuchtem Wetter etc. Besser im Sommer.
- **Zarte, schwächliche, kränkliche** Kinder oder Kleinkinder mit Knochenbeschwerden und deutlicher Abmagerung trotz Heißhunger.
- Beschwerden während der Rekonvaleszenz.
- Beschwerden durch Wechsel von Wetter oder Temperatur, in der Pubertät, durch Masturbation, Flüssigkeitsverlust, nach Einnahme von Eisenpräparaten.
- Anämie durch Ernährungsstörungen, charakterisiert durch kalte Extremitäten und schwache Verdauung.
- Brüchige Knochen,
- Kretinismus.
- Zwergwuchs mit Entwicklungsverzögerung oder -Stillstand, besonders der Knochen.
- Drüenschwellungen bei abgemagertem Körper.
- Tonsillitis oder gastrointestinale Beschwerden in der Vorgeschichte.
- Juveniler Diabetes begleitet von Heißhunger.
- Müdigkeit nach dem Essen.
- Lernt spät laufen, mit verspäteter Knochenentwicklung.
- Muskeldystrophie.
- Erkältungsneigung.
- Neigung zu wiederkehrender Abszess- und Fistelbildung, besonders der Gelenke.

CALCIUM PICRICUM

(Calciumpikrat - Calc-pic.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Tuberkulinisches Mittel.
- ▶ Neigung zu wiederkehrenden Furunkeln. Sie bilden sich da, wo die Haut dicht am Knochen anliegt, wie z. B. am äußeren Ohr.
- ▶ Akne mit Pusteln.

CALCIUM SILICATUM

(Calciumsilikat - Calc-sil.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Beziehungen mit großem **Schutz- und Sicherheitsbedürfnis**; ein Gefühl der Unsicherheit löst Depressionen aus.
- ▶ **Abhängig** von anderen Menschen, Eltern, Freunden, Geschwistern; zu wenig Mut, um eigenständig zu sein; **Feigheit**.
- ▶ **Endogene Depression** bei Jugendlichen.
- ▶ Zu **nachgiebige** und zu **sanfte** Kinder, denen es schwer fällt, in der Familie und in der Gesellschaft für sich einzustehen.
- ▶ Faul und **passiv**.
- ▶ Trotz seiner **Intelligenz** kann er bei größeren Anstrengungen seine Energie nicht einteilen.

KÖRPER

- ▶ Beschwerden beginnen nach dem **Abstillen**; das Kind lehnt die Säuglingsmilchnahrung ab und assimiliert sie auch nicht.
- ▶ **Abmagerung** bei Kindern, bei denen Sil nicht half.
- ▶ Alles wird schlimmer durch **Überhitzung**, z. B. durch zu viele Bettdecken, zu warme Kleidung, Schlafen in schlecht belüfteten Räumen usw.
- ▶ **Überempfindlich** gegen Schmerz, Wetterwechsel, Gefühle.
- ▶ **Schwach, mager und fröstelig**. Sehr empfindlich gegen Kälte, aber schlimmer bei Überhitzung.
- ▶ Hydrogenoide Konstitution; schlimmer bei feuchtkaltem Wetter (Nat-s).
- ▶ Erschöpft durch die geringste Anstrengung.
- ▶ Abneigung gegen frische Luft.
- ▶ Tuberkulöse Diathese; häufig Tuberkulose in der Familien- und Vorgeschichte.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Schüchterne Kinder**.
- **Ausgeprägter Familiensinn**, bis hin zu überängstlicher Besorgtheit über die Gesundheit der Familienmitglieder.
- **Starkes Empfinden für Pflicht und Moral; sehr gewissenhaftes Kind**.
- Beschwerden durch Schreck und Ermahnung.

- Erwartungsspannung.
- Das Kind verlangt viele Dinge, aber wird schnell müde und erschöpft.
- Das Kind mag Spiele, bei denen man Wörter bildet, wie z. B. Scrabble; spielt nicht gerne im Freien.
- Geistesverwirrung beim Erwachen am Morgen und durch geistige Anstrengung.
- Kosmopolitisch wie Tub; liebt es zu reisen.
- Déjà-vu-Erlebnisse und Hellsichtigkeit.
- Legastheniker.
- Furcht, in Prüfungen zu versagen, vor Höhen, nachts.
- Fühlt sich grundlos schuldig.
- Leicht erschreckt durch Kleinigkeiten.
- Hasst jede Art geistiger oder körperlicher Anstrengung, weil sie Symptome zu verschlimmern scheint.
- Unwillkürliches Weinen oder Murmeln beim Hochschrecken aus dem Schlaf.
- Geringe Selbstachtung.
- Macht viele Fehler beim Schreiben oder beim Sprechen.

KOPF

- **Nachtschweiß am Hinterkopf.**
- Kopfschmerzen bei Schnupfen.
- Periodische, heftige Kopfschmerzen durch Kälte im Allgemeinen (kalte Luft, kaltes, feuchtes Wetter, durch Kaltwerden, Trinken kalter Getränke etc.), Geräusche, Bücken; besser im Stehen oder im Liegen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Der Scheitel fühlt sich kalt an.**
 - Hydrozephalus.
 - Pusteiige oder schuppig ekzematöse Ausschläge auf der Kopfhaut.

AUGEN

- Tränenfluss bei Schnupfen und in kalter Luft.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hornhauttrübung.
 - Hypermetropie (Weitsichtigkeit).
 - Rötung der inneren Augenwinkel.
 - Gelblich-grüne, dicke Absonderung aus den Augen, führt zur Verklebung.

OHREN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Vermehrtes Ohrenschmalz.
 - Gelblich-grüne, dicke, eitrige, blutdurchsetzte, übelriechende Otorrhoe.

NASE

- **Jede Erkältung führt zu Sinusitis.**
- Hellrotes Nasenbluten beim Schnäuzen der Nase.
- Heuschnupfen mit wässrigem Schnupfen im Freien und beim Aufstehen am Morgen.

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Retronasaler Katarrh.**
 - Nasenpolypen.
 - Gelblich-grüne, eitrige, übelriechende Absonderung der Nase, die harte Krusten und Schuppen bildet, wenn sie antrocknet.

GESICHT

- **Neigung zu Pickeln an Stellen mit wenig Fettgewebe, wie Kinn, Nase oder Stirn.**
- Akne rosacea, die bei Verstopfung schlimmer wird.
- Umschriebene Gesichtsrötung bei Kopfschmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Risse in der Unterlippe.
 - Ausgeprägter Gesichtsschweiß.
 - Altaussehender Gesichtsausdruck.
 - Schwellung der Parotiden und Submaxillardrüsen.

MUND

- Reichlicher Speichelfluss.
- Zahnschmerzen in zerfallenen Zähnen, schlimmer beim Kauen und bei Aufnahme von etwas Kaltem; besser durch warme Getränke oder Speisen und durch lokale äußere Wärmeanwendung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Mundgeruch.
 - Schwellung und Bluten des Zahnfleisches.

HALS

- Chronische Pharyngitis.
- Schmerzen wie von einem Splitter im Hals beim Schlucken oder Husten.
- Zäher Schleim im Hals.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Struma.
 - Geschwollene, verhärtete Halsdrüsen.
 - Der Hals ist rot mit geschwellenem Zäpfchen und entzündeten Tonsillen.

MAGEN

- **Extremer, unstillbarer Durst.**
- Übelkeit mit saurem Aufstoßen oder Aufstoßen bei oder nach dem Essen.
- Magenschmerzen nach kalten Getränken, beim Husten, nach einem Spaziergang an frischer Luft.
- Langsame Verdauung.
- Verschlimmerung: Gegrillte Speisen, Broccoli, **kalte Getränke, kalte Speisen und kalte Milch**, Fett.
- Abneigung: **Broccoli**, Blumenkohl, Käse, Fleisch, Muttermilch, salzige Speisen, Süßigkeiten.
- Verlangen: Gegrillte oder im Ofen gebackene Speisen, Buttermilch, Eier, Früchte, Milch. **Pizza**. Salz. saure Speisen. Süßigkeiten. **Gemüse. warme Speisen.**

ABDOMEN

- Tympanitische Auftreibung des Abdomens („Trommelbauch“) nach dem Stillen.
- Schmerz und Empfindlichkeit in der rechten Oberbauch-Region.
- Untersuchungsergebnis:
 - Leber vergrößert und hart beim Abtasten.

REKTUM

- Verstopfung mit erfolglosem Drang, auch angestregtes Pressen hilft nicht.
- Der Stuhl enthält unverdaute Nahrungspartikel.
- Schmerzloser Durchfall mit stinkendem Geruch.

HARNWEGE

- Bettnässen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Leukozyten +, Erythrozyten +, Zucker +.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Übelriechender Schweiß in der Skrotalgegend.
- Untersuchungsergebnis:
 - Empyozele und Hydrozele.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Reichlich grünlicher Schleim wird vom Kehlkopf hochgeräuspert.
- Reizung und Kitzeln in Larynx und Trachea.
- Schmerzlose Heiserkeit der Stimme.

ATMUNG

- **Chronische Allergie durch Hausstaub und Hausstaubmilben.**
- Neigung zu **wiederkehrender asthmatischer Bronchitis.**
- Asthma schlimmer in kalter Luft.
- Dyspnoe mit Husten beim Hinlegen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rasselnde Atmung.
 - Seufzende Atmung.

HUSTEN

- **Krampfartiger trockener Husten, schlimmer am Morgen beim Erwachen, durch kalte Getränke, kalte Luft, beim Hinlegen und beim Sprechen.**
- Eitriger, stinkender, dicker, gelber Auswurf.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Eiterbeule in der Achselhöhle.
 - Brustschweiß.
 - Röntgen: Pneumonie.

RÜCKEN

- Steifheit der Zervikalregion, schlimmer bei Kälte.
- Untersuchungsergebnis:
 - Kalter Schweiß, besonders im Nacken.

EXTREMITÄTEN

- Kalte Gliedmaßen, extrem empfindlich gegen den geringsten Luftzug.
- Kalter Schweiß der Handflächen, mit Kälte der Fingerspitzen.
- Hüftgelenksschwäche.
- Stinkender, kalter Fußschweiß.
- Schmerzhaftes Hühneraugen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Große Warzen an den Händen und Daumen.
 - Rissige Hände und Finger.
 - Nagelbettentzündung.
 - Harte oder brüchige Fingernägel.

SCHLAF

- Kann nur in Bauchlage schlafen.
- Schläfrigkeit nach Essen.
- Schreckt im Schlaf leicht hoch.
- Alpträume, träumt von kranken oder toten Personen, sieht Leichen oder den Tod von nahen Verwandten.
- Ruhelos im Bett; wechselt ständig seine Lage.
- Aufschreien im Schlaf.

HAUT

- Neigung zu Staphylokokkeninfekten der Haut.
- Tiefe, schmerzhaftes Geschwüre mit einer dünnen, grünlich-gelben, übelriechenden Absonderung.
- Heißer, saurer und stinkender Schweiß.
- Hautjucken ohne Ausschläge; muss kratzen, bis es roh ist, was verschlechtert; besser durch lokale Wärmeanwendung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Gänsehaut.
 - Intertrigo.
 - Gelbsüchtige Haut.
 - Psoriasis.
 - Talgretentionszysten.
 - Vitiligo.
 - Warzen.

ALLGEMEINES

- Charakteristische **Abend- und Nachtverschlimmerung**.
- Beschwerden durch Wetterwechsel, Vollmond, unterdrückte Schweißbildung,
Müdigkeit, Isolation

- Abneigung gegen Baden.
- Absonderungen der Schleimhäute, Ausschläge, Abszesse, Geschwüre sind dick, gelblich und eitrig.
- Drüsenverhärtung.
- Wiederkehrende Abszessbildung, Hervorsickern von gelblich-grünem Eiter.
- Große, dünne, schwache, abgemagerte Kinder mit zarter Konstitution und Neigung zu Anämie; schlimmer durch die geringste geistige oder körperliche Anstrengung.
- Sehr fröstelig; bekommt schnell eine Erkältung; schlimmer durch die geringste Einwirkung von Kälte, Wind oder frischem Luftzug und durch Wetterwechsel.

CAPSICUM

(Cayennepfeffer - Caps.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Beschwerden durch Umzug, Schulwechsel oder Auswanderung;** durch Änderungen in der täglichen Routine, während der ersten Schultage, bei Adoption usw.; das Kind neigt zu **Heimweh**.
- ▶ **Extrem sensible und empfindliche Kinder;** sehr schnell beleidigt, sie verstehen keinen Spaß und können keine Kritik annehmen.
- ▶ **Heimweh führt zu Bulimie** (orale Fixierung), Durchfall, Fieber, Magenverstimmung, Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit.
- ▶ **Schwerfällig**, sehr gemütlich und **faul** (Vithoulkas), hasst den Sportunterricht und jegliche Art von Körperübung.
- ▶ Angst vor Tadel.
- ▶ Schiebt gern alles auf.
- ▶ Kinder, die sich ungeliebt und nicht umsorgt fühlen, aufgrund von ständiger Bevormundung oder durch übermäßig strenge Eltern.
- ▶ Unsichere Kinder, deren Eltern Alkoholiker oder drogensüchtig sein können.
- ▶ Starke Abneigung, nach draußen zu gehen und mit gleichaltrigen Kindern Spaß zu haben. Sie bleiben lieber dauernd zuhause. Diese Stubenhockerei kommt einerseits von ihrer Faulheit und andererseits durch ihre Verletzlichkeit, wenn jemand einen Witz über sie macht oder über sie lacht.
- ▶ Sehr nostalgisch, lebt gern in der Vergangenheit; z. B. wird ein Schulkind immer wieder plötzlich launisch und beschäftigt sich dabei zwanghaft mit erfreulichen oder unerfreulichen Gedanken an früher.
- ▶ Sehr vergesslich. Das Kind geht einkaufen und lässt den Einkauf im Geschäft liegen. Gedächtnisschwäche besonders für Worte. Unaufmerksamkeit. Sehr oft kommt das Kind von einem Botengang zurück, ohne das, was es besorgen sollte, mitzubringen.
- ▶ Träge und langsam beim Lernen in der Schule.
- ▶ Das Kind lehnt jede Änderung der gewohnten Routine ab und liebt regelmäßige Abläufe. Der Wechsel von der Wiege ins Kinderbettchen, andere Möbel oder Kleider und andere Bezugspersonen können großen Einfluss haben.

KÖRPER

- ▶ Schmutzige, unordentliche Kinder.
- ▶ Plumpe und mollige Kinder ohne Ausdauer.
- ▶ Empfindlich gegen Zugluft.
- ▶ Neigung zu Übergewicht.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Ehrgeiziges Kind, macht viele Pläne, aber zu träge, um sie auszuführen.
- Launisches Kind; lehnt seine Lieblingsspielsachen und -spiele ab.
- Schwerfällig und ungeschickt, mit Mangel an Eleganz.
- Empfindet sich leicht als vernachlässigt und hat das Gefühl, ungeliebt zu sein.
- Spontane Neigung, jeden zu küssen.
- Schreckt leicht zusammen, besonders bei Fieber und im Schlaf.
- Obwohl normalerweise faul und träge, können sie leichtsinnig wie ein Draufgänger sein (Didier Grandgeorge).

KOPF

- Empfindlich gegen Zugluft.

AUGEN

- Jucken der Augen bei Schnupfen.
- Tränenfluss bei Husten.
- Untersuchungsergebnis:
 - Enge Pupillen bei Schweißbildung.

OHREN

- **Neigung zu Abszessbildung hinter, unter und im Ohr und am Processus mastoideus.**
- Ohrenschmerzen beim Husten oder in kalter Luft.
- Caps, ist das Mittel der Wahl, wenn das Kind in der Nacht mit Ohrenschmerzen aufwacht, vor Schmerzen schreit und im Bereich des Mastoids sehr empfindlich ist.
- Vermindertes Hören.
- Absonderungen aus dem Ohr sind aggressiv, eitrig und dick gelb.
- Schlimme Ohrenschmerzen besonders auf der rechten Seite. Kalte Zugluft verschlimmert die Ohrenschmerzen und immer beim Husten entsteht ein Gefühl, als ob das Ohr platzen würde.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Processus mastoideus und äußeres Ohr sind berührungsempfindlich.**
 - Otitis media.
 - Trommelfellperforation.
 - **Paukenhöhle voll mit dickem gelbem Eiter.**
 - Röntgen des Mastoids: Hypozelluläre Erosion des Knochens, geringe Belüftung der Luftzellen des Mastoids, Anzeichen von Sklerose mit durchscheinenden Bereichen und Bildung von Kavitäten.

NASE

- Chronischer Schnupfen mit einer dicken, zähen Absonderung.
- Der Schnupfen ist fließend, schleimig, klebrig und dick. Ausgeprägtes Jucken in der Nase mit häufigem kräftigem Niesen.
- Muss niesen nach dem Husten.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalte Nase mit heißer Spitze.
 - Retronasaler Katarrh +.
 - Rötung.

GESICHT

- **Glühendrote** Gesichtsfärbung bei Asthma, Schnupfen, Husten, Fieber, Heimweh, Schmerzen, beim Essen und bei Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akne.
 - Kalt bei Berührung.
 - Ausdruck: Abgehärmt und leidend.
 - Rote Wangen.

MUND

- **Schlechte Mundhygiene.**
- Speichelfluss übelriechend und klebrig.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen.
 - Grünliche Färbung der Zunge.
 - Gingivitis.
 - Zahnfleisch löst sich von den Zähnen.
 - Stinkender Atem.
 - Schwammiges, skorbutisches Zahnfleisch.

HALS

- Schmerz und Wundheit im Hals sind **schlimmer, wenn er nicht schluckt.**
- Halsschmerzen mit sehr hohem Fieber, gerötetem Gesicht und Durst auf kalte Getränke.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verlängertes Zäpfchen.
 - Vergrößerte Halsdrüsen.
 - Rötung des Pharynx bei entzündeten Tonsillen.

MAGEN

- Magenverstimmung nach fettigen oder sauren Speisen.
- Durst auf kleine Mengen Wasser, besonders nach Stuhlgang.
- Verschlimmerung: Kaffee, Salz und Gemüse.
- Verlangen: Kaffee, kalte Getränke, eiskaltes Wasser, Flüssigkeiten, Pfeffer, scharfe und gewürzte Speisen.

ABDOMEN

- Kolik nach Gemüse.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schlaffes Abdomen (Calc., Kali-bi.).
 - Leistenbruch.

REKTUM

- Amöben- und bakterielle Dysenterie.
- Durchfall **nach kalten Getränken** (Ars.) und durch **Luftzug** (Acon., Nux-v., Sil.) vor allem am Abdomen.
- Häufige, kleine Stühle mit Blut und Schleim.
- Der Stuhl ist fettig, grün und heiß beim Abgang.
- Schlimmer nach Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnis:
 - Stuhl: Fett ++.

HARNWEGE

- Bettnässen.
- Milchiger Urin.
- Untersuchungsergebnis:
 - Nephritis +.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Kälte des Skrotums.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heiserkeit der Stimme durch Überbeanspruchung.

ATMUNG

- Asthma besser durch aufrechtes Sitzen, schlimmer nach Essen.
- Chronisches Asthma.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rasselgeräusche ++.
 - Atmung: Seufzend, schnarchend und giemend.

HUSTEN

- Bellender und explosiver Husten; schlimmer durch Ärger und am Abend.
- Der Husten beginnt, sobald der Kopf das Kissen berührt.
- Heftiger Husten; fauliger Mundgeruch bei jedem Hustenanfall.
- Untersuchungsergebnis:
 - Kälte der Fingerspitzen.

SCHLAF

- Übermäßige Schläfrigkeit nach jeder Mahlzeit (Agar., Calc.).
- Schlafposition: Sitzend.
- Schlaflosigkeit aufgrund von Heimweh und durch Husten.

FIEBER

- Frost:
 - Beim Frost ist das Kind gereizt, will allein gelassen werden, zeigt Intoleranz gegen Geräusche.

- Erhöhter Speichelfluss mit übermäßiger Schleimansammlung in Mund und Hals.
- Das Kind weiß, dass der Frost kommt, denn es wird durstig; das Frösteln nimmt bei jedem Schluck zu.
- Heftiger Frost im Rücken.
- Hitze:
 - Kälte der Fingerspitzen.
 - Kein Durst.
- Schweiß:
 - Die Pupillen neigen zur Kontraktion im Schweißstadium des Fiebers.

ALLGEMEINES

- Erkältungsneigung; **schlimmer durch kalte Luft** und Essen von kalten Dingen.
- Außerordentlich empfindlich auf Geräusche und Berührung.
- Neigung zur Bildung von Gangrän, Nekrose oder Ulzeration der betroffenen Teile.

Vergleiche **Calc.** und **Graph**, mit Caps.

HERKUNFT

- Capsicum annuum aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae)

CARCINOSINUM

(Krebsnosode - Carc.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Ein Carc.-Zustand kann sich entwickeln, wenn dem Kind zu früh zu viel **Verantwortung** aufgebürdet wird (Aur.), was vielleicht seine Ausbildung verzögert.
- ▶ **Emotional unterdrückte** Kinder, deren Eltern sich ihnen gegenüber wie Hitler oder Stalin auführen.
- ▶ **Lesen leidenschaftlich gern Bücher** mit wenig Interesse an Sport und Spielen.
- ▶ **Übermäßig fürsorgliche und beschützende** Eltern oder Erzieher können die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes **unterdrücken** und lösen damit einen Carc.-Zustand aus. **Zu strenge und ehrgeizige** Eltern können ebenfalls einen Carc.-Zustand auslösen.
- ▶ **Leidenschaftliche** und **ehrgeizige** Kinder, die im Leben hoch hinaus wollen.
- ▶ **Frühreife** Kinder; sie reden und verhalten sich wie Erwachsene; sehr gute Beobachter, sehr interessiert und sehr neugierig.
- ▶ **Liebt alle Tiere**; behandelt sie wie Familienmitglieder: Liebkost sie, umarmt sie und redet mit ihnen (sehr ähnlich wie Aeth.).

KÖRPER

- ▶ Augenzwinkern oder **bizarre Tics**, z. B. mit den Fingern an den Kopf klopfen, knabbert Nägel und die Haut darum herum ab.
- ▶ Klinisch nützlich als palliatives Mittel bei vielen angeborenen **Missbildungen** wie Cri-du-chat-Syndrom, Down-Syndrom (Trisomie 21), Edwards-Syndrom (Trisomie 18), Hallermann-Streiff-Syndrom, Patau-Syndrom (Trisomie 13), Silver-Russell-Syndrom und Turner-Syndrom.
- ▶ Vorgeschichte **rezidivierender Infektionen** wie Bronchitis, Gastroenteritis, Malaria, Masern, Mononukleose, Mumps, Pneumonie, Sinusitis und Tonsillitis.
- ▶ Konstitution: Blaue Skleren, Cafe-au-lait-Färbung der Haut, dunkle Ringe um die Augen, erdige Verfärbung des Gesichts; oft sind die beiden Augenbrauen in der Mitte verbunden; kreisrunde und andere Leberflecke und Naevi.
- ▶ Das Mittel ist oft nützlich, wenn offenbar indizierte Mittel wie Calc-p., Dys-co., Lyc., Med., Nat-m., Sep., Sulph., Syph. oder Tub. keine langfristige Erleichterung bringen.
- ▶ Malabsorption oder Glutenintoleranz.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch Beschimpfung, **Demütigung, Bestrafung**, Tadel, **Vorwurf** oder Verachtung; Tod geliebter Personen; **Furcht vor dominierenden Eltern**; Heimweh; durch körperlichen oder sexuellen Missbrauch oder lang andauernden, ungelösten und stillen Kummer (kann nicht weinen).
- **Prüfungsangst** (Erwartungsspannung); Lampenfieber.
- **Schamhafte** und **schüchterne** Kinder, sogar gegenüber anderen Kindern in der Klasse.
- **Hellsichtig.**
- **Gewissenhafte** Kinder mit einem starken Verantwortungsgefühl.
- **Penible Kinder mit einer Sauberkeitsmanie.**
- **Zwangsneurosen:** alles muss seinen festen Platz haben, dauerndes Händewaschen, ständiges Kontrollieren geringfügiger Details etc.
- **Starke Bindung an Familienmitglieder und Freunde;** furchtsam, wenn jemand in der Familie krank wird.
- Unternehmungslustige Kinder.
- Mitfühlende Kinder (Phos.), die gern Zuneigung zeigen und erhalten in Form von kuscheln, liebkost und gewiegt werden.
- Zorn mit Schreck und Empörung, nachdem er heftig beschimpft wurde; bekommt Atemnot durch Zorn.
- Gehemmte Entwicklung.
- Bulimie oder Anorexia nervosa bei Jugendlichen.
- Kann es nicht ertragen zu hören oder zu sehen, wie Gewalt oder Grausamkeiten begangen werden, sogar im Fernsehen nicht und zwar besonders gegen Tiere.
- Fröhlich und glücklich, wenn es donnert und blitzt oder wenn er in frischer Luft oder an der Meeresküste ist.
- Das Kind mag keine weichen oder flaumigen Spielsachen und Teddybären.
- Das Kind fasst in der Klinik ständig alles an.
- Kontaktfreudige Kinder mit Verlangen nach Gesellschaft, die bessert.
- Ungehorsame Kinder, die Wutanfälle bekommen (revoltieren gegen Autorität), sich sehr grob und beleidigend gegen die Familie verhalten, Spielzeug und andere Gegenstände zerstören und Widerspruch nicht ertragen.
- Legasthenische Kinder mit geringem Selbstvertrauen; fühlen, dass sie in der Schule versagen; können sich nicht konzentrieren.
- Furcht vor Tieren (Katzen, Hunde, Insekten, Mäuse, Schlangen, Spinnen etc.), vor Vorwürfen oder Strafe, vor überfüllten oder offenen Plätzen, vor Dunkelheit und Bösem (besonders nachts), vor Versagen in der Prüfung; Höhenangst.
- Fühlt sich vernachlässigt und verlassen; betrachtet sich als unterlegen (körperlich und geistig); fühlt sich ungerecht behandelt.
- Gibt sich große Mühe, anderen zu gefallen, damit sie eine gute Meinung von ihm haben.
- Hyperaktive, ruhelose Kinder mit übermäßiger Energie.
- Unentschlossen bei Kleinigkeiten; sehr verwirrt, sogar bei einfachen

- Liebt es, Musik zu hören und ist ein guter Tänzer, mit einem guten Rhythmusgefühl, was die meisten Gemütssymptome bessert.
- Äußere Milde maskiert innere Gewalttätigkeit.
- Rivalität unter Geschwistern.
- Die geringste Ermahnung verschlimmert, selbst wenn sie sanft und freundlich geäußert wird.
- Große Liebe zu Natur, Tanzen, Musik, Reisen und Seeluft.

KOPF

- Einseitige Kopfschmerzen; schlimmer besonders auf der rechten Seite, durch Gehirnerschütterung oder Kopfverletzung bei der Geburt; besser durch Erbrechen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schuppen.
 - Vorzeitiges Ergrauen der Haare.

AUGEN

- Verschwommene Sicht bei Kopfschmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Blaue Skleren**, besonders bei Kindern, die an Phenylketonurie oder Osteogenesis imperfecta tarda leiden.
 - **Lange Wimpern**.
 - **Zucken** des linken Oberlides.
 - Gerstenkörner auf dem Oberlid.

OHREN

- Untersuchungsergebnis:
 - Eiterbeulen hinter den Ohren, die dauernd die Seite wechseln.

NASE

- Chronisches und andauerndes Nasenbluten.
- Schnupfen in trockener, kalter Luft.
- Häufige Heuschnupfenanfälle mit asthmatischer Atmung.
- Verstopfung der Nase am Morgen beim Erwachen und wenn er aus der kalten Luft in einen warmen Raum kommt.
- Schmerz an der Nasenwurzel bei Kopfschmerzen.
- Anfallsweises Niesen, besonders abends.
- Untersuchungsergebnis:
 - Adenoide.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Bläuliche Lippen mit Rissen in der Mitte der Oberlippe.
 - Braune, erdige Flecken im Gesicht.
 - Sommersprossen.
 - Ölines oder fettiges Gesicht mit Pickeln auf Kinn und Stirn

MUND

- Gingivitis mit Schwellung und Blutung durch den geringsten Druck oder beim Säubern von Zahnfleisch und Zähnen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Stottern.**
 - Aphthen und Geschwüre, besonders an den Zungenrändern.
 - Mundgeruch.
 - Die Papillen an der Zungenspitze fehlen.
 - Frühe Karies bei kleinen Kindern.

HALS

- Halsschmerzen durch Wärme in jeder Form, besser durch kalte Getränke oder Speisen.
- Halsweh am Morgen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Chronisch geschwollene Tonsillen.
 - Verhärtete Drüsen.

MAGEN

- Galliges, grünes Erbrechen ausgelöst durch Kopfschmerz und Emotionen wie Traurigkeit oder Zorn.
- Hat einen launischen und wechselhaften Appetit.
- Magenverstimmung mit Sodbrennen und Auftreibung des Abdomens nach der Mahlzeit, besser nach Aufstoßen.
- Kinetose mit dauernder Übelkeit beim Reisen in Auto oder Bus.
- Magenschmerzen beim Husten oder durch warme Getränke.
- Durst auf große Mengen Wasser, besonders bei Regenwetter.
- Verschlimmerung: Kalte Milch, Eier, fettige Speisen, Früchte, Eiscreme, Fleisch, Zwiebeln, reichhaltige Nahrung, Süßigkeiten.
- Besserung: Warme Getränke.
- Abneigung: Brot und Butter, Eier, fettes Fleisch, Eiscreme, Kartoffeln, Salz, Suppe, Süßigkeiten, Gemüse.
- Verlangen: Speck, **Brot und Butter**, Käse, **Schokolade**, Cola, kalte Speisen und Getränke, kalte Milch, Sahne, Leckerbissen, Eier, fettige Speisen oder Teigwaren, Fisch, Pommes frites, Früchte, Knoblauch, Schinken, Eiscreme, Limonade, Backwaren, Pfeffer, in Essig Eingelegtes, **Kartoffeln** (sogar roh), **rohe Zwiebeln**, Salz, geräuchertes oder gebratenes Fleisch, Suppe, Gewürze, Zucker, Süßigkeiten, Ketchup, Essig, warme Getränke und Joghurt.

ABDOMEN

- Krampfende und kneifende Schmerzen im Abdomen, besonders in der Nabelgegend, bei Verstopfung; besser durch nach vorne gebeugtes Sitzen und durch Aufnahme warmer Flüssigkeiten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Vergrößerte Leber.
 - Leistenbruch.

REKTUM

- Verstopfung mit vergeblichem Drang und Anstrengung.
- Durchfall bei Kleinkindern mit bräunlich-grünen Stühlen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rektumprolaps.
 - Stuhl: Würmer.

HARNWEGE

- Enuresis nocturna.
- Hartnäckiges nephrotisches Syndrom, das nicht auf Steroidbehandlung reagiert.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Albumin +, Granuläre Zylinder ++, Erythrozyten +, Zucker +.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heiserkeit der Stimme.
- Kitzeln in den Luftwegen, schlimmer im warmen Zimmer.

ATMUNG

- Asthma abwechselnd mit Ausschlägen.
- Asthma durch Schreck oder Aufregung, nach Impfung, in feuchtem Wetter; besser am Meer und durch Liegen in Knie-Brust-Lage.
- Atemnot beim Laufen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Seufzende Atmung.

HUSTEN

- Kurzer Husten durch Kitzeln im Hals; **nach Impfung** oder Wetterwechsel, schlimmer nachts oder beim Erwachen am Morgen, in kalter Luft, beim Essen, Reden oder Lachen und durch Aufdecken.
- Blutiger Auswurf.

BRUST

- Druck auf der Brust mit Verlangen, tief zu atmen.
- Pneumonie oder Bronchitis bei immungeschwächten Kindern.
- Reichlicher, stinkender Achselschweiß.
- Untersuchungsergebnis:
 - Akne oder Warzen auf der Brust.

EXTREMITÄTEN

- Reichlicher, kalter, stinkender Schweiß der Füße und Hände.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Anormale Behaarung der oberen Gliedmaßen.
 - Ekzematöse oder psoriatische Ausschläge in den Gelenkbeugen.
 - Eiskalte Finger und Zehen; kann nicht den geringsten Luftzug ertragen.
 - Nägel: Deformiert und verkümmert, mit Niednägeln.
 - Warzen an Handflächen und Fußsohlen.

SCHLAF

- Grundlose Schlaflosigkeit bei Babys, die dauernd gewiegt werden müssen.
- Schlaflosigkeit bei intelligenten Kindern, die wach gehalten werden durch übermäßigen Gedankenandrang (Cupr.).
- Schläft in Knie-Brust-Lage oder auf dem Bauch mit den Händen über dem Kopf.
- Im Schlaf: Zähneknirschen; Treten; reichlicher Schweiß; Aufschreien durch Alpträume, mit Schweiß; Reden.
- Schlaflosigkeit durch Aufregung oder Erwartungsspannung.

HAUT

- Wollüstiges Jucken der Haut ohne Ausschläge; schlimmer beim Ausziehen oder Aufdecken der Teile.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Atopisches Ekzem, aus dem übelriechende Absonderung hervorsickert.
 - Übermäßiger Haarwuchs an Gliedmaßen und Gesicht.
 - Dunkle Leberflecke.
 - Sommersprossen.
 - Keloide.
 - Molluscum contagiosum.
 - Kleine, weiche, fleischige Warzen.
 - Spider naevi.

ALLGEMEINES

- **Krebsartige Leiden mit kachektischer Abmagerung.**
- Das Kind hat eine **deutliche Familiengeschichte** von Alkoholismus, Anämie, Krebs, Diabetes, Leukämie, Suizid oder Tuberkulose.
- Perniziöse Anämie.
- Beschwerden während der Rekonvaleszenz nach Influenza oder Keuchhusten.
- Knochenmarkdepression.
- Brüchige Knochen.
- Fröstelig; Erkältungsneigung; schlimmer durch kalten Luftzug, aber besser in frischer Luft.
- Kollagenosen.
- Konvulsionen nach Impfung.
- Zwergwuchs mit Entwicklungsstillstand.
- Eosinophilie.
- Juveniler Diabetes mit Tuberkulose.
- Wiederkehrende akute Beschwerden.
- Schlimmer durch Baden im Meer, aber Verbesserung durch Aufenthalt an der Seeluft (Med.).

CASTOREUM CANADENSE

(Kanadisches Bibergeil - Cast.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Schnell reizbar und nervös; kaut dann an den Nägeln.
- ▶ Furcht vor Unfällen und außergewöhnlich empfindlich auf äußere Eindrücke.
- ▶ Störungen des Zentralnervensystems oder aber Beschwerden des Magen-Darm-Traktes.
- ▶ Koliken mit heftige krampfartige Schmerzen im Abdomen, besser durch warme Anwendungen und Sich krümmen.
- ▶ Sehr aufgetriebenes Abdomen durch ausgeprägte Flatulenz.
- ▶ Sommerdurchfall bei Kindern mit häufigem, grünlichem, schleimigem und wässrigem Stuhl.
- ▶ Durch schreckliche Träume unterbrochener Schlaf.
- ▶ Chorea nach jeder emotionalen Erregung.
- ▶ Enilensie durch starke Gefühle

HERKUNFT

- Sekret aus den Drüsensäcken des Bibers.

CAUSTICUM

(Hahnemanns Tinctura acris sine Kali - Caust.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Schon sehr früh entwickelt das Kind eine idealistische Sicht von einer besseren Welt und will für eine gute Sache kämpfen, z. B. für den Naturschutz oder für Tiere, Hilfe für Erdbebenopfer etc.
- ▶ Ungeschickte Kinder, besonders ungelenk bei Bewegungsspielen.
- ▶ Extrem penible und ordentliche Kinder; ähnlich wie Ars. und Carc.
- ▶ Diese Kinder mögen wie Anführer oder gar diktatorisch wirken, doch der Anschein trügt; ihr Auftreten entspringt einer extremen Verletzlichkeit und tiefen Ängsten. Sie benehmen sich herrisch oder diktatorisch, um ihre irrationalen Ängste unter Kontrolle zu bekommen, z. B.:
 - Angst vor Kleinigkeiten.
 - Angst vor anderen.
 - Ängstliche Furcht.
 - Wahnvorstellungen, sieht Phantome.
 - Furcht, andere anzusprechen.
 - Furcht im Dunkeln.
 - Furcht vor drohender Gefahr.
 - Furcht vor Unglück.
 - Furcht vor Fremden.
 - Furcht, dass etwas passieren wird.
 - Furcht, Schrecken.
- ▶ Langsam fortschreitende Lähmung der emotionalen und geistigen Fähigkeiten aufgrund von Trauer und Depression bei Kindern, die schon lange Kummer haben und von der Familie oder religiösen Autoritätspersonen ungerecht behandelt werden.
- ▶ Sehr empfindlich auf jede emotionale Störung. Oft weinen diese Kinder, wenn sie meinen, dass man ihrer Mutter oder einem anderen Kind wehtut. Sie fühlen eher den psychisch-emotionalen Schmerz als die tatsächliche physische Gewalt.
- ▶ Sensibel gegen Autorität, sie ertragen keine Ungerechtigkeit.
- ▶ Sie sind geborene Anführer, die andere Kinder ihres Alters leicht motivieren können. Meist dominieren sie ihre Geschwister; sie führen sich auf, als wüssten sie genau, was für den kleinen Bruder oder die Schwester gut ist.
- ▶ Nach Missbrauch (Schläge oder sexuell) oder nach dem Tod eines Elternteiles oder anderem Kummer können sie Chorea oder unwillkürliche Muskelzuckungen bekommen.
- ▶ Ein Caust.-Kind erträgt oft seine eigenen Schmerzen gut, aber es kann keine anderen Kinder weinen oder leiden sehen.

- ▶ Sie neigen zu starken Schuldgefühlen, als ob sie ein schweres Verbrechen begangen hätten (starkes Moralempfinden).

KÖRPER

- ▶ Atrophie bei Unterernährung, Malabsorption oder chronischen Infektionen (Zytomegalie-Virus, Röteln, HIV, E. coli, Staphylococcus aureus).
- ▶ Caust.-Kinder haben oft zahlreiche Warzen am ganzen Körper.
- ▶ Angeborene Verkürzung von Sehnen und Muskeln, besonders der *Kniesehnen, so dass das Kind nur mit Mühe in den Schneidersitz* kommt.
- ▶ Dunkles Haar, dunkle Augen; fahl-gelbliche Hautfarbe; zart und empfindsam.
- ▶ Verspätete Zahnung nach Eiweißmangel, Rachitis oder Hypothyreose.
- ▶ Rheuma, rheumatoide Arthritis oder Wachstumsschmerzen, besonders in Nacken, Knöcheln, Füßen und Unterschenkeln.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Liebevoll.**
- **Linkisch;** lässt Dinge fallen.
- Kann es nicht ertragen, **Gewalt** oder irgendetwas Beängstigendes oder Grausames im Fernsehen zu hören oder zu sehen.
- **Kann Ungerechtigkeit nicht ertragen;** sehr starke **Moral** und angeborener Sinn für Recht und Unrecht.
- **Dyslexie;** macht eine Menge Fehler beim Schreiben oder Sprechen; benutzt falsche Wörter, betont falsch oder verdreht die Wörter, vertauscht die Buchstaben etc.
- Extreme **Empfindlichkeit gegen Berührung** auf Grund großer **Kitzlichkeit**.
- **Furcht vor Hunden,**
- **Eifersucht** wegen unbelebter Gegenstände (wie z. B. Spielzeuge, Spielsachen, Kleidung etc.).
- Liebt es zu **reisen**.
- **Aufsässige Kinder,** die trotzig, unhöflich und sehr ungehorsam sind; können keinen Widerspruch ertragen.
- Beschwerden durch Erwartungsspannung, allgemein physischen oder sexuellen Missbrauch, Tod von geliebten Menschen (Eltern oder nahen Freunden), emotionale Erregung, Schreck und Kummer.
- Mut und Verwegenheit, nimmt gern Herausforderungen an.
- Launisch.
- Grundloses Weinen bei Babys, besonders während der Nacht.
- Gewissenhaft.
- Dumpfheit beim Antworten; muss die Frage erst wiederholen.
- Schnell bereit zu lachen oder bei Kleinigkeiten zu weinen.

- Übermäßig mitfühlend mit jedem um ihn herum [Nit-ac., Phos. (während Nit-ac. und Caust. manchmal selbstsüchtige Motive haben oder bedingt mitfühlend sind, ist Phos. sehr aufrichtig und sein Mitgefühl ist ohne Hintergedanken)].
- Kritische Kinder, die nicht so leicht zufrieden zu stellen sind.
- Furcht, ein Unglück könnte die Familie treffen oder dass jemand krank werden könnte.
- Beeindruckbar.
- Kleptomanie.
- Lieben es, jemanden aufzuziehen.
- Tanzen gern, was verbessert.
- Liebe zu Tieren.
- Klagen über Kleinigkeiten.
- Nervosität und Angst führen zu Diarrhoe.
- Ist nicht sehr auf Musik aus, aber es stört ihn nicht, wenn andere Musik spielen.
- Röte des Gesichtes bei Angst.
- Schlaflos und ruhelos die ganze Nacht wegen Furcht vor der Dunkelheit.
- Langsam beim Laufen-, Schreiben- oder Sprechenlernen.
- Misstrauische Kinder, trauen ihren Freunden oder anderen nicht so leicht.
- Neigung zum Nägelkauen.
- Schüchterne, ängstliche und verschämte Kinder von stiller Art.
- Schwäche in Mathematik, Algebra, Geometrie, Arithmetik.

KOPF

- Kopfschmerz bei trockenem, kaltem Wetter, mit Übelkeit und Erbrechen; schlimmer nachts, in kalter Luft oder durch Anstrengung der Augen; **besser durch lokale Hitze.**
- Haarverlust nach Kummer.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krampfhaftes **Nicken oder Rollen** des Kopfes.
 - **Reichliche Schweißabsonderung** der Kopfhaut.
 - Krustiges, schuppiges Ekzem oder Impetigo am Hinterkopf.
 - Fettiges Haar.
 - Hydrozephalus.
 - Ringelflechte (ringworm) auf der Kopfhaut.
 - Tumorartige Schwellung auf der Kopfhaut.

AUGEN

- Dem Kind fällt es schwer, die Augen offen zu halten; **schließt die Augen krampfhaft.**
- Akkomodative Asthenopie.
- Wundmachender Tränenfluss.
- Brennen in den Augen wie von Sand oder einem Fremdkörper.
- Kann die Oberlider nicht oben halten, sie sind fast wie gelähmt.
- Dauerndes Verlangen, die Augen zu reiben.
- Trübe Sicht nach Masern.
- Tränenfluss im Freien.
- Zucken des linken Oberlides

- Schwäche der Sehkraft, schlimmer durch Anstrengung der Augen (Vorbereitung für eine Prüfung, Video- oder Computerspiele).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ptosis.
 - Angeborene Katarakt.
 - Erweiterte Pupillen.
 - Hyperopie.
 - Unfreiwilliges Blinzeln der Augen.
 - Paralyse der äußeren Augenmuskeln.
 - Rollende Bewegungen der Augen.
 - Strabismus.
 - Gerstenkorn über dem linken Oberlid.
 - Lidknorpelschwellungen
 - Augenzwinkern durch Lichtempfindlichkeit.
 - Gelbliche, eitrige Absonderung aus den Augen, mit Verklebung der Lider am Morgen.

OHREN

- Die Ohren sind sehr empfindlich gegen **Zugluft**.
- Chronische eitrige Otitis media mit stinkender, gelblicher Otorrhoe.
- Ohrenschmerzen beim Naseschnäuzen, besonders im rechten Ohr.
- Tinnitus während der Zahnung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Eustachischer Katarrh.
 - Polypen in den Ohren.
 - Bläschenartige Ausschläge oder Pickel hinter den Ohren, aus denen eine wässrige Absonderung hervorsickert.
 - Ohrenschmalz ++.

NASE

- Das Kind **zupft oder reibt andauernd** die Nase.
- Schnupfen mit Laryngitis.
- Nasenbluten beim Naseputzen am Morgen.
- Beim Schlucken von Flüssigkeit läuft sie zur Nase heraus (Gaumensegellähmung).
- Nächtliche Verstopfung der Nase beim Liegen.
- Anfallartiges Niesen am Morgen beim Aufstehen.
- Gelblich-grüne, wund machende, übelriechende Absonderung aus der Nase.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krustenbildung in den hinteren Nasenhöhlen.
 - Polypen.
 - Retronasaler Katarrh.
 - Rote, entzündete Nasenspitze.
 - Warzen auf der Nasenspitze.

GESICHT

- Rechtsseitige Paralyse des Gesichts durch Kälteexposition (z. B. Sport treiben oder Schwimmen im Meer), im Wind reiten, nach Nässeinwirkung oder durch unterdrückte Ausschläge im Gesicht; besser durch Reiben des betreffenden Körperteils.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Warzen auf den Lippen.**
 - Akne rosacea auf Stirn und Nase.
 - Kauende Bewegungen der Kiefer.
 - Krustige oder schuppige Ausschläge auf der Nasenspitze.
 - Verzerrung des Gesichts beim Sprechen.

MUND

- **Beißen auf die Innenseite der Wangen** beim Sprechen oder Kauen.
- **Stammelnde Sprache** durch **Aufregung** oder Ärger.
- Absolute Trockenheit von Mund und Zunge, aber durstlos.
- Schwierige Zahnung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zunge hat einen **roten Streifen in der Mitte**, mit weißem Belag an den Rändern.
 - Herausragende Papillen auf der Zunge, mit schmerzhaften Bläschen auf der Zungenspitze und den Seiten.
 - Paralyse einiger Zungenmuskeln, die das Herausstrecken erschwert.
 - Skorbutisches Zahnfleisch, das leicht blutet und sich von den Zähnen löst. - Soor.

HALS

- Ständiger, ergebnisloser Drang **abzuhusten**.
- Aufgenommene Flüssigkeiten werden in die Nase gepresst.
- Rauheit, Rohheit und Schmerz im Hals durch Husten.
- Klebriger, dicker, weißer Schleim aus dem Hals muss geschluckt werden.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Tortikollis**; Kopf zur rechten Seite gezogen.
 - Eiterblasen an der Seite des äußeren Halses.
 - Dunkelrotes Zäpfchen.

MAGEN

- Schnell angegriffener Magen, als ob der Magen alles ablehnen würde (Hahne-mann).
- Häufiger Schluckauf.
- Großer Durst auf kaltes Wasser nach jeder Mahlzeit.
- Verstärkter Appetit mit Übelkeit, direkt nach dem Füttern.
- Verdauungsstörungen mit Aufstoßen, Herzbrennen, Übelkeit, saurem Erbrechen, Schmerz; schlimmer nach Brot, mehlhaltigen Speisen, Fett, Zucker; besser durch kalte Getränke.
- Verschlechterung: Kaffee, mehlhaltige Speisen, fette und reichhaltige Speisen, Früchte, Fleisch, Schweinefleisch, Kalbfleisch, warme Speisen und Getränke.

- Besserung: Kalte Speisen und Getränke.
- Abneigung: Kaffee, Delikatessen, Früchte, heiße Getränke, Okraschoten, **Süßigkeiten**, Gemüse, Essig.
- Verlangen: **Speck**, Käse, kalte Getränke, Eier, Fisch, Schwein, scharfe und gewürzte Dinge, Erfrischendes, Salz, **geräucherte Speisen** (Hähnchen, Hammel), Joghurt.

ABDOMEN

- **Kneifende Schmerzen im Abdomen und Krämpfe bei Kleinkindern und Säuglingen; muss sich nach vorne beugen, schlimmer am Morgen, besser durch lokale Wärme und abgehende Winde.**
- Kolik beim Kleinkind, die an Coloc. erinnert; besser durch Vorwärtsbeugen.
- Schmerzhaftes Überblähung des Abdomens mit eingeklemmten Blähungen und hartem Stuhl, schlimmer nach Essen.
- Poltern und Unbehagen im Abdomen nach Essen, besser bei abgehenden Winden.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aszites.
 - Darmlähmung, wobei Stuhl im Darm eingeschlossen ist.
 - Schwellung der Leistendrüsen.

REKTUM

- Diarrhoe **nach Kälte** (kalte Luft, kalte Getränke).
- Verstopfung bei Kindern mit Fieber.
- Zahlreiche, laute, stinkende Blähungen.
- Häufiger Stuhldrang während Fieber und durch Schreck.
- Unwillkürlicher Abgang von Stuhl mit Blähungen.
- Schmerzhaftes Verkrampfung des Rektums begleitet den Stuhldrang.
- Teilweiser Prolaps des Rektums beim Husten, mit Austreten von großen, äußerlichen Hämorrhoiden, die sehr empfindlich gegen Berührung sind.
- Unbemerkter und unwillkürlicher Austritt kleiner, harter Kotkugeln (Aloe).
- Während Pressen auf der Toilette entwickelt das Kind übermäßige Hitze, Röte und Schweiß im Gesicht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Fettige, harte und klumpige, mit Schleim bedeckte Stühle, die **fettig** glänzen.
 - Anus patulus [offen stehender Anus] (Paralyse von S1 und S2).
 - Wundheit des Perineums, besonders zwischen den Gesäßbacken, durch Windeln.
 - Windeldermatitis bei Säuglingen.
 - Stuhl: Spulwürmer, Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- **Angeborene Schwäche des Blasensphinkters.**
- **Verzögertes Urinieren;** beim Stehen gehen nur ein paar Tropfen ab, aber beim Husten, Lachen, Sitzen, Niesen, Gehen kommt es zu unwillkürlichem Harn-

- **Spasmodische nächtliche Enuresis** (Enuresis nocturna) während der ersten Phase des Schlafes (vergleiche Bell., Rhus-t., Sulph.; der Schlaf bei Bell, und Sulph. ist viel tiefer), wenn es schwierig ist, das Kind zu wecken.
- Kein Harndrang, trotz überfüllter Blase.
- Übelriechender, dunkelbrauner oder wolkiger Urin.
- Schmerzhaftes Harnverhalten nach chirurgischen Eingriffen oder bei Neugeborenen nach Einwirkung von kalter Luft.
- Das Kind uriniert in Stößen beim Husten.
- Schwäche des Blasensphinkters, verursacht unwillkürliches Urinieren, besonders beim Sitzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - M. Addison.
 - Urin: Aceton +, Calciumoxalat ++, Leukozyten ++ und Erythrozyten ++.
 - Hefeähnliches oder rotes, sandiges Sediment in der Windel.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- **Das Kind hat die Neigung zu masturbieren.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krustige, ekzematöse Ausschläge in der Genitalregion.
 - Kryptorchismus.
 - Schweißabsonderung in der Hodenregion verursacht Jucken und Wundreiben.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Reichlicher, scharfer, durchsichtiger, fadenziehender, klebriger und zäher Ausfluss, nur nachts, mit starkem Jucken.
- Verspätete Menarche.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Dauerndes **Kitzeln im Kehlkopf** und der Trachea, zwingt das Kind zu andauern-dem Räuspern.
- **Verlust der Stimme bei jeder Infektion der unteren Atemwege;** nachdem die Infektion abgeklungen ist, braucht es mindestens 2-3 Wochen bis zur vollständigen Genesung.
- **Schmerzlose Heiserkeit,** Rauheit oder nasaler Klang der Stimme, mit Schnupfen oder durch Kälteexposition, schlimmer durch Singen oder Reden, fühlt sich zeitweise besser durch Trinken kalter Getränke.
- Reizung des Larynx durch kalte Luft, Sprechen und am Morgen im Bett.
- Schleim im Hals, der nicht ausgehustet werden kann.

ATMUNG

- **Asthma abwechselnd mit Hautausschlägen.**
- Rasseln in der Brust mit Atemnot beim Husten, Sprechen oder schnellen Gehen; fühlt sich besser, wenn die Kleider gelockert sind.
- Spastisches Asthma durch die kleinste Anstrengung oder nach unterdrückten Gefühlen.
- Untersuchungsergebnis:

Schnelldes oder schnelldes Atmen

HUSTEN

- Husten schlimmer durch **kalte Luft**, bei **trockenem** und windigem Wetter, beim Vorwärtsbeugen; besser durch kalte Getränke.
- Trockener, harter, quälender und reizender Husten am Morgen beim Erwachen, der am Abend beim Liegen locker wird, **obwohl er dann nur wenig abhusten kann**; muss gelösten Schleim herunterschlucken.
- Kind hustet so stark, dass es die ganze Brust erschüttert (Tyler).
- Kind reibt sich Gesicht und Augen mit der Faust während des Hustens.
- Husten durch Ösophagotrachealfistel.
- Gesicht läuft blau an durch Husten.
- Fettig schmeckender Auswurf (Puls.).

RÜCKEN

- Schmerzhaftes Steifheit der Zervikalregion durch Zugluft oder trockenen kalten Wind.
- Untersuchungsergebnis:
 - Verkrümmung der Wirbelsäule.

EXTREMITÄTEN

- **Ungelenkigkeit** der unteren Gliedmaßen, stolpert beim Gehen.
- **Juvenile rheumatoide Arthritis**, bei der das Kind in der Nacht durch die Schmerzen unruhig wird (Rhus-t. ist ruhelos am Tag und in der Nacht). Die Schmerzen sind schlimmer bei kaltem, trockenem Wetter (Rhus-t. hat Verschlechterung bei feuchtem Wetter; vergleiche auch Acon., Bry., Nux-v.). Der Schmerz nötigt zur Bewegung, die nicht erleichtert (bei Rhus-t. erleichtert Bewegung den Schmerz). Schlimmer im Freien; besser im Bett oder in einem warmen Raum (Guernsey) oder bei warmem, feuchtem Wetter (Hep., Nux-v.).
- **Lähmung des Delta-Muskels** durch Zangengeburt oder Geburtstrauma.
- Kalte, ätzende Schweißabsonderung an den Füßen.
- Schmerzhaftes, brennendes Hühneraugen.
- Schmerzhaftes Krämpfe in den Beinen, Fußsohlen und Zehen nachts im Bett.
- Spontane Luxation des Hüftgelenks.
- Zittern der Hände beim Schreiben.
- Unsicherer Gang und leichtes Hinfallen bei kleinen Kindern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verkürzung der Beugemuskeln und Sehnen der Hände (besonders der Finger) und Oberschenkel.
 - Risse in den Gelenkbeugen.
 - Fistelöffnungen am Hüftgelenk.
 - Hornige Warzen auf der Hand, besonders in der Nähe der Fingerspitzen.
 - Linke Hüfte empfindlich gegen Berührung.
 - Nägel: brüchig, deformiert, verkümmertes Wachstum, dick, mit eingewachsenen Zehennägeln.
 - Schmerzhaftes Nagelbettentzündung an der Nagelwurzel.
 - Steifheit der Gelenke.
 - Synovitis, Ergussbildung im Gelenkspalt.

SCHLAF

- Dauerndes **Zucken** der Arme und Beine während des Schlafes.
- Im Schlaf: **Krampfhaftige Bewegungen** mit den Gliedmaßen, Zähneknirschen, Lachen, **Stöhnen**, offener Mund, Ruhelosigkeit, Schreien, Zusammenfahren wie von Schreck, Sprechen, Wimmern.
- Schlaflosigkeit durch Husten.
- Gähnen bei Beschwerden im Abdomen.

HAUT

- Jucken der Haut, schlimmer in der Nacht durch **Bettwärme** oder Kratzen, mit Brennen und beißenden Schmerzen.
- Haut anfällig für **Intertrigo** während der Zahnung.
- **Saurer Geruch** des Schweißes.
- Knotige Urtikaria in kalter Luft, schlimmer nach Kratzen.
- Nützlich in Fällen von trockener Scabies, die durch Steroide und Benzylbenzoat unterdrückt wurde.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundgelegene Stellen.
 - Ikterus.
 - Keloide.
 - Ungesunde Haut.
 - Warzen: Groß, hart, hornig oder flach, gestielt, entzündet, blutend und sehr berührungsempfindlich.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Zorn (bei Säuglingen), Kaltwerden oder nach dem Genuss kalter Getränke, Kältegefühl, **tiefen Schlaf**, Zahnung, Fieber, Schreck (Bell., Ign., Hyos., Op., Stram.), Neumond oder **Vollmond, Bestrafung**, unterdrückte Ekzeme oder unterdrückte Skabies (Ars., Calc., Cupr., Sulph.) und Impfung.
- Aura vor Konvulsionen: Zerstreut, stumpfsinnig oder vergesslich; Aura wird im Magen gefühlt; **heißer Kopf**; Lachen; Schweißabsonderung an der Kopfhaut; ruhelos und rennt im Kreis herum; Zittern; Schwindel mit Kopfschmerz und Übelkeit.
- Während der Konvulsionen: Beißt andere, Zungenbiss, Einschlagen der Daumen in die Handfläche, Kälte des Körpers, epileptiforme Konvulsionen bei Bewusstsein, Nasenbluten, Kopf nach rechts gezogen, unwillkürliches Urinieren, Lachen, einseitige Konvulsionen (schlimmer auf der rechten Seite), blasses oder rotes Gesicht und übermäßiger, schaumiger Speichelfluss aus dem Mund.
- Nach den Konvulsionen: Fröstelnd, tiefer Schlaf, Kopfschmerz, Lachen, einseitige Lähmung, reichlicher Urin, Tinnitus (brummende oder zischende Geräusche), Weinen.

CHOREA

- Beschwerden durch: Schreck, **Kummer** (Ph-ac., Ign., Nat-m.) und unterdrückte Neurodermitis.
- Beeinflusst die Muskeln auf der **rechten Seite**, besonders die Muskeln des Aug-

- Schlechter bei trockenem Wetter und beim Darandenken.

ALLGEMEINES

- Beschwerden während Rekonvaleszenz, nach Verbrennungen oder nach Gebrauch von Cortison-Salben.
- Beschwerden durch trockenes kaltes Wetter, Voll- oder Neumond, Nasswerden, Masturbation, Masern und Sitzen auf nassem Untergrund.
- Verzögerte Entwicklung.
- Spätes Laufenlernen.
- Frösteliger Patient, Kind kann nicht warm genug eingepackt sein, trotzdem bessert die Wärme nicht.
- Fröstelige, zarte, kümmerliche, anämische und kränkliche Kinder von straffer Faser und dunkler Gesichtsfarbe, mit allergischer Konstitution und der Tendenz, sich schnell zu erkälten.
- Konstitutionelle Folgen von Verbrennungen (emotional und physisch).
- Verlangen nach Aufenthalt im Freien, aber Zugluft verschlechtert.
- Abgemagertes Kind trotz Heißhunger.
- Intoleranz gegen Druck der Kleidung; muss die Kleidung lockern.
- Juveniler Diabetes, begleitet von Heißhunger und vorzeitiger Trübung der Cornea.
- Reichliche Schweißbildung während des Essens und beim Stuhlgang.
- Poliomyelitis.
- Fortschreitende Lähmung nach Diphtherie oder durch unterdrückte Hautausschläge.
- Rachitis.

CHAMOMILLA

(Echte Kamille - Cham.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Babys und Kleinkinder können niemanden in ihrer Nähe ertragen; ältere Kinder wollen nicht angesprochen werden; wenn man sie zur Antwort zwingt, fällt sie **gereizt** und **schnippisch** bis **kratzbürstig** aus.
- ▶ Heftige Zornesausbrüche und andere Verhaltensstörungen bei Kindern, deren Mütter Drogen wie Cannabis, Kokain oder Morphin benutzt haben oder zu viel grünen Tee oder Kaffee trinken; auch nach Tabakmissbrauch.
- ▶ In Anfällen widerwärtiger Gereiztheit schreit und heult das Kind unaufhörlich; kann nur durch **Umhertragen beruhigt** und besänftigt werden.
- ▶ Jämmerliches Klagen und Weinen dauert Stunden und Tage an, wenn die Eltern die Wünsche des Kindes nicht erfüllen.
- ▶ Kleinkinder und Neugeborene sind extrem ruhelos (vergleiche Ars.); sie gehen von einer Person zur anderen; nie sind sie zufrieden; niemals völlig ruhig; das Kind wandert von einer Person zur nächsten und wird dabei immer unzufriedener und schlägt vielleicht sogar nach ihnen, wenn es weitergereicht wird. Andauernd wollen sie getragen und liebkost werden.
- ▶ Glühender Zorn, wenn man ihnen etwas verweigert oder **vehemente Zurückweisung von Dingen, die man ihm anbietet** (Bry., Cina, Kreos.).
- ▶ Das Kind mag überhaupt keine Musik und wendet sich rasch ab.
- ▶ Trias von Cham.: Verdrießlichkeit, Überempfindlichkeit und rasender Zorn.
- ▶ Unbeherrschte, unhöfliche, außer Kontrolle geratene und nicht mehr führbare Kinder, die bei Wutanfällen den Atem anhalten; bei Zorn können sie Spasmen, Konvulsionen, Kolik, Diarrhoe und Fieber bekommen; manchmal schlagen sie auch mit dem Kopf gegen die Wand.

KÖRPER

- ▶ Bei Zorn können sich zahlreiche körperliche Symptome wie galliges Erbrechen, Schüttelfrost, Kolik, Konvulsionen, Fieber, Migräne etc. einstellen.
- ▶ Eine Wange ist rot und heiß, die andere blass und kalt.
- ▶ Sehr schmerzempfindlich; der Schmerz erscheint unerträglich und treibt zur Verzweiflung; das Kind wird bei Schmerzen wie verrückt und macht die anderen damit ebenfalls verrückt und panisch; will sofortige Linderung und duldet keinen Aufschub; im Schmerz wird das Kind sogar gewalttätig, wirft sich umher, schreit vor Verzweiflung und kann die ganze Nachbarschaft in Aufruhr versetzen. Die Schmerzen werden schlimmer durch Hitze, am Abend bis Mitternacht, im warmen Zimmer

und durch lokale Anwendung von Wärme; verbunden mit Ohnmacht; die schmerzende Stelle wird schließlich taub.

- ▶ Die Kinder sind sehr anfällig für Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen und Zahnschmerzen und sie fordern dabei sofortige Linderung.
- ▶ Absonderungen sind heiß: Heißer Schnupfen, heißer Schweiß und heiße Stühle.
- ▶ Sehr nützlich bei Kindern, deren Mutter während der Wehen Morphinum bekam.
- ▶ Kleinkinder sind empfindlich, gereizt, durstig, heiß und benommen.
- ▶ J. H. Allen bezeichnet Cham, als sykotisches Mittel wegen seiner schrullig-launischen Reizbarkeit; Überempfindlichkeit, angeschaut oder angesprochen zu werden; fehlende Schmerztoleranz; wegen der grünschleimigen Stühle und der Besserung durch Getragenwerden oder Schaukeln. In meiner Praxis habe ich gesehen, dass Cham.-Kinder in der Familiengeschichte oft Rheuma, Arthritis oder Asthma verzeichnet haben.
- ▶ Das Neugeborene verzieht dauernd das Gesicht und bohrt den Kopf ins Kissen.
- ▶ Überempfindlich gegen frische Luft; mit starker Abneigung gegen Wind, besonders um die Ohren.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Verhaltensstörungen bei Kindern, die bockig und schnippisch sind und zu Wutanfällen neigen; gewalttätig, beleidigend und widerspenstig; kneifen, schmeißen Dinge herum. **Außer sich vor Wut, mit rotem Gesicht und Atemnot**, besonders am Morgen beim Erwachen oder durch jeglichen Schmerz oder wenn ihnen irgendetwas nicht passt.
- **Launisches** Kind; weist Dinge zurück, um die es gebeten hat, sobald sie ihm angeboten werden.
- Beschwerden, sobald sie beleidigt, gedemütigt oder verachtet werden.
- Kann nicht den geringsten Schmerz während der Zahnung ertragen: Weint, klagt oder wird sehr ärgerlich, ruhelos und gewalttätig, mit Schreien und Schlägen; schlimmer durch Trost, kann nur still sein, wenn es getragen wird.
- Neigung, dauernd die Stirn zu runzeln.
- Untröstliche Kinder.
- Steckt die Finger in den Mund.
- Das Kind besteht darauf, überall getragen zu werden und weigert sich vehement zu laufen; wenn es zum Laufen gezwungen wird, wird es spastisch oder bekommt eine Kolik oder einen Wutanfall.
- Widerwärtige, ärgerliche und unhöfliche Kinder, die sehr zänkisch sind und sich über jede Kleinigkeit ärgern.

KOPF

- Kopfschmerzen **durch Zorn**, Zahnung, Kaltwerden, durch unterdrückten Schweiß, ausgelöst durch zu viel Haaröl oder durch zu häufiges Waschen des Kopfes mit Shampoo oder durch windiges Wetter; schlimmer am Morgen im Bett.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Reichlicher, klebriger saurer Kopfschweiß während des Fütterns.
 - Unwillkürliches Nicken des Kopfes, vor und zurück.
 - Meningitis und Enzephalitis.
 - Feuchte Ausschläge am Kopf.
 - Unfähig, den Kopf gerade zu halten, der zur Seite gezogen wird.

AUGEN

- Katarrhalische Entzündung der Augen bei Kleinkindern durch Erkältung.
- Tränenfluss bei Schnupfen oder Fieber.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blepharitis.
 - Augenlider halb geöffnet.
 - Ikterus.
 - Entzündung der Meibomdrüsen.
 - Pupillen tendieren dazu, sich abwechselnd zu verengen und zu erweitern.
 - Rollen des Augapfels.
 - Starren.
 - Gelbliche, eitrige Absonderungen aus den Augen, besonders am Morgen, die die Augen verkleben.

OHREN

- **Die Ohren sind empfindlich im Freien und gegen Geräusche.**
- Ohrenschmerzen mit Halsweh, schlimmer durch kalte Luft und in der Nacht durch Bettwärme; besser durch Einhüllen der Ohren; Ohren sind sehr empfindlich gegen die geringste Berührung, aber besser durch starken Druck.
- Beeinträchtigtes Hörvermögen durch Erkältung mit Ohrenschmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rote Ohr läppchen.
 - Dünnes Ohrenschmalz.
 - Katarrh der Eustachischen Röhre.
 - Otitis media mit dünner, eitriger Absonderung.

NASE

- Kann starke Gerüche nicht ertragen.
- Reichlicher, wässriger, heißer, reizender Schnupfen mit verstopften Nasengängen.
- Nasenbluten mit dunklem, schwarzem, klumpigem Blut, besonders auf der rechten Seite, am Morgen beim Aufstehen und bei Kopfweh.
- Niesen mit Unfähigkeit zu schlafen
- Untersuchungsergebnisse:

GESICHT

- **Heißer Schweiß** im Gesicht, besonders nach Essen, Trinken und bei Fieber.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Eine Wange kalt und blass, die andere heiß und rot.**
 - Kaubewegungen der Kiefer.
 - Riss in der Mitte der Unterlippe.
 - Mumps.
 - Eingefallenes Gesicht.
 - Schwellung und Verhärtung der Parotis und Submaxillardrüsen.
 - Zittern der Lippen beim Weinen.
 - Faltige Stirn.

MUND

- Kind will **dauernd die Finger in den Mund stecken.**
- Zahnschmerz erstreckt sich zu Kopf und Ohren, schlimmer durch Kauen, durch warme Speisen oder Getränke (Bism., Bry., Coff.); **besser durch kaltes Wasser im Mund.**
- Beißt beim Füttern auf das Glas.
- Übermäßiger schaumiger Speichelfluss bei Zahnschmerzen.
- Langsame und schwierige Zahnung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszess des Zahnfleisches (Merc., Sil.).
 - Mundgeruch.
 - Landkartenzunge oder auch schmutzig-gelber oder weißer Belag, mit rotem Streifen in der Mitte abwärts ziehend und roten Seiten.
 - Ranula.
 - Stottern.

HALS

- Kann nur Flüssigkeiten schlucken; die geringste feste Nahrung würgt ihn (Schwäche der Laryngo-Tracheal-Muskeln).
- Wiederkehrende Tonsillitis nach der geringsten Kälteeinwirkung.
- Halsweh durch Kälte, besser durch warme Getränke.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dunkelroter Rachen mit vergrößerten und entzündeten Tonsillen.
 - Schweißabsonderung des äußeren Halses.
 - Schwellung der Hals- und Submandibulardrüsen.

MAGEN

- **Wechselhafter Appetit.**
- **Starker Durst** ist ein wichtiger Begleitumstand bei Beschwerden wie Diarrhoe, Fieber oder Schmerzen.
- Magenverstimmung und Schmerz im Epigastrium nach jeder Art emotionaler Aufregung (Zorn und Schreck) oder vor einem Hustenanfall; besser durch Zusammenkrümmen.
- Schluckauf.

- Übelkeit mit heftigem Würgen und leichtem, galligem Erbrechen nach Zorn, Ärger, mit Fieber, nach Husten, nach Milch oder allopathischen Medikamenten.
- Saures Aufstoßen nach dem Essen, mit Geruch nach faulen Eiern.
- Verschlimmerung: Milch, Süßigkeiten, warme Speisen und Getränke.
- Verbesserung: Kaffee, kalte Speisen und Getränke.
- Abneigung: Kaffee, Suppe, warme Speisen und Getränke.
- Verlangen: Brot, kalte Speisen und Getränke, Sauerkraut (sehr verbreitet in Russland), saure Speisen, Gemüse.

ABDOMEN

- **Krampfende und kneifende Schmerzen bei Säuglingen oder kleinen Kindern durch Zorn, Aufregung oder Ärger;** schlimmer durch Kaffee, Husten, Berührung und beim Versuch, zu urinieren; **besser durch Zusammenkrümmen,** Abgang von Blähungen, **warme Anwendungen;** begleitet von vielen Blähungen.
- Hepatitis nach Ärger.
- Gestaute Blähungen mit schmerzhafter, tympanitischer Auftreibung des Abdomens, schlimmer nach dem Essen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Leber fühlt sich bei der Palpation hart an.
 - Schmerzhafter und eingeklemmter Leistenbruch (Nux-v., Op., Verat.).
 - Paralytischer Ileus.
 - Sigmoidoskopie: Colitis ulcerosa.
 - Nabel empfindlich gegen Berührung.

REKTUM

- **Schmerzlose Diarrhoe bei Säuglingen;** mit galligen, **heißen, ätzenden,** schleimigen, grünen, wässrigen Stühlen, **wie kleingehackte Eier mit Spinat,** mit Geruch nach faulen Eiern; durch kaltes Wetter, Zahnung, Abwärtsbewegung (Borx., Sanic.), **Aufregung** (Zorn, Schreck, Ärger), Einwirkung von kaltem Wind und durch Erkältung.
- Wechselhafte Stühle.
- Cholera infantum mit häufigen, wässrigen, grünen Stühlen.
- Verstopfung mit knotigen, knötchenförmigen, klumpigen Stühlen, zusammengehalten durch Schleimfäden (Graph., Nux-v., Sei.).
- Jucken um den Anus, besonders am Abend.
- Übelriechender Stuhlgang und heiße, sauer oder nach faulen Eiern riechende Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundheit und Rötung um den Anus.
 - Spulwürmer.

HARNWEGE

- Bettnässen
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rotes Sediment in der Windel

KEHLKOPF UND SPEISERÖHRE

- Heiserkeit bei Schnupfen (Carbo-veg., Caust., Merc., Phos.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Stridor.

ATMUNG

- **Kind hält im Zorn den Atem an.**
- **Plötzlicher Atemstillstand bei Kindern nach einem Weinkrampf.**
- Plötzliche Anfälle von Asthma oder Atemnot durch eine Erkältung, trockenes Wetter, Gefühle (besonders Zorn), Blähungen, unterdrückte Masern, durch Kaffee oder warme Speisen; besser durch Trinken von kaltem Wasser oder Hinausgehen in die kalte Luft und durch aufrechtes Sitzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Heißer Atem.
 - Unregelmäßige, ungleichmäßige, röchelnde Atmung.
 - Laute Einatmung mit forcierter Ausatmung.
 - Seufzende Atmung.

HUSTEN

- **Chronischer, trockener Husten nach Masern** (Dros., Puls.).
- Dauernder, trockener, heftiger, spastischer und krampfartiger Husten im Schlaf; schlimmer nach Mitternacht, aber es scheint ihn nicht zu stören oder ihn zu wecken (Aral., Arn., Lach.); wird tagsüber lockerer.
- Trockener Reizhusten, der aus dem Magen zu kommen scheint (Bry., Sep.); verschlimmert durch kalten Wind, Zahnung, Emotionen (Zorn, Weinen, Ärger), Musikhören, beim Klavierspielen und im Winter.
- Weinen durch Husten (Bell., Cina, Hep.).

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Bronchitis.
 - Harte, knotige Schwellung der Mammae bei Neugeborenen.

EXTREMITÄTEN

- Kind liegt immer mit gespreizten Gliedmaßen.
- Krämpfe in den Zehen.
- Reichlicher Fußschweiß.
- Steifheit der Arme beim Greifen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Daumen sind verkrampft und nach innön gedreht.
 - Kalter Schweiß auf den Handflächen.
 - Trockene Handflächen mit sehr kalten Fingern.
 - Wundheit zwischen den Oberschenkeln.

SCHLAF

- Neugeborene, die einen sehr leichten Schlaf haben; die beim leisesten Geräusch zusammenfahren.

- Schlaflosigkeit nach Ärger, während der Zahnung oder bei Schmerz; das Kind muss getragen werden.
- Kind gähnt fortwährend, wälzt sich umher und streckt sich während der ganzen Nacht, mit ruhelosem Schlaf.
- Während des Schlafes: Heißer Schweiß der Kopfhaut; Rucken, Zucken oder Zittern der Beine; tritt die Decken weg; laute Atmung; offener Mund mit Speichelfluss; Stöhnen, Schreien, Schnarchen; Zusammenfahren wie durch einen Schreck; Schlafwandeln; Sprechen, Weinen, Wimmern; deckt die Füße ab.
- Es ist fast unmöglich, Cham-Kinder ins Bett zu bringen, da sie ab ca. 21 Uhr bis ungefähr Mitternacht extrem unruhig sind. Nach Mitternacht lässt die hohe Erregbarkeit nach und das Kind schläft allmählich ein.
- Schlaflage: Liegt mit gespreizten Gliedern.
- Schläfrig, aber kann nicht einschlafen.
- Unruhig im Schlaf.
- Zucken der Hand- und Gesichtsmuskeln im Schlaf.

FIEBER

- Beschwerden durch: Zorn oder Ärger; bei Zahnung, Masern oder Hepatitis; 11 Uhr bis 16 Uhr; zu Frühlingsbeginn (d. h. von März bis April).
- Frost:
 - Kalte Extremitäten mit brennender Hitze des Gesichts, mit dem Gefühl, als ob Hitze aus den Augen kommt.
 - Durstlos.
 - Verschlimmert durch Aufdecken, Ausziehen, kalte Luft.
- Hitze:
 - **Extreme Reizbarkeit** und **Stöhnen** bei Fieber (Bry.).
 - Je größer die Hitze, um so größer der Durst.
- Schweiß:
 - Heißer Schweiß, besonders im Gesicht und am Kopf.
- Zunge: Gelb oder weiß an den Seiten und rot in der Mitte (Gegent. von Ant-t.).

HAUT

- Trockene Haut mit Unfähigkeit zu schwitzen.
- Jucken der schwitzenden Körperteile, verschlimmert durch Kratzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Erysipel.
 - Intertrigo.
 - Ungesunde Haut.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Zahnung, emotionale Aufregung (Zorn, Demütigung oder Bestrafung), Fieber, Schlaf, Wurmbefall.
- Bei Konvulsionen: Schmerzen im Abdomen, eingeschlagene Daumen, Hustenanfall, Fallen, Schaum vor dem Mund, Steifheit und Kontraktion der Muskeln und Sehnen der Gliedmaßen (besonders der Beugemuskeln des Unterarmes und der Finger), tetanische Starre, Weinen.

ALLGEMEINES

- Beschwerden durch häufigen Gebrauch allopathischer Medikamente (Chinin-Präparate), Masern und Unterdrückung von Schweiß (besonders Fußschweiß).
- Abneigung gegen Baden.
- Fröstelndes Kind, eine Körperhälfte ist kalt, die andere heiß; Abneigung gegen frische Luft; verschlechtert bei Wetterwechsel, Kälteexposition oder Wind in jeder Form.
- Chorea mit rhythmischen Bewegungen des Körpers.
- Verlangen nach und Besserung durch Bewegung.
- Blonde, hellhäutige, abgemagerte Kinder mit schlaffem Gewebe und der Neigung, sich zu erkälten.
- Ungesunde, eiternde Wunden, die langsam heilen.
- Wandernde, unerträgliche Schmerzen, schlimmer nach Zorn.

CHAM: NEUGEBORENE UND KLEINKINDER

- Weinen (schrill, laut mit Zorn).
- Fuchelt mit den Armen.
- Neigt dazu, den Kopf nach hinten zu biegen und vor Zorn steif zu werden.
- Hände geballt.
- Ruhelos.
- Streckt den Körper und die Extremitäten im Zorn.
- Zittert am ganzen Körper beim Weinen, besonders um den Mund.

HERKUNFT

Familie der Korbblütler (Asteraceae/Compositae)

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM

(Amerikanisches Wurmkraut - Chen-a.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Skrofulöse Diathese.
- ▶ Schwerhörigkeit entweder erblich bedingt, durch Lähmung des Hörnervs, durch unzureichende Knochenleitung oder aufgrund von wiederkehrenden Mittelohrentzündungen.
- ▶ Schwerhörigkeit bei Wurmbefall.
- ▶ Entzündete und geschwollene Tonsillen, käsiger Belag auf den Tonsillen. Beim Versuch zu schlucken ist der Hals äußerst schmerzhaft.
- ▶ In östlichen Ländern wie Singapur und Sumatra wird dieses Mittel eingesetzt, um alle Arten von **Würmern** zu beseitigen: Spulwurm, Madenwurm, Peitschenwurm und Hakenwurm.
- ▶ Ausgeprägtes Verlangen nach Tee und Brot.

HERKUNFT

- Wird auch Traubengänsefuß genannt und gehört zur Familie der Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae).

CHINA OFFICINALIS

(Chinarinde - Chin.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST UND KONSTITUTION

► Ein Gefühl, **verfolgt** (Cench., Dros., Kali-br.) und **gequält** (Aq-mar., Lyss.) zu werden, findet man bei den Kindern in Folgendem wieder: - Bilder: Benutzt oft Farben wie Schwarz, malt über begrenzende Linien hinweg, nicht fähig, sein Thema richtig auszudrücken.

- Zeichnungen: Benutzt einen sehr harten Bleistift, malt Figuren, die Grausamkeit, Zerstörung, Missbrauch an Menschen und Tieren ausdrücken.
 - Sprache: Benutzt Wörter und Sätze, bei denen man fühlt, dass das Kind in irgendeiner Weise unter Verfolgung oder Blockierung leidet.
 - Familiärer Hintergrund: Meistens wird das Kind von seinem Vater bedrängt, der Alkoholiker ist oder es missbraucht.
 - Schule: Das Kind wurde übermäßig bestraft oder von Lehrern oder Mitschülern gedemütigt.
 - Sozioökonomische Situationen wie äußerste Armut und soziale Niedrigstellung, z. B. Asylbewerber, Sozialhilfeempfänger, Kinder die Verfolgung, Verachtung oder Demütigung von ihrem sozialen Umfeld hinnehmen mussten.
- Das Gefühl, **unzureichend** zu sein, wird mit übermäßiger Vorstellungskraft und Fantasie kompensiert, die ihrerseits dann zu besonderer Kreativität führen.
- Jegliche **gefühlsmäßige Erregung wirkt sich auf Kopf und Magen aus.**
- Die Kinder haben schon in sehr jungen Jahren einen ausgesprochenen Sinn für Schönheit, gepaart mit starker imaginativer Kraft, so dass sie später oft Berufe wie Dichter (Ant-c., Coff., Nat-m.), Schriftsteller, Filmemacher oder ähnliche ergreifen.
- Kinder, die gern Märchen lesen und von Geschichten wie z. B. „Aschenputtel“ etc. beeindruckt werden.
- **Verächtlich** (Ars., Cic., Ipec., Pall.) anderen gegenüber, was hauptsächlich auf Frustration in ihren eigenen Bestrebungen oder auf Mangel an Chancen beruht, dies wiederum als Folge der Tatsache, dass sie blockiert wurden.
- **Kreative, verträumte und fantasievolle Kinder;** starke Neigung zu kreativen Aktivitäten, die sie Tag und Nacht betreiben können.
- Drückt sich am besten in der Kunst (Malen) aus (Carc., Med., Phos., Staph.) oder durch das Schreiben von Versen und Gedichten (Agar., Ant-c., Thea.).

- ▶ **Äußerst geräuschempfindlich** (Asar., Borx., Coff., Ther., Zinc.); die Empfindlichkeit wird durch den geringsten schrillen Ton verstärkt, der z. B. von einer Bohrmaschine, einem Automotor, vom Fernseher oder vom Dampfkochtopf kommt.
- ▶ **Sehr empfindliche und sensible Kinder**; die geringste Ermahnung verletzt sie sehr (Bell., Ign., Med., Stann.).
- ▶ Emotional, ästhetisch und geistig äußerst sensibel; diese Sensibilität ist in den ersten Gesprächen nicht gleich zu erfassen, aber später begreift man, wie empfindlich das Kind gegenüber Gewalt und Grausamkeit ist, wie sehr es mit seinen Freunden mitfühlt, mit seinem Haustier etc. oder wie viel Wissen es in diesem frühen Alter bereits von geistigen Dingen hat.
- ▶ **Gemein, grausam** (Anac., Hep., Nux-v., Stram.), **unsoziales Verhalten** (Aur., Cic., Syph.), das sich im Ärgern anderer Kinder und Erwachsener zeigt und auf ähnliche Erlebnisse und Erfahrungen im eigenen Lebenslauf zurückzuführen ist.
- ▶ Wenn der Homöopath oder Therapeut das Vertrauen des Kindes nicht gewinnen konnte, gibt das Kind tatsächlich kein einziges wahres Gefühl preis, nichts über sein wahres Selbst. Es wird sich einfach oberflächlich geben, kann sogar unhöflich und kurz angebunden sein. Mit China-Kindern muss der Homöopath sehr intensiv arbeiten, bevor er ihr Vertrauen gewinnt.

KÖRPER

- ▶ **Eingesunkene Augen** (Ant-t., Cina, See., Spig.) mit blauen Ringen, mattem Ausdruck und kränklicher Erscheinung; das Gesicht kann aufgedunsen sein, mit leichter Milzvergrößerung und tastbar vergrößerter Leber sowie eine ausgesprochene **tympantische Auftreibung des Abdomens** (Ars., Carbo-veg., Lach., Ter.).

DD: Kann leicht mit Nat-m. verwechselt werden, da das Kind zurückhaltend ist und seine Gefühle nicht ausdrückt, wenigstens nicht in den ersten Gesprächen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Geistesabwesend (Apis., Cann-i., Hell.), in Gedanken versunken (Hell., Nux-m., Mez.).
- Abneigung, berührt oder liebkost zu werden (Ant-c., Cham., Cina, Cupr.); kann es nicht ertragen, angesehen zu werden (Brom., Iod., Mag-c., Sanic.).
- Launenhaft und habgierig.
- Äußerst ängstliche, zaghafte Kinder voller Furcht; die Furcht vor Tieren (Alum., Bell., Elaps., Puls., Tub.) ist so stark, dass das Kind sich nicht nur vor Hunden

sogar vor Haustieren wie Hühnern (Calc-p., Ign.), Ziegen und Schafen. Die meisten Ängste von China sind nachts schlimmer. Wenn die Nacht heraufzieht, wird das Kind äußerst ängstlich und stellt sich vor, dass Geister und Phantome da sind, und wenn es einschlafen will und die Augen schließt, können in seiner Fantasie seltsame Gestalten auftauchen (Arg-n., Calc., Lach., Stram.).

- Kinder mit großer Abneigung gegen Sport (Chel., Nat-n., Pall.) und körperliche Übungen.
- Neidisch auf die Fähigkeiten von anderen (Ars., Calc., Sulph.).
- **Das Gefühl, benachteiligt** (Bry., Cub., Graph., Verat.) **oder glücklos zu sein, entspringt tiefer Traurigkeit, da das Kind nicht bekommen kann, was andere haben.**
- Will immer das Beste im Leben haben (Ars.), z. B. die beste Kleidung, besonders Designer-Sachen, das beste Spielzeug, die besten Spiele; gewöhnliche Dinge scheinen völlig unattraktiv zu sein.
- Kinder voller Ideen und Pläne; ihre Mitschüler und Lehrer sehen es gern, wenn sie mit ihrem Wissen und Können zu Projekten, Wettbewerben und anderen kreativen Gebieten beitragen.

KOPF

- Migräne in der Kindheit.
- **Äußerste Empfindlichkeit des Kopfes; das Kind lehnt jede Kopfbedeckung ab** (Bry., Nit-ac., Sil.), **will sich nicht einmal kämmen lassen, weil das sehr weh tut** (Carbo-veg., Carbn-s., Kreos.).
- Das Haar fällt aus, ist schmerzhaft, besonders die Haarwurzeln, schlimmer beim Kämmen, Berührung.
- **Kopfschmerzen** mit chronischen Leberbeschwerden (Chel., Jug-c., Lept., Nux-v., Ptel.), begleitet von Verstopfung, mit Übelkeit und Erbrechen, nach Zorn, während Schnupfen oder unterdrücktem Schnupfen (Acon., Calc., Dulc., Lach., Sil.), während Husten, nach gefühlsmäßiger Erregung (Aur., Chinin-ar, Ph-ac., Verat.), nach geistiger Anstrengung, **von Tee** (Guar., Nux-v., Sei., Thuj.); **von etwas Kaltem im Mund**; gastrische Kopfschmerzen, **schlimmer durch Haarekämmen**, im Freien gehen; besser durch Dunkelheit; wahnsinnig machende Schmerzen, nervöser Kopfschmerz; heftiger Schmerz; periodisch; **Schmerz zwingt das Kind zu gehen oder zu stehen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krustige und schorfige Ausschläge auf der Kopfhaut.
 - Dunkles Haar.
 - Kopf nach hinten (Cic., Tax.), seitwärts (Bar-c., Caust., Lachn., Lyc.) gezogen.
 - Enzephalitis.
 - Nach hinten Fallen des Kopfes, schlimmer beim Sitzen (Dig., Oena., Op.).
 - Hitze des Kopfes bei Kälte der Extremitäten (Bell., Cact., Ferr., Sulph., Verat.).
 - Hydrozephalus (Apis.-, Calc., Lyc., Sil.).
 - Schweiß auf der Kopfhaut nachts, Schweiß am Hinterkopf; kalter Schweiß auf der Stirn (Carbo-veg., Op., Verat.).

TRÄGE BLUTZIRKULATION IM GEHIRN

- Dieses Phänomen tritt bei Kindern auf, die extremen Blutverlust erlitten haben wie in Fällen von Hämophilie, Thalassämie, Leukämie, Thrombozytopenie, zerebrale Tumoren.
- Dieser Zustand ist charakterisiert durch Kopfschmerzen besonders morgens; Klingen in den Ohren, blasses und kaltes Gesicht, Kälte der Extremitäten, große Schwäche, Kribbeln, Zittern und Zucken der Muskeln, Ohnmachtsgefühl besser durch Hinlegen.

AUGEN

- Ziliarneuralgie nach Augenoperation; besser im Dunklen.
- Flackern beim Sehen während Kopfschmerzen (Cycl., Nat-m.).
- Zusammenlaufen der Buchstaben während des Lesens.
- **Brennen in den Augen wie von Sand.**
- **Starkes Hervorstehen der Augen.**
- **Schwache Augen durch schlechten Ernährungszustand; die Augen entwickeln Müdigkeit und Schmerzen, wenn das Kind zu lesen oder zu schreiben versucht.**
- **Schlechtes Sehen bei Nacht wegen Schwäche der Retina; schlimmer beim Fokussieren.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Mattes Aussehen (All-c., Ant-t., Nux-v.).
 - Konjunktivitis.
 - Hornhauttrübung.
 - Ulzera der Hornhaut.
 - Augenschleim in den Canthi (Agar., Am-c., Ant-c., Sulph.).
 - Weitsichtigkeit.
 - Iritis.
 - Kurzsichtigkeit.
 - Ein Auge halb offen, das andere geschlossen während Schlaf (Ign.).
 - Lähmung des Nervus opticus (Gels., Sil., Sulph.).
 - Photophobie.
 - Hervortreten.
 - Erweiterte Pupillen mit schwachem Lichtreflex.
 - Eingesunkene Augen.
 - **Gelbe Skleren.**

OHREN

- **Starke Empfindlichkeit der Ohren, kann keinen Lärm ertragen** (Bell., Op., Ther.).
- **Hörminderung nach quecksilberhaltigen Zahnfüllungen bei Karies** (Asaf., Carb-c., Staph.), aufgrund von Katarrh der Eustachischen Röhre.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Karies des Mastoids (Aur., Caps., Ferr-p., Sil.).
 - Chronische Otitis media.
 - Blutige, übelriechende, faulige, eitrige Absonderungen.
 - Entzündung des Trommelfells.
 - **Rote Verfärbung der Ohrmuscheln** (Caj., Caps., Cham., Merc., Puls.).

NASE

- Schnupfen begleitet von Diarrhoe (Merc., Puls., Sang.), Epistaxis (Acon., Elaps, Ipec., Mosch.), mit Fieber (Lach., Lyc., Spig.).
- Absonderungen geleeartig, tropfend, übelriechend, eitrig.
- **Habituelles Nasenbluten bei jungen Kindern** (Croc., Ferr., Puls., Ter.), **besonders morgens beim Aufstehen**; Nasenbluten begleitet von Blässe des Gesichts; während Fieber, Kopfschmerzen.
- **Geruchssinn überscharf** (Coff., Ign., Op.).
- **Unterdrückter Schnupfen, der zu Kopfschmerzen führt.**
- Heftiges Niesen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalter Schweiß rund um die Nase (Rheum.).**
 - Spitze Nase (Camph., Verat.).
 - **Heiße und rote Nase.**
 - **Nasenspitze kalt.**

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufgedunsen (Ars., Op.).
 - Rissige Lippen (Alum., Arum-t., Nat-m.).
 - Kalter Schweiß auf dem Gesicht, um den Mund herum (Rheum.).
 - **Aufgesprungene Lippen, Mitte der Lippe** (Mez., Nat-m., Hep.), **Unterlippe** (Nat-c., Nit-ac., Puls., Sep.).
 - Verfärbung: blass besonders während Husten (Ars., Cina, Ferr., Mez., Sulph.) und Schweiß (Cina, Puls., Sei., Verat.); rot während Fieber (Bell., Hep., Kreos.); Wangen rot während Fieber (Acon., Hyos., Ferr., Rhus-t.).
 - **Ausdruck kränklich** (Ars., Ars-h., Cina, Lach., Lyc.), **blass, schmal** (Aeth., Cupr., Tab., Verat.).
 - **Eingesunkene, von blauen Ringen umgebene Augen.**
 - **Fettig** (Nat-m., Rhus-t., Tub.).
 - Hippokratisches Gesicht (Aeth., Carbo-veg., Tab., Verat.).
 - Geschwollene Lippen (Apis, Arum-t., Nat-m., Sep.).

MUND

- **Profuse Hämorrhagien des Zahnfleisches nach Zahnextraktion** (Arn., Lach., Phos.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen.
 - **Zahnfleisch geschwollen und schwammig.**
 - Übler Geruch.
 - Reichlicher Speichel während Schweiß (Bell., Dros., Dulc., Merc., Nit-ac., Rhus-t., Spig.), während Schlaf (Lyc., Merc., Puls., Rhus-t.); Speichel blutig (Bufo, Crot-c., Mag-c., Plb.) und übelriechend.
 - Karies der Zähne.
 - Zunge braun, sehr belegt, schmutzig weiß; weiß während Fieber; schmutzig gelb; sauber.

HALS

- Halsschmerzen während des Hustens (Arg-met., Caps., Merc.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blut kommt aus dem Hals.
 - Vergrößerte zervikale Lymphknoten wegen tuberkulärer Lymphadenopathie.
 - Struma.
 - Klopfende Karotiden (Bell., Calc., Hep., Glon., Op., Tarent.).

MAGEN

- **Abneigung gegen Butter** (Cycl., Merc., Ptel., Sang.), **fettes Essen**, Beeren (Mag-m., Ox-ac., Prot., Sulph.).
- **Brennender Durst auf große oder kleine Mengen Wasser, besonders bei Diarrhoe** (Acet-ac., Ars., Bry., Cham., Dulc., Rheum., Sul-ac.), **Fieber**; allerdings kann der Durst variieren und fehlt manchmal während des Fiebers.
- **Verlangen nach Saurem** (Acon., Cor-r., Hep., Verat.).
- **Verdorbener Magen durch Obst** (Ars., Bry., Calc-p., Lyc.) **und Milch** (Calc-ar., Iris, Nat-c., Sep., Sulph., Zinc.).
- Aufblähung des Magens direkt nach dem Stillen.
- Dyspepsie bei jungen Kindern nach Bohnen, Linsen, Erbsen und Milch.
- Aufstoßen bei gestillten Kindern, besonders nach dem Stillen.
- **Blähung von Magen und Darm, mit viel Gären und Kollern** (Anac., Jatr-c., Gamb.).
- Häufiges Erbrechen unverdauter Milch bei Säuglingen und Neugeborenen (Mag-c.).
- Gesteigerter Appetit mit **schneller Sättigung** (Lyc., Plat.); gesteigerter Appetit nachts (Chinin-s., Cina, Lyc., Phos., Psor.); Heißhunger während Fieber (Ars., Bry., Caps., Cham., Cina, Phos.).
- Heißhunger mit Schweiß (Calc., Caps., Sil., Verat.).
- Das Kind wird mit vielen **Allergien** geboren, die den Gastrointestinaltrakt vollständig durcheinander bringen. Das Kind kann nicht einmal die kleinsten Mengen von Folgendem verdauen: **Äpfel** (Ant-t., Borx., Fago., Lyc., Rumx.), **Bohnen** (Bry., Coloc., Lyc., Petr.), **Brot** (Bry., Puls., Sep.), **Butter** (Carbo-veg., Cycl., Fern, Puls.), **Kirschen** (Mag-m., Merc-c., Nat-m.), **Kaffee** (Canth., Cham., Caust., Ign., Nux-v.), **Mais** (Calc-ar., Kali-c., Puls., Sulph.), **mehlhaltige Lebensmittel** (Bry., Carb-an., Iris, Nat-s.), **Fett** (Ferr., Graph., Tarax., Tarent.), **Früchte** (Ars., Bry., Coloc., Nat-s., Puls., Verat.), **Weintrauben** (Ox-ac., Ruta, Verat.), **Milch** (Aeth., Con., Lac-d., Staph., Tub.), **Schafffleisch** (Ars., Colch., Ferr., Puls.), **Öl** (Bry., Canth., Graph., Rob., Tarax.), **Erbsen** (Bry., Coloc., Lyc., Petr.), **Pfeffer** (Ars., Cina, Nat-c., Sil.), **Sauerkraut** (Bry., Lyc., Petr.), **saure Dinge** (Acon., Ant-c., Hep., Olnd.).
- Unersättlicher Appetit, aber schwache Verdauung; alles, was er isst, verwandelt sich in Gase.
- **Fehlender Appetit bei Kindern, besonders bei nebligem Wetter.**

ABDOMEN

- Kolik jeden Tag zu einer bestimmten Stunde (Cham., Cupr., Dios.), besser durch Vornüberbeugen (Bov., Mag-p., Stann., Verat.).

- Aufblähung des Abdomens, nicht besser durch Abgang von Flatus (Arg-n., Phos.).
- Schlimme krampfende Schmerzen vor Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Atrophie der Leber (Aur., Calc., Phos.).
 - Aszites.
 - Vergrößerte Leber, fühlt sich hart an (Ars., Dig., Iod., Rat.).
 - Milz fühlt sich hart an (Agn., Ferr., Mez., Psor., Sul-ac.).
 - Hypochondrium stets berührungsempfindlich (Bry., Colch., Mag-m., Verat.).

LEBER

- Alle Leberbeschwerden sind verbunden mit **großer Erschöpfung**.
- Langsame Verdauung.
- Leber vergrößert, empfindlich.
- Die Eltern geben meistens folgende Krankheitsgeschichte an: Niedriges Gewicht bei der Geburt, vorzeitige Entbindung, Schwäche, häufige Diarrhoe, reichlicher Nachtschweiß, rezidivierende Malaria.
- Die Milz ist ebenfalls häufig vergrößert.
- Die Symptome verschlechtern sich jeden zweiten Tag.
- **Die Zunge ist weiß oder gelb belegt.**
- Großer **Hunger** besonders nachts (Lyc., Phos., Psor.) mit Verlangen nach Saurem.
- Meistens Diarrhoe, Flatulenz und **lehmfarbene Stühle** (Card-m., Chel., Nat-s.).
- Das Mittel hat vornehmlich Wirkung auf die Leber; es ruft Kongestionen, Entzündung und Gelbsucht hervor.

HYPERÄMIE DER MILZ

- Die Hyperämie und Kongestion der Milz entsteht durch portale Hypertension (Pfortaderhochdruck), Malaria, chronische myeloische Leukämie (Cean., Nat-s.).
- Diese Hyperämie führt dann am Ende zur Vergrößerung der Milz.
- Kind klagt über große Erschöpfung, es schwitzt stark während des Schlafs oder wenn es zugedeckt wird, die Haut ist gelb, Ikterus erscheint, kein Verlangen nach Speisen oder Wasser; **Abdomen tympanitisch**; viel Gärung nach dem Essen; **unverdauter Stuhl**.

REKTUM

- Reichliche Flatulenz.
- Cholera infantum.
- Verstopfung nach Missbrauch von Abführmitteln (Aloe, Hydr., Nux-v., Sulph.).
- Jucken im After durch Madenwürmer und Spulwürmer.
- Offenstehender Anus nach unfreiwilligem Stuhl (Apis., Phos.).
- **Würmer bei Vollmond** (Calc., Cina, Ferr., Sulph.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Würmer.
 - Schafkotstuhl.
 - Feuchtigkeit.

DIARRHOE

- Nach kalten Getränken, während Zahnung, durch Gemütererregung, während Fieber, nach Essen von Fisch. **Obst** (Ars., Coloc., Nat-s., Puls., Verat.).

- Nach Stuhlgang: **Gefühl von großer Schwäche.**
- Vor Stuhlgang: **Schlimme Kolik.**
- **Chronische Diarrhoe.**
- Aufgrund von Tuberkulose (Bapt., Coto., Cupr-ar.), Primärkomplex.
- Während Stuhlgang: Gleichgültigkeit, blass, erdfarbenes und aufgedunsenes Gesicht, Lippen trocken und rissig, Speichelfluss, bitterer Geschmack im Mund, Verlangen in häufigen, aber kleinen Schlucken zu trinken (Ars., Coloc., Nat-ar.), starker Appetitmangel, aufgeblähtes Abdomen, **Tympanitis, Flatulenz**, dunkler Urin.
- **Morgendliche Diarrhoe** treibt das Kind aus dem Bett (Aloe, Psor., Rumx., Sulph.).
- **Schmerzlos** (Bapt., Bism., Squil., Tub.).
- Stühle nachts und nach dem Essen häufiger.
- Stühle gelb, wässrig, unverdaut, schaumig (Ambro., Crot-t., Olnd., Psor.).

HARNWEGE UND NEBENNIEREN

- Morbus Addison (Calc., Iod., Nat-m., Phos., Sil.).
- Chronische Entzündung der Nieren.
- **Chronische eitrige Pyelitis** (Baros., Chim., Cop., Uva.) **wegen Strikturen an der Verbindungsstelle Nierenbecken-Ureter oder wegen Blasen-Ureter-Reflux.**
- Unwillkürlicher Harnabgang nachts bei mageren und schwachen Kindern.
- Nephrotisches Syndrom (Apis, Calc-ar., Lyc., Merc-c., Phos., Sulph., Tub.).
- Harnverhaltung.
- Nierensteine bei Kindern (Benz-ac., Calc., Lith-c., Pareir., Sars.).
- Urinieren selten bei Fieber.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Urin: Eiweißhaltig, blutig, wolkig nach Stehen, schaumig (Chel., Lach., Sei., Seneg.), milchig, ziegelrot, feuerrot, dunkel, grün, gelb.
 - Übelriechend, strenger Geruch.
 - Dünner Harnstrahl.
 - Zucker im Urin bei jungen Kindern (Ars., Colch., Hyos., Op., Puls., Stram.).

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Tendenz zur Masturbation.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Orchitis.
 - Schlaffes Skrotum.
 - Hodenhochstand.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Krupp.
- Heiserkeit nach Husten.
- Rasseln in Larynx und Trachea.
- Schwache Stimme (Ant-t., Canth., Hep., Stann., Verat.), tonlos (Calad., Dros., Stram.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Glottisödem.
 - Laryngitis.

ATMUNG

- **Asphyxie bei Kindern und Neugeborenen, besonders von Müttern, die eine Post-Partum-Hämorrhagie entwickeln.**
- **Asthma durch Flatulenz** (Carbo-veg., Cham., Chel., Lyc., Mag-p., Nux-v., Op., Phos., Sulph., Zinc.), **bei feuchtem Wetter** (Aur., Dulc., Ipec., Lem-m., Nat-s., Syph.); **meistens abends und nachts** um Mitternacht herum; **möchte zugefächelt bekommen; schlimmer, wenn der Kopf niedrig liegt** (Apis, Cact., Hep., Kali-c., Spig., Spong.) oder **Liegen ist unmöglich** (Ars., Crot-t., Puls., Seneg., Tub.).
- Keuchende Atmung während Husten.
- **Lähmung der Lunge durch Katarrh** (Ant-t., Ars., Camph., Ipec., Sulph., Verat), **durch Kongestion** (Acon., Ipec., Phos., Samb., Verat-v.).
- Rasselnde Atmung bei Kindern, während Husten.
- Atmung schnarchend; stertorös während Schlaf.
- Giemen, schlimmer beim Einatmen.

HUSTEN

- Ständiger Husten, schlimmer bei kaltem Wetter; kruppöser Husten **schlimmer beim Essen**; schlimmer während Fieber, Lachen, Liegen mit dem Kopf nach unten (Bry., Carbo-veg., Hyos., Rumx., Sang., Spong.); Husteln schlimmer morgens beim Aufstehen (Arn., Ferr., Lach., Par., Thuj.); Husten **besser, wenn der Kopf hoch liegt** (Aral., Carbo-veg., Rumx., Sep.).
- Auswurf eitrig.

BRUST

- Primärkomplex, Lungentuberkulose bei jungen Kindern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blutige Beulen auf der Brust (Arn., Graph.).
 - Hitze der Brust bei Fieber.

EXTREMITÄTEN

- Ungeschicklichkeit: Das Kind stolpert beim Gehen (Agar., Caust., Ipec.).
- Krämpfe beim Ergreifen eines Gegenstandes.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Chronische Entzündung der Gelenke.
 - Kälte von Händen und Füßen.
 - Hühneraugen (Calc., Rhus-t., Sep., Sil.).
 - Ödeme der Knöchel.
 - Abmagerung der unteren Extremitäten (Abrot., Arg-n., Ign., Plb., Sanic.).
 - Plattfuß (Abrot., Calc., Guaj., Ph-ac., Stront-c.).
 - Eine Hand kalt, die andere warm (Ant-c., Canth., Chel., Cocc., Dig., Ipec., Lyc., Mosch., Puls., Tab.).

RHEUMATISMUS BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN

- Furcht im Freien zu sein - selbst ein kurzer Aufenthalt dort bringt schlimme Schmerzen.
- Schmerzen in Gliedern und Gelenken wie verstaucht; schlimmer durch die lei-

- **Rheumatismus bei Kindern nach Intoxikation durch Quecksilber bei Zahnfüllungen** (Guaj., Hep., Phyt., Sars.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Heiße Schwellung der Knie (Bell., Calc., Ferr-p., Iod., Puls., Verat-v.), schmerzhaft bei Berührung.
 - Gelenke geschwollen, empfindlich.
 - Geschwollene Füße.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Schwitzen in der Zervikalregion.
 - Steifheit des Nackens.

SCHLAF

- Kinder wollen nicht früh ins Bett.
- **Furcht nach Träumen** (Am-m., Cocc., Con., Lyc.).
- Stöhnen im Schlaf (Aur., Bry., Cham., Op., Sulph.).
- Schlaf gestört durch das geringste Geräusch.
- Schlaflosigkeit durch Kopfschmerzen oder ruheloser Schlaf durch Träume.
- **Schlaflosigkeit durch Husten** (Caps., Caust., Kali-bi., Ol-j., Tub.), **durch Angst** (Acon., Ign., Laur.), **durch Kopfschmerzen** (Aur., Coff., Puls., Spig., Sulph.).
- Das Kind schläft mit den **Armen über dem Kopf** (Nux-v., Puls., Sulph.) oder **unter dem Kopf** (Acon., Bell., Meny., Sanic.), wobei die unteren Gliedmaßen entweder heraufgezogen (Carbo-veg., Lac-c., Merc-c.) oder ausgestreckt sind (Cham., Dulc., Puls., Stann.).
- **Der Schlaf des Kindes ist unterbrochen durch Hunger** (Abies-n., Ign., Lyc., Ph-ac., Phos., Teuer.), **schreckliche Träume und Angst** (Ars., Merc., Nat-m., Sep., Sil.).
- Weinen im Schlaf (Cham., Merc., Op., Puls., Sep., Sil.).

FIEBER

- **Fieber intermittierend, dreitäglich, täglich.**
- Anfälle kommen alle 7 oder 14 Tage wieder.
- Prodromalstadium: **Großer Durst**, Hunger, **Übelkeit**, Angst, Kopfschmerzen, Schwäche; Niesen in kalter Luft; Kolik, ruheloser Schlaf in der Nacht vor dem Fieberanfall.
- Frost: **Kein Durst** (Ars., Caust., Hell., Mosch., Mur-ac., Phos., Sabad., Spig., Thuj.); Durst hört auf, sobald der Frost beginnt; Frost beginnt in den unteren Extremitäten unter den Knien und erstreckt sich dann zum Körper; stärker durch Trinken; Frost mit **Gänsehaut** nach jedem Schluck (Eu-p. Trinken erzeugt Erbrechen); möchte nahe am Ofen sein, wodurch der Frost noch verstärkt wird (Ipec. erfährt durch die Hitze des Ofens Erleichterung); eisige Kälte der Hände und Füße; Kälte von Händen und Füßen sogar im warmen Raum; Haut kalt und blau.
- Hitze: **Gesicht blass, hippokratisches Aussehen**; eingesunkene Augen umgeben von dunklen Ringen; Hitze besonders im Gesicht; stärker bei Bewegung und Gehen (Caps.: Hitze besser durch Gehen); Durst folgt eine Stunde nach dem Verschwinden der Hitze; allgemeine Hitze mit erweiterten Venen, Kopf-

trockener Mund; trockene, brennende Lippen, Röte des Gesichts, trockener spasmodischer Husten; Schmerz in den Hypochondrien; Wangen sind rot und heiß; **Zunge weiß oder gelb, dicker oder schmutziger Belag**; bitterer Geschmack im Mund; schneller Puls.

- Schweiß: **Durst** (Arn., Cham., Nat-m., Stram., Verat.); reichlich und schlimmer beim Zudecken (Acon., Bell., Puls., Staph., Thuj., Verat.).
- Fieberlosigkeit: Das Kind schwitzt schnell; **große Schwäche**; erschöpfende Nachtschweiß; ikterische Farbe der Haut.
- Das Fieber wird für gewöhnlich **schlimmer morgens** (Apis, Bism.) **und nachmittags** (Bell., Ign., Gels., Nat-m., Phos.).

SCHWEISS

- **Kalter klebriger Schweiß mit allen möglichen Hämorrhagien.**
- Schweiß während des Schlafes (Agar., Borx., Podo.).
- Reichlicher schwächender Schweiß besonders während Fieber.
- Schweiß meistens auf den bedeckten Teilen des Körpers (Acon., Bell., Cham., Ferr., Nit-ac., Sanic., Sil., Thuj.).
- Untersuchungsergebnis: Öliges Schweiß (Mag-c., Sei., Thuj.).

HAUT

- Neigung zu Beulen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ekchymosen (Arn., Led., Ph-ac., Phos., See., Sulph-ac.).
 - Gänsehaut.
 - Fettig.
 - Masern.
 - Psoriasis.

ALLGEMEINES

- Schärfe aller Sinne (Bell., Coff., Op., Phos.) mit Hyperästhesie gegenüber der leichtesten Berührung, Licht etc.
- Schwäche durch Verlust von Körpersäften wie bei Hämorrhagie, Durchfall, Schwitzen etc.
- **Schlimme Folgen von Hämorrhagie** bei jungen Kindern, wie Ohnmacht, Klingeln im Ohr und Konvulsionen.
- **Neigung zu passiven Hämorrhagien aus jeder Körperöffnung** (Adren., Bufo, Crot-c., Mangi-i.), **oft begleitet von entzündlichen oder kongestiven Zuständen.**
- Äußerste physische Erschöpfung bei progressiver Anämie (Calc-p., Fern, Nat-m., Ph-ac.).
- Indiziert bei Zusammenbruch von Kindern, die zuvor eine robuste Konstitution hatten, aber nach akuten schwächenden Krankheiten oder erschöpfenden Krankheiten wie Pneumonie, Typhus etc. schwach geworden und entkräftet sind.
- Schmerz entsteht und flammt wieder auf durch die geringste Berührung.
- Periodizität der Symptome, die jeden zweiten Tag wiederkehren (Alum., Ipec., Rhod.), jedes Jahr (Ars., Lach.) oder im Herbst (Kali-bi., Lach., Rhus-t.).
- Rheumatische, neuralgische Schmerzen, Knochenschmerzen; schlimmer durch leichte Berührung, besser durch starken Druck (Arn., Coloc., Lach.).

CHIRONEX FLECKERI

(Seewespe - Chri-f.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Verhaltensstörungen bei Kindern.
- ▶ Stur, trotzig, unzufrieden und ängstlich.
- ▶ Unsympathisch, streitsüchtig und kann auch körperlich gewalttätig werden.
- ▶ Der Hauptgrund für dieses auffällige Verhalten ist fehlende Liebe der Eltern.
- ▶ Leicht mit Tub. zu verwechseln.
- ▶ Neigung zu vergrößerten, verhärteten und geschwollenen Nackenlymphknoten.
- ▶ Abmagerung trotz unbändigem Appetit.

HERKUNFT

- Auch Würfelqualle genannt, wurde von Alastair Gray (Australien) in die Homöopathie eingeführt.

CHLORALUM HYDRATUM

(Choralhydrat - Chlol.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Fürchterliche, schreckliche Traumbilder; das Kind schreit laut, sitzt im Bett und kann nicht beruhigt werden.
- ▶ Schlafwandeln, das Kind steht in der Nacht auf, versteckt sich und kann sich nach dem Aufwachen nicht daran erinnern, wo es gewesen ist.
- ▶ Lernstörungen durch lange Behandlung mit Antiepileptika.
Für diese Kinder ist es schwierig zu antworten oder sie geben zusammenhanglose Antworten und beantworten Fragen nicht richtig; Konzentrationsschwierigkeiten beim Lernen.
- ▶ Hastige und zusammenhanglose Sprache.
- ▶ Schreckliche und fürchterliche Bilder im Schlaf, wacht deshalb oft auf und kann nicht mehr einschlafen.
- ▶ Konvulsionen bei der Zahnung.
- ▶ **Nächtlicher Terror bei der Zahnung.**
- ▶ Bettnässen bei Kindern in den frühen Morgenstunden; nach dem Einnässen ist es schwer das Kind aufzuwecken.
- ▶ Urtikaria, die tagsüber auftritt und in der Nacht dann wiederkommt.

HERKUNFT

- Chloralhydrat war das erste synthetisch hergestellte Schlafmittel. Wirkt als Sedativum, Hypnotikum und Antikonvulsivum.

CHLORPROMAZINUM

(Allopathisches Medikament - Chlorpr.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Schizoide Persönlichkeit.
- ▶ Anfälle von Geistesabwesenheit und Konzentrationsschwäche.
- ▶ Mangelhafte schulische Leistungen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- An nichts interessiert.

NASE

- Verstopft.

GESICHT

- Untersuchungsergebnis: - Akne.

MUND

- Untersuchungsergebnisse:
 - Zahnfleischbluten.
 - Candida.
 - Trockene Lippen.
 - Rissige Zunge.
 - Mundgeruch.

MAGEN

- Zyklisches Erbrechen.

ABDOMEN

- Untersuchungsergebnis: - Schlaffes Abdomen.

REKTUM

- Hartnäckige Verstopfung.

URIN

Enuresis.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Leukorrhoe.

EXTREMITÄTEN

- Zerebrale Lähmung.
- Chorea.
- Kalte Füße.

SCHLAF

- Alpträume.
- Schläfrigkeit am Morgen.

HAUT

- Empfindlichkeit gegen Sonnenlicht.
- Untersuchungsergebnis:
 - Vitiligo.

ALLGEMEINES

- **Neigung zu Fettsucht.**
- Aplastische Anämie.
- Chronische Epilepsie.
- Familiengeschichte von Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder Tuberkulose.
- Mangel an Lebenswärme.
- Resistenz gegen antiepileptische Behandlung.
- Neigung, sich schnell zu erkälten.
- Thrombozytopenie.

HERKUNFT

- Chlorpromazin war der erste Arzneistoff aus der Gruppe der Neuroleptika und legte damit den Grundstein der modernen Psychopharmaka-Therapie.

CHLORUM

(Chlorwasser - Chlor.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Wird aus Chlorgas hergestellt.
- ▶ Wirkt besonders auf die **Schleimhäute der Atemorgane**, auf Kehlkopf, Haut und Drüsen.
- ▶ Allergischer vasomotorischer Schnupfen, der mit fließenden Absonderungen von wund machendem Schleim beginnt. Wunde Nasenflügel und verstopfte Nase, besonders auf der linken Seite. Heftiges Niesen und schmutzig belegte Nasenlöcher.
- ▶ Eingefallenes Gesicht.
- ▶ Die Probleme der Kinder entstehen während der Zahnungszeit oder durch Masern.
- ▶ Schmerzhafte Aphten im Mund; Mund sehr trocken und wie ausgedörrt.
- ▶ Krampfartige Verengung des Kehlkopfes, schlimmer beim Husten; Husten durch anhaltende Entzündung im Kehlkopf. Heisere Stimme; Atmen, Einatmen wie auch Ausatmen, fällt schwer.
- ▶ Glottiskrampf bei Kindern und Kleinkindern besonders beim Saugen an der Brust oder im Schlaf.
- ▶ Während eines akuten Asthmaanfalls kann die Atmung unregelmäßig, laut, streichend und rasselnd sein. Das Kind braucht Zugluft, was erleichtert; schlimmer in warmen Räumen und beim Schlafen. Hippokratisches Gesicht beim Asthmaanfall oder während der Atemprobleme.
- ▶ Krupphusten oder Keuchhusten. Der Auswurf ist schaumig, dick und weiß.
- ▶ Ausgeprägtes Verlangen nach Gewürznelken.
- ▶ Fieber mit Urtikaria.
- ▶ Sehr heiße Kinder und Besserung durch frische Luft, wie bei allen Halogengasen.

CICUTA VIROSA

(Wasserschierling - Cic.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Abartiges Verhalten; singt, brüllt und tanzt mit grotesken Bewegungen (sehr ähnlich wie Hyos.- und Stram.-Kinder).
- ▶ Kinder, die nicht „groß“ werden wollen. Sie leben in dem Gefühl, dass sie immer noch ganz klein sind und wollen mit Spielzeug spielen, das weit unter ihrem Altersniveau liegt.
- ▶ Psychische Symptome und verzögerte Entwicklung des Kindes nach Unfall oder Kopfverletzung.
- ▶ Abneigung gegen die Anwesenheit von Fremden.
- ▶ Verhaltensstörungen mit chronischer Epilepsie und Wurmbefall.
- ▶ Unzufriedene Kinder, durch nichts zufrieden zu stellen.
- ▶ Persönlichkeitsstörungen mit geistiger Zurückgebliebenheit.
- ▶ Plötzliche Gewalttätigkeit bei entwicklungsgehemmten Kindern, gekennzeichnet durch Klagen, Heulen und Aggression.

KÖRPER

- ▶ Chronische Beschwerden durch Verletzungen.
- ▶ Krampfartige Zustände: Schluckauf, Tetanus und Krämpfe.
- ▶ Zucken verschiedener Körperteile, besonders Arme und Finger.

Cic. gehört zur Familie der Umbelliferen (Apiaceae - Doldengewächse). Es ist sehr leicht zu verwechseln mit Con., da die beiden Pflanzen sich sehr ähnlich sind. Einige gemeinsame Merkmale sind am Ende dieses Arzneimittelbildes beschrieben.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Abneigung gegen Gesellschaft, vermeidet den Anblick von Menschen.**
- **Herablassend.**
- **Misstrauisch.**
- Antwortet schroff.
- Antwortet auf Ansprechen, erkennt aber niemanden.
- Das Kind kann keine schrecklichen oder gewaltsamen Szenen im Fernsehen anhören oder sehen.
- Geistesverwirrung; verwechselt die Gegenwart mit der Vergangenheit; neigt außerdem zu Verwirrung in Bezug auf Zeit und Ort.
- Beeindruckbar.

- Impulsiv.
- Erschrickt leicht und zuckt zusammen.

KOPF

- **Hirnerkrankungen ausgelöst durch unterdrückte Ausschläge.**
- Meningoenzephalitis.
- Gehirnerschütterung begleitet von Zungenbiss.
- Kopfschweiß, besonders im Schlaf.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kontraktion der Nackenmuskulatur, zieht den Kopf nach hinten**, mit steifer Wirbelsäule.
 - Bohrt seinen Hinterkopf in das Kissen.
 - Kopf zu einer Seite gewendet und verdreht.
 - Heißer Kopf und kalte Gliedmaßen.
 - Kernig-Zeichen +.
 - Rollen des Kopfes.
 - Dicke, gelbe Schuppen auf dem Kopf nahe dem Haaransatz (Nat-m.).

AUGEN

- **Konvergenter Strabismus nach Schlag, Konvulsionen oder Schreck.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Augen starren nach oben beim Anheben der Lider.
 - Pupillen erweitert und reaktionslos.
 - **Rollen der Augen.**
 - **Starrender Blick**, der auch das erste Anzeichen eines epileptischen Anfalls ist.
 - Zucken der Augenlider.
 - Hornhautreflex fehlt.
 - Offene Augen bei Bewusstlosigkeit.

OHREN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Ohren abwechselnd heiß und kalt.
 - Eitrige, brennende **Hautausschläge** um die Ohren, besonders **hinter den Ohren.**
 - Bei Schädelbasis-Fraktur: Battle-Zeichen positiv (Ekchymosen hinter dem Ohr).

NASE

- **Nasenbluten durch die leichteste Berührung.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ulzerierende Nasenlöcher mit gelber eitriger Absonderung.
 - Gelbe Krusten in den Nasenlöchern.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Aschfahles oder blaurotes Gesicht, schrecklich verzerrt, bei Konvulsionen.**

- Kauende Kieferbewegungen.
- Ekzem mit dicken gelben Schuppen.
- Epitheliom der Lippen (Con.).
- Herpes um den Mund.
- Impetigo.
- Kiefersperre (Trismus, mit Zähneknirschen oder fest zusammengepressten Zähnen).
- Zucken der Gesichtsmuskeln.

MUND

- **In die Wange oder Zunge beißen** während Konvulsionen und beim Kauen oder Sprechen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schaum im und um den Mund herum.
 - Blutendes und zurückgehendes Zahnfleisch.
 - Stottern oder Verschlucken von Wörtern.

HALS

- **Schwierigkeiten beim Schlucken von Flüssigkeiten.**
- **Spasmen und Verengungen der Speiseröhre verursachen Würgen beim Schlucken.**
- Untersuchungsergebnis:
 - Würgereflex schwach.

MAGEN

- **Intensiver Durst, besonders bei Konvulsionen, mit Unfähigkeit zu schlucken.**
- **Zwerchfellospasmen verursachen heftigen Schluckauf**, besonders während eines epileptischen Anfalls oder bei einem apoplektischen Insult.
- Unersättlicher Heißhunger, sogar nach einer vollen Mahlzeit.
- Heftiges Erbrechen mit Konvulsionen.
- Schlimmer durch Milch in jeder Form.
- Verlangen: Kohl, Kreide, Kohle, Schmutz, unverdauliche Dinge, Kalk, Senf, rohe Kartoffeln und Stärkemehl.

ABDOMEN

- **Schmerzhafter Blähbauch bei Konvulsionen.**
- Bauchkolik mit Konvulsionen und Erbrechen.
- Schweiß am Abdomen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Leistenbruch.

REKTUM

- Verlangen, jedes Mal nach dem Stuhlgang zu urinieren.
- Stuhl dünn und wässrig, entleert sich schwallartig.
- Untersuchungsergebnisse:

HARNWEGE

- Urinausscheidung in großen Mengen oder absolute Harnretention.
- Untersuchungsergebnis:
 - Spastische Verengung der Harnröhre.

ATMUNG

- Untersuchungsergebnisse:
 - Atemstillstand bei Konvulsionen.
 - Keuchende Atmung.

HERZ UND KREISLAUF

- Schwache Herztätigkeit, mit dem Gefühl, als ob das Herz aufhören würde zu schlagen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Puls: zitternd, schwach, langsam, fast nicht spürbar.

RÜCKEN

- Stoßverletzung der Wirbelsäule.
- Spinale Meningitis und Myelitis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rücken bogenförmig nach hinten durchgebogen.
 - Kernig-Zeichen +.
 - Verkrampfung der Halsmuskeln.

EXTREMITÄTEN

- Wie elektrische Schläge in den Gliedmaßen, mit Zucken.
- Totale Kraftlosigkeit der Gliedmaßen nach plötzlichen Zuckungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verkrampfte Finger.
 - Kalte Gliedmaßen bei Konvulsionen.
 - Verdrehte Gliedmaßen bei Konvulsionen.
 - Gliedmaßen abwechselnd ausgestreckt oder gebeugt bei epileptischen Krämpfen.
 - Knotige Arthritis.
 - Blaue Nägel.
 - Handvenen erweitert.

HAUT

- Hirnerkrankungen durch unterdrückte Hautausschläge.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Chronische Impetigo.
 - Nässende Ekzeme mit harten, zitronenfarbenen Krusten.

SCHLAF

- Beißt sich in die Zunge und knirscht mit den Zähnen im Schlaf.

FIEBER

- Zerebrales und typhoides Fieber.
- Fieber bei Kindern mit Wurmbeschwerden, mit Kolik und Konvulsionen.
- Intensive Hitze mit Konvulsionen.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: **Kolik, Zahnung, Zugluft, Fieber, Auskühlung, Kopfverletzungen, Darmparasiten (Würmer), Geräusche, Druckstellen und Berührung.**
- Aura: Beginnt im **Magen** oder um Kopf und Hals und erstreckt sich nach unten (Gegenteil von Cupr., bei dem sich die Aura nach oben ausdehnt)
- Vor Konvulsionen: Schriller Aufschrei.
- Während Konvulsionen:
 - Aufblähung und Schmerzen im Abdomen.
 - Aschfahles oder blaurotes Gesicht mit schrecklichen Verzerrungen.
 - Wangen- oder Zungenbiss.
 - Kalte Gliedmaßen, die abwechselnd ausgestreckt und gebeugt werden.
 - Kiefersperre, die Zähne entweder zusammengepresst oder knirschend.
 - Bewusstlosigkeit.
 - **Opisthotonus** mit überstrecktem Körper und Extremitäten, steif, unbeweglich und hart wie Holz ODER ohne jeglichen Tonus und schlaff.
 - Schrilles Schreien.
 - Zwerchfellospasmen verursachen heftigen Schluckauf.
 - Blutiger Schaum vor dem Mund.
 - Blaue Lippen.
 - Aufregung.
 - Klagen, Heulen, Jammern und Weinen.
 - Trismus.
- **Konvulsionen gehen vom Zentrum zur Peripherie.**
- **Tetanische Krämpfe durch Holzsplitter.**
- Spasmus wird erneut ausgelöst durch Berührung oder Geräusche.
- Spasmus zieht nach unten mit schrecklicher Gewalt, dann zuckt es plötzlich durch Körper oder Kopf, gefolgt von Steifheit oder Schreien, worauf längere Bewusstlosigkeit einsetzt mit völliger Erschöpfung, wie leblos.
- Betäubung zwischen den Konvulsionen.

ALLGEMEINES

- **Stupor kehrt schnell zurück, nachdem Fragen korrekt beantwortet wurden.**
- **Nützlich bei Prellungen, Verstauchungen und Splitterverletzungen.**
- Fröstelnd mit Verlangen nach Wärme.
- Neurologische Beschwerden durch unterdrückte Hautausschläge.
- Rachitis.

GEMEINSAME SYMPTOME VON CIC. UND CON.

- Abneigung gegen Gesellschaft, besonders gegen die Anwesenheit von Fremden.
- Blutige Absonderung aus den Ohren.
- Das Kind tanzt gern.
- Zyanose mit blauer Verfärbung des Gesichts und der Fingernägel.

- Verlangen nach Kohl und unverdaulichen Dingen wie Kreide, Holzkohle, Ton, Erde, Kalk, Griffel etc.
- Verlangen nach Anteilnahme.
- Furcht vor Menschen.
- Albernes Verhalten.
- Schaum vor dem Mund.
- Leicht zu erschrecken.
- Kommt schnell in Wut, neigt zu Gewalttätigkeit.
- Drüsenschwellung.
- Zähneknirschen.
- Beeindruckbar.
- Milch verschlechtert.
- Schmerz und Steifheit in der Halsregion.
- Puls: Unmerklich, langsam, klein und schwach.
- Pupillen kontrahieren und erweitern sich abwechselnd bei konstanten Lichtverhältnissen.
- Rollende Augen.
- Traurig und düster nach Kopfverletzung.
- Blutendes und zurückgehendes Zahnfleisch.
- Geräuschempfindlich.
- Schluchzen beim Weinen.
- Oesophagusspasmen mit Schwierigkeit, Flüssigkeiten zu schlucken.
- Spasmus der Gesichtsmuskeln mit Kiefersperre oder Risus sardonicus.
- Starrende, hervortretende Augen.
- Zuckt schnell zusammen: Durch Geräusche oder im Schlaf, wie durch Schreck.
- Strabismus.
- Benommenheit nach Kopfverletzung.
- Misstrauisch.
- Tonisch-klonische Konvulsionen mit tetanischer Steifheit.
- Gedächtnisschwäche mit Konzentrationsproblemen.

Familie der Doldenblütler (Apiaceae/Umbelliferae).

CINA MARITIMA

(Wurmsamen - Cina)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Cina befindet sich in einem Zustand ständiger Enttäuschung; egal, was sie bekommen, sie sind nie damit zufrieden.
- ▶ Ärgerlich, reizbar, schlecht gelaunt, will nicht berührt werden und kann keine Annäherung ertragen.
- ▶ Verlangt viele Dinge, aber weist sie zurück, sobald sie angeboten werden (Ant-t., Bry., Cham., Staph.).
- ▶ Wutanfälle und andere Störmanöver, die die Aufmerksamkeit immer gerade dann beanspruchen, wenn die Eltern am meisten mit eigenen Dingen beschäftigt sind.
- ▶ Zickig und empfindlich (Staph.), abstoßend, gereizt, widerborstig und unzufrieden.
- ▶ Hering beschreibt Cina-Kinder als wimmernd, klagend und ruhelos, sogar im Schlaf; sie liegen kaum 5 Minuten wach und schon geht die Heulerei los. Das Kind muss dauernd gewiegt, getragen oder auf dem Knie geschaukelt werden, Tag und Nacht; will nicht angefasst werden; verlangt vieles, weist es aber zurück, sobald man es ihm anbietet; mit nichts glücklich und zufrieden, immer unwillig und quengelig.
- ▶ Boshaft, böswillig.

KÖRPER

- ▶ Dunkle Haare; blasse Haut; dunkle Ringe um die Augen; dicklich; rosig.
- ▶ Grab- und Bohrexpert: Dauernd gräbt und bohrt er in der gereizten Nase oder dem gereizten After (reibt gern die Nase oder den After am Bett, am Kissen oder an der Schulter der Krankenschwester).
- ▶ Kränklich-weißes oder bläuliches Aussehen um den Mund und dunkle Ringe unter den Augen oder eine Wange rot und die andere blass (Cham.).
- ▶ Kinder mit Wurmbefall, gekennzeichnet durch jämmerliches Weinen, Zähneknirschen, Heißhunger und Verlangen nach Süßigkeiten.
- ▶ Je größer der Hunger, desto stärker ist die Abmagerung.
- ▶ Obwohl schwach und ausgezehrt, hat das Kind erstaunliche Kraft und schlägt zornig nach jedem, der in seine Nähe kommt.
- ▶ Frisch gelassener Urin ist trübe; er wird milchig nach längerem Stehen (Aur-m., Lyc., Ph-ac.).

Cina ähnelt Ant-c., Bry., Cham, und Staph.

DIFFERENTIALDIAGNOSE ZWISCHEN CHAM, UND CINA

CHAMOMILLA	CINA
Schroff.	—
Beleidigend.	—
Liebevoll.	—
Beschwerden durch Verachtung.	Beschwerden durch Vorwürfe.
Zorn: Mit rotem Gesicht; beim Erwachen; über Schmerzen.	Zorn: Durch Liebkosungen; vor Husten.
—	Nägelkauen.
—	Fröstelig; empfindlich gegen jede Zugluft.
—	Klammern ++.
Verlangen: Kaffee.	Verlangen: Mango und Süßigkeiten; Abneigung gegen und Verschlimmerung durch Milch.
Diktatorisch.	—
Furcht vor Geräuschen, Wind.	Furcht, wenn sich ihm jemand nähert.
Erschrickt schnell.	—
—	Extrem empfindlich, verträgt überhaupt keinen Spaß.
Gesten: Wischt sich über das Gesicht.	Gesten: Greift sich an Nase und Lippen.
Voll Hass und Rachedanken.	—
—	Der Kopf ist empfindlich gegen die geringste Erschütterung.
—	Hungrig nach dem Erbrechen oder sogar nach einer vollständigen Mahlzeit.
Ungeduldig.	—
Untröstlich.	—
—	Ständiges Gähnen.
Unregelmäßige Rötung einer Wange mit Blässe der anderen.	Umschriebener roter Fleck auf der Wange oder Blässe um den Mund und die Nase.
Reizbarkeit am Morgen, nach dem Aufstehen oder beim Erwachen.	Reizbarkeit bei Husten; besser durch schnelles Schaukeln.
Eifersucht.	—

CHAMOMILLA	CINA
Treten.	—
Stöhnen bei Hitze; unwillkürlich; durch Schmerz.	Stöhnen während des Hustens.
—	Stur wie ein Maulesel.
Wut durch Schmerz.	—
Nimmt Einmischung aus emotionalen Gründen übel.	Nimmt Einmischung aus körperlichen Gründen übel.
Ruhelosigkeit durch Schmerz.	Ruhelosigkeit beim Erwachen.
Traurigkeit durch Musik.	—
Empfindlich gegen Wind und nach Kaffeegenuss.	Empfindlich gegen Zurechtweisung.
Schreien bei Kolik oder Schmerz (besonders der Ohren); während Fieber.	Schreien bei Berührung oder beim Erwachen.
Stuhl: Grün.	Stuhl: Weiß.
Weinen: Grundlos; bei Hitze; bei Husten; hartnäckig; mitleiderregend; mit Schläfrigkeit.	Weinen: Unwillkürlich; nach Husten; wegen Kleinigkeiten.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Abneigung **liebkost** zu werden; es macht ihn ärgerlich und er schreit.
- **Nägelkauen.**
- Das Kind will **alles auf dem Tisch berühren** (Bell., Merc., Tarent., Thuj.).
- **Klammert sich** an Nahestehende, besonders an die Mutter oder an das Lieblingsspielzeug.
- Die meisten psychischen Symptome sind **schlimmer beim Erwachen**: Angst, Reizbarkeit, Jammern, Stöhnen, Schreien, Ruhelosigkeit, Weinen.
- Beschwerden durch Zorn, Schreck und Vorwürfe.
- Abneigung gegen die Anwesenheit Fremder.
- Verhaltensstörungen bei Kindern, die aufsässig, eigensinnig, trotzig, boshaft, grob, ungezogen sind und sich nicht beruhigen lassen; sie springen, kneifen, schlagen, stampfen mit den Füßen, werfen mit Gegenständen und haben Wutanfälle.
- Das Kind weint jämmerlich und schreit, wenn man es anschaut, sich ihm nähert oder es berührt; es ist nur ruhig, wenn es getragen oder geschaukelt wird.
- Reizbarkeit und Zorn über Kleinigkeiten bei zahnenden Kindern oder bei Wurmbefall; sie sind nur ruhig, wenn sie über der Schulter getragen oder schnell geschaukelt werden.
- Zieht viele Grimassen und gestikuliert mit den Händen.

- Fröhreife Kinder (Lach., Med., Verat.).
- Empfindlich gegen Zurechtweisungen, leicht zu verletzen.

KOPF

- Können das **Kämmen der Haare** nicht ertragen (Arn.).
- **Extreme Wutanfälle, wenn die Haare geschnitten werden sollen** (Bell., Tub.).
- Kalter, feuchter Schweiß auf der Stirn.
- Heftige Kopfschmerzen durch Wurmbefall, schlimmer durch Anstrengung der Augen, durch Sonnenlicht, Druck.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Kind lässt den Kopf ständig sinken, als ob es unfähig wäre, ihn aufrecht zu halten.
 - Enzephalitis.
 - Hydrozephalus.
 - Unwillkürliches Rucken, Rollen oder Zurückwerfen des Kopfes, in Fällen von Meningitis oder Enzephalitis.

AUGEN

- Asthenopie durch mangelnde Akkommodation (Art-v.).
- Verlangen, andauernd die Augen zu reiben.
- Photophobie.
- Sehschwäche nach Masturbation (Ph-ac.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Dunkle Ringe** um die Augen.
 - **Eingesunkene Augen** (Chin., Puls.), mit kränklichem Aussehen um die Augen.
 - Amblyopie.
 - Asthenopie.
 - Konvergenter Strabismus.
 - Rollende oder nach oben gedrehte Augen.
 - Erweiterte Pupillen.

OHREN

- **Bohrt andauernd mit den Fingern in den Ohren** (Sil.).
- Otitis media.

NASE

- Ständiges **Verlangen, an der Nase zu zupfen**, bis sie blutet (Arum-t., Nat-m., Sil.), besonders bei Kindern mit Hirnschäden.
- Dauerndes Reiben und Kratzen der Nase.
- Fließschnupfen mit Verstopfung der Nase, besonders am Abend.
- Heftige Niesanfälle (Nat-m.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Schweiß auf der Nase** (Nat-m., Ruta, Tub.).
 - Eingeogene Nasenlöcher (Carbo-veg.).
 - Spitze, schmale Nase (Camph., Verat.).

GESICHT

- Glühend rotes Gesicht beim Erwachen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kauende Bewegungen der Kiefer** (Bell., Hell., Merc., Stram.).
 - **Zupft dauernd an den Lippen** (Arum-t., Bry., Stram.).
 - **Eingefallenes Gesicht** (Ant-t., Carbo-veg., Dig., Op.) mit kränklichem Ausdruck.
 - Bläuliche Färbung um den Mund (Acon., Cupr., Verat.).
 - Kalter Schweiß auf dem Gesicht (Camph., Carbo-veg., Merc-c., Verat.).
 - Linea nasalis (ausgeprägte Blässe zwischen Nase und Oberlippe) (Ant-t., Ipec., Stram., Tarent.).
 - Eine Seite rot, die andere blass (Acon., Cham., Ipec., Mosch.).

MUND

- Schwierige **Zahnung** (Borx., Calc., Sil.).
- Das Kind will beim Füttern in das Glas beißen.
- Die Zähne sind empfindlich gegen kalte Luft und kaltes Wasser.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Saubere Zunge** (Ars., Ipec., Rhus-t.).
 - Spastisches Herausstrecken der Zunge.

HALS

- Es ist ihm unmöglich, etwas anderes als Flüssigkeiten zu schlucken (Bapt., Crot-c., Crot-h.).
- Gefühl des Erstickens, mit dauernder Neigung zu schlucken.

MAGEN

- Wechselhafter oder **launischer Appetit**, kurz nach dem Essen wieder Hunger oder erscheint zu ungewöhnlichen Zeiten.
- Magenbeschwerden durch **Gemütsregung** (durch Ärger oder Tadel).
- **Gurgelnde Geräusche vom Magen beim Trinken.**
- **Heißhunger nach den Mahlzeiten**; Säuglinge wollen ständig gestillt werden.
- Sehr **durstig**.
- Krampfartige Schmerzen im Magen nach dem Essen.
- Leere im Magen, nicht gebessert durch Essen.
- Übelkeit und heftiges Erbrechen mit sauberer Zunge.
- Erbrechen und Durchfall direkt nach dem Essen und Trinken.
- Verschlimmerung: Brot, Muttermilch (Sil.), Pfeffer und Süßigkeiten (Arg-n., Ign., Sulph.).
- Abneigung: Buttermilch, Speisen (nachdem er ein wenig gegessen hat) und Muttermilch (Borx.).
- Verlangen: Brot, **kalte Getränke**, kalte Speisen, **Mango** (Chin., Mag-m., Puls.) und **Süßigkeiten**.

ABDOMEN

- Krampfartige, kneifende Schmerzen bei Säuglingen und Kleinkindern, schlimmer vor dem Stuhlaana: **besser durch Druck und durch Liegen auf dem Bauch**.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufgeblähtes, hartes Abdomen (Carbo-veg., Cic., Sil.).
 - Leistenbruch bei Kindern (Aur., Nit-ac., Nux-v.).
 - Tabes mesenterica (Schwellung mesenterialer Lymphknoten bei Tbc: Bar-c., Calc., Iod., Tub.).

REKTUM

- Durchfall, schlimmer tagüber, bei **Zahnung, warmem Wetter** und unmittelbar nach dem Essen oder Trinken.
 - Vor dem Stuhlgang: Kolik.
 - Während des Stuhlgangs: Ausscheidung von **Spulwürmern**.
 - Begleitsymptome bei Durchfall: Neigung, viel zu weinen, ärgerlich und mürrisch zu sein.
- **Grünlicher**, schleimiger, galliger Stuhl oder weiß, wie kleine Stücke **Popcorn** mit rötlichem Schleim.
- **Jucken um den After herum**.
- Periodische Beschwerden durch Wurmbefall bei abgemagerten Kindern; verschlimmert bei jedem Vollmond.
- Untersuchungsergebnis:
 - Stuhl: Madenwürmer (Bar-c., Nat-m., Sabad.), **Spulwürmer** (Gran., Spig., Sulph.) und Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Krampfartige Enuresis mit unwillkürlichem, nächtlichem Urinabgang, besonders in der ersten Schlafphase (Caust., Kreos., Ph-ac., Sep.), häufiger bei Vollmond.
- Der Urin ist wolkig, trüb, milchig (Apis, Aur., Lyc.) und molkeartig.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Neigung zu masturbieren.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Würmer ziehen über das Perineum und dringen in die Vagina ein, was zu Erregung und exzessiver Masturbation führt (Calad.).
- Menses beginnen zu früh; Menarche vor dem normalen Alter (d. h. vor dem Einsetzen der Pubertät).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Reizung und Kitzeln im Kehlkopf, wie von Staub.

ATMUNG

- **Ringeln nach Luft beim Husten**.
- Unregelmäßige, ungleichmäßige, stoßweise Atmung mit unterbrochener Einatmung.
- Laute, pfeifende Einatmung.
- Rasselnde Atmung beim Gehen in frischer Luft.
- Untersuchungsergebnis:
 - Keuchende Atmung

HUSTEN

- Beschwerden durch: **Zorn** (Ant-t., Cham., Staph.), Zahnung, Staub, Schreck, **Ärger** (Cham., Ign., Staph.) und **Wurmbefall** (Ter.).
- Beim Husten: Bläuliche Gesichtsfarbe, Nasenbluten, **Würgen** (Arg-n., Lach., Nux-v.), Reizbarkeit, Tränenfluss, **Stöhnen** (Bell.), **Würgen mit Erbrechen** (Carbo-veg., Dros., Puls.), Niesen, Steifheit der Gliedmaßen, Bewusstlosigkeit und Weinen.
- Nach dem Husten: **Ringern nach Luft** (Cor-r.); das Kind wird blass und traut sich nicht zu sprechen oder sich zu bewegen, aus Angst, einen Hustenanfall zu provozieren. Nach dem Husten steigt ein gurgelndes Geräusch vom Magen zur Kehle auf.
- Bronchitis nach **Masern** (Dros., Puls.).
- Der Husten ist abends locker, morgens trocken.
- Erstickender Husten, morgens beim Aufstehen.

EXTREMITÄTEN

- Kalter Handschweiß (Ant-t., Cham., Ipec., Tub.).
- Konvulsionen der Streckmuskulatur.
- Die unteren Extremitäten sind gebeugt oder werden in Richtung des Abdomens gezogen (Cupr., Hyos., Plb.).
- Spastische Muskel- und Sehnenkontraktionen der Hände und Finger.
- Wirft den Arm von einer Seite zur anderen; der linke Fuß ist in dauernder, krampfartiger Bewegung.

SCHLAF

- Babys, die nur schlafen können, wenn sie die ganze Nacht geschaukelt werden (Carc, Stict).
- Bettnässen im ersten Schlaf (Sep.).
- Im Schlaf: Kaubewegungen (Bry., Calc., Zinc.), gefolgt von Schlucken; Zähneknirschen (Bell., Tub.), Schluckauf, Rucken und Zucken der Glieder (Cupr., Zinc.), Treten (Bell., Sulph., Tub.), Ruhelosigkeit und Herumwerfen, Reden.
- Schlaflosigkeit durch Hunger (Chin., Lyc., Phos.) oder durch Bauchbeschwerden.
- Das Kind erwacht ganz plötzlich aus dem Schlaf wie aus einem Albtraum.
- Schläft in Knie-Ellenbogen-Lage, das Gesicht ins Kissen gepresst.
- Untersuchungsergebnis:
 - Rollen der Augäpfel im Schlaf.

FIEBER

- Beschwerden durch: Zorn, Zahnung, Sommer, Wurmbefall (Acon., Merc.).
- Vor dem Fieber: Verstärkter Appetit, Übelkeit.
- Frost:
 - Aufsteigende Kälte, beginnend in der Brust (Apis, Sep); begleitet von kaltem, feuchtem Schweiß auf der Stirn, Durchfall (Ipec., Phos.), geblähtem Bauch, Zittern und Schütteln der Glieder mit Gänsehaut und Verlangen nach Wärme, die nicht erleichtert.
- Hitze:
 - Trockene, brennende Hitze, schlimmer nachts im Schlaf, wird am stärksten im Gesicht (Merc., Sulph.), dem Kopf, den Händen und

Füßen empfunden - kann auch einseitig auftreten, entweder auf der linken Seite, der Vorderseite des Körpers oder der oberen Körperhälfte; begleitet von Bauchschmerzen, Angst (Phos., Spong.), galligem Erbrechen, sauberer Zunge, kaltem, bleichem Gesicht mit warmen Händen und bläulicher Färbung um die Augen herum, mit Husten, Delirium, Durchfall, erweiterten Pupillen, Atemnot, extremem Durst oder absoluter Durstlosigkeit, Kopfschmerzen, gesteigertem Appetit (Ars., Bry.), Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Niesen und dem Bedürfnis nach Ausstrecken der Glieder.

- Schweiß:
 - Kalter, saurer Schweiß, besonders auf der Stirn oder am Oberkörper, im Gesicht und an den Händen, schlimmer während des Schlafes. Auf den Schweiß folgen Erbrechen und Heißhunger.
- Nach Fieber: Gesteigerter Appetit (Chin.).

HAUT

- Jucken der trockenen Haut, gebessert durch Kratzen (Anac.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ikterus.
 - Warzen.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Zorn, **Bestrafung oder Zurechtweisung** (Agar., Cham., Cupr., Ign.); Zahnung, Fieber; Schreck; Blutung; Berührung; **Wurmbefall** (Indg., Santin.).
- Vor Konvulsionen: Kalte Füße, Husten, Kopfschmerzen, Schreien.
- Bei Konvulsionen: Stockende Atmung (Cic., Stry.), Husten, erweiterte Pupillen (Bell.), **Schaum vor dem Mund** (Art-v., Hyos.), glasige Augen, gurgelnde Geräusche aus dem Hals, Schreien und steife Extremitäten.
- Nach Konvulsionen: Kopfschmerzen (Bufo, Caust.).

ALLGEMEINES

- **Periodizität** der Beschwerden.
- Beschwerden durch Masturbation (Con., Staph.) oder nach Masern (Carbo-veg.).
- Chorea durch Masturbation (Calc.) oder Wurmbefall (Spig.).
- Die meisten Beschwerden sind nachts schlimmer, besonders von 2-5 Uhr (Aloe, Kali-c.), im Sommer (Nat-c.), zu Anfang der Bewegung, bei Neumond (Nux-v.) oder Vollmond (Alum., Puls.); besser in warmer Luft und durch fortgesetzte Bewegung.

HERKUNFT

- Synonym: *Artemisia maritima*, Zitwerblüte. Familie der Korbblütler (Asteraceae/Compositae).

CINNABARIS

(Zinnober - Cinnb.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Viele Symptome sind ähnlich wie bei Merc.
- ▶ Wiederkehrende Katarrhe der Nase und Nasennebenhöhlen.
- ▶ Die Nasenabsonderungen sind blutig, dunkel, wund machend, eitrig, dick und gelb.
- ▶ Dickes Sekret, das von den Nasennebenhöhlen in den Rachen herunterhängt.
- ▶ Wiederkehrende Sinusitis besonders der Stirnhöhlen mit Schmerzen an der Nasenwurzel.
- ▶ Weiß verfärbte Zunge; schaumiger, dicker Speichel mit fauligem Geschmack im Mund.
- ▶ Ein wertvolles Mittel für **chronische folliculäre Halsentzündungen** bei Kindern, wenn dicker Schleim aus den Nasennebenhöhlen gezogen wird.
- ▶ Streptokokken-Infektion im Hals, die Schmerzen sind nachts und beim Leer schlucken schlimmer.
- ▶ Ein gutes Mittel für die Austreibung von **Bandwürmern**.
- ▶ Phimose mit Schwierigkeiten beim Wasserlassen.

HERKUNFT

- Cinnabaris ist rotes Quecksilbersulfid.

Coccus CACTI
(Echte Kochenille-Laus - Coc-c.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Heftige Reizung und Kongestion der Schleimhäute im Rachen, in der Rachenhöhle, im Hals, Kehlkopf und in den Bronchien.
- ▶ Dicker, weißer oder gelber Fließschnupfen mit Juckreiz und Verstopfung der Nase und ständigem Niesen.
- ▶ Reizhusten schon durch Zähneputzen oder Ausspülen des Mundes.
- ▶ Permanentes kratziges Gefühl durch das verlängerte Zäpfchen.
- ▶ Der Rachen ist äußerst empfindlich auf Berührung durch Flüssigkeiten oder feste Speisen.
- ▶ Virusbedingter Husten, allergischer Husten oder Keuchhusten; im Grunde genommen Husten jeglicher Art.
- ▶ Gleich morgens beim Aufwachen krampfartiger, rasselnder, erstickender Husten. Hustenkrampf in der Nacht besonders vor und nach Mitternacht oder Husten im Schlaf. Husten schlimmer in verrauchten Zimmern. Meistens endet der Husten damit, dass klarer, zäher Schleim erbrochen wird. Trinken von kaltem Wasser oder Frühstücken bessert.
- ▶ In rauchiger Luft beginnt das Kind zu husten.
- ▶ Launischer Appetit.
- ▶ Wichtiges Mittel bei Mumps.

HERKUNFT

- Coccus cacti wird aus der Schildlaus *Dactylopius coccus cacti* gewonnen, welche auf Opuntienarten Südamerikas heimisch ist.

COFFEA CRUDA

(Kaffee - Coff.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Gewissenhafte Kinder; sie haben starke Schuldgefühle, wenn etwas schief geht.
- ▶ Voller Ideen und schnell im Handeln; sie können deshalb nicht entspannen und schlafen schlecht.
- ▶ Hohe Aktivität von Geist und Körper mit scharfem Intellekt, was sie sehr kreativ macht (Chin., Med., Phos., Sulph., Tub.). Die Kinder werden von ihren Eltern oft als rastlos und unermüdlich beschrieben (Lach., Med.).
- ▶ Das Wesen der Kinder ist mild, passiv und verfeinert; sie sind leicht unterdrückbar (Staph.).
- ▶ Hastig beim Essen und Trinken (Hep.).
- ▶ Unsichere Kinder mit schwacher Willenskraft.
- ▶ Phänomenales Gedächtnis, kann lange Gedichte aufsagen und sich Tabellen, Logarithmen und chemische und physikalische Formeln rasch einprägen.

KÖRPER

- ▶ Überempfindlich gegen alle Reize, ähnlich wie Cham, und Op.
- ▶ Schmerzen werden intensiv empfunden; sie erscheinen fast unerträglich und treiben das Kind zur Verzweiflung; es wird so ruhelos, dass es gequält aussieht (auch an Cham, denken).
- ▶ Große, schlanke Kinder mit schlechter Haltung und dunklem Teint.

Beim Studium von Coffea sollte man immer an Acon. und Cham, denken. Coff. gehört zur Familie der Rubiaceae wie Chin, und Ipec. und muss mit ihnen verglichen werden.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Fröhlich und lebhaft, selbst bei Fieber.**
- **Die Kinder lieben den Aufenthalt im Dunkeln.**
- **Klammern.**
- **Gedächtnis aktiv bis Mitternacht.**
- **Stöhnen und Schreien** vor Schmerz, bei Fieber oder im Schlaf.
- Launisch.
- Ärgern sich über Mitleid.
- Entweder sehr redselig oder einsilbig.

- Exzessives Weinen, praktisch ohne Schlaf, bei Neugeborenen.
- Exzessives Heulen und Schreien wegen Kleinigkeiten.
- Extrem fleißige und kreative Kinder, die sehr hart für ihren Erfolg arbeiten, damit sie in der Gruppe akzeptiert werden.
- Furcht vor Schmerz.
- Leicht zu beeindrucken.
- Er sagt, ihm gehe es gut, obwohl er in Wirklichkeit sehr krank ist.
- Neigung, durch plötzliche Emotionen in Ohnmacht zu fallen.
- Wirft im Zorn mit Gegenständen.
- Weint bei Schmerz oder Freude.
- Witzig.

KOPF

- **Kopfschmerzen**, verschlimmert durch geistige Anstrengung, **Überessen**, **geringste Geräusche**, sogar durch das Geräusch von Schritten oder beim Denken oder Sprechen.
- **Migräne bei überaktiven und intelligenten Kindern.**
- Untersuchungsergebnis:
 - Hirnblutungen.

AUGEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Erweiterte Pupillen.**
 - Leuchtende und strahlende Augen.

OHREN

- **Abneigung gegen Geräusche; sie verursachen ihm Schmerzen.**
- Sehr scharfes Gehör.

NASE

- Sehr feiner Geruchssinn.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Eine Wange heiß und rot, besonders bei Fieber, Schmerz oder jeder Form von Aufregung.**
 - **Leuchtend rotes Gesicht bei hohem Fieber** (auch an Op. denken).
 - Bläuliche Verfärbung durch Stimmritzenkrampf.
 - Schweiß auf der Oberlippe.

MUND

- **Schwierige Zahnung.**
- **Zähneknirschen.**
- Die Zahnschmerzen werden **durch warmes Essen und Trinken verschlechtert** und **durch eiskaltes Wasser im Mund gebessert.**
- Sehr feines Geschmacksempfinden.
- Zusammenbeißen der Zähne bessert die Beschwerden.
- Nächtliche Trockenheit des Mundes mit Durstlosigkeit.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Früher Verfall und Karies der Zähne.
 - Hastige Sprache.

HALS

- Schluckzwang durch Kloßgefühl im Hals.
- Halsweh.
- Untersuchungsergebnis:
 - Verlängertes, rotes, entzündetes Zäpfchen.

MAGEN

- **Andauernde Übelkeit bei Kopfschmerzen.**
- **Starker Hunger**, besonders vor den Mahlzeiten.
- **Erhöhter Durst, besonders nachts oder bei Fieber.**
- **Verdauungsstörungen bei Kleinkindern.**
- Galliges Erbrechen.
- Schluckauf.
- Heftiges, saures und krampfhaftes Aufstoßen.
- Abneigung: Kaffee.

ABDOMEN

- **Extreme Berührungsempfindlichkeit, selbst durch Kleidung, besonders während einer Kolik.**
- Kind krümmt sich und weint bei Kolik.
- Eingeklemmte Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufgeblähter Bauch.
 - Eingeklemmte Hernie.

REKTUM

- **Wässriger und schmerzloser Durchfall nach Emotionen wie Zorn, Schreck und Freude.**
- Zahnungsdurchfall.
- Nächtliches Jucken am After.
- Abgang stinkender Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundheit um den After.
 - Spastische Kontraktionen des Sphinkters.
 - Stuhl: Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Harnverhaltung.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: vermindertes spezifisches Gewicht und Glukose +.

GENITALIEN

- Neigung zu masturbieren.
- Wollüstiges Jucken der Genitalien.

KEHLKOPF

- Laryngismus stridulus (Stimmritzenkrampf).
- Raue oder heisere Stimme beim Erwachen am Morgen.
- Virale Laryngitis.

ATMUNG

- Allergisches Bronchialasthma.
- Asthma nach Emotionen bei nervösen Kindern.
- Die Atmung neigt dazu, beim Husten zu stocken.

HUSTEN

- **Dauernder, trockener, hackender und krampfhafter Husten in kurzen Anfällen nach Masern**, beim Einatmen und im Freien.
- **Muss sich beim Husten zusammenkrümmen.**
- Erschöpfung durch Husten.

BRUST

- Untersuchungsergebnis:
 - Röntgen: Pneumonisches Infiltrat.

HERZ UND KREISLAUF

- Untersuchungsergebnis:
 - Schneller, voller, schnellender Puls.

RÜCKEN

- Nachtschweiß am Rücken.

EXTREMITÄTEN

- Kalter feuchter Schweiß der Hände beim Schreiben.
- Zucken und choreatische Bewegungen der Glieder, besonders der Arme.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kälte der Glieder.
 - Konvulsionen oder Kontraktionen der Fingersehnen.
 - Wundheit zwischen den Oberschenkeln und an den Füßen durch Schweiß.
 - Neigung, beim Gehen die Knie aneinander zu schlagen.
 - Zittern der Hände beim Ausstrecken oder Schreiben.

SCHLAF

- Ruheloser Schlaf oder absolute Schlaflosigkeit bei Neugeborenen.
- Der Schlaf wird durch das leiseste Geräusch gestört.
- Schlaflosigkeit nach Aufregung.
- Schlaflosigkeit nach Masern.

FIEBER

- Fieber mit Schüttelfrost, besonders beim Aufenthalt im Freien.
- Innere Kälte bei äußerlicher Hitze einer Gesichtshälfte und einer Körperseite.
- Verstärkter Durst, Stöhnen, Schreien und Seufzen mit heißer und leuchtend roter Gesichtsfarbe bei Temperaturanstieg.
- Fieber nach Trauma.

HAUT

- Sehr empfindlich gegen Berührung und Druck der Kleidung.
- Starker Juckreiz; kratzt die Stellen, bis sie wund werden und bluten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Windpocken.
 - Masern.
 - Purpura miliaris.
 - Röteln.
 - Scharlachausschlag.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Zahnung, Aufregung und exzessives Spielen oder Lachen.
- Konvulsionen und Spasmen, die durch jede Bewegung verschlimmert werden.

ALLGEMEINES

- Abneigung gegen und Verschlimmerung durch Aufenthalt im Freien.
- Hypovolämischer Schock nach Verletzung.
- Neuritis.
- Überempfindlichkeit gegen oder üble Folgen von Antibiotika, Antiepileptika oder Ritalin.
- Zittern am ganzen Körper vor Freude oder Schreck.

HERKUNFT

- Synonym: *Coffea arabica*, Kaffeebaum. Familie der Rötegewächse (Rubiaceae).

COLIBACILLINUM

(Kolibakterien - Coli.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ *Escherichia coli* (abgekürzt *E. coli*) hilft gut bei Kindern mit wiederkehrenden Infektionen der Niere und Blase.
- ▶ Meistens sind die Schließmuskeln oder angeborene Missbildungen im Harnsystem die Ursache für die häufigen und chronischen Blasenentzündungen.
- ▶ Der Urin ist trübe, angreifend und enthält zu viele Bakterien.
- ▶ Wurmbefall begleitet von Entzündungen des Harntraktes.
- ▶ Wenig Appetit.
- ▶ Verlangen nach Milchprodukten und Eiern.
- ▶ Das Kind neigt zu wiederkehrendem Durchfall.
- ▶ Viel Tuberkulose in der eigenen Vorgeschichte und in der Familienanamnese.

COPAIVA OFFICINALIS

(Copaivabalsam - Cop.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Wirkungsbereich sind die Schleimhäute des Harnsystems und der Atmungsorgane.
 - ▶ Ständiges Nasenbohren.
 - ▶ Das Kind ist sehr anfällig für Infektionen des Harntraktes meist infolge eines geschwächten Immunsystems. Wiederkehrende akute oder chronische Blasenentzündungen.
 - ▶ Schmerzhaftes Harnverhalten durch Erkältung, kaltes Essen oder Trinken oder bei kaltem Wetter.
 - ▶ Häufiges Urinieren bei kaltem und nassem Wetter.
 - ▶ Ausgeprägtes Verlangen nach kaltem Wasser und Zwiebeln.
-
- ▶ Urtikaria begleitet von Fieber, Verstopfung oder Verdauungsstörungen, schlimmer nachts.

HERKUNFT

- Dieser Baum aus Südamerika gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler (Leguminosae).

CORALLIUM RUBRUM

(Edelkoralle - Cor.-r.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Trockener Schnupfen, die Nase fühlt sich verstopft an, trockene Nase mit Schleim hauptsächlich in den Nasennebenhöhlen.
- ▶ Rissige Lippen.
- ▶ Auch ein sehr gutes Mittel bei **Glottiskrampf**.
- ▶ Dr. Guernsey sagt, der Husten hört sich an wie eine einminütige Gewehrsalve.
- ▶ Der Husten ist so gewaltsam, dass das Kind die Puste verliert und das Gesicht sich purpurrot, dunkel und schwarz verfärbt.
- ▶ Der Husten beginnt mit keuchender Atmung und geht dann in wiederholtes krächzendes Einatmen über, bis das Kind völlig erschöpft ist. Dann erfolgt jede Menge Auswurf von hartnäckigem, klebrigem und zähem Schleim. Selten Nasenbluten durch das anhaltende Husten.
- ▶ Husten nachts oder morgens. Bellender Krupphusten, die Anfälle erfolgen sehr schnell hintereinander und sind sehr kurz.
- ▶ Krampfhafter Husten und Keuchhusten.
- ▶ Husten bei jeder Art von Wetterwechsel.
- ▶ Kein homöopathisches Mittel kann solch **gewaltsame Hustenanfälle** hervorrufen außer Cupr. und Pert.
- ▶ Verlangen nach saurem und salzigem Essen.
- ▶ Die meisten der Symptome sind schlimmer nach dem Abendessen, nachts und an der frischen Luft; Einhüllen bessert.
- ▶ Das Kind deckt nachts beim Schlafen den Kopf zu.

HERKUNFT

- Wird landläufig auch „Rote Koralle“ genannt.

CROTALUS CASCAVELLA

(Brasilianische Klapperschlange - Crot-c.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Beschwerden durch unterdrückten Ärger mit Wutanfällen
- ▶ **Nasenbluten, während dem Schlaf, hellrot und wässrig** (Ail., Croc., Ferr-ars., Kali-i., Nit-ac., Psor.)
- ▶ Ehrgeizig
- ▶ Pflichtbewusst, aber egoistisch und hochmütig
- ▶ Wach, aufmerksam und neugierig
- ▶ Beschwerden **nach Impfung**
- ▶ Kann keine enge Kleidung vertragen (Schlangen allgemein, Calc., Nux-v. and Spong.)
- ▶ Großer Appetit, vergeht jedoch beim Anblick von Essen. (Sil)

CUPRUM METALLICUM

(Kupfer - Cupr.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Ehrgeizig (Nux-v., Verat.); will der Beste sein.
- ▶ Kann Zuneigung nur schwer zeigen (Nat-m., Sep.), zu **verkrampft** und verklemmt.
- ▶ Vorsichtig (Ign.) und übergenu in allem.
- ▶ Diktatorische Haltung; liebt es, andere zu kontrollieren (Lach., Merc.) z. B. Freunde, Klassenkameraden und Geschwister.
- ▶ Erschrickt leicht (Arg-n., Nat-c.), wenn sich jemand nähert, wenn im Haus plötzlich das Licht ausgeht, wenn ein Hund bellt.
- ▶ Quengelige Kinder (Cham., Cina), die nicht wissen, was sie wollen; ihre Wünsche und Forderungen wechseln ständig; niemals zufrieden.
- ▶ Strebertypen, die sich durchsetzen; haben viele Aktivitäten am Laufen, sind dabei aber gut organisiert.
- ▶ Unabhängige Kinder (Nux-v.), die nicht gern um Hilfe bitten (egoistisch).
- ▶ Übernimmt gern die Führung (Caust., Lyc.) und trägt Verantwortung.
- ▶ Ausdauernd (Ferr., Sil.); sehr zielstrebig; gibt niemals auf.
- ▶ Gegensätzliches Verhalten: Raffiniert und boshaft oder still und schüchtern; nachgiebig oder dickköpfig; das führt zu emotionaler Instabilität.
- ▶ Reservierte, ernst dreinblickende Kinder, die sich mit ihrem zerbrechlichen Ich und ihren verletzten Gefühlen oft selbst blockieren.
- ▶ Verantwortungsbewusste und gewissenhafte Kinder, die auch von anderen Kindern dasselbe erwarten.
- ▶ Stottern nach Schreck.
- ▶ Zugeknöpft und verschwiegen bis zur Heimlichtuerei (Bar-c., Lyc., Ign.), kann unerbittlich und verbissen sein.

KÖRPER

- ▶ Ein Universalmittel bei Cholera (Dr. Clapton schrieb, dass Arbeiter in Kupferfabriken stets von der Cholera verschont blieben, obwohl die ganze Nachbarschaft schwer krank war); auch hilfreich bei Rotavirus- Infektionen von Neugeborenen und Kleinkindern; ebenso wichtig bei Sepsis durch E. coli oder andere gram-negative Keime.
- ▶ Eisige Kälte (Camph., Carbo-veg., Laur., Phos., See., Verat.), kalter Schweiß, kalter Atem und Kollaps (Zusammenbruch der Vitalität) (Ars., Carbo-veg., Hydr-ac., Laur., Op., See., Verat.).
- ▶ Neigung zu Spasmen und Muskelkrämpfen in den Fingern (geballte Fäustchen) und Extremitäten, in der Kehle (Sprechen und Schlucken blockiert) und mit eingeschlagenen Daumen (umgekehrt zu See.).
- ▶ Neurologische Beschwerden, die durch Schreck (Carc., Op., Stram.) oder durch sexuellen Missbrauch (Ph-ac., Staph.) entstanden sind.

- ▶ Körperliche Beschwerden wie Konvulsionen und Verhaltensstörungen in Folge von unterdrückten Hautausschlägen (Bry., Zinc.) und unterdrücktem Schweiß, besonders Fußschweiß (Bar-c., Zinc.).
- ▶ Sensible Kinder (Ign., Phos., Puls.), die emotional und körperlich empfindlich sind, z. B. empfindliche Haut, empfindliche Verdauung; empfindliche Naturen. Überreaktion auf alles mögliche, z. B. ist schon die kleinste, mildeste und einfachste Arzneimitteldosis zu viel und verschlechtert alles. Bei solchen Babys kann Cupr. die Empfindlichkeit mildern und dann können gut gewählte Arzneimittel über längere Zeiträume heilend wirken (Kent).
- ▶ Neurologische Beschwerden oder Verhaltensauffälligkeiten treten episodisch auf (Periodizität).
- ▶ Viele Symptome sind typischerweise heftig, z. B. Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, Krämpfe, Konvulsionen etc.
- ▶ Beim Stillen oder Trinken hört man ein gurgelndes Geräusch im Hals, das die Speiseröhre hinuntergluckert (Ars., Cina, Hell., Hydr-ac., Laur.).
- ▶ Cupr.-Kinder sind nervlich bis aufs Äußerste gespannt.
- ▶ Sehr fröstelig, aber Durst auf kaltes Wasser (Phos.).
- ▶ Alle fünf Sinne sind geschärft und höchst empfindlich (Cham., Chin., Coff.).
- ▶ Züngelt wie eine Schlange (Lach.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch emotionale Aufregung oder durch **Schreck**.
- **Ängstliche Beklemmung nach Schreck** (Carc., Verat.) mit rotem Gesicht, besonders nachts.
- **Aphasie durch Schreck** (Hyos.).
- **Abneigung gegen Berührung oder Liebkosungen**.
- Macht sich steif und tritt, **wenn er getragten wird**.
- Furcht vor **Berührung**, Dunkelheit, **Hunden**, Abwärtsbewegung, Räubern, Spinnen, vor **Fremden**, Gewitter und Wasser.
- Fürchtet zu versagen und leidet daher unter enormer **Erwartungsspannung** vor Prüfungen; braucht dauernde Bestätigung, dass er es gut schaffen wird.
- **Albernes Benehmen**; reißt **Possen** (Bell.), macht **lächerliche Gesten** und merkwürdige Grimassen, die er hinter der Hand zu verbergen versucht.
- Von Natur aus **stachelt er gerne auf** (Hyos.) und ärgert besonders gern Tiere.
- **Rennt dauernd herum** (Stram., Verat.); kann überhaupt nicht auf einem Platz sitzen bleiben, selbst wenn es Zeit zum Schlafen ist; sehr schwierig, ihn im Bett zu halten; wirft sich ruhelos herum.
- Neigung, **Späße zu machen und andere zu ärgern**.
- **Nachahmen** (Stram.) der Lehrer und anderer Kinder in der Klasse.
- Entwicklungsstillstand bei Kindern.

- Am anderen Ende des Spektrums sehen wir scheue, milde, schüchterne Kinder, die nicht vor der Klasse sprechen oder zu Partys gehen können.
- Hinterlistige (Lach.), durchtriebene und boshafte (Cann-i.) Kinder.
- Schmutzige Kinder; koten auf den Boden (Sep.).
- Impulsiv.
- Das Kleinkind spuckt gewöhnlich den Schnuller aus oder beißt, wenn es zornig ist.
- Liebt Pflanzen.
- Musik erleichtert.
- Krampfhaftes, übermäßiges Lachen.
- Klammert sich gerne an die Mutter, wenn es getragen wird, weil es zu fallen fürchtet (Borx.).
- Weint bei der geringsten Gemütsbewegung.

WUTANFÄLLE

- Abneigung gegen Berührung.
- Beißen.
- Will getragen werden.
- Klammern: Das Kind hält sich ganz fest an der Mutter.
- Versteckt sich.
- Heulen.
- Untröstlich.
- Frech.
- Eigensinnig, dickköpfig.
- Zieht an den Haaren (seinen eigenen oder von anderen).
- Raserei mit Gewalttätigkeit.
- Schreien.
- Spuckt anderen Leuten ins Gesicht.
- Schlägt um sich nach imaginären Objekten.
- Schlagen mit Raserei.
- Zerreißt Dinge.
- Wildheit.

KOPF

- **Bohrt** seinen Kopf in das Kopfkissen (Apis, Bell., Hell., Stram., Tarent., Tub.).
- **Unterdrückte Hautausschläge** (atopisches Ekzem, Kontaktallergie, Impetigo, Molluscum contagiosum [Dellwarzen], Skabies) **führen zu entzündlichen Erkrankungen des Gehirns** (Enzephalitis) **und der Hirnhäute** (Meningitis) (Cupr-act., Zinc.).
- Heftige Kopfschmerzen, besonders zwischen den Augen über der Nasenwurzel; begleitet von Übelkeit und Erbrechen; schlimmer durch Schreck, beim Husten oder durch Druck; besser durch warmes Einhüllen (Mag-p.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akuter Hydrozephalus mit Meningitis.
 - Kann den Kopf nicht aufrecht halten.
 - Kalter Schweiß auf der Stirn.
 - Konvulsivische Bewegungen des Kopfes, Kopffrollen oder -herumwerfen.

- Kopf nach hinten gezogen (Cic., Hyos., Stram.).
- Kernig-Zeichen ++.
- MRT [Kernspintomographie]: Hirnblutungen, Hydrozephalus.
- Zieht an den Haaren.

AUGEN

- **Tränenfluss mit Husten** (Nat-m., Puls.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Ständige Bewegung der Augäpfel**, sogar unter geschlossenen Lidern.
 - Lähmung des **oberen schrägen Augenmuskels** (Arn., Seneg.).
 - Entzündung des Tränensacks.
 - Erweiterte Pupillen, die lichtunempfindlich sind.
 - Augen nach oben gerollt (Bufo., Laur.).
 - Nystagmus mit unwillkürlichen pendelartigen Bewegungen des Augapfels, von einer Seite zur anderen.
 - Pupillen reagieren nicht auf Licht.
 - Starrende, glänzende, glitzernde oder glasige Augen mit wildem Blick.
 - Gerstenkorn.
 - Eingesunkene Augen.
 - Zucken der Lider.

NASE

- Katarrh erstreckt sich bis zu den Stirnhöhlen (Lyc., Merc.).
- Nasenbluten mit dunklem, schwarzem Blut, besonders aus dem rechten Nasenloch, beim Naseputzen.
- Häufiges Niesen mit reichlichem, übelriechendem, wässrigem Schnupfen.
- Schniefen und Verstopfung mit wässrigen Absonderungen aus der Nase.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Fächelnde Bewegungen der Nasenflügel (Chel., Spong.).
 - Spitze Nase (Verat.).

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Zyanotisches Gesicht** mit bläulicher Verfärbung um den Mund (Carbo- veg., Lach., Verat.).
 - **Hippokratisches Gesicht** (Aeth., See.) mit ängstlichem, gequältem, erschrecktem, spitzem, krankem Ausdruck und bläulicher Färbung um die Augen.
 - Kaubewegungen (Bell., Hell.).
 - Zusammengepresste Kiefer (Glon., Op.).
 - Rissige Lippen.
 - Dunkles oder bläulich-rotes Gesicht im Zorn oder bei Husten oder Konvulsionen.
 - Verzerrung der Gesichtsmuskulatur.
 - Hochrotes Gesicht (Phos., Sulph.).
 - Bleiches, eingefallenes Gesicht.
 - Glänzendes mit eiskaltem Schweiß bedecktes Gesicht

MUND

- **Schwierige Zahnung.**
- Beißt beim Füttern in das Glas.
- Hat Schwierigkeiten zu sprechen durch Chorea oder Spasmen in Hals oder Zunge.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dauerndes **Knirschen** (Apis, Ars., Bell., Cina) oder Zusammenbeißen der Zähne.
 - **Bewegt** die herausgestreckte **Zunge hin und her** oder züngelt wie eine Schlange (Lach., Merc., Vip.).
 - Trockene, rissige Zunge mit vergrößerten, aufgerichteten Papillen, weißem Belag in der Mitte und roten Seiten.
 - Schaum vor dem Mund.
 - Zahnfleisch rot, empfindlich und zurückgehend.
 - Stottern.

HALS

- **Spasmen der Speiseröhre bringen das Kind zum Würgen beim Schlucken von Flüssigkeiten**, die aus der Nase wieder herauslaufen.
- Linksseitige Beschwerden von Hals und Mandeln, besser durch warme Getränke (Ars., Lyc., Hep.).
- Rezidivierende Tonsillitis mit Tendenz zu Verhärtung und Eiterung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Man hört im Hals **gurgelnde Geräusche**, besonders beim **Schlucken von Flüssigkeiten**.
 - Rotes Zäpfchen.
 - Torticollis mit nach rechts gezogenem Kopf.

MAGEN

- **Häufiger Durst auf kleine Mengen kalten Wassers.**
- Plötzliche Übelkeit, **Erbrechen** mit Schluckauf und Würgen, durch Rotavirus-Infektion, sofort nach dem Essen, mit gleichzeitigem Stuhldrang; **besser durch Trinken von kaltem Wasser** (Bry., Phos., Puls.).
- Gierig beim Essen und Trinken (Hyos.).
- Reiswasserartiges oder grünes, galliges Erbrochenes mit widerlichem Geruch.
- Langsame Verdauung.
- Heftige krampfende und schneidende Schmerzen im Epigastrium, in den Rücken ausstrahlend, mit tödlichem Gefühl unter dem Brustbein und Übelkeit; schlimmer durch Berührung oder nach Milch; besser durch festes Bandagieren des Abdomens.
- Verschlimmerung: Bohnen, Brot, Kohl, kalte Speisen, Fett, blähende Speisen, **Milch**, Erbsen.
- Abneigung: Kartoffeln (besonders gekochte).
- Verlangen: Kalte Getränke, kalte Speisen, kaltes Wasser, Delikatessen, warme und dampfend heiße Getränke, **warme und dampfend heiße Speisen**.

ABDOMEN

- **Kolik bei Kleinkindern** durch jeden Schreck, Zorn, Erregung; schlimmer durch

- Periodische heftige, krampfartige Schmerzen im Abdomen bei Säuglingen und Kleinkindern nach Stillen oder Essen von Gemüse, vor und nach Stuhlgang oder Erbrechen, bei Bewegung (während des Gehens) oder durch Berührung des Bauches; **besser durch Hinlegen** (besonders auf den Bauch), **lokale Wärmeanwendung** oder Bandagieren des Körperteils, Zusammenkrümmen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Übermäßig heiß und berührungsempfindlich.
 - Intussuszeption (Darmverschlingung) (Op., Plb., Verat.).
 - Tympanitische Auftreibung des Abdomens.

REKTUM

- Durchfall nach Gemüse, **während Zahnung**, bei warmem Wetter, begleitet von Übelkeit, Erbrechen und Gliederkrämpfen.
- Durchfall abwechselnd mit Verstopfung.
- Reisswasserartige Stühle mit Flocken, häufig aber **nicht sehr reichlich** oder grünlich-schwarze wässrige Stühle bei Cholera, mit heftigen Krämpfen und Schluckauf.

CHOLERA UND GASTROENTERITIS

- **Übermäßiger Durst.**
- **Reichliche Ausscheidungen** aus Magen (Erbrechen) und Darm (Durchfall).
- Das Kind **fröstelt** sehr und braucht daher eine Menge Decken und Kleidung, um es warm zu halten (Gegenteil von Camph.).
- Ständiges Unbehagen.
- Verlangen nach warmen Speisen und Getränken.
- Trinken von kaltem Wasser bessert das Erbrechen.
- Ruheloses Herumwerfen.
- Schwache Muskelzuckungen.
- Kalte Zungenspitze.
- Heftige Krämpfe im Abdomen und der Wadenmuskulatur als Folge von Hyponatriämie.
- Heftiges Erbrechen von Galle und Wasser mit schwerer Kolik in Magen und Abdomen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Große Erschöpfung.
 - Blaufärbung um die Fingernägel.
 - Dehydratation von Grad I bis Grad III.
 - Niedriger Blutdruck.
 - Hypovolämischer Schock.
 - Intensive Kälte des Körpers mit kaltem Schweiß.
 - Fleckige, marmorierte und dunkle Haut.
 - Feuchte Haut.
 - Spastische Verzerrung des Gesichtes.
 - Stuhl: Eiter +, Erythrocyten +, Madenwürmer und Bandwurmsegmente.
 - Eingesunkene, tiefliegende Augen.
 - Tachykardie.
 - Tachypnoe.

DIFFERENTIALDIAGNOSE BEI MAGEN-DARM-BESCHWERDEN

CUPRUM METALLICUM	CAMPORA OFFICINALIS	VERATRUM ALBUM
—	Schweiß am After.	Reichlicher Schweiß.
—	Aszites.	—
Gallenleiden.	—	Gallenleiden.
—	Kalte Extremitäten.	Kalte Extremitäten.
—	Kalte Stirn.	Kalter Scheitel.
Kalter Schweiß auf der Stirn.	—	Kalter Schweiß auf der Stirn.
Krämpfe ++.	Wenig Krämpfe.	Wenig Krämpfe.
Tödliche Übelkeit.	Tödliche Übelkeit.	—
Auftreibung des Abdomens.	—	Auftreibung des Abdomens.
—	Schock tritt leicht ein.	—
—	Frühzeitige Harnverhaltung.	—
Hartes Abdomen.	—	Hartes Abdomen.
Schluckauf.	—	Schluckauf.
—	—	Unwillkürlicher Stuhl beim Abgang von Blähungen.
Wenig Durst.	Extremer Durst.	Extremer Durst auf große Mengen in langen Abständen.
Madenwürmer.	—	Spulwürmer.
—	—	Heißhunger mit Durchfall.
Würgen bei Durchfall.	—	—
Magen, Kleidung stört.	—	—
Stuhl: - Dunkel - Flockig - Mit Druck - Grün - Übelriechend.	—	Stuhl: - Dunkel - Flockig - Mit Druck - Grün - Übelriechend.
Erbrechen: - Kaffeesatz - Fäkal - Heftig - Schaumig und grünlich - Übelriechend - Reiswasserartig.	—	Erbrechen: - Fäkal - Heftig - Schaumig und grünlich - Übelriechend - Reiswasserartig.
Erbrechen während Durchfall.	—	Erbrechen während Durchfall.

HARNWEGE

- Harnverhalten infolge eines hypovolämischen Schocks (Camph., Op., See., Verat.) oder infolge angeborener Anomalien oder angeborener subpelviner Ureterstenose durch angeborene Nierenabgangsenge.
- Akutes Nierenversagen.
- Reichlicher wolkiger oder dunkelroter, übelriechender Urin bei den meisten Beschwerden (Kopfschmerz, Erbrechen, Epilepsie).
- Unwillkürlicher, häufiger, nächtlicher Urinabgang.
- Schmerzhaftes Harnverhalten bei Cholera.
- Nützlich bei Kindern mit einer deutlichen Vorgeschichte oder Familiengeschichte von Nierensteinen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Urin: Albumin ++, Erythrozyten ++, Zucker ++.
 - Urin hinterlässt ein übelriechendes, rötliches Sediment in der Windel, das schwierig auszuwaschen ist.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Hodenretention (Aur.).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heisere, raue, brüchige Stimme beim Weinen, Vorlesen oder lauten Singen oder durch trockene, kalte Luft; verhindert das Sprechen.
- Zusammenschnürung des Kehlkopfs beim Husten.
- Laryngismus stridulus, schlimmer beim Versuch zu schlucken.
- Stimmritzenkrämpfe (Brom., Chlor.).

ATMUNG

- Atemnot nach **plötzlichen Emotionen** (Zorn, Aufregung, Schreck, Ärger), durch Lachen, bei feuchtem Wetter, beim Gehen gegen den Wind oder Rennen; schlimmer nach Mitternacht und **besser durch Rückwärtsbiegen oder tiefes Atemholen**; kann während des Anfalls kein Taschentuch vor dem Gesicht ertragen.
- **Stockender Atem bei Husten oder Weinen.**
- Plötzliche Anfälle von spastischem Asthma nach Gefühlserregung, kalter Luft oder kaltem Wind, unterdrückten Hautausschlägen; **schlimmer nach Mitternacht (3-4 Uhr)** mit bläulicher Gesichtsfarbe.
- Asthma abwechselnd mit Hautausschlägen (besonders Ekzemen).
- Hyperventilationssyndrom aufgrund von Hirnschädigungen.
- Häufiges Verlangen, tief Atem zu holen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krampfartige, unregelmäßige, ruckweise Atmung, **schnappt nach Luft während dem Husten.**
 - **Keuchen** mit langsamer Einatmung.
 - Cheyne-Stokes-Atmung.
 - Kälte des Atems.
 - Hyperventilation.
 - Rasselnde, krächzende Atmung.
 - Seufzende Atmung.

HUSTEN

- Beschwerden durch: Kalten, trockenen Wind (besonders am Meer), Zahnung, Betreten eines warmen Raums aus der frischen Luft, **Masern**.
- Vor Husten: Ängstlicher Gesichtsausdruck.
- Während Husten: **Das Kind wird ganz steif**, das Gesicht läuft dunkel bläulichrot an, mit **Würgen** (Agar., Cina), Übelkeit, **Zittern der Glieder** (Bell., Phos.) oder Zucken der Finger und Zehen.
- Nach Husten: Erbrechen.
- Ständiger Husten, begleitet von schaumigem Speichelfluss und Nasenbluten, bis zur **Bewusstlosigkeit** (Cina, Kali-c.).
- Husten schlimmer durch tiefes Atmen, feste Nahrung, Lachen, Sprechen (kann nicht sprechen, ohne zu husten); **besser durch kalte Getränke** (Am-caust., Caust., Coc-c., Iod., Kali-c., Op., Sulph., Verat.).
- **Lang andauernder Hustenanfall** (Dros., Ipec.), klingt nach Krupp.
- Plötzlicher, trockener, erschöpfender, hartnäckiger, rasselnder oder spastischer, erstickender, heftiger Husten nachts, in ununterbrochenen Anfällen, durch Reizung oder Kitzeln im Kehlkopf, lässt ihn nicht schlafen.

BRUST

- Schmerzhaftes Zusammenschnüren der Brust nach Essen oder Trinken, durch Zorn, bei Husten oder vor dem Erbrechen; schlimmer durch Berührung.
- Spasmen der Brust beim Husten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaufärbung in der Schlüsselbeingegend.
 - Röntgen/Thorax: Verschattungen der Lunge.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Opisthotonus.

EXTREMITÄTEN

- Zusammengeballte Finger (besonders der Daumen wird nach innen gezogen) (Cic, Mere, Stann), schwierig auszustrecken.
- Eiskalte Hände und Füße.
- Abwechselnde Beugung und Streckung der Gliedmaßen.
- Kalter Schweiß der Hände und Füße, besonders zwischen den Zehen.
- Krämpfe der Glieder, besonders der Waden, Zehen und Finger.
- Untere Extremitäten krampfhaft angezogen, liegt mit angezogenen Oberschenkeln.
- Nägel: brüchig, blau und blass.
- Zucken der Finger und Zehen bei Husten und im Schlaf.

SCHLAF

- Während des Schlafes: Zucken der unteren Extremitäten, Lider halb geöffnet mit verzerrtem Mund und Augen, Schwatzen, Stöhnen, reichlich schaumiger Speichelfluss, Ruhelosigkeit und Herumwerfen, Rumpeln im Abdomen,

- Die Babys sind schlaflos nachts bis 2 Uhr mit häufigem Gähnen.
- Schläft auf dem Bauch, wirft das Becken krampfartig hoch.

HAUT

- Bei Masern, wenn die Ausschläge noch nicht herausgekommen sind, mit intensivem Jucken, unverändert durch Kratzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kollaps mit bläulich-zyanotischer Haut, die sich eiskalt anfühlt.
 - Ikterus.
 - Purpura haemorrhagica [Hautblutungen].
 - Berührungsempfindlich.

KONVULSIONEN

- Beschwerden: **Nach Bestrafung**, durch Gehirnerschütterung oder Kopfverletzungen, während Kolik, **Zahnung**, Fieber, Gefühlen (Zorn, Angst, Ärger etc.), durch Nierenversagen, unterdrückte Absonderungen oder Hautausschläge und **Würmer**.
- Vor Konvulsionen: Bellen, Angst, Schluckauf, Lachen, Übelkeit, Herzklopfen, Würgen, Schreien, temporärer Verlust des Sehvermögens, tympanitische Auftreibung des Abdomens und Erbrechen.
- Während Konvulsionen: Ängstlicher Gesichtsausdruck, asthmatische Atmung, **beißt sich und andere**, Zungenbiss, verkrampfte und nach innen gezogene Daumen, **kalte Hände und Füße**, kalter Schweiß, Husten, nach vorne fallen, schaumiger Speichelfluss (Art-v., Bufo, Cina, Hyos.), Schluckauf, **unwillkürliches Urinieren** oder absoluter Harnverhalt, Lachen, Liegen mit gespreizten Extremitäten, Liegen auf dem Bauch mit spastischen Zuckungen des Beckens nach oben, blasses oder dunkel bläulich-rotes Gesicht, **Schreien vor Wut** (Apis, Bell., Hyos., Plb., Stram.), Schlaflosigkeit, Spasmen und abwechselndes Beugen und Strecken der Glieder (beginnt besonders in den Fingern und Zehen), tetanische Starre, Bewusstlosigkeit mit starren Augen und Weinen.
- Nach Konvulsionen: **Kalter Schweiß**, reichliches Urinieren, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Lachen, einseitige Lähmung, Schlaflosigkeit, Schlagen, Erbrechen und **Schwäche**.
- Periodische Konvulsionen alle 2 bis 3 Wochen.
- Schlimmer nachts, während Schlaf, während Stuhlgang oder Erbrechen, durch kalte Getränke.

DIFFERENTIALDIAGNOSE DER MITTEL CUPR., PLB. UND ZINC, BEI KONVULSIONEN:

CUPRUM METALLICUM	PLUMBUM METALLICUM	ZINCUM METALLICUM
Beschwerden durch:		
Nach Zorn, besonders bei Neugeborenen.	—	—
Nach Husten.	—	—
Nach Bestrafung.	—	—
Nach Ärger.	—	—
Bei Zahnung.	—	Bei Zahnung.
—	Beim Essen.	—

CUPRUM METALLICUM	PLUMBUM METALLICUM	ZINCUM METALLICUM
Beschwerden durch:		
Im Schlaf.	—	—
Beim Stuhlgang.	—	—
Erregung.	—	Erregung.
Furcht.	—	—
Schreck.	—	Schreck.
Verletzung.	—	—
—	Masturbation.	—
Unterdrückte Hautausschläge.	—	Unterdrückte Hautausschläge.
Würmer.	—	—
Während Epilepsie:		
Zungenbiss.	—	—
Zusammengeballte Finger, besonders Daumen.	—	—
klonisch.	klonisch oder tonisch.	—
Konvulsionen: Abwechselnd Beugung und Streckung.	—	—
Konvulsionen mit Beißen.	—	—
Konvulsionen mit Zyanose.	—	—
Bläuliches Gesicht.	Bläuliches Gesicht.	—
Blasses Gesicht.	Blasses Gesicht.	Blasses Gesicht.
Rotes Gesicht.	—	—
Schaum vor dem Mund.	Schaum vor dem Mund.	—
Unwillkürliches Urinieren.	Unwillkürliches Urinieren.	Unwillkürliches Urinieren.
Linke Körperhälfte.	Linke Körperhälfte.	—
—	Pupillen erweitert.	—
Schreien.	—	—
—	—	Mit Hydrozephalus.
—	—	Mit Meningitis.
Verschlimmerung durch kalte Getränke.	—	—
Verschlimmerung bei Neumond.	—	—
Nach Epilepsie:		
Reichlich Urin.	—	—
Kopfschmerz.	—	—
Ruhelosigkeit.	—	—
Erbrechen.	—	—

CHOREA

- Beschwerden durch **Schreck**, Nachahmung, unterdrückte Hautausschläge.
- Schlimmer in kalter Luft, nachts, **bei Neumond; besser in Rückenlage** oder durch Schlaf.
- Einseitige periodische Chorea (besonders links) mit bräunlicher Färbung der Zunge, die beim Herausstrecken zittert.

ALLGEMEINES

- **Entwicklungsstillstand.**
- Beschwerden durch häufige Einnahme von Eisen, Flüssigkeitsverlust, Schlafmangel, unterdrückten Fußschweiß, unterdrückte Hautausschläge und nach Impfung.
- Anämische, fröstelige Kinder, die überhaupt keine kalte Luft ertragen können.
- Brüchige Knochen.
- Kalte Bäder bessern (Apis, Calc-s.).
- Bauchwassersucht durch Lebererkrankungen.
- Abmagerung trotz Heißhunger bei Kindern mit juvenilem Diabetes.
- Puls: Häufig, intermittierend, klein, weich, schwach und kaum wahrnehmbar.

CYPRIPEDIUM PUBESCENS

(Frauschuh - Cypr.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Die Symptome sind denen von Valer. sehr ähnlich.
- ▶ Nervöse und ängstliche Kinder, die sehr anfällig für Magen- und Verdauungsstörungen sind.
- ▶ Nervöse Erregung gekennzeichnet durch Erwartungsangst, große Angst in der Nacht, Lachen im Schlaf, unwiderstehliches Verlangen in der Nacht wach zu bleiben und zu spielen, Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Chorea, Konvulsionen, Zuckungen und Schwäche. Die Reizempfindlichkeit kann während der Zahnung oder durch einen Kummer in der Vergangenheit ausgelöst werden.
- ▶ Nervöse Schwäche nach jeder Virusinfektion, besonders nach Grippe.
- ▶ Neigung zu Konvulsionen während der Zahnung oder nach Schlafentzug.
- ▶ Ausgeprägter Konsum von Genussmitteln wie Tee oder Kaffee durch die Mutter während der Schwangerschaft kann beim neugeborenen Kind einen Cypr.-Zustand erzeugen.
- ▶ Überreizung des Gehirns während der Zahnung führt zu einem Zustand von gesteigerter Gemütsregbarkeit, bei der das Kind extrem ruhelos, launisch und aufgeregt wird. Es macht seine Sachen kaputt und wird destruktiv.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Orchideengewächse (Orchidaceae).

DESOXYRIBONUCLEICUM ACIDUM

(Desoxyribonukleinsäure - Des-ac.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Hauptmittel in der Homöopathie für Kinder mit geistiger Retardierung, besonders nach Geburtsverletzungen oder auf Grund von ischämischen Enzephalopathien oder nach postnatalen Infektionen.
- ▶ Entwicklungsstörungen durch emotionalen Missbrauch.
- ▶ Down-Syndrom, Fragiles-X-Syndrom (Martin-Bell-Syndrom) und andere vererbte degenerative Störungen des Zentralnervensystems.
- ▶ Verzögerte und verlangsamte Entwicklung.
- ▶ Das Kind sieht ausdruckslos aus und hat sehr wenig Selbstvertrauen.
- ▶ Viele Fehler beim Sprechen und Schreiben; Starrsinn; sexuelle Frühreife bei geistiger Retardierung.
- ▶ Verlangen allein zu sein. Trotz wenig Selbstvertrauen sehr selbstständig und will sich nicht helfen lassen.
- ▶ Viele Allergien z. B. der Atmungsorgane; Asthma schlimmer beim Hinlegen oder nach Mitternacht.
- ▶ Großes Verlangen nach Getränken mit Kohlensäure, nach Cola, Kartoffeln und Süßigkeiten.
- ▶ Übelkeit beim Autofahren.
- ▶ Knochenverletzungen heilen sehr lange nicht.
- ▶ Schnarchen im Schlaf wegen Katarrh der Nasenebenhöhlen.

HERKUNFT

- Von Dr. Othon-Andre Julian aus Frankreich in die Homöopathie eingeführt.

DIPHThERINUM

(Diphtherie-Nosode - Diph.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Skrofulöse Diathese mit Tendenz zu Katarrhen der Atmungsorgane.
- ▶ Möchte in den Armen gehalten werden.
- ▶ Dicke, gelbe Absonderung aus der Nase. Die Zunge ist feucht mit roter Spitze.
- ▶ Angreifender Schleim aus Nase und Mund. Fächerartige Bewegung der Nasenflügel.
- ▶ Gerötetes Gesicht.
- ▶ Wiederkehrende Halsschmerzen mit vergrößerten und verhärteten Nackenlymphknoten. Schlucken wird außerordentlich schwierig. Der Rachen ist dunkelrot; dicker, käsiger Belag auf den Tonsillen; sehr penetranter Geruch aus dem Mund. Halsschmerzen mit ausgeprägtem Stumpfsinn und Stupor. Schweiß und Schwäche sind die frühen Anzeichen dieser Erkrankung. Die Schmerzen sind erstaunlich gering im Vergleich zu der Entzündung und Toxizität.
- ▶ Die meisten **hartnäckigen Fälle von Tonsillitis** reagieren auf dieses Mittel.
- ▶ Krankengeschichte von wiederkehrenden Bronchitiden.
- ▶ Großes Verlangen auf kalte Getränke.
- ▶ Trockene Haut, Handflächen fühlen sich heiß an.
- ▶ Sprechen im Schlaf.
- ▶ Ausgeprägter Schweiß.
- ▶ Schlimme Folgen von Impfungen.

HERKUNFT

- Diese Nosode entsteht durch Potenzierung aus dem Diphtheriebakterium oder der Membran eines erkrankten Patienten des Klebs-Loeffler Bazillus.

DIPHTherOTOXINUM

(Diphtherietoxin - Diphtox.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Langsame und dumme Kinder.
- ▶ Schnupfen mit dicken, übel riechenden Krusten in der Nase.
- ▶ Wiederkehrende Halsschmerzen oder Mandelentzündungen.
- ▶ Entzündeter Hals; Schlucken ist schwierig.
- ▶ Schlimme Halsschmerzen schlechter durch kalte Luft, besser durch kalte Getränke.
- ▶ Neigung zu wiederkehrenden Bronchitiden mit lockerem, krampfartigem Husten und schwierigem Auswurf.
- ▶ Atemnot beim Husten.
- ▶ Schlimme Folgen von Diphtherie-Impfung.

ELAPS CORALLINUS

(Korallenschlange - Elaps)
geprüft von Dr. Mure aus Brasilien mit zwei Prüfern

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft vom Partner verlassen wurden, was zu Einsamkeits- und Verlassenheitsgefühlen führt (Cycl., Kali-br., Plat.)
- ▶ Solche Kinder reagieren häufig übertrieben zornig.
- ▶ Der Zorn kann rasch und heftig als Reaktion auf den Versuch der Eltern oder Schulkameraden aufflammen, dem Kind Grenzen zu setzen, es zu necken oder auch nur sanft zu kritisieren.
- ▶ „Wutüberflutung“: heftige Wutausbrüche, gekennzeichnet durch eine plötzliche Reaktion des Kindes auf vermeintliche Beleidigung oder Ablehnung. Eltern oder anderen Personen kann die Ablehnung geringfügig erscheinen. Wenn die Eltern z.B. etwas verbieten, was das Kind tun wollte, kann das dazu führen, dass das Kind lange Zeit schreit und manchmal auch schlägt, tritt oder beißt. Die Wutausbrüche treten häufig auch beim Spiel mit Freunden auf. Dabei kann es um Spielregeln oder Spielergebnisse gehen. (Hep., Merc., Tarent.)
Das Problem wird als „Wutüberflutung“ bezeichnet, weil diese Wutausbrüche schwerwiegender sind als eine vorübergehende aggressive Reaktion, die nur wenige Minuten anhält. Bei einer Wutüberflutung wird das Kind von seinen aggressiven Gedanken und Gefühlen völlig vereinnahmt. Es kann nicht aufhören zu schreien und in manchen Fällen auch sich körperlich abzureagieren, selbst wenn die Eltern versuchen, das Kind abzulenken oder Grenzen zu setzen und Konsequenzen zu ziehen. (Anac., Med., Syph.)
Die folgenden Rubriken zeigen das deutlich:
 - Zorn: auf sich selbst; wenn er angesprochen wird; beißt sich selbst
 - streitsüchtig
 - Kreischen, Schreien
 - Schlagen
- ▶ Mütter, die aus irgendwelchen Gründen an starkem Kummer leiden. Wenn das in der Schwangerschaft anhält, kann es zu Krankheiten des Kindes führen, wie Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, bipolarer Störung oder Störungen des Sozialverhaltens.
- ▶ Kinder, die viel lieber auf dem Land leben möchten, als in einer Stadtwohnung eingeschlossen zu sein
- ▶ hübsche, lebhafte Kinder, die ständige Aufmerksamkeit verlangen
- ▶ Furcht vor dem Alleinsein aus Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte

- ▶ Ängste, die aus der Schwangerschaft stammen, als die Mutter von ihren Schwiegereltern, ihrem Ehemann oder an ihrem Arbeitsplatz Übergriffe und emotionale Verletzungen erdulden musste. Das führt bei Säuglingen und Kleinkindern zu starken Ängsten, die sich durch Zähneklappern und Zittern äußern.
- ▶ lebhaft und gesprächig Kinder

KÖRPER

- ▶ Elaps hat sich als besonders hilfreich bei HNO-Beschwerden erwiesen.
- ▶ chronische und hartnäckige Sinusitis in der Kindheit (Hydr., Kali-i.)
- ▶ schwarze Absonderungen: Ohrenschmalz, Nasenbluten, Schleim aus dem Hals, Stuhl, Auswurf, Rektalblutungen usw. (Vip.)
- ▶ Schwarzfärbung verschiedener Körperteile, wie Zunge oder Haut
- ▶ Adynamische Sepsis bei untergewichtigen Säuglingen oder Frühgeburten (Crot-h., Echi.)
- ▶ Folgende Bakterien lösten häufig eine Septikämie bei den von mir behandelten Patienten aus: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, B-Streptokokken, Pneumokokken und Pseudomonas aeruginosa.
- ▶ Neigung zu Zuckungen, Krämpfen und schließlich Lähmung von Augenlidern, Speiseröhre und Gliedmaßen
- ▶ generalisierter kalter Schweiß

ADYNAMISCHE SEPSIS VON BOTHROPS

- schwarze Zunge
- heißer Atem
- brennender Durst, kaltes Wasser bessert
- Wachkoma
- Delirium im Wechsel mit bewussten Intervallen
- Durchfall sofort bei der Nahrungsaufnahme, Stuhl flockig, dunkel, oft blutig, mit extremer Schwäche nach dem Stuhlgang
- trockene Lippen
- aschfahles Gesicht
- große zerebrospinale Entkräftung
- große Schwäche des somatischen Nervensystems
- große Schwäche und Abmagerung
- Blutungsneigung, z.B. Nasenbluten, Zahnfleischbluten, Darmblutung
- Kopf kalt bei Berührung
- Unwillkürlicher Stuhlgang. Oft kommt reines Blut oder blutiger Schleim aus dem weit offenen, gelähmten Anus.

- Leber schmerzhaft bei Berührung und oft vergrößert
- leichtes Fieber
- zahlreiche Roseolaflecken, Ekchymosen und hirsekorngroße Ausschläge am Oberkörper
- offener Mund
- profuser Schweiß, der keine Linderung bringt
- hinzukommende Lungenkongestion oder -entzündung
- tagsüber schläfrig, nachts ruhelos
- Sopor
- Milz wie Leber
- Neigung zur Gewebeerweichung und zum Gewebeabbau
- drohende Hirn- oder Lungenlähmung
- Zunge bedeckt mit zähem, fadenziehendem Schleim, der schwer auszuwerfen ist
- heißer Oberkörper
- aufgeblähtes Abdomen
- Der Harn ist trüb und riecht stark nach Ammoniak.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- geistesabwesend
- wütend über sich selbst, wünscht nicht, angesprochen zu werden
- Vorahnung einer tödlichen Erkrankung (Kali-c., Nit-ac.)
- Niedergeschlagenheit, Wunsch nach Einsamkeit
- Angst, allein gelassen zu werden, als werde etwas Schlimmes geschehen

KOPF

- Zerebelläre Störung bei Kindern (Heio, Helo-s., Sulfon.) Elaps-Kinder zeigen oft „milde“ neurologische Symptome, deren Auswirkung auf das Lernen, die täglichen Aktivitäten (Selbstfürsorge, Stimmungskontrolle, Appetit), die sensorische und senso-sensorische Koordination und auf die soziale Interaktion jedoch enorm sein kann.
- Das Kleinhirn ist teilweise empfindlich gegen prä- oder perinatalen Stress, daher bekommen viele Mütter, die in dieser Zeit unter Stress standen, Frühgeburten, Kinder mit Chiari-Malformation, Dyslexie, ADS / ADHS und Störungen des autistischen Formenkreises.
- sehr hilfreich bei akuter Cerebellitis (Alum., Con.)
- Migräne bei Schulkindern, schlimmer durch kalte Getränke, Fasten und Speiseeis
- Untersuchungsergebnisse
 - Haarausfall
 - Schweiß auf der Stirn

AUGEN

- Sehtrübung, schlimmer bei Kopfschmerzen und beim Lesen
- trockene Augen morgens beim Aufwachen
- Tränenfluss, Lesen verschlimmert (Carb-s., Croc.)
- Amblyopie (Ph-ac., Ruta)
- Nystagmus
- Augenschmerzen, als wäre Sand im Auge
- Untersuchungsergebnisse
 - schwarze Augenringe
 - Rotfärbung
 - glasiges Erscheinungsbild (Hell., Op., Plat.)
 - Nystagmus
 - Optikusatrophie
 - Lähmung des Oberlids
 - Fotophobie
 - Gerstenkörner am linken Auge (Phos., Rhus-t.)
 - Gerstenkörner am Unterlid

OHREN

- Ohrensummen und akustische Täuschungen
- schwarzes und übermäßig hartes Ohrenschmalz (Iod., Naja)
- Knackgeräusche in den Ohren beim Schlucken
- grünliche, gelblich grüne, dünne, wässrige, blutige, wund machende Absonderung, begleitet von Hörstörungen
- Hörstörungen nach Erkältung und nach Otitis media (Led., Merc., Puls.)
- unerträgliches Jucken in den Ohren
- Ohrenschmerzen beim Schlucken
- rechtsseitige Beschwerden
- Anfälle nächtlicher Taubheit mit Dröhnen
- Untersuchungsergebnisse
 - Ohr berührungsempfindlich (Cham., Kali-i.)
 - Leimohr
 - Hörstörung
 - Otitis media
 - Otitis media mit Erguss
 - Trommelfellperforation (Hydr., Kali-bi., Sil.)
 - Bade-Otitis (Graph., Puls.)

NASE

- Anosmie
- chronischer Nasenkatarrh, wässrige, weiße, gelblich grüne Absonderung, die stark nach Fischlake riecht, schlimmer durch Luftzug
- chronischer Schnupfen ohne Absonderung
- Beschwerden der Nase, die sich zum Ohr erstrecken (Lem-m.)
- angeborene Vergrößerung der Nase durch Nasendermoide, Gliome, nasopharyngeales Teratom oder Encephalozele (Ars-i., Aur.)
- Schnupfen, schlimmer durch Luftzug

- Hautausschlag im Nasenbereich
- viele große, grünliche Verschorfungen
- Nasenlöcher verstopft, besonders Choanen und Nasenwurzel, v.a. bei feuchtem Wetter
- Schmerz an der Nasenwurzel (Hep., Merc-i-f.)
- Schmerzen von der Nase zu den Ohren beim Schlucken
- rezidivierendes Nasenbluten mit dunklem, schwarzem oder hellem Blut, schlimmer durch Schnauben
- chronischer Schnupfen bei Neugeborenen (Lyc., Samb.)
- Untersuchungsergebnisse
 - Akne
 - Atrophische Rhinitis
 - Sinusitis
 - Schwellung der Nasenscheidewand

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse
 - Akne
 - aufgedunsen
 - kalter Schweiß
 - dunkler Teint
 - Lippenherpes (Ars., Rhus-t.)
 - vergrößerte Parotiden

MUND

- offen im Schlaf
- Sprache lallend und undeutlich
- Untersuchungsergebnisse
 - Aphthen
 - saubere Zunge
 - Mundgeruch
 - hervorstehende Zunge, schießt heraus und hinein wie bei einer Schlange (Cupr., Vip.)

ZÄHNE

- Zähneklappern vor Angst

HALS

- Luftnot durch Kleidung am Hals
- Luftnot beim Schlucken
- linksseitige Halsbeschwerden
- dicker, trockener und übel riechender Schleim im Hals
- Beschwerden des Nasopharynx (Hydr., Spig.)
- übler Geruch
- Schluckbeschwerden, v.a. Flüssigkeiten bleiben stecken (Hyos., Nat-m.), z.B.
 - Achalasie
 - Zerebralparese

- Refluxösophagitis
- Meningitis
- Muskeldystrophie
- Zenker-Divertikel
- Post-Polio-Syndrom
- Untersuchungsergebnisse
 - schwarzes Sinubronchiales Syndrom
 - schwacher Würgreflex
 - grünlich -gelber Schorf an der hinteren Rachenwand

MAGEN

- Appetit gesteigert bei Kopfschmerzen
- Abneigung gegen Bananen, Salz und saure Speisen
- Kälte, schlimmer durch kalte Getränke
- Kolik nach der Hauptmahlzeit, besser durch Bauchlage
- Verlangen nach Schinkenspeck, Rindfleisch, Buttermilch, gefrorenem Joghurt, Salat und Eis
- Ohnmachtsanfall bei Magenbeschwerden, wie Erbrechen
- Völlegefühl nach dem Essen
- Magenverstimmung nach kalten Getränken
- Übelkeit beim Husten und nach dem Essen
- Durst nach dem Essen
- Erbrechen von Wasser morgens, wenn es Zeit ist zur Schule zu gehen

ABDOMEN

- Gastroenteritis, begleitet von schwärzlichem, schaumigem, gelblichem, wässrigem Durchfall mit Schleim und Rumoren im Bauch, schlimmer durch Obst (Chin., Ferr.)
- chronischer Durchfall bei Kindern mit Tuberkulose in der Familien- oder Krankengeschichte
- Kolik, als seien die Därme verdreht, besser durch Bauchlage
- Untersuchungsergebnisse
 - vergrößerte Leber
 - Hämorrhoiden
 - Analprolaps
 - Würmer im Stuhl

HARNWEGE

- häufiges Urinieren nachts
- Untersuchungsergebnisse
 - Harn trüb, roter Sand, Zucker

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Die Vorhaut ist dick und entzündet.
- Untersuchungsergebnisse

ATMUNG

- ständiger Husten mit Schmerzen in der Lunge
- schwieriges Atmen beim Liegen auf der linken Seite (Spig., Tarent.)
- trockener Husten, der mit dem Aufsteigen von schwarzem Blut endet
- Untersuchungsergebnisse
 - Luftnot
 - Mundatmung

BRUST

- Kälte in der Brust nach dem Trinken
- Thorax-Röntgen zeigt linksseitige apikale Tuberkulose
- Untersuchungsergebnisse
 - rechte Seite empfindlich

RÜCKEN

- Kältegefühl im Rücken (Cact., Nat-s.)
- Untersuchungsergebnisse
 - Schweiß

EXTREMITÄTEN

- Arme und Hände bläulich geschwollen
- Hautausschlag an den Fingerspitzen (Cist., Nat-c.), Abschilferung an den Handflächen
- Untersuchungsergebnisse
 - geschwollene Füße
 - blaue Hände (Nux-v., Lach.)
 - eiskalte Füße
 - Intertrigo
 - Abschilferung an Handflächen und Fingerspitzen
 - Eiterung der Achsellymphknoten (Nit-ac., Rhus-t.)

SCHLAF

- beißt Hände und Füße im Schlaf
- Träume vom Fallen, das Kind wacht erschrocken auf.
- Einschlafen beim und nach dem Stuhlgang (Aeth., Sulph.)
- Schlaflosigkeit durch lanzinierende Kopfschmerzen
- schläft auf der Seite, kann nicht auf der linken Seite schlafen

ALLGEMEINES

- bedeutsame HNO-Symptome
- Abmagerung bei gesteigertem Appetit
- Epilepsie durch Masturbation (Art-v.)
- Ohnmachtsanfälle in überfüllten Räumen (Nux-m., Nux-v.)
- generelle Verschlimmerung durch Gewitter und regnerisches Wetter
- rezidivierende Abszesse

Vergleichende Materia medica von Elaps

DURCHFALL

ELAPS CORALLINUS	ARSENICUM ALBUM
<i>Elaps</i> und <i>Arsenicum</i> sind beide bei Durchfall angezeigt bei Patienten mit tief sitzenden Krankheiten, wie Tuberkulose, Lungenentzündung, diversen septischen Zuständen usw.	
Stuhl biliös, schwarz, blutig, schaumig, teerartig, unverdaut, wässrig, gelb.	Stuhl klein, übel riechend, dunkel, gewaltsam, schwallartig, schleimig, lenterisch, mit starker Erschöpfung.
Erbrechen grüner Galle, gefolgt von Durchfall. Übersäuerung des Magens mit Übelkeit und Ohnmachtsgefühl, saures Aufstoßen.	Heftiger Durchfall mit häufigen Entleerungen, Übelkeit, Erbrechen, Durst, großer Schwäche, Kolik und Tenesmus.
Durchfall, begleitet von Eiseskälte im Magen, schlimmer nach kalten Getränken und Obst.	Durchfall, begleitet von Harndrang, der erneut nach dem Essen und Trinken auftritt.
Gefühl, als seien die Därme verdreht. Analsphinkterstriktur nach blutigem Stuhlgang.	Rektalprolaps mit starken Schmerzen im Rektum.
Durchfall, schlimmer tagsüber.	Durchfall, schlimmer nachmittags und nachts, besonders nach Mitternacht.

OHRENBESCHWERDEN

PULSATILLA PRATENSIS	ELAPS CORALLINUS
<i>Elaps</i> und <i>Pulsatilla</i> sind beide bei chronischer, schmerzhafter Otitis media angezeigt, die von Otorrhoe begleitet wird. Ebenfalls angezeigt bei Tinnitus und schwarzem, hartem Ohrenschmalz.	
Dicke, gelbe, eitrige, milde Absonderung; sehr übel riechend, manchmal blutig.	Absonderung einer serösen oder grünlichgelben Flüssigkeit, besonders aus dem linken Ohr.
Tinnitus: pulsierende Ohrgeräusche, Klingeln, Dröhnen, Brummen.	Tinnitus: Summen im rechten Ohr, Knackgeräusche beim Schlucken.
Otorrhoe mit pochendem Tinnitus.	Übel riechende Otorrhoe mit Hautausschlag.
Schwerhörigkeit, als seien die Ohren verstopft (v.a. durch Kälte, nach dem Haareschneiden oder nach unterdrückten Masern).	plötzliche Taubheit nachts mit ständigem Dröhnen und Knacken
Entzündung und Schwellung des Außenohrs; Ohr erysipelatös und violett; Schorf am Tragus.	Schorfige Ausschläge an Ohr und Wange.

OHRENBSCHWERDEN

ELAPS CORALLINUS	LACHESIS MUTUS

Elaps und *Lachesis* haben beide Ohrenbeschwerden infolge einer Ansammlung von Ohrenschmalz. Ebenfalls stark indiziert sind sie bei chronischer Otitis media mit Tinnitus, Ohrenscherzen und akustischen Täuschungen.

Ohrenschmalz schwarz und verhärtet	Ohrenschmalz spärlich, zu hart und blass oder wie Brei und weiß, mit verminderter Hörkraft
Absonderung einer serösen oder grünlich gelben Flüssigkeit aus dem Ohr, schlimmer morgens; übel riechende Otorrhoe mit Hautausschlägen; Absonderung von Blut aus dem Ohr	blutige, bräunliche, reichliche und übel riechende Absonderungen aus den Ohren
Ohrgeräusche, wie Summen, Knacken, Dröhnen, Donnern, Pfeifen; schlimmer beim Schlucken	Ohrgeräusche, wie Zischen, Trommeln, Flattern, Widerhallen, Summen, Pulsieren, Pochen, Schwirren wie von Insekten im Ohr
reißende Ohrenscherzen, schlimmer nachmittags und beim Schlucken	Ohrenscherzen, schlimmer morgens beim Erwachen, abends, bei Kopfscherzen, bei Schnupfen, besser im Liegen auf dem Ohr; begleitet von Halsentzündung

FURCHT

STRAMONIUM	ELAPS CORALLINUS
<i>Stramonium</i> und <i>Elaps</i> sind beide sehr furchtsam und fürchten sich vor vielfältigen Dingen und Phänomenen.	
Furcht vor dem Alleinsein, besonders in der Dunkelheit	Furcht vor dem Alleinsein, besonders während den Menses
Furcht vor großen schwarzen Hunden und Spinnen. Furcht, von Tieren gefressen zu werden.	Furcht vor Tieren, v.a. Katzen und Schlangen
Furcht vor dem Tod bei Abort	Furcht vor dem Tod
Furcht vor Gewitter, schnell fließendem und tiefem Wasser	Furcht vor Regen
Furcht, vergiftet, ermordet oder angegriffen zu werden, vor drohenden Krankheiten	Furcht, dass etwas Schlimmes passieren werde
Furcht in Umzügen, in engen Räumen (Gewölben, Kellern), in offenen Räumen	Furcht in Menschenmengen
—	Furcht vor Schlaganfall
Furcht vor schwarzen Gegenständen, sprach von schwarzen Menschen, schwarzen Wolken	—

MAGENBESCHWERDEN

ARSENICUM ALBUM	ELAPS CORALLINUS
<i>Elaps</i> und <i>Arsenicum</i> sind beide bei schwerer Gastritis angezeigt, die von heftigem Erbrechen und Schmerzen begleitet wird.	
Erbrechen von Speisen und Getränken oder von Schleim, biliöser oder seröser Materie von gelblicher, grünlicher, bräunlicher oder schwärzlicher Färbung; Erbrechen blutiger Materie	Erbrechen grüner Galle, gefolgt von Durchfall
Erbrechen von allem, was aufgenommen wird. Selbst ein Teelöffel Wasser erzeugt eine extreme Magenreizung. Eine winzige Menge heißen Wassers beruhigt ihn manchmal für eine Minute, wird jedoch schon bald wieder erbrochen. Kalte Flüssigkeiten werden sofort erbrochen.	starker Durst; Kältegefühl in der Brust nach dem Trinken
sehr starke Schmerzen im Epigastrium und im Magen, vor allem bei Berührung. Strikturgefühl, krampfartige Schmerzen, ziehende, durchbohrende und nagende Magenschmerzen	plötzliche Magenschmerzen, als müsse sie zusammenbrechen; schlimmer im Sitzen, besser beim Umhergehen
häufige, sehr starke Übelkeit mit Neigung zu erbrechen, muss sich hinlegen; häufiges Aufstoßen, besonders nach dem Trinken oder Essen	Übersäuerung des Magens mit Übelkeit und Ohnmachtsgefühl; saures Aufstoßen

ELAPS ERINNERT STARK AN *LACHESIS*.

ELAPS CORALLINUS	LACHESIS MUTUS
Die gemeinsamen Symptome sind schwarze Absonderungen; schlimmer durch Wind, feuchtes Wetter, Regen, Gewitter; Septikämie; besser in Bauchlage; Verlangen nach Milch, Süßigkeiten, Rindfleisch; kalter Schweiß; Schlaganfallneigung; Würgen im Hals, schlimmer durch Kleidung.	
Differenzialdiagnose:	
Obst verschlimmert.	Obst bessert
rechtsseitig	linksseitig
kälteempfindlich	hitzeempfindlich
kaum Gelbsucht	Gelbsucht ist ausgeprägter
kaum Eiterungen	Eiterungen sind ausgeprägter
Feuchtes Wetter verschlimmert	Feuchtes Wetter bessert
Windiges, stürmisches Wetter verschlimmert	Windiges, stürmisches Wetter bessert
—	Verschlimmerung vor, während und nach dem Schlafen

ELATERIUM

(Spritzgurke - Elat.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Wichtiges Mittel in der Homöopathie bei **Magen-Darm-Entzündungen**.
- ▶ Heftige Übelkeit mit reiswasserartigem Erbrechen.
- ▶ Grünliches, wässriges Erbrechen mit schneidenden Schmerzen im Abdomen; reichlicher, flüssiger, schaumiger Stuhl, oft olivgrün.
- ▶ **Abszesse, die nur sehr langsam abheilen.**

HERKUNFT

- Die Spritz- oder Eselsgurke gehört zur Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae).

EQUISETUM HYEMALE

(Winterschachtelhalm - Equis-h.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Das beste Mittel für **nächtliches Einnässen und für Blasenentzündung.**
- ▶ Permanenter Drang in der Blase, als ob sie völlig überfüllt mit Urin sei, aber Urinieren erleichtert nicht vollständig.
- ▶ Ist oft angesagt, wenn Canth. versagt hat.
- ▶ Der ganze Blasenbereich ist empfindlich auf Druck.
- ▶ Trotz heftigem Harndrang geht nur spärlich Urin ab.
- ▶ Träume vom Urinieren und dabei unwillkürlicher Harnabgang bei kleinen Kindern.
- ▶ Hartnäckiges Bettnässen.

HERKUNFT

- Winterschachtelhalm ist ein botanischer Verwandter des Ackerschachtelhalms (auch Zinnkraut genannt), er gehört zur Klasse der Schachtelhalme (Equisetaceae).

EUCALYPTUS GLOBULUS

(Blaugummibaum - Eucal.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Schnupfen breitet sich zu den Stirn- und Siebbeinhöhlen aus.
- ▶ Glatte Zunge.
- ▶ Katarrh der Schleimhäute in den Bronchien oder der Nase, charakterisiert durch akuten und chronischen Schnupfen mit wund machender, scharfer, angreifender, eitriger und gelbgrünlicher Absonderung aus der Nase.
- ▶ Entzündung von Rachen und Mandeln, anhaltende Anfälligkeit zu kratzendem, lockerem Husten mit massenhaft schaumig eitrigem Auswurf.
- ▶ Vermehrter Appetit mit quälendem Durst.
- ▶ Akuter Durchfall mit gelblichem, wässrigem Stuhl besonders morgens.
- ▶ Würmer.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie Myrtengewächse (Myrtaceae).

FERRUM ACETICUM

(Eisenacetat - Ferr-act.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Tuberkulose in der Familie.
- ▶ Dünne, schwächliche und blasse Säuglinge und Kinder. Wachsen schnell und sind immer erschöpft.
- ▶ Launisch und zänkisch.
- ▶ Neigung zu wiederkehrendem Nasenbluten, besonders auf der linken Seite.
- ▶ Wachstumsschmerzen bei skrofulöser Diathese.

FERRUM METALLICUM

(Eisen - Ferr.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Familienorientierte Kinder; schon sehr früh hüten sie wie ein Wachhund das Ansehen ihrer Familie in der Gesellschaft.
- ▶ Reizbarkeit beim kleinsten Geräusch: Papierrascheln, Geschirrklopfen, Staubsauger, Waschmaschine und ähnliche Geräusche bringen das Kind zur Verzweiflung (Asar.).
- ▶ Zornige (Anac.), streitsüchtige (Nux-v., Sulph.), leicht erregbare und zänksische Kinder.
- ▶ Die Kinder glauben oft, dass jemand hinter ihnen sei, wenn sie im Dunkeln unterwegs sind (Sanic.).
- ▶ Selbstsichere und egoistische Kinder, aber dabei nüchtern und ausgeglichen.
- ▶ Hochmütige (Verat), selbstzufriedene Miene.
- ▶ Die Geschichte erzählt von einem verletzten, verwundeten und brüchigen Ego; das Kind hat immer Recht und regt sich über den geringsten Widerspruch auf.

KÖRPER

- ▶ Anämische, zarte und schwache Kinder mit feuerrotem Gesicht.
- ▶ Vollkommen gesund und wohl, solange sie im Haus sind, aber sobald sie nach draußen gehen und dort spielen oder herumrennen, sind sie erschöpft.
- ▶ Chronischer Durchfall (Phos., Thyr.) ohne infektiöse Ursache, besonders bei Malabsorptionssyndrom; dabei muss das Kind während des Essens zur Toilette rennen.
- ▶ Leicht ermüdbar (Chin.) und müde; kommt außer Atem, fühlt sich total erschöpft, wird oft ohnmächtig und fühlt sich schwindlig, besonders beim Sport, bei körperlicher Ertüchtigung, beim Spielen, zuviel Reden, bei der leichtesten Überanstrengung etc.
- ▶ Extrem fröstelige Kinder; Kleinkinder fühlen die Kälte intensiv, haben kalte Extremitäten und unangenehme Krämpfe in den Füßen.
- ▶ Hämorrhagische Diathese; hellrotes Blut, das schnell gerinnt (Ipec., Phos.).
- ▶ Blässe des Gesichts, der Lippen und Schleimhäute; errötet aber bei der geringsten Gefühlsregung oder Anstrengung.
- ▶ Schmerzempfindlich bei der kleinsten Verletzung; erträgt keine Spritzen, Impfungen oder Zahnbehandlungen.
- ▶ Ohnmacht in Menschenmengen wie z. B. auf Bahnhöfen, Flughäfen, Theatern, Jahrmärkten etc.
- ▶ Erbricht unmittelbar nach Stillen oder beim Füttern oder gleich nach dem Essen; erbricht heftig und im Schwall alles, was er zu sich genommen hat.

- ▶ Errötet leicht (Aml.-ns., Coca.).
- ▶ Schwallartiges Hochkommen von Milch und Nahrung (Alum.), ohne Übelkeit.
- ▶ Sommerdurchfall bei Babys, sofort beim Füttern.
- ▶ Nützlich bei hämatologischen Erkrankungen besonders von Neugeborenen und Kleinkindern: Thalassämie, hereditäre Sphärozytose (Kugelzellanämie), Sichelzellanämie, Eisenmangelanämie, idiopathische thrombozytopenische Purpura, Hämophilie und akute lymphatische Leukämie.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch **Erregung der Gefühle** (Zorn, Glück oder freudige Überraschungen).
- Furcht vor **offenen** (Calc.) oder **engen Plätzen** (Arg-n., Stram.), dadurch Furcht, mit dem Zug zu fahren oder eine Brücke zu überqueren.
- Ängstlich und **empfindlich** gegen das **leiseste Geräusch**; fährt sogar durch **Papierrascheln** zusammen (Asar., Coff., Ther.).
- **Aufsässige, dickköpfige** (Cham., Tarent.), unhöfliche und schroffe Kinder; werden leicht rot und reizbar durch den kleinsten Widerspruch.
- **Schüchterne**, schamhafte Kinder.
- Sehr **konkurrenzbetonte** Kinder mit Versagensangst (Lyc.).
- Abwechselnde Zustände: Starke Willenskraft wechselt mit schnellem und übertriebenem Weinen; Fröhlichkeit wechselt mit Traurigkeit; Gemütssymptome wechseln mit körperlichen Symptomen.
- Fürchterliche Angst, wenn das Kind keinen Stuhlgang hat.
- Dumpfheit am Morgen beim Erwachen (Chin., Mag-m.).
- Fühlen sich sehr schnell schuldig, wenn sie ihren Eltern nicht gehorchen oder ihre Pflicht verletzen.
- Sind gerne immer geschäftig und beschäftigt.
- Empfindlich gegenüber der Meinung anderer und gegen Kritik.

KOPF

- Blutandrang und Hitze im Kopf durch **Erregung** (Phos.), Zorn, Husten, Lachen etc., mit blassem Gesicht.
- **Heißer Schweiß** am Hinterkopf (Calc., Ph-ac., Sulph.).
- Heftige hämmernde oder pulsierende Kopfschmerzen mit Nasenbluten, Appetitverlust und **rotem Gesicht** (Bell., Glon); schlimmer durch Kaltwerden, Husten, emotionale Erregung, Erschütterung und Bücken; besser durch **kalte Anwendungen** (Bell., Bry., Glon., Spig.), äußerlichen Druck, im Liegen oder **im Freien** (Lyc., Puls., Zinc.).
- Migräne, fast alle 2 Wochen, hält 2 bis 3 Tage lang an.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kann den Kopf nicht aufrecht halten; Kopf wird zur rechten Seite gezogen.

- Hydrozephalus.
- Kopfhaut ist berührungsempfindlich (Chin., Mez.).

AUGEN

- **Tränenfluss** beim Schreiben (Calc., Staph.) oder **mit Schmerz** in einem beliebigen Körperteil (Sabad.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Gerstenkörner** am Oberlid (Ph-ac., Puls.).
 - Astigmatismus.
 - Einblutung der Bindehaut.
 - Verengte Pupillen, unempfindlich gegen Licht.
 - Ödematöse Schwellung von Ober- und Unterlidern.
 - Ikterus.

OHREN

- **Empfindlichkeit des Gehörs gegen das geringste Geräusch** (Asar., Borx.); das Kind erwacht sogar durch leises Papierrascheln.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Katarrh der Tuba Eustachii.
 - Absonderungen aus dem linken Ohr (Graph., Puls.).

NASE

- **Chronisches Nasenbluten** (Vip.) bei angeborenen oder erworbenen hämorrhagischen Erkrankungen. Auch bei kleinen, anämischen Kindern, mit klumpigem oder hellrotem Blut, täglich am Morgen, schlimmer beim Naseputzen.
- Katarrh erstreckt sich zu den Stirnhöhlen.
- Eitrige Absonderungen der Nase, schlimmer nachts, bilden trockene **Krusten und Borken** am Morgen (Kali-bi., Stict.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Fächernde Bewegung** der Nasenflügel.
 - Erweiterte Nasenlöcher bei der Ausatmung.
 - Retronasaler Katarrh.

GESICHT

- **Eingefallenes** (Ant-t., Ars.), **blasses, hippokratisches Gesicht**, errötet schnell durch die kleinste Aufregung, während Schmerzen oder bei Fieber.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Erweiterte Venen an den Schläfen (Bell., Chin., Sang.).
 - Eine Seite rot, die andere blass.

MUND

- **Dauerndes Zähneknirschen.**
- Langsame und schwierige Zahnung.
- Zahnschmerz besser durch schluckweises Trinken eiskalten Wassers.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Mundgeruch.
 - Blasses, weißes Zahnfleisch durch Anämie.
 - Zunge zittert beim Herausstrecken (Gels., Hell.).
 - Weißlicher oder schmutzig-gelblicher Zungenbelag.

HALS

- Rezidivierende Mandelentzündungen.
- Kloßgefühl im Hals mit Würgen, treibt das Kind zum ständigen Schlucken, das keine Erleichterung bringt.
- Untersuchungsergebnis: Schwellung der Halsdrüsen.

MAGEN

- **Launischer Appetit**, manchmal übermäßig, manchmal fehlend, aber immer verbunden mit gesteigertem Durst.
- **Die Kinder weigern sich, ihr Essen zu kauen; sie verlangen ihr Essen zerdrückt oder püriert** (Lyc., Merc., Staph.) (Didier Grandgeorge).
- Verdauungsstörungen mit krampfartigen Magenschmerzen, schlimmer nach kalten Getränken, **Eiern** (Colch.), **Fleisch** (Ptel.) oder Milch.
- Plötzliche und heftige Übelkeit und Erbrechen mundvoller Mengen saurer, unverdauter Nahrung **bis der Magen vollständig leer ist**; schlimmer nach Mitternacht; nach jedem Husten; durch kaltes Wasser, Eier, Fleisch oder Süßigkeiten; **beim Essen**; beim Auto- oder Busfahren.
- Das gesamte Essen eines Tages wird erbrochen, besonders gegen Mitternacht.
- Fauliges, bitteres oder saures Aufstoßen und wässriges Aufstoßen nach dem Verzehr von fetten oder reichlichen Speisen.
- Langsame Verdauung.
- Erbrechen der Nahrung, mit feuerrotem Gesicht.
- Verschlimmerung: Butter, kalte Speisen oder Getränke, trockene Nahrung, **Eier**, Fett, Obst (besonders saure Früchte), Fleisch, Milch, reichhaltiges Essen, saure Nahrung, Süßigkeiten, **Tee** (Chin., Nux-v., Sep.), Tomaten, Essig, warme Speisen und Getränke.
- Abneigung: Käse, **Eier** (Puls., Sulph.), **Fett** (Chin., Nit-ac.), Obst (besonders grünes und saures), Hering, **Fleisch**, Milch, Nüsse, feste Nahrung, **saure Speisen** (Bell., Cocc.), Tomaten, warme Speisen oder Getränke.
- Verlangen: Brot, **Brot und Butter** (Bar-m., Merc.), Butter, Delikatessen, saure Früchte (Ars.) und unverdauliche Dinge (Kreide, Ton, Erde, Kalk oder Bleistift), **flüssige Speisen (warme Suppe)**, Fleisch, Pizza (Nat-m.), rohe Tomaten (Ign.), saure Speisen, Süßigkeiten, **warme Speisen oder Getränke** (Bry., Ph-ac.).

ABDOMEN

- Gurgeln im Abdomen durch Flatulenz vor dem Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aszites.
 - Harte, tastbare Leber und Milz.
 - Tympanitische Auftreibung des Abdomens.

REKTUM

- Chronischer, hartnäckiger, plötzlicher, schwallartiger, schmerzloser, schwächender Durchfall mit braunen oder schwarzen, wässrigen Stühlen, mit Schleim, **unverdauten Nahrungspartikeln** und stinkenden Blähungen, **schlimmer nachts** (Ars., Chin., Merc.), nach dem Trinken, bei Zahnung, durch Nervosität, bei warmem Wetter, bei Bewegung, **während Stillen oder Essen** (Crot-t, Kali-p.) oder

- Cholera infantum mit Reiswasserstühlen.
- Nächtliches Jucken am After.
- Prolaps des Rektums beim Stuhlgang (Ign., Sep.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Heraussickern** einer übelriechenden Feuchtigkeit aus dem After.
 - Wundheit des After.
 - Stuhl: Ascariden (Spulwürmer), Madenwürmer.

HARNWEGE

- **Unwillkürliches Urinieren** durch plötzliche Bewegungen.
- Enuresis nocturna.
- Urin tröpfelt den ganzen Tag; das Tröpfeln hört auf, wenn das Kind ganz still liegt.
- Urin hinterlässt ein gelbliches Sediment in der Windel.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Albumin ++, erhöhtes spezifisches Gewicht, Leukozyten ++, Erythrozyten ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Neigung zu masturbieren.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Ätzende, milchige Leukorrhoe bei anämischen Kindern mit unerträglichem Jucken und Brennen der Genitalien.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Rauheit und Kitzeln im Kehlkopf, verursacht Husten.
- Schwäche oder Heiserkeit der Stimme durch Sprechen.

ATMUNG

- **Atemnot** und asthmatische Atmung schlimmer nach Mitternacht, am Vormittag (10 - 11 Uhr) und beim Husten; **besser durch Zufächeln**, Sprechen, Aufrecht sitzen, Bewegen oder langsames Umhergehen.
- **Schwere Brustbeklemmung**; das Kind fühlt sich als ob etwas Schweres auf seine Brust drückt; schlimmer um Mitternacht; muss sich aufsetzen oder noch besser: herumlaufen.
- Asthma nach unterdrückten Ekzemen oder Skabies (Ars., Cupr.).
- Atmung setzt beim Husten aus (Ant-t, Cupr.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Heißer Atem** (Sulph.).
 - Bauchatmung.
 - Das Kind hat Schwierigkeiten tief zu atmen.
 - Rasselnde Atmung.
 - Keuchende, pfeifende Atmung.

HUSTEN

- Während Husten: **Würgen**, muss sich aufsetzen, Schmerzen im Abdomen, Schweiß, Würgen mit Spucken und Erbrechen.

- Spastische Hustenanfälle mit **Erbrechen** (Ipec.) und Nasenbluten; jedwedes Essen oder Trinken bewirkt, dass das Kind alles erbricht, was es zu sich genommen hat; schlimmer durch Weinen oder Sprechen, vom Abend bis Mitternacht, durch kalte Luft, am Morgen beim Aufstehen; besser durch Gehen oder **durch langsames Herumgetragen werden**.
- Der Husten scheint aus dem Magen zu kommen (Bry., Sep.).
- Trockener Husten abends, der erst am Morgen locker wird.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Empyem.
 - Pneumonie mit Hepatisation und Blutung aus den Lungen.
 - Systolische Geräusche.

RÜCKEN

- **Schweiß in der Halsgegend** (Calc.).
- Schwellung der Halsdrüsen im Nacken.

EXTREMITÄTEN

- Nächtliche Krämpfe in Waden und Zehen im Bett.
- Schwache Gelenke.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalter Schweiß der Handflächen und zwischen den Zehen.
 - Eiseskälte der Endglieder, besonders der Zehen.
 - Ruhelose Beine (Med., Zinc.).
 - Kontraktion der Fingermuskeln und -sehnen.
 - Warzen an Händen und Fingern.

SCHLAF

- Kann nur auf dem Rücken schlafen (Rhus-t., Sulph.).
- Schläft leicht ein beim Versuch sich auf das Lernen zu konzentrieren (Gels.).
- Schläft mit halb-offenen Augen (Lyc.).
- Schlaflosigkeit bei Kindern, die an Wurmerkrankungen leiden; die ganze Nacht schlaflos, schläft dann am Morgen tief.
- Schläfrig nach Essen oder Stillen.

FIEBER

- Frost:
 - Beschwerden durch Zugluft oder Regen.
 - Während Frösteln: Trockener Husten, Hitze und Röte des Gesichts, eiskalte Füße und erhöhter Durst.
 - Es treten häufige, kurze, heftige Fröstelanfälle auf (schlimmer auf der linken Seite), sie beginnen in Händen und Füßen und treten in regelmäßigen und bestimmten Abständen auf (schlimmer nach 3 Uhr morgens).
- Hitze:
 - Während Hitze: Bitterer Geschmack im Mund, kalte Füße, Husten, Verlangen, sich aufzudecken, erweiterte Blutgefäße, Atemnot, Kopfschmerzen, Kleidung ist unerträglich, Reizbarkeit, blasse Haut, rotes, heißes Gesicht

mit eiskalten Gliedern (besonders Hände und Füße), Ruhelosigkeit, Durstlosigkeit oder unstillbarer Durst, Erbrechen.

- Örtlich begrenzte Hitze auf dem Bauch, Rücken, Wangen, Augen, äußeren Hals und Kopf.
- Trockene, brennende Hitze, die am Abend und im Schlaf auftritt.
- Schweiß:
 - Kalter, feuchter und reichlicher Schweiß, der die Wäsche gelb färbt, mit dem Verlangen, sich aufzudecken.
 - Alle Symptome schlimmer während Schweiß (Gegenteil von Nat-m., bei dem alle Symptome sich durch Schweiß bessern).

HAUT

- Haut fühlt sich brennend heiß an (Bell.), aber das Kind empfindet innere Kälte.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ekchymose (kleinflächige Hauteinblutung).
 - Ikterus.
 - Kleine Warzen.
 - Wächserne Haut.
 - Schrumpelige oder schlaffe Haut.

ALLGEMEINES

- **Anämische, schwache Kinder** mit ausgeprägter Blässe und Ohnmacht; durch Ernährungsstörungen, nach schwächenden Krankheiten oder Blutungen; das Gesicht errötet schnell durch die geringste Aufregung; besser durch Zufächeln.
- Dickliche Kinder, die rasch frieren; **erkälten sich schnell**; schlimmer durch die geringste Kälte oder im Freien und bei kaltem oder nassem Wetter.
- **Starke Abmagerung** (Ars., Calc., Chin., Nat-m., Tub.).
- **Blutungsneigung**; reichlicher, hellroter Fluss mit dunklen Klumpen aus Körperöffnungen oder kleinen Wunden.
- Beschwerden durch Wetterwechsel (von kalt zu warm), kaltes oder nasses Wetter, während Rekonvaleszenz, durch Blutverlust (Nasenbluten, bakterielle Dysenterie, Hakenwürmer) oder Flüssigkeitsverlust (Gastroenteritis, chronischer Durchfall).
- Hitzewallungen durch geringste Nervosität oder Anspannung.
- Spätes Laufenlernen (Calc., Calc-p.).
- Rasche Abmagerung trotz Heißhunger, bei Kindern mit juvenilem Diabetes.
- Rachitis; weiche Knochen; Knochenbrüche heilen langsam.

FILIX MAS

(Gemeiner Wurmfarne - Fil.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Häufig Lungentuberkulose und Tuberkulose-Miasma in der Familie.
- ▶ Mürrische, reizbare und blasse Kinder mit blauen Augenringen und weiß belegter Zunge.
- ▶ Ein gutes Mittel in der Homöopathie für **Bandwürmer**.
- ▶ Wurmbefall mit Verstopfung.
- ▶ Sehr anfällig für durch Würmer verursachte Kolik mit Juckreiz in der Nase und blassem Gesicht.

HERKUNFT

- Synonym: *Dryopteris filix*. Gehört zur Familie der Schildfarne (Aspidiaceae).

FLAVUS

(Flavus bacillus - Flav.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Neigung zu **wiederkehrenden Entzündungen der Nasennebenhöhlen**, mit grünlichen und eitrigen Absonderungen und heftiger Kongestion in der Nase.
- ▶ Die Nase ist einseitig verstopft, besser durch Niesen.
- ▶ Kieferhöhlenentzündung.
- ▶ Wiederkehrende Mittelohrentzündungen.
- ▶ Entzündeter Rachen, viel Nasenabsonderung läuft in den Rachen; Gefühl eines Klumpens im Rachen; Schlucken ist schwierig.
- ▶ Trockener Husten mit Atemnot, besonders nach Mitternacht.
- ▶ Erkältungsneigung.
- ▶ Warme Patienten.

HERKUNFT

- Flavus ist ein Arzneimittel, das aus Flavus-Bakterien des Nasen-Rachen-Raums hergestellt wird. Jedoch ist die genaue taxonomische Zuordnung nicht bekannt.

FLOR DE PIEDRA

(Steinblüte - Flor-p.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Tuberkulinische Kinder, häufig Tuberkulose in der Familienanamnese.
- ▶ Fehlende Konzentration beim Lernen.
- ▶ Wiederkehrende Entzündung der Mundschleimhaut.
- ▶ Durchfall mit gräulichem oder blassgelbem Stuhl.

HERKUNFT

- Synonym: *Lophophytum leandri*. Wächst in den tropischen Regenwäldern von Argentinien und Paraguay und gehört zur Familie der Kolbenträgergewächse (Balanophoraceae).

FOLLICULINUM

(Estron, Eifollikel - Foil.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ fehlendes Identitätsgefühl aufgrund übermäßiger Kontrolle durch Eltern, Großeltern, Geschwister usw. (Anac., Mag-c., Staph.)
- ▶ Die fehlende Beziehung zu sich selbst führt zu Willensschwäche.
- ▶ Kinder, die unter dem Druck von Gleichaltrigen und Eltern leiden
- ▶ physisch, psychisch oder sexuell missbrauchte und misshandelte Kinder
- ▶ Essstörungen bei Kindern, wie Anorexie, Bulimie, Binge Eating
- ▶ postnatale Probleme bei Neugeborenen und Kleinkindern mit schwieriger Mutterbindung, z.B. Reaktionsmangel, wenn das Baby geküsst oder liebkost wird, schwach ausgeprägter Augenkontakt, das Baby kann bewegten Objekten nicht mit den Augen folgen
- ▶ sexuell frühreife Kinder (Aloe, Bar-c.)
- ▶ Kinder, die zu einer Zwangsstörung neigen, wie Anacardium, Hyoscyamus oder Medorrhinum, gekennzeichnet durch:
 - Konzentrationsschwierigkeiten, die die Schulzeit in vielfältiger Weise beeinträchtigen können. Die Konzentration kann durch hartnäckige, sich wiederholende Gedankengänge beeinträchtigt werden, von denen andere nichts mitbekommen.
 - Es fällt oft schwer, eine Arbeit in angemessener Zeit fertigzustellen.
 - soziale Isolation oder Rückzug aus Kontakten mit Gleichaltrigen.
 - niedriges Selbstwertgefühl bei sozialen und schulischen Aktivitäten
 - Verhaltensstörungen, wie Schlägereien oder Streit, die aus Missverständnissen zwischen dem Kind und Schulkameraden oder Lehrern entstehen.
 - Das Kind ist unaufhörlich damit beschäftigt, aus Angst vor Ansteckung jeglichen Kontakt mit Gegenständen zu vermeiden, oder wäscht sich täglich stundenlang die Hände.
 - Extremer Stress, wenn andere ein Ritual unterbrechen. Das Kind kann schlimme Wutanfälle bekommen, wenn die Eltern darauf bestehen, dass es zur nächsten Aufgabe übergehe.

KÖRPER

- ▶ Kinder von Müttern, die lange Zeit die Antibabypille genommen haben
- ▶ Kinder von Müttern, die zur Regulierung der Periode missbräuchlich Diethylstilbestrol angewendet haben
- ▶ Kinder von Müttern mit wiederholten Schwangerschaftsabbrüchen (Gaul., Plb.)
- ▶ Mütter, die in der Schwangerschaft und bei der Geburt an Hypertonie, Diabetes, Harnwegsinfektionen oder Brustkrebs gelitten haben
- ▶ viele Krebserkrankungen in der Familiengeschichte, v.a. Brustkrebs (Phos., Sep.)

- ▶ Kinder mit angeborenen Missbildungen, v.a. des Genitaltraktes, z.B. fehlende Zervix, transversales Septum, fehlender oder unentwickelter Uterus, Hymenalatresie, Vaginalagenesie, Küster-Hauser-Syndrom oder gestörter Hodenabstieg
- ▶ Kinder, die nur langsam von akuten Viruserkrankungen genesen, z.B. von Pfeiffer-Drüsenfieber, Influenza, Respiratorischen Synzytial-Viren usw. (Carbo-veg., Chin.)
- ▶ Kinder, denen bei jeder Erkrankung in der Kindheit lokal, oral oder als Inhalation missbräuchlich Cortison verabreicht wurde. (Nux-v., Sulph., Zinc.)

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- tief sitzende Ängste bei Kindern, die psychisch misshandelt wurden (Aeth., Bufo, Hyos.)
- Wahnidee, unter dem starken Einfluss einer anderen Person zu stehen, z.B. der Eltern, Schulkameraden oder Geschwister. (Hyos., Lach., Stram.)
- Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber dem Druck von Umständen, die sich der eigenen Kontrolle entziehen
- starkes Gerechtigkeitsempfinden wie bei Causticum und Staphisagria
- hohe Geräusch- und Berührungsempfindlichkeit
- emotionale Empfindlichkeit, v.a. gegen Tadel
- lässt sich von Kleinigkeiten leicht in Panik versetzen (Kali-c., Nat-c.)
- mitfühlende Kinder, wie Carcinosinum

GESICHT

- Akne vor und in der Pubertät

MAGEN

- starkes Verlangen nach Süßigkeiten, Zucker und Kohlenhydraten (Arg-n., Chin., Sacch.)

ABDOMEN

- Auftreibung des Abdomens nach dem Verzehr von Weizenprodukten oder Zucker, v.a. raffiniertem Zucker (Ign., Sulph., Zinc.)

HARNWEGE

- Candida-albicans-Infektion bei kleinen Mädchen; gelbe, schmutzige, übel riechende Leukorrhoe
- juckende Genitalien
- leicht erregbare Genitalien (Phos., Plat., Staph.)

BRUST

- Thorax-Röntgen zeigt Veränderungen des Primärkomplexes.

EXTREMITÄTEN

- Die Fingerspitzen sind bei Berührung immer kalt, während die übrige Hand warm ist.
- kalte Hände oder Füße bei Kopfschmerzen
- geschwollene Fußgelenke

SCHLAF

- schläfrig tagsüber und während des Unterrichts

HAUT

- Cafe-au-lait-Flecken am ganzen Körper (Am-m., Carc.)

ALLGEMEINES

- Neigung, ohnmächtig zu werden, oder Ohnmachtsanfälle bei Anämie
- reichlicher Harnabgang mit Schmerzen überall im Körper
- Reisekrankheit
- friert immer, braucht viele Kleidungsstücke, um sich zu erwärmen
- generelle Verschlimmerung aller Symptome am Morgen
- sehr träge, keine Lust sich anzustrengen (Ars., Camph., Kali-p.)
- Schlafmangel erzeugt Lethargie und körperliche Erschöpfung.
- übermäßiges Schwitzen nachts

P.S. Große Ähnlichkeit mit Natrium muriaticum. Wir finden hier „Niedergeschlagenheit mit Weinen“, „häufiges Verlangen nach großen Mengen Flüssigkeit“, „periodische Kopfschmerzen, die mit der Sonne auf- und untergehen“ und „hartnäckige Verstopfung mit schmerzhaften Fissuren“

Vergleichende Materia medica

Folliculinum zeigt große Ähnlichkeit mit **Natrium muriaticum** und **Carcinosinum**.

DIE FOLGENDEN SYMPTOME SIND ALLEN DREI MITTELN GEMEINSAM:

- Beschwerden nach physischer, psychischer oder sexueller Misshandlung bzw. Missbrauch
- Beschwerden durch Unterdrückung
- Zwangsneurose
- starke Entrüstung
- kann keine Ungerechtigkeit ertragen
- Gefühl der Hilflosigkeit
- leicht beleidigt (= nimmt alles übel)
- empfindlich gegen Geräusche
- empfindlich gegen Tadel
- mitfühlend
- nachgiebig
- Akne im Gesicht
- Bettnässen

- Verlangen nach Zucker
- Verlangen nach Süßigkeiten

SYMPTOME	CARCINOSINUM	FOLLICULINUM	NATRIUM MURIATICUM
Wahnidee, unter einem mächtigen Einfluss zu stehen		4-	
Beschwerden durch Zorn mit Schreck	4-		
Beschwerden durch Gewalt	+		
grundloser Zorn	4-		
Zorn mit blassem Gesicht			4-
Wahnidee, sie sehe elend aus			4-
lebenslange Furcht	+		
Furcht vor Kleinigkeiten			4-4-
Kummer, kann nicht weinen	4-		4-4-4-
Gefühl der Demütigung nach sexuellem Missbrauch	+		
Sauberkeitswahn	4-		4-
Verlangen nach Musik	4-		
Traurigkeit nach Kränkung	4-		
entrücktes Gefühl		4-	
Denken an Unangenehmes			4-
Verlangen zu reisen	+		
blaue Skleren	4-4-		
Kopfschmerzen durch Anstrengung der Augen			4-
Gerstenkörner an den inneren Canthi			4-
Schweiß auf der Nase			4-
Struma			4-

SYMPTOME	CARCINOSINUM	FOLLICULINUM	NATRIUM MURIATICUM
Durchfall nach Mehlspeisen			4-
Cafe-au-lait- Flecken	4-4-	4-	
kalte Fingerspitzen		4-	
häufiges, schmerzhaftes Urinieren		4-	
Nachtschweiß		4-4-	4-4-4-4-
geschwollene Fußgelenke		4-	4-
schläft in Knie- Brust-Lage	4-		
Abmagerung bei Kindern und Säuglingen			4-4-
Verlangen nach Eiern	4-		
Verlangen nach Schinkenfett	4-		
Missbrauch der Antibabypille		4-	

GAMBOGIA

(Gummiharz vom Gummiguttebaum - Gamb.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Durchfall verursacht durch E. Coli, Cholera, Shigellen, Salmonellen, Giardiasis oder E. Histolytica.
- ▶ Der Stuhl verändert sich von gelblich, grün, wässrig zu teilweise geformtem Stuhl mit viel Rumpeln im Abdomen.
- ▶ Plötzlicher Stuhldrang. Die Entleerung erfolgt mit viel Anstrengung, bringt aber dann Erleichterung.
- ▶ Schwallartiger Stuhl mit Brennen im Anus und darauf folgender Erleichterung.
- ▶ Häufiger Blähungsabgang, schlimmer abends und nachts.
- ▶ Der Stuhl ist wässrig, schleimig, geruchlos, reichlich, gelb wie geronnene Milch und enthält unverdaute Teile.
- ▶ Vor dem Stuhlgang Drängen und scharfes Kneifen im ganzen Bauch, viel Blähungsabgang beim Stuhlgang.
- ▶ Große Erleichterung des Patienten durch Stuhlentleerung.
- ▶ Süßigkeiten und Zucker verschlimmern.

HERKUNFT

- Synonym: *Garcinia morella*. Gehört zu Familie der Clusiaceae.

GRAPHITES

(Graphit, Reißblei - Graph.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Ängstliche Erwartungsspannung, neigt zu großer Ängstlichkeit.
- ▶ Anspruchsvoll, penibel, wählerisch (Anac., Ars., Carc., Nux-v.).
- ▶ Unentschlossenheit mit geringem Selbstvertrauen. Wie ein Pendel schwankt und zögert das Kind bei jeder Entscheidung.
- ▶ Negative Grundeinstellung (Bar-c., Calc.).
- ▶ Träge und faule Kinder; Abneigung gegen Arbeit.
- ▶ Schüchterne Kinder mit mangelnder Selbstsicherheit; brauchen ständige Unterstützung.
- ▶ Alle Gefühle (Angst, Befürchtungen, Furcht, Traurigkeit etc.) werden durch Weinen gebessert.
- ▶ Das Kind ist morgens langsam und träge, wird aber abends extrem fröhlich und aktiv.
- ▶ Gewissenhaft in Kleinigkeiten.
- ▶ Scheu vor allem Neuen (z. B. ein neues Spiel zu spielen, in eine neue Schule zu gehen, neue Freunde kennenzulernen).
- ▶ Zappelig.
- ▶ Mädchen, die gerne Jungenspiele spielen, Jungenkleidung und -schuhe tragen und lieber mit Jungs zusammen sind (Plat.) etc.

KÖRPER

- ▶ Sehr fröstelige Kinder, reichlicher Schweiß, mit Verlangen nach Wärme.
- ▶ Die meisten Beschwerden werden durch Anstrengungen verschlimmert und durch Essen gebessert.
- ▶ Korpulente, verstopfte und träge Kinder, mit Fettpolstern am Rumpf, aber dünne Gliedmaßen.
- ▶ Wunden heilen langsam.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch **Unsicherheit, Kummer und Schreck** bei Kindern, infolge **dauernder Streitereien und Kabbeleien zwischen ihren Eltern** (Mag-m.).
- Das Kind hat große **Furcht vor Gewitter** (Borx., Phos.), zusammen mit anderen Ängsten wie Furcht vor Unfällen, Dunkelheit, Bösem, Versagen, zu fallen, vor der Nacht und vor Fremden. Alle seine Ängste **bessern sich durch Weinen** (Dig., Phos.) und durch Essen; dies kann bei kleinen Kindern zur Adipositas führen.

- Das Kind hasst es zu lernen; alle Symptome **verschlimmern sich durch jede Form geistiger oder körperlicher Anstrengung** (Calc., Nat-c., Pic-ac.).
- Das Kind ist aufgrund seiner häufigen Alpträume ängstlich vor dem Schlafengehen.
- Leicht zum Lachen oder Weinen zu bringen.
- Melancholische Stimmung nach Musikhören.
- Es existieren zwei Aspekte dieses Mittels: Das Kind ist extrem ängstlich und schüchtern oder es ist sehr unhöflich, überkritisch, feindselig und streitsüchtig.
- Nützliches Arzneimittel für Bulimie bei lustlosen, faulen und inaktiven Kindern, die gerne die ganze Zeit auf einem Platz sitzen bleiben.

KOPF

- Der Kopf muss immer warm eingepackt sein; **sehr empfindlich gegen kalte Luft**.
- **Feuchte, krustige, faulig riechende Ausschläge**, die sich durch Erosion der Ränder ausbreiten; Kratzen verursacht Hautabschürfungen und weitere Feuchtigkeitsabsonderung, die als Krusten antrocknet; mehr am Scheitel.
- **Psoriatische und ekzematöse Läsionen mit exzessiver Schuppung und Jucken, schlimmer nachts (Mez.)** und durch Kälte; **besser durch Wärme** (Anac.) und Kopfwäschen.
- Katarrhalische und meningitische Kopfschmerzen; schlimmer nach Schlaf und beim Erwachen am Morgen.
- Übermäßiger Kopfschweiß, muss den Kopf trotzdem bedeckt halten.
- Vorzeitiger Haarausfall bei kleinen Kindern, besonders am Scheitel, durch Sorgen, Demütigung und Traurigkeit.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Reichliche, **weiße, abblätternde Schuppen** auf der ganzen Kopfhaut.
 - Hartnäckige Läuse im Haar.
 - Plica polonica (verfilzte Haare).
 - Talgretentionszyste.

AUGEN

- **Chronische Blepharitis** (Entzündung der Lidränder) (Ant-c.).
- **Lider** morgens total **verklebt** (Lyc., Phos.).
- Entzündete, rote, geschwollene Lider mit Lichtempfindlichkeit.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Klebrige Absonderung, die antrocknet und an den Lidern haftet.
 - Myopie.

OHREN

- Chronische Otitis media.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Ausschläge und wundte Stellen hinter dem Ohr** (Petr.).
 - **Perforation des Trommelfells** (Tub.).
 - Ekzeme des äußeren Ohres.
 - Gelbe, wundmachende Absonderungen.

NASE

- Anhaltende, eitrige Absonderung aus der Nase.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schwarze Poren (Mitesser) auf der Nase (Sulph).
 - Faulig riechende, stinkende Absonderungen.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Erysipel (Ant-c.).
 - Harte, geschwollene submaxilläre Lymphknoten.
 - Hartnäckige Gesichtsakne (Ars-i.).
 - Blass-gelbes Gesicht.

MUND

- Zahnfleisch schwillt an und blutet leicht (Kreos).

HALS

- Untersuchungsergebnisse:
 - Heisere Stimme.
 - Tonsillenhypertrophie (Bar-m.).

ATMUNG

- **Husten durch tiefe Atmung** (Bry., Kali-c.)

MAGEN

- **Große Verdauungsschwäche**, schlimmer durch kalte Speisen. (Ph-ac.)
- Trotz Fettleibigkeit (Caps., Phyt.) besteht große Abneigung gegen Süßigkeiten (Caust.).
- Immer hungrig (Iod., Lyc.), mit großem Appetit (Sulph.).
- Häufig nagender Hunger innerhalb weniger Stunden nach den Mahlzeiten.
- Großer Durst am frühen Morgen (Nit-ac.).
- Die meisten Verdauungsbeschwerden (Magenverstimmung, Verstopfung, Kolik) treten auf, wenn das Kind übermäßigem geistigem Stress ausgesetzt ist.
- Verschlimmerung: Kalte Speisen, kaltes Wasser, **fette** Speisen (Puls., Tarent.).
- Verbesserung: Milch, insbesondere heiße Milch.
- Abneigung: Gekochte Speisen, **Fisch** (Phos., Zinc.), Fleisch und Süßigkeiten.
- Verlangen: Schonkost, Hühnchen, Säfte, **Fleisch** (besonders zum Abendessen), Süßigkeiten.

ABDOMEN

- **Koliken werden** nur **gebessert** durch **heiße Milch** (Crot-t.).
- Auftreibung des Abdomens nach dem Essen.
- Exzessive Auftreibung mit Abgang übelriechender Blähungen (Asaf.).
- Kann nichts Enganliegendes um den Bauch vertragen (Arg-n., Lach., Nux-v.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufgeblähtes Abdomen bei Babys mit Kolik.
 - Leber vergrößert und verhärtet

REKTUM

- Große Stuhlmenge (Bry.) mit Beimengung von relativ viel zähem, weißem Schleim (Borx., Kali-chl.).
- Stuhl hart und zu groß ODER weich und klein.

BLASE

- Sauer riechender Urin (Nat-c., Sep.).

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Ödematöse Schwellung von Vorhaut und Skrotum (Apis, Ars., Rhus-t.).

WEIBLICHE GENITALIEN

- Wundheit der Vulva.

EXTREMITÄTEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundheit zwischen den Fingern und an den unteren Extremitäten.
 - Dicke, verkrüppelte Zehennägel (See.).
 - Dicke, deformierte Fingernägel (Ant-c., Sil.).

HAUT

- Neigung zu allergischen Ekzemen (Anthrac., Mez.) in den Hautfalten (Ars., Psor.), auf der Rückseite der Ohren (Lyc., Oind.), in den Augenwinkeln, Leistenbeugen, in der Ellenbeuge, um das Handgelenk und um den After.
- Raue, trockene Haut, die zu Rissen neigt, besonders durch Kälteeinwirkung.
- Ungesunde Haut.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rissige Haut (Calc., Petr.) mit der Neigung zu bluten; es sickert ein dickes, gelbes, klebriges Sekret heraus, das schnell eintrocknet und dicke Krusten bildet. Die Krusten schichten sich auf, da die Sekretion unter der Oberfläche anhält. Die Kruste fällt dann ab, darunter werden die gleichen klebrigen, gelben Absonderungen sichtbar, die sehr oft mit Blut durchsetzt sind.

ALLGEMEINES

- Extrem **fröstelige** Kinder; schlimmer durch die geringste Zugluft (Kali-c., Puls.) oder kalte Luft (Bar-c., Hep.).
- **Dicke, schwergewichtige Kinder mit vergrößertem Abdomen** (Calc.).
- Neigung zu **Wundheit, Rissen und Schrunden** in den Mundwinkeln (Arum-t, Nit-ac., Sil.), an den Übergängen zur Schleimhaut von Augen, Mund, After (Cham., Mur-ac., Nit-ac.) und Nase.
- **Verlangen nach frischer Luft** (grundlegende Eigenschaft aller Kohlenstoff-Verbindungen).
- Kinder, die zu hartnäckigen und rezidivierenden Hautkrankheiten neigen (Carbo-veg. hat hartnäckige Ekzeme der Kopfhaut).
- Abmagerung der erkrankten Körperteile (Led., Puls., See.).

-
- Helle Hautfarbe mit Blässe, aber schnelles Erröten schon bei geringem Stress, Angst oder Aufregung.
 - Generalisierte Abmagerung, muskuläre Schwäche mit schneller Erschöpfung, trotz seiner stämmigen Erscheinung; das Kind kann keine Reisen oder Anstrengungen vertragen.
 - Intoleranz gegen stickige Atmosphäre und Mangel an Luft.
 - Klumpig, verdickt oder hart: Haut, Drüsen, Nägel, Stuhlgang, Narben oder Krusten.
 - Die meisten Beschwerden verschwinden durch Bewegung an der frischen Luft (Cann-i.).
 - Spärliche, faulig riechende, dünne, klebrige, ätzende Absonderungen.
 - Deutliche familiäre Disposition zu rheumatoider Arthritis und Hautkrankheiten.
 - Deutliche persönliche Vorgeschichte von hartnäckiger Verstopfung.
 - Neigung zu Erysipel (Apis., Bell., Euph., Lach.).
 - Neiauna. sich schnell zu erkälten.

HEKLA LAVA

(Asche des Hekla-Vulkans auf Island - Hekla)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Ein wichtiges syphilitisches Mittel.
- ▶ Hilfreich in Fällen mit schwieriger **Zahnung**, Karies der **Zähne**, besonders von Milchzähnen, bei schlimmen Zahnschmerzen nach Zahnbehandlung oder wenn ein Zahn gezogen wurde.
- ▶ Verhärtete, geschwollene, schmerzhaftes Halslymphknoten.
- ▶ Anfällig für Abszesse an den Zahnwurzeln.
- ▶ Knochenkrebs bei Kindern, besonders Osteosarkome.
- ▶ Entzündung der **Knochen**, die zu Osteomyelitis führen kann.

HERKUNFT

- Dieses ungewöhnliche Arzneimittel wird aus der feineren Vulkanasche des Mount Hekla auf Island hergestellt und enthält Fluoride. Bei den größten Ausbrüchen dieses Vulkans mussten die Bauern ihre Höfe verlassen, da die Asche die Wiesen vernichtete und die Gase die Herden vergiftete.

HEDERA HELIX

(Gemeiner Efeu - Hed.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Drei wichtige Indikationen:
 - Knochenerweichung bei Kindern (Rachitis).
 - Liquoraustritt aus der Nase aufgrund einer Fraktur der Siebbeinzellen durch eine Kopfverletzung.
 - Hydrocephalus - chronischer Hydrocephalus entweder durch fieberhafte Entzündungen oder aufgrund tuberkulöser Meningitis.
- ▶ Das Kind muss immer ein paar Sekunden warten, bis es urinieren kann.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Araliengewächse (Araliaceae).

HELODERMA SUSPECTUM

(Gila-Krustenechse - Helo-s.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Wagemutig und extrovertiert; Gefühl nicht geliebt zu werden.
- ▶ Viele Rechtschreib- und Sprachfehler, lassen Worte aus oder schreiben sie falsch.
- ▶ **Neurologische Erkrankungen** bei Kindern, z. B. Tumoren im Kleinhirn und Entzündungen des Kleinhirns.
- ▶ **Linderung in fortgeschrittenen Fällen von Hirntumoren** bei Kindern, z. B. bei einem Medulloblastom, Gliom des Hirnstamms oder einem Ependymom des vierten Ventrikels.
- ▶ Störungen des Gleichgewichts. Ruckartige Bewegung der unteren Gliedmaßen. Zittern am ganzen Körper beim Versuch zu gehen. Torkelnder Gang. Anheben der Beine viel höher als notwendig und beim Gehen ein Gefühl, als ob man auf Wolle schreitet.
- ▶ Große Schwäche und Gleichgewichtsstörungen beim Gehen durch Degeneration der **Vorderseitenstrangbahn** (Tractus spinothalamicus), Gefühllosigkeit von Fußsohlen und Händen, eisige Kälte von Füßen und Händen.

HERKUNFT

- Todd Rowe aus den Vereinigten Staaten hat dieses schöne Echsenmittel geprüft und damit der homöopathischen Welt ein wundervolles Arzneimittel geschenkt.

HIPPOMANES

(Pferdebrunst - Hipp.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Sehr wirksam bei **Wachstumsschmerzen**, besonders wenn die Kinder innerhalb kurzer Zeit sehr schnell wachsen und sich dann über große Schwäche in Händen und Fingern beklagen. Am meisten betroffen ist das **Handgelenk**.
- ▶ Große Schmerzen im Handgelenk begleitet von ausgeprägter Schwäche in Händen und Fingern.
- ▶ Juvenile rheumatoide Arthritis hauptsächlich im Handgelenk.
- ▶ Verlangen nach sauren Speisen und Abneigung gegen Süßigkeiten.

HERKUNFT

- Dieses Mittel wird aus Sedimenten der Allantois des Pferdes gewonnen (embryonaler Harnsack).

HYOSCYAMUS NIGER

(Schwarzes Bilsenkraut - Hyos.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Spielt ständig mit den Fingern (Kali-br., Merc., Tarent.).
- ▶ Hinterlistig, verbirgt Informationen über sich selbst.
- ▶ Fällt rasch ins Delir (Ars., Bapt., Bell., Crot-c., Op.) durch systemische Infektionen, Hypoxie, Hyperkapnie, Hypoglykämie, Flüssigkeits- und Elektrolytentgleisung, Enzephalopathie, Kopfverletzungen etc.
- ▶ Neidische und eifersüchtige Kinder mit dem ständigen Gefühl, dass andere vorgezogen werden oder dass Eltern und Lehrer für andere Partei ergreifen (Lach., Lyss., Nux-v.).
- ▶ Exhibitionismus: Kinder zeigen bewusst Fremden ihre Genitalien und masturbieren eventuell so, dass andere es sehen können (Bell., Phos., Stram., Verat.).
- ▶ Machen sich bei Exkursionen und Picknicks unter Gleichaltrigen beliebt durch unzüchtige Lieder und ebensolches Benehmen.
- ▶ Überschwänglich (Cann-i., Lach., Op.) in Gefühlen und Zuneigung.
- ▶ Vorgetäuschte Beschwerden (Bell., Lach., Op., Tarent.); körperliche oder psychische Symptome können absichtlich produziert oder vorgespielt werden, um in die Rolle des Kranken zu schlüpfen (Bell., Tarent., Verat.).
- ▶ Rivalitätskämpfe unter Kindern, da sie sehr besitzergreifend gegenüber ihren Freunden und Kameraden sind.
- ▶ Geschlechtliche Identitätsstörung, gegengeschlechtliches Verhalten, Vorliebe für Travestie bei Jungen, Mädchen wollen unbedingt Jungenkleider tragen.
- ▶ Geschwätzige Kinder (Dulc., Lach., Stram.), können keine Sekunde still sein; Spitzname „Quasselstrippe“.
- ▶ Vorwitzig-aufdringliche Kinder (Plb.) (ähnlich wie bei: „Dennis, Geschichten eines Lausbuben¹“).
- ▶ Sagt schmutzige und vulgäre Dinge in praktisch jedem Satz.
- ▶ Spezifisches Mittel beim Asperger-Syndrom (abgeschwächte Form von Autismus).
- ▶ Prahlt gern mit seinen mutigen Taten, waghalsigen Aktionen und sexuellen Erlebnissen mit anderen Kindern.
- ▶ Heftige Wutausbrüche (Bell., Hep., Nux-v., Stram.), bis zur Raserei und körperlichen Gewalt, beißt z. B. jeden, der ihm in die Quere kommt.
- ▶ Kinder, die gern über Sex reden, verbotene Filme anschauen oder im Internet nach pornografischen Seiten suchen (Lach., Phos., Plat., Staph.).

KÖRPER

- ▶ Fröstelig: Empfindlich gegen kalte Luft, kalten Wind und kaltes Wetter.
- ▶ Geistes- und Körpersymptome verschlimmern sich bei Neu- und Vollmond (Alum., Calc., Lyc.).

- ▶ Wird oft ohnmächtig, besonders nach Kopfverletzungen.
- ▶ Muskelzuckungen (Agar., Merc.) von Kopf bis Fuß.
- ▶ Ruheloses Schwächegefühl während und nach Stuhlgang und durch Sprechen.
- ▶ Neigung zu Blutungen mit hellrotem Blut (Acon., Ipec., Mill.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch **Misshandlung** - körperlich, sexuell oder verbal (Acon, Carc., Ign., Nat-m., Op.); Alleinsein oder Erregung des Gemüts (Zorn, Schreck, Kummer, Eifersucht, Ärger).
- **Unbeholfene Kinder; stolpern beim Laufen über Gegenstände** (Agar.).
- **Verhaltensprobleme und Verhaltensstörungen:** Beschimpfen und Beleidigen älterer Menschen; asoziales Verhalten; **Beißen** von Umstehenden, Familienmitgliedern, Nägeln (Nägelkauen), Gegenständen (Bell.); Fluchen (Anac., Nit-ac.); zerstörerische Handlungen wie das Zerschlagen von Gegenständen, Zerreißen von Kleidung (Stram.); Treten; Eigensinn; Streitsucht, mit dem Verlangen, andere zu schlagen (Nux-v.); Schreien in rasender Wut, beim Erwachen oder in der Nacht oder wenn sie berührt werden (Piat., Verat.); Wutanfälle.
- **Hinterlistige** (Lach., Nux-v.) und durchtriebene Kinder.
- **Schmutzige Kinder** (Am-c., Caps., Graph., Merc., Sulph.); urinieren und koten überall, spielen dann mit dem Urin und den Fäkalien und lecken manchmal daran oder verschlucken sie oder sie spielen mit Dreck, Matsch oder Tierkot.
- **Legastheniker** (Bar-c., Med., Phos.); machen viele Fehler beim Lesen, Sprechen oder Schreiben; vertauschen Wörter oder benutzen sie falsch.
- Furcht vor **Tieren** (gebissen, verletzt oder vergiftet zu werden), vor dem Alleinsein, der Dunkelheit, Hunden, Geistern, vor Höhen, offenen Plätzen, Ratten und Wasser.
- **Sinnloses, übertriebenes, lautes und albernes Gelächter** (Cann-i.).
- **Gierige Kinder**, die nach allem greifen, was ihnen angeboten wird.
- **Hyperaktive und ruhelose Kinder;** Verlangen im Raum herumzurennen oder überall hochzuklettern (auf Schränke, Bäume, den Balkon hinauf usw.); bleibt nicht im Bett, sondern springt immer wieder heraus.
- **Verlust der Sprache** nach erschreckenden Erlebnissen (Op., Stram.), z. B. wenn sie einen Streit der Eltern oder die Misshandlung eines Elternteils durch den anderen mit angesehen haben oder Zeuge eines Unfalls gewesen sind.
- Liebt es, andere zu Prügeleien und Streitereien **aufzustacheln** (Coloc., Plb.).
- **Boshaft;** erinnert sich lange Zeit an Verletzungen und wartet auf eine Chance es zurückzuzahlen.
- **Wutanfälle** oder Raserei mit rotem Gesicht (Bry., Staph.), Kneifen, Schreien, Stampfen mit den Füßen, Schlagen des Kopfes gegen die Wand (Bell., Mill., Tub.), Schlagen anderer (Cur., Stram.) und zusammenhangloses Sprechen. Dieser Zustand ist besonders in Fällen zu sehen, in denen das Kind sehr eifersüchtig auf ein neugeborenes Geschwisterkind ist und den Säugling verletzen möchte, um die verlorene Aufmerksamkeit der Eltern zurückzubekommen.

- Neigung zu **Klatsch und Tratsch** (Stram., Verat.) bei kleinen Kindern; lieben es, Gerüchte auszustreuen.
- Will alles **berühren** aus Neugierde und Ruhelosigkeit (Bell., Verat.).
- Liebevoll (Bell., Puls.).
- Antwortet schroff oder grob (Cic., Nux-v., Ph-ac.).
- Bulimie abwechselnd mit absoluter Nahrungsverweigerung (Ign., Nat-m.).
- Grundloses Stöhnen und Weinen bei Babys, sie sind nur durch Hin- und Herschaukeln zu beruhigen (Cham., Cina).
- Fröhlichkeit mit Tanzen, Lachen und Singen.
- Hellsichtigkeit (Anh., Crot-c., Phos.).
- Dauerndes Beschweren über dieses oder jenes.
- Neugierig und wissbegierig; stellt viele Fragen.
- Tanzen.
- Erschrickt beim Erwachen (Calc., Nat-m.).
- Fühlt sich verlassen, als ob er keinen wirklichen Freund auf der Welt hätte (der Grund dafür liegt im eigenen misstrauischen und eifersüchtigen Wesen).
- Hochmütig; sieht sich selbst als bedeutende Person (Cann-i., Verat.).
- Kleptomanie (Op.).
- Mangel an künstlerischer Begabung.
- Reißt Possen und zieht Grimassen mit albernem Gesten oder spielt andauernd mit den Fingern oder steckt sie in den Mund.
- Weigert sich gegen jede Medizin.

KOPF

- Heftige Kopfschmerzen: Durch Zahnung, Kältereinwirkung, Geräusche oder Sonne, Schreck, Kopfverletzung (Nat-s., Glon.) und **Masern** (Puls.); das Kind fühlt sich besser beim Gehen **im Freien** und wenn der Kopf eingehüllt ist.
- Muss den Kopf immer bedeckt haben (Hep., Sil.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Das Kind reibt sich dauernd den Kopf mit der Hand** (Tarent., Verat.).
 - Kann den Kopf nicht aufrecht halten; Kopf fällt zur Seite; muss den Kopf mit den Händen stützen.
 - Hydrozephalus.
 - Kernig-Zeichen ++.
 - MRT: Hirnblutung.
 - Rollen oder unwillkürliches Rucken des Kopfes oder Schlagen des Kopfes gegen Gegenstände.

ZNS PATHOLOGIE

Hyos. ist eine wichtige Arznei bei folgenden neurologischen Zuständen:

- Degenerative Hirnerkrankungen (Lipogranulomatose, Adrenoleukodystrophie = Schilder-Syndrom, Friedreich-Ataxie, Rett-Syndrom, Menkes-Syndrom, metachromatische Leukodystrophie).
- Enzephalitis (Arboviren: Japanische B-Enzephalitis, Östliche und westliche Equine Enzephalitis (EEE und WEE), Goxsackie, Rubella).
- Intrakranielle raumfordernde Prozesse (Tuberkulom, subdurale Hämatome,

- Fortschreitende Enzephalopathien, die geistige Behinderung verursachen (Phenylketonurie, Hurler-Syndrom, Tay-Sachs-Syndrom, Tuberosklerose, subakute sklerosierende Panenzephalitis).
- Verschiedene Formen von eiterbildenden oder bakteriellen Infektionen des ZNS (H. influenzae, Pneumokokken, Meningokokken, Staphylokokken, Streptokokken, E. coli) oder nicht-bakterielle Zustände (tuberkulös, viral etc.).

Häufige klinische Bestätigungs-Symptome bei o. g. ZNS-Pathologien

GEIST

- Beschwerden durch: Die Mutter entwickelte während der Schwangerschaft starke Emotionen wie **Eifersucht** (Nux-v., Puls.), Enttäuschung, Schreck oder erlitt irgendeinen psychischen Schock.
- Antwortet falsch, unzusammenhängend oder einsilbig; **Stupor kehrt schnell nach dem Antworten zurück** (Arn., Bapt., Op.).
- Delirium: Lachen; **redselig** (Lach., Stram., Verat.); murmeln (Stram., Zinc.); **zupfen an Nase oder Lippen** (Bry., Carbo-veg.; Ph-ac.); **erkennt niemanden** (Agar., Op., Stram.), schaukelt vor und zurück, möchte nackt sein (Merc., Phos.).
- Gesten: **Zupfen an Fingern** (Con., Kali-br.), **spielen mit den Fingern** (Asar., Tarent.).
- **Stöhnen während des Schlafs** (Aur., Bry., Calad.).
- Zupfen an der **Bettwäsche** (Hell., Op., Stram., Zinc.).
- **Spielerische Possen** (Androc., Lach.).
- **Schlägt sich an den Kopf** (Bell.).
- Bittet um nichts (Aur-m., Bry., Op.).
- Versucht zu fliehen (Agar., Bell.).
- Abneigung zu antworten (Glon., Manc., Ph-ac.).
- Wachkoma (Lach., Op.).
- Geistesverwirrung, wie berauscht (Bapt., Carbn-s.).
- Wahnidee, er sei weg von zuhause (Bry., Op.); dass er beobachtet wird (Ars.).
- Verlangen, im Bett zu bleiben.
- Furcht vor imaginären Dingen (Hell., Med.).
- Gieriges Greifen nach Dingen.
- Gleichgültigkeit; beklagt sich nicht (Op., Stram.).
- Unwillkürliche Handbewegungen.
- Gereizt, wenn er angesprochen wird (Cham., Nit-ac.).
- Übertriebenes, unwillkürliches und lautes Lachen (Agar., Bell.).
- Weigert sich, Medizin zu nehmen (Arn., Lach., Stram.).
- Schreien: Im Schlaf (Tub., Zinc.), bei Berührung (Merc.).
- Sprache: Verwirrt (Gels., Lyc.); unzusammenhängend (Lach., Stram.); laut (Bell., Op.) und banal (Merc.).

AUGEN

- **Pendelbewegungen** des Auges von einer Seite zur anderen (Agar., Bell., Gels.).
- **Pupillen erweitert** (Gels.).

- Glasig (Cupr.).
- Pupillen kontrahiert.
- Pupillen erweitert bei Hitze (Apis, Bell.).
- Strabismus.
- Wilder Blick (Lyss., Stram.).

NASE

- **Beim Schlucken von Flüssigkeit läuft sie zur Nase wieder heraus** (Lac-c., Kali-perm., Merc-cy.).

GESICHT

- **Zusammengepresste Kiefer** (Op., Stram.).
- **Rote** Verfärbung bei **Fieber** (Bell., Op., Stram.).
- Gesichtsausdruck: Verhärtet (Ars., Kali-c.), **trunken** (Gels., Lach.) oder **leer** (Anac., Hell.).
- Rissige Lippen.
- Kiefer fällt herab.

MUND

- **Verlangen, die Zähne zusammenzupressen** (Lyc., Phyt.).
- **Zähneknirschen im Schlaf** (Ars., Bac.).
- Saubere Zunge.
- Lähmung der Zunge (Both., Caust.).
- Sprache schwierig, unverständlich.

HALS

- **Würgen** beim Trinken und Schlucken (Lyc.).
- Aufgenommene Flüssigkeit wird zur Nase herausgedrückt.
- Schlucken: Behindert; unmöglich.

REKTUM

- **Durchfall mit gleichzeitigem unwillkürlichem Urinieren** (Ars., Carbo-veg., Stram.); im Schlaf.
- **Unbemerkter** Stuhlabgang (Aloe).
- Unwillkürlicher Stuhl, der wohlgeformt sein kann; erscheint besonders im Schlaf oder beim Urinieren.

BLASE

- **Harnunterdrückung bei Fieber** (Op., Plb., Stram.) (Hypovolämischer Schock).
- Harnverhaltung (Canth., Ter.).

ATMUNG

- **Lungenödem** (Ant-ar., Ant-t.).
- Keuchen (Phos., Verat-v.).
- Röcheln (Am-c., Spong.).

RÜCKEN

- Opisthotonus.

EXTREMITÄTEN

- **Frost beginnt im Rücken** (Caps., Dulc., Lach.).
- Anhaltendes Fieber (continua): mit **Stupor** (Mur-ac., Ph-ac.).
- Anhaltendes Fieber (continua): mit vollständiger **Bewusstlosigkeit** (Hell., Op.).
- **Konvulsionen mit Zähneknirschen** (Bufo).
- **Konvulsionen mit unwillkürlichem Urinieren** (Bufo, Cupr.).
- Schlaf, **Wachkoma** (Acon.).
- Anhaltendes Fieber (continua): Zerebral (Lach., Lyc.).
- Konvulsionen mit Kälte des Körpers (Hell., Verat.).
- Konvulsionen mit Lähmungen (Caust., Plb.).
- Konvulsionen mit Bewusstlosigkeit.
- Zuckungen.
- Lähmung, Hemiplegie.
- Puls schnell und klein.
- Schläft in Rückenlage (Bry., Nux-v., Puls.).

AUGEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Divergenter **Strabismus** (Jab., Nat-m.).
 - Pupillen **unempfindlich gegen Licht** (Cupr., Op.) oder abwechselnd verengt und erweitert bei gleichen Lichtverhältnissen.
 - Weitsichtigkeit.
 - Lähmung der äußeren Augemuskeln.
 - Gesichtsfeld: Hemianopsie (Halbseitenblindheit).
 - Rote und geschwollene Lider.
 - Rollende oder pendelartige Bewegungen der Augäpfel von einer Seite zur anderen.
 - Krampfartiges Schließen der Augen (Coloc., Merc.); das Kind hat Schwierigkeiten, die Augen offen zu halten.
 - Wilder (Camph., Carbo-veg.), glänzender oder glasiger Blick.

OHREN

- Beeinträchtigt Hörvermögen durch Lähmung des Hörnervs.
- Übelriechende Absonderungen aus dem Ohr.

NASE

- Schnupfen schlimmer in trockener kalter Luft.
- Niesen ohne Schnupfen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Beim Versuch zu schlucken, kommen **Flüssigkeiten aus der Nase wieder heraus**.
 - Trockene, ruß-schwarze Nasenlöcher (Ant-t., Hell., Lyc.).
 - Nasenbluten mit hellrotem Blut.

GESICHT

- Schweiß.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zusammengepresste Kiefer (Bell., Oena.).
 - Dunkelrot (Bapt., Op.).

- Kiefer fällt herab.
- Lippen trocken (Nux-m.), rissig (Sulph.) und bluten.
- Glänzend (Apis., Aur.).
- Eingefallen (Ars., Chin.).

MUND

- **Zähneknirschen im Zorn** (Kali-c.).
- Zunge fühlt sich schwer und steif an; **zittert beim Herausstrecken** (Lach., Thuj.) und einmal herausgestreckt, ist sie schwierig wieder hereinzuziehen, ohne dass sie sich zwischen den Zähnen verfängt.
- Beißt sich in die Wange beim Sprechen (Ign.) oder Kauen.
- Schwierige Zahnung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dauerndes Verlangen, die Zähne fest **zusammenzupressen** (Phyt.).
 - Hin- und **Herbewegen** der Zunge im Mund (Bufo).
 - Blutendes Zahnfleisch.
 - Trockene, rissige Zunge.
 - Reichlicher, schaumiger Speichelfluss.
 - Stottern mit lauter und mühsamer Aussprache von jedem Wort.

HALS

- **Aufgenommene Flüssigkeiten werden durch die Nase herausgedrückt** (Lac-c.).
- Schluckbeschwerden, besonders bei Flüssigkeiten (Lach., Lyss.), durch Spasmen oder mit Erstickungsgefühl.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verlängertes Zäpfchen.
 - Entzündeter und roter Rachen.
 - Hervorstehende und pulsierende Halsschlagadern (Bell., Glon., Op.).

MAGEN

- **Unstillbarer** Durst (Eup-per., Phos.); kann aber wegen Erstickungsgefühl und Unfähigkeit zu schlucken immer nur häufige, kleine Mengen aufnehmen.
- **Heftiger** Schluckauf schlimmer nach Stillen (Alum., Bry.) oder Mahlzeiten (eine sehr häufige Begleiterscheinung bei vielen neurologischen Störungen).
- Vergebliches Aufstoßen und Würgen bei Kolik.
- Übelkeit mit krampfenden Schmerzen im Bauch, gefolgt von schwarzem Erbrechen.
- Langsame Verdauung.
- Verschlimmerung: Kalte Speisen und Getränke.
- Abneigung: **Obst**, Süßigkeiten, Tomaten, Wasser.
- Verlangen: **Käse** (Chel., Cist.) und **unverdauliche Dinge** (Kreide, Ton, Kalk, Erde, Bleistift etc.).

ABDOMEN

- Kolik mit Verstopfung und eingeklemmten Blähungen; schlimmer nachts (Sulph.).
- Rumpelnde und gurgelnde Geräusche im Bauch mit durchfälligem Stuhl.
- Untersuchungsergebnisse:

REKTUM

- **Durchfall bei Typhus** (Ars., Bapt., Phos.).
- **Unwillkürlicher Stuhl** im Schlaf (Podo.), durch jede Form von Gemüts-erregung (Syc-co.) oder beim Urinieren (Mur-ac.).
- **Schmerzlose, gelbe**, klebrige, dünne oder **wässrige** Stühle, sehr übelriechend oder **fast geruchlos** (Verat.) bei Durchfall, der nachts schlimmer ist, im Schlaf oder durch Gemüts-erregungen (besonders Zorn).
- Begleitscheinungen von Durchfall: Leise murmelndes Delirium; saubere, ausgedörrte, trockene Zunge; viel Durst und spärlicher Urin.
- Setzt mit dem Stuhl Madenwürmer und Spulwürmer ab.
- Untersuchungsergebnis:
 - Stuhl: Eiter +.

HARNWEGE

- Dysurie (Apis) mit unwillkürlichem Tröpfeln bei Kindern.
- Spasmodisches Bettnässen (Gels.).
- Harnverhaltung oder -Unterdrückung, wie bei akutem Nierenversagen oder Urämie, besonders bei Neugeborenen (Acon., Apis., Ars.).
- Weißlich-graue oder rötliche sandartige Ablagerungen im Urin (Sep.).

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Ausgeprägte Neigung, bei jeder Gelegenheit zu masturbieren (Bufo, Med.), zeitweise sogar in der Öffentlichkeit.
- Gesteigertes sexuelles Verlangen mit häufigen Erektionen und Anfassen der Genitalien, sogar in der Öffentlichkeit.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Sehr frühe Menarche.
- Heftiges sexuelles Verlangen mit Neigung, bei jeder Gelegenheit zu masturbieren, zeitweise sogar in der Öffentlichkeit.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Reizung und Kitzeln im Kehlkopf beim Liegen im Bett (Spong.).
- Stimmverlust durch Schreck (Gels., Op.).
- Schleimrasseln in der Luftröhre.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Laryngismus stridulus (Bell., Gels., Ign.).
 - Raue heisere Stimme.

ATMUNG

- Atemnot, besser durch Aufrecht-sitzen.
- Schnappt nach Luft beim Husten (Cina, Dros.).
- Nützlich in Fällen von Asthma bei Neugeborenen und in Fällen von Neugeborenen-Asphyxie (Ant-t., Camph.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Langsame, unregelmäßige Atmung, mit lauter Einatmung.
 - Röchelnde Atmung nach Gehirnerschütterung oder Kopfverletzung.

HUSTEN

- **Anhaltender trockener Husten jede Nacht nach Masern** (Dros., Puls.).
- Trockener, harter, hackender, kitzelnder, krampfartiger, heftiger und erstickender Husten, in langen erschöpfenden Anfällen, begleitet von Nasenbluten; schlimmer **nach Mitternacht** (Dros.), durch Essen oder Trinken, in kalter Luft, **beim Liegen** (besonders mit tiefliegendem Kopf) (Ars., Chin.), Singen oder Sprechen; besser durch aufrechtes Sitzen im Bett.
- Während Husten: **Unwillkürliches Urinieren** (Caust), **rotes Gesicht** (Sang.) und **Würgen** (Carbo-veg.).
- Trockener Husten nachts, wird am Morgen locker (Puls., Sulph.).

BRUST

- Übelriechender Achselschweiß.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Heftige Erschütterung der Brust beim Husten** (Lact, Phos.).
 - Atelektasen (Ant-t., Sulph.).
 - Bronchitis.
 - Lungenödem.
 - Rheumatische Endokarditis (Aur., Kalm.).
 - Krämpfe der Brust zwingen das Kind, sich nach vorne zu beugen (Ph-ac.).

RÜCKEN

- **Nackenschweiß** im Schlaf (Calc., Phos., Sanic.).
- Meningitis spinalis (Apis, Gels.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Steifheit der Zervikal region, nach hinten gezogener Kopf (Bell., Cimic., Op.).

EXTREMITÄTEN

- Ungeschicklichkeit der Glieder; lässt Dinge fallen (Apis, Bov., Stram.), stößt gegen Dinge und stolpert beim Gehen.
- Schweiß der unteren Gliedmaßen (Phos., Zinc.).
- Krämpfe und Kontraktionen in Oberschenkeln, Waden, Fingern, Zehen etc.
- Zucken von Händen und Füßen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Daumen eingeschlagen (Bell., Bufo, Glon.).
 - Gebeugte untere Extremitäten; entweder ist der Unterschenkel gegen den Oberschenkel (Plb.) oder der Oberschenkel zum Abdomen (Cupr., Merc-c.) gezogen.
 - Ruhelosigkeit der Hände, besonders der Finger (Kali-br., Zinc.).
 - Fest geballte Fäuste, Finger lassen sich nur schwer wieder ausstrecken (Myotonie).

SCHLAF

- Im Schlaf: Verkrampfte Finger, konvulsivische Bewegungen, reichlich Nackenschweiß (Calc., Sanic.), Zähneknirschen (Cina), Lachen oder Lächeln, Stöhnen, Murmeln, offene Augen, Schreien, Schnarchen, Schluchzen beim Weinen, Zusammenzucken wie durch Schreck, Sprechen und lautes Beichten, Zucken (besonders der Füße) und Wimmern.

- Erschöpft und schläfrig durch die geringste geistige Anstrengung.
- Reizbar und ruhelos mit Schlaflosigkeit; das Kind will ständig von einem Bett in das andere wandern.

FIEBER

- Frost:
 - Aufsteigender Frost (Sabad., Sulph.), beginnt in den Füßen oder im Rücken und steigt nach oben.
 - Frost ist begleitet von Abneigung angesprochen zu werden (Cina, Sil.), kalten Händen, Wunsch aus dem Bett zu steigen, Reizbarkeit, rotem Gesicht (Bell.), Harnverhaltung, Geräuschempfindlichkeit (Caps., Gels.) und starrendem Blick.
 - Frost ohne Durst.
 - Schlimmer nachts im Bett.
 - Besser durch äußere Wärme.
- Hitze:
 - Hitze mit innerem Brennen (besonders im Kopf gefühlt) aber bei Berührung fühlt sich der Körper äußerlich kalt an. Maximale Hitze wird im äußeren Ohr, Gesicht, Hals und in der Stirn gefühlt.
 - Das Hitzestadium ist begleitet von Abneigung gegen Gesellschaft, Rückenschmerzen, klonisch-tonischen Konvulsionen, Geistesverwirrung, Wachkoma, Delirium (entweder wildes und heftiges Delirium mit Verlangen, nackt zu sein oder absolute Stille), trockenem Husten (der das Fieber verschlechtert), trockener weißer oder brauner Zunge, abwechselnd rotem und blassem Gesicht, dumpf und schläfrig, häufigem Stuhldrang, Kopfschmerzen, gesteigertem Appetit, undeutlicher und unartikulierter Sprache, unwillkürlichen Handbewegungen (Streichen über das Gesicht, Greifen oder Zupfen an der Bettwäsche, Tasten im Dunkeln, Aneinanderreiben der Hände, Spinnen und Weben), Spielen mit den Genitalien, faulem Mundgeschmack, betäubendem Schlaf, Stupor, Harnverhaltung mit vergeblichem Harndrang, Zittern und Zucken, großem Durst mit Abneigung Wasser zu trinken und nimmt deshalb immer nur sehr kleine Schlucke. Die Haut fühlt sich trocken und heiß an.
 - Hitze beginnt am Abend und bleibt die ganze Nacht mit Schlaflosigkeit (Apis, Rhus-t.) und sehr hoher Temperatur.
 - Verlangen, sich aufzudecken.
- Schweiß (falls vorhanden):
 - Reichlicher, kalter, schwächender, saurer Schweiß.
 - Schweiß besonders auf dem Rücken (Chin.).
 - Schlimmer nachts im Schlaf.
- Durchfall mit Lungenentzündung bei Typhus.
- Nützliches Mittel bei Dengue-, Ausschlags- oder Typhus-Fieber.

HAUT

- Beschwerden durch unterdrückte Hautausschläge (Bry., Psor.).
- Roter Ausschlag mit Jucken, das durch Kratzen unverändert bleibt (Puls., Spong.).

- Untersuchungsergebnis:
 - Purpura haemorrhagica.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Zahnung (Kali-br.), Fieber, Gemüts-**erregung** (Cic.), Zorn, **Schreck**, Kummer, unterdrückte Hautausschläge und **Würmer** (Stram.).
- Vor Konvulsionen: Heißhunger, Ruhelosigkeit, **Schreien** (Cupr.), Sehstörungen.
- Während Konvulsionen: Verkrampfte Kiefer, Finger und Daumen; begleitet von bläulich-rotem oder sehr **blassem Gesicht** (Verat.), kalter Haut, Husten, Delirium, Doppeltsehen, steifen und krampfhaft nach oben gezogenen Extremitäten, **Schaum vor dem Mund** (Art-v.), **Zähneknirschen** (Bufo), **Anfassen der Genitalien**, **Schluckauf** (Ran-b.), heftiges Fieber, **unwillkürliches Urinieren** (Caust., Zinc.) **oder vollständige Harnverhaltung**, Bewusstlosigkeit, Opisthotonus, Schreien, tetanische Starre, Erbrechen und Weinen.
- Nach Konvulsionen: Fieber, Tiefschlaf (Op.), einseitige Lähmung (Caust., Cic.), Heißhunger (Coc-c.).
- Stupor bei Hydrozephalus (Apoc.), in dem das Kind korrekt antwortet, wenn es gefragt wird, aber sofort wieder in Stupor verfällt.
- Schlimmer nachts, nach dem Essen (Arg-n.) oder Trinken.

CHOREA

- **Chorea schlimmer durch Essen** (Ign.).
- Das Kind neigt dazu, sich **albern und töricht** zu verhalten mit starkem Hang zu lachen.
- Dauernde Chorea mit Muskelkrämpfen, Zucken oder Rucken nach übermäßigem Tanzen (Bell., Stram.); können einfach nicht still bleiben.
- Das Zucken ist hauptsächlich auf das Gesicht, die Augenlider und die oberen Extremitäten beschränkt.

ALLGEMEINES

- Beschwerden durch: Nasswerden des Kopfes (Puls.); **Verletzungen** (Erschütterung des Kopfes, Biss eines tollwütigen Hundes); Masturbation (Chin., Phac.); unterdrückten Schweiß.
- **Koma mit abwesenden „Puppenaugen“-Bewegungen nach Kopfverletzung.**
- Lähmende Schwäche bei jeglichem akuten anhaltenden Fieber; das Kind kann sich nicht im Bett aufsetzen, **rutscht herunter** in halb liegende, halb sitzende Position.
- Fröstelige Kinder mit Neigung, sich leicht zu erkälten; schlimmer durch die geringste Kälteeinwirkung oder Wind; besser am Meer (Med.).
- Kollaps mit Zyanose.
- Wird schnell und oft ohnmächtig.
- Puls: Schnell, voll, hart, groß und kräftig.

HERKUNFT

Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae).

ICTODES FOETIDA

(Stinkkohl - Ictod.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Asthma und Atemprobleme bei Säuglingen und Kindern, ausgelöst durch Einatmen von Staub. Besser nach Stuhlgang.
- ▶ Wachstumsschmerzen, die ständig den Ort wechseln.

HERKUNFT

- Synonym: *Pothos foetidus*. Gehört zur Familie der Aronstabgewächse (Araceae).

IGNATIA AMARA (Ignatiusbohne - Ign.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Erträgt nicht den geringsten Tadel; sobald man das Kind schimpft, entwickelt es sofort Symptome wie Bettnässen, Husten, Fieber, Konvulsionen etc. (Carc., Staph.).
- ▶ Kinder, die unter Druck gesetzt werden, noch mehr zu lernen, entwickeln oft Ign.-Symptome. Weil sie aufgeweckt, klug, frühreif und erfolgreich sind, wird immer mehr von ihnen gefordert. Sie kommen häufig aus armen Familienverhältnissen und müssen mit einem Stipendium durchkommen; wenn sie versagen, machen sie sich selbst dafür verantwortlich und werden ganz depressiv oder melancholisch.
- ▶ Reservierte, unnahbare Kinder; sie haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle auszudrücken; oft lachen sie albern oder sind zwanghaft gut gelaunt.
- ▶ Emotional instabil (Nat.-m.): Rasch wechselnde Emotionen, Freude kehrt sich in Leid oder Lachen schlägt in Weinen um (Coff., Croc., Nux.-m.).
- ▶ Großer Kummer nach Verlust geliebter Personen oder Dinge, z. B. Tod der Eltern, eines Familienmitgliedes, Haustieres, Verlust des Lieblingsspielzeugs.
- ▶ Ziehen sich häufig zurück und brüten in Gedanken über Probleme, Ärger und emotionale Verletzungen, die sie einstecken mussten.
- ▶ Hochgesteckte Ziele, große Ambitionen und hohe Ideale; mit brennendem Ehrgeiz und vorsichtigem, gewissenhaftem, pingeligem und perfektem Verhalten streben sie nach ihrer Erfüllung.
- ▶ Sanfte und sensible Kinder, die schnell begreifen und das Gelernte rasant in die Tat umsetzen (Vergleiche Puls.: Auch sanft und sensibel, aber langsam und unentschlossen).
- ▶ Das Mittel wird in der Praxis gern und häufig bei Kindern verordnet, deren Mutter in der Schwangerschaft verärgert und gedemütigt oder vom Ehemann misshandelt wurde.
- ▶ Verfeinerte und zarte Kinder.
- ▶ Romantische Kinder, die sehr sentimental werden können, gerne gefühlvolle Lieder hören und sentimentale Filme und Liebesromane mögen.
- ▶ Kopfschmerzen, die meist gegen Tagesende auftreten und sich vor Prüfungen verschlimmern.
- ▶ Emotional rasch erregbar; wenn man dem Kind in diesem Zustand auch noch widerspricht, bricht es entweder zornig in Tränen aus oder wird untröstlich traurig.
- ▶ Das Kind kann dieses hohe Arbeitstempo aber nicht dauernd durchhalten und langsam spielen dann die Nerven nicht mehr mit: Es treten Prüfungsängste und Gedächtnislücken auf.

- ▶ Das Gesicht nimmt einen seltsamen Ausdruck an, es können Grimassen auftreten, schließlich entwickeln sich auch Sprachstörungen wie Stimmeln und Stottern.
- ▶ Die Handschrift verschlechtert sich und wird zittrig; die Feinmotorik beginnt zu leiden.
- ▶ Große Schreckhaftigkeit.

KÖRPER

- ▶ Fröstelige Kinder, die nicht an die frische Luft wollen.
- ▶ Beißt in die Wange beim Sprechen oder Kauen.
- ▶ Schweiß im Gesicht beim Essen (Nat-m., Sulph.).
- ▶ Punktuelle Schmerzen (Kali-bi., Ox-ac.).
- ▶ Rektum-Prolaps durch Pressen beim Stuhlgang oder bei Durchfall.
- ▶ Muskelzucken beim Einschlafen.
- ▶ Allgemein nützliches Mittel bei widersprüchlichen Symptomen: z. B. Geräuschempfindlichkeit besser bei Musik; Halsschmerzen besser durch Schlucken; Leeregefühl im Magen nicht besser durch Essen; Husten verschlimmert sich, je mehr er hustet; krampfartiges Lachen bei Kummer; durstig bei Frost und durstlos bei Fieber; Gesichtsfarbe wechselt in Ruhe und nicht beim Aufstehen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch Beleidigungen, Bestrafung oder Tadel; sexuellen Missbrauch; **Tod** von nahen und geliebten Menschen (Großeltern, Eltern oder Freunde); Widerspruch; **betrogene Freundschaft** (Nat-m., Ph-ac.); **Enttäuschung** (Aur., Merc., Puls.); Gefühle wie Schreck, Entrüstung, Eifersucht oder Kränkung; Versagen.
- **Abwechselnde Symptome** (Nat-m., Puls., Thuj.); Wechselhaftigkeit der Stimmung, Wechsel von gegensätzlichen Gemütssymptomen oder von Geistes-symptomen mit körperlichen Symptomen etc.
- **Ungeschicklichkeit** (Apis, Nux-v.); lässt ständig Dinge fallen.
- Kann es nicht ertragen, **getröstet** zu werden (Calc-p., Sil.), Trost verschlechtert.
- **Tagträumer** und geistesabwesend; hat Schwierigkeiten, seine Aufmerksamkeit auf den Unterricht zu lenken.
- Verlangen, getragen zu werden, aber **hasst es, liebkost zu werden** (Cina).
- Furcht vor **Vögeln** (Bufo), Hühnern, **Ärzten** (Stram., Thuj.), auf der Bühne zu stehen, engen Plätzen, Räubern und Spinnen.
- **Furcht vor Zurückweisung** (Caps., Nat-m.); **Verlassenheitsgefühl**.
- **Unwillkürliches Seufzen** (Calc-p.) mit traurigem Gesichtsausdruck.
- **Eifersucht** mit Enttäuschung (Hyos., Lach.) nach der Geburt eines neuen Geschwisterchens, das einen großen Teil der Aufmerksamkeit der Familie erhält.
- **Zurückhaltender Unmut** (Ipec., Staph.) gegenüber denen, die ihn beleidigt

- **Stiller Kummer** mit Unfähigkeit zu weinen (Cycl., Mur-ac., Puls.).
- Sehr **gewissenhaft**, mit starkem **Pflichtgefühl**.
- Verwegenheit.
- Launisch und voller Wünsche, aber weist zurück, was er gewünscht hat, wenn es angeboten wird.
- Das Kind hat einen starken Widerwillen gegen gedeckte und dunkle Farbtöne wie Schwarz, Grau, Dunkelbraun und dunkles Orange; hat gerne alle Kleider und Spielsachen in Farben wie Zitronengelb, Hellgrün, Hellblau oder Rosa.
- Herausfordernde Kinder, die plötzlich über Kleinigkeiten zornig werden, besonders wenn ihnen widersprochen wird, ansonsten sehr fröhlich.
- Destruktivität (beginnt vor allem, Kleidung zu zerreißen) durch unterdrückte Gefühle wie Zorn oder Enttäuschung.
- Legasthenische Kinder; machen viele Fehler beim Sprechen oder Schreiben, besonders durch Eile.
- Simuliert Krankheit.
- Heimweh.
- Übertriebenes Lachen, der Situation nicht entsprechend.
- Reist gern.
- Altkluge, ruhelose und hyperaktive Kinder; müssen immer beschäftigt und dauernd in Bewegung sein.
- Geheimnistuerisch, verschlossen.
- Selbstherabsetzung.
- Empfindlich auf Musik, Gerüche, Meinungen anderer, Schmerz, Vorwürfe sowie das geringste Geräusch.
- Schüchterne, verschämte und sanfte Kinder, die sich sehr schnell verlegen fühlen.
- Kleine Kinder weinen leicht mit lautem Schluchzen, sobald sie ermahnt werden oder wenn etwas verweigert wird.

KOPF

- Migräne, begleitet von unnatürlichem Hunger (Leeregefühl im Magen). Kopfschmerzen sind **zeitweilig besser durch Essen** (Sep.), aber kehren mit größerer Heftigkeit kurz nach dem Essen zurück. Das Kind zeigt auf seine **Stirn** als dem schmerzhaftesten Teil (Bry).
- Periodische Kopfschmerzen, besonders im Hinterkopf und der rechten **Stirngegend**, mit trüber Sicht und Tränenfluss; schlimmer bei Zahnung, **Erregung des Gemüts**, Einwirkung von kalter Luft oder Wind, durch **Schreck, Kummer**, beim Erwachen am Morgen, beim Bücken, starken Gerüchen, Sonne, Berührung, **Ärger** (Mez.); besser durch festes Umhüllen des Kopfes, **Schließen der Augen** (Bry., Sil.) **und absoluter Ruhe**, reichlichem Urinieren, warmem Einwickeln und warmen Anwendungen.
- Haarausfall nach Kummer (Ph-ac.).
- Kopfschmerzen nach Weinen aufgrund von schwerer Enttäuschung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kann den Kopf nicht aufrecht halten.
 - Hydrozephalus.
 - Unwillkürliches Nicken oder Bewegungen des Kopfes; Rucken von einer Seite zur anderen.

- Kernig-Zeichen +.
- Meningitis.

AUGEN

- Trübsichtigkeit mit Tränenfluss beim Lesen.
- Augenentzündung bei Kleinkindern.
- Tränenfluss beim Gähnen (Nux-v., Sabad.).
- Photophobie mit Tränenfluss im Sonnenlicht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Pendelartige Bewegungen der Augäpfel von einer Seite zur anderen.**
 - Trübung der Hornhaut.
 - Augen halb geöffnet.
 - Unwillkürliches Zwickern.
 - Pupillen abwechselnd verengt und erweitert bei gleichen Lichtverhältnissen.
 - Eingesunkene oder hervorstehende Augen.
 - Zittern der Augenlider beim Schließen derselben (Merc.).

OHREN

- **Ohren sehen rot aus, und fühlen sich innerlich heiß an, sind aber bei Berührung kalt.**
- Katarrh der Eustachischen Röhre.
- Beeinträchtigtes Hörvermögen nach Demütigung.
- Mittelohrentzündung bei Kindern.
- Untersuchungsergebnis: Ein Ohr kalt, das andere heiß.

NASE

- **Kalte Nase** (Camph., Carbo-veg.), empfindlich gegen die eingeatmete Luft.
- Empfindlich auf starke Gerüche.
- Katarrh erstreckt sich zu den Stirnhöhlen.
- Wundmachende, eitrige Absonderung.
- Flüssigkeiten kommen beim Versuch zu schlucken wieder aus der Nase heraus.
- Einseitige Verstopfung der Nase.
- Untersuchungsergebnis:
 - Nasenbluten mit dunklem, klumpigem Blut.

GESICHT

- **Kalter Schweiß, besonders an der Oberlippe (Med)., beim Essen.**
- **Zucken der Mundwinkel** (Bry., Op.).
- Kieferverrenkung tritt leicht ein.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Vermehrte Gesichtsbehaarung bei kleinen Mädchen** (Sep., Thuj.).
 - **Eingefallenes** Aussehen mit bläulichen Augenringen.
 - Trockene, rissige Lippen mit schuppigen Ausschlägen in den Mundwinkeln.
 - Das Gesicht verzerrt sich beim Sprechen.
 - Verhärtung und Schwellung der Ohrspeicheldrüse und der submaxillären Lymphknoten, besonders rechts.
 - Eine Wange heiß und rot, die andere blass.
 - **Bleibung um den Mund**

MUND

- Tendenz, **sich in die Zunge zu beißen** beim Kauen oder Sprechen.
- Schwierige Zahnung mit frühzeitiger Karies und schwarzer Verfärbung der Zähne.
- Speichelfluss bei Kopfschmerz (Merc.).
- Zahnschmerzen nach Erkältung; schlimmer sofort nach dem Hinlegen, am Morgen beim Erwachen, im Winter und beim Kauen; besser durch Liegen auf der schmerzhaften Seite.
- Sehr empfindliche Zähne (Mag-c., Sil.); das Kind kann keine Zahnbehandlung ertragen; weint und heult schon vor dem Betreten der Zahnklinik.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufrechte, rote Papillen auf sauberer, trockener Zunge mit Zahneindrücken, Zunge zittert beim Herausstrecken.
 - Mundgeruch.

HALS

- **Schluckbeschwerden, bei denen es für das Kind schwerer und schmerzhafter ist, Flüssigkeiten zu schlucken als feste Nahrung.**
- Gefühl von Zusammenschnürung oder Ersticken durch einen Fremdkörper oder **Kloß im Hals** (Nat-m., Psor.); schlimmer abends, muss ständig schlucken, was bessert.
- Kann aufgrund des Würgegefühls keine Kleidung um den Hals ertragen (Apis, Lach., Spong.).
- Aufgenommene Flüssigkeiten werden durch die Nase ausgestoßen.
- Halsschmerzen, erstrecken sich beim Schlucken zum Ohr.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Follikuläre Tonsillitis mit Vereiterung.
 - Schmerzhaftes Halsdrüsen.
 - Roter Rachen.
 - Torticollis.

MAGEN

- **Bulimie, wenn traurig oder Anorexia nervosa aufgrund von Kummer** (Aur.).
- Verdauungsstörung mit Gurgeln, vergeblichem Würgen und krampfenden Schmerzen im Abdomen; **schlimmer durch Gemütsbewegungen** (Zorn, Schreck, Kummer, Ärger), warmes Essen oder die leichteste Berührung des Bauches; besser nach Essen; nach saurem Aufstoßen oder in Rückenlage.
- Übelkeit und Erbrechen nach Essen, bei Zahnung oder durch **Gemütsbewegungen** (Zorn, Schreck, Kummer, Ärger).
- **Anfallartiger Schluckauf** bei Säuglingen nach Essen oder Trinken oder nach Gemütsbewegungen wie Zorn oder Schreck.
- Wechselhafter Appetit; heißhungrig zu merkwürdigen Uhrzeiten (11 Uhr vormittags oder in der Nacht) und verringert bei den Mahlzeiten.
- Langsame Verdauung.
- Magenbeschwerden sind schlimmer um 11 Uhr: gesteigerter Appetit, Übelkeit etc.
- Verschlimmerung: Kalte Speisen und Getränke, **Kaffee** (Caust., Cham.), **Gurken** (Sul-ac.), trockene Speisen, Eier, Obst, heiße oder warme Getränke, Milch,

- Verbesserung: Heiße Speisen, rohe Speisen, Essig.
- Abneigung: Brot, Käse, gekochtes Essen, **Obst** (Chin., Phos.), **Fleisch** (Calc., Graph.), **Milch** (Nat-c.), saures Essen und warmes Essen.
- Verlangen: Brot, Brot und Butter, Butter, Kaffee (Bry.), kalte Speisen und Getränke, Fett, unverdauliche Dinge (Kreide, Holzkohle, Ton, Erde, Kalk, Kohle, Bleistift), sauer Eingelegtes, rohe Speisen, **Roggenbrot**, saure Speisen, saures Obst, **kräftiger Käse**, Süßigkeiten, **Tomaten** (gekocht oder roh).

VERDAUUNGSSTÖRUNGEN UND KOLIK-SYNDROM

- Eine Mischung aus **Leere** und **Auftreibung** des Abdomens, die das Kind nicht genau erklären kann. Das Gefühl kann sich in milden Lufthunger mit häufigem Seufzen verwandeln oder es kann zur Kolik wechseln, die durch Essen besser wird (Graph., Nat-c.).
- Kolik bei Stillkindern, deren **Mütter** unter **Kummer** leiden.
- Dauernder Wunsch an etwas zu **knabbern** (Chin.).
- **Übermäßiger Speichelfluss** und saurer Mundgeschmack sind wichtige Begleitsymptome.
- Die Symptome der Verdauungsstörung sind oft besser durch ein saures Getränk, **Zitrusfruchtsäfte** oder saures Essen (wie Mixed Pickles, Essiggurken).
- Nach der Mahlzeit kommt es zu plötzlichem Hochwürgen der Nahrung, begleitet von Aufstoßen.
- Nahrungsverlangen und -abneigungen sind sehr wechselhaft; ein paar Tage lang sehnen sie sich nach etwas; dann verschwindet das Verlangen vollkommen für die nächsten paar Tage und wird schließlich zur Abneigung.
- Unstillbares Verlangen nach Brot.
- Nervöse Verdauungsstörungen, die durch absolute Abneigung gegen das Füttern oder übertriebenes Füttern gekennzeichnet sind.
- Das Kind ist zu Beginn der Mahlzeit recht hungrig, aber mittendrin verschwindet plötzlich alles Nahrungsverlangen.
- Unkontrollierbare, anhaltende Schluckaufanfälle (Cic.), die zeitweise durch Essen gebessert werden.

ABDOMEN

- Krampfende und kneifende Bauchschmerzen bei gestillten Säuglingen und Kleinkindern; schlimmer nach Aufregung, nach Zucker (Ox-ac.), nachts, während des Stuhlgangs; besser durch Druck oder **beim Sitzen in leicht gebeugter** Position; mit Abgang von reichlichen **übelriechenden Blähungen**.
- Reizdarmsyndrom oder Colitis Ulcerosa nach Kummer.
- Gelbsucht nach Zorn (Nat-s).
- Schmerzhafte Auftreibung des Abdomens, durch eingeklemmte Blähungen, mit Rumpeln nach dem Essen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Leistenbruch** (Nux-v.).
 - Vergrößerte, harte und tastbare Leber und Milz.
 - Gurgelgeräusche aus dem Abdomen.

REKTUM

- Verstopfung **auf Reisen** (Alum., Op.) mit vergeblichem Drang und Pressen sogar bei **weichem Stuhlgang**.
- **Schmerzloser**, plötzlicher, schwallartiger Durchfall durch Zahnung oder **Gemütsbewegungen** (Zorn, Schreck, Kummer, Nervosität) (Gels., Coloc.); schlimmer im Stehen (Aloe).
- **Rektumprolaps** während und nach Stuhlgang.
- Anhaltender oder häufiger StuhlDrang, unmittelbar nach dem Stuhlgang.
- Unwillkürliche Stühle beim Abgang von Blähungen (Ph-ac., Verat.).
- Jucken um den After, schlimmer nachts, wenn das Kind im Bett warm wird.
- Rektalfissuren mit Blutungen nach Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ekzeme um den After (Nit-ac.).
 - Wundheit des Perineums.
 - Offener After mit leichtem Ödem und Feuchtigkeit um ihn herum.
 - Spasmen des Rektums (Crot-t.).
 - Stuhl: Madenwürmer, Spulwürmer und Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Häufiges und reichliches Urinieren mit Kopfschmerzen.
- Unwillkürliches Urinieren bei Husten.
- Spasmodisches nächtliches Bettnässen.
- Harnverhaltung durch Schreck (Op.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Urin: Zucker +.
 - Der Urin hinterlässt weißliche oder lehmfarbene Sedimente in der Windel.

MÄNNLICHE / WEIBLICHE GENITALIEN

- Reichlicher Schweiß in der Genitalregion.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Reizung und Kitzeln im Kehlkopf wie durch Staub; wird schlimmer beim Husten, so dass das Kind den Hustenreiz unterdrücken will.
- Hysterische Aphonie.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Glottisödem (Crot-h.).
 - Laryngismus stridulus.
 - Leise, schwache, zittrige Stimme.
 - Rasseln von Schleim in der Luftröhre.

ATMUNG

- Die Atmung setzt aus und das Kind schnappt beim Husten oder Weinen nach Luft (Cina).
- Atemnot oder Asthma durch Gemütsregung (besonders Zorn, Kummer oder Demütigung); schlimmer abends gegen 17 Uhr, beim Husten oder in Seitenlage; besser in Rückenlage (Psor.).

- Untersuchungsergebnisse:

- Cheyne-Stokes-Atmung.
- Unregelmäßige, ungleichmäßige und pfeifende Atmung; mit lauter Einatmung und forcierter, langsamer Ausatmung; mal langsam mal schnell.
- Stöhnende, rasselnde und seufzende Atmung.

HUSTEN

- Trockener, hackender, hohler, erstickender und heftiger Husten, in kurzen und häufigen Anfällen, die **Tag und Nacht** aufzutreten scheinen, mit Übelkeit und Würgen; schlimmer nach Masern oder durch **Gemütsbewegungen** (wie Zorn, Schreck, Demütigung oder Ärger); besser durch Positionswechsel des Säuglings oder Kindes im Bett.
- Der Husten scheint ausgelöst zu werden durch ein reizendes, kitzelndes Gefühl im Kehlkopf, wie von Staub, das zunimmt, je mehr er hustet und auf diese Weise die Hustenanfälle verschlimmert.

BRUST

- Herzklopfen durch Kummer oder Ärger, schlimmer nach dem Essen, bei Schmerzen, morgens im Bett; besser durch Liegen auf der linken Seite.
- Untersuchungsergebnis:
 - Röntgen/Thorax: Pneumonische Verdichtungen.

RÜCKEN

- Nützlich in Fällen von Rückenschmerzen durch Sportverletzungen (Symph.); besser in Rückenlage.

EXTREMITÄTEN

- Ungeschicklichkeit mit der Neigung, beim Gehen zu stolpern und zu fallen.
- Chorea durch Schreck (Caust., Kali-br.).
- Hysterische Lähmungen aufgrund von Kummer oder Ärger.
- Rucken und Zucken der Glieder nach Ärger.
- Schmerzhaftes Frostbeulen an den Füßen.
- Schmerzhaftes, brennendes Hühneraugen.
- Wandernde rheumatische Schmerzen mit Hitze der Gelenke (Kali-s., Lac-c.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Furunkel an den Oberschenkeln (Hep.).
 - Verkrampfte Daumen.
 - Gänsehaut an Unterarmen und Oberschenkeln.
 - Heiße Knie (Bar-m.).
 - Krampfhaftes, unwillkürliches Hochziehen der Glieder.
 - Handschweiß.
 - Zittern der Hände beim Ausstrecken nach vorne oder beim Schreiben.
 - Gelbe Nägel.

SCHLAF

- Im Schlaf: Kaubewegungen (Calc.); kaltes Gesicht und kalte Hände; Zähneknirschen; Gurren; Schluckauf; gestigerter Speichelfluss; Gliederzucken; Reden

Seligkeit; (Ambr.); Stöhnen; offener Mund; Schweiß; kurze, unregelmäßige und röchelnde Atmung; Schreien (Hyos.); Schnarchen; Stampfen mit den Füßen (Kali-c.); plötzliches Auffahren; Sprechen; Zucken der Hände; Wimmern (Cham.).

- Schlaflosigkeit durch dauernden Speichelfluss.
- Säuglinge mit scharfem Gehör, erwachen durch das geringste Geräusch.
- Können nur in Rückenlage mit den Händen unter dem Kopf schlafen (Nux-v.).
- Dauerndes, krampfhaftes Gähnen, sogar nach gutem Schlaf.
- Schläft bei der geringsten geistigen Anstrengung ein (Ars.) (z. B. beim Versuch, sich auf das Lernen zu konzentrieren oder Aufgaben zu lösen oder beim Lesen).
- Schlaflosigkeit durch Schreck, Kummer, Demütigung, Sorgen etc.
- Ruheloser, unbefriedigender Schlaf, durch anhaltendes Träumen, sogar beim Mittagsschlaf.

FIEBER

- Beschwerden durch: Gefühlserregungen (Zorn, Schreck, Kummer, Demütigung, Ärger etc.), Masern, Schmerzen, Würmer.
- Bei Frost:
 - Die Kälteschauer sind begleitet von Zähneklappern (Caps., Sulph.), kalten Füßen und Händen, erweiterten Pupillen, Gänsehaut, Kopfschmerzen (einseitig), Gleichgültigkeit (Phos., Sep.), Übelkeit, Gliederschmerzen, rotem Gesicht mit Spasmen, Traurigkeit (Ars., Puls.), Durst auf große Mengen kalten Wassers (Bry., Caps., Carbo-veg., Eup-per), Erbrechen und Weinen (Bell.).
 - Totale Kälte des Körpers, besonders im Nacken, Rücken und Gesäß; besser durch warme Raumtemperatur oder durch Zudecken.
 - Hände und Füße fühlen sich kalt an (Carc., Cupr.).
 - Heftige, schüttelnde Kälteschauer, beginnen im Abdomen (Apis, Bell., Camph.) oder in den Armen (Bell., Hell.).
 - Schlimmer abends, im Freien und im Herbst.
 - Besser durch äußere Wärme.
- Bei Hitze:
 - Das Hitzestadium wird begleitet von Furcht und Schreckhaftigkeit, Abneigung gegen Essen, galligem Erbrechen, Wechselhaftigkeit der Stimmung (Stumpfheit wechselt mit Erregung), sauberer Zunge, anhaltendem trockenem Husten (Ipec.), Delirium (Bapt.), Atemnot, Aufstoßen, Ausschlag auf den Lippen, Ohnmacht, Kopfschmerzen, Taubheit oder Schmerzen in den unteren Extremitäten, Ungeduld, Tränenfluss, Stöhnen (Mur-ac.), Schmerzen im Abdomen, tastbarer und empfindlicher Milz, roten Ohren (Caps.) und Gesicht (Stram.), Ruhelosigkeit und Herumwerfen im Bett, trauriger und schweigsamer Stimmung, Speichelfluss, Seufzen (Cham.), Schnarchen (Op.), Gesichtsschweiß, Durstlosigkeit mit Abneigung gegen Flüssigkeiten, Schwäche, Weinen und betäubendem Schlaf.
 - Trockene Hitze der vorderen Körperseite, mit kalten Händen und Füßen.
 - Innere Hitze mit äußerlichem Frösteln und Hautrötung.

- Schlimmer durch Husten, äußere Wärme (Puls.), nachmittags und durch Zudecken mit warmen Decken.
- Besser durch Aufdecken.
- Bei Schweiß:
 - Kalter Schweiß einzelner Körperteile, besonders der oberen Körperhälfte, schlimmer durch Aufdecken; reichlicher, blasser Urin; Übelkeit; und Durstlosigkeit.
 - Alle Symptome sind schlimmer während des Schwitzens.
- Hunger nach Fieber.
- Nützlich in Fällen von Fieber nach Chininmissbrauch, wenn die Anfälle häufig und unregelmäßig wechseln.
- Das Fieber beginnt meist spät am Nachmittag oder Abend und hält dann die ganze Nacht an.
- Das Kind muss aufgedeckt werden, sobald das Fieber beginnt (Acon., See.).

HAUT

- Vitiligo nach Kummer.
- Jucken der Haut durch Wärme oder Hitze, besser durch Kratzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dekubitus bei kleinen Kindern.
 - Gänsehaut.
 - Ikterus.
 - Intertrigo.
 - Die Haut fühlt sich kalt an, obwohl das Kind über innere Hitzewallungen klagt.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Zorn, Hustenanfälle, Arzneimittel, bei Zahnung, Aufregung, Fieber, Schreck, Kummer, Blutungen, Lärm, Schmerzen, **Bestrafung, Tadel, Ärger**, Würmer.
- Während Konvulsionen: Blutiger Schaum vor dem Mund, verkrampfte Daumen, Fallen nach hinten, Kopf wird nach hinten gezogen, Lachen, Stöhnen, Schreien, Starren, Weinen.
- Nach Konvulsionen: Fällt in Tiefschlaf, Fieber, gesteigerter Durst, Lachen und Schweißbildung.
- **Wechselhaftigkeit der Konvulsionen**, mit periodischer Wiederkehr.

CHOREA

- Beschwerden durch: Gemütsregung, **Schreck, Kummer oder Bestrafung**.
- Schlimmer nach Essen, durch Licht oder Geräusche; besser in Rückenlage.

ALLGEMEINES

- **Saure**, reichliche, **ätzende**, übelriechende, eitrige oder wässrige Absonderungen der Schleimhäute.
- **Frösteliges Kind** mit Erkältungsneigung und häufigen Sinusitiden; schlimmer durch kalte Luft, kaltes Baden, Zugluft, trockenes kaltes Wetter oder im Herbst, im Freien; besser durch Warmwerden, Drinnenbleiben, warme Luft, Ofenwärme.

- **Dauernde Abwechslung oder Wechselhaftigkeit der Symptome wird beobachtet.**
- Abneigung gegen Bewegung.
- Die Kinder sind überempfindlich gegen allopathische Medikamente.
- Unverträglichkeit von Kleidung oder Decken, besonders am äußeren Hals und dem Abdomen.
- Die meisten Beschwerden sind schlimmer durch Licht, Geräusche, Seitenlage; besser durch Essen, Rückenlage.
- Schmerzlose Schwellung und Verhärtung der Drüsen.
- Rechtsseitige Beschwerden.
- Schmerzempfindlichkeit.

HERKUNFT

- Familie der Brechnussgewächse (Loganiaceae).

INDIGO TINCTORIA

(Wilder Indigo - Indg.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Reflexstörungen infolge von Wurmbefall**, hauptsächlich Epilepsie und Gemütsstörungen.
- ▶ Konvulsionen durch eine Vorgeschichte von Angst oder Kummer. Sie kommen periodisch und eine typische epileptische Aura im Abdomen oder vom Solarplexus geht voran. Zornig, aufgeregt und nervös vor den Epilepsieanfällen, sanft wenn der Anfall vorbei ist.
- ▶ Unwillkürliche Bewegungen wie Zittern, Chorea, myoklonische Krämpfe.
- ▶ Permanenter Harndrang.
- ▶ Jucken am Anus bei Wurmbefall, besonders nach dem Essen oder in der Nacht oder bei Verstopfung.
- ▶ Sehr häufiges Gähnen.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler (Leguminosae).

ODOFORMIUM

(Trijodmethan - Iodof.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Viel Tuberkulose in der Vorgeschichte und miasmatische Belastung mit Tuberkulose in der Familie.
- ▶ **TUBERKULÖSE MENINGITIS.**
- ▶ Hinweise für dieses Mittel bei tuberkulöser Meningitis sind: Hydrocephalus, entsetzliche Kopfschmerzen, Aufwachen aus dem Schlaf, plötzliches Schreien, bei der Untersuchung des Augenhintergrundes stellt man eine Entzündung des Sehnervs fest, ständiges Schnüffeln in der Nase, aber keine Absonderungen, trockene Lippen, bitterer Geschmack im Mund, extrem unruhiger Schlaf, aufgedunsen und stuporös mit verengten Pupillen, beschleunigter Puls und zuckende Muskeln überall am Körper.
- ▶ Chronischer Durchfall bei Kindern mit tuberkulösem Miasma.
- ▶ Der Stuhl ist grün, unverdaut und wässrig, ausgeprägte Abmagerung bei Durchfall.

JABORANDI

(Rutakraut - Jab.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Wassereinlagerungen auf Grund von Lungen-, Herz- oder Nierenerkrankungen.
- ▶ **Präventivmittel bei Mumpsepidemien** oder während einer Mumpserkrankung. Metastasierung der Mumpserkrankung in die Brüste, Eierstöcke oder Hoden.
- ▶ Frühzeitig graues Haar bei Kindern.
- ▶ Augenerkrankungen, Sehschwäche durch geschwächten internen Rektusmuskel oder gestörten Akkomodationsreflex.
- ▶ Augenschmerzen, schlechter bei Anstrengung der Augen wie z. B. beim Lesen, Nähen oder Stricken.
- ▶ Schielstellung der Augen nach Operationen.
- ▶ Verschwommenes Sehen; trübes und nebliges Sehen oder Flecken vor den Augen beim Lesen.
- ▶ Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Choroiditis, Linsentrübung bei Kindern (Katarakt), trübes Sehen, entfernte Gegenstände sehen wie verschleiert aus.
- ▶ Schnelle Ermüdung der Augen.
- ▶ Fehlerhafte Akkomodation, gekennzeichnet durch Spannungsgefühl in den Augen und weiße Flecken vor den Augen.
- ▶ Dauernde plötzliche Veränderung der Sehkraft, alle paar Minuten mehr oder weniger trübe (Allen).
- ▶ Tränenfluss bei Schnupfen und während der Kopfschmerzen.
- ▶ **Viel Speichelfluss, Tränenfluss und flüssige Absonderungen aus der Nase mit reichlich wässrigem Durchfall sind die Schlüssel- Symptome von Jaborandi.**
- ▶ Übelkeit beim Schauen auf bewegte Gegenstände.
- ▶ Wurm befall.
- ▶ Bei chronischem Nierenversagen wird mehr und mehr Blut im Urin nachgewiesen.
- ▶ Reichliches Schwitzen, das an der Stirn und im Gesicht beginnt und sich dann über den ganzen Körper ausbreitet.
- ▶ Extrem frostige Kinder mit Erkältungsneigung.
- ▶ Heftiger Durst.

HERKUNFT

- Auch bekannt als *Pilocarpus jaborandi*, gehört zur Familie der Rautengewächse (Rutaceae).

JALAPA

(Jalapenknolle - Jal.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Das Kind schreit und kreischt unaufhörlich und scheinbar ohne jeden Grund.
- ▶ Schwitzen am Kopf.
- ▶ Glatte Zunge, wie glasiert und trocken.
- ▶ Durchfall während der Zahnung, gewaltsamer Stuhl, plötzlich überschwänglich und schlammartig mit saurem Geruch.
- ▶ Abneigung gegen Muttermilch.
- ▶ Verlangen nach Salz, Essig und Schokolade.
- ▶ Verdauungsstörungen bei Säuglingen.
- ▶ **Durchfall bei Kindern mit Schmerzen und Kneifen im Darm und Flatulenz.**
- ▶ Der Stuhl ist wässrig, riecht sauer und ist zeitweise blutig.
- ▶ Koliken vor und während des Stuhlgangs. Die meisten der Durchfallsymptome sind nachts schlechter. Dünner und schlammiger Stuhl.
- ▶ Aufgeblähter Bauch und wunder Anus.
- ▶ Tagsüber geht es dem Kind gut, aber nachts schreit es und wirft sich hin und her.
- ▶ Erkältungsneigung.

HERKUNFT

- Auch bekannt als *Exogonium purga*. Gehört zur Familie der Winden-gewächse (Convolvulaceae).

J ATROPH A CURCAS (Purgiernussbaum - Jat-r-c.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Ängstlichkeit mit Seelenqual, Erschöpfung und schwachen Krämpfen machen aus Jat-r-c. ein hervorragendes Heilmittel bei Cholera.
- ▶ Unstillbarer Durst.
- ▶ Großes Verlangen nach Limonade.
- ▶ Durchfall mit plötzlichem Stuhldrang, anhaltendem Rumpeln und Gluckern, als ob der Bauch voll mit Flüssigkeit wäre, besonders auf der linken Seite. Dabei Übelkeit mit Kälte des Körpers und kalter Schweiß.
- ▶ Massenhafter Stuhl, schmerzlos, vergoren, geruchslos mit geleeartigem Schleim.
- ▶ Spundloch-Durchfall, der Stuhl strömt heraus wie ein Tsunami.
- ▶ Plötzlicher weicher Stuhlabgang, eine Vielzahl von Spulwürmern und Madenwürmern wird mit ausgeschieden.

HERKUNFT

- Auch als *Atropha curcas* bekannt und gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae).

KALIUM BROMATUM

(Kaliumbromid - Kali-br.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Rasch Schuldgefühle** bei Themen wie Moral, Sex und Pflichtverletzung.
- ▶ **Nervöse Rastlosigkeit**; kann nicht stillsitzen, muss umherwandern oder beschäftigt sein.
- ▶ Viele psychosexuelle Probleme in der Pubertät bei Kindern, in deren Familien Sex als Tabu betrachtet wird.
- ▶ Nächtliche Panik bei Kindern, die furchtbare Traumbilder sehen, schreiend aufwachen und dann niemanden erkennen.
- ▶ Das Kind denkt, dass es den Zorn Gottes auf sich gezogen hat.
- ▶ Oft angezeigt bei Kindern mit streng religiösem Hintergrund, deren Erziehung durch strenge Vorstellungen von Moral, Verbrechen und Schuld geprägt ist.

KÖRPER

- ▶ Unruhige Hände (Tarent) und Füße.
- ▶ Fett, hellhäutig, lethargisch, schwerblütig und träge.
- ▶ Trotz aller Dumpfheit besteht eine gewisse Unruhe einzelner Körperteile.

DD: Kali-br.-Kinder sind ähnlich wie die Arzneimittelbilder von Ambr., Hyos., Mygal., Stram. und Tarent.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Antwortet einsilbig** (Ph-ac., Verat.) oder **antwortet auf alle Fragen mit „Nein“**.
- **Furcht in der Nacht**, besonders im Zahnungsalter.
- **Geistige Erschöpfung**; Gedächtnisverlust.
- **Kinder, die in der Schule von der Leistung her nicht gut mitkommen**; sie sind träge und es mangelt ihnen offenbar an Intelligenz.
- **Depressive Störungen, ausgelöst durch den Tod von geliebten Menschen.**
- **Frühzeitige Masturbation** mit enormen **Schuldgefühlen** (Staph).
- **Zappeligkeit** (Iod., Merc.); dauerndes Spielen mit den Fingern, Fummeln an seinen Schuhen oder der Kleidung, Zupfen mit den Fingern, Ringen der Hände (Stram.) etc.
- **Vergisst oder verdreht Wörter beim Sprechen und Schreiben.**

- **Die Schrift ist dürrig und undeutlich** (Kali-p., Merc.).
- Kinder, die beim kleinsten Anlass immer gleich losheulen.
- Trägheit und Langsamkeit; antwortet langsam, muss erst die Frage wiederholen.
- Ausgelassenheit (Hyos.).
- Sinnlose Beschäftigung (Verat.).
- Hasst Musikunterricht, besonders Klavierunterricht.
- Aus trivialen emotionalen Konflikten entsteht sehr leicht das Gefühl, von Gott und von seinen Freunden verlassen worden zu sein, was auf eine sehr starke emotionale Unsicherheit hinweist.
- Ruhelosigkeit nachts.
- Lampenfieber.
- Misstrauisch.
- Nützlich in Fällen von Legasthenie, geistiger Zurückgebliebenheit oder Entwicklungsverzögerung.

KOPF

- **Heftige Kopfschmerzen durch Gehirnerschütterung.**
- Migräne mit gerötetem Gesicht, pochenden Schläfen und roten Augen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Heißer Kopf mit kalten Extremitäten.**
 - Kann seinen Kopf nicht aufrecht halten (Gels).
 - Schuppen.
 - Beginnende Basilar meningitis.
 - Kernig-Zeichen ++.
 - MRT zeigt zerebrovaskuläre Traumen, besonders durch Ruptur eines angeborenen Beerenaneurysmas.
 - Rollt seinen Kopf (Bell., Sulph.).

AUGEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Rote Augen, besonders bei Kopfschmerzen** (Spig.).
 - Starrer Blick.
 - Pupillen erweitert und unempfindlich gegen Licht.
 - Strabismus nach Nachtschreck (pavor nocturnus).
 - Eingesunkene Augen.

NASE

- **Absteigender Schnupfen, der den Hals und die unteren Atemwege miteinander bezieht.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rote Nase (Alum.).
 - Dicke gelbe Krusten in den Nasenlöchern.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Leuchtend rotes Gesicht bei Kopfschmerzen, durch Aufregung oder bei Bewusstlosigkeit.
 - **Leerer Ausdruck** (Phos.).

- Bläulich-rote Akne.
- Ausschlag auf der Nase.
- Kiefersperre.
- Zupft andauernd an den Lippen (Bry.).
- Schwellung der rechten submaxillaren Lymphknoten.

MUND

- **Trockener Mund mit vermehrtem Durst.**
- **Zähneknirschen durch Furcht oder im Schlaf.**
- Aphasie durch Embolie der mittleren Hirnarterie.
- Schwierige Zahnung: Erbrechen und Durchfall.
- Vermehrter übelriechender Speichelfluss.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hervortreten der Zunge bei Chorea.
 - **Stammelnde Sprache** (Stram.).
 - Aphthen.
 - Mundgeruch.
 - Rote, empfindliche Zunge und schwammiges Zahnfleisch.
 - Soor.

HALS

- **Schluckbeschwerden, besonders bei Flüssigkeiten** (Lach.), **kann nur Festes schlucken.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dunkelrote oder violette Verfärbung von Tonsillen und Uvula.
 - Pulsieren in den Karotiden.
 - Schwellung der Schilddrüse.

MAGEN

- **Intensiver Durst** ist ein Begleitsymptom bei den meisten Beschwerden.
- **Anhaltender Schluckauf.**
- **Erbrechen bei Zahnung** (Bry., Ipec.)
- **Erbrechen von Mekonium bei Säuglingen mit Keuchhusten.**
- Abscheu gegen Nahrung.
- Erbrechen von Nahrung und Schleim nach jeder Mahlzeit.
- Abneigung: Früchte, Milch, Zwiebeln.
- Verlangen: Schokolade, kalte Getränke.

ABDOMEN

- **Krampfende, kneifende Kolik bei Säuglingen und Kleinkindern durch Blähungen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aszites.
 - Vergrößerung von Leber und Milz.

REKTUM

- **Cholera infantum;** setzt grüne, wässrige Stühle ab bei schnell fortschreitendem Kollaps.

- **Hartnäckige Verstopfung bei Neugeborenen mit sehr harten Stühlen** (Nux-v., Op.).
- Zahnungsdurchfall mit intensivem Durst; scheidet auch Blut aus.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Mekoniumretention.**
 - Rektumpolypen.
 - Krampfhaftes Zusammenschnüren des Rektums.

HARNWEGE

- Unterdrückung von Urin in Fällen von Cholera.
- Reichliche Urinabsonderung mit gesteigertem Durst.
- Harträufeln mit Stuhlgang (Caust.).
- Enuresis nocturna.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Albumin +, erhöhtes spezifisches Gewicht, Sediment; Phosphate ++, Zucker ++.

GENITALIEN

- Neigung zu masturbieren.
- Wollüstiges Jucken der Genitalien.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Schmerzhafte Heiserkeit.
- Untersuchungsergebnis:
 - Laryngismus stridulus.

HUSTEN

- **Krampfhafter oder hackender Husten bei schwachen, nervösen Kindern, der sie in Panik erwachen lässt.**
- Trocken, hart, ununterbrochen.
- Nächtliche Hustenanfälle, gefolgt von Erbrechen.
- Weinen durch Husten.

BRUST

- Kindliche Kapillarbronchitis mit starker Dyspnoe und Konvulsionen.
- Pneumonie bei Kleinkindern.
- Untersuchungsergebnis:
 - Röntgen/Thorax: Verdichtungen in der Lunge.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Opisthotonus.

EXTREMITÄTEN

- Chorea durch Furcht.
- Neigt zum Stolpern oder lässt aufgrund von Gelenkschwäche Dinge fallen.
- Untersuchungsergebnisse:

- Unruhige, zappelige Hände und Finger, sind ständig in Bewegung.
- Beine, Füße und Handgelenke sind eiskalt und blau; auf Fingerdruck bleiben weiße Eindrücke.
- Lähmende Schwäche der Streckmuskulatur von Beinen und Füßen.
- Händezittern bei jeder Art willkürlicher Bewegung.
- Zucken der Finger.
- Schwankender Gang.

SCHLAF

- Alpträume.
- Fällt in tiefen Schlummer nach einem epileptischen Anfall.
- Ruhelos im Schlaf mit häufigem Stöhnen.
- Schlafwandeln.

HAUT

- Kleine Eiterpickel erscheinen in aufeinander folgenden Häufungen (Arn.) im Gesicht und am Rumpf, mit heftigem Jucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verhärtungen oder Narben, die noch lange nach dem Verschwinden der Ausschläge bleiben (Vario.).
 - Schmerzhaft pustulöse Ausschläge.
 - Kalt bei Berührung.
 - Psoriasis.
 - Talgzyste.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: **Zorn, Schreck** (Hyos., Indg.) oder andere emotionale Ursachen; **bei Zahnung** (Cupr.); bei Neumond; durch Masturbation; organische Verletzungen, Hirntumor (Sil.); **bei Keuchhusten** oder bei akutem oder chronischem Nierenversagen.
- Während Konvulsionen: **Starre Augen, fixierter Blick** (Ign.); Muskelzuckungen, die meist im Gesicht beginnen.
- Nach Konvulsionen: Kopfschmerz und Appetitverlust.
- **Periodische Anfälle:** Jede Woche, alle 2 Wochen oder 10 Tage.
- Konvulsionen am Tage.
- Grand mal-Epilepsie.

ALLGEMEINES

- **Chorea durch Schreck** (Caust.); kann nicht gehen, muss rennen oder springen.
- **Periodizität der Beschwerden.**
- Zystische Tumore.
- Stehen empfindet er als sehr unbequem.
- Fette, übergewichtige Kinder.
- Reaktionsmangel.
- Die meisten Beschwerden sind besser, wenn das Kind geistig und körperlich beschäftigt ist.

KALIUM CARBONICUM

(Kaliumcarbonat - Kali-c.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Zu penibel, starr und dogmatisch; **anal fixierter Persönlichkeitstyp.**
- ▶ **Leicht reizbar durch Geräusche** (Ars., Borx., Ferr., Iod.); jedes plötzliche Geräusch erschreckt sie (hupende Autos, Radio- oder Fernsehlärm, knallende Türen).
- ▶ **Besitzergreifend, klammert sich an allem fest.** So klammert sich das Kind andauernd an seine Mutter (Ant-t., Lyc., Phos., Puls.); es braucht die Mutter ständig als Stütze, will keine Stunde von ihr getrennt sein. Dieses Klammern ist noch stärker als bei Puls oder Stram.
- ▶ **Starkes Pflichtgefühl** (Aur., Calc., Thuj.); sehr verantwortungsbewusst.
- ▶ Die Kinder wollen immer alles vorausplanen und halten sich auch an ihre Pläne; nichts ist schlimmer als Änderungen ihres Zeitplans (Bry., Camph., Merc.).
- ▶ Diese Kinder sind meist ordentlich, präzise und wirken selbstbewusst (Ferr., Sulph.).
- ▶ Verwirrungssyndrom: Das Kind erwacht morgens mit dem Gedanken an seine vielen Pflichten des Tages; dann macht es sich an seine Aufgaben und denkt sofort, es gebe noch Wichtigeres zu erledigen; mit diesem Gedanken lässt es das erste Projekt fallen und stürzt sich auf das zweite. Kaum macht es sich aber an die zweite Aufgabe, geht es schon weiter zur dritten. Zum Schluss ist das Kind ganz verwirrt und bringt nichts mehr zu Ende.
- ▶ Große Eile, wo sie nicht nötig wäre (Arg-n., Merc., Nat-m., Tarent.); in der Folge macht das Kind Fehler beim Sprechen, vertauscht Worte, bricht mitten im Satz ab usw.
- ▶ Sture Kinder; lassen sich nicht so leicht auf einen Kompromiss ein.
- ▶ Das Kind mag nicht allein sein oder allein spielen; möchte Gesellschaft, aber kein Mitleid.
- ▶ Nüchterne, phantasielose Kinder, die sich eher vom Verstand als von ihren Gefühlen leiten lassen (Lyc., Nit-ac., Plb.).
- ▶ Kleine Kinder sind sofort irritiert, wenn ihre Routine verändert wird, da sie in allen Dingen ihre festen Abläufe wollen:
 - die gewohnten Freunde.
 - das gewohnte Essen.
 - feste Zeiten zum Aufstehen und Schlafengehen.

KÖRPER

- ▶ Dunkles Haar, Neigung zum Dickwerden (Am-c., Graph.) und zu Plattfüßen.

- ▶ Kleinkinder wollen nicht berührt werden; sie schrecken bei der leisesten Berührung zusammen (Cocc, Kali-p, Sil), besonders wenn man die Füße berührt; das Kind fasst sich dabei an die Herz- oder Magengegend.
- ▶ Schwitzen leicht bei der geringsten Anstrengung (Calc., Chin., Ferr., Iod., Lyc., Psor., Sulph.).
- ▶ Empfindlich gegen Zugluft (Calc-p., Rhus-t., Sil.) und besser im warmen Zimmer, doch warme Getränke verschlechtern (zwar erwärmt sich das Kind durch warme Getränke, doch dann wird ihm sofort wieder kalt; daher beruht die Verschlechterung eher auf der Abkühlung als auf dem warmen Getränk).
- ▶ Starke Erkältungsneigung, besonders nach Überhitzung (Bry., Carbo- veg., Puls., Sep.).
- ▶ Anämische, blasse und fröstelnde Kinder.
- ▶ Kinder, die nur geringe geistige und körperliche Anstrengungen aushalten.
- ▶ Kleinkinder und sogar schon Neugeborene sind pingelig, sie fühlen sich unbehaglich und sind gereizt nach jeder Mahlzeit.
- ▶ Kinder, die sich nie wohl fühlen und keine Energie haben, wenn es Zeit zum Aufstehen ist.
- ▶ Nasenbluten beim Gesichtwaschen am Morgen (Am-c., Arn.).
- ▶ Blasse, sanfte, schlaffe Kinder, schnell erschöpft durch die geringste Anstrengung (Calc.).
- ▶ Anfällig für feuchtes Wetter (Nat-s.); das Kind hat bei feuchtem Wetter allergische Beschwerden der oberen Atemwege.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch: **Erwartungsspannung**, Alleinsein, Gemütsregung (schlechte Nachrichten, Schreck, Kummer usw.) und geistige Anstrengung.
- **Klammert sich an die Mutter und hält andauernd ihre Hand** (Ant-t., Bism., Lyc., Phos., Puls.).
- Will **getragen** (Cina) und **geschaukelt** (Puls., Merc-c.) werden.
- **Gereiztheit durch Hunger.**
- **Extrem kitzelig** (Calc-p., Lach., Nat-m., Phos., Zinc.) und empfindlich gegen Berührung und Geräusche; fährt plötzlich zusammen wie im Schreck.
- Furcht vor dem Alleinsein, **Vögeln** (Apis, Nat-m.), Menschenmengen, Dunkelheit, Versagen und **Zurückweisung** (Calc., Ign., Nat-m.).
- **Erschrickt leicht über Kleinigkeiten** (Ars., Lyc., Nat-c.), sogar wenn jemand sich ihm nähert oder ihn berührt, da er fürchtet, verletzt oder geschlagen zu werden; kann es nicht ertragen, dass ihn jemand auch nur ansieht.
- **Plötzliches Schreien über Kleinigkeiten** (Plb., Stram.).
- **Zu korrekt, wohlerzogen** (Nat-m., Sil.).

- **Schwach in Mathematik** (Alum., Merc., Nat-c., Ph-ac., Rhus-t.); jegliche mathematische Berechnung wird als besonders schwierig empfunden.
- Abwechselnde Zustände:
 - Launenhaftigkeit, abwechselnd mit Abneigung gegen jede Art von Veränderung seiner Routine.
 - Wechselhafte Stimmung.
 - Verlangen nach Gesellschaft, abwechselnd mit Abneigung gegen Gesellschaft.
 - Reizbarkeit abwechselnd mit Fröhlichkeit.
 - Heftige Zornausbrüche über Kleinigkeiten, abwechselnd mit Milde und Ruhe.
- Ehrgeizige Kinder; wollen reiche Unternehmer werden und ein enormes Vermögen besitzen.
- Säuglinge und Kinder sind nach dem Essen und beim morgendlichen Erwachen reizbar.
- Bulimie.
- Können keine Musik ertragen, besonders keine Popmusik.
- Können keine gewalttätigen oder angstmachenden Filme oder Fernsehshows ansehen oder über Themen lesen, die sie zutiefst betroffen machen.
- Grundloses Weinen bei Babys die ganze Nacht über.
- Die Kinder sind den ganzen Tag über stumpf und werden nachts sehr ruhelos; können nur beruhigt werden, indem sie getragen oder geschaukelt werden.
- Gewissenhaft in Kleinigkeiten, mit starkem moralischem Empfinden und Verantwortungsbewusstsein; das Kind macht pünktlich seine Hausaufgaben, bewahrt alles an seinem Platz auf etc.
- Dauerndes Stöhnen, Wimmern und Klagen.
- Kreative Persönlichkeit.
- Verlangt nur nach Gesellschaft, weil er sich fürchtet, allein zu sein.
- Weint schnell, schluchzt vor Schmerz oder bei sanftem Tadel oder Ermahnungen; schlimmer durch Trost.
- Kann sich nur schwer schriftlich ausdrücken, ist also schlecht in Aufsätzen, Verständnistests etc.
- Konzentrationsschwierigkeiten beim Lernen. Macht Fehler beim Schreiben oder Sprechen; verstellt die Worte oder benutzt die falschen.
- Habgierige Kinder (Hyo.).
- Führungsqualitäten (Nux-v., Sulph., Verat.) schon in sehr jungen Jahren.

KOPF

- Chronische Kopfschmerzen; mit Tränenfluss, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen; schlimmer durch kaltes Wetter, Husten, Anstrengung der Augen, Kälteeinwirkung, Nasswerden des Kopfes, Erschütterung, **unterdrückten Schnupfen** (Verwendung von schleimhautabschwellenden Mitteln) (Acon., Calc., Dulc., Nux-v.), beim Erwachen am Morgen; besser durch Hinlegen, **warme Anwendungen** (Kali-ar., Mag-p.) und **warmes Einhüllen des Kopfes** (Hep., Nux-v., Sil.).
- Kopf empfindlich **gegen Zugluft** (Hep., Nux-v., Sil.) oder kalte Luft, besonders am Scheitel.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Kind kann den Kopf nicht aufrecht halten; fällt nach hinten.
 - Schuppen.
 - Abschilfernde, trockene, krustige oder schuppige, schorfige Ausschläge in Flecken auf dem behaarten Kopf.
 - Heißer Kopf.
 - Unwillkürliches Rucken des Kopfes von einer Seite zur anderen oder nach vorn und hinten.
 - Geschwollene und ödematöse Glabella [unbehaarte Stelle zwischen den Augenbrauen],

AUGEN

- **Ödematöse Schwellung um die Augen** (Apis, Fern, Phos., Rhus-t.), besonders sackartige Schwellung **zwischen dem Oberlid und den Augenbrauen** (Lyc.); schlimmer morgens beim Erwachen, erschwert dem Kind das Öffnen der Augen.
- **Ausfall der Augenwimpern** (Apis, Ars., Merc., Rhus-t., Staph.).
- **Schwache Augen, trübe Sicht nach Masern** (Caust., Euphr, Puls.).
- Allergische und katarrhalische Bindehautentzündung, mit Hitze der Augen, nach einer Erkältung.
- Tränenfluss bei Schnupfen, Husten oder Kopfschmerzen.
- Schmerz in den Augen beim Lesen oder bei Fieber (Lyc.) oder unterdrücktem Schnupfen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Entzündete Lider.
 - Injizierte Bindehaut.
 - Trübung der Hornhaut.
 - Geschwüre der Hornhaut.
 - Pendelartige Bewegungen der Augäpfel von einer Seite zur anderen.
 - Hervortretende Augen.
 - Starren.
 - Eingesunkene Augen.

OHREN

- Ohrenschmerzen, besonders im **rechten Ohr** (Bar-c., Bell., Nit-ac.), gegen **Mitternacht**.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Rechtes Ohr rot und heiß** (Bry., Cham., Sep.), das linke blass und kalt.
 - Reichliche, stinkende, gelbliche, dünne, blutdurchsetzte Absonderungen.
 - Feuchte, schuppige Ausschläge hinter den Ohren.
 - Mittelohrentzündung.
 - Lymphknoten vor und hinter den Ohren vergrößert und empfindlich.
 - Gelbliches, dünnes Ohrenschmalz quillt dauernd aus den Ohren.

NASE

- **Katarrh erstreckt sich zu den Stirnhöhlen** (Lyc., Merc., Sil.) **und hinunter in den Hals** (Kali-bi., Kali-i., Merc.). entwickelt sich entweder zu einer Mandel-

- Schnupfen: Durch **Überhitzung** (Bry., Carbo-veg., Puls., Sep.) oder durch Aufenthalt in einem heißen Raum und dann Abkühlung durch Hinausgehen; wundmachende, stinkende, eitrige, dicke, gelblich-grüne Absonderungen, die **trocknen und Krusten und Schuppen bilden** (Bov., Kali-bi., Lac-c., Stict.), welche bei Ablösung bluten (Nit-ac.).
- Nasenbluten bei Kindern mit verminderten Thrombozyten; schlimmer nach Essen, **Naseschnäuzen** (Arn., Lach., Phos.), morgens und beim **Gesichtwaschen** (Arn., Calc-s., Dros.).
- Verstopfung der Nase im warmen Raum; **besser im Freien** (Phos., Puls., Rhus-t., Sulph.).
- **Rechtsseitige Beschwerden** der Nase (Bry., Kali-bi., Merc., Sulph.): Katarrh, Schnupfen, Nasenbluten und Verstopfung.
- Chronisches Schniefen (Calc., Lyc.).
- Heftiges, häufiges Niesen beim Erwachen am Morgen, ohne Absonderung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalte Nasenspitze** (Apis, Ars., Calc-p., Lach.).
 - **Spitze Nase** (Camph., Kali-bi., Lyc.).
 - Retronasaler Katarrh.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Trockene, aufgesprungene, **geschwollene** Lippen (Arum-t., Nat-m., Sep.), mit Ablösung der Haut und leichtem Bluten.
 - Ausdruck: **Leidend** (Ars., Lyss.), **eingefallen** (Ant-t., Camph., Op., Verat.) **und schmutzig aussehend** (Arg-n., Lyc., Psor., Sulph.), mit bläulichen Ringen um die Augen.
 - **Gräuliche Verfärbung** der Zunge (Arg-g., Chel., Cupr., Merc-cy.).
 - Schweiß auf der Oberlippe (Med., Nux-v., Rheum.).
 - **Zucken der linken Gesichtshälfte** (Agar., Calc.).
 - Akne.
 - Hitze und Rötung einer Gesichtshälfte, während die andere kalt und blass ist.
 - Speicheldrüsen und submaxilläre Lymphknoten vergrößert, besonders auf der rechten Seite.
 - Warzen.
 - Gerunzelte Stirn.

MUND

- **Zähneknirschen im Zorn.**
- Zahnschmerzen durch jedes **kalte** (Cham., Nux-v.) Essen oder Getränk oder sogar durch Einatmen kalter Luft; besser durch äußere **Wärme** (Mag-p.) und Druck; der Zahnschmerz erstreckt sich zu den Ohren, Augen, zum Gesicht, zur Stirn, den Wangenknochen und Schläfen.
- Trockener Mund beim Erwachen am Morgen.
- Reichlich übelriechender Speichelfluss, schlimmer bei Schmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kirschrote Zunge

- Mundgeruch.
- Skorbutisches Zahnfleisch mit schmerzhafter Schwellung und Eiterung; löst sich von den Zähnen und blutet leicht.

HALS

- **Kann keine Kleidung um den Hals vertragen** (Lach., Sep.).
- Das Kind empfindet das Schlucken von **fester Nahrung** als schwierig (Bapt., Bar-c.), würgt beim Versuch zu essen; **muss mit jedem Bissen Wasser trinken, um ihn nach unten zu spülen** (Bell., Cact., Nat-c.).
- **Extrem empfindlich gegen kalte Zugluft** (Fl-ac.) und **kalte Getränke**; wenn die Mandelentzündung nicht unter Kontrolle gebracht wird, kann sie sich in asthmatische Bronchitis verwandeln.
- Halsschmerz wie von einer Nadel, **erstreckt sich zum Ohr** beim Schlucken (Nit-ac., Nux-v.); schlimmer durch Einwirkung kalter Luft und beim Husten.
- Speisen bleiben im Hals stecken.
- Klebriger Schleim im Hals, besonders morgens, der weder geschluckt noch ausgeräuspert werden kann.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Verlängertes Zäpfchen.**
 - Neigung, dauernd zu schlucken (Caust., Merc-c.).
 - Exophthalmischer Kropf [M. Basedow].
 - Linksseitige Mandelentzündung.

MAGEN

- Verdauungsprobleme, dabei **schmutziggraue Zunge**.
- Die meisten Magenbeschwerden sind schlimmer **nach Trinken von kaltem Wasser (besonders nach Überhitzung); nach Essen (besonders von Brot, blähenden Speisen, gebratenem Fisch oder Milch)** oder durch **Aufregung oder Ärger**, was zu Auftreibung, Schwere und Schmerz im Magen führt, sowie zu Sodbrennen, unvollständigem saurem Aufstoßen, Würgen und Erbrechen.
- Alle Gefühle werden im Magen gefühlt (Ant-c.).
- Schluckauf.
- Verschlimmerung: Äpfel, Bohnen, **Brot**, Kohl (Lyc.), kalte Getränke (besonders nach Überhitzung), Mais, Mehlspeisen oder blähende Speisen, Fett, **gebratener oder verdorbener Fisch**, heiße Getränke, **Eis, Fleisch, Milch, Gebäck** (Ant-c.), Erbsen, Haferbrei, Suppe, Gemüse und warme oder heiße Speisen.
- Verbesserung: Kalte Speisen.
- Abneigung: **Brot** (Chin.), besonders Schwarzbrot oder Roggenbrot, Kohl, Fleisch, Milch, der Anblick von Essen, Suppe, **Süßigkeiten** (Ars.).
- Verlangen: Käse, Schokolade, Delikatessen, Obst, Leber, Haferbrei, **saure Speisen, Zucker** (Arg-n.), **Süßigkeiten** und warme Getränke.

DYSPEPSIE-SYNDROM

- Das Kind verlangt nach Süßigkeiten oder Zucker; selten verlangt es auch Saures; die meisten Kinder, die Kali-c brauchen, haben eine starke **Abneigung gegen Fleisch** (Calc., Puls.).

- Die Mehrheit der Kali-c.-Kinder, die ich gesehen habe, haben **Übergewicht**, trotz chronischer blähender Dyspepsie und Verdauungsstörung.
- Übermäßige Auftreibung des Abdomens, das empfindlich gegen Druck und die Berührung der Kleidung ist; die Auftreibung ist schlimmer nachts oder in den frühen Morgenstunden und macht das Kind schlaflos.
- Schlaaffe, blasse Zunge; dick belegte Basis oder rohe Zungenspitze.
- Unwohlsein nach den Mahlzeiten, daher bevorzugen Kleinkinder kleine, aber häufige Mahlzeiten; sofort nach dem Essen werden sie hungrig und fühlen sich wieder unwohl.

ABDOMEN

- **Kolik**, schlimmer nach dem Stillen oder Essen, im Freien und während Stuhlgang; mit viel Gurgeln und Rumpeln; besser durch **Zusammenkrümmen**.
- **Gelbsucht bei gestillten Kindern nach Ärger der Mutter** (Cham., Nat-c.).
- Festsitzende Blähungen (Arg-n., Raph.), mit schmerzhafter tympanitischer Auftreibung des Abdomens nach dem Stillen oder Essen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Mesenterialdrüsen vergrößert.**
 - **Bauch erzittert beim Husten** (Carb-an., Sil.).
 - Aszites.
 - Harte, vergrößerte Leber.
 - Leistenbruch.
 - Paralytischer Ileus.
 - Schwellung der Leistendrüsen.

REKTUM

- Blutdurchsetzter Schleim beim Stuhl, der anfänglich trocken, **hart und groß ist, gefolgt von weichem Stuhl** (Bov., Lyc.).
- Schmerzloser, übelriechender Durchfall nach **Milch** (Mag-m., Nat-c.).
- Reichliche, übelriechende Blähungen bei Durchfall.
- Unwillkürlicher Stuhlgang beim Abgang von Blähungen (Aloe, Nat-p.).
- Rektumprolaps während Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Offener, entspannter Analsphinkter.
 - Stuhl: Madenwürmer, Spulwürmer und Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Gibt roten Sand mit dem Urin ab (Canth., Sep.).
- Harnverhaltung mit Wassersucht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Nephrotisches Syndrom.
 - Urin: Albumin +++, Zylinder +, Eiter ++, Erythrozyten ++, Zucker +, Harnsäure ++.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Schleimrasseln in der Luftröhre vor dem Husten.
- Heiserkeit bei Schnupfen (Carbo-veg., Phos.).

ATMUNG

- **Asthma abwechselnd mit nächtlichem Durchfall.**
- Atemnot oder asthmatisches Atmen, schlimmer nach Stuhlgang, **Trinken von kaltem Wasser bei Überhitzung** (Bry.), im Schlaf (besonders von **2-4 Uhr**), Einwirkung von kalter Luft, durch Anstrengung, Liegen, beim Essen, Trinken oder Schreiben, bei nassem Wetter; **besser durch nach vorne Beugen oder Lehnen** (Ars., Lach.), **Aufstoßen** (Calc., Carbo-veg.), **Schaukeln** (See.), **aufrechtes Sitzen** (Ant-t., Laur.), **halbsitzende Position** (Spig.) oder **nach vorne gebeugt sitzend mit den Ellbogen oder dem Kopf auf den Knien** (Coc-c.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rasselnde Atmung (Cupr., Lyc.).
 - Seufzende oder laut stöhnende Atmung.
 - Pfeifende Geräusche oder Keuchen beim Einatmen (Aral., Caps.) oder beim Husten.

HUSTEN

- Während Husten: Bläulich-rotes Gesicht, Würgreiz, Übelkeit und Erbrechen, Schmerz in Brust oder Hals, **Würgen** (Carbo-veg., Dros.).
- Plötzlicher, heftiger, erschütternder, krampfartiger, erstickender, erschöpfender Husten durch Trockenheit und Reizung im Kehlkopf, beim **Hinlegen** (Rumx., Sang.); schlimmer nach **Masern** (Puls), nach Mitternacht (von ungefähr **2-4 Uhr**, verhindert Schlaf), beim Erwachen am Morgen, durch Kälte oder im Freien, Temperaturwechsel, Winter, Essen, Brot, warme Speisen, Milch; besser durch Essen oder Trinken (kalte Getränke) und durch Auswurf.

LUNGENENTZÜNDUNG

- Aussehen des an Lungenentzündung erkrankten Kindes: **Ausgezehrt, blass, aufgedunsenes Gesicht, erschöpfte Erscheinung.**
- Kinder, die unter Kali-c.-Pneumonie leiden, sind höchst anfällig für ein **Empyem** oder Endokarditis.
- In meiner Praxis ist es manchmal schwierig, **bei Lungenentzündung Kali- c. von Hep. zu unterscheiden**, da beide Mittel viele Husten-Modalitäten gemeinsam haben. Die zeitliche Verschlechterung von 2-4 Uhr fehlt bei Hep., das stattdessen meistens eine Verschlechterung später am Morgen, d. h. gegen 7-8 Uhr hat. Außerdem sind Hep.-Kinder dünner und sehen ängstlicher aus.
- In den späteren Stadien will das Kind bei Atemnot aufrecht sitzen, nach vorne gebeugt mit den Ellbogen auf den Knien.
- **Verschleppte Lungenentzündungen, die fortbestehen und nicht abklingen** (Sulph.).
- Pneumonie des **rechten unteren Lungenlappens** bei Kleinkindern, mit Rippenfellentzündung; mit Schmerzen in der Seite der Brust beim tiefen Einatmen, schlimmer bei nassem Wetter und beim Liegen auf der rechten Seite.
- **Das Kind kann bei Atemnot nur schluckweise Flüssigkeiten zu sich nehmen, da es seinen Atem nicht lang genug anhalten kann, um länger**

zu trinken; es kann keine feste Nahrung essen, weil es zu husten beginnt und der Husten sich **nicht bessert, bevor es nicht alles erbrochen hat.**

- Die Lippen sind **meist zyanotisch, trocken und rissig;** die Zunge ist trocken und rot oder hat einen schmutzigen, gräulich-weißen Belag.
- Die typische Verschlechterungszeit 2-4 Uhr ist auch bei Husten und Atemschwierigkeiten zu bemerken; besser durch **hochgelagertes Sitzen** und nach **vorne Beugen** (Ars., Lach., Spong.).
- Zittern der Hände und Finger, **Zupfen an der Bettwäsche** (Hyos.), **Gesichtszuckungen bei Pneumonie.**
- Das Kind mag nicht allein gelassen werden und wird sehr ängstlich.
- Das Kind ist sehr empfindlich gegen jeden Luftzug und gegen Geräusche.
- Begleitende Blähungen und Bauchbeschwerden bei Pneumonie.
- Kali-c. ist in den frühen Stadien von Pneumonie kaum angezeigt; gewöhnlich ist es eher indiziert, wenn eine pneumonische Verdichtung der Lunge eingetreten ist.
- Der Mund ist trocken, mit ausgeprägtem Durst.
- Das Sputum ist spärlich und schwierig auszuwerfen.
- Starke Schweißausbrüche mit Hustenanfällen (Hep.).
- Dem Kind geht es schlechter beim Liegen auf der erkrankten Seite (wo Verdichtung in der Lunge besteht), gewöhnlich der rechte untere Lobus.
- Sie werden sehr leicht ärgerlich und reizbar, wenn jemand sie untersuchen will.
- Schwacher Puls.
- Bei Mitbefall der Pleura klagt das Kind über starke Schmerzen in der Brust, schlimmer bei jeder Bewegung und beim Husten.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Empyem.
 - Mitral- und Trikuspidalinsuffizienz.
 - Lungenödem.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Wirbelsäulenverkrümmungen.
 - Wirbelsäulenverletzungen.

EXTREMITÄTEN

- Kalte Füße nachts im Bett (Calc.).
- Hüftgelenkserkrankung.
- Ruhelose Glieder bei Kleinkindern vor dem Zubettgehen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalte Finger (Graph., Thuj.).
 - Reichlich, kalter, übelriechender, klebriger Fußschweiß.
 - Berührungsempfindliche Hühneraugen.
 - Zyanose mit bläulicher Verfärbung der Hände und Füße.
 - Wassersüchtige oder ödematöse Schwellung nur eines Fußes.
 - Wundheit der Haut zwischen den Oberschenkeln.

SCHLAF

- Im Schlaf: Würgende oder unterbrochene Atmung (Cench., Op.), Krämpfe in Waden und Oberschenkeln, Zähneknirschen (Cina, Tub.), lautes Sprechen, reichlicher Speichelfluss, um Hilfe Rufen (Rhus-t.), Stampfen der Füße, Auffahren, Zucken der unteren Glieder und Weinen.
- Schlaflosigkeit bei Kleinkindern während der Zahnungsperiode.
- Das Kind kann nicht auf der linken Seite schlafen.
- Das Kind ist ruhelos und schlaflos nach Mitternacht durch Blähungskolik oder Husten.

FIEBER

- Frost:
 - Galleerbrechen, Delirium, extremer Durst, Aufdecken ist unerträglich, Übelkeit, Schmerzen im Abdomen, das Kind will still sein.
 - Schlimmer nach Essen, am Abend (17-18 Uhr) und durch den geringsten Luftzug.
 - Besser durch äußere Wärme und in einem warmen Raum.
- Hitze:
 - Begleitet von qualvoller Angst (Arn.), Rückenschmerzen (Nux-v.), schlechtem Geschmack mit weißem Belag auf der Zunge, brennenden Augen, Delirium, trockenem oder lockerem Husten, Atemnot, Aufregung (Rhus-t.), Blähungen mit Auftreibung des Abdomens, Kopfschmerzen, Ekel vor Speisen, Übelkeit, Schmerz im rechten Hypochondrium, Schläfrigkeit mit Gähnen, Durstlosigkeit, Erbrechen.
 - Partielle Hitze des Abdomens, der Achselgegend, des Gesichts, der Füße, Gelenke der oberen und unteren Glieder, der Lumbalregion, des Halses oder einseitige Hitze (rechte Seite oder untere Körperhälfte).
 - Schlimmer nach Mitternacht, 3-5 Uhr, beginnt am Morgen von 9-17 Uhr, im Bett und im warmen Raum.
 - Besser durch Aufstehen.
- Schweiß:
 - Reichlicher, kalter, saurer oder stinkender Schweiß des Oberkörpers, schlimmer nach Mitternacht.

HAUT

- Reichlicher Schweiß durch die geringste Anstrengung (geistig oder körperlich), durch unterdrückte Absonderungen oder beim Essen.
- Trockene Haut mit Jucken und Brennen nach Kratzen.
- Schmerzhaftes, juckendes Warzen, die allmählich an Größe zunehmen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Sommersprossen.
 - Intertrigo.
 - Deutliche Blässe.
 - Talgzyste.
 - Alt aussehende, raue, ungesunde und verschrumpelte Haut.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Fieber oder Wurmerkrankungen.
- Während Konvulsionen: Klonisch-tonische Konvulsionen, Husten, Spasmen der Lippen und Kiefer sowie Steifheit der Glieder.
- Nach Konvulsionen: Aufstoßen, Übelkeit und Schlaflosigkeit.
- Verschlimmerung: Im Schlaf, abends und nachts.

ALLGEMEINES

- **Sehr fröstelige Kinder**, mit großer Erkältungsneigung, die Sinusitis und Adenitis entwickeln; schlimmer durch kalte, nasse Anwendungen, Zugluft oder kalte Luft, trockenes kaltes Wetter, im kalten Raum etc. und besser durch Wärme in jeder Form.
- Schlimmer nach oder während des Essens, **von 2-4 Uhr**, Wetterwechsel, im Schlaf, durch Hunger, durch Bewegung oder Gehen, beim Erwachen am Morgen und **Unterdrückung von Schweiß** (besonders Fußschweiß) (Sep., Sil., Zinc.).
- Allergische Konstitution.
- Ein Kind von tuberkulösem Miasma, häufig Tuberkulose in der Familienanamnese.
- Das Kind war seit einer Lungenentzündung nie mehr ganz gesund.
- Kinder, die schwach und anämisch sind durch erschöpfende Erkrankungen oder Blutungsneigung; dauerndes Verlangen sich hinzulegen oder aufzustehen und sich anzulehnen.
- Wassersucht durch Herzerkrankung (Dig.).
- Abgemagerte oder sehr korpulente Kinder.
- Juveniler Diabetes mit deutlicher Erschöpfung und Leber- oder Herzfunktionsstörung.
- Periodizität und ständiger Wechsel der Symptome sind typisch.
- Rechtsseitige Symptome.

KALIUM CHLORICUM

(Kaliumchlorat - Kali-chl.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Sehr eigensinnige und schwierige Kinder.
- ▶ Milchschorf, auch Milchborke genannt, mit abschilfernder oder rauer Haut auf dem Kopf des Kindes.
- ▶ Akute, **eiternde Prozesse in der Mundhöhle** von Stillkindern mit Pilzen im Mundraum. Im Endstadium wird die Mundhöhle gangränös.
- ▶ Mund und Zahnfleisch sind empfindlich, der Speichel ist stinkend und eitrig, die Zunge belegt und überall auf der Schleimhaut sind Geschwüre mit grauer Basis.
- ▶ Mittelohrentzündung mit ausgeprägtem Katarrh der Eustachischen Röhre. Die Absonderung ist dick, weiß, gelblich-grün. Die Mittelohrentzündung kann zu Polypenbildung im Ohr führen.
- ▶ Käsig Ablagerungen auf den Mandeln. Der Hals ist violett und rot gefärbt. Das Kind hustet andauernd käsige Klumpen aus.
- ▶ Entzündung von Rachen und Mandeln; weißer Schleim wird aus dem Rachen gezogen, schlimme brennende Schmerzen wie roh im Hals. Schlucken ist schwierig. Geschwollene, empfindliche Halslymphknoten.
- ▶ **Hydrozele** (Hodenwasserbruch) bei Neugeborenen.
- ▶ Windelausschlag mit gereizter und entzündeter Haut um den Damm.

KALIUM MURIATICUM

(Kaliumchlorid - Kali-m.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Bulimische Essstörungen bei Kindern, deren Eltern mit anderen Familienmitgliedern im Streit liegen.
- ▶ Extrem sture Kinder (Chin., Tub.); gegen ihren Willen lassen sie sich zu nichts zwingen; dann stöhnen und ächzen sie und sitzen stocksteif da.
- ▶ Pflichtbewusste Kinder.
- ▶ Ärgern gerne andere (Hyos.).

KÖPER

- ▶ Abneigung gegen Baden (Ant-c.).
- ▶ Katarrh mit reichlich milchig-weißen, fädigen, zähflüssigen Absonderungen.
- ▶ Drüsenschwellung und -Verhärtung.

Dieses Mittel hat Ähnlichkeit mit Kali-c. und Nat-m.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Schnell erregt oder entmutigt.**
- **Heimweh** (Ign., Merc.).
- Abneigung gegen Freunde und Familienmitglieder.
- Delirium vor und während Konvulsionen.
- Furchtsame Kinder, besonders vor Geistern und Bösem.
- Gleichgültig gegen alles und jeden.
- Schlechte Schüler; langsame Auffassungsgabe.
- Sprechen im Schlaf.
- Bewusstlosigkeit bei Gehirnerkrankungen.

KOPF

- Verstopfung und Schmerz in den Stirnhöhlen (Hep.).
- Meningitis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - CT: Hirnblutung; **Sinusitis der Nasennebenhöhlen.**
 - Schuppen.
 - Kernig-Zeichen +.
 - Milchschorf oder Krustenbildung (Mez., Sep.).
 - Schweiß nur am Kopf (Bell., Calc.).
 - Kann den Kopf nicht aufrecht halten, er fällt nach hinten.

AUGEN

- Schwierigkeiten beim Lesen, die Buchstaben erscheinen kleiner.
- Tränenfluss bei Husten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Hornhautentzündung.**
 - Ader- und Netzhautentzündung.
 - Stauung und Röte der Augen.
 - Hornhautgeschwür.
 - Exsudate der Netzhaut.
 - Hyperämie der Netzhaut.
 - Trübung der Hornhaut (Calc., Sulph.).
 - Trachom.
 - Verdickung der Augenlider und Krustenbildung auf den Augenlidern.
 - Gelbe Krusten und Schuppen an den Lidrändern (Dulc.).

OHREN

- **Schmerz im Ohr mit Schwellung der präaurikularen Drüsen.**
- Chronische Mittelohrentzündung (Merc., Puls.).
- Rezidivierende Mittelohrentzündungen, die zur Mastoiditis führen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Verwachsungen in der Paukenhöhle** (Cholesteatom) (Calc., Calc-f.).
 - **Drüsen um die Ohren geschwollen.**
 - Massiver Erguss in der Nähe der Ohrmuschel.
 - **Trommelfellruptur** (Tub.).
 - **Eiterung der Löcher für Ohringe** (Lach., Pitu-a.).
 - Katarrh der Eustachischen Röhre (Ferr-p., Kali-s.).
 - Ekzematöse Ausschläge um die Ohren.
 - Nervale oder Schallempfindungstaubheit.
 - Ohrpolypen.
 - Röntgen des Mastoids zeigt Sklerose, mit Fehlen der lufthaltigen Zellen.

NASE

- **Verstopfung bei Erkältung** (Stict).
- Katarrhalische Beschwerden mit reichlichen, dicken, milchig-weißen Absonderungen.
- Hervorwürgen von Schleim aus den hinteren Nasenhöhlen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Nasenbluten.
 - Retronasaler Katarrh [Katarrh der Choanen] (Hep., Kali-bi.).

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Geschwollene Drüsen um Kiefer und Hals.**
 - Akne.
 - Aufgesprungene Lippen.
 - Ausschläge um den Mund.

- Schwellung der Parotis (Bar-c., Sil.).
- Pochen der Schläfenarterie, schlimmer durch die geringste Berührung.
- Muskelzuckungen.

MUND

- Aphasie (Sprachverlust).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen und wunder Mund bei gestillten Babys.
 - Vergrößerte, verhärtete Landkartenzunge.
 - Blutendes, skorbutisches und geschwollenes Zahnfleisch.

HALS

- **Chronische Halsschmerzen.**
- **Würgt dicken, weißen, käsigen Schleim hervor** (Kali-chl., Phos.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akut entzündete und vergrößerte Tonsillen machen das Schlucken sehr schmerzhaft.
 - Festhaftende Krustenbildung auf den Tonsillen.
 - Ödematöse Schwellung des Zäpfchens.
 - Follikuläre Tonsillitis mit käsigen Ablagerungen (Chen-a., Kali-chl.) auf den Tonsillen.

MAGEN

- **Bulimie; Heißhunger kurz nach dem Essen; heftiger Hunger zwischen den regulären Essenszeiten; Hunger verschwindet durch Wassertrinken.**
- **Habitueeller Appetitverlust; weigert sich zu essen.**
- **Verdauungsstörungen durch fettes** (Puls.), **reichhaltiges Essen.**
- Intensiver Durst auf kaltes Wasser.
- Plötzliches Erbrechen von milchig-weißem Schleim.
- Verschlimmerung: Teigwaren, reichhaltiges und würziges Essen.
- Abneigung: Äpfel (Hell.), fettes Essen, Fleisch.
- Verlangen: Schokolade, kalte Getränke, Mehlspeisen (Lach.), gegrilltes Essen, **Essig** (Hep., Sep.).

ABDOMEN

- Völlegefühl nach dem Essen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Peritonitis.**
 - Aszites.
 - Vergrößerte Milz.
 - Empfindlichkeit bei der Palpation.

REKTUM

- **Durchfall nach fettem Essen** (Kali-chl., Puls.).
- Unwillkürlicher Stuhlgang beim Abgang von Blähungen.
- „Lücken am After nach Stuhlgang“ durch Madenwürmer

- Blasse, hell gefärbte Stühle.
- Der Stuhl ist so trocken, dass er fast krümelt (Nat-m.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Scheidet Madenwürmer mit dem Stuhl aus.

HARNWEGE

- Chronische Blasenentzündung.
- Nephrotisches Syndrom.
- Tröpfelndes Urinieren.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Albumin +, Zucker +.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Hodenentzündung.

KEHLKOPF

- Kehlkopf sehr empfindlich gegen Berührung.

ATMUNG

- Asthma verbunden mit gastrointestinalen Beschwerden (Carbo-veg., Nux-v.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Rasselnde Atmung.

HUSTEN

- **Lauter, geräuschvoller Husten, der aus dem Magen zu kommen scheint** (Sep.).
- Auswurf von dickem, weißem Schleim, der schwer hochzubringen ist.
- Milchiger Auswurf fliegt explosionsartig aus dem Mund beim Husten.
- Krampfartiger, kruppertiger Husten.
- Keuchhusten.

BRUST

- Bronchitis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Röntgen/Thorax: Pneumonische Verdichtungen mit Pleuraerguss.
 - Rasseln von Schleim in der Brust (Ant-t., Cupr.).

EXTREMITÄTEN

- Rheumatisches Fieber mit Exsudaten und ödematöser Schwellung um die Gelenke.
- Rheumatische Schmerzen während der Bewegung oder durch Bettwärme.
- Steifheit der Hände beim Schreiben (Cocc.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalte Hände und Füße.
 - Bursitis des Kniegelenks.
 - Eingewachsene Zehennägel.

HAUT

- Ausschläge mit gastrointestinalen Beschwerden.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akne; Erythem; Ekzem, mit dicken, weißen Eiterblasen.
 - Windpocken.
 - Trockene Schuppung der Haut.
 - Intertrigo.

ALLGEMEINES

- Folgen von Impfungen (Sil., Thuj.).
- Ödeme durch Leber- oder Herzerkrankung.
- Epileptiforme Konvulsionen durch unterdrückte Ausschläge.
- Hilft hartes, fibrinöses Exsudat aufzulösen.
- Offene Schnitte und Wunden mit markanter Granulation und Schwellung.
- Nützlich in Fällen von Epitheliom, M. Hodgkin, Lymphadenitis, rheumatischem Fieber, Sarkomen und Skorbut.
- Schlimmer im Freien und durch Zugluft.

KALIUM PHOSPHORICUM

(Kaliumphosphat - Kali-p.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Jeder emotionale Schock und jede nervliche Überanstrengung oder Erschöpfung führt zu nervöser Dauerspannung.
- ▶ Geistig ausgebrannt oder große Prüfungsangst nach übermäßigem Lernen.
- ▶ Schwache, nervöse Kinder, die den täglichen Stress und das anstrengende Lernen in der Schule nicht bewältigen und schließlich in einen Zustand permanenter Reizbarkeit und Niedergeschlagenheit kommen; solche Kinder sind typische Kandidaten für einen Nervenzusammenbruch im späteren Leben.
- ▶ Geistige Schwäche nach Hirnoperationen, besonders bei Hirntumoren oder nach Schlaganfall.

KÖRPER

- ▶ Abszesse, septische und gangränöse Zustände mit eitriger Absonderung.
- ▶ Goldgelbe Absonderungen.
- ▶ Schwer erschöpft mit lähmender Schwäche.

DD: Ähnlich wie Phos. und Ph-ac.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Ungeschickt; stolpert und stößt gegen Dinge beim Laufen.**
- Kinder, die **extrem optimistisch** sind und **es lieben, viele Freunde zu haben**; äußerst **gesellige** Kinder, die es genießen, über alles zu sprechen, was in ihrem Leben passiert.
- **Schwaches Gedächtnis und Erschöpfung durch zu langes Lernen.**
- **Ruhelosigkeit bei Neugeborenen von total erschöpften Müttern.**
- **Tierlieb.**
- **Unentschlossene, vorsichtige und wechselhafte Kinder.**
- **Bedürfnis gehalten zu werden.**
- **Schwach in Mathematik**, besonders beim Addieren.
- Ängstlich und furchtsam nachts.
- Die Kinder stecken alles in den Mund, besonders ihre Finger.

- Übermäßig nervöse und überempfindliche Kinder, die schnell durch Geräusche, Schreck, im Schlaf und bei Berührung zusammenschrecken.
- Furcht vor Menschenmengen.
- Große Schüchternheit mit Abneigung gegen Gespräche.
- Heimweh.
- Schiebt alles auf die lange Bank.
- Einfache Arbeiten, die ihnen übertragen werden, erscheinen als riesige Aufgabe.
- Heftig und destruktiv; zerreißt im Zorn die Nachtwäsche und andere Dinge.
- Händeringen.
- Die Schrift ist unklar und Schreiben ermüdet.

KOPF

- Erschütterung oder mechanische Verletzungen des Kopfes.
- Extreme Geräuschempfindlichkeit.
- Nervöse Kopfschmerzen der Studenten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hydrozephalus.
 - Stößt oder schlägt seinen Kopf gegen Gegenstände.

AUGEN

- Sehschwäche nach einem Anfall von Typhus, Meningitis, Tuberkulose oder durch Erschöpfung des Sehnervs.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Lähmung oder Zucken des linken Oberlides.
 - Netzhautentzündung.
 - Starrender Blick.
 - Schielen nach Hirnverletzungen.
 - Eingesunkene Augen.

OHREN

- Atrophie des Hörnervs.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Perforation oder Ulzeration des Trommelfells.
 - Pickel im Gehörgang.
 - Eitrige Mittelohrentzündung mit Hervorsickern von blutigem Eiter, der sehr übelriechend ist.

NASE

- **Jucken in den hinteren Nasenhöhlen (Choanen).**
- Nasenbluten.
- Nächtliche Verstopfung der Nase.
- Untersuchungsergebnis:
 - Geschwüre in der Nase mit Hervorsickern von stinkenden Absonderungen.

GESICHT

- Verzerrungen und unwillkürliches Verziehen des Mundes durch Schwäche der Gesichtsmuskulatur.

- Untersuchungsergebnisse:
 - Herpesausschlag um den Mund.
 - Entzündung der Speicheldrüse und der submaxillären Lymphknoten.
 - Kiefersperre.
 - Trauriger Gesichtsausdruck mit hohlen, eingesunkenen Augen.
 - Ulzeration der Lippen.

MUND

- **Leicht blutendes Zahnfleisch.**
- **Der Mund ist so trocken, dass die Zunge am Gaumen kleben bleibt.**
- Zähneknirschen im Schlaf.
- Nervöses Zähneklappern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen.
 - Bräunlicher, dicker Zungenbelag.
 - Mundgeruch.
 - Sprache langsam und unartikulierte.
 - Schwammiges, zurücktretendes, skorbutisches Zahnfleisch.
 - Mundfäule.

HALS

- Untersuchungsergebnis:
 - Dunkelroter Hals, mit weißen, follikulären Stippchen auf den Mandeln.

MAGEN

- **Hungrig sofort nach einem kompletten Mahl;** will jede Stunde etwas essen.
- **Unstillbarer Durst, besonders nachts.**
- Appetitlos, außer auf Süßes.
- Erbrechen beim Husten.
- Abneigung: Brot.
- Verlangen: Äpfel, Fisch, **eiskaltes Wasser**, Oliven, **Kartoffelchips, Nüsse** und Süßigkeiten.

ABDOMEN

- Gastroenteritis.
- Muss das Abdomen wegen eines Kältegefühls bedeckt halten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abdominalhernien.
 - Aszites.
 - Deutlich tastbare Leber und Milz.
 - Tympanitische Auftreibung, die den Atem zu beengen scheint.

REKTUM

- **Durchfall durch Erschöpfung, Schreck oder emotionale Erregung.**
- Cholera mit Reiswasserstühlen.

- Durchfall mit goldgelben, schmerzlosen Stühlen, mit aashaftem Geruch, ausgeschieden während oder nach der Mahlzeit.
- Dysenterie mit blutigen Stühlen.
- Abgang vieler lauter, übelriechender Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rektumprolaps.
 - Entspannter Anus.

HARNWEGE

- Hartnäckiges nächtliches Bettnässen bei nervösen, erregbaren Kindern.
- Wolkiger, übelriechender Urin.
- Unterbrochener oder unwillkürlicher Harnfluss durch nervöse Erschöpfung.
- Nephritis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Safranfarbene Flecken in der Windel.
 - Urin: Albumin +, Zucker+.

KEHLKOPF

- Heiserkeit durch Überanstrengung der Stimme.
- Aphonie durch Stimmbandlähmung.
- Kitzeln oder dauernde Reizung im Kehlkopf und der Luftröhre.

ATMUNG

- **Asthma durch die geringste Nahrungsaufnahme.**

HUSTEN

- Anfallsartiger Husten oder Keuchhusten bei nervösen Kindern, mit intensivem Schwächezustand und Auszehrung.
- Gelber, schaumiger Auswurf.

BRUST

- Tuberkulose im Anfangsstadium.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszessbildung in der Achselhöhle.
 - Knoblauchartiger Geruch aus der Achselhöhle.
 - Schwellung der axillären Lymphknoten.
 - Röntgenbild zeigt pneumonische Verdichtung und Lungenödem.

HERZ UND KREISLAUF

- Herzklopfen durch Erregung oder Kummer.
- Untersuchungsergebnis:
 - Unregelmäßiger Puls.

RÜCKEN

- Muss sich aufgrund lähmender Schwäche anlehnen, um stehen zu können.
- Untersuchungsergebnis:
 - Pickel auf dem Rücken (Carbo-veg. und Rumx.).

EXTREMITÄTEN

- Lähmende Schwäche durch die geringste Anstrengung.
- Stolpert beim Laufen.
- Neigt dazu, Dinge häufig fallen zu lassen, aufgrund von schwacher Handmuskulatur.
- Jucken der Handflächen und Fußsohlen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue oder violette Flecken an den Gliedern.
 - Kalte Hände und Füße.
 - Abmagerung des gelähmten Gliedes.
 - Zappelige Füße (Zinc.).

SCHLAF

- Schlaflosigkeit durch Furcht, Sorge oder nach geistiger Anstrengung.
- Übermäßiges Gähnen.
- Nächtliche Angstanfälle, erwacht erschrocken und schreiend.
- Seufzen und Stöhnen im Schlaf.
- Schlafwandeln.

FIEBER

- Hungrig bei Fieber.
- Septisches Fieber.

HAUT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue oder braune Flecken.
 - Karbunkel.
 - Fühlt sich kalt an.
 - Erysipel im Übergang zur Gangrän.
 - Leicht ikterische Gesichtsfarbe.
 - Übelriechende, faulige Absonderungen der Ausschläge.
 - Geschwüre mit sehr übelriechender Absonderung.

ALLGEMEINES

- **Lähmung bei Kleinkindern mit Muskelatrophie während der Zahnung.**
- **Reichlicher, erschöpfender, übelriechender Schweiß durch die geringste Anstrengung, besonders nachts.**
- Anämie.
- Atrophie der Drüsen.
- Epileptische Konvulsionen durch Schreck.
- Blutungen mit dünnem, fauligem, hellrotem, nicht geronnenem Blut.
- Leukämie.
- Poliomyelitis.
- Skorbut.
- Intemperament

KETOGLUTARICUM ACIDUM

(Alpha-Ketoglutarsäure - Keto-ac.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Lernstörungen.** Konzentrationsschwierigkeiten besonders beim Lesen. Der Geist ist verwirrt, das Kind fühlt sich benommen und schläfrig. Langsames Sprechen und Stumpfsinn.
- ▶ Reizbar schon durch Kleinigkeiten; reizbar schon morgens beim Aufwachen. Geistesabwesend.
- ▶ Stiller Kummer aufgrund einer leidvollen Vergangenheit ist der Hauptgrund für die Lernprobleme.
- ▶ Vermehrter Durst und großes Verlangen nach kalten Getränken.
- ▶ Verstopfung, angestregtes Pressen beim Stuhl obwohl dieser weich ist.
- ▶ Schlaflage auf der rechten Seite.

HERKUNFT

- Dieses Ketonderivat der Glutarsäure wurde von David Riley eingeführt und bezieht sich, wenn nicht näher bezeichnet, immer auf die Alpha-Variante, also Alpha-Ketoglutarsäure.
- Die wichtigste Aufgabe dieser Säure ist im Körper innerhalb des Zitronensäurezyklus die Bildung von Aminosäuren und der Transport von Stickstoff. Ganz bedeutsam ist auch ihre Funktion als Nahrungsergänzungsmittel für Bodybuilder, da sie angeblich die Kondition verbessern soll.

KREOSOTUM

(Destillat aus Buchenholzteer - Kreos.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Kinder mit angeborener Gedächtnisschwäche und sehr schwacher Auffassungsgabe (Anac., Nux-m.).
- ▶ Kinder, die nachts oft schreien.
- ▶ Schlecht gelauntes und mürrisches Kind; es schreit die Eltern an, weil sie ihm nicht geben, was es will, aber wenn man es ihm gibt, wird es weggeworfen (Bry., Cina, Cham., Staph.). Eine Art permanenter Unzufriedenheit.
- ▶ Sehr ruhelos.
- ▶ Ärgert sich über jede Kleinigkeit und wirft im Zorn mit Gegenständen.

KÖRPER

- ▶ Tuberkulöses und syphilitisches Miasma.
- ▶ Große, hagere, alt und kränklich aussehende, unterernährte Kinder von dunklem Teint.

Dieses Mittel, abgekürzt „Kreos.“, sollte zusammen mit Ars. und Mere, studiert werden. Nicht verwechseln mit Kresolum, abgekürzt „Kres.“!

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Beschwerden durch Misshandlung.** Ein nützliches Mittel für **sexuell missbrauchte** Kinder.
- Der unterdrückte Zorn über den sexuellen Missbrauch zeigt sich im zornigen Verhalten des Kindes. Es wirft mit Gegenständen, wird wütend, wenn man ihm etwas verweigert, und ist trotzig und unzufrieden.
- Kreosotum ist ein tief greifendes Mittel für Kinder mit Krebs nach sexuellem Missbrauch.
- **Nächtliches Schreien und Kreischen bei zahnenden Kindern.**
- Während der Zahnung werden die mentalen Symptome sehr viel schlimmer. Die Kinder werden noch gereizter, wütender und schreien schon bei kleinsten Vorkommnissen.
- Starrköpfiges Kind, neigt zum Schreien, bekommt Wutanfälle, **wirft Gegenstände umher** und wimmert, wenn Dinge, die er verlangt, abgelehnt werden.
- Ärgerlich, mürrisch und schlaflos bei Zahnung.
- Verlangen, getragen und gestreichelt zu werden.
- Vergesslich.

- Jammernd und reizbar bei Schmerzen.
- Ruhelos, besonders nachts.
- Empfindlich auf Musik; Musik regt ihn auf oder bringt ihn zum Weinen.

KOPF

- Kopfhaut empfindlich sogar gegen Haarekämme.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krusten oder Schuppenbildung mit Abschuppung der Kopfhaut.
 - CT: Hirnblutung.

AUGEN

- **Staphylokokkeninfekt des Augenlides bei Kleinkindern mit heißem Tränenfluss.**
- Augen zittern unkontrollierbar.
- Neigt dazu, die Augen häufig zu reiben.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bluten aus den Augen.
 - Anhaltendes Zucken der Augenlider.
 - Entzündung oder zystischer Tumor der Meibom-Drüsen (Con., Staph., Thuj.). '
 - Fisteln der Tränenorgane.
 - Die Lider, besonders die Lidränder, sind geschwollen und rot, mit unerträglichem Jucken.
 - Starrer, stumpfer Blick.
 - Eingesunkene Augen mit erweiterten Pupillen und blauen Ringen um die Augen.
 - Ulzeration der Hornhaut.

OHREN

- Chronische Mittelohrentzündung mit Heraussickern von wässrigen und übelriechenden Absonderungen.
- Jucken in den Ohren.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blasen und Herpesausschlag im Gebiet der Ohren.
 - Hitze, Röte und Schwellung des linken Ohres mit Vergrößerung der Halslymphknoten.
 - Pickel im Ohr.

NASE

- **Wässriger, reichlicher, ätzender Schnupfen, macht die Oberlippe wund.**
- Chronischer Katarrh.
- Nasenbluten mit dünnem, hellrotem oder schwarzem, geronnenem Blut.
- Morgendliches anfallsartiges Niesen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Epitheliom.
 - Fächerartige Bewegungen der Nasenflügel bei Pneumonie.
 - Scheußlich übelriechende Nasenabsonderungen.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Gesicht **fühlt sich bei Berührung heiß an, mit umschriebenen roten Flecken auf den Wangen.**
 - **Befeuchtet die Lippen ständig** (Puls.).
 - Akne rosacea.
 - Risse in den Mundwinkeln, besonders rechts.
 - Herpesausschlag mit gelben Blasen, besonders um den Mund.
 - Alt aussehende Kinder, mit leidendem Gesichtsausdruck.
 - Der Teint ist entweder dunkel oder hell
 - Rote Lippen, die schnell reißen und bluten.
 - Schwellung der submaxillären Lymphknoten.

MUND

- **Fauliger Mundgeruch.**
- **Schneller, vorzeitiger Verfall und Karies der Milchzähne;** sobald sie erscheinen, werden die Zähne direkt an der Zahnfleischlinie weggefressen (Staph., Calc-f.); die Verfallsgeschwindigkeit ist schneller als das Wachsen der Zähne.
- Zahnschmerzen bei Karies.
- Während der **Zahnung wird alles schlimmer**, Konvulsionen, Verstopfung, Durchfall oder Husten, auch der Appetit ist dann sehr wechselhaft.
- Zähne neigen dazu, leicht zu zerkrümeln.
- Sehr schmerzhaftes Zahnung; das Kind schreit die ganze Nacht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen.
 - Schwarze Flecken auf den Zähnen, die eine gelbliche Verfärbung haben.
 - Bläulich-rotes, schwammiges Zahnfleisch, das leicht blutet und etwas von den Zähnen gelöst ist.
 - Schaumiger Speichel.
 - Eiterfluss.
 - Zunge weiß belegt.
 - Geschwüre, die zur Blutung neigen.
 - Keilförmige Zähne.

HALS

- Rauheit und Kratzen beim Husten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kleine, runde, bläulich-rote Flecken oder Geschwüre.
 - Mandelentzündung, besonders der linken Tonsille.

MAGEN

- **Aufstoßen und Schluckauf, besonders beim Aufstehen, beim Aufsitzen oder Getragenwerden.**
- **Tiefer und langanhaltender Widerwille gegen Essen bei Rekonvaleszenz von Pneumonie, Malaria oder Hepatitis A.**
- **Nahrung wird nach einigen Stunden unverdaut wieder erbrochen.**
- **Übelkeit und Erbrechen bevor er zur Schule geht.**

- **Plötzliches, anhaltendes Erbrechen von unverdauter Nahrung mehrere Stunden nach dem Essen.**
- Übelkeit beim Autofahren
- Trinkt gierig.
- Schaumiges Aufstoßen und Erbrechen.
- Bluterbrechen.
- Hunger verschlimmert.
- Vergebliche Versuche zu erbrechen; es kommt nur Schleim.
- Würgen beim Husten.
- Erbrechen nach Fleischgenuss.
- Verschlimmerung: Obst, Essig.
- Abneigung: Gekochtes Essen, Saures.
- Verlangen: **Gegrilltes oder geräuchertes Fleisch** (Caust., Tub.), **Saures**.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verhärtete, harte Stellen tastbar im Epigastrium (aufgrund von Pylorusstenose).
 - Empfindlichkeit der Magengrube (Epigastrium) bei Palpation.

ABDOMEN

- **Das Kind widersetzt sich gegen enge Kleidung um das Abdomen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Auftreibung des Abdomens nach dem Stillen, aber nicht sehr hart bei Palpation.
 - Intussuszeption.
 - Schwellung und Hypertrophie der Mesenterialdrüsen.

REKTUM

- **Das Kind jammert und schreit beim Stuhlgang vor Schmerzen.**
- **Grünliche, wässrige, blutdurchzogene, sehr übelriechende Stühle mit Dehydratation und unstillbarem Durst bei gestillten Säuglingen während Zählung.**
- Chronischer Durchfall bei Kindern mit Tuberkulose in der Vorgeschichte oder in der Familienanamnese.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zusammenschnürung oder Strikturen von Anus und Rektum.
 - Wundheit des Perineums und der Haut zwischen den Gesäßbacken durch ätzenden Stuhl.

HARNWEGE

- Das Kind träumt vom Urinieren, während es tatsächlich das Bett einnässt.
- Unwillkürliches Herausspritzen von Urin beim Hinlegen und beim Niesen oder Husten.
- Enuresis nocturna in der ersten Schlafphase (Sep.), aus der das Kind nur schwer zu wecken ist.
- Häufiges Urinieren von reichlichem, blassem Urin.
- Übelriechender, ätzender Urin, der das Perineum wund macht.
- Plötzlicher Harndrang im Schlaf, der das Kind aufweckt, aber es kommt nicht

- Untersuchungsergebnisse:
 - Ultraschallbild: Blasensteine.
 - Urin von brauner oder rötlicher Farbe oder Ablagerung von rotem oder weißem Sediment in der Windel.
 - Urin: Glucose ++.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Ätzende, reichliche Leukorrhoe bei jungen Mädchen.
- Wollüstiges Jucken der Vagina und zwischen den Labien.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Geschwollene Labien und Vulva.
 - Geschwüre im Vaginalbereich.

KEHLKOPF

- Heiserkeit am Morgen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Tuberkulose des Kehlkopfes.

ATMUNG

- **Unterbrochene Atmung, das Kind schnappt beim Husten nach Luft.**
- Häufiges Verlangen, einen tiefen Atemzug zu nehmen.
- Nervöses Asthma.

HUSTEN

- **Husten bei Zahnung.**
- **Husten beim Lagewechsel oder Umdrehen im Bett.**
- **Anfallartiger Husten im Winter, der das Kind erschöpft.**
- Reichlicher, gräulicher, eitriger Auswurf bei jedem Hustenanfall.
- Husten nach Grippe.
- Der Husten zwingt das Kind, die ganze Nacht aufzusitzen.
- Trockener, krampfartiger Husten, bringt das Kind zum Würgen, mit dem vergeblichen Versuch zu erbrechen.
- Hämoptyse [Bluthusten] von schwarzem, geronnenem Blut.
- Würgen beim Husten.
- Untersuchungsergebnis:
 - Hält beim Husten die Brust mit beiden Händen.

BRUST

- Akute und verschleppte Pneumonie.
- Bronchitis bei Zahnung.
- Schmerzen in der Brust beim Husten.
- Untersuchungsergebnis:
 - Röntgen/Thorax: Pneumonische Verdichtung.

HERZ UND KREISLAUF

- Untersuchungsergebnisse:
 - EKG zeigt Endokarditiszeichen.
 - Puls weich, klein, schnell, intermittierend.

RÜCKEN

- Krampfartige Kontraktionen der Halsregion, ziehen des Kopfes nach hinten.
- Untersuchungsergebnis:
 - Schwellung der zervikalen Lymphknoten.

EXTREMITÄTEN

- Reichlicher Schweiß der Handflächen und Fußsohlen, sehr übelriechend.
- Schwellung der Handgelenke abwechselnd mit Schwellung der Kniegelenke.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue, blutunterlaufene Flecken (Ekchymosen) an den Füßen und Schenkeln.
 - Spröde und rissige Haut der Hände.
 - Ödeme der Füße, die sich kalt anfühlen.

SCHLAF

- Das Kind schläft nicht, bis es gestreichelt und liebkost wird.
- Deutliche Schläfrigkeit am Tage, begleitet von häufigem Gähnen, aber nachts liegt es bis zu später Stunde wach.
- Lacht laut und neigt dazu, dauernd im Schlaf zu stöhnen.
- Gähnen und Schläfrigkeit bei den meisten Beschwerden.
- Ruhelos, wirft sich die ganze Nacht herum.
- Schläft lieber auf dem Rücken.
- Schläft mit halboffenen Augen.
- Zusammenschrecken im Schlaf beim ersten Einnicken, wie durch Schreck.

FIEBER

- Wärme bessert nicht, obwohl das Kind sich bei Fieber sehr kalt fühlt.
- Das Froststadium ist gefolgt von Hitze und dann Schweiß.
- Husten steigert meist den Fieberanfall.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalter Schweiß.
 - Extreme körperliche Unruhe bei Hitze, umschriebene Röte des Gesichtes und eiskalte Füße.

HAUT

- Heftiges, unkontrollierbares Jucken, besonders abends; das Kind kratzt die Stelle, bis sie offen ist und blutet.
- Ein gutes Mittel für Wundsein.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundgelegene Stellen bei Säuglingen.
 - Ekzeme.
 - Intertrigo.
 - Feuchte Ausschläge, besser durch Wärme.
 - Psoriasis.
 - Skabies.
 - Kleine Wunden bluten reichlich

- Urtikaria.
- Schrumpelig, welk.

ALLGEMEINES

- **Reichliche, brennende, heiße, wundmachende, sehr übelriechende Absonderungen, die die Stelle röten.**
- **Ausgeprägte Verschlechterung vieler Beschwerden nach Sonnenuntergang** (Syph.).
- **Reichliche, passive Blutungen von dunkelbrauner Farbe, sogar aus sehr kleinen Wunden** (Lach., Phos.); vorgefunden bei Störungen der Gerinnungsfaktoren, wie Hämophilie oder Funktionsstörungen der Blutplättchen; Blutungsneigung nach Mandelentfernung oder Zahnextraktion.
- **Sehr fröstelig, mit kalten Beinen und Füßen, aber das Gesicht kann heiß sein.**
- Angiom.
- Konvulsionen bei Zahnung.
- Hagere Kinder, unterernährt, zu schnell gewachsen, runzliges Gesicht und nervös.
- Linksseitige Beschwerden.
- Rapide Abmagerung, mit großem Schwächezustand und Erschöpfung durch die geringste Anstrengung.
- Nützlich in Fällen von Skorbut.

HERKUNFT

- Familie der Fagaceae.

LAC CANINUM

(Hundemilch - Lac-c.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Kinder, die in einer Umgebung geboren und großgezogen werden, in der ein Elternteil sie misshandelt und vernachlässigt und ihnen Liebe, Zuneigung und Pflege verweigert, obwohl das Kind sich nach seinen Eltern sehnt.
- ▶ Kinder mit schwersten Schuldgefühlen und gelegentlichen Suizidgedanken; sie fühlen sich völlig unzureichend und rechtfertigen sich ständig mit dem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit.
- ▶ Kleingewachsene Mädchen entwickeln ein negatives und minderwertiges Körperbild wegen ihrer Akne, Körperbehaarung, dunklen Hautfarbe, kleinen Brüsten und ihrer kleinen Statur.
- ▶ Bulimie nach sexuellem Missbrauch (Carc., Ign., Nat-m., Op.).
- ▶ Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft hoffnungslos niedergeschlagen waren und nicht allein sein wollten mit ihren Ängsten und bizarren Fantasien, die sie eher bei Licht als in der Dunkelheit quälten.
- ▶ Kinder, die bei der Anamnese oft Dinge sagen wie: „Keiner mag mich.“, „Ich bin dumm.“, „Ich sehe furchtbar aus.“, „Ich hasse mich.“, „Ich bin zu dick und unattraktiv.“, „Warum muss ich so leben?“ usw.
- ▶ Kinder, die lange körperlich und sexuell mißbraucht wurden und sich nie dagegen wehrten. Das führt zu mangelndem Selbstwertgefühl und Selbstverachtung; das Kind glaubt dann, es sei bedeutungslos und werde von anderen abgelehnt. Es lebt mit dem ständigen Gefühl, ein Versager zu sein.

KÖRPER

- ▶ Angeborene Milchunverträglichkeit (Aeth., Calc., Sil.).
- ▶ Wandernde Schmerzen, kreuzweise oder von Seite zu Seite hin und her wechselnd.
- ▶ Vorgeschichte wiederkehrender Mandelentzündungen, Allergien der oberen Atemwege, chronisch rezidivierende Sinusitis.
- ▶ Verdauungsprobleme und rezidivierende Infekte bei Kindern, die nie Muttermilch bekamen, besonders bei Waisenkindern oder sehr früh abgestellten Kindern.

DD: Dieses Mittel muss mit Lach, und Phos. verglichen werden.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Zerstreut; kann sich beim Lesen oder Lernen nicht konzentrieren;** extrem vergessliche Kinder (Anac., Caust., Nat-m.).
- Kinder, die die Angewohnheit haben, auf **die geringste Provokation hin zu lästern oder zu fluchen** (Nit-ac.).
- Kinder, die **niemals ausdauernd sind in einem Hobby, einer Aktivität oder in der Schule**; erreichen letztendlich gar nichts; **selbstzerstörerisch oder selbstsabotierend**, unternimmt z. B. vieles, hält aber nichts durch.
- **Verlangen nach Gesellschaft mit Furcht vor dem Alleinsein.**
- Lac-c.-Kinder haben **keinen Abwehrpanzer, um sich selbst zu schützen.** Äußerlich zeigen diese Kinder eine Art Ruhelosigkeit, die sie von ihrem inneren Schmerz ablenkt.
- **Ruhelosigkeit, Weinen und Schreien bei Kindern nachts oder im Schlaf.**
- **Selbstzerstörerische Kinder**; das kann sich in **unfallträchtigem Verhalten oder Selbstvernachlässigung äußern.**
- **Beim Schreiben macht es törichte Fehler**, braucht zu viele Worte oder nicht die richtigen, lässt den oder die letzten Buchstaben des Wortes weg; kann sich nicht auf das Lesen oder Lernen konzentrieren (Bov.- und Graph.-Kindern).
- **Jugendliche haben lebhaft, grauenvolle Vorstellungen von Schlangen.** Sehr häufig zu sehen bei Mädchen in der Pubertät.
- Kinder, auf die herabgesehen wird oder die von ihren Schulkameraden zurückgewiesen werden.
- Zwanghaftes Verlangen, sich dauernd die Hände zu waschen.
- Ärgerliche, reizbare Kinder, die die ganze Nacht weinen und schreien (Jal., Psor.).
- Verlangen nach Licht.
- Extrem Willensschwäche Kinder mit geringem Körperbewusstsein.
- Furcht, die Treppe herunterzufallen.
- Geistig schwer behinderte Kinder mit schrillum Schreien.
- Frech.
- Neugeborene und Kleinkinder, die leicht zusammenschrecken.

KOPF

- **Migräne bei Schulkindern, wobei der Schmerz die Seiten wechselt**, d. h. wenn der Schmerz auf der einen Seite nachlässt, wird der Schmerz auf der anderen Seite heftiger; schlimmer bei kaltem Wind und besser im warmen Zimmer.
- Chronische Kopfschmerzen nach Kopfverletzungen (Nat-s.).
- Kopf seitwärts gezogen, besonders bei Tonsillarabszess und Vergrößerung der Halslymphknoten.
- Kopfschmerzen abwechselnd mit Halsschmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:

AUGEN

- **Schwierigkeiten, Gegenstände zu unterscheiden, auch beim Lesen, weil die Bilder zu lange verweilen und die Buchstaben ineinanderzufließen scheinen.**
- **Neigung, sich häufig die Augen zu reiben.**
- Schwere der Augenlider.
- Tränenfluss bei Kopfschmerz, beim Schnupfen oder beim Lesen.
- Lichtempfindlichkeit.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dunkle Ringe unter den Augen.
 - Stumpfe und glanzlose Augen.
 - Glaukom.
 - Nicht-ödematöse Schwellung von Ober- und Unterlid.

OHREN

- Alle Geräusche scheinen von weit her zu kommen.
- Angeborene Taubheit.
- Ohrenschmerzen durch kalten Wind oder beim Schlucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Fehlende Reaktionen beim audiometrischen Test (BAER-Test).
 - Trockenness des Ohrenschatz.
 - Grüne, geruchlose Absonderungen.

NASE

- **Dauernde Neigung, sich die Nase zu schnäuzen.**
- Schärfe des Geruchssinns.
- Schnupfen wechselt von Seite zu Seite.
- Verstopfte Nase.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalt bei Berührung.
 - Dauerndes Zupfen an den Nasenlöchern, versucht die Krusten zu entfernen.
 - CT: Entzündung und Exsudation in den Nebenhöhlen, Nasenseptumdeviation, Polypen in den Nebenhöhlen und Verdickung der Nebenhöhlenwände.
 - Übermäßige Krustenbildung in der Nase.
 - Reichlicher, dicker, grünlicher, wund machender Nasenausfluss nachts, der das Kissen färbt.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Ängstlicher Gesichtsausdruck.
 - Gesicht abwechselnd rot und blass.
 - Herpesausschlag oder Fieberblasen um die Lippen.
 - Abschälende Lippen.
 - Rote Farbe der Lippen.
 - Schwellung der submaxillären Lymphknoten und der Parotiden.

MUND

- **Stottert beim Versuch schnell zu sprechen.**
- **Reichlicher Speichelfluss, besonders im Schlaf bei Diphtherie; nässt das Kissen rundherum.**
- Wunder Mund beim Stillen.
- Durstlos trotz trockenem Mund.
- Zahnschmerzen sind besser durch Halten von kaltem Wasser im Mund.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen, die leicht bluten.
 - Glasiger Gaumen.
 - Zahnfleisch geschwollen, zurückgegangen, blutend aufgrund von mangelhafter Ernährung.
 - Mundgeruch.

HALS

- **Erstickungsgefühl beim Schlafengehen.**
- Beschwerden wie Halsweh und Mandelentzündung, bei denen die Symptome **ständig die Seiten wechseln.**
- **Flüssigkeiten kommen beim Versuch zu schlucken wieder aus der Nase heraus.**
- **Schmerzhafte Schlucken, besonders von fester Nahrung.**
- **Halsschmerzen strahlen beim Schlucken zu den Ohren aus.**
- Chronische Pharyngitis.
- Dauernde Neigung zu schlucken durch Kloßgefühl im Hals.
- Trockenheit des Halses beim Erwachen am Morgen.
- Der äußere Hals ist sehr empfindlich gegen Berührung.
- Postmeningitische oder postenzephalitische Lähmung der kranialen Nerven, besonders IX und X, mit Einbeziehung des Nucleus ambiguus (Both., Crot-c.).
- Stechende Empfindung im Hals, wie voller kleiner Spießchen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ödematöse Schwellung des Halses.
 - Verlängerte Uvula, mit leichtem Hervorsickern von Blut.
 - Follikuläre Tonsillitis; weiße, eitrige Geschwüre auf den Tonsillen.
 - Sich berührende Tonsillen.
 - Purpurrote Verfärbung des Halses.

MAGEN

- **Anhaltende oder häufige Anfälle von Übelkeit, die Furcht vor dem Essen hervorrufen.**
- **Großer Durst auf große Mengen Wasser und auch das zu oft, aber das Schlucken fällt schwer.**
- Leeregefühl im Magen, besonders beim Erwachen am Morgen, wird nicht gebessert durch Essen.
- Sehr hungrig, auch nach einer vollen Mahlzeit; unstillbarer Appetit.
- Besser: Fisch.

Abdominaler Schmerz (besonders links oben im Magen) und Obstipation

- Verlangen: Schwarzer Pfeffer, stark gewürztes Essen, heiße Getränke, Marinadensauce, Milch, Senf, scharfe Speisen, Salz.

ABDOMEN

- Schmerzen beim Beugen nach vorn; das Kind fühlt sich besser beim Zurücklehnen.
- Pulsieren im Abdomen.
- Wundsein des Abdomens durch Kleidung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abdomen hart und aufgetrieben durch Blähungen, mit extremer Berührungsempfindlichkeit.
 - Schwellung der Leistendrüsen.

REKTUM

- Tonartige und schwarze Stühle.
- Hartnäckige Verstopfung mit häufigem, vergeblichem Drang, selbst bei weichem Stuhl.
- Tenesmus während Stuhlgang.

HARNWEGE

- Enuresis nocturna; fast ein spezifisches Mittel bei nächtlichem Bettnässen oder in Fällen, in denen andere Mittel nicht geholfen haben (Bac-t).
- Anhaltender oder häufiger Harndrang.
- Reichliches unwillkürliches Urinieren nachts, mit Träumen vom Urinieren.
- Tröpfeln nach dem Urinieren.
- Dysurie, wenn dem Harndrang nicht nachgegeben wird.
- Urin dunkel und stark durchsetzt mit dickem, rötlichem Sediment, das schlecht aus den Windeln zu waschen ist.
- Untersuchungsergebnis:
 - Albuminurie.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Erregbare Genitalien.
- Masturbation bei kleinen Kindern.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Scharfer, blutiger Fluor, besonders tagsüber.
- Jucken der Vulva nachts.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Fauliger Geruch der Genitalien.
 - Geschwollene Labien.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heisere oder veränderliche Stimme.
- Nasale oder belegte Stimme.
- Empfindlichkeit des Kehlkopfs gegen Druck oder Berührung.
- Kann nicht laut sprechen.
- Stimmverlust nach Brüllen und Schreien beim Sport.

ATMUNG

- Erschwerte Atmung macht das Hinlegen unmöglich.

HUSTEN

- **Dauernder Husten durch ein Kitzelgefühl in Hals und Kehlkopf.**
- Husten beim Versuch tief zu atmen.
- Husten mit Auswurf von derbem, zähem, weißem Schleim.
- Hackender, harter und metallischer Husten, schlimmer durch Sprechen und Hinlegen.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Abszessbildung in der Achsel (Hep., Jug-r.).
 - Stinkender Achselschweiß, färbt die Wäsche gelb oder braun.
 - Verhärtung der Achseldrüsen.

RÜCKEN

- Die Wirbelsäule ist empfindlich gegen Berührung und Druck.
- Schmerz in der Sakralgegend, erstreckt sich zur Hüfte und den Oberschenkeln; besser durch Bewegung und schlimmer durch Sitzen.
- Wandernde Schmerzen im Zervikalbereich, zwingen das Kind, mit zurückgebeugtem Kopf zu sitzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schweiß der Zervikalregion.
 - Steifheit und Spannung im Zervikalbereich.

EXTREMITÄTEN

- Hat die Füße gern unbedeckt.
- Ruhelosigkeit der Hände nachts im Bett.
- Rheumatische Schmerzen in den unteren Gliedern und Gelenken, schlimmer durch Wärme und besser durch kalte Anwendungen.
- Kann nicht ertragen, dass sich die Finger untereinander berühren, aufgrund von Schmerz und Empfindlichkeit.
- Kälte der Gliedmaßen nachts, besonders der Fingerspitzen, die sehr empfindlich gegen Kälte sind.
- Krämpfe in den Füßen.
- Schmerz und Schwellung in den Fußgelenken, mit Erweiterung der Knöchelvenen; besser durch heiße Anwendungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Finger krampfartig abgespreizt.
 - Hitze in Handfläche und Füßen.
 - Rheumatisches Fieber, mit Streptokokkeninfektion als Ursprung; mit Antistreptolysintiter über 300 Einheiten; C-reaktives Protein ++.
 - Schwellung und Taubheit der linken Hand.
 - Warzen am Ringfinger.

SCHLAF

- Liegt mit einem gebeugten oder angezogenen Bein, das andere ist ausgestreckt
ODER schläft auf dem Rücken mit den Händen über dem Kopf.
- Schläft mit dem Gesicht nach unten ins Kissen gedrückt oder in Bauchlage.
- Träume von Schlangen, vom Urinieren (wacht in dem Moment auf, in dem sie im Begriff ist, es auch zu tun).
- Ruhelosigkeit im Schlaf, unfähig eine bequeme Position zu finden.

FIEBER

- Reichlicher Schweiß mit starkem, stinkendem Geruch, färbt die Kleidung und die Bettwäsche gelblich-braun.
- Hitze abwechselnd mit Frost.
- Rheumatisches Fieber.

HAUT

- Die Haut ist extrem berührungsempfindlich.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bläuliche ekchymotische Flecken auf der Haut.
 - Angeborene Ichthyosis [Fischschuppenkrankheit].
 - Erysipel, das dauernd die Seiten wechselt.
 - Haut trocken und heiß bei Berührung.
 - Warzen.

ALLGEMEINES

- **Kann nicht die geringste Berührung oder Erschütterung ertragen; muss selbst die Finger gespreizt halten.**
- **Gegensätzliche und abwechselnde Zustände** oder dauernd wechselnde Symptome.
- **Knochenerweichung; Rachitis.**
- **Wärme verschlechtert; Kälte bessert.**
- Baden bessert.
- Maligne Erkrankungen in der Kindheit wie Leukämie und Lymphome.
- Fröstelig; der leichteste Luftzug verschlimmert, aber besser im Freien.
- Große Schwäche und Erschöpfung.
- Sexualorgane leicht erregbar durch Berührung, Druck oder Reibung.
- Leichter Druck verschlechtert; starker Druck bessert.
- Neigung zu allergischen Erkrankungen bei Kindern, die übermäßig viel Milch trinken.

----- Witterung verschlechtert

LAC CAPRINUM

(Ziegenmilch - Lac-cp.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Depressionen mit Persönlichkeitsstörungen und Manie.**
- ▶ Sehr schnell zornig, Wut bei Kleinigkeiten, unkontrollierbare Wut und meistens Wut bei Unterbrechungen. Sehr kritisch, gehetzt und ungeduldig.
- ▶ Will bei Zorn ins Bett gehen und sich hinlegen, wird dann ungezogen, kratzbürstig und wütend.
- ▶ Argwöhnisches und misstrauisches Verhalten, denkt immer seine Freunde reden schlecht über ihn.
- ▶ Boshaft - solange die Menschen das Kind gut behandeln, ist es freundlich. Wird aber zum schlimmsten Feind, sobald jemand versucht es zu verletzen.
- ▶ Ziemlich unruhig und ängstlich, das Kind läuft von Ort zu Ort; Unruhe schlimmer zwischen 16 -23 Uhr.
- ▶ Gefühl von Einsamkeit während der Depression.
- ▶ Beschwerden durch fehlende Familie. Der Vater muss auswärts arbeiten, Erziehung durch nur einen Elternteil oder Aufenthalt in einem Internat.
- ▶ Große Vorliebe für die Farbe grün, die Kinder wollen sich sehr gerne grün anziehen.
- ▶ Weinen wegen der Kopfschmerzen bei Migräne; Kopfschmerzen schlimmer morgens beim Aufwachen und nach Aufenthalt in der Sonne; Gemütszustand zeigt sich in Träumen, die sehr ängstlich sind und von Verfolgung handeln.
- ▶ Großes Verlangen nach gebratenem Essen, Milch, gewürzten Speisen und Süßigkeiten.

HERKUNFT

- Wurde von Dr. Kees Dam aus Amsterdam in die Homöopathie eingeführt.

LAC DELPHINUM

(Milch des Großen Tümmlers - Lac-del.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Künstlerisch kreativ.
- ▶ Hellsehen.
- ▶ Kinder mit Familiensinn.
- ▶ Angst vor Räubern.
- ▶ Tierliebe.
- ▶ Gefühlvoll.
- ▶ Oft lassen sich Angst oder schlimme Erlebnisse der Mutter während der Schwangerschaft als Ursache für die Probleme des Kindes ausmachen.
- ▶ Freundliche und attraktive Persönlichkeiten, die sich gerne unter Menschen aufhalten. Sie fühlen sich verlassen und ungeliebt und möchten deshalb nicht alleine sein.

KÖRPER

- ▶ Kurzer, trockener Kitzelhusten.
- ▶ Allergisches Asthma nach dem Genuss von kalten Getränken und Eiscreme.
- ▶ Allergien der oberen Atemwege mit Sinusitis.
- ▶ Neigung zur Sinusitis.
- ▶ Sonnenhitze schwächt.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch Furcht.
- Das Kind empfindet den Zwang, alles anzufassen.
- Das Kind neigt dazu, sehr verspielt und liebevoll zu sein; scherzt und lacht gern.
- Gewissenhaft in Kleinigkeiten.
- Furcht vor Räubern, in einer Menschenmenge, vor Unfällen.
- Fühlt sich leicht verlassen.
- Hyperaktive Kinder, die Vergnügen und Gesellschaft lieben.
- Geht gern schwimmen.
- Geringes Selbstvertrauen.
- Geräuschempfindlich, besonders beim Schlafengehen.
- Sehr kommunikativ, möchte gern von allen wahrgenommen und beobachtet werden.

AUGEN

- Erhöhte Sehschärfe.
- Photophobie.
- Untersuchungsergebnis:
 - Rötung der Augen.

OHREN

- Fühlen sich verstopft und trocken an.
- Untersuchungsergebnis:
 - Röte des äußeren Ohres.

NASE

- Katarrhalische Beschwerden.
- Schnupfen mit Fieber.
- Sehr anfällig für fieberhafte Katarrhe der Nase. Diese beschränken sich meist auf die Nasennebenhöhlen, von denen permanent wässrige Sekrete abgesondert werden; können sich aber auf die Stirnhöhlen ausweiten oder nach unten in die Kieferhöhle wandern.

MUND

- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen.
 - Rötung der Seiten der Zunge.

HALS

- Schmerzhafte Trockenheit des Halses am Morgen und beim Schlucken.
- Wundschmerz auf der linken Halsseite.
- Wiederkehrende Halsschmerzen besonders auf der linken Seite.
- Untersuchungsergebnis:
 - Der Hals ist rot angeschwollen, mit einer entzündeten linken Tonsille.

MAGEN

- **Launenhafte Essgewohnheiten bei Kindern, die sich verlassen fühlen.**
- Gesteigerter Appetit mit Übelkeit am Morgen.
- Verlangen: Schokolade, kalte Getränke, Eiscreme, Zwiebeln.

ABDOMEN

- Blähungen nach jeglichem Essen.

REKTUM

- Durchfall.
- Schmerzhafte Hämorrhoiden.
- Starke Blähungen nach dem Abendessen.
- Stühle: Dünn, trocken und in kleinen Mengen entleert.

HARNWEGE

- Häufiger Harndrang.

KEHLKOPF

- Kitzeln in den Luftwegen beim Sprechen, gibt Anlass zum Husten.

BRUST

- Schmerzen in der Brust beim Husten.
- Bei Kindern Neigung zur Lungenentzündung.

HUSTEN

- Gräulicher Auswurf.
- Kurzer, trockener Husten, aufgrund von Kitzelempfinden in den Luftwegen.

EXTREMITÄTEN

- Krämpfe in Zehen und Waden.
- Wachstumsschmerzen, speziell am Schienbein, schlimmer beim Gehen.
- Fußschweiß.
- Jucken von Handflächen und Schenkeln.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ausschläge an den Füßen.
 - Schwellung von Füßen und Fußgelenken.

SCHLAF

- Scharfes Gehör, sogar im Schlaf.
- Träume: Unfälle, Tiere (Pferde, Katzen, Hunde, Fische), Autos und Flugzeuge, Hellsichtigkeit, Freunde, Verstecken vor einer Gefahr, Mutter, Wasser.
- Ruheloser Schlaf; wechselt dauernd die Position.
- Leichter und unruhiger Schlaf.

ALLGEMEINES

- Verlangen nach Aktivität und körperlicher Anstrengung.
- Schwäche durch Anstrengung und durch Hitzeeinwirkung, besonders draußen in der Sonne.

Lac-del. kann oft mit **Carc. und Phos.** verwechselt werden, da sie **viele gemeinsame Symptome** haben, von denen einige wie folgt aufgeführt sind:

- Gefühlvoll.
- Angst um die Familie.
- Hellsichtigkeit.
- Kreativ und künstlerisch.
- Verlangen: Schokolade, kalte Getränke, Eiscreme.
- Tierliebe.

LAC FELINUM

(Katzenmilch - Lac-f.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ **Adoptierte Kinder** aus Jugendstrafanstalten oder aus dem Pflegeheim.
- ▶ Schmerz und Trauer beim **Tod von Haustieren** (Hund oder Katze), kann die Trennung nicht verkraften.
- ▶ Sehr tierlieb.
- ▶ Hellsichtigkeit und Intelligenz.
- ▶ Große Angst vor Nadeln, spitzen Gegenständen und Hunden.
- ▶ Kopfschmerzen meist mehr auf der linken Seite des Kopfes oder genau über der Augenbraue. Scharfer einschießender Schmerz, schlimmer durch Lesen und jegliche Anstrengung der Augen.
- ▶ Stirnhöhlenvereiterung auf der linken Seite, mit scharfen schneidenden und einschießenden Schmerzen.
- ▶ Zerklüftete Zunge; schlimme Verstopfung, der Stuhl kommt heraus, schlüpft aber dann sehr schnell wieder zurück.
- ▶ Ausgeprägte Abneigung gegen fette Speisen; großes Verlangen nach Milch und unverdaulichen Dingen, wie Bleistifte, Erde, Kreide und Ton.

LAC HUMANUM

(Muttermilch - Lac-h.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Kinder, die sexuell missbraucht wurden und oft vom Tod, schmutzigem Wasser, furchtbarer Schuld, Verfolgung usw. träumen.
- ▶ Extrem verunsicherte Kinder bei Familienkonflikten oder elterlichem Streit; die Unsicherheit zeigt sich indirekt auch in Träumen von Gefahr, Tod, Absturz, Mord, Streitereien, Krieg, wilden Tieren etc.
- ▶ Das Kind fühlt sich verlassen, einsam, missachtet und entfremdet von Freunden und Familie.
- ▶ Fühlt sich wie „weggetreten“. Traumartiger Zustand und Unbeholfenheit wegen der Missachtung durch die Familie, will gerne allein sein und es kann vorkommen, dass es sogar an den Tod denkt.
- ▶ Die Gefühle des Kindes werden unterdrückt von einer Autoritätsfigur, z. B. von den Eltern, Lehrern, überlegenen Freunden-etc. Das kann sich indirekt in Träumen zeigen mit Bildern von Löwen, in denen sie für ihr Recht kämpfen oder fliehen.
- ▶ Missachtung oder Enttäuschung der Mutter in der Schwangerschaft, eine Familiensituation von Alleinerziehenden, Tod eines Familienmitgliedes oder auch eines Haustieres können einen Lac- humanum-Zustand entstehen lassen.
- ▶ Nie mehr gesund nach sexuellem Missbrauch.
- ▶ Schlechte Beziehung zur Mutter. Das Kind ist der Ansicht, dass es wegen der Mutter traurig und depressiv ist.
- ▶ Gefühl unbeliebt zu sein und deshalb möchte das Kind sich an etwas festhalten, z. B. an einem Spielzeug oder einem anderen ausgewählten Gegenstand. Hat auch immer etwas im Mund wie z. B. den Daumen oder Kaugummi.
- ▶ Schwere Essstörungen

KÖRPER

- ▶ Ungeschicklichkeit, lässt dauernd Sachen aus den Händen fallen; **stolpert beim Gehen.**
- ▶ Chronischer Durchfall bei Malabsorptionssyndrom und Zöliakie; starker plötzlicher Stuhldrang am Morgen.
- ▶ Entweder sehr energisch oder völlig energielos.

DD: Die Symptome sind denen von Calc. und Sacch. sehr ähnlich.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Aufgeweckt und energisch;** Verlangen, dauernd aktiv zu sein; abwechselnd mit Faulheit.
- **Abneigung gegen und ängstlich oder reizbar in Gesellschaft; verlangt Einsamkeit, die bessert.**
- **Launisch.**
- Lernstörungen, macht **eine Menge Fehler beim Buchstabieren und Schreiben, beim Rechnen, in Bezug auf die Zeit und die Orientierung.** Fehlende Konzentration besonders beim Rechnen. Schlechtes Namensgedächtnis, kann sich aber auch nicht merken, was es eben gerade gelesen hat.
- **Unordentlich oder extrem ordentlich.**
- Unbeholfen.
- Versagensangst in Prüfungen.
- Gleichgültigkeit gegen alles.
- Ringt ständig die Hände.
- Krankhafter Impuls, mit Feuer zu spielen; z. B. mit Streichhölzern, Gasfeuerzeugen, elektrischen Feuerzeugen und Öfen.
- Periodisches Verlangen, auf Mutters Schoß zu klettern, zu schmusen und sie zu lieben.
- Gefühl des „high-Seins“, mit traumartigem Zustand und Unbeholfenheit, resultierend aus der Missachtung durch die Familie.
- Wutanfälle, wenn irgendetwas abgelehnt wird, gefolgt von schneller Reue; Neigung, sich selbst zu verletzen oder sich wehzutun.
- Daumenlutschen.

KOPF

- Katarrhalische Kopfschmerzen.
- Migräne, besser durch Liegen in einem dunklen Raum oder Autofahren.

AUGEN

- Tränenfluss im Wind oder durch Luftzug.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ekchymosen.
 - Schwellung des rechten Oberlides.

NASE

- **Verstopfung der Nasenlöcher, hauptsächlich einseitig, beim Erwachen am Morgen.**
- Brennende Schmerzen in der Nase wie von Pfeffer.
- Anfallsweises Niesen ohne jegliche Absonderung, besonders in kalter Luft und bei Luftzug.
- Laufende Nase; die Absonderung ist mild, klar und wässrig.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Absonderungen: Weiß und dick.

- Entzündung der Nasennebenhölen.
- Retronasale Absonderungen.
- Rote Nasenspitze.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Furunkel auf der Stirn.
 - Herpesausschlag um die Lippen.

MUND

- Speichelfluss, besonders morgens beim Erwachen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aphthen an der Innenseite der Oberlippe.
 - Blutendes Zahnfleisch.
 - Risse in den Mundwinkeln.
 - Mundgeruch.

HALS

- Reizung und Kitzeln im Hals.
- Flüssigkeit läuft teilweise vom Mund unkontrolliert in den Kehlkopf und verursacht Würgen (Kali-c.).
- Halsschmerzen, erstrecken sich zu den Ohren; besser durch Schlucken und besser durch warme Getränke.
- Halsschmerzen, schlimmer morgens beim Aufwachen; besser durch warme Getränken.
- Untersuchungsergebnis:
 - Dicker, klebriger Schleim oder Katarrh im Hals.

MAGEN

- **Häufiger Durst auf große Mengen von Wasser, besonders nachts.**
- Dauerndes Aufstoßen, besser nach Trinken.
- Aufstoßen riecht wie faule Eier.
- Schluckauf beim Essen.
- Gesteigerter Appetit; Verlangen, ständig etwas zu knabbern.
- Milch schmeckt sauer oder sehr süß.
- Übelkeit beim Anblick oder Geruch von Essen, besser durch Essen oder durch Bewegung.
- Abneigung: Milch, Suppe und **saure Speisen.**
- Verlangen: **Schinken**, Schokolade, kalte Getränke, **Sahne, Eier**, Milch, Pudding, reichhaltiges Essen, Salz, Süßigkeiten, **Tee**, Ingwer.

ABDOMEN

- Auftreibung des Abdomens nach Essen.
- Schmerzen im Abdomen vor Stuhlgang.

REKTUM

- **Chronischer Durchfall aufgrund von Malabsorptionssyndrom, verbunden mit Zöliakie; hat starken, plötzlichen Stuhldrang am Morgen.**
- Grüne Stühle.

HUSTEN

- Trockener und bellender Husten, besonders im Liegen.
- Zäher, fadenziehender, metallischer oder salzig schmeckender Auswurf.

EXTREMITÄTEN

- Ungeschicklichkeit der Hände; lässt dauernd Sachen fallen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Gänsehaut an den Beinen.
 - Hitze der Handflächen.

SCHLAF

- Schlaflosigkeit fast bis um 1 - 2 Uhr, durch Gedankenandrang.

HAUT

- Spärlicher Schweiß.

ALLGEMEINES

- **Entweder sehr energisch oder völlig energielos.**
- Ein gutes Mittel bei Mukoviszidose, Laktoseintoleranz, Malabsorptionssyndrom und Rachitis.
- Fröstelige Kinder.
- **Erkältungsneigung.**
- Generelle Empfindlichkeit, mit Verschlechterung durch die geringste Berührung.

LAC LEONINUM

(Löwenmilch - Lac-leo.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Zorniges Kind, wird rasch ausfällig; das Ego ist sehr schnell verletzt.
- ▶ Führungsqualitäten.
- ▶ Kinder, deren Mutter ungerecht und schäbig behandelt wurde oder ihren Zorn während der Schwangerschaft unterdrücken musste.
- ▶ Diktatorische Kinder, Einzelkinder oder Erstgeborene.
- ▶ Will in allem der Beste sein.

KÖRPER

- ▶ Heiße Patienten: Brauchen ständig Ventilator oder Klimaanlage.
- ▶ Hals empfindlich gegen Kleiderdruck.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Ehrgeizige und konkurrenzbetonte** Kinder.
- **Hochmütig**; fühlt sich als bedeutende Person oder ist körperlich sehr stark.
- **Körperliche Ruhelosigkeit** bei Kindern; muss dauernd in Bewegung sein.
- **Heftiger Zorn**, mit Verlangen zu schlagen und sehr ausfallend beim geringsten Widerspruch.
- Antwortet schnippisch, einsilbig; scheint sehr grob und unhöflich zu sein, wenn er angesprochen wird.
- Ungeschickt.
- Hinterlistig.
- Fühlt sich ausgelacht oder verspottet.
- Impuls, seltsame Dinge zu tun.
- Intuitiv oder heilsichtig.
- Reizbar durch Kleinigkeiten. Hat eine sehr geringe Toleranz- und Geduldsschwelle.
- Eifersucht.
- Tierliebe.
- Spielt und schwimmt gern.
- Arglistiger und bedrohlicher Charakter.
- Musik bessert.
- Streitsüchtige Kinder; fangen gern zum Spaß Streit an.
- Empfänglich für die Natur und Objekte aus der Natur.
- Empfindlich gegen Tadel und Vorwürfe

AUGEN

- Neigung zu zwinkern.
- Zucken des linken Oberlides.
- Untersuchungsergebnis:
 - Schwellung der Oberlider, besonders rechts.

MUND

- Trockenheit des Mundes.
- Wundheit der Zungenspitze.

HALS

- Am Hals empfindlich gegen Kleidung.
- Fremdkörpergefühl im Hals.
- Halsschmerzen beim Erwachen am Morgen.

MAGEN

- Verminderter Appetit mit schneller Sättigung.
- Aufstoßen nach dem Essen.
- Übelkeit am Morgen.
- Durst auf große Wassermengen.
- Verlangen: Kalte Getränke, Gurken, Obst, saftige Speisen, Fleisch, Milch, Kartoffeln, scharfe Speisen, Salz, Spinat, Gemüse (besonders roh), Joghurt.

ABDOMEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Aufgetriebenes Abdomen.

REKTUM

- Blähungen mit widerlichem Geruch wie faule Eier.
- Die Stühle sind von dunkler Farbe.
- Untersuchungsergebnis:
 - Krampfartige Zusammenziehung des Rektums.

HARNWEGE

- Harnröhrenreizung.
- Schmerzen in der linken Niere.

KEHLKOPF

- Untersuchungsergebnis:
 - Laute Stimme.

HUSTEN

- Heftiger, krampfhafter, anfallsartiger Husten.

EXTREMITÄTEN

- Ungeschickte Bewegungen der Extremitäten.
- Taubheit der Hände im Schlaf.
- Schmerz in den Beinen, besonders beim Stehen.

SCHLAF

- Träumt von: Flugzeugen, von wilden Tieren (Tiger, Schlangen etc.), verfolgt zu werden, Katzen, Insekten, Reisen, Monstern, Spielen, Polizei, Schule, Urinieren oder Wasser.
- Schläfrigkeit tagsüber, besonders beim Sitzen.
- Schlaflosigkeit vor Mitternacht durch Ruhelosigkeit und Gedankenandrang.

HAUT

- Scharfer, wundmachender Schweiß.
- Das Jucken ist besser durch Kratzen, gefolgt von Brennen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urtikaria.

ALLGEMEINES

- Besser durch Luftzufächeln, im Freien oder am Meer.
- Hunger verschlimmert.
- Alles tut weh beim Erwachen am Morgen.
- Meistens schlimmer morgens und besser abends.
- Wärme verschlimmert.
- Schwäche und Schwerfälligkeit des Körpers.

LAC VACCINUM DEFLORATUM

(entrahmte Kuhmilch - Lac-d.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Sanfte, freundliche Kinder (Puls., Rhus-t., Sil.) mit hübschem Äußeren.
- ▶ Anziehende Persönlichkeit.
- ▶ Lebhaftes Sprechweise (Hyos., Lach.).
- ▶ Erträgt schweigend allen Kummer in seinem Umfeld (Ign., Nat-m.), z.B. die außereheliche Affäre des Vaters, die ehelichen Misshandlungen der Mutter, Aggression und Gewalt des Vaters gegenüber anderen Familienmitgliedern.
- ▶ Große Angst, aus oben genannten Gründen die Mutter zu verlieren
- ▶ Seelische Traumata bei Kindern, die von ihren Müttern beim Stillen vernachlässigt wurden (Lac-h., Mag-m., Sacch., Sep.).
- ▶ Starkes Gerechtigkeitsempfinden, fühlt sich von seiner Hilflosigkeit gegenüber Ungerechtigkeit erdrückt, besonders wenn sie sich gegen Schulkameraden und Freunde richtet.
- ▶ Sehr liebevolle Kinder, die ihre Mutter verehren. Das Wort „Mutter“ bedeutet ihnen alles. Übermäßige Sorge um die Mutter. Starkes Mitgefühl, wenn die Mutter in ihrer Beziehung leidet oder das Kind selbst zusammen mit der Mutter in einer schwierigen Beziehung leidet.
- ▶ Sorgt sich sehr um die Mutter, wenn die Mutter von ihrem Partner oder Ehemann unterdrückt wird.
- ▶ Braucht gute Beziehungen zu Freunden, Freunde bedeuten ihm viel, kann nicht ohne Freunde oder ohne deren Unterstützung leben
- ▶ Große Angst vor Ablehnung im Freundeskreis oder bei den Schulkameraden (Mag-c., Nat-m.).
- ▶ Nie mehr gesund, seit er von Freunden verlassen wurde (Arg-n., Puls.)
- ▶ Träume, von Freunden verfolgt, geschlagen oder getrennt zu werden, sind ein deutlicher Hinweis auf die Unsicherheit des Kindes und sein Schutzbedürfnis.
- ▶ Geistige Retardierung durch Fehlernährung.

KÖRPER

- ▶ Ernährungskrankheiten, die direkt oder indirekt durch einen Mangel an essenziellen Nährstoffen verursacht wurden. Protein-Energie-Mangelernährung bei kleinen Kindern, selbst bei guter Ernährung.
- ▶ Angeborene Störung der Calcium-Resorption, die zu Rachitis und Tetanie führt.
- ▶ Vielfältige Mangelerkrankungen, wie Keshan-Krankheit, Eisenmangel, Eisenmangelanämie, schwere Wachstumsstörung infolge Zinkmangel.

- ▶ Übermäßiger Genuss von Schokolade und Milchprodukten führt zu schweren Ernährungsstörungen.
- ▶ Übergewicht bei kleinen Kindern aufgrund zu hoher Kalorienaufnahme im Verhältnis zur körperlichen Bewegung, was zu einer gestörten Energiebilanz führt.
- ▶ Übergewicht bei Kindern, deren Nahrung zu wenig Nährwert und zu viel Fett, Zucker und Zusatzstoffe enthält.
- ▶ Übergewicht durch akute Überernährung.
- ▶ Struma bei Kindern durch strumigene Nahrungsmittel, die die Jodaufnahme behindern.
- ▶ Juveniler Diabetes. Hilft, den Glukosespiegel bei minimalem Einsatz von Insulin aufrecht zu erhalten.
- ▶ Akutes und chronisches Nephrotisches Syndrom bei Kindern mit ernährungsbedingter Schwäche.
- ▶ Beschwerden bei Kindern, die zu schnell abgestellt wurden.
- ▶ Verstopfung; mit erfolglosem Stuhldrang (Anac., Nux-v.); Stuhl trocken und hart (Bry., Sulph.); Stuhl umfangreich, hart, geht nur unter viel Anstrengung ab, Anuslazeration; schreit beim Drücken vor Schmerzen.
- ▶ Völlig erschöpft, selbst wenn sie nichts tut; starke Ermüdung beim Gehen.
- ▶ Wassersucht; durch organische Herzkrankheit; durch chronische Leberbeschwerden; fortgeschrittene Albuminurie; nach intermittierendem Fieber.
- ▶ Abmagerung, lokal und generalisiert.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- starke Ruhelosigkeit, extreme und lang anhaltende Schlafstörungen (Cocc., Nit-ac.)
- Große Verzweiflung aufgrund eines körperlichen Leidens wie Diabetes mellitus, Nephrotisches Syndrom, Migräne usw. Niedergeschlagenheit führt zu Tränenausbrüchen.
- Schwere Lernstörung mit Gedächtnisverlust. Konnte sich beim Lesen nicht mehr an den Absatz erinnern, den sie zuvor gelesen hatte (Arn., Med.).
- Übergewicht oder Hässlichkeit führt bei Kindern zu Minderwertigkeitskomplexen (Cob., Nux-v., Tub.).
- Lernstörungen wie Dyskalkulie, Rechtschreibstörung, Dyslexie, Dyspraxie oder Gerstmann-Syndrom
- vergisst die Worte beim Sprechen, Gedächtnisschwäche für Gelesenes und Worte
- Geistige Anstrengung, wie schulisches Lernen, verschlimmert (Calc-p., Lyc.).
- geistige Ermüdung nach einem langen Schultag oder nach jeder einfachen geistigen Arbeit
- große Angst seine Freunde zu verlieren, hat ständig das Gefühl, seine Freunde würden sterben und er würde allein bleiben
- Traurigkeit, besser durch Gesellschaft (Bov.) und aktive Konversation

KOPF

- Kopfschmerzen bei Kindern mit Anämie oder mit Tuberkulose in der Familienoder Krankengeschichte
- Migräne; beginnt in der Stirn, erstreckt sich zum Hinterkopf, morgens beim Aufstehen (Bry.); starkes Pochen, mit Übelkeit, Erbrechen, Blindheit, spärlichem Harnabgang und hartnäckiger Verstopfung (Epig., Iris-v., Sang.); begleitet von einem Ohnmachtsgefühl, wie bei China und Am-c.
- schlimmer durch Lärm, Licht, Bewegung (Mag-m., Sil.), Hinlegen und beim Aufstehen aus dem Bett
- Die Schmerzen sitzen vorwiegend in der Stirn direkt über den Augen. Sie sind oft unerträglich UND heftig (Nat- m. und Tub. haben ähnliche Kopfschmerzen.).
- Wenn die Schmerzen an Heftigkeit zunehmen, setzen oft Übelkeit und Erbrechen ein, und die Patienten bekommen einen Widerwillen gegen Licht, Geräusche und Bewegung.
- Die Kopfschmerzen werden gelindert durch reichliches Urinieren, Liegen im abgedunkelten Raum, Druck auf den Kopf und festes Bandagieren des Kopfes sowie nach Sonnenuntergang.
- Bei diesem Mittel beginnen die Kopfschmerzen bevorzugt am Innenwinkel der rechten Augenbraue.
- chronische Migräne bei Kindern, die zu viel Milch trinken
- verbreitete Empfindungen, die von Kindern während der Migräne beschrieben wurden: als würde der Kopf zerspringen; als seien die Augen voller Kieselsteine; als würde der Scheitel abgehoben; als sitze eine Schmerzkugel in der Mitte der Stirn

AUGEN

- Fotophobie, selbst das Licht einer kleinen Kerze ist unerträglich.
- Sehtrübung vor den Kopfschmerzen (Gels., Hyos., Iris, Kali-bi., Nat-m.)
- Sehstörung bei Kindern mit Juvenilem Diabetes
- „Als seien die Augen voller Kieselsteine“ ist eine verbreitete Empfindung bei Migräne.

OHREN

- Schwerhörigkeit bei Kindern mit geistiger Retardierung

NASE

- häufiger Schnupfen durch Milchgenuss

GESICHT

- blasses, kränklich aussehendes Gesicht
- schmerzlose Schwellung des Gesichtes
- Pickel im Gesicht und an der Stirn, wenn das Kind in die Pubertät kommt (Hep.)

MUND

- Trockenheit
- übler Mundgeruch

ZÄHNE

- knirscht im Schlaf mit den Zähnen (Bac., Tub.)

HALS

- Halsentzündung, schlimmer beim Schlucken
- Halsentzündung, die trockenen Husten auslöst

MAGEN

- gesteigerter Appetit bei Kopfschmerzen (Phos., Psor.)
- Übelkeit, fühlt sich sterbenselend, kann aber nicht erbrechen; mit Ruhelosigkeit, begleitet von Kältegefühl
- Übelkeit; schlimmer morgens, beim Hinlegen, durch Bewegung, beim morgendlichen Aufstehen
- erbricht zuerst unverdaute Speisen oder Kaffeesatz-Erbrechen, Erbrochenes schmeckt bitter
- ununterbrochenes Erbrechen
- starker Durst
- saures Aufstoßen nach Milch (Chin., Mag-c.)
- Krämpfe im Epigastrium

ABDOMEN

- Nabelschmerzen bei Migräne (Lept.)
- chronische Auftreibung des Abdomens durch unregelmäßige Darmbewegungen die sich anfühlen, als liege ein Stein im Bauch
- berührungsempfindliches Abdomen (Verat.)
- Druck um die Taille löst Ohnmachtsanfälle aus.

REKTUM

- chronische Verstopfung bei Migräne (Nat-s., Podo.)
- Der Stuhl ist trocken, reichlich und hart und verursacht oft Lacerationen am Anus. Das Kind muss sich beim Stuhlgang sehr anstrengen.
- Hartnäckige Verstopfung, selbst die stärksten Abführmittel helfen nicht.

HARNWEGE

- Beim Nephrotischen Syndrom besteht häufiger Harnabgang und der Harn ist blass, reichlich und kann nur schwer zurückgehalten werden.
- große Mengen Albumin im Harn
- Schmerzen in der Nierengegend, die zur Blase (Berb-v.) oder durch den Rücken in die Oberschenkel ziehen.

ATMUNG

- asthmatische Atmung mit akuter Auftreibung des Epigastriums

HUSTEN

- kurzer, trockener Husten mit schwer löslichem Auswurf eines kleinen Schleimklümpchens, der den Husten bessert
- kurzer, trockener Husten, schlimmer in kalter Luft oder kalten Räumen

BRUST

- Thorax-Röntgen zeigt Veränderungen des Primärkomplexes (Bac., Sil.)

EXTREMITÄTEN

- Die Fingerspitzen sind bei Berührung immer kalt, während die übrige Hand warm ist.
- kalte Hände oder Füße bei Kopfschmerzen (Meli., Meny.)
- geschwollene Fußgelenke

SCHLAF

- schläfrig tagsüber und während des Unterrichts

ALLGEMEINES

- Neigung, leicht ohnmächtig zu werden, oder Ohnmachtsanfälle bei Anämie
- reichlicher Harnabgang mit Schmerzen überall im Körper
- Reisekrankheit
- friert immer, braucht viele Kleidungsstücke, um sich zu erwärmen
- generelle Verschlimmerung aller Symptome am Morgen
- sehr träge, keine Lust, sich anzustrengen (Ars., Camph., Kali-p.)
- Schlafmangel erzeugt Lethargie und körperliche Erschöpfung.

P.S. Große Ähnlichkeit mit Natrium muriaticum. Wir finden hier „Niedergeschlagenheit mit Weinen“, „häufiges Verlangen nach großen Mengen Flüssigkeit“, „periodische Kopfschmerzen, die mit der Sonne auf- und untergehen“ und „hartnäckige Verstopfung mit schmerzhaften Fissuren“

LACHESIS MUTA

(Gift der Buschmeisterschlange - Lach.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Der große Mafioso und Manipulator (Puls., Sulph.); verhält sich sehr liebenswürdig und freundlich zu Leuten, die über ihm stehen (die älter und mächtiger sind) und mit extremer Verachtung gegenüber Gleichrangigen und Unterlegenen.
- ▶ Aufgeweckte, charismatische, charmante, dynamische und extrovertierte Kinder.
- ▶ Verhaltensstörungen bei Kindern und Heranwachsenden mit heftigem Zorn, Beißen, Grausamkeit, Betrug, Frechheit, Eifersucht, Bösartigkeit, Spott, böser Streit aus Eifersucht.
- ▶ Die Kinder putzen sich gern heraus, um die Aufmerksamkeit der Umgebung auf sich zu ziehen; z. B. große Armreifen um schmale Handgelenke, große Ohringe in kleinen Ohren, aufdringliches Parfüm und Deodorant, viele Bänder und Ketten um den Hals; sie stellen sich auch gern in den Mittelpunkt, indem sie die Umgebung mit Witzen und ausgeprägter Gebärdensprache oder Nachäfferei unterhalten.
- ▶ Listig (wie Tarent, und andere Spinnen); kleine Kinder agieren lieber auf Umwegen und indirekt (wie eine kleine aufgerollte Schlange) mit Schmeicheleien, falschem Verhalten und Lügen; beim Sport oder bei Schulwahlen besiegen sie ihre Gegner gern durch Falschheit, Verleumdung, Betrug und Intrigen (boshafter Klatsch) (Ars., Verat.).
- ▶ Liebt Spott und Satire (Lac-ac., See.).
- ▶ Beleidigende Sprache; verletzt leicht die Gefühle anderer.
- ▶ Geschwätzig, Großmaul.
- ▶ Aktiver (manchmal überaktiver) und kreativer Geist, besonders von abends bis Mitternacht.
- ▶ Mischt sich immer gern in die Gespräche anderer ein, besonders wenn zwei sich streiten oder ein interessantes Gespräch miteinander führen.
- ▶ Uneheliche Kinder, die später enttäuscht oder beschimpft werden und unglücklich sind.
- ▶ Kinder, die in eine feindselige Welt hineingeboren wurden; die Mutter hatte einen ähnlichen Geisteszustand in der Schwangerschaft erlebt, weil sie vielleicht misshandelt wurde durch die Familie, Freunde oder gesellschaftliche Umstände. Das Gefühl von Feindseligkeit zeigt sich in misstrauischem Verhalten und Depression.
- ▶ Äußerst intelligente, frühreife und aufmerksame Kinder.
- ▶ Lebhaftige Kinder mit starker Vorstellungskraft und blühender Phantasie.
- ▶ Geringes Selbstwertgefühl und Selbstverachtung bei Kindern, deren Mütter sich in der Schwangerschaft sehr verlassen gefühlt haben.

- ▶ Sehr akkurate Kinder (erinnern an Carc., Lyc., Sil.) mit Scharfsinn und Verstand.
- ▶ Starke und frühzeitige sexuelle Reifung.
- ▶ Der syphilitische Geist zieht sich schon sehr früh durch alle Geistessymptome; z. B. Boxen, Zerstörungswut, Neid, Kämpfen, Wutausbruch bei der leichtesten Provokation, Eifersucht, Schlagen und Streiten.

KÖRPER

- ▶ Fast alle Beschwerden sind schlimmer nach oder im Schlaf.
- ▶ Hitze quält die Kinder körperlich und geistig; heiße Getränke verschlimmern; ein heißes Bad kann zu Konvulsionen führen; selbst wenn das Kind sich kalt fühlt, verstärkt ein warmer Raum die Symptome.
- ▶ Große Hitze oder Kälte kann krank machen (Epilepsie, Ohnmacht, Fieber).
- ▶ Hämorrhagische Diathese; Neigung zur Zyanose und Purpura.
- ▶ Überempfindlichkeit gegen Kleiderdruck besonders am Hals (Lac-c.); die Jungen weigern sich z. B. eine Krawatte zur Schuluniform zu tragen.
- ▶ Empfindliche Muskeln; das leichteste Anstoßen schmerzt und macht blaue Flecken.
- ▶ Sehr empfindlich auf feuchtwarmes, schwüles Wetter; bekommt dann zahlreiche allergische Beschwerden.
- ▶ Entzündete Körperteile sind extrem berührungsempfindlich.
- ▶ Viele Beschwerden sind linksseitig.
- ▶ Rezidivierende Infekte.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Hellsichtigkeit** (Crot-c., Med.).
- **Fasziniert von Katzen** (Aeth., Caps.).
- **Eitel** (Piat., Verat.); muss wie aus dem Ei gepellt aussehen.
- Liebt es **zu tanzen, zu singen** und **ein Musikinstrument zu lernen**.
- **Besitzergreifende** (teilt nichts) und **materialistische** Kinder.
- Aggressiv unverblümte, egozentrische und arrogante Kinder, die sehr grob sind und denen es an Respekt für die Gefühle anderer Menschen (Freunde und Familie) mangelt.
- Chaotische Kinder, können nichts auf ordentliche Weise machen.
- Tollpatschig; lässt häufig Sachen fallen (Apis, Caps.).
- Aufsässige Kinder, die geneigt sind, alles abzulehnen, was von ihnen verlangt wird.
- Dyslexie: Macht Fehler beim Buchstabieren, Schreiben, vertauscht Wörter.
- Überschwängliche, extrovertierte Kinder, die jede Art Aufregung lieben.

- Simulieren Krankheit.
- Schnell erschreckt durch Kleinigkeiten, besonders beim Erwachen.
- Ruhelose Kinder, die ständig mit ihren Fingern spielen und viel gestikulieren.
- Wacht verwirrt auf.

KOPF

- Migräne begleitet **von Verstopfung der Nase** (Stict.); besser im Freien, durch Bandagieren des Kopfes, **durch Fließschnupfen**; schlimmer bei Verstopfung, Kaffeetrinken oder auch nur durch Geruch von Kaffee; durch Fasten oder Sonneneinwirkung.
- Das Kind neigt zu Verweigerung und Wutanfällen, wenn es zum Friseur gehen soll, aufgrund der Empfindlichkeit von Kopfhaut und Haar (Chin.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bohrt den Kopf in das Kissen, besonders im Schlaf (Apis., Bell., Hell., Zinc.).
 - Kalter Schweiß auf der Stirn.
 - CT: Hirnblutung.
 - Enzephalitis.
 - Läuse.
 - Meningitis.

AUGEN

- Tränenfluss bei Kopfschmerzen (Ign., Puls.) und Schnupfen.
- Photophobie.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Bindehaut dunkelrot und sichtbare Äderchen.**
 - Chemosis [Ödem der Bindehaut],
 - Dakryozystitis [Entzündung des Tränensacks].
 - Absonderung: Eitrig und gelb.
 - Augen halb offen.
 - Augen nach oben gedreht.
 - Tränendrüsenfistel.
 - Entzündung des Sehnervs.
 - Pupillen erweitert.
 - Retinitis pigmentosa.
 - Starrender, glasiger Blick.
 - Gerstenkörner.
 - Eingesunkene Augen.

OHREN

- **Bohrt** mit den Fingern in den Ohren (Mez.).
- **Empfindlich gegen Zugluft** (Cham., Hep.).
- **Schwere Otitis media**, charakterisiert durch **nächtliche Schmerzen**, begleitet von Halsschmerzen; schlimmer durch kalte Luft und **Berührung**, dennoch besser durch Liegen auf dem schmerzhaften Ohr.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ohrenpolypen.
 - Absonderung reichlich, blutig, eitrig und übelriechend.

- Trockenes und verhärtetes Ohrenschmalz.
- Ausschläge hinter dem Ohr (atopisch).
- Katarrh der Eustachischen Röhre.
- Röntgen: Entzündung der pars petrosa des Schläfenbeins; schlechte Belüftung der Luftzellen des Mastoids.

NASE

- **Bohren** und Zupfen an der Nase, bis sie blutet (Arum-t.).
- **Kann nichts in der Nähe der Nase ertragen.**
- Neigung zu rezidivierendem Nasenbluten; hell- oder dunkelrotes, geronnenes Blut, fädig; schlimmer beim Schnäuzen, bei Fieber, bei Kopfschmerzen.
- Schnupfen zugleich mit Husten und Fieber.
- Absonderung reichlich, tropfend und laufend, besonders aus dem linken Nasenloch.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kälte der Nasenspitze** (Apis, Calc-p.).
 - **Spitze Nase** (Camph.).
 - Röntgenaufnahmen nach Caidwell und Waters: Nasennebenhöhlen-Entzündung.
 - Verstopfung der Nasenlöcher aufgrund von Nasennebenhöhlen-Entzündung.
 - Bei Untersuchung mit dem Spekulum: Nasenmuscheln geschwollen.
 - Rote Nase.
 - Schorfige Nasenlöcher; voller Krusten und Schuppen.

MUND

- **Speichelfluss beim Sprechen** (Iris) und bei Beschwerden wie Husten, Fieber, Halsschmerzen und Tonsillitis.
- Neigung, **sich auf die Zunge zu beißen**, besonders bei Konvulsionen (Caut., Cupr.).
- Stammeln, Stottern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Schwarze Verfärbung der Zunge** bei Durchfall und Verstopfung.
 - **Fadenziehender, schleimiger und zäher Speichelfluss:** bei Husten, Hitze, Schlaf und beim Sprechen.
 - **Schwammiges und blutendes Zahnfleisch.**
 - Die Zunge hängt heraus; leckt hin und her oder **schnellt hinein und heraus** (Bufo, Phyt.).
 - Zahnkaries.
 - Schaum aus dem Mund.
 - Mundgeruch faulig.
 - Landkartenzunge; Erdbeerzunge (Bell., Tub.) ODER ist braun oder rot, mit Rissen und Fissuren und einem roten Streifen in der Mitte, mit leuchtendroter Spitze.
 - Die Zunge neigt beim Herausstrecken stark zum Zittern (Calc. Ph.)

GESICHT

- **Zupfen an den Lippen** (Arum-t, Bry).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ausdruck: gequält, **verhärtet** und verstört (Ars., Kali-c.), kränklich, **leidend**.
 - **Gesichtsröte** bei Husten, Aufregung, **Fieber** (Fern, Op.) und **Kopfschmerzen** (Glon., Meli.).
 - Atopisches Ekzem auf den Wangen und im Gesicht.
 - Aufgedunsen.
 - Aufgesprungene und rissige Lippen.
 - Zyanotische Lippen bei Hitze und Atemnot.
 - Linke Ohrspeicheldrüse vergrößert und entzündet.
 - Eine Gesichtshälfte blass, die andere rot.

HALS

- Die Halsschmerzen sind schlimmer beim Husten, **leeren Schlucken** (Bar-c., Kali-c.), morgens beim Erwachen, Schlucken von Flüssigkeiten oder Süßigkeiten und **warmen Getränken** (Phyt.); besser durch **kalte Getränke** (Apis); **erstrecken sich zu den Ohren** (Hep., Merc-cy.).
- **Das Schlucken von Flüssigkeiten ist immer schwierig** (Lyss., Stram.).
- Der Hals ist extrem **empfindlich gegen Berührung** und den geringsten Druck.
- Würgen beim Husten, beim Zubettgehen oder beim Schlucken fester Nahrung (Tracheoösophageal-Fistel).
- Schmerz in der linken Mandel, der sich schnell zur rechten Mandel ausdehnt.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verfärbung: **Violett oder rot**.
 - Rachenkatarrh mit **Mandelentzündung**, besonders der **linken Mandel**.
 - Halsdrüsen vergrößert und berührungsempfindlich.
 - Verlängertes Zäpfchen.
 - Schwacher Würgereflex.
 - Lähmung der Hirnnerven IX (Nervus glossopharyngeus) und X (Nervus vagus).
 - Nackenschweiß.
 - Vereiterung der Mandeln bis zum Peritonsillarabszess.

MAGEN

- **Durst auf kleine Mengen** (Ars., Lyc.).
- Würgen bei Husten und nach dem Stillen.
- Gewaltiges und heftiges Erbrechen nach dem Füttern, besonders nach Milch.
- Verschlimmerung: Fisch, kalte Speisen und Milch.
- Besser: Kalte Speisen und Früchte.
- Abneigung: Milch, besonders **Muttermilch** (Sil.).
- Verlangen: Kaffee, **Austern** (Lycps-v.), **Pasta** (Calc-p., Nat-m.) und andere Mehlspeisen, saure Gurken, scharfe und saure Speisen.

ABDOMEN

- Abdominalkolik besser durch Zusammenkrümmen; **schlimmer durch Druck der Kleidung** (Bry., Nux-v.) und Berührung.
- Trägt immer lockere Kleidung um den Bauch.
- Extrem laute und geräuschvolle Blähungen.
- Erhöhte Neigung zum Neugeborenen-Ikterus und zur „Indian Childhood Cirrhosis“ (ICC) [eine Kupfer-assoziierte Form der Leberzirrhose].
- Neigung, primär virale Hepatitiden zu entwickeln in Verbindung mit 5 spezifischen Viren: HAV, HBV, HCV, HDV und HEV.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aszites +.
 - Auftreibung durch Verstopfung.
 - Vergrößerte Leistendrüsen.
 - Vergrößerte Milz.
 - Vergrößerte, harte Leber.
 - Leisten- und Nabelbruch.
 - Empfindlichkeit des McBurney-Punktes durch entzündeten Blinddarm.
 - Reye-Syndrom.
 - Tympanitische Auftreibung.

REKTUM

- **Durchfall:** Infektiös, **meist als Begleiterscheinung von Typhus**; schlimmer durch **saure Speisen** oder bei warmem, feuchtem Wetter.
- **Schafskotartige Stühle** (Alum., Plb.); **tonartig, hart, eitrig, übelriechend, mit Kadavergeruch.**
- Verstopfung nach Abführmittelmissbrauch; schwierige, aber weiche Stühle; Stühle liegen im Rektum ohne Stuhldrang (Angeborenes Megakolon).
- Unwillkürlicher Stuhlgang im Schlaf.

NIERE

- Der Säugling schreit vor dem Urinieren (Borx., Lyc.).
- Bettnässen.
- Unwillkürliches Urinieren, wenn dem Harndrang nicht nachgegeben wird.
- Juveniler Diabetes.
- Harnverhaltung durch Dehydratation.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Urin: Albumin +, Hyaline Zylinder +.
 - Der Urin ist dunkel, blass oder wolkig, mit rotem Sand.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Stimmritzenkrampf.
- Flüssigkeiten geraten leicht in den Kehlkopf, verursachen Verkrampfung oder Würgen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kehlkopfentzündung +.
 - Laryngoskopie: Ödem der Stimmbänder.
 - Krächzende und nasale Stimme.

ATMUNG

- Asthma durch **Emotionen** (Coff., Ign.); schlimmer durch Essen, Bedecken von Mund oder Nase, in **einem warmen Raum**, beim Liegen oder bei **Berührung des Halses**; besser in einem klimatisierten Raum, bei Kälte, im Freien und durch **vornübergebeugtes Sitzen** (Ars., Kali-c.).
- **Asthmatische Bronchitis** bei Babys und Kleinkindern, **abwechselnd mit atopischem Ekzem**; die Anfälle kommen meist **im Schlaf**; das Kind erwacht durch Erstickungsanfälle und zeigt durch Gesten, dass es zum Fenster und an die frische Luft möchte oder **verlangt direkten Luftzug ins Gesicht, besonders kalte Luft vom Ventilator oder der Klimaanlage**.
- Verlangen, tief zu atmen.
- Aussetzen der Atmung nachts, bei Husten und beim Schlafengehen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Stöhnende, rasselnde, röchelnde und keuchende Atmung.

HUSTEN

- Das Kind **wird rot im Gesicht und greift sich an den Hals beim Husten** (Acon.).
- **Husten im Schlaf** (Cham.), **ohne sich dessen bewusst zu sein**.
- Anfallsweiser kruppertiger Husten, der um und nach Mitternacht schlimmer ist; muss sich sofort aufsetzen, wenn der Husten einsetzt; mit **Unfähigkeit zu sprechen**.
- Husten durch Berührung des Gehörgangs, des Kehlkopfes oder Halses.
- Husten bei Neugeborenen, als ob Flüssigkeit in „den falschen Hals“ geraten wäre.
- Der Husten beginnt, sobald das Baby einschläft und ist am quälendsten während der Morgen- und Abendstunden.

LUNGENENTZÜNDUNG

- Röntgen/Thorax: Linksseitige Lobärpneumonie.
- Ausdruck des Kindes: **Wie betrunken, gequält**, verhärtet, zyanotisch und aufgedunsen.
- **Kopf fühlt sich heiß an** mit eiskalten Extremitäten.
- **Leichtes Delirium, murmelt vor sich hin** oder Redseligkeit bei Fieber (Teuer.).
- Der Husten ist rasselnd, doch der Auswurf ist spärlich, begleitet von **entsetzlichen Kopfschmerzen**.
- **Zunge dunkelrot und geschwollen; mit klebrigem, fadenziehendem Speichel**.
- Kann es nicht ertragen, wenn die Bettdecke den Hals berührt.
- Die Lippen sind zyanotisch und berührungsempfindlich.
- Die Sprache ist undeutlich (ältere Kinder); sie stolpern über ihre eigenen Worte und vollenden häufig den Satz nur halb.
- Anfälle von Atemnot, wenn das Kind auf dem Rücken liegt und von erstickendem Husten, sobald der Kopf das Kissen berührt.
- Die Lungenentzündung dieses Mittels erinnert sehr an die von Bapt. und Pyrog.

HERZ-KREISLAUF-SYSTEM

- Angeborene Herzmuskelschwäche.
- Neugeborenen-Zyanose.
- Puls: Schwach, unterbrochen, langsam und unregelmäßig.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rheumatische Endokarditis.
 - Rheumatische Erkrankungen der Herzklappen, besonders Mitral-insuffizienz.

CHRONISCHES HERZVERSAGEN

- Allgemeine Ursachen für Herzversagen, die bei Lach, beobachtet wurden:
 - Anämie.
 - Angeborene Herzerkrankungen verkompliziert durch Anämie oder Infektion.
 - Neugeborenenasphyxie.
 - Rheumatische Herzerkrankungen.
- Anfängliche „Warnzeichen“, die Lach, anzeigen könnten:
 - Schwierigkeiten beim Füttern.
 - Häufige schnelle kurze Atemzüge, die sich bessern, wenn das Kind über der Schulter getragen wird.
 - Reizbarkeit, mit geringer Gewichtszunahme.
 - Andauernder Husten und Keuchen.
- Akute Erstickungsanfälle mit Husten oder Atemnot beim Einschlafen (Grin., Op.). Diese cardial bedingte Problematik wird schlimmer, wenn das Kind auf der linken Seite einschläft.
- Übermäßiger Schweiß mit extremer Hitzeempfindlichkeit und Unverträglichkeit von heißen, stickigen Räumen.
- Herzgeräusche.
- Kann kein Gewicht ertragen, wie den Druck der Bettwäsche oder enge Kleidung um den oberen Teil der Brust oder den Hals.
- Knöchelödeme.
- Aufgedunsenheit des Gesichts.

EXTREMITÄTEN

- Wachstumsschmerzen.
- Eiskalte Hände und Füße, selbst bei warmem Wetter (Asar.).
- Ungeschicklichkeit der Hände; lässt Dinge fallen (Apis, Bov.).
- Kindliches Rheuma, besonders der Weichteile.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue Verfärbung der Hände.
 - Ödeme der Füße durch Hypoproteinämie und Albuminurie.
 - Exostosen.
 - Flache Warzen auf der Hand (Dulc., Sep.), auf Daumen und Mittelfinger.
 - Osteomyelitis.

SCHLAF

- Schlaflage: Auf dem Bauch; dauernd wechselnde Lage; Seitenlage unmöglich (Merc., Phos.).

- Schlaf wird häufig durch dauernden Husten gestört, durch Erstickungsgefühl, Schmerz, Schweiß und durch das kleinste Geräusch (Asar.).
- Das Kind schläft meist in die Verschlechterung hinein.
- Dauerndes Umherwerfen, mit Stöhnen und Speichelfluss im Schlaf.

FIEBER

- Frost:
 - Eiskalte Füße.
 - Liebt Wärme und Hitze.
 - Mangel an Durst (Gels., Nat-m.).
 - Kälteschauer beginnen irgendwann von abends bis nachts (18 Uhr bis Mitternacht), mit klappernden Zähnen, Übelkeit und Erbrechen.
 - Kälteschauer beginnen meist am Rücken (Eup-per.).
- Hitze:
 - Ausgeprägte Geschwätzigkeit (Bapt., Gels., Podo., Pyrog., Teuer., Tub., Zinc.); wechselt schnell das Thema, dabei erregt.
 - Durstlos.
 - Heftige Kopfschmerzen.
 - Brennende Handflächen und Fußsohlen, müssen aufgedeckt werden.
 - Appetitverlust.
- Schweiß: Kalt, gelbfärbend.
- Zunge: Landkartenzunge, dunkelrote Spitze, zitternde Zunge mit brauner Mitte.
- Puls: Beschleunigt.
- Das Fieber bei einem Lach.-Kind tritt normalerweise in den Monaten Februar, März, April (Carbo-veg., Sulph.) auf, aber verglichen mit Europa ist das in Indien selten. In meiner Praxis bekommen die Kinder Fieber mit Lach.-Symptomen allein durch ihr schwaches Immunsystem, das rezidivierende Infektionen nach sich zieht.
- Das Kind entwickelt in den frühen Stadien des Fiebers oft Stupor.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Abdomen ist aufgetrieben und berührungsempfindlich.
 - Blutuntersuchung: C-reaktives Protein erhöht, hohe BSG, erhöhtes alpha-Haptoglobin, Leukozytose, Thrombozyten verringert, Serum Fibrinogen erniedrigt.
 - Fieber um ca. 22 Uhr, gekennzeichnet durch extremen Stupor.
 - Malaria Parasiten +.
 - Schwammiges Zahnfleisch.

SEPSIS

- Häufige Ursachen (unter anderen):
 - Amnionitis [Fruchtblasenentzündung].
 - Einrisse in Schleimhäuten.
 - Gebrauch von Saugapparaten, Kathetern, Infusionsflaschen und Beatmungsbeuteln.
- Die am häufigsten vorkommenden Organismen:
 - E. coli.
 - Klebsiella pneumoniae.
 - Pseudomonas aeruginosa.

- Anzeichen für frühe Sepsis bei Lach.-Neugeborenen und Säuglingen sind:
 - Auftreibung des Abdomens.
 - Heftiger Durst (bei älteren Kindern).
 - Anfälle von Atemnot.
 - Blutungsneigung (zersetztes, spärliches, nicht gerinnendes Blut) aus vielen Körperöffnungen.
 - Zyanose um den Mund.
 - Konvulsionen.
 - Schwierigkeiten, die Zunge herauszustrecken, mit ausgeprägtem Zittern (ältere Kinder).
 - Trockene, braune Zunge.
 - Ausdruck wie betrunken, verhärtet, vergiftet und leer.
 - Fehlende Gewichtszunahme.
 - Reizbarkeit.
 - Gelbsucht.
 - Lethargie.
 - Durchfall - widerlicher, fauliger Geruch.
 - Geschwätziges Delir.
 - Verweigert Nahrung.
 - Ruhelosigkeit.
 - Leerer, teilnahmsloser Blick.
 - Erbrechen.
 - Schlimmer bei warmem Wetter.

EPILEPSIE

- Typen:
 - Grand mal.
 - Petit mal.
 - Einfache Fieberkrämpfe.
- Beschwerden durch:
 - Zorn, Eifersucht, Zahnung und im Schlaf (Arg-n., Cupr.).
- Bei Konvulsionen:
 - Zungenbiss.
 - Einwärtsdrehen der Daumen.
 - Schaum vor dem Mund.
 - Unwillkürliches Urinieren.
 - Blasses Gesicht.
 - Schreien.

HAUT

- Neigung zu Furunkeln und Abszessen, besonders durch Staphylokokken.
- Neigung zu Zellulitis.
- Ungesunde Haut.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Arzneimittellexanthem.
 - Atopisches Ekzem.

- Tinea cruris und Tinea pedis.
- Urtikaria.

ALLGEMEINES

- **Lufthunger**; ausgeprägtes Verlangen im Freien zu sein; das Kind besteht darauf, beim Auto- oder Zugfahren am Fenster zu sitzen.
- Extrem **heiße Kinder**; lieben es, im Freien zu sein und zu spielen, verlangen immer nach Ventilator oder Klimaanlage im Raum.
- **Nächtliche Verschlimmerung** vieler Beschwerden, besonders vor Mitternacht (Ars., Cham.), z. B. Asthma, Husten, Durchfall, Fieber, Migräne, Sinusitis.
- Krebs bei Kindern, wie z. B. Leukämie, ist sehr häufig; auch gutartige Tumore wie Angiome, Hämangiome, Keloide usw.
- Absonderungen: Blutig (besonders Ekzeme, Schleimhautsekrete, Stühle, Urin oder Erbrochenes).
- Schnelle Abmagerung bei Durchfall (Mag-c., Ol-j.).
- Wird schnell ohnmächtig bei Schreck, Schmerzen, in einem heißen Raum oder durch heißes Duschen.
- Hämorrhagische Diathese; kleine Wunden bluten schnell und reichlich. Dunkles, nicht gerinnendes Blut.
- In der Familien gibt es oft valvuläre oder rheumatische Herzerkrankungen, Krebs, Leukämie, Anämie, Diabetes, Sepsis, zerebrovaskuläre Vorkommnisse.
- Neigung, sich sehr schnell zu erkälten.
- Neigung zu Ödemen durch Herz-, Leber- oder Milzerkrankungen.

LACTICUM ACIDUM

(Milchsäure - Lac-ac.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Probleme mit dem Vater, Gefühl vom Vater nicht genug geliebt zu werden.
- ▶ Sehr liebevoll und selbstständig.
- ▶ Viele Fehler beim Sprechen, in der Rechtschreibung; beim Schreiben Auslassen von Wörtern.
- ▶ Helle, blonde Kinder, die hager, dünn und abgemagert sind.
- ▶ Sehr anfällig für wiederkehrende Aphten im Mund.
- ▶ **Juveniler Diabetes.**
- ▶ Heißhunger.
- ▶ Ausgeprägte Abneigung gegen Fleisch.
- ▶ **Übelkeit mit Krankheitsgefühl** als bedeutsames Begleitsymptom. Übelkeit mit anhaltendem starkem Speichelfluss.
- ▶ **Rheumatismus bei Kindern.**
- ▶ Rheumatische Entzündung der Ellbogen, Knie und kleinen Gelenke der oberen und unteren Extremitäten. Gelenkschmerzen schlechter nachts und besser durch warme Anwendungen. Empfindliche, entzündete und geschwollene Gelenke.
- ▶ Eisige Kälte der Fingerspitzen und Füße.
- ▶ Sehr frostig, der kleinste kalte Luftzug verschlimmert.

HERKUNFT

- Wurde von Dr. Swan in die Homöopathie eingeführt.

LAUROCERASUS

(Kirschlorbeer - Laur.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Enthält Blausäure; deshalb ähneln viele Symptome den Symptomen dieser Säure.
- ▶ **Trias: Kälte, Blaufärbung und Schnappatmung.**
- ▶ Schlüsselsymptom: **Trotz Schwäche und Krankheit immer gut gelaunt.**
- ▶ Herzfehler jeglicher Art beim Kind, wenn die Mutter viel Kummer, Angst oder schlimme emotionale Aufregung durchgemacht hat.
- ▶ Saubere Zunge.
- ▶ Schweiß auf der Nase.
- ▶ Spitze Nase.
- ▶ Hippokratisches Gesicht.
- ▶ **Angeborene zyanotische Herzerkrankungen.**
- ▶ Bläulich rotes Aussehen mit Trommelschlegelfingern, die Lippen sind bläulich und gestaut.
- ▶ Extreme Atemnot, plötzliche Schnappatmung, dann 2 oder 3 tiefe Atemzüge, dann wird die Atmung nach und nach flacher, dann eine Stockung gefolgt von 2 oder 3 Atemzügen und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Die Atemnot ist viel schlimmer, wenn der Patient aufrecht sitzt, sie ist besser in halb liegender Position. Zyanose bei kleinster Anstrengung. Das Kind schnappt nach Luft bei geringster Anstrengung, schlechter in frischer Luft und beim Aufrechtsitzen.
- ▶ Kardialer Husten besonders beim Hinlegen. Während des Liegens ist der Husten schlimmer, beim Aufrechtsitzen jedoch ein Gefühl von extremer Einengung in der Brust, so dass die halb liegende Position am erträglichsten ist.
- ▶ Wiederkehrende Lungenentzündungen durch ererbte Herzerkrankungen besonders Ventrikelseptum-Defekt oder Eisenmenger-Syndrom.
- ▶ Herz- und Lungenprobleme schlimmer durch jede Bewegung oder Anstrengung.
- ▶ Ohnmachtsanfälle auf Grund von Defekten der Koronargefäße am Herz, das Gesicht wird bleich und blau. Kalte Körperoberfläche, sehr verlangsamte Reaktionen und schlechte Vitalität.
- ▶ Fehlender Appetit.
- ▶ Immer frostig, fühlt sich kalt an und braucht viel Wärme.

HERKUNFT

- Synonym: *Prunus laurocerasus*. Familie der Rosengewächse (Rosaceae).

LYCOPodium

(Keulenbärlapp - Lyc.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Tritt zuversichtlich und bestimmt auf (als Maske), manchmal seine Kraft überschätzend, um verborgene Ängste und Unsicherheiten zu kompensieren.
- ▶ Achtet genauestens auf alles, was er tut, um ein bestimmtes Image aufrechtzuerhalten (eine Art intellektuelle Manipulation).
- ▶ Vorsichtige Kinder, die kein Risiko eingehen; so sind sie zwar niemals eigensinnig, aber ohne Rückgrat.
- ▶ Aufgeblasenes Ego.
- ▶ Überhebliches Verhalten, das sich zwar gegen Fremde nach außen sehr bescheiden, unkompliziert und nett gibt, sich aber zuhause gegen die Familie genauso ärgerlich, gereizt, beleidigend und intolerant gebärdet.
- ▶ Wichtigtuersisch; sie ernten oft die Lorbeeren, die sie nicht verdient haben.
- ▶ Kinder, die sich selbst herabsetzen; sie halten sich oft für klein und unterlegen (sie können ihre Ängste nicht durch die überzogene Selbstsicherheit des anderen Typs kompensieren).
- ▶ Unterdrückung der intuitiven, phantasievollen und künstlerischen Fähigkeiten (rechte Hirnhälfte) bei Überbetonung des Intellektuellen und Rationalen (linke Hirnhälfte).
- ▶ Kinder, die emotional zusammenbrechen können, wenn jemand freundlich zu ihnen ist; sie können dann sogar weinen.
- ▶ Kinder, die sich mehr auf ihre geistigen Stärken verlassen als auf ihre Körperkraft.
- ▶ Kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten; packt nichts Neues an, weil er ja doch versagen würde. Oft wegen seiner herrischen Eltern, die dauernd an ihm herumkritteln.
- ▶ Wichtigtuersisch, übertreibt und redet gern nur von sich.

KÖRPER

- ▶ Lufthunger; will raus ins Freie, obwohl viele Symptome an der frischen Luft schlimmer werden. Verträgt keine Zugluft.
- ▶ Trockenheit einzelner Teile (Haut, Darm, Schleimhäute, Nase usw.).
- ▶ Gebläht wie eine Trommel.
- ▶ Die Kinder können keine komplette Mahlzeit zu sich nehmen, weil sie sich immer wieder aufrichten oder aufstehen müssen durch quälendes Aufstoßen und Schluckauf.
- ▶ Bleiche, schmale, magere, alt aussehende Kinder mit trockener, rauer, faltiger Haut und aufgetriebenem Bauch; mit gut entwickeltem Kopf, dunklen Haaren, trüber Bindehaut und langer, schmaler Brust (ältere Kinder nehmen oft eine nach vorn gebeugte Haltung ein).

- ▶ Gelbfärbung in der Hautfarbe und in den Absonderungen, bei Schnupfen, Auswurf, Erbrochenem, Stuhl, Ausfluss, Urin usw.
- ▶ Tagsüber strampelt das Kind die warmen Decken weg, doch nachts braucht es sie, um sich zu wärmen.
- ▶ Abmagerung bei gutem Appetit (Malabsorption).
- ▶ Verdauungsstörungen bei gutem Appetit; sie essen und trinken dabei oft mehr als der Durchschnitt.
- ▶ Beim Stillen:
 - Der Säugling will dauernd gestillt werden (Aufmerksamkeit), selbst wenn er gerade eine ausgiebige Mahlzeit bekommen hatte (Heißhunger) oder er schreit nach der Brust, hört aber nach wenigen Zügen auf (schnell gesättigt).
 - Bevorzugt die rechte Brust.
 - Muss zum Einschlafen gestillt werden (Schläfrigkeit nach dem Füttern).
 - Wacht laut weinend auf und will gefüttert werden (nächtlicher Hunger).
- ▶ Geringe Ausdauer; geistig und körperlich rasch erschöpft.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Ehrgeizige, konkurrenzbetonte Kinder, die alle Möglichkeiten nutzen, um zu gewinnen.
- Abneigung gegen Gesellschaft, besonders gegen **Fremde**.
- Abneigung draußen zu spielen; spielt lieber drinnen mit Spielen wie **Lego** und **Scrabble**.
- **Grundloses Weinen** bei Säuglingen, besonders nachts.
- Während der Befragung sind Lyc.-Kinder **schweigsam**, niemals **mitteilsam**.
- **Neidisch** auf die Fähigkeiten anderer.
- Sogar dem besten Freund gegenüber wird das Kind nicht immer seine Empfindungen ausdrücken. Sie haben eine gewisse **Reserviertheit**; versuchen viele Informationen zurückzuhalten, teilen nichts mit.
- Faule Kinder, die die Neigung haben, jede ihnen aufgegebenen Arbeit oder Verpflichtung **aufzuschieben**.
- **Frühreife** Eitelkeit bei kleinen Mädchen.
- **Selbstsüchtige**, habgierige Kinder; sehr eigen mit ihren Sachen; wollen sie mit niemandem teilen.
- **Starke Überzeugungen** und Ideen; Abneigung gegen Widerspruch.
- **Schreckliche Handschrift**, fast unleserlich.
- Sehr **wachsam**.
- Am Morgen sehr langsam, wird erst nach dem **Frühstück** aktiver.
- Schwach in **Mathematik**, besonders in Rechnen

- Beschwerden durch: Erwartungsspannung, schlechte Nachrichten, in einer Menschenmenge, Tod von geliebten Menschen, Versagen, Schreck, lange Geschichte von übermäßiger elterlicher Kontrolle, Kränkung und sexuellem Missbrauch.
- Babys, die ständig getragen werden wollen.
- Die Babys neigen dazu, sich ständig an die Mutter zu klammern, ihre Hand festzuhalten und wollen nicht auf den Arm eines anderen Familienmitgliedes.
- Feigheit; sehr schnell verängstigt durch Bagatellen.
- Dyslektische Kinder; machen viele Fehler beim Lesen, Sprechen oder Schreiben; verwenden die falschen Wörter; vertauschen, verdrehen oder vergessen Buchstaben oder Wörter.
- Furcht allein zu sein (besonders nachts), vor Versagen, Geistern, Insekten, engen Plätzen, Lärm, Menschen (trotz der Furcht allein zu sein), neue Herausforderungen anzunehmen, Gewitter.
- Parodieren und imitieren ihre Großeltern, Lehrer etc.
- Ruhelose Kinder; trampeln mit den Füßen beim Sitzen.
- Schmerzempfindlich; werden bei Schmerzen sehr heftig.
- Schluchzen und weinen bitterlich über Kleinigkeiten; bei der geringsten Zurechtweisung.
- Lampenfieber.
- Neigung zu beißen oder alles in den Mund zu stecken; besonders zum Nägelkauen, ins Kissen Beißen etc.

KOPF

- Kopfschmerzen sind rechtsseitig; ausgelöst durch Zorn oder **Ärger**, emotionale Erregung, **Hunger**, unterdrückte Ausschläge (Skabies, atopisches Ekzem), Reisen in Auto oder Bus; schlimmer nach dem Frühstück, nach Kaffee, durch **Heißwerden in warmer Luft**, geistige Anstrengung und **unterdrückten Schnupfen** (Nasenschleimhaut abschwellende Mittel); besser durch Anwendung von äußerem Druck; **kalte, frische Luft**, Essen, im klimatisierten Raum, Niesen, Abdecken des Kopfes; verbunden mit **begleitenden Verdauungssymptomen** wie Verstopfung und gallebedingten Verdauungsstörungen.
- Ekzem der Kopfhaut, besonders am Hinterkopf, mit übermäßigem Schuppen und Jucken; schlimmer durch Bettwärme; Hervorsickern einer ätzenden Absonderung, die das Haar zerstört.
- Empfindliche Kopfhaut, besonders gegen kalte Luft und Abneigung gegen jegliche Kopfbedeckung.
- Schweißperlen auf der Stirn beim Essen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Vorzeitiges Ergrauen und Ausfallen der Haare.**
 - Liquor: Meningitis, besonders tuberkulös.
 - CT: Hirnblutung, Hydrozephalus.
 - Schuppen.
 - Der Kopf ist seitwärts gezogen, besonders zur rechten Seite.
 - Läuse.
 - MRT: Beeren-Aneurysma (Hirnaneurysma).
 - Nachtschweiß im Bett.
 - Plica polonica.

- Talgretentionszyste.
- Kann den Kopf nicht aufrecht halten.

AUGEN

- Scharfer Tränenfluss bei Schnupfen oder Fieber oder im Wind.
- Katarrhalische Konjunktivitis bei Säuglingen.
- Kurzsichtigkeit.
- Sehkraft geschwächt, schmerzhaft durch langes Lesen oder Fernsehen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Glänzende, rote Augen.**
 - **Augen halb geöffnet.**
 - Ikterus.
 - Verklebte Lider.
 - Entzündete Lider.
 - Katarakt.
 - Chemosis.
 - Dauerndes Verlangen, die Augen zu reiben.
 - Konvergentes Schielen.
 - Absonderung blutig, eitrig, dick und gelb, mehr aus den äußeren Augenwinkeln.
 - Ekchymosen.
 - Körnige Lider.
 - Tränendrüsenfistel.
 - Photophobie.
 - Hervortretende Augen.
 - Pupillen erweitert.
 - Retinopathia pigmentosa.
 - Gerstenkörner nahe den inneren Augenwinkeln.
 - Eingesunkene Augen.
 - Zucken der Augenlider.

OHREN

- Chronisch eitrige Otitis media nach Masern, besonders des **rechten Ohres**, charakterisiert durch heftige Schmerzen; schlimmer durch Luftzug und im Freien; das Kind zeigt **hinter das Ohr als schmerzhafteste Stelle**.
- **Bohrt** dauernd mit den Fingern in den Ohren, sogar im Schlaf.
- Beeinträchtigtes Hörvermögen durch **vergrößerte Mandeln**.
- Die Ohren sind schmerzhaft empfindlich gegen Wind, Kälte und im Freien.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Ekzeme** feucht, schuppig, mit Rissen, besonders **hinter den Ohren**.
 - Grünliche, stinkende, wundmachende, rechtsseitige Otorrhoe.
 - Vermehrtes Ohrenschmalz.
 - Polypen.

NASE

- **Dauerndes Kratzen, Zupfen oder mit den Fingern Bohren**; sogar im Schlaf, fährt plötzlich auf, um die Finger in die Nasenlöcher zu stecken.
- **Verstopfung** der Nase bei gestillten Kindern: schlimmer **nachts im Schlaf**

- **Schniefen** bei Neugeborenen.
- Dauerndes Verlangen, die Nase zu schnäuzen.
- Absonderung: Blutig, reichlich, grünlich, übelriechend, eitrig oder weißlich-gelb, mit Tendenz zu Krusten- und Schuppenbildung.
- Nasenbluten mit dunklem Blut, besonders bei Fieber und beim Naseputzen.
- Nasenkatarrh erstreckt sich zur Stirnhöhle; akute Stirnhöhlen- und Siebbeinzellenschmerzen, schlimmer durch Druck (besonders Druck der Brille) und Bewegung.
- Verstopfung der Nase mit Eiter; schlimmer im Schlaf.
- Neigt zum Niesen nach jedem Hustenanfall.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Fächerartige Bewegung** der Nasenflügel bei Brustbeschwerden.
 - **Retronasaler Katarrh.**
 - Röntgen des Nasopharynx: **Adenoide.**
 - Spitze Nase.
 - Polypen.

GESICHT

- Akne verbunden mit Verdauungsbeschwerden.
- Schwellung und Entzündung der Unterkiefer- und der Ohrspeicheldrüse; beginnt auf der rechten Seite und erstreckt sich dann zur linken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dauerndes **Lecken der Lippen.**
 - Riss in der Mitte der Unterlippe.
 - Verfärbung: **Rot, einseitig oder umschrieben**; schlimmer bei Husten, beim Essen oder bei Kopfschmerzen.
 - **Faltige Stirn**, besonders als Begleitsymptom bei Brustbeschwerden.
 - Atopisches Ekzem im Gesicht mit übermäßiger Krustenbildung und feuchter, stinkender Absonderung.
 - Bläuliche Ringe unter den Augen.
 - Kaubewegungen des Unterkiefers.
 - Verfärbung: Schmutzig aussehend, erdig, gräulich, gelb und blass.
 - Ekzematöse Ausschläge um die Mundwinkel.
 - Ausdruck: Ängstlich, hippokratisch, alt aussehend, spitz und kränklich.
 - Fettiges Gesicht.
 - Eiskalter Schweiß im Gesicht.
 - Ticks.
 - Warzen auf dem Kinn.

MUND

- **Zähneknirschen bei Zorn.**
- **Stotternde Sprache**, besonders beim Aussprechen des letzten Wortes in einem Satz.
- Trockener Mund mit Durstlosigkeit, besonders beim Erwachen am Morgen.
- Zahnschmerzen sind schlimmer nachts und durch Genuss von etwas Kaltem; besser durch Wärme in jeder Form.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Lecken und Schmatzen mit der Zunge**

- Zungenbewegungen von einer Seite zur anderen, **Herausschnellen der Zunge wie bei einer Schlange.**
- Gelbe Verfärbung der Zähne.
- Dauerndes Zusammenbeißen der Zähne oder Stecken des Fingers in den Mund.
- Landkartenzunge ODER schwärzlich oder bräunlich belegte Zunge, mit roten Seiten und einer roten Spitze, mit Fissuren und hervorstehenden Papillen.
- Schaum vor dem Mund.
- Mundgeruch.
- Reichlicher Speichelfluss mit skorbutischem und eitrigem Zahnfleisch, das durch die geringste Berührung oder beim Putzen leicht blutet; der Speichelfluss wird schlimmer bei Fieber oder im Schlaf.
- Eiterfluss, mit Furunkeln auf dem Zahnfleisch.

HALS

- Es ist schwieriger, **Flüssigkeiten zu schlucken als Festes**; kann sie nur teelöffelweise aufnehmen.
- Halsbeschwerden (Membranenbildung, Schmerzen), die dazu neigen, auf der **rechten Seite zu beginnen** und dann **zur linken** hinübergehen; Halsschmerzen erstrecken sich zum Ohr beim Schlucken; Verschlimmerung nach **kalten Speisen, kalten Getränken** oder **warmen Getränken**, aber es kann auch Besserung erfolgen nach **heißen oder kalten Getränken**.
- Das Kind neigt dazu, käsige Klumpen auszuräuspern.
- Speisen und Getränke kommen beim Schlucken zu den Nasenlöchern wieder heraus.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Anti-Streptolysin-Titer größer als 300 Einheiten.
 - Verlängertes Zäpfchen.
 - Struma.
 - Verhärtete Schwellung der zervikalen Lymphknoten, wie Perlenschnüre.
 - Lähmung der Hirnnerven IX. (Nervus glossopharyngeus) und X. (Nervus vagus).
 - Rechtsseitige Tonsillitis und Pharyngitis.
 - Schwacher Würgereflex.

MAGEN

- Säuglinge bevorzugen beim Stillen die **rechte Brust**.
- Heißhunger, je mehr das Kind isst, umso mehr verlangt es. Es **erwacht auch nachts mit Hungergefühl**. Die Kinder sind sogar hungrig, wenn sie krank sind (z. B. Durchfall und Kopfschmerzen). Essen bringt ihnen zeitweilige Erleichterung.
- Verdauungsprobleme bei Neugeborenen, wie Gallengangsverschluss, angeborene Hyperbilirubinämie und Laktoseintoleranz, wenn die Mutter eine Vorgeschichte von **lang andauernden Misshandlungen, Zorn** mit **Empörung, Zorn** mit **stillem Kummer** oder **unterdrücktem Zorn** während der Schwangerschaft hatte.
- Magenverstimmung mit Übelkeit, Erbrechen und Auftreibung des Abdomens durch **Brot, kalte Speisen und Getränke, Obst, Milch, Zwiebeln oder Austern**.

- **Essen und sei es auch noch so wenig, verursacht Völlegefühl.**
- Blähungen, Dyspepsie und Magenreizungen aufgrund von verzögerter Magenentleerung oder angeborener Pylorusstenose; verschlimmert durch **kalte Speisen**; gebessert durch **warme Mahlzeiten** und **Lockerung der Kleidung** (Neugeborene wollen lieber sehr locker in ihre Windeln gewickelt werden.)
- Die Kinder gedeihen besser bei **kleinen Mahlzeiten**; sie können nie **große Mahlzeiten** verdauen, die große Qualen hervorrufen.
- **Lautes Aufstoßen** und **Schluckauf** begleitet fast jede Stillmahlzeit und macht das Kind ärgerlich und reizbar.
- Durst auf **kleine Mengen** kalten Wassers, sogar bei Fieber.
- Der Säugling erwacht häufig am Morgen wegen Magenstörungen.
- Das Erbrochene ist gallig, blutig und sauer, schlimmer nach Trinken von kaltem Wasser.
- Verschlimmerung: Bohnen, Brot, Kohl, Karotten, Schokolade, Kaffee, **kalte Getränke, kalte Speisen**, Eier, Fett, Fisch, Obst, Milch, Zwiebeln, **Austern**, Backwaren, Erbsen, Salat, Süßes, Rüben.
- Abneigung: Bohnen, Brot, **Kohl**, Kaffee, kalte Speisen, kalte Getränke, Fett, Fleisch, Muttermilch, Zwiebeln, Austern, Backwaren, Erbsen, Salz, Suppe, Tomaten.
- Verlangen: Brot, Käse, Schokolade, **Austern**, Oliven, Mehlspeisen, Zucker, **Süßigkeiten, warme Getränke und Speisen.**

ABDOMEN

- Jegliche **enge Kleidung** um den Bauch ruft **Unwohlsein hervor**.
- Schluckauf bei **Bauchfellentzündung**.
- **Geräuschvolles** Abdomen.
- Abdominalkolik: Das Kind krümmt sich zusammen durch Essen von kalten Speisen oder Genuss kalter Getränke; besser durch Abgang von Blähungen.
- Malabsorptionssyndrom [Protein-Energie-Mangelernährung], Kohlehydratunverträglichkeit und Zöliakie.
- Eingeklemmte Blähungen mit weißlicher Farbe der Zunge und Auftreibung des Abdomens, sogar nach kleinen Mahlzeiten. Reichlicher Abgang von Blähungen.
- Rumpeln und Gurgeln im Abdomen vor Durchfall.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Leistenbruch +.**
 - **Leber vergrößert** und berührungsempfindlich.
 - **Pankreas: Mukoviszidose.**
 - **Paralytischer Ileus +.**
 - Abdomen eingezogen.
 - Aszites +.
 - Fettes Abdomen.
 - Darmtuberkulose.
 - Peritonitis +.
 - Aufgetriebenes Abdomen +.
 - Ultraschallbild: Leberzirrhose und portale Hypertension, Leberabszess und vergrößerte Mesenteriallymphknoten.
 - Wässrige Absonderung aus dem Nabel.

REKTUM

- Akuter Durchfall durch **pseudomembranöse Kolitis** (Clostridium difficile-assoziiertes Durchfall) oder chronischer Durchfall bei Kindern, die an Darmparasiten (Hakenwurm, Spulwurm, Entamoeba histolytica), Eisenmangelanämie oder Protein-Energie-Mangelernährung leiden oder nach übermäßigem **Konsum von Fruchtsäften**.
- Verstopfung nach Milch oder **auf Reisen**; Stuhl muss **mechanisch** entfernt werden.
- Stühle: Braun, reichlich, gewaltsam, grün, rot, schleimig, eitrig und unverdaut; **der erste Teil des Stuhles ist hart, gefolgt von weichem**, dünnem oder flüssigem Stuhl oder langem schmalen Stuhl, begleitet von vielen **Blähungen** oder die Stühle sind dünn, braun und blass, gemischt mit harten Klumpen gelblich-grüner oder **rötlicher unverdauter Partikel**.
- Der Durchfall beginnt oder verschlimmert sich meist nach kalten Getränken, Kaffee, **Mehlspeisen**, Obst, **Milch**, **Zwiebeln**, **Austern**, Backwaren, Kartoffeln, Gemüse; nach unterdrücktem Hautausschlag, besonders Skabies; morgens beim Aufstehen, nach Mitternacht (zwischen 1 - 3 Uhr oder 3-4 Uhr) oder am Abend (16-20 Uhr).
- Gutes Mittel bei Medikamenten-induziertem Durchfall durch Ampicillin, Amoxicillin und Clindamycin.
- Hartnäckige Verstopfung wegen Leberträgheit, führt zu großen Schmerzen im Anus bei dem Versuch, Stuhl abzusetzen.
- Die folgenden Begleitsymptome sind typisch für den Durchfall, der bei diesem Mittel zu finden ist:
 - Blaue Ringe um die Augen; Augen weit offen und blinzeln nicht.
 - Heißhunger, mit totaler Durstlosigkeit.
 - Erdfarbenes oder gerötetes Gesicht.
 - Lautes Rumpeln.
 - Gemüt: Reizbar, lustlos und traurig.
 - Fauliger Mundgeruch.
 - Empfindlichkeit am ganzen Abdomen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundheit des Anus.
 - Rektalpolypen.
 - Stuhluntersuchung: Würmer: Madenwürmer und Bandwurmsegmente.

BLASE

- Unwillkürliches Urinieren nach Schreck und bei Typhus.
- Das Kind schreit und weint vor dem Urinieren.
- Bettnässen.
- Häufiger Harndrang bei Fieber.
- Nützliches Mittel bei Nierenversagen, juvenilem Diabetes, Nierenentzündung und nephrotischem Syndrom.
- Harnverhaltung bei Neugeborenen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Urin: Albumin +, Glukose +, Calciumoxalatkristalle, Erythrozyten +.

- Der Urin erscheint wolkig oder milchig oder ist von schlammiger, backsteinroter Farbe, mit üblem Geruch und Vorhandensein von rotem oder gelbem Sand.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Hodenentzündung.
- Neigung zu masturbieren.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Feuchtigkeit zwischen Schenkeln und Skrotum.
 - Phimose +.
 - Schlaffes Skrotum.
 - Kleiner Penis (Fröhlich-Syndrom oder Hypogonadismus).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Stimme: Bellend, heiser, hohl, rau, nasal oder Verlust der Stimme.

ATMUNG

- Asthma bei Kindern durch **Magenstörungen**; schlimmer nachts, nach Mitternacht, im Schlaf, in kalter frischer Luft, in Rückenlage und beim Gehen im Freien; besser durch **Essen**, Seitenlage und **aufrecht sitzen**.
- **Fächelnde Bewegungen der Nasenflügel**: Wichtiges Begleitsymptom bei Atembeschwerden wie Asthma und Lungenentzündung.

HUSTEN

- Husten: **Bellend**; laut; **tags und nachts gleichbleibend**; verursacht **große Qual**, besonders **bei Fieber**.
- Auswurfsschwierig, gelatineartig, grünlich, eitrig.

LUNGENENTZÜNDUNG (ERINNERT AN KALI-C.)

- Ich habe Lyc.-Kinder mit Pneumonie gesehen, die sehr **diktatorisch** und **anspruchsvoll** in ihren Forderungen waren.
- Die Lungenentzündung dieses Mittels befällt häufig die **rechte Lunge**.
- Die Atmung ist **beschleunigt, keuchend, behindert, angestrengt, laut, nach Luft ringend, rasselnd und kurz**; schlimmer, wenn das Kind auf dem Rücken liegt; es fühlt sich besser, wenn es sich aufsetzt.
- Das Kind erscheint **furchtsam, abgehärmt, müde** und runzelt die Stirn; sein Benehmen ist wie **betäubt und träge**.
- Das Kind ist extrem kälteempfindlich, obwohl es gleichzeitig **stickige Räume nicht mag**.
- Das Kind ist sehr **ängstlich** und **besorgt** über seine Krankheit und braucht daher dauernde **Aufmerksamkeit**, will immer **jemanden um sich** haben. Trotzdem besteht die Tendenz, sich gegenüber helfenden **Personen in seiner Umgebung mürrisch** und **gereizt** zu verhalten.
- Der Husten ist **anfallsweise, krampfartig und heftig** mit spärlichem hartem Sputum.
- **Schweiß fehlt völlig** bei pneumonischem Fieber.
- Das Kind ist ärgerlich und reizbar, sobald es aus dem Schlaf erwacht.

- Vernachlässigte Lungenentzündung durch schwache Konstitution und Antibiotikamissbrauch.
- Rezidivierende Pneumonie bei immungeschwächten Kindern.
- Das Kind kann durstig auf warme Getränke sein, die sofort zu einem Völlegefühl und Auftreibung des Abdomens führen. Viele Lyc.-Kinder können auch durstlos sein.
- Das Fieber beginnt gewöhnlich um ca. 16 Uhr, zusammen mit Atemschwierigkeiten und vermehrtem Husten.
- Gewöhnlich angezeigt in den späteren Stadien, nach 3-4 Krankheitstagen, in denen das Kind anfänglich geistig sehr aktiv war.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Abmagerung um die Schlüsselbeine.**
 - Nasenflügelatmung.
 - Röntgen/Thorax: Pneumonie, Lungenödem, Pleuraerguss.
 - Zyanotische Lippen.
 - Spitze Nase.
 - Schläft mit halbgeschlossenen Augen.
 - Weißer Zungenbelag.
 - Zucken der Gesichtsmuskeln.

RÜCKEN

- **Abmagerung** der Zervikalregion.
- Kyphose.

EXTREMITÄTEN

- Ungeschicklichkeit; lässt Dinge aus den Händen fallen.
- Reichlicher, stinkender Fußschweiß.
- Extremitäten werden krampfartig zusammengezogen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Eisige Kälte der Hände und Füße.
 - Zerebrale Lähmung mit übermäßiger Kontraktion der Muskeln und Sehnen.
 - Zusammengeballte Finger.
 - Hühneraugen.
 - Synovitis.

EPILEPSIE

- Beschwerden durch Zorn bei Stillkindern, deren Mütter stark unter unterdrücktem Zorn leiden.
- Bei Konvulsionen: Zusammenballung der Finger, Schaum vor dem Mund und Röte des Gesichtes.
- Schlimmer nach kalten Getränken.

HAUT

- Untersuchungsergebnisse:
 - Blutige Abszesse.
 - Schmutzige Haut.
 - Psoriasis.

SCHLAF

- Gestört durch Husten, Hunger oder Alpträume.
- Im Schlaf: Zucken, Lachen, Stöhnen, Murmeln, offene Augenlider, offener Mund, Schweiß, Speichelfluss, Schreien und Weinen.
- Häufiges oder dauerndes Gähnen oder vergebliche Anstrengungen zu gähnen.
- Kleinkinder werden sehr schläfrig abends nach dem Stillen oder dem Essen.
- Schlaflage: Knie-Brust-Lage (Genupektoral).

FIEBER

- Frost:
 - Eiskälte der Hände und Füße.
 - Das Froststadium ist begleitet von Übelkeit, Erbrechen und Gähnen.
 - Frost ohne Durst.
 - Frösteligkeit wird nicht besser durch Zudecken.
- Hitze:
 - Gesicht, Wangen, Ohren, Augen und Handflächen heiß und brennend.
 - Große Hitze und Röte des Gesichtes.
 - Geistig: Reizbar, ruhelos, schweigsam, stumpf.
 - Körperlich: Verstopfung, Schnupfen, Nasenbluten, häufiges Urinieren, Tränenfluss, Übelkeit, Speichelfluss, saures Erbrechen, Durst, saubere oder braunbelegte Zunge.
- Schweiß:
 - Sauerriechender Körperschweiß außer an den Extremitäten.
- Das Fieber ist entweder intermittierend oder besteht aufgrund von Leukämie oder Lymphom.

ALLGEMEINES

- **Abmagerung mit Heißhunger.**
- Familiengeschichte von **Hirnschlag, Gicht, Bluthochdruck, Rheuma, rheumatischer Arthritis, Nierensteinen.**
- Mangel an Reaktion, wenn angezeigte Mittel versagen.
- Ödeme durch Herz- oder Lebererkrankungen.
- Neigung, in überfüllten Räumen durch Hunger oder durch Stehen ohnmächtig zu werden.

HERKUNFT

- *Lycopodium clavatum* aus der Familie der Bärlappgewächse (Lycopodiaceae).

MAGNESIUM CARBONICUM

(Magnesiumcarbonat - Mag-c.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Das Kind wirkt sehr sanft, doch damit überdeckt es einen inneren Sturm von Gewalt.
- ▶ **Waisen, uneheliche oder vernachlässigte Kinder** (Film: „Gottes vergessene Kinder“) oder Kinder, die immer wieder Zeuge von **Misshandlungen und Streit in der Familie** waren.
- ▶ Verdrängte Emotionen, die meist durch dominierende Unterdrückung entstanden sind.
- ▶ Aggression und geringe Kontaktfähigkeit, meist aus Unsicherheit und Mangel an Schutz.
- ▶ Aufmerksamkeitsdefizit, Verhaltensstörungen und Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern mit Tuberkulose in der Familienanamnese.
- ▶ Legasthenie; lernt nur langsam.
- ▶ Schnell erschrocken bei unerwarteter Berührung oder Geräuschen.
- ▶ Emotional vernachlässigte Kinder, die man sitzengelassen hat, auch für kurze Zeit; z. B. Ferien, Jobwechsel usw.
- ▶ Nachtkinder (Mezger).
- ▶ Waisenkinder vom „Oliver Twist“-Typ, unterdrückt, schweigend, unsicher, mager, liebebedürftig usw.
- ▶ Friedensstifter als psychologische Projektion, als ein Versuch, den unterschwelligen Zorn, die Konflikte und den Kummer zu besänftigen.

KÖRPER

- ▶ Zarte, kümmerliche, kränkliche, saure Babys mit stark tuberkulärer Diathese; essen gut, trotzdem abgemagert.
- ▶ Allgemein überempfindlich: Auf Klimaeinflüsse, Gefühle, Licht, Musik, Geräusche, Schmerz etc. Das Kind verträgt keinen Temperaturwechsel, keine Berührung oder Zugluft - alles verschlimmert seine Beschwerden (besonders seine Schmerzen).
- ▶ Man sollte an dieses Mittel denken, wenn das Kind eine Abneigung gegen Gemüse mit starkem Verlangen nach Fleisch hat. Kein anderes Mittel der Materia Medica hat ein solches Verlangen nach Fleisch und nach allem, was nach Fleisch schmeckt. Gedeiht ohne Fleisch nicht; muss es in jeder Mahlzeit haben.
- ▶ Allgemeine Verschlimmerung durch Milch; Laktoseintoleranz.
- ▶ Schlechter durch körperliche und geistige Anstrengung; schnell ermüdet. Trotz geringer Ausdauer und niedrigem Energieniveau kann das Kind wohlgenährt aussehen.

HALS

- Halsschmerzen beim Niesen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Käsig Klumpen auf den Mandeln.
 - Kropf.
 - Unterkieferdrüsen vergrößert und berührungsempfindlich.

MAGEN

- **Der Säugling schreit vor Hunger, auch nach einer vollen Mahlzeit, die gerade ein paar Minuten vorher stattgefunden hat.**
- **Verdauungsstörungen nach Kohl, Milch und sauren Speisen.**
- Dauerndes saures Aufstoßen, nach dem Frühstück und nach jeder Speise, besonders nach Kohl.
- Extremer Durst bei Fieber, nach dem Mittagessen und vor, während und nach Stuhlgang.
- Erbrechen nach dem Füttern, besonders von unverdauter oder geronnener Milch.
- Verschlimmerung: Kalte Speisen, saures Obst, Pflaumen, Kartoffeln, warme Speisen.
- Besser: Kaffee, kalte Speisen, Schweinefleisch, Salz.
- Abneigung: Brot, Butter, gekochte Speisen, Obst, Fleisch, Milch, Hammelfleisch, Salat, Gemüse, warme Speisen.
- Verlangen: Brot, Butter, Kohl, Kaffee, Delikatessen, Obst (besonders saures), saftige Dinge, Fleisch (eingelegt, gesalzen oder konserviert), Milch, sauer Eingelegtes, Suppe.

ABDOMEN

- Kolik: Begleitet von übermäßiger Auftreibung des Abdomens und dauerndem saurem Aufstoßen; schlimmer auf der linken Bauchseite (rechte Seite: Lyc.) oder um den Nabel; die Kolik ist gefolgt von Durchfall (Verstopfung folgt der Kolik: Lyc.); schlimmer von 6-7 Uhr morgens oder abends, durch den Genuss von grünen Speisen, grünem Gemüse oder Milch; besser durch Fleischdiät.
- Aufgetrieben nach dem Essen; mit Durchfall; besser durch Abgang von Blähungen.
- Gurgeln im Abdomen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abdomen druckempfindlich.
 - Vergrößerte Leber.
 - Leistenbruch.
 - Tastbarer Dickdarm.

REKTUM

- Durchfall:
 - Beschwerden oder Verschlimmerung durch: **Künstliche Milch, andere Nahrungsergänzungen, Zahnung, Obst, heißes Wetter.**
 - Vor dem Stuhl: Schwere **Kolik** und Abgang von Blähungen.
 - Während Stuhlgang: Schwere **Kolik**.

- Begleitsymptome: Zunge weiß belegt, **übermäßiger Durst**, durch Blähungen aufgetriebenes Abdomen.
- Besser durch: Warme Suppe.
- Das Kind hat vergeblichen Stuhldrang, bei dem nur kleine Mengen Stuhl mit vielen Blähungen abgegeben werden.
- Verstopfung mit schwierigem Stuhlgang, obwohl er weich ist; hartnäckige und chronische Verstopfung nach seelischer Erschütterung.
- Stühle: Reichlich, sauer riechend, unverdaut; grün oder grünlich-gelb; schaumig, schleimig oder wässrig; mit blutigem Schleim, grünem Schaum oder weißen Klumpen wie Talg.
- Würmer: Madenwürmer und Spulwürmer.

HARNWEGE

- Bettnässen.
- Häufiges Urinieren.
- Juveniler Diabetes mellitus.

HUSTEN

- Durch Hunger.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Schweiß der Halsregion.

EXTREMITÄTEN

- Schnell ermüdet aufgrund weicher und schlaffer Muskeln.
- Untersuchungsergebnis:
 - Kalte Hände und Füße.

SCHLAF

- Schläfrigkeit nach dem Füttern, besonders nach dem Mittagessen.
- Im Schlaf: Stöhnen, Schweißbildung, Schreien, Seufzen, Zusammenschrecken, Sprechen, Muskelzuckungen und Weinen.
- Braucht viele Stunden Schlaf, um sich am Morgen frisch zu fühlen.
- Schlaflage: Beine gespreizt.
- Der Schlaf wird durch Konvulsionen oder Alpträume gestört.

HAUT

- Schweißbildung besonders nach warmen Speisen und beim Schlafengehen; ist übelriechend, ölig, sauer und färbt die Bettwäsche gelb.
- Das Jucken wird schlimmer durch Baden.
- Neigung zu rezidivierender Furunkelbildung.
- Untersuchungsergebnis:
 - Psoriasis.

ALLGEMEINES

- **Abmagerung von Säuglingen und Kindern, besonders mit chronischen Beschwerden wie Durchfall.**

- **Extrem fröstelige Patienten;** schlimmer durch den geringsten Luftzug, kaltes Wetter, kalte Getränke und kalte Speisen.
- Die Absonderungen sind beißend, ätzend und übelriechend.
- Allgemeine Verschlechterung nachts, besonders die kolikartigen Schmerzen und der Durchfall.
- Erkältungsneigung.
- Neigung zu Drüsenvergrößerungen: Adenoide, Lymphknoten, Mandeln etc.
- Schwäche durch Durchfall, nach Essen, durch Schweißabsonderung, nach Stuhlgang oder Erbrechen.

GEMEINSAME MERKMALE VON MAG-C. UND CHAM.

Ein Mag-c.-Kind kann ähnlich wie ein Cham.-Kind erscheinen. Einige wichtige **gemeinsame Symptome** sind:

GEIST

- Beschwerden durch Gemütsregungen.
- Abneigung, berührt oder angesehen zu werden.
- Abneigung gegen geistige Anstrengung, mit Dumpfheit.
- Launisch.
- Widerspenstig, mit Neigung zu widersprechen.
- Konzentrationsschwierigkeiten beim Lernen.
- Schreckhaft, besonders nachts.
- Vergesslich.
- Faul.
- Macht Fehler beim Schreiben.
- Deutliche Gereiztheit und heftiger Zorn.
- Streitsüchtig.
- Ruhelos im Bett; es treibt ihn aus dem Bett; Herumwerfen im Bett.
- Geräuschempfindlich.
- Schreit schnell, besonders im Schlaf, beim Erwachen und bei Schmerzen.

KOPF

- Kopfschweiß.
- Kann seinen Kopf nicht aufrecht halten, wird nach hinten gezogen.
- Abdecken des Kopfes verschlechtert.

OHREN

- Schmerzen bei Berührung.
- Rote Verfärbung.

NASE

- Empfindlicher Geruchssinn, besonders für starke Gerüche.
- Schnupfen bei Husten.
- Absonderung: Tropfend, wässrig.

GESICHT

- Rote Farbe.
- Schwellung der Wangen bei Zahnschmerzen.

MUND

- Zahnkaries.
- Schwierige und langsame Zahnung.
- Speichelfluss bei Zahnschmerzen.
- Stottern.

MAGEN

- Appetit: Launisch und heißhungrig.
- Erbrechen nach Milch.
- Verschlimmerung: Kaffee, Milch, warme Speisen.
- Abneigung: Fleisch.
- Verlangen: Kalte Getränke, kaltes Wasser, Brot, saure Speisen.

ABDOMEN

- Kolikartige Schmerzen bei gestillten Kindern.

REKTUM

- Durchfall bei Kindern, besonders während der Zahnung.
- Stuhl: Schaumig, grün, wässrig und schleimbedeckt.

HARNWEGE

- Bettnässen.

SCHLAF

- Im Schlaf: Stöhnen, Schreien, schrickt leicht zusammen, Reden und Muskelzucken.
- Häufiges Gähnen.
- Schläfrigkeit nach dem Mittagessen.
- Schlaflosigkeit bei Zahnung, durch Furcht, durch Ruhelosigkeit.

ALLGEMEINES

- Verschlimmerung durch Baden, kalte feuchte Anwendungen, Aufdecken und durch Gehen im Freien.
- Abneigung zu baden.
- Konvulsionen bei Schmerzen im Abdomen.
- Abmagerung.

Differenzierende Merkmale zwischen Mag-c. und Cham.	
MAGNESIUM CARBONICUM	CHAMOMILLA
Geist • Beschwerden durch: Uneinigkeit zwischen den Eltern. • Angst mit Furcht; bevor er zum Arzt oder Zahnarzt geht. • Abneigung gegen Gewalt; Verlangen nach Harmonie; Beschwerden durch Streit. • Verlangen zu reisen. • Verlangen zu knabbern. • Konzentrationschwierigkeiten beim Schreiben. • Vielfraß. • Gier. • Heimweh. • Waisen; Verlassenheitsgefühl. • Ruhelosigkeit durch Zahnschmerzen. • Zusammenschrecken im Schlaf besonders um Mitternacht. • Lautes Sprechen im Schlaf. • Schüchternheit.	Geist • Beschwerden durch: Widerspruch. • Angst bei Kleinkindern; nachts. • Zorn: Wirft mit Sachen, wenn es seinen Willen nicht bekommt. • Abneigung, liebost zu werden. • Verhaltensprobleme: Beleidigend, Treten, Aufsässigkeit und Schlagen. • Kann es nicht ertragen, angesehen zu werden. • Launenhaftigkeit. • Konzentrationschwierigkeiten beim Lesen. • Verlangen getragen zu werden. • Furcht: Vor der Annäherung anderer, vor Menschen. • Gesten: Finger in den Mund stecken oder mit den Füßen stampfen. • Untröstlich. • Reizbarkeit bei Zahnung. • Stöhnen: Kläglich. • Ruhelosigkeit gebessert nur durch Umhergetragenwerden. • Schreien: Bei Zahnung und bei Kolik.
Kopf • Schlägt seinen Kopf gegen die Wand, besonders im Schlaf. • Offene Fontanellen mit eingesunkenem Hinterkopf. • Schweiß auf der Stirn beim Erbrechen, am Hinterkopf.	Kopf • Schweiß: Feucht, heiß, im Schlaf, sauer. • Warme Bedeckung am Kopf verschlimmert. • Kopfwäschen verschlimmert.
Nase • Dauernde Neigung zu schnäuzen. • Verstopfung der Nase beim Erwachen. • Rote Verfärbung.	Nase • Schnupfen bei Kehlkopfentzündung.
Mund • Mund offen bei Schnupfen. • Zähne empfindlich und schmerzhaft bei Berührung. • Zahnschmerzen: Schlimmer bei Wetterwechsel, kaltem Wasser, beim Zusammenbeißen der Zähne; besser durch Liegen auf der schmerzhaften Seite.	Mund • Zahnschmerzen: Mit unwillkürlichem Speichelfluss; schlimmer durch emotionale Erregung wie Zorn, beim Kaltwerden nach Überhitzung, beim Liegen auf der schmerzlosen Seite; besser durch kaltes Wasser im Mund.

MAGNESIUM CARBONICUM	CHAMOMILLA
Magen • Erbrechen: Nach Suppe; von geronnener und unverdauter Milch. • Verschlechterung: Kohl und Mehlspeisen. • Abneigung: Brot und Butter, Muttermilch, Gemüse, besonders grünes Gemüse. • Verlangen: Delikatessen.	Magen • Schmerzen: Schlimmer nach dem Frühstück, nach Kaffee, vor einem Hustenanfall, durch Berührung. • Verschlimmerung: Kaffee, Süßigkeiten, warme Getränke. • Abneigung: Essen, besonders nachdem er eine Kleinigkeit gegessen hat, Suppe, warme Speisen und Getränke. • Verlangen: Kalte Speisen.
Abdomen • Schmerzen: Kolikartig nach Milch und nach Durchfall; besser durch Zusammenkrümmen.	Abdomen • Schmerzen: Nach Zorn, nach Kaffee, durch kalte Getränke; kolikartige Schmerzen besser durch warme Anwendungen, aber nicht besser durch Druck.
Rektum • Durchfall: Nach künstlicher Nahrung, nach Milch. • Stuhl: Grün, wie Schaum auf einem Froschteich; harter Stuhl gefolgt von weichem, kräftig und schwallartig.	Rektum • Durchfall: Bei Säuglingen; schlimmer durch Abwärtsbewegung, Schreck, nach rohen Speisen oder nach Genuss von Kaltem. • Stuhl: Übelriechend, wie faule Eier; grün, wie Spinat in kleinen Stückchen oder gehackte Eier.
Schlaf • Schlaflosigkeit durch Aufregung, besonders nach Mitternacht.	Schlaf • Schlaflosigkeit bei Neugeborenen, der Säugling muss herumgetragen werden. • Schläft mit angezogenen oder ausgestreckten Beinen.
Allgemeines • Abmagerung: Bei Durchfall; bei Säuglingen; mit Heißhunger. • Saurer Körpergeruch.	Allgemeines • Kalt werden bessert. • Strampelt alle Decken weg. • Etwas zu berühren, verschlimmert. • Schwäche, besonders lähmende, durch Schmerz.

MAGNETIS POLI AMBO

(Magnet - M-ambo.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Geistesabwesend und verträumt.
- ▶ Großes Verlangen nach Milch.
- ▶ Übermäßiger Hunger, aber sehr schnell satt.
- ▶ **Phimose, Paraphimose und Leistenbruch.**
- ▶ Schlaflage mit den Armen auf dem Bauch oder mit den Armen unter dem Kopf oder auf dem Rücken, mit angewinkelten Knien und Ellbogen oder abgespreizten Knien.
- ▶ Spätes Aufwachen.
- ▶ Schlechteste Zeit ist morgens beim Aufwachen.

HERKUNFT

- Von Hahnemann in die Homöopathie eingeführt, bei Dr. H. C. Allen aber fälschlich als Nosode deklariert.

MAGNETIS POLUS ARCTICUS

(magnetischer Nordpol - M-arct.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Empfindsam und zurückhaltend.
- ▶ Nervöse Kinder, die Dinge aufschieben, wenn sie ihnen gefährlich oder schwierig erscheinen.
- ▶ Hastig, immer in Eile.
- ▶ Schüchterne und sanfte Kinder, die faul sind und Fehler beim Schreiben machen.
- ▶ **Bauchhernien oder schmerzhafte Leistenbrüche.**
- ▶ Schlafwandeln.
- ▶ Schlaflage auf dem Rücken oder auf der Seite.
- ▶ Erkältungsneigung.
- ▶ Heftige Reaktion auf homöopathische Mittel.

HERKUNFT

- Von Hahnemann in die Homöopathie eingeführt.

MAGNETIS POLUS AUSTRALIS

(magnetischer Südpol - M-aust.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Unberechenbare, mürrische Kinder, niemand darf sie anfassen.
- ▶ Starke Abneigung gegen Gesellschaft und sehr streitsüchtig von Natur aus. Gefühl ungeliebt und verlassen zu sein, deshalb streitsüchtig und unzufrieden.
- ▶ Starke Abneigung gegen Milch.
- ▶ **Leistenbruch, Bauchwandbrüche und zurückgezogene Hoden.**
- ▶ Plötzlicher Harndrang, muss zur Toilette rennen, weil sonst Urin abgeht.
- ▶ **Bettnässen.**
- ▶ **Eingewachsene Zehennägel.**
- ▶ Wachstumsschmerzen.
- ▶ Aufwachen durch Schreck.
- ▶ Schläft mit den Händen oder Armen unter dem Kopf.

HERKUNFT

- Von Hahnemann in die Homöopathie eingeführt.

MALANDRINUM

(Pferdemaue - Maland.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Spielt immerzu mit den Genitalien.
- ▶ Mehrfache Impfungen und seitdem nie mehr richtig gesund.
- ▶ Abmagerung des geimpften Körperteils.
- ▶ Infektionskrankheiten wie **Masern und Windpocken**.
- ▶ Angreifende Absonderungen, besonders Stuhl, Atem und Fußschweiß.
- ▶ Impetigo.
- ▶ Akne mit fettiger Gesichtshaut.
- ▶ Ungesunde Haut; Hautausschläge heilen nur sehr schwer.

HERKUNFT

- Dieses Mittel aus dem Fesseleczem von Pferden wurde von Dr. Boskowitz aus Brooklyn, New York, USA, in die Homöopathie eingeführt.

MANCINELLA

(Manchinellenbaum - Mane.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Kinder, die **Angst und Schrecken** erlebt haben, schreckliche Filme gesehen oder gruslige Geschichten gehört haben oder Furcht erregende Serien im Fernsehen anschauen; nachts große Angst, fürchtet sich vor außerirdischen Wesen, beim Alleinsein in der Dunkelheit, Angst vom Teufel geholt zu werden, vor dem Bösen, vor Gespenstern, dass etwas passieren wird, vor Monstern und in engen Räumen.
- ▶ Übermäßige Dominanz der Eltern.
- ▶ Willensschwach und schwacher Verstand, aber nicht stumpfsinnig und stupide wie bei Bar-c.
- ▶ Schwäche des Verstandes mit unkontrollierten Gedanken; fixe Ideen, von denen sie nicht abzubringen sind.
- ▶ In extremen Fällen auditive und visuelle Halluzinationen. Sie kämpfen dauernd mit diesen Angst- oder Zwangsstörungen und befürchten eines Tages geisteskrank zu werden.
- ▶ Ungeschicktes Verhalten, lassen Gegenstände aus der Hand fallen.
- ▶ Beginn der meisten Beschwerden in der Pubertät.
- ▶ Verlangen nach salzigem Essen und kalten Getränken.

HERKUNFT

- Auch Hippomane mancinella genannt, gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae).

MEDORRHINUM

(Tripper-Nosode - Med.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST UND KONSTITUTION

- ▶ **Auf ihre Schönheit bedachte** Mädchen und Jungen, die ihr Haar gern besonders cool oder nach der neuesten Mode frisieren; ausgiebig Deodorants, Parfums und Body-Lotions benutzen und bevorzugt teure Markenkleidung tragen, z. B. von Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Lacoste etc.
- ▶ Kinder aus Familien, deren Eltern und/oder Großeltern an Tripper/**Gonorrhoe** (Agn, Nat-s., Thuj.) litten, die durch allopathische Medikamente **unterdrückt** wurde (Cann-s., Canth., Sars., Thuj.).
- ▶ Kinder aus Familien, in denen strenge Erziehung und **Unterdrückung** (Anac., Carc., Naja., Lyc., Sep.) herrschen, **Missbrauch** (Carc., Hyos., Lac-c., Lyss., Nat-m., Sep.) oder starke **Disharmonie** zwischen den Eltern (Graph., Lach., Mag-m., Nit-ac.).
- ▶ Kinder, deren Eltern eine ausgeprägte Geschichte folgender Krankheiten aufweisen:
 - Krebs (Brom., Calc-ar., Carb-an., Carc., Con., Cund., Sein, Trif-p.).
 - Chronische Oophoritis.
 - Chronische Salpingitis.
 - Down-Syndrom.
 - Gicht (Calc., Lyc.).
 - Neuralgien wie Ischias, Trigeminusneuralgie.
 - Parametritis.
 - Rheumatismus (Sep.).
 - Rheumatoide Arthritis.
 - Myome.
- ▶ Frühe soziale und geistige Entwicklungsschritte, manchmal dagegen auch verzögerte körperliche Entwicklung. Die **geistige Frühreife** ist erkennbar an Ungeduld und Eile, alles erkunden zu wollen, an Abenteuerlust und Verlangen nach Gesellschaft (Philip Bailey: Aur., Calc-p., Lach., Verat.).
- ▶ Babys, Kleinkinder und jüngere Kinder haben eine früh entwickelte Libido und sind fasziniert von ihren Genitalien. Fangen beim Erkunden unwillkürlich an zu masturbieren. **Frühe exzessive Masturbation**. Junge Med-Mädchen sind sehr sinnlich und flirten gern mit den Jungs. Sie mögen das gegenseitige berühren der Genitalien und ebenso gegenseitiges Masturbieren. Als Teenager kann die junge Med-Frau schon eine richtige Sex-Affäre mit einem Mann haben. Med.-Kinder verlieben sich leicht, schnell und leidenschaftlich (Philip Bailey).
- ▶ Konstitution: Blass, rachitisch; geistig dumpf und schwach.
- ▶ Verlangen nach **frischer Luft** (Carbo-veg., Lyc., Puls., Sulph.).
- ▶ **Grenzenlose Energie** (Tar., Merc-sol., Tub.).
- ▶ Sehr **neugierig** (Aran-ix., Lach., Phos., Sulph., Verat.) und übereifrig, was den Menschen in ihrer Umgebung Kopfschmerzen bereiten kann.

- ▶ Furchtlos (Agar., Ign., Op.) in all ihren Handlungen, kaum jemals schüchtern; sie können mit einem völlig Fremden problemlos essen, sprechen und zusammen sein; das Kleinkind geht zu jedem hin.
- ▶ Gefühl, als sei jemand hinter ihm in der Dunkelheit (Anac., Calc., Crot-c., Ferr., Lach., Sanic.).
- ▶ Freies, ungebundenes Naturell der Kinder (Bell., Nux-v., Sulph.); mögen gern selbstständig etwas unternehmen.
- ▶ **Ungeduldige Kinder** (Cham., Ign., Ipec., Sep.), die nicht in der Warteschlange anstehen können oder es nicht schaffen zu warten, bis das Essen auf den Tisch kommt.
- ▶ Viele Med.-Kinder haben keine Ideale oder Ziele im Leben; dieser Mangel wird besonders stark, wenn sie gefühlsmäßig durcheinander sind (z. B. in der Pubertät) oder wenn sie mit Alkohol- und Drogenkonsum in Berührung kommen.
- ▶ Aus miasmatischer Sicht zeigen Med.-Kinder nicht das sykotische Vollbild wie Thuja, sondern eher tuberkulinische Züge mit einem Hauch von Sykose.
- ▶ Sie verabscheuen Einschränkungen, Regeln und Richtlinien und lehnen jede Art von Autorität ab (Merc., Nat-m., Tub.).
- ▶ Sie haben Freude daran, Tiere und kleine Kinder zu piesacken, z. B. treten sie einen Freund beim Fußball- oder Baseballspielen, ziehen der Katze am Schwanz, schubsen einen Freund ins Wasser oder werfen einen Hund in den Teich.
- ▶ Schwaches Gedächtnis; können sich nicht an Namen erinnern (Anac., Chlor., Euon., Guaj., Lyc., Sulph.), nicht an Wörter oder Anfangsbuchstaben; **muss nach dem Namen seines besten Freundes fragen**; vergisst sogar seinen eigenen Namen (Alum, Cic., Kali-br., Sulph., Valer.); ist in der Rechtschreibung schlecht (Helo-s., Lach., Lyc.); überlegt, wie ein wohlbekannter Name geschrieben wird; das Kind verliert ständig den Gesprächsfaden (Calc-sil., Lyc., Tarent.).

KÖRPER

- ▶ **Arthritische** oder **rheumatische** Schmerzen bei jungen Kindern, als Folge **unterdrückter Gonorrhoe** bei den Eltern.
- ▶ **Fischiger Geruch der Absonderungen** (Ol-an., Teil., Sanic.).
- ▶ **Große Hitze** im Körper lässt das Kind wenig bekleidet in Haus und Garten umherstreifen; es mag frische Luft im Zimmer oder einen Ventilator; nachts wirft das Kind die Bettdecke ab.
- ▶ Bei Kindern, die Mittel wie Nat-s., Kali-s., Arg-n., Sep. wegen Erkrankungen des Atemtrakts wie Bronchiolitis oder Asthma bekommen, ist fast immer eine Zwischengabe Med. erforderlich.
- ▶ **Sie lieben das Meer** und die **Meeresküste** (Carc.). Kinder, die Med. brauchen, gehen gern ausgiebig schwimmen, weil sie ihr starkes Bedürfnis, im Wasser zu sein, nicht unterdrücken können. Sie fühlen sich auch besser in feuchtem Klima (Caust., Nux-v.).

- ▶ **Neugeborene und Säuglinge liegen bequemer auf dem Bauch** (Bell., Chel., Coloc., Podo., Stann.).
- ▶ **Neugeborene, die den ganzen Tag schlafen und nachts aktiv sind** (Syph. - das Neugeborene schreit nachts viel ohne Grund).
- ▶ Kann fröstelig sein (10%) oder warm (90%).
- ▶ Die Kinder sind äußerst empfindlich gegen nebliges (Aran., Hyper., Rhus-t.) und feuchtes Wetter.
- ▶ Kinder mit allgemein verminderter Vitalität und ständiger Müdigkeit, bei denen eine gründliche systematische Untersuchung aber nichts zutage fördert (Alum., Calc-p., Gels., Kali-p., Phos-ac., Zinc.).
- ▶ Chronische katarrhalische Zustände besonders der Atemwege, des Magen-Darm-Trakts und der Harnwege, wobei reichliche, scharfe Absonderungen auftreten sowie Jucken.
- ▶ **Zwergenhafter, verkümmerter Wuchs**, an Bar-c., Calc-p. und Syph. erinnernd.
- ▶ **Nie mehr gesund seit der letzten Impfung** (Maland., Merc., Sars., Sil., Sulph., Thuj.), mit Krankheiten wie Neurodermitis, Urtikaria, Ekzem und allgemein niedriger Immunabwehr.
- ▶ Hypophysendysfunktion wie Simmonds-Krankheit, charakterisiert durch Hypogonadismus, Fehlen der sekundären Geschlechtsmerkmale, Akromegalie (Bar-c., Carc., Pitu., Pitu-gl., Thyr.), Gigantismus, Sotos-Syndrom, Kretinismus.
- ▶ **Rezidivierende Infektion der Harnwege** bei jungen Kindern (Apis, Asaf., Borx., Caps., Lach., Lyc., Sars., Sep., Tub.) mit oder ohne organische Ursache im Harntrakt.
- ▶ Besser: **auf dem Bauch liegen**; frische Luft; sich abdecken (Iod., Lyc., Puls.); starkes Reiben (Rad-br.); **am Meer** (Acon., Aq-mar., Borx., Brom., Carc., Iris, Sulph-ac.); feuchtes Wetter; **Sonnenuntergang** (Alum., Coca., Lil-t., Sei.).
- ▶ Schlimmer: **Feuchtes Wetter**, Kälte; **am Tag** (Alum., Euphr., Ferr., Sang., Stann., Sep., Sulph.); 3-4 Uhr morgens; nach dem Urinieren (Coloc., Merc., Thuj.); Berührung (Ant-t., Cina); geschlossene Räume (Alum., Arg-n., Just., Tub., Vib.); beim Denken an die Beschwerden (Caust., Gels., Ox-ac., Oxyt., Pip-m., Ran-b., Sabad., Spong.); Hitze; Sonne; Gewitter (Bry., Lach., Nat-c., Phos., Rhod., Sep., Sil.); die geringste Bewegung; Schweiß; sich strecken (Cham., Plat., Puls., Ran-b., Rheum.); den Kopf nach vorn beugen; Bad in Salzwasser (Ars., Mag-m., Mur-ac., Rhus-t., Sep., Zinc.).
- ▶ Wenn gut gewählte Mittel weder Erleichterung noch dauerhafte Verbesserung der Symptome bei einem Kind bringen, besonders in Fällen von
 - allergischer Reaktion auf **Tiere** (Atmung und Haut betreffend);
 - allergischer Reaktion auf **Lebensmittel** (Magen und Haut betreffend);
 - allergischer Reaktion auf **Pflanzen** (Atmung und Haut betreffend);
 - Bronchialasthma;
 - juveniler rheumatoider Arthritis;
 - nephrotischem Svdrom.

Med. ist ein Gigant unter den sykotischen Mitteln. Es ähnelt stark Thuj., Nat-s., Arg-n., Tub. und Tarent.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Nägelkauen** (Arum-t., Bar-c., Brom., Carbo-veg., Carc., Plb., Verat.), Knabbern an den Fingern (Acon., Arum-t., Carc., Stram.), an den Händen (Acon., Arum-t., Hura, Op., Plb.), an allem Möglichen.
- Kann nicht sprechen ohne zu weinen (Kali-c., Puls., Sep.).
- Das Kind ist immer in großer Eile, wenn es etwas tut (Dulc., Merc., Sil., Sulph-ac., Tarent.); schließlich macht diese Eile aber müde (vgl. Merc., der in Eile ist, aber nie müde wird).
- Kinder, die tief ins Reich der Fantasie und der mystischen Einblicke eingedrungen sind; oft tragen sie eine bestimmte Art von Kleidung oder modische Amulette, Ringe, Armbänder, Ohrringe etc.
- Kinder aus einer Familie, wo ein Elternteil ihm ständig Vorwürfe macht und unfähig ist, die Gefühle des Kindes zu verstehen; dadurch zieht das Kind sich manchmal zurück oder es nimmt seine Zuflucht in die Welt der Fantasie, der Intuition und Imagination. [*Gemüt; Wahnideen - unwirklich - alles erscheint unwirklich*],
- Kinder, die Med. brauchen, sind gut in Sport, im Lernen, in Kunst, sie sind redigewandt und fantasievoll im Erzählen (Lach., Lyc., Nux-v., Sulph.).
- Möchte sehr gern die verschiedensten Erfahrungen machen, seien sie nun gesellschaftlich akzeptiert oder nicht. Liebt es, als junger Mensch die Welt zu erkunden. Probiert gern Beziehungen aus, eine nach der anderen, oft mit extrem unterschiedlichen Menschen.
- Bei jungen Kindern äußerste Spannweite im klinischen Bild, von introvertiert bis extrovertiert, von freundlich bis grausam, von stumpf bis intellektuell und intuitiv, von gefühlsmäßig offen bis abgesondert und isoliert.
- Außerordentlich **leidenschaftliche** (Carbo-veg., Lach., Nux-v.) und **enthusiastische** (Carc., Lach., Merc., Nux-v., Plat., Stram.) Kinder, die das Leben gern voll auskosten.
- Ängstlich vor Schulwechsel, Wohnungswechsel, vor jeglicher Ausübung von Sport und Spiel (Arg-n., Calc-sil., Lyc.).
- **Fühlen sehr sensibel Ereignisse, bevor sie noch eintreten, und liegen meist richtig mit ihrer intuitiven Wahrnehmung** (Acon., Anh., Crot-c., Phos.).
- **Gute Auffassungsgabe** (Coff., Lach., Op., Phos.), gut in der Schule, oft gleichermaßen beliebt bei Lehrern und Mitschülern.
- Gut im Aufsatzschreiben wegen ihrer starken Fantasie (Op.).
- Med-Kinder sind berühmt für ihren **Ungehorsam** (Caust., Merc., Plb., Tarent.) gerade dann, wenn man ihnen einen vernünftigen Ratschlag gibt (Bell., Carc., Ign., Phos., Plat.).
- In ihrer Wildheit, Ungeduld und Eile können Med-Kinder einen Zustand heraufbeschwören, der gewöhnlich als Panikattacke beschrieben wird; ihr Gemütszustand ist dann völlig außer Kontrolle.
- **Optimistische Kinder** (Calc., Sulph., Tub.), die aus jeglicher Art von Erfahrung zu lernen gewillt sind und ihren Lebenshorizont erweitern wollen; geben bis zum Schluss die Hoffnung nicht auf.

- Gut im Gedichte-Aufsagen, guter verbaler Ausdruck, bekommt deshalb oft Auszeichnungen.
- Tendenz wie „weggetreten“ zu sein, wobei einfache Wörter vergessen werden, normale Sätze nicht mehr verfügbar sind oder Unfähigkeit besteht, das zu behalten, was gerade gesagt wurde. Oft kommen diese Kinder aus der Schule und haben vollständig vergessen, was für Schularbeiten sie machen sollen.
- Neigung, Gesichter im Dunklen zu sehen, mit lebhaften Fantasien verbunden (Phos., Stram.).
- Das Kind hat große Schwierigkeiten, seine Symptome zu schildern; der Homöopath muss seine Fragen oft wiederholen.
- Die Mädchen wollen schon in sehr jungem Alter ihre Brüste und Schenkel zeigen und tragen daher Miniröcke und Tops mit tiefem Ausschnitt (Hyos., Phos., Tarent.); dies hauptsächlich, um attraktiv auf die Jungen zu wirken.
- Med.-Kinder sind Nachtmenschen. Ihr Energiepegel steigt dann an und es erfolgt ein langsames Umschalten von Rationalität zu einer eher spontanen und romantischen Stimmung. Während dieser Phase sind die Kinder wesentlich kreativer und künstlerischer und können ihre schulischen Projekte sehr leicht umsetzen ohne viel mentalen Aufwand (Philip Bailey).
- Kinder sind reizbar am Tag, werden aber, wenn es Nacht wird, sehr aktiv (Lyc.), gut gelaunt (Caust., Cypr., Verat.) und würden gern die ganze Nacht spielen. „Missmutig am Tag, heiter in der Nacht; möchte spielen.“ (H. C. Allen, Materia Medica of Nosodes).
- Kleine Kinder haben die Angewohnheit, **ihre Hände zu einer Faust zusammenzupressen** (Hyos.).

KOPF

- Kopfschmerzen bei Schulkindern (Calc-p., Nat-m., Ph-ac.), schlimmer beim Lesen (Calc., Plat., Sep., Tub.), während Schnupfen (All-c., Chlor., Lyc., Merc.), Licht, Erschütterung, Sonne; **wahnsinnig machende Schmerzen**, wandernde Schmerzen; Schmerz in der Stirn und im Hinterkopf.
- Bewegung des Kopfes, seitlich, **wiegt den Kopf von einer Seite zur anderen, um den Schmerz zu lindern** (Agar., Cina).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schuppen mit Jucken.
 - Kopf nach hinten gezogen (Cic., Cupr., Tax.).
 - Hautausschläge krustig, schorfig, feucht (Anan., Bar-c., Graph., Olnd., Psor.), das Haar zerstörend (Dulc.).
 - Haar: Lockig (Mez.), trocken (Calc., Iod., Plb., Thuj.), locker (Ph-ac.), fettig (Caust., Nat-m.), glanzlos (Arn., Canth., Jab., Thuj.) und dick; sieht immer ungekämmt aus.
 - Entzündung der Stirnhöhlen.
 - Großer Kopf (Calc., Calc-p., Sil.).
 - Rollen des Kopfes (Bell., Stram., Sulph., Tarent., Tub.); **reibt den Kopf am Kopfkissen, sobald Kopfschmerz oder Unbehagen auftauchen.**
 - Tinea capitis (Kopfflechte) (Bac., Brom., Dulc., Graph., Teil.).
 - Wuschelkopf.

AUGEN

- Diplopie.
- Wimpern fallen aus (Rhus-t., Staph.).
- **Verhärtung auf dem oberen Lid.**
- Entzündung des Auges: Chronisch (Ars., Calc., Hep., Phos., Sil.), arthritisch (Ant-t., Form., Phyt.), Konjunktivitis (All-c., Apis, Euphr., Rhus-t., Sulph.), Blepharitis (Arg-met., Carbn-s., Petr., Teil.).
- **Es sieht aus, als ob das Kind auf alles starrt.**
- **Schmerz, als ob das Auge herausgezogen würde, wenn es geschlossen ist.**
- Gefühl des Hervortretens des Auges (Bry., Eupi., Par., Scut.).
- Sehen: Gegenstände erscheinen klein (Glon., Hyos., Merc-c., Plat., Stram.); braune Farben vor den Augen (Agar., Bell., Lac-c.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verklebt am Morgen (Arg-n., Calc., Clem., Rhus-t.).
 - Astigmatismus (Lil-t., Tub.).
 - Nach außen gezogen (Aloe, Crot-c., Lach.).
 - Verträumter Blick in den Augen.
 - Panophthalmie bei Neugeborenen (Hep., Iod., Phyt., Rhus-t.).
 - Lähmung des oberen Lides (Caust., Gels., Nit-ac., Rhus-t., Sep., Spig.).
 - Photophobie.
 - Schorfige Ausschläge auf den Augenlidern (Ars., Graph., Merc., Sep., Thuj.).
 - Striktur des Tränenkanals (Abrot., Nat-m., Puls., Rhus-t., Sil.).
 - Gerstenkorn (Carbn-s., Con, Puls, Staph).
 - Schwellung der Augenlider; Oberlid (Apis., Kali-c., Puls.); unter den Lidern (Apis, Ars., Hep., Kali-c., Phos.).
 - Ulzeration der Hornhaut (Apis, Brom., Calc., Euphr.).

OHREN

- Chronische Otitis media (Bar-m., Hydr., Iod., Merc-d.), besonders des linken Ohres (Spig., Sulph.).
- Angeborene Taubheit.
- Teilweise oder vorübergehende Taubheit wegen chronischer Otitis media (Asar., Calc., Kali-m., Kali-s.).
- Eingeschränktes Hören wegen vergrößerter Tonsillen (Agra., Kali-bi., Staph.).
- **Schmerzen, knorpelige Anteile des Ohres schmerzhaft beim Draufliegen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ausschläge hinter dem Ohr: Risse (Graph., Hydr., Syc-co.), Ekzem (Graph., Lyc., Mez., Oind., Psor., Tub.).
 - Ohring-Loch wund und deschwürig (Ars., Lach.).

NASE

- Chronischer retronasaler Katarrh bei Kindern.
- Schnupfen besser durch Baden im Meer; Absonderungen weiß, gelblich, gelblich-grün, blutig, übelriechend, stinkend, dick.
- Verstopfung besonders an der Nasenwurzel (Ars., Elaps, Kali-i., Mur-ac., Par., Sin-n., Stict.), Choanen (Calc-s., Petr., Rhod., Stann.).

- Reibt sich ständig die Nase, besonders die Nasenspitze (Cina, Napht., Sil.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kälte der Nasenspitze (Apis, Calc-p., Camph., Cedr., Tab.).
 - Schmutzige, schwarze Nasenlöcher (Ant-t., Chlor., Colch., Hell., Zinc.).
 - Polypen.
 - Schniefen bei Kindern (Lyc., Nux-v., Samb.).
 - Geschwollen.

MUND

- Stark vermehrte Mundatmung.
- **Hervorstrecken der Zunge bessert Asthma.**
- Rezidivierende Aphthen auf der Zunge, klein und wund (Borx., Merc-cy., Mur-ac., Sul-ac., Sulph.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zungenbiss während Schlaf (Phos-ac.).
 - Blutendes Zahnfleisch (Bov., Carbo-veg., Merc., Phos., Sep.).
 - Zähne: Karies, hohle Zähne (Ant-c., Fl-ac., Kreos., Merc., Mez., Staph.), Löcher zwischen den beiden mittigen oberen Schneidezähnen, bröckelnd (Calc-f., Calc-p., Plb., Staph., Thuj.), gezähnelte Schneiden (Bac., Lach., Plb., Syph., Tub.), weich (Alum., Calc-p., Caust., Nit-ac., Nux-m.).
 - Schaum vor dem Mund während Konvulsionen (Art-v., Bufo., Ind., Oena., Op.).
 - Mundgeruch (Ars., Carbo-veg., Kreos., Merc.).
 - Steckt die Finger in den Mund (Calc., Cham., Ipec., Sacch.).
 - Rezidivierende Abszesse des Zahnfleisches (Bar-c., Calc., Caust., Hep., Lyc., Sil., Sulph.).
 - Fadenziehender Schleim kommt während des Schlafes aus dem Mund.
 - **Zunge braun und dick;** dick belegt (Auran., Bapt., Colch., Gels., Podo.); schlaff (Camph., Hydr., Merc., Ph-ac., Sep.); mit Zahneindrücken (Ars., Chel., Merc., Rhus-t., Sep.); Landkartenzunge (Bac., Graph., Lach., Nat-m., Tarax.).
 - Zittern der Zunge (Agarin., Camph., Lach., Merc., Op.).
 - Ulzerative Stomatitis (Astac., Kali-i., Nux-v., Sulph.).
 - Klebriger Speichel (Chel., Kali-bi., Lach., Lyss., Merc., Merc-c.).
 - Gelbe Verfärbung der Zähne (Iod., Lyc., Sil., Thuj.) bei Kindern, die während der Neugeborenen- und Säuglingszeit sehr viele Antibiotika bekommen haben; auch **gelbe Verfärbung der Zähne nach dem Essen.**

GESICHT

- Eckig geformtes, breites Gesicht, gerade Nase, volle (Bar-c., Bufo, Op., Syph.) und sinnliche (Bufo, Plat.) Lippen, lange Wimpern (Phos., Tub.).
- Wimpern fallen aus (Ars., Calc-s., Rhus-t., Sei., Staph., Sulph.) und Haare der Augenbrauen (Agar., Anan., Bell., Nit-ac., Sei.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Akne vor den Menses (Graph., Mag-m., Psor., Sep.) bei jungen Mädchen.

- Gesicht bedeckt mit Akne und Sommersprossen (Lyc., Phos., Sulph.).
- Wunde Stelle von Fieber auf der Unterlippe (Ars., Ign., Nat-m., Rhus-t., Sulph.).
- Fettig (Nat-m., Rhus-t., Thuj., Tub.).
- Blasse Lippen (Ars., Ferr., Kali-ar.).
- Schweiß während Schlaf (Prun., Sep., Tab.); auf der Oberlippe (Acon., Coff., Kali-c., Nux-v., Rheum.).
- Zupfen an den Lippen (Arum-t., Bry., Lach., Nit-ac.).
- **Rote Spider naevi** auf dem Gesicht.
- **Dicke Lippen wegen Mundatmung.**
- Wächsern (Apis, Ars., Phos., Sep., Sil.), blass.

HALS

- **Erstickungsanfälle durch Spasmus der Epiglottis.**
- Entzündung.
- Schleim hängt die Choanen herab.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Vergrößerte Tonsillen.
 - Ständig gefüllt mit dickem, grauem Schleim aus den Choanen (Hydr.).
 - Dicke, gelbe retronasale Absonderungen.
 - Verlängertes Zäpfchen (Bar-m., Crot-t., Hyos., Kali-i.).

MAGEN

- Abneigung: kalte Getränke, kalte Speisen, **Auberginen**, Okraschoten (Calc., Caust., Cob., Nat-m., Puls., Zinc.), Salz, **schleimige Speisen** (Calc., Calc-pic., Nat-m.), Süßigkeiten.
- Ständiger Durst auf eiskaltes Wasser (Sil., Verat.); **der Durst ist so heftig, dass das Kind träumt, es trinke Wasser**; heftigster Durst besonders während Fieber; unstillbarer Durst.
- Verlangen: Getränke mit Kohlensäure (Nat-c., Ph-ac., Phos., Sulph.), Käse, Schokolade, Kaffee (Ang., Bry., Sei., Sep.), Entenfleisch (Phos.), Fett (Calc-p., Nit-ac., Nux-v., Sil.), Fett und Salziges, Fett und Süßes, Feta-Käse (Calc-n., Ign., Puls., Sulph.), Fisch; Pommes frites (Calc., Carc., Puls., Tub.), unreifes Obst (Calc., Calc-s., Lepi., Lept.), Eis (Calc., Elaps, Nat-s., Verat.), Eiscreme (Bung-fa., Calc., Phos., Sil., Sulph.), Saftiges (Ant-t., Ph-ac., Sabin., Verat.), Zitronen (Bell., Merc., Sabad., Thea., Verat.), Orangen (Cub., Elaps, Lyc., Oind., Sol-t-ae., Ther.), Papadam (Ars., Chin., Mag-p, Merc., Nux-v.), Pizza (Calc-p., Gaert., Nat-m., Phos., Puls., Tub.), Kartoffeln (Calc., Calc-p., Nat-c., Nat-m., Ol-an., Oind., Puls., Tub.), rohe Zwiebeln (All-c., Cub., Sabad., Staph., Thuj.), Salsa (Nux-v., Tub.), Salziges und Süßes, salzige Speisen (Arg-n., Carbo-veg., Lac-c., Nat-m., Phos., Verat.), Saures (Acon., Cor-r., Hep., Verat.), Süßigkeiten, warme Getränke (Ars., Bry., Lac-c.).
- Übelkeit nach Trinken von Wasser (Acon., Cocc., Op., Phos.), nach dem Essen (Am-c., Cocc., Nux-v., Puls., Sep.); heftiges Würgen (Ant-t., Ars., Verat.).
- **Schmerzen schlimmer durch Beugen der Beine.**
- Heißhunger; Hunger unmittelbar nach dem Essen (Cina, Lyc., Psor.); verstärkter **Hunger um Mitternacht.**

- Schlimmer: Fleisch (Bry., Colch., Ptel., Rumx.); Orangen (Arg-n., Olnd., Syc-co.); Orangensaft (Androc., Scor.); Süßigkeiten (Arg-n., Graph., Ign., Sei.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Erbrechen von schwarzem (Ars., Cadm-s., Nux-v., Phos., Verat.), durchsichtigem Schleim (Arg-n., Ars., Iris, Jatr., Kali-bi., Verat-v.), fadenziehend (Cor-r., Kreos.).

ABDOMEN

- Koliken der Neugeborenen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aszites.
 - Angeborene kindliche Zirrhose.
 - Absonderung aus dem Nabel (Abrot., Calc., Calc-p., Kali-c., Lyc.).
 - Großes Abdomen bei Kindern (Bar-c., Calc., Psor., Sanic., Sars., Sil.).
 - Leber vergrößert (Chin., Lyc., Mag-m., Nat-s., Nux-v.).

REKTUM

- Cholera infantum (Aeth., Guaj.).
- Verstopfung: Bei Neugeborenen (Alum., Nux-v., Op., Sulph., Zinc.); **das Kind kann nur Stuhl entleeren, wenn es sich weit nach hinten beugt**; schwierige Stühle, zurückschlüpfender Stuhl (Lac-d., Op., Sanic., Sil., Thuj.); sogar bei weichem Stuhl muss gepresst werden (Alum., Nux-m., Op., Plb., Sanic., Sep., Sil.). Stuhl zäh; wie Kugeln (Lach.), wie Lehm (Calc., Lac-c., Podo., Sil.); träge, kann nicht pressen, weil das Gefühl von Analprolaps besteht (Alum.).
- Diarrhoe am frühen Morgen (Aloe, Nat-s., Nuph., Podo., Psor., Rumx., Sulph.), bei Erwartungsspannung (Aeth., Arg-n., Gels., Ph-ac.), biliös (Asc-t., Nat-s., Podo.), während Zahnung (Calc., Cham., Dulc., Ferr., Rheum., Sil.), schlimmer durch Milch (Calc., Mag-m., Nat-ar., Nat-c., Sep.). Stuhl blutig, zerhackt (Calc., Cham., Kreos., Rhus-t.), lehmfarben (Calc., Hep., Nat-s.), geronnen (Calc., Nit-ac., Rheum., Sanic., Valer.), Zugfahren verschlimmert.
- Intensives Jucken des Anus.
- **Schmerzen beim Stuhlgang sind ein Albtraum; sie sind so stark, dass Tränen in die Augen schießen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Analekzem, das heftig juckt (Nit-ac.).
 - **Anus rot wie Feuer.**
 - **Hautausschläge um den Anus bei Neugeborenen, besonders nach dem Waschen.**
 - Wundheit des Perineums (Calc., Carbo-veg., Graph., Lyc., Merc., Sulph.).
 - Übelriechender Flatus.
 - Feuchtigkeit sickert aus dem Anus, übler Geruch nach Fischlake (Caust., Hep.).
 - Rektumprolaps.
 - **Ausschlag auf Anus und Perineum bei Neugeborenen.**
 - Würmer.

HARNWEGE

- Kann den Urin nicht lange halten, Urin färbt die Windeln schmutzig-braun.
- Rezidivierende Zystitis bei Kindern, die exzessiv masturbieren.
- Chronische Zystitis (Cann-s., Sep., Tub.) bei jungen Mädchen.
- Chronisches nephrotisches Syndrom, das sich der Gabe des konstitutionellen Mittels widersetzt.
- Nephritis, Glomerulonephritis, Nierensteine.
- Tendenz zur Bildung von Nierensteinen oder sonstige Nierenerkrankungen bei kleinen Kindern; die Nierenkolik ist durch heftigen Schmerz in der Nierengegend charakterisiert, besser durch reichlichen Urinabgang (Lyc.); ein starkes Begleitsymptom ist Verlangen nach Eis.
- Hartnäckiges Bettnässen; enorme Mengen von ammoniakalischem und stark gefärbtem Urin jede Nacht im Bett, schlimmer beim Spielen, bei Anstrengung, bei Extremen von Hitze oder Kälte (Caust., Dulc., Rhus-t.); angezeigt, wenn sorgfältig ausgewählte Mittel es nicht schaffen, das Bettnässen zu beheben oder wenn es eine ausgeprägte Familiengeschichte von Gonorrhoe gibt.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Feuerrotes Perineum durch scharfen Urin.**
 - Urin: Albumin, Zylinder, Zucker.
 - Urin fließt sehr langsam (Alum., Clem., Op.).

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Kinder spielen mit ihren Genitalien (Merc., Stram., Zinc.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Verhärtung der Hoden (Clem., Con., Rhod., Sil., Spong.).

WEIBLICHE GENITALIEN

- **Chronische Erkrankungen des Beckenraums bei jungen Kindern kurz vor der Pubertät, besonders wenn es eine Familiengeschichte von unterdrückter Gonorrhoe gibt.**
- Jucken der Vulva.
- Leukorrhoe bei jungen Mädchen (Calc., Cann-s., Merc., Sep.); grünlich, gelb, weißlich oder wie schmutziges Wasser; übelriechend; dick (Ars., Calc., Hydr., Kali-bi.); dünn (Graph., Nit-ac., Puls.); reichlich; färbt die Wäsche gelb (Agn., Carb-ac., Carb-an., Kreos., Nux-v., Prun.); ätzend (Bacis-10, Morg- p., Morg-g., Syc-co.), führt zu Beißen und Jucken der Vulva (Anac., Kreos., Sep.) und der Vagina.
- Untersuchungsergebnis:
 - Warzen (Calc., Lyc., Merc., Nat-s., Nit-ac., Sabin., Sars., Sep., Thuji.).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Asthmatische Atmung wegen Krämpfen und Schwäche der Epiglottis.
- Erstickungsgefühl beim Neugeborenen wegen Schwäche und Krämpfen des Kehldeckels und des Kehlkopfs.

ATEMWEGE

- **Asthma besser beim Liegen auf dem Abdomen und gleichzeitigem Vorstrecken der Zunge, besser durch Liegen auf dem Abdomen, Liegen in Knie-Ellbogen-Lage** (Carc); schlimmer durch feuchtes, kaltes Wetter (Ars., Dulc., Nat-s., Thuj., Verat.); **besser am Meer** (Brom., Carc., Syc-co.).
- Das Kind kann gut einatmen, aber hat keine Kraft zum Ausatmen (Samb.).
- Asthma bei jungen Kindern, das in Lungentuberkulose übergeht, wenn es nicht mit dem richtigen konstitutionellen Mittel behandelt wird.
- Asthma bei Kindern mit sykotischer Krankengeschichte.
- Asthma schlimmer **2 Uhr nachts** (Ambro., Ars., Kali-bi., Rumx.), **2-4 Uhr nachts** (Kali-c.); **möchte angefächelt werden** (Carbo-veg., Lach.).
- Allergisches Asthma im Wechsel mit Rheumatismus (Dulc) oder Hautausschlägen (Crot-t., Hep., Kalm., Psor., Sulph.).
- Atmung keuchend, rasselnd und pfeifend.

HUSTEN

- Ständiger Husten nachts (Anac., Calc., Con., Sep.); beim Zubettgehen (Agar., Carbo-veg., Kali-c., Lach., Sulph.), weckt aus dem Schlaf (Caust., Phos., Sulph.); bellend; hohl, heiser; hohler Husten, Aufsitzen im Bett bessert (Nat-c., Phos.); trocken (Hyos., Spong.), unaufhörlich (Ign.); schlimmer nachts, **durch Essen von Süßem** (Spong., Zinc.) und Süßigkeiten, durch Hinlegen, im warmen Zimmer (Bry., Coc-c., Kali-s., Puls.); **besser durch Liegen auf dem Magen** (Alum., Bar-c., Caust., Phos., Podo., Rhus-t.); sehr schmerzhafter Husten, als ob der Kehlkopf zerrissen würde (All-c., Bell., Borx., Calc., Cist., Phos., Staph.); wenn das Kind hustet, scheint sehr viel Schleim in der Brust zu sein.
- Auswurf: Kleine grünliche Kugeln aus Schleim, schwer hochzubringen, gelatineartig (Alumn., Arg-met, Cact., Ferr., Samb.).

BRUST

- Die Brüste (Cham., Lac-c., Sil.) und die Brustwarzen (Arn., Caust., Lach.) des Neugeborenen sind wund und berührungsempfindlich.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Primärkomplex.
 - Bronchiektasen bei Kindern aufgrund von chronischem Asthma oder rezidivierender Bronchopneumonie.
 - Übelriechender Achselschweiß (Hep., Nit-ac., Petr., Sil., Sulph.).
 - Lungentuberkulose.

HERZ UND KREISLAUF

- Herzklappenerkrankung als Folge von rheumatischem Fieber.

RÜCKEN

- Schweiß an der Zervikalregion (Calc., Chin., Ph-ac., Sulph.).
- Empfindliche Wirbelsäule.

EXTREMITÄTEN

- Leichtes Umknicken in den Fußgelenken beim Gehen (Carb-an., Led.).
- Brennen der Fingerspitzen (Sars., Sil., Sulph.).
- Brennen von Händen und Füßen; möchte sie abgedeckt und befächelt haben (Lach., Sulph.).
- Chronische Arthritis, chronischer Rheumatismus.
- Schmerzhaftes Steifheit aller Gelenke im Körper.
- Beine sind ständig in Bewegung beim Sitzen (Lyc.).
- Das Kind möchte gern die Beine ausstrecken.
- Zittern der Beine beim Gehen (Led., Puls.).
- Das Kind möchte ständig getragen werden, da es die Anstrengung des Gehens nicht einmal ein paar hundert Meter lang ertragen kann, denn die gesamte Energie der Arme und Beine wird durch die geringste Anstrengung verbraucht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zusammenkrampfen der Finger zur Faust (Apis, Ars., Cupr., Oena.).
 - Kälte der Füße (Calc., Carb-c., Phos., Sil.) und Hände, besonders nachts (Aur., Bry., Phos., Sep., Thuj.).
 - Risse in den Fingerspitzen (Aur-m., Graph., Petr., Sars.), in den Hacken (Arund., Lyc.).
 - Deformierte Hände, Gelenke, besonders Fingergelenke.
 - Große **Empfindlichkeit der Hacken** (Jatr-c.) und Fußballen (Kali-c., Lyc., Merc-i-r., Staph.), besonders bei Kindern, die viel Sport treiben.
 - Behaarte Arme.
 - Hitze in Händen, Handinnenflächen und Fußsohlen.
 - Verhärtung der Finger
 - Große aufgedunsene Knöchel.
 - Schmerzhaftes Hühneraugen (Agar., Ant-c., Calc-s., Iod., Nit-ac., Sulph.).
 - **Fußschweiß schlimmer im Winter** (Arg-n.).
 - Ruhelose, zapplige Füße und Beine nachts und tagsüber (Zinc.).
 - Geschwollene Knöchel.

RHEUMATISMUS

- Kälte der Beine, Füße, Hände und Unterarme.
- Die unteren Extremitäten schmerzen die ganze Nacht, verhindern Schlaf (Kali-bi., Mez., Rhus-t., Syph.).
- Lendenwirbelsäule schmerzhaft und berührungsempfindlich.
- Schmerzen in den Beinen von der Hüfte bis zum Knie (Kali-bi., Sep.) nur beim Gehen.
- Schmerzen im Sacrum, Steißbein und den hinteren Teilen der Hüften; die Schmerzen laufen um die Glieder herum und an ihnen herunter (Agar., Coloc., Pic-ac., Sep.).
- Rheumatismus der Schulter (Colch., Ferr., Rhod., Rhus-t., Sulph.) und des Armes (Fern, Kalm., Rhus-t., Sang.); der Schmerz erstreckt sich vom Arm zu den Fingerspitzen.

SCHLAF

- **Beißt sich im Schlaf auf die Zungenspitze** (Cic., Mygale., Ph-ac.).
- Kann nur auf dem Rücken schlafen, die Hände über dem Kopf (Lac-c., Nux-v., Plat., Puls., Viol-o.).
- **Träume:** Schrecklich; Geister; Alpträume; Schlangen; **von Schmerz** (Asar., Bry., Cain, Cocc., Lyc.).
- Knie-Brust-Schlaf; knieende Position, das Gesicht ins Kissen gedrückt (Aeth., Petr., Sep.), zusammengerollt, auf dem Abdomen.
- Schlaflosigkeit durch Jucken, Schmerzen.
- Völlig ausgeschlafen aufwachend nach kurzem Schlaf, als wäre es lange gewesen (Fl-ac., Nux-v.); aufwachend von Schwindel (Dulc., Kali-c., Nux-v., Phos., Sulph.).

FIEBER

- Durstlos bei Fieber (Apis., Gels., Puls., Sabad.).
- Möchte bei Fieber zugefächelt bekommen (Carbo-veg., Lach.), obgleich die Körperoberfläche sich kalt anfühlt.
- Möchte sich abdecken (Apis, Chin., Nat-m., Puls., Op.).

HAUT

- Ekzem bei Kindern nach unterdrücktem Bronchialasthma (Sulph.).
- **Urtikaria durch den Druck der Kleidung.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Übermäßiger Haarwuchs, manchmal an ungewöhnlichen Stellen (Thuj., Thyr.).
 - Molluscum contagiosum (Dellwarzen).
 - Naevi (Acet-ac., Fl-ac., Phos.).
 - Gestielte Hautauswüchse und Warzen (Caust., Dulc., Nit-ac., Thuj.).
 - Warzen: Filiformes, gestielt, weich (Ant-c., Calc., Nit-ac., Sil., Thuj.) spitz.

ALLGEMEINES

- Besser am Meer (Borx., Carc., Iris, Nat-m., Sul-ac., Tub.) und schlimmer in den Bergen.
- Kalter, klebriger Schweiß (Camph., Ph-ac., Verat.).
- **Die Beschwerden sind allgemein schlimmer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang** (umgekehrt wie bei Syph.).
- Med.-Kinder sind extrem empfindlich gegen Wetterwechsel, wie ein „menschliches Barometer“ (Phos., Merc.).

MERCURIUS CYANATUS

(Quecksilbercyanid - Merc-cy.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Dieses Mittel ist nicht klassisch geprüft.
- ▶ Ist sehr eng mit Kalium chloricum verwandt.
- ▶ Eingesunkene Augen.
- ▶ Starkes Nasenbluten, dunkelschwarz, mehrmals am Tag.
- ▶ Speichelfluss, Schwellung von Zunge und Zahnfleisch, Zunge schwarz verfärbt, grau oder milchig weiß. Schleimhäute im Mund mit Aphten bedeckt, die übermäßig schmerzhaft sind und sich zu mannigfachen Geschwüren entwickeln.
- ▶ Akute Streptokokkeninfektion des Halses.
- ▶ Dunkel verfärbter Rachen, schmutzig, grau und rot; Schlund und Mandeln gestaut, follikuläre Entzündung des Rachens und der Mandeln, gräulicher Schleim aus der Kehle, Halsschmerzen erstrecken sich zum Ohr, ein trockener schmerzhafter Punkt im Hals. Wenn die Krankheit fortschreitet, schlimme Eiterung und Exsudation der Mandeln. Vergrößerte und empfindliche Halslymphknoten.
- ▶ Schneller Ausbruch und rasante Entwicklung der Halsschmerzen; die begleitende Schwäche und der Schweiß machen das Kind völlig kraftlos.
- ▶ Bellender Husten, schlimmer nachts.
- ▶ Abneigung gegen heiße und warme Getränke.
- ▶ Schlimme Folgen der DTP-Impfung.

MERCURIUS DULCIS

(Quecksilberchlorid - Merc-d.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Hager, dünn und abgemagert.
- ▶ Mundhöhlenentzündung mit Aphten, schlechtem Atem und Speichelfluss.
- ▶ Schwammiges Zahnfleisch, die Zunge ist weiß verfärbt oder schmutzig gelb.
- ▶ Reichlicher, übler Speichelfluss nachts und beim Schlafen.
- ▶ Katarrh der Eustachischen Röhre, chronische Mittelohrentzündung, besonders auf der linken Seite; eingezogenes Trommelfell, schwerhörig auf Grund des Katarrhs der Eustachischen Röhre, schon einfacher Schnupfen führt zu Schwerhörigkeit.
- ▶ Vergrößerte, geschwollene Mandeln, besonders auf der rechten Seite, beim Schlucken erstreckt sich der Schmerz zu den Ohren.
- ▶ Allergie auf Milch, Milch in jeder Form verschlimmert.
- ▶ Durchfall bei der Zahnung oder durch E. Coli-Infektionen.
- ▶ Entzündung der Leber durch virusbedingte Infektionen, die auch zu Gelbsucht führen können.
- ▶ Bei Gelbsucht dicke, verbreiterte, gelb belegte Zunge mit Zahneindrücken, tympanitisches Abdomen, empfindliche Leberregion und vergrößerte Leber. Speichelfluss und stinkender Mundgeruch. Der blasse Stuhl kann auch Schleim enthalten. Tenesmus beim Stuhlgang.
- ▶ Durchfall, Stuhl spärlich, blutig, dunkelgrün und wässrig mit schleimigem Kneifen; Wundheit und Brennen am Anus, anhaltender Stuhldrang ohne Tenesmus.
- ▶ Amöbenruhr; kleine Mengen Stuhl aus Schleim und Galle, mit aufgelagertem Blut.
- ▶ Im Stuhl jede Menge Spulwürmer.

HERKUNFT

- Auch als Kalomel bekannt, ein selten vorkommendes Mineral aus der Klasse der Halogenide.

MERCURIUS SOLUBILIS

(Schwarzes Quecksilberoxid - Merc.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Aggressionen** als unmittelbare Antwort auf den **geringsten Widerspruch**; schießt sofort zurück in Form von **Beschimpfungen, Zerstörungswut** und **Streit** (Androc., Crot-c., Lac-leo.) und dies **ohne jegliches Schuldgefühl** (Ars., Hep., Lach.).
- ▶ **Verhaltensstörungen** mit aggressivem Verhalten und tätlichem Angriff [*Rubriken: Gemüt - Destruktivität, Zerstörungswut und Gemüt - Ziehen - Haaren; an den - Verlangen zu ziehen - jemanden an den Haaren*], Fehlverhalten bis hin zu gefährlicher Gewaltanwendung [*Rubriken: Gemüt - Herausfordern und Widerspenstig*]. Gängige Beispiele aus der Praxis: - Schikaniert andere.
 - Sexuelle Gewaltanwendung bis zur Vergewaltigung eines anderen Kindes (gleich- oder gegengeschlechtlich).
 - Fängt mit Prügeleien an.
 - Schüchtert andere Kinder ein.
 - Tierquälerei.
 - Greift im Streit zur Waffe und benützt z. B. einen Schlagstock, Ziegelstein, Hockeyschläger, Steine etc.
- ▶ **Hyperaktivitätsstörung:**
 - **Unruhe** der Finger, Hände und Zehen (Caust., Tarent., Zinc.); will jemanden auf der Straße an den Haaren oder an der Nase ziehen.
 - Rennt dauernd umher oder turnt auf allem herum (Stram.).
 - Ständig aktiv (Eile in Bewegungen) (Stram., Tarent.).
 - Kann sich in der Freizeit nur schwer beschäftigen.
 - Wechselt oft den Platz im Klassenraum, kann nicht lange stillsitzen.
 - Redet zu viel (Lach.).
- ▶ **Störungen der Impulskontrolle:** Unfähigkeit, einem Impuls, Drang oder einer Versuchung etwas entgegenzusetzen, die ihn dazu anstacheln will, andere oder sich selbst zu verletzen (das zeigt sich als Aggressivität und dem krankhaften Drang, jemanden zu erstechen oder andere Gewalttaten zu begehen).
- ▶ **Unabhängige Kinder** (Bell., Nux-v., Sulph.), die die Freiheit lieben, koste es, was es wolle (Falco-pe., Haliae-lc., Lyc., Med., Tub.).
- ▶ **Oppositionelles Trotzverhalten**, charakterisiert durch **Streitsucht** und **Zank** mit den Eltern, Lehrern und anderen älteren Personen; provoziert oder **weigert sich**, elterlichen Forderungen oder Schulregeln nachzukommen, ärgert absichtlich Familienmitglieder, manchmal **rachsüchtig** und **boshaft** (Anac., Caust., Cham., Cina, Lyc., Tarent.); akzeptiert keine Autorität oder Bevormundung durch die Eltern, Brüder, Schwestern, Großeltern, die Schulleitung oder die Lehrer;

typischerweise entziehen sich diese Kinder jedem Zwang, indem sie sich trotzig gegen Autoritätspersonen auflehnen.

- ▶ **Verantwortungsbewusste** Kinder, die ihre Pflichten sehr gewissenhaft erledigen (Calc., Kali-c., Nit-ac.); sie arbeiten sehr hart und können wie junge Workaholics wirken.
- ▶ **Ruhelose Kinder** (Acon., Bac., Jal., Rhus-t.), die ständig die Position wechseln, sich im Bett herumwerfen, **sich umherbewegen** (Bell., Calc-p., Cupr.); besonders **bei Fieber** (Ars., Puls., Rhus-t.), bei **Schmerzen** (Acon., Cham., Plb.), bei **Schweiß** (Bry., Ign.) und bei **Schläfrigkeit** (Hep., Stram.).

KÖRPER

- ▶ **Temperaturschwankungen verschlimmern**; empfindlich gegen Kälte und Hitze, leicht verkühlt oder überhitzt.
- ▶ Kindliche **Drüsenerkrankungen oder Skrofulose** (Calc., Sil.); Lymphadenitis, Mumps, Hals- oder Mandelentzündungen.
- ▶ **Immungeschwächte Kinder** (Des-ac., Phos., Saroth., Syph., Tub-r.) mit vielen kindlichen Infekten wie:
 - Amöbencolitis.
 - Bakterielle Dysenterie.
 - Bindehautentzündung.
 - Enzephalitis.
 - Impetigo.
 - Pfeiffersches Drüsenfieber.
 - Mastoiditis.
 - Meningitis.
 - Mumps.
 - Mittelohrentzündung.
 - Rachenentzündung.
 - Sepsis.
 - Sinusitis.
 - Mandelentzündung.
 - Keuchhusten.
 - Würmer.
- ▶ Viele körperliche Symptome sind **schlimmer nachts** (Syph.) und durch **Bettwärme, feuchtes Wetter**, Durchnässung (Regen oder auch nur nasse Windeln) und durch **Schweiß**.
- ▶ **Ausgeprägte Eiterungstendenz** (Anthraci., Calc-s., Galen., Phos., Sil., Staphycoc., Streptoc.).
- ▶ Erkrankungen der Knochen und knöchernen Strukturen in Form von Entzündungen, Infektionen, Nekrosen, Exostosen und Krebs (Calc., Fl-ac., Ph-ac., Staph., Syph.).
- ▶ Kindliche Krebserkrankungen wie Leukämie (Calc-p., Nat-ar., Nat-s.), Lymphome, Sarkome (Crot-h., Kali-chl.) etc.
- ▶ Die Drüsen sind verhärtet, infiziert, entzündet, nekrotisiert und geschwollen (Ars., Bufo, Sil.).

- ▶ Schwäche, Erschöpfung und Kraftlosigkeit durch die geringste Anstrengung, besonders nach Stuhlgang.
- ▶ Die Absonderungen sind ätzend, brennend, faulig, grünlich oder grünlich-gelb, schleimig, dick oder dünn.
- ▶ Langsame Wundheilung nach jeder Verletzung.
- ▶ Gelbfärbung der Augen, Zähne und der Absonderungen aus der Nase; Gallenerkrankung, Gelbsucht.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Unternehmungslustige** Kinder, mit Verlangen nach Aktivität, sehr wenig Angst um sich selbst und keinem Sinn für Gefahr (Agar., Op.).
- **Prahlerie** (Lyc., Med., Sulph.).
- **Dyslexie**, charakterisiert durch geringe Dauer der Aufmerksamkeit, daher fällt es schwer, sich auf das Lernen und Schreiben zu konzentrieren; macht Fehler beim Rechnen, Lesen, Sprechen, vertauscht Wörter und spricht sie falsch; unbegabt für Mathematik (Psor.).
- **Extravagant** (Bell., Op., Stram., Verat.).
- **Füllt seine Taschen** mit allem Möglichen (Ars., Stram., Sulph.).
- Spaß liebende und **lebhaft** (Coff., Lach.) Kinder, die gern singen und tanzen (Bell., Hyos., Ph-ac.).
- **Frühreife** (Calc., Calc-p., Lach., Verat.).
- Starke **Führungsqualitäten** (Aur., Kali-c., Lac-leo., Lyc.).
- **Drogenmissbrauch** bei Kindern (Cham., Hyos., Lach., Op., Phos.).
- Schaffen es nicht, ihre schulischen Verpflichtungen zu erfüllen, mit wiederholtem Fehlen oder schwachen Prüfungsleistungen, die am Schluss zum Verweis von der Schule führen.
- **Wutanfälle**; spuckt Leuten ins Gesicht (Bell., Cupr., Verat.) und auf den Boden; aufgebracht, dickköpfig, stur bis zur Raserei.
- Vorliebe für blau, himmelblau und marineblau, z. B. Kleidung, Fahrrad, Schultasche, Schreibutensilien etc.
- Das Kind ist tagsüber schläfrig, aber nachts schlaflos.
- Computerfan (Bufo, Zinc.).
- Übermäßige Angst vor trivialen Ursachen.
- Furcht vor Dunkelheit, Katzen (Bac., China, Tub.), Hunden, Feuer (Cupr., Stram.), Freunden, um die Gesundheit der Eltern, an hochgelegenen Orten, Injektionen, Räubern, Ersticken und Gewittern.
- Schmutzig auf körperlicher und geistiger Ebene.
- Inneres Eilegefüh, mit Langsamkeit der Handlungen.
- Liebt Spiele oder Aktivitäten, die abenteuerlich (Falco-pe., Haliae-lc., Med., Tub.) oder riskant sind und wo übermäßige Energie in Geschwindigkeit umgesetzt wird, daher bevorzugt er Spiele wie Skateboard oder Inliner fahren (Buteo-j.), von Mauern springen; liebt es auch, mit Spielzeugautos zu spielen oder mit den Eltern in schnellen Autos mitzufahren (Med., Tub.).

- Verdrießlich und schweigsam, dauernd unzufrieden, Jammern und Klagen.
- Stottern.
- Deutliche Vorgeschichte von Schreck bei der Mutter in den frühen Schwangerschaftsmonaten, den sie bis zum Beginn der Wehen wieder vergessen hatte (Gels., Op.).
- Plötzliche Gewalt und Zorn bei Kindern, die ungerecht behandelt werden (Staph.).

KOPF

- Die Kopfschmerzen sind schlimmer nachts, bei Schnupfen, bei Zahnung, durch **Zugluft**, beim Erwachen, bei Verstopfung und beim Lesen (Nat-m.); besser durch äußeren Druck und beim Sitzen mit den Händen auf dem Kopf.
- **Empfindlich** gegen den geringsten Luftzug (Bell., Chin., Sil.).
- Kopfschmerz nach Verletzung (Cic., Hyper., Nat-s., Staph.).
- Meningitis mit Pochen in der Stirn (Bell., Glon.).
- Schreien vor Schmerz bei Hydrozephalus.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Der Kopf ist **berührungsempfindlich**.
 - **Feuchte Ausschläge** auf der Kopfhaut, die das Haar wegfressen (Kali-bi., Nat-m., Rhus-t.).
 - **Ölige** Kopfhaut (Bry.).
 - Kephalthämatom (Calc-f., Sil.).
 - Hirnblutung (Both., Ipec., Op.).
 - Kalter Schweiß auf der Stirn (Verat.).
 - Exostose des Kopfes (Aur., Phos.).
 - Ausfall der Augenbrauen und Wimpern.
 - Hydrozephalus; liegt mit dem Kopf tief (Apis, Zinc.).
 - Offene Fontanellen (Calc-p.).
 - Rollen des Kopfes von einer Seite zur anderen mit Stöhnen.

AUGEN

- **Die Erkältung zieht** von der Nase **nach oben** und beeinträchtigt die Augen.
- Empfindlich gegen den **hellen Schein** des **Feuers** (Canth., Glon.).
- Alle Augenbeschwerden sind nachts schlimmer.
- Farbenblind (Carbn-s., Santin.).
- Schwere Photophobie.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Chemosis** (Apis, Euphr., Vesp.).
 - **Hypopyon** [Eiteransammlung in der Vorderkammer des Auges] (Hep., Sil.), das die Lunge angreift (Phos.).
 - Reichliche, scharfe und **schleimig eitrige** Absonderung aus den Augen.
 - Verklebte Lider.
 - Hornhautulzerationen.
 - Netzhautdegeneration (Phos., Syph.).
 - Netzhautablösung (Ben-d., Napht., Pilo.).
 - Episkleritis.
 - Augenlider halb offen (Bell., Cupr., Op.).
 - Tränendrüsenfistel.

- Körnige Lider.
- Iritis.
- Keratokonjunktivitis (Ran-b., Merc-n.).
- Orbitalphlegmone (Rhus-t.).
- Panophthalmie (Hep., Rhus-t.).
- Lähmung des Sehnervs (Gels., See.).
- Pupillen erweitert, träge, reagieren nicht auf Licht (Arn., Hyos., Op.).
- Gerstenkörner.

OHREN

- Ohrschmerzen in Verbindung mit **Halsweh**, nach kalten Speisen oder **kalttem Wasser** oder bei Zahnerkrankungen.
- Vermindertes Hörvermögen durch **vergrößerte Mandeln** (Kali-bi., Staph.).
- Die Ohren sind bei Merc-Kindern fast immer betroffen (Cham., Puls.).
- Die Ohren sind berührungsempfindlich.
- Die Ohrschmerzen sind nachts schlimmer durch Bettwärme.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Furunkel** und Eiterbeulen im äußeren Gehörgang (Pic-ac.).
 - Die Absonderungen sind dick, gelb, blutig und übelriechend (chronische Otorrhoe).
 - Otitis media.

NASE

- Schnupfen schlimmer beim Niesen, besonders bei **feuchtem Wetter** (Dulc., Hep., Puls.), im warmen Raum und draußen in der Sonne.
- **Nasenkatarrh erstreckt sich zu den Stirnhöhlen** (Kali-bi., Puls., Thuj.).
- Absonderungen sind dick, reichlich und greifen die Oberlippe an; ätzend, grünlich-gelb und übelriechend, mit Geruch nach altem Käse.
- Nasenbluten im Schlaf (Crot-c., Nit-ac.) und beim Naseschnäuzen (Phos.).
- Laufende Nase durch Luftzug, egal ob kalt oder warm.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Ölige** (Hydr., Puls.) und **glänzende** Nase (Iris, Phos.).
 - Rote, rohe und **schmutzige** Nase bei Kindern, mit wunden Nasenlöchern durch scharfe Absonderungen (Ars., Kali-bi., Nit-ac., Sulph.).
 - Dauerndes Zupfen an der Nase (Lyc., Teuer.).
 - Polypen.
 - Eingefallen (Aur., Psor.).

GESICHT

- Die Lippen schmecken immer salzig.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Aufgedunsenes Gesicht** (nach längerer Einnahme von Steroiden).
 - **Rissige Lippen** und Mundwinkel (Graph., Sil.).
 - Atopisches Ekzem.
 - Schwellung der Ohrspeicheldrüsen, der submaxillären und submentalen Lymphknoten.
 - Runzelige Stirn (Nux-v.).
 - Röntgen: Speicheldrüsen

MUND

- **Großer Durst trotz erhöhter Speichelbildung.**
- **Stomatitis durch Kaugummi-Kauen.**
- Zäher, seifiger, fadenziehender, **reichlicher, stinkender** Speichel (Chin., Kali-bi., Kali-i., Nit-ac., Sep., Sil.), ist Hauptbegleitsymptom bei Husten, Fieber, Kopfschmerz, Schlaf, Halsweh und Zahnschmerzen.
- Dauernde Neigung zu schlucken.
- Jucken des Gaumens ist ein wichtiges Begleitsymptom bei Mandelentzündung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Aphthen mit übermäßigem Speichelfluss** (Con., Hell.).
 - Zunge: **gelb** belegt, **schwabbelig, vergrößert, feucht** und dick, Zahneindrücke zeigend (Chel., Podo., Rhus-t.), mit Längsriss in der Mitte.
 - Aphthen auf der Zunge, wegen derer das Kind nicht gestillt werden kann (Borx.).
 - Zahnfleischentzündung +.
 - Zungenentzündung +.
 - Übelriechender Atem (Bapt., Carb-ac., Kali-p., Nit-ac., Sil.).

ZÄHNE

- Schwierige und verspätete Zahnung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Abszess der Zahnwurzeln.**
 - Alveolarabszess.
 - Zahnkronen bleiben intakt bei verfaulenden Wurzeln (Mez.).
 - Verlangen, die Zähne dauernd zusammenzubeißen (Bell., Hyos.).
 - Der Zahnschmelz ist zu schwach (Calc-f., Sil.).
 - Das Zahnfleisch ist schwammig, blutet leicht und neigt zu Geschwürbildung über den Zähnen.

HALS

- **Neigung, dauernd zu schlucken.**
- **Ausgeprägte Empfindlichkeit des Halses gegen Zugluft.**
- Trockenheit des Halses mit gesteigertem Durst.
- Halsweh befällt gewöhnlich die rechte Seite, wobei der Schmerz schlimmer nachts ist, beim Leerschlucken und beim Sprechen.
- Halsschmerz erstreckt sich zu den Ohren (Bell., Lac-c., Lach.) und Unterkieferdrüsen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Verlängertes Zäpfchen** (Bar-m, Hyos, Lach, Phos).
 - **Belegte** und heisere Stimme.
 - Halsdrüsen geschwollen und vergrößert.
 - Schwacher Hustenreflex.
 - Dunkler, roter, entzündeter Hals.
 - Mandelentzündung +.

MAGEN

- **Launischer Appetit**, das Kind weiß nicht, was es will, lehnt viel Dinge ab, wenn

- Das Essen von Süßem, **Brot**, Kaffee oder **Milch** verursacht Auftreibung, Aufstoßen und kolikartige Schmerzen.
- Will ständig gestillt werden (erschöpft die Mutter); **unersättlicher Appetit**; der Säugling ist auch nach einer guten Stillmahlzeit hungrig (Chin., Lyc., Psor.).
- **Kotbrechen** (Op., Plb.) bei Darmverschluss (Ars., Verat.).
- **Schluckauf** nach **jeder Mahlzeit**, auch beim Essen (Cycl.).
- **Extremer und unstillbarer Durst**, besonders gegen Mitternacht (Mag-m., Sulph.).
- Übelkeit beim Zähneputzen (Sep.), bei Husten, bei Koliken, nach dem Essen von Süßigkeiten (Graph.).
- Heißhunger mit schwacher Verdauung.
- Empfindlich um die Magengrube.
- Erbrechen durch erhöhten intrakraniellen Druck (Apom., Bell., Hell., Zinc.).
- Erbrechen durch Husten oder bei Durchfall.
- Verschlimmerung: Heiße Speisen, Milch, Pflaumen, Kartoffeln, Süßes.
- Abneigung: Butter, Kaffee, gekochte Speisen, Fett, Fleisch, Muttermilch, reichhaltige, salzige, feste Speisen, kräftiger Käse, Süßigkeiten, warme Speisen.
- Verlangen: **Brot und Butter** (Fern, Mag-c.), **kalte Getränke, Zitronen** (Verat.), Fleisch.
- Untersuchungsergebnis:
 - Epigastrium berührungsempfindlich.

ABDOMEN

- **Neugeborenenengelbsucht** (Bov., Chin., Nat-s.).
- **Heftiger Tenesmus und dauernder Drang auch nach dem Stuhlgang; „Nie-fertig“-Gefühl.**
- Aszites folgt auf Entzündung der Mesenterialdrüsen.
- Kolik bei Verstopfung, begleitet von Hunger; besser durch Absetzen blutiger Stühle mit Tenesmus (Nux-v.).
- Blähungen nach Milch (Calc., Nat-c.) und beim Urinieren (Lyc.).
- Colitis ulcerosa bei Kleinkindern; mit großer Qual vor und beim Stuhlgang, hauptsächlich durch quälenden Tenesmus und Kolik.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Abdomen fühlt sich bei Berührung kalt an (Colch., Verat.).
 - Blinddarmenzündung.
 - Aszites.
 - Kolitis.
 - Leistendrüsen vergrößert und empfindlich (Hep., Rhus-t., Sil.).
 - Intussuszeption [Darmverschlingung],
 - Leber: Atrophie, vergrößert, fettige Degeneration, berührungsempfindlich (Chin., Lyc., Mag-m.).
 - Peritonitis.
 - Milz vergrößert.

REKTUM

- Dysenterie mit **weißer Verfärbung der Zunge** (Trom.).

- Stühle wie **gehackte Eier** (Cham., Puls.), **gehackter Spinat** (Acon., Arg-n.), geronnen, grünlich, blutig und schleimig.
- Laute Blähungen.
- Schmerzloser Durchfall: Nach Genuss von Zucker in jeder Form (Arg-n.), während und nach Masern, bei Zahnung und Gelbsucht (Chion., Dig., Sulph.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wunde Stellen am Anus durch Stuhlgang (Aloe, Apis, Nit-ac.).
 - Abszess um den Anus.
 - Rektumprolaps.
 - Würmer.

HARNWEGE

- Die abgegebene Urinmenge ist weitaus größer als die vom Säugling aufgenommene Muttermilchmenge (Bell., Lac-ac., Nux-v.).
- Dauernder und häufiger Drang, Tag und Nacht, mit übermäßigem Urinieren, besonders bei Fieber (Lyc., Ph-ac., Rhus-t.).
- Schmerzhafter Harndrang; das Kind fasst sich an die Genitalien und weint laut (Acon.).
- Harnverhaltung bei Dysenterie.
- Plötzlicher Harndrang; muss zur Toilette eilen, sonst würde Urin abgehen.
- Nützlich in Fällen von Nierenentzündung und nephrotischem Syndrom.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schwacher Strahl.
 - Gegabelter Strahl (Thuj.).
 - Milchiger Urin.
 - Urin: Albumin ++, Erythrozyten ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Das Kind spielt ständig an den Genitalien (Stram.).
- Neigung zum Masturbieren.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Entzündung der Eichel (Jac-c.).
 - Hydrozele mit vergrößerten und verhärteten Hoden.
 - Feuchtigkeit zwischen Schenkel und Skrotum.
 - Paraphimose (Nit-ac.) und Phimose mit Eiterung.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Ausfluss bei kleinen Mädchen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Die Vulva ist geschwollen und wund.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Stimmverlust durch Nervosität (Caust., Gels.) und Lähmung der Stimmbänder (Caust.).
- Dauerndes Räuspern.
- Heiserkeit bei Schnupfen (Carbo-veg., Phos.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Glottisödem.

ATMUNG

- Asthma: Durch Einatmen von Staub und beim Versuch, einzuschlafen; dem Kind ist es **unmöglich, auf der linken Seite zu liegen** (Apis, Kali-c.); besser durch Einwirkung von kalter Luft (Ventilator, Klimaanlage oder Gehen im Freien).
- Beschleunigte Atmung im Schlaf (Chel.).
- Atemnot beim Husten (Ant-t., Cina, Ipec.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Keuchende Atmung.

HUSTEN

- **Bellender Husten** (Hep., Spong.) durch **kalte Getränke** und bei Schnupfen.
- **Muss die Brust beim Husten mit beiden Händen halten** (Arn., Bry., Dros.).
- **Anfälle von zwei Hustenstößen** (Bell., Phos., Puls., Sulph., Thuj.), die schnell aufeinander folgen; schlimmer nachts, durch Bettwärme, beim Liegen auf der rechten Seite und durch Tabakrauch.
- Trockener Husten durch Reizung im Kehlkopf, nach Masern (Dros., Puls.).
- Trockener, krampfartiger Husten, der schnell ermüdet; mit Auswurf von ätzendem, eitrigem, dünnem Schleim während des Tages.
- Keuchhusten mit Nasenbluten (Arn.).

BRUST

- **Kann nicht auf der rechten Seite liegen**, besonders bei Pneumonie (kann nicht auf der linken Seite liegen: Lyc.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalter Schweiß** auf der Brust (Sep., Stann.).
 - Furunkel in den Achseln.
 - Röntgen/Thorax: Verdichtung im rechten unteren Lappen (Chel., Kali-c.).

RÜCKEN

- Kann keinen Luftzug im Nacken ertragen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verkrümmung der Wirbelsäule.
 - Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

- Wachstumsschmerzen in den Knochen nachts (Hep., Nit-ac., Sil.).
- Extremitäten empfindlich gegen kalte Luft.
- Still-Syndrom [schwere juvenile chronische Arthritis].
- Vereiterung des Hüftgelenks.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Aufgesprungene Hände.
 - Feuchtkalter, klebriger Schweiß der Hände.
 - Zusammenballen der Finger (Cic., Nux-v., Stry.) und Daumen (Bufo, Cic., Cupr., Lach., See.).
 - Exostose am Schienbein (Nit-ac.).
 - Eiskalte Fingerspitzen (Ant-t., Thuj., Zinc.).
 - Nägel: Brüchig und deformiert.
 - Schwankender Gang.

FIEBER

- Frost:
 - Frösteln durch Dysenterie (erscheint besonders vor und bei Stuhlgang), Schreck (Gels., Puls., Verat.) und nach Ärger (Bry., Nux-v., Tarent.), mit Schütteln des ganzen Körpers.
 - Kälte des Abdomens (Meny.), mit eiskalten Händen und Füßen und Durstlosigkeit.
 - Frösteln nicht besser durch Zudecken.
 - Schlimmer im Freien (ähnlich wie Rhus-t., gegensätzlich zu Puls.).
- Hitze:
 - Abneigung, sich aufzudecken, sogar in diesem Stadium.
 - Absolute Durstlosigkeit, mit brennender Hitze, schlimmer nachts.
 - Rötung des Gesichts und der Handflächen bei Hitze.
- Schweiß:
 - Stöhnen im Schweißstadium.
 - Reichlicher Schweiß nachts und bei jeder Bewegung.
- Fieber tritt auf bei jedem möglichen septischen Herd im Körper, z. B. bei Dauerkatheter, Butterfly-Nadel, Trachealtubus, Magen-Sonde, intravenösen Sonden etc.
- Bei Fieber haben der Säugling oder das Kind Durst auf Milch.
- Fieber begleitet Katarrhe der oberen oder unteren Atemwege und des Magen-Darm-Trakts.

HAUT

- Das Jucken ist schlimmer nachts, durch Schweiß und durch Bettwärme (Mag-act., Rhod.); die Haut brennt nach dem Kratzen.
- Schweiß nachts und nach warmen Getränken, färbt das Bettlaken blutig (Lach.) oder gelb und lässt es steif werden (Nat-m., Sei.).
- Neigung, Furunkel zu bilden.
- Risse in der Haut im Winter (Calc., Sep., Sulph.).
- Reichliche Schweißbildung bei jeder Beschwerde, was aber nicht erleichtert (Bell.). (Reichlich Schweiß, der erleichtert: Nat-m., Verat.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blutige, ätzende Absonderung zerstört das Haar (Lyc., Rhus-t.).
 - Atopisches Ekzem.
 - Kontaktdermatitis.
 - Rissige Haut in den Beugefalten der Fingergelenke; kann nicht die geringste Berührung ertragen.
 - Windelausschlag (Canth.).
 - Skabies (Psor., Sulph.).
 - Die Haut ist trocken und blutet durch Kratzen schnell (Ars., Sulph.).
 - Warzen.

SCHLAF

- Kann nicht auf der rechten Seite liegen (Chin., Puls.).
- Im Schlaf: Kalte Hände, stinkender Kopfschweiß, Zähneknirschen, Ächzen, Stöhnen (Bar-c., Stram.), offener Mund mit reichlich Speichelfluss, körperliche Ruhelosigkeit, Seufzen, Sprechen.

- Schläft nackt (Sulph.).
- Leichter Schlaf.
- Der Schlaf wird gestört durch Furcht vor Räubern (Nat-m., Sil.), schreckliche Träume, Bauchschmerzen (Caust., Rhus-t.) und Schweiß.
- Schlaflosigkeit durch Kopfschmerzen, bei Fieber, durch Knochenschmerzen (Daph., Kalm., Plb.).

KONVULSIONEN

- Beschwerden oder Verschlimmerung durch: Zahnung, **nachts**, Schlaf.
- Konvulsionen bei **Hydrozephalus** oder raumfordernden Prozessen des Gehirns.
- Schreien bei Konvulsionen.
- Schlaflosigkeit bei oder nach Konvulsionen.
- Tetanische Starre.
- Besser durch: Sehr festes Einwickeln des Körpers.

ALLGEMEINES

- Beschwerden durch Missbrauch von Iod, Eisen, Quecksilber, Chinin oder Schwefel; **Wetterwechsel** (Dulc., Rhus-t., Tub.), von warm nach kalt; Unterdrückung von Schweiß, besonders der Füße; Impfung.
- **Brüchige Knochen** (Calc., Ph-ac., Ruta, Sil.).
- Generalisierte Ödeme bei Mangelerkrankungen wie **Kwashiorkor** (Aeth., Abrot.) und **Protein-Mangelernährung** (Calc-p., Sil., Tub.).
- Unverträglichkeit von **Wollkleidung** (Corn., Sulph.).
- **Stöhnen** im Allgemeinen, besonders bei Schmerzen (Bell., Coff., Coloc.), Schlaf (Bry., Bar-c.) oder Schweiß (Phos., Stram., Verat.).
- Abszesse mit Hervorsickern von blutigen, stinkenden, gelb-grünen Absonderungen.
- Anämische Kinder.
- Das Kind fühlt sich besser, wenn es frottiert oder sanft gestreichelt wird (Calc., Cycl., Nat-c.).
- Kinder mit einer Vorgeschichte von rezidivierenden Ohrinfektionen.
- Fröstelig mit Mangel an Lebenswärme, aber auch schlimmer durch Wärme.
- Ödeme durch Störungen von Leber, Niere oder durch Unterdrückung von intermittierendem Fieber.
- Drüsenverhärtung (Bar-m., Iod., Spong.).
- Deutliche Wirkung auf das Lymphsystem (Carc.).
- Übelriechender Körpergeruch.
- Poliomyelitis.
- Skorbut.
- Sinusitis mit Erkältungsneigung, schlimmer durch Kaltwerden oder im Freien.
- Erweichung der Knochen und Rachitis.
- Eiternde Wunden, die nur langsam heilen.
- Zittern bei Kälte durch die aerinaste Anstreunauna (Cocc.. Gels.).

MILLEFOLIUM

(Schafgarbe - Mill.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Aggressiv; Zorn mit Gewalttätigkeit. Schlägt auf sich selbst oder auf andere ein. Schlägt bei Zorn den Kopf gegen die Wand.
- ▶ Kopfschmerzen mit Nasenbluten.
- ▶ Migräne bei Kindern mit so unerträglichen Schmerzen, dass das Kind den Kopf an die Wand schlägt. Die Schmerzen kommen nach dem Trinken von Kaffee oder Schlaf. Es ist ein greller Schmerz, mehr auf der rechten Seite und besonders bei jungen Mädchen.
- ▶ Andauerndes Bohren mit dem Finger im Ohr.
- ▶ Nasenbluten; wenn man ein Blatt der Schafgarbe in die Nase steckt, wird man sogleich Nasenbluten bekommen.
- ▶ Nasenbluten schlimmer nachts, reichlich, unaufhörlich und andauernd; das Blut ist hellrot, dunkelrot oder sehr blass.
- ▶ Nasenbluten ausgelöst durch Putzen der Nase.
- ▶ Bei der Zahnung Konvulsionen oder Epilepsie mit Steifheit.
- ▶ Eingeklemmte Hernien bei Kindern.
- ▶ Madenwürmer.
- ▶ Leukorrhoe bei jungen Mädchen.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae/Compositae).

MOSCHUS

(Sekret der Präputialdrüsen des Moschushirsches - Mosch.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Moschus kann viele hysterische Jungen und Mädchen heilen, die bisher noch nie die Gelegenheit hatten zu lernen, was Gehorsam bedeutet. Sie sind beleidigend, kritisch, verächtlich, zerstörerisch, stur und egoistisch. Sie sind von klein an bis zur Pubertät daran gewöhnt worden, ihre Marotten durch schlaues und listiges Verhalten durchzusetzen. Auf diese Art und Weise werden sie dann letztendlich ein perfektes Objekt für die Verordnung von Moschus, Asaf., Ign., Mosch, und Valer. sind die vier Hauptmittel für Hysterie bei Kindern.
- ▶ Diese Kinder haben Unmengen von tatsächlichen und eingebildeten Symptomen, die sowohl an Menge wie auch an Intensität solange zunehmen, bis alle Wünsche des Kindes erfüllt sind.
- ▶ Obwohl das Kind scheinbar wahrheitsgetreu und ehrlich seine Symptome schildert, stellen sich die Angaben dann doch als unzuverlässig heraus. Die Kinder haben ihre Empfindungen und Einbildungen schon so oft übertrieben oder falsch geschildert, dass sie nicht mehr dazu in der Lage sind etwas wahrheitsgetreu wiederzugeben.
- ▶ Schimpfende und zornige Kinder.
- ▶ Emotionale Störungen durch **übermäßige elterliche Kontrolle**, besonders des Vaters.
- ▶ Krampfhafter Husten, Masturbation oder unwillkürlicher Stuhl im Schlaf durch übermäßige Bevormundung.
- ▶ Furchtlose Kinder.
- ▶ Maßloses, **unkontrollierbares Lachen** über Kleinigkeiten.
- ▶ Zorn mit Schlagen.
- ▶ Ungeschickte Kinder; lassen Dinge in Hast fallen.
- ▶ Chaotisch und destruktiv.
- ▶ Lustig und aufgedreht bei Fieber.
- ▶ Verschlagen-schlau, dreht so manches Ding.
- ▶ Verlangen nach Aktivität trotz körperlicher Schwäche.
- ▶ Fingert ständig an seinen Knöpfen herum.
- ▶ Antwortet nicht auf Fragen.
- ▶ Simuliert Krankheiten.
- ▶ Gestikuliert und spricht laut mit sich selbst.
- ▶ Schreckhaft.
- ▶ Redselig, spricht aufgeregt und hastig.
- ▶ Nervöse Kinder.
- ▶ Verhättschelte und verwöhnte Kinder.
- ▶ Streitsüchtige, boshafte und starrköpfige Kinder.
- ▶ Schamlos.

- ▶ Ausgeprägte Unfähigkeit zu rechnen. Sehr schlecht in Mathematik.
- ▶ Hastige Sprache.
- ▶ Schlafwandeln.

KÖRPER

- ▶ **Wird schnell ohnmächtig** bei Krankheit und durch Zurechtweisung.
- ▶ Junge Mädchen mit plötzlicher Bewusstlosigkeit oder Ohnmacht mit starken Spasmen der Extremitäten.
- ▶ Das Kind wird gern abgerieben und frottiert.
- ▶ Große Empfindlichkeit gegen Luft und Verschlechterung durch Kälte.
- ▶ Reaktionsmangel, besonders nach häufigem Gebrauch von Antibiotika, Beruhigungsmitteln oder Antiepileptika.
- ▶ Neurologische Erkrankungen mit Konvulsionen, Spasmen, Epilepsie, Würgen und Zucken.

Weitere wichtige Symptome

KOPF

- Enzephalitis oder Meningitis.
- Kopfschmerzen mit Kälte, reichlichem blassem Urin, Ohnmacht und unwillkürlichen Stühlen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Der Kopf wird während Konvulsionen wiederholt schnell nach unten und nach hinten gezogen.
 - Unwillkürliches Kopfnicken.
 - Kernig-Zeichen ++.
 - Reichlich Kopfschweiß.

AUGEN

- Verlangen, häufig die Augen zu reiben.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Erweiterte Pupillen.
 - Starrer Blick, Augen glitzernd, hervorstehend, fixiert oder nach oben gedreht.
 - Tränenfluss aus dem linken Auge.

OHREN

- Verminderte Hörfähigkeit nach Zorn.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blutige Absonderung aus den Ohren.
 - Ohrenschmalz ++.

NASE

- Schnupfen mit Fieber.
- Untersuchungsergebnis:
 - Nasenbluten bei Spasmen oder Konvulsionen.

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Bläuliche Verfärbung von Gesicht und Lippen bei Ärger.**
 - **Eine Wange rot, trocken und kalt; aber die andere blass, feucht und heiß.**
- Kaubewegungen des Unterkiefers.
- Spröde Lippen.
- Zucken um Nase und Mund.

MUND

- **Bitterer Geschmack.**
- Schwierigkeiten, den Mund zu öffnen.
- Trockenheit mit sehr wenig Durst.
- Krampfartige Kontraktionen des Mundes.
- Fehlende Sprache.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schaum vor dem Mund.
 - Grünlich-gelbe Verfärbung der Zunge.

HALS

- **Gefühl von Einschnürung am Hals mit Erstickungsgefühl** ist das wichtigste und häufigste Symptom bei diesen hysterischen Kindern
- **Würgen.**
- **Globus hystericus:** Gefühl eines Kloßes, der im Hals aufsteigt.
- Spasmen der Laryngealmuskeln, besonders beim Essen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Beim Schlucken gluckert die Flüssigkeit hörbar durch den Hals.

MAGEN

- **Abneigung gegen den Anblick von Essen.**
- **Auftreibung und Völlegefühl.**
- **Häufiges, heftiges Aufstoßen, mit heißem Speichel im Mund.**
- **Krampfartiger Schluckauf bei nervösen Kindern.**
- Extremer Durst oder extreme Durstlosigkeit.
- Ohnmacht beim Essen.
- Übelkeit durch den Anblick oder den Geruch von Essen.
- Verlangen: **Käse** und starker schwarzer Kaffee.

ABDOMEN

- **Eingeklemmte Blähungen.**
- Übermäßige Auftreibung des Abdomens mit Flatulenz bei hysterischen Kindern.
- Abgang von vielen Blähungen, mit schrecklichem Geruch, ähnlich wie Knoblauch.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Übermäßiger, feuchtkalter Schweiß am ganzen Abdomen.
 - Einziehung des Nabels.
 - Spasmen von Zwerchfell und Abdominalmuskeln.
 - Tympanitische Auftreibung des Abdomens; aber ist unfähig, die Blähungen auf irgendeinem Weg abgehen zu lassen

REKTUM

- Reichliche, wässrige Stühle werden **unwillkürlich im Schlaf abgegeben oder beim Urinieren.**
- Reichlicher, wässriger, nächtlicher Durchfall mit Auftreibung des Bauches und Abneigung gegen Essen, sogar der Anblick von Essen macht das Kind krank.
- **Süßlicher Geruch der Stühle.**
- Kribbeln im After, Erleichterung durch Reiben.

HARNWEGE

- Strenger Ammoniakgeruch des Urins, mit hefeartigem Sediment.
- Der Urin ist reichlich und klar wie Wasser.
- Urin normal oder blass tagsüber, aber dunkelrot und übelriechend in der Nacht.
- Unwillkürliches Urinieren nach Stuhlgang.
- Juveniler Diabetes: Polyurie oder Glukosurie, mit großem Durst, Abmagerung, Brennen in der Urethra.
- Untersuchungsergebnis:
 - Urin: Albumin +, Glukose ++, Erythrozyten +.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Laryngismus stridulus beim Kaltwerden.
- Krampfartige Kontraktionen des Larynx bei Bestrafung.
- Glottisspasmen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Stimme: Laut.

ATMUNG

- **Akutes, plötzliches, spastisches Asthma**, mit intensiver Angst und Furcht, Zyanose und drohender Asphyxie.
- **Atmung scheint beim Husten auszusetzen.**
- Dauerndes Verlangen, tief zu atmen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Keuchende Atmung.
 - Unregelmäßige, pfeifende Atmung.

HUSTEN

- **Anfallsartiger oder krampfartiger Husten** durch Kaltwerden, **durch Tadel, von Mittag bis Mitternacht.**
- Husten begleitet von Nasenbluten.
- Keuchhusten.

BRUST

- **Lautes Schleimrasseln in der Brust, aber fast nichts wird abgehustet.**
- Konstriktion der Brust bei spastischem Husten.
- Untersuchungsergebnis:
 - Röntgen/Thorax: Hochstand des Zwerchfells als Anzeichen für dessen I ähmung

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Schweiß der Zervikalregion.

EXTREMITÄTEN

- Glieder angespannt, fühlen sich zu kurz an.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue Flecken an den Oberschenkeln.
 - Kälte der einen Hand bei Schweiß der anderen.
 - Unwillkürliche Bewegungen der Finger, als ob er etwas zupfen oder mit den Fingern zählen würde.
 - Unwillkürliche Bewegungen der Hände und Füße.
 - Eine Hand heiß und blass, die andere kalt und rot.
 - Krampfartige Kontraktionen der Finger.
 - Steifheit der Extremitäten bei Konvulsionen und Husten.
 - Zucken der Beine oder des Daumens.

SCHLAF

- Erwacht alle halbe Stunde und wirft die Decken weg; fühlt sich zu heiß, obwohl er nicht schwitzt.
- Kann nicht lange in einer Position liegen; hat einen sehr ruhelosen Schlaf.
- Schlaf in Seitenlage.
- Schläfrigkeit, mit häufig wiederkehrendem Gähnen.
- Schlaflosigkeit durch Überreizung.
- Schläfrig am Tag, schlaflos in der Nacht.

FIEBER

- Brennende Hitze im Schlaf, mit Verlangen, sich abzudecken.
- Frösteln abwechselnd mit Hitze.
- Kontinuierliches kongestives Fieber, mit Lähmung der Lungen.
- Absteigende Kälteschauer, mit Schütteln, schlimmer durch Luftzug.
- Untersuchungsergebnis:
 - Schweiß riecht nach Moschus.

HAUT

- Insektenstiche.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue Flecken.
 - Kälte der Haut ist ein wichtiges Begleitsymptom bei vielen Beschwerden.

KONVULSIONEN

- **Konvulsionen nach Zorn bei Säuglingen.**
- Aura/Vor dem Anfall:
 - **Ungeduld**, mit großer Ruhelosigkeit.
 - Erträgt kein Zudecken.
 - Druck in der Brust.
- Während des Anfalls:

- Kälte des Körpers.
- Der Kopf wird wiederholt schnell nach unten und nach hinten gezogen.
- **Laryngismus stridulus beim Kaltwerden**, mit Pharynxödem.
- Steifheit der Extremitäten.
- Alle Muskelbewegungen (wie Zucken) verlaufen in einer bestimmten Richtung, entweder von oben nach unten oder von unten nach oben.
- Alle Sekretionen und Exkretionen sind während der Spasmen unterdrückt.
- Kontraktion der Finger.
- Die Augen glitzern hell, starren und stehen ziemlich hervor.
- Nasenbluten.
- Blasses und zuckendes Gesicht, mit offenem Mund.
- Spasmodische Kontraktionen der Laryngealmuskeln, besonders beim Essen.
- Tetanische Krämpfe.
- Nach dem Anfall:
 - Der Anfall endet mit Aufstoßen und Zucken verschiedener Körperteile, gefolgt von kribbelndem Empfinden in den Armen.
- **Abwechselnd tonische und klonische Krämpfe.**
- Konvulsionen mit - oder gelegentlich ohne - Bewusstsein.
- Urämische Konvulsionen.

ALLGEMEINES

- **Kälte**, großes Verlangen nach Wärme oder Feuer.
- **Die Krankheiten folgen keinem normalen Ablauf.**
- In den **letzten Stadien von Krupp**, nach Versagen aller angewandten Mittel.
- **Zittern am ganzen Körper mit kaltem Schweiß.**
- Trockenheit gewöhnlich feuchter Teile.
- Hämorrhagien.
- Synkope mit Zyanose.

MYGALE LASIODORA

(Schwarze südamerikanische Vogelspinne - Mygal.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Zapplige Unruhe, besonders der Hände.
- ▶ Liebt schnelle, laute und rhythmische Musik.
- ▶ Ruhelose Kinder, die schnell sprechen und handeln.

KÖRPER

- ▶ Ruhelosigkeit: Dauernde Bewegung, besonders der Hände und Füße.
- ▶ Empfindlich gegen Geräusche, Berührung und Vibration.
- ▶ Besser durch Nachmittagsschlaf.
- ▶ Fröstelig.
- ▶ Extrem behaarte Kinder.
- ▶ Vorwiegend rechtsseitiges Mittel.
- ▶ Neigung zu Lymphangitis.

Herkunft: Dieses Mittel stammt von einer großen Vogelspinne aus Brasilien. Sie ist eine der ältesten Spezies der Erde. Dieser Spinnentyp ist 150 Millionen Jahre älter als die bekannte *Tarentula hispanica*. Damit gab es sie schon lange vor den Dinosauriern. Mygale ist eine sehr primitive, aber effizient gebaute Spinne. Sie hat keine Augen, trägt aber stattdessen auf ihren acht Beinen acht verschiedene Arten von Haaren, mit denen sie „hören“ kann und damit eine dreidimensionale Wahrnehmung besitzt. Sie kann kleinere Vögel aus der Luft fangen.

Die männliche Vogelspinne wird nur zwei Jahre alt, während das Weibchen bis zu 35 Jahre alt wird. Das Männchen führt ein gefährliches Leben auf der Suche nach paarungswilligen Weibchen, während die Weibchen den größten Teil ihres Lebens unter der Erde in ihren Höhlen bleiben. Die Männchen reifen daher sehr schnell, um sich innerhalb ihres kurzen Lebens paaren zu können. Mygale ist eine der haarigsten Spinnen. Obwohl sehr träge, kann sie sehr schnell zuschlagen.

Vogelspinnen wie Mygale haben keine Netze. Stattdessen weben sie dichte, weiße, röhrenförmige Nester zwischen Blättern und in den Rissen alter Baumstämme. Mygale hat wie die meisten Spinnen eine sehr enge Speiseröhre, so dass sie keine großen Tiere fressen kann. Mygale kann hoch springen und auf Bäume klettern. (Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Willem Woutman, Utrecht, Niederlande).

Kinder, die Mygale benötigen, sind ähnlich wie Agar.-, Stram.-, Tarent.- und Ziz.-

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Aktive, aggressive und ruhelose Kinder, besonders morgens beim Erwachen.**
- **Empfindlich gegen Musik, Geräusche, Berührung und Vibration.**
- Verlangen, mit Seilen zu spielen.
- Furcht vor dem Tod und vor engen Räumen.
- Macht viele Gesten, besonders mit einem Arm und einem Bein.
- Rachsüchtige Kinder.
- Sprache unartikulierte, die Worte kommen stoßweise beim Versuch zu sprechen.

KOPF

- Untersuchungsergebnisse:
 - Der Kopf fällt zu einer Seite, normalerweise zur rechten.
 - Wirft seinen Kopf nach hinten und dann mit einem Ruck nach vorne.

AUGEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Augenlider öffnen und schließen sich schnell.

OHREN

- **Akute Ohrenschmerzen**, besonders auf **der rechten Seite, schlimmer nach Mitternacht**, treiben das Kind aus dem Bett.
- Gehör intensiv und scharf.

AKUTE OHRENSCHMERZEN

Ich habe in meiner Praxis bei der Behandlung akuter Ohrenschmerzen, die das Kind mitten in der Nacht weinend aufwachen lassen, nie ein negatives Ergebnis erzielt. Ich beginne immer mit **Ferr-p. C 200** und wenn das nicht wirkt, setze ich **Cham. 50 M** ein.

GESICHT

- Gesichts-Tics, besonders wenn sie jemanden imitieren.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ängstlicher Ausdruck.
 - Dauerndes Zucken der Gesichtsmuskulatur.
 - Verzerrtes Gesicht am Morgen.
 - Das Gesicht ist heiß und gerötet.

MUND

- **Zähneknirschen mit der Neigung, sich im Schlaf auf die Zunge zu beißen.**
- Untersuchungsergebnis:
 - Der Mund öffnet und schließt sich schnell.

MAGEN

- **Übermäßiger Durst bei Fieber.**
- **Übelkeit** mit heftigem Herzklopfen erscheint **als ein Begleitsymptom** bei vielen anderen Zuständen.
- Abneigung gegen Nahrung.

HARNWEGE

- Brennend heißer Urin.
- Vermehrtes Urinieren.

ATMUNG

- Erschwerte Atmung, mit Angst.

RÜCKEN

- Krämpfe und Zuckungen nach Verletzungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Opisthotonus.
 - Torticollis.

EXTREMITÄTEN

- Chorea und andere unwillkürliche Bewegungen sind besser im Schlaf (wie Agar, und gegensätzlich zu Ziz.), aber schlimmer morgens und durch Bewegung.
- Ungeschicklichkeit der Beine, stolpert beim Gehen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Intensive rote Streifen, folgen den Lymphbahnen der Beine, von den Waden bis hoch zum Körper.
 - Unwillkürliche konvulsivische Bewegungen der Glieder, besonders rechts.
 - Die Beine sind beim Sitzen dauernd in unwillkürlicher Bewegung (Zinc.) und werden beim Versuch zu gehen nachgezogen.
 - Ruhelosigkeit: Dauernde Bewegung, besonders der Hände und Füße. Findet es unmöglich, seine Hände auch nur eine einzige Minute in derselben Position zu halten.
 - Schulterzucken oder konvulsivische Bewegungen der Schultern.

SCHLAF

- Ruheloser Schlaf.

HAUT

- Untersuchungsergebnis:
 - Karbunkel

FIEBER

- Frost, mit Zittern am ganzen Körper.
- Übermäßiger Durst bei Fieber.
- Gerötetes Gesicht und trockener, brauner Zungenbelag bei Hitze.
- Heftiges Frösteln, gefolgt von Hitze.

CHOREA

Mygale hat Chorea, besonders des Gesichts und des Oberkörpers. Folgende andere Mittel sollte man vergleichend erwägen:

- Agar.: Erinnert sehr stark an Mygale, aber als unterscheidendes Symptom haben sie Jucken der Augenlider oder anderer Körperteile, wie bei Erfrierungen; die Wirbelsäule ist berührungsempfindlich.
- Ign.: Chorea emotionalen Ursprungs.
- Stram.: Charakterisiert durch hervortretende Zunge, Stammeln, feurigen Ausdruck und häufiges Heben des Kopfes vom Kissen.
- Tarent.: Angezeigt bei Chorea des rechten Arms und des rechten Beins. Die Bewegungen dauern sogar nachts an.
- Ziz.: Chorea setzt sich im Schlaf fort.

ALLGEMEINES

- **Dauernde Bewegung des ganzen Körpers.**
- **Unsicherer Gang.**
- Fröstelig.
- Abmagerung des Körpers bei choreatischen Beschwerden.
- Unfähig richtig zu gehen oder zu stehen.
- Periodische Beschwerden.
- Vorwiegend rechtsseitiges Mittel.
- Rote Streifen entlang der Lymphbahnen.
- Zucken und konvulsivisches Rucken der Muskeln.

NAJA TRIPUDIANS

(Kobragift - Naja)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Bulimie bei kleinen Kindern, deren Mutter in der Schwangerschaft ein ähnliches Problem hatte, gekennzeichnet durch Binge Eating und anschließendes Abführen oder Aufnahme einer großen Nahrungsmenge innerhalb kurzer Zeit, gefolgt vom Versuch, das Gegessene wieder loszuwerden, typischerweise durch Erbrechen oder exzessiven Kraftsport
- ▶ Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft in einer Ehe lebten, in der sie von der Schwiegerfamilie abgelehnt, drangsaliert oder unrecht behandelt wurden (Mag-c., Mag-m., Sacch.)
- ▶ Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft durch die erfahrene Unterdrückung und Misshandlung in ihrer Beziehung böse und wütend waren, während sie zugleich aus Pflichtgefühl alles geduldig und still ertrugen
- ▶ Kinder von Müttern, die in ihrer Beziehung viel gelitten haben und sich hilflos und gefangen fühlen. Solche Kinder leiden später an herzbezogenen Erkrankungen.
- ▶ Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft in einem ständigen Konflikt zwischen Wut und Hass einerseits und Respekt, Verantwortung und Pflichtgefühl gegenüber der Familie andererseits lebten
- ▶ Kinder mit Schuldgefühlen, als hätten sie etwas Falsches getan. Dabei kann es sich um Verfolgungswahn handeln, wie man ihn häufig bei Schizophrenie findet (Alum., Anac.).
- ▶ Kinder, die in einem Umfeld leben, in dem große Angst vor seelischer oder körperlicher Verletzung herrscht
- ▶ Kinder, die Naja brauchen, haben eine Beziehung zu Schlangen, z.B. Träume von Schlangen oder eine Faszination für diese Tiere.
- ▶ Konzentrationsschwierigkeiten beim Lernen, die zu einer Abneigung gegen das Lernen und die Schule führen
- ▶ Naja-Kinder leben oft wie Roboter, als stünden sie unter der Kontrolle einer überlegenen Macht oder einer starken Persönlichkeit - seien es strenge Eltern oder starke religiöse Einschränkungen in der Familie (Stram., Thuj.).
- ▶ Verantwortungsbewusste Kinder, die alles zu ernst nehmen. Sie wollen ihre Pflichten auf bestmögliche Weise erfüllen.
- ▶ Selbstabwertung bei kleinen Kindern, die Opfer strenger und dominanter Eltern sind oder sexuell missbraucht wurden
- ▶ schüchterne Kinder, die ihre Ansichten und ihren Zorn gegen Familie und Freunde nicht ausdrücken können (Calc., Gels., Kali-c.)

KÖRPER

- ▶ wirkt besonders auf Kleinhirn und Medulla oblongata
- ▶ Luftnot und Dyspnoe durch eine angeborene Herzerkrankung, wie
 - Aortenstenose
 - Atriumseptumdefekt (ASD)
 - Atrio-ventrikulärer Septumdefekt (AVSD)
 - Aortenisthmusstenose (ISTA)
 - Dextrokardie
 - Ebstein-Anomalie
 - Hypoplastisches Linksherz-Syndrom (HLHS)
 - Hypoplastisches Rechtsherz-Syndrom (HRHS)
 - Mitralklappenstenose
 - Persistierender Ductus arteriosus (PDA)
 - Cantrell-Syndrom
 - Pulmonalatresie
 - Pulmonalstenose
 - Shone-Komplex
 - Fallot-Tetralogie
 - Ventrikelseptumdefekt (VSD)
- ▶ Herzklappenkrankheiten bei Kindern, z.B. valvuläre Stenose, valvuläre Regurgitation, Atresie oder Mitralklappenprolaps (Kalm., Lycps-v.)
- ▶ linksseitige Beschwerden, z.B. Kopf-, Arm- oder Halsbeschwerden

Weitere wichtige Symptome**GEIST**

- kann seine Gefühle nicht ausdrücken, unfähig zu antworten, wenn er emotional verletzt wurde (Nat-m., Puls.)
- Depression bei Kindern, gekennzeichnet durch Unzufriedenheit mit allem, weint schnell oder bei der geringsten emotionalen Erregung. Die Depression wird manchmal durch Aggression, Reizbarkeit oder aggressives und selbstzerstörerisches Verhalten kompensiert.
- ständige Ängstlichkeit, als habe er etwas Falsches getan
- Furcht, seine Nächsten könnten einen Unfall haben
- Furcht vor Regen oder Regenschauern. Das Kind entwickelt eine starke Phobie davor, sich dem Regen auszusetzen und nass zu werden.
- Identitätsprobleme durch seelische oder körperliche Misshandlung oder sexuellen Missbrauch
- malt sich Stress und Probleme aus und grübelt dann gern darüber nach
- liebt Musik
- malt gern
- schreibt gern Gedichte (Agar., Ant-c.)
- sensible Kinder, die ihre Gefühle verbergen
- völliger Verlust des Selbstvertrauens durch chronischen Kummer

KOPF

- katarrhalischer Kopfschmerz bei Husten und Erkältung
- Kopfschmerzen durch Magenstörungen (Bry., Iris)
- Kopfschmerzen durch Autofahren
- Migräne bei Kindern, die häufige Depressionen heraufbeschwört
- Migräne, die im Schlaf beginnt (Ferr., Ptel.)
- Migräne schlimmer durch Bewegung und scharfe Speisen, besser durch Aufenthalt im Freien und kalte Anwendungen
- Untersuchungsergebnisse
 - Hautschuppen
 - Haarausfall am Scheitel
 - empfindliche Kopfhaut

AUGEN

- Untersuchungsergebnisse
 - verklebt
 - Lähmung des Oberlids
 - Pupillen reaktionsträge und unempfindlich gegen Licht (Hell., Op.)
 - eingesunken
 - Schwellung des Oberlids

OHREN

- chronische Otitis media, schwarze Absonderung wie Fischlake
- Untersuchungsergebnisse
 - Entzündung des Trommelfells

NASE

- allergische Rhinitis, die sich schließlich in der Brust festsetzt und Asthma erzeugt
- allergische vasomotorische Rhinitis, v.a. nachts, gefolgt von Niesen, v.a. im Frühling und im Herbst
- Naseschnauben mit sehr geringfügigen Absonderungen
- verstopfte Nase, schlimmer tagsüber, besser durch Niesen
- Untersuchungsergebnisse
 - Akne
 - geschwollene Nasenflügel

GESICHT

- Rotfärbung bei Kopfschmerzen
- Untersuchungsergebnisse
 - ängstlicher, kränklicher Gesichtsausdruck
 - Blässe, Rötung

MUND

- Trockenheit morgens beim Erwachen
- Sprache verlangsamt schwerfällig lallend und undeutlich

- Untersuchungsergebnisse
 - Weißfärbung der Zunge
 - Gingivitis
 - profuser, schaumiger Speichel
 - schmutziger Belag auf Lippen und Zunge
 - Zungengeschwüre

HALS

- akute Pharyngitis
- Luftnot beim Schlafengehen (Cench., Lac-c.)
- ständige Neigung zu schlucken
- Schluckschwierigkeiten durch Lähmung der Medulla oblongata
- Schmerzen nach dem Husten
- empfindlich, erträgt keine enge Kleidung am Hals
- Halsentzündung, schlimmer morgens und beim Schlucken
- Schwellung von Pharynx und Tonsillen, die das Schlucken behindert
- Untersuchungsergebnisse
 - rot oder dunkelrot verfärbt
 - entzündet
 - Entzündung der linken Tonsille
 - zäher Schleim

MAGEN

- Übelkeit durch Autofahren
- Kolik nach der Hauptmahlzeit

ABDOMEN

- ständiges Gefühl, als würde er Durchfall bekommen
- krampfende und windende Empfindungen im Nabel und um den Nabel herum
- schmerzhaftes Auftreibung des Abdomens durch Flatulenz
- kollernde und glickernde Geräusche
- Untersuchungsergebnisse
 - tastbares Colon
 - vergrößerte Milz
 - Empfindlichkeit der linken Darmbeingrube
 - Empfindlichkeit der linken Leistengegend

REKTUM

- Durchfall durch die geringste Unachtsamkeit beim Essen
- gewaltsame, schwallartige Stuhlentleerung, Stuhl wässrig wie bei Cholera
- ungenügender, unbefriedigender Stuhlgang

HARNWEGE

- spärlicher Harnabgang
- Untersuchungsergebnisse
 - Ablagerungen von rotem Sediment im Harn (Dig., Merc-c.)
 - Harn von der Farbe dunklen Strohs

LARYNX UND TRACHEA

- kruppartige Beschwerden von Larynx und Trachea
- ständiges Freiräuspern des Larynx
- Heiserkeit beim lauten Lesen und beim Sprechen

ATMUNG

- allergisches Asthma, begleitet von Hautkrankheit
- Asthma bei Kindern mit Herzproblemen
- Asthma nach Schnupfen (Aral., Nux-v.)
- Asthma, schlimmer nachts, beim Hinlegen, beim Liegen auf der linken Seite und im Schlaf, besser durch Fächeln und Liegen auf der rechten Seite
- Husten, schlimmer nach Mitternacht, durch kalte Luft, durch Anstrengung
- Husten durch Kardiomegalie (Laur., Tab.)
- kurzer und quälender Husten
- Auswurf von weißlichem, dickflüssigem Schleim morgens beim Erwachen
- Reizung und Kitzeln in Larynx und Trachea
- Atmung sehr langsam, flach und kaum wahrnehmbar; angestrengt und schwierig
- kurzer, keuchender Husten alle paar Minuten
- Untersuchungsergebnisse
 - beschleunigte Atmung, Fischmaulatmung, Hecheln

HERZ

- Brustenge, begleitet von Asthma
- Herzbeschwerden nach Infektionskrankheit (Spartin-s.)
- Herzbeschwerden, begleitet von Atemproblemen, Migräne und Zyanose
- Herzbeschwerden, schlimmer beim Liegen auf der linken Seite (Cact., Phos.)
- Herzinsuffizienz, begleitet von Herzklappenkrankheit (Acetan, Stry-ar., Stry-s.)
- nervöse Palpitation
- Palpitation nach der geringsten Anstrengung oder Schreck
- rheumatisches Fieber, das das Herz angreift (Bry., Sulph.)
- Herzklappenschaden nach einer Streptokokken-Infektion des Halses
- Untersuchungsergebnisse
 - hörbare Herztöne
 - Fallot-Tetralogie
 - Hypertrophie des Herzens
 - Hypotonie
 - Mitralklappeninsuffizienz
 - Mitralklappenstenose
 - Herzgeräusch
 - Perikarditis
 - Puls schnell und voll oder schwach und langsam

EXTREMITÄTEN

- rheumatische Schmerzen am ganzen Körper
- Untersuchungsergebnisse
 - kalte Hände bei Fieber und Kopfschmerzen
 - kalte Füße

- ein Fuß kalt, der andere heiß
- blaue Hände
- violette Hände
- Schweiß an Händen, Fußgelenken und Füßen
- Schweiß an den Handflächen beim Husten
- wund machender Fußschweiß, zerfrisst die Schuhe (Sanic., See.)
- Restless-Legs-Syndrom
- geschwollene Hände und Füße

RÜCKEN

- chronische Schmerzen durch Kummer

SCHLAF

- schreckliche Träume, viele Alpträume
- Schlafstörungen, begleitet von Herzbeschwerden
- Aufwachen durch Erstickenanfall (Grin., Op., Spong.)

HAUT

- Untersuchungsergebnisse
 - Purpura

ALLGEMEINES

- Konvulsionen im Schlaf und durch Masturbation
- Zyanose bei Kleinkindern
- Ohnmachtsgefühl nach dem Frühstück
- Obst, besonders saures Obst, bessert in der Regel.
- Blutungsneigung
- Krebschmerzen bei Kindern mit Leukämie
- Erkältungsneigung

NAPHTALINUM

(Naphthalin - Naph.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Katarakt (grauer Star) bei Kindern.
- ▶ Entzündung der Netzhaut.
- ▶ Hornhauttrübung und Netzhautablösung.
- ▶ Heuschnupfen oder vasomotorischer Schnupfen mit entzündeten Augen, Schmerzen, anhaltendem Niesen, heißem Kopf und scharfen, wund machenden Absonderungen. Der Schnupfen kann nach unten wandern und zu einem Anfall von Bronchialasthma führen, besser in frischer Luft.
- ▶ Keuchhusten.
- ▶ Virusbedingte wie auch bakterielle Bronchitis.
- ▶ Lang andauernde Anfälle von krampfartigem Husten mit Atemnot, dabei blaurotes oder rotes Gesicht. Große Anstrengung mit Schweiß beim Auswurf von dickem zähem Schleim.

HERKUNFT

- Ein Steinkohlederivat, das bei der Herstellung von Kohlegas entsteht.

NATRIUM MURIATICUM

(Kochsalz - Nat-m.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Beschwerden durch **Mangel an echter elterlicher Liebe** und Fürsorge.
- ▶ Weint rasch (Puls.), aber **Trost verschlimmert**.
- ▶ **Im Schlaf kommen Ängste hoch** mit vielen Träumen, Alpträumen und Schlaflosigkeit.
- ▶ **Versteckt seinen tiefen und bitteren Groll** vor den Eltern und der Familie aus Angst, seine Lieben für immer zu verlieren.
- ▶ Das Kind wird aggressiv, weil es nicht genügend Liebe bekommt.
- ▶ Meidet Menschen, die ihn trösten wollen, besonders solche, die ihn verwöhnen und viel Aufhebens machen (Reizbarkeit, wenn getröstet: Ign., Plat., Sep., Sil.).
- ▶ Emotionale Unsicherheit nach Durchtrennung der Nabelschnur; braucht viel Liebe und Zuneigung.
- ▶ Extrem empfindlich mit Überreaktionen (Reizbarkeit, nimmt alles von der üblen Seite auf: Caps., Caust., Croc., Nux-v., Pall.).
- ▶ Fürchtet, dass ihm oder einem Menschen, den er liebt oder von dem er abhängig ist, etwas zustoßen könnte.
- ▶ Die Unsicherheit in den prägenden Entwicklungsjahren ist für das Kind ein solches emotionales Trauma, dass es nie mehr vergessen wird.
- ▶ Zorn projiziert sich in Form von Reizbarkeit, Impulsivität und ungestümem Verhalten.
- ▶ Das Kind nährt ein emotionales Trauma und weigert sich, sich von ihm zu befreien; lieber trauert es still vor sich hin.
- ▶ Das Kind redet lieber mit einer verstorbenen Person, wenn es die Zuwendung einer geliebten Bezugsperson verloren hat (Wahnidee, spricht mit verstorbenen Personen).
- ▶ Dieses emotionale Trauma des Kindes zeigt sich auch beim Blick in den Spiegel: es meint, es sehe richtig scheußlich aus.
- ▶ Probleme beim Füttern; immer wieder Wutanfälle, die sich aufs Essen beziehen. Psychologisch ist die Nahrungsaufnahme ein oraler Reiz, der die Liebe und Fürsorge repräsentiert, die das Kind unbewusst ablehnt. Wenn es zum Essen gezwungen wird, wird das Kind ängstlich und reizbar (Angst nach dem Essen).
- ▶ Kann und will die fröhliche, glückliche und freudige Seite des Lebens nicht annehmen; kann deshalb über keinen Witz lachen.
- ▶ Generalisierte Ängste; Träume und Wahnideen von Dieben und Räubern (vielleicht weil dem Kind die Zuneigung geraubt wird).

- ▶ Die verschiedensten Fallträume oder Träume von gezogenen Zähnen, die den unterdrückten Zorn und die anderen Gefühle des Kindes symbolisch zum Ausdruck bringen: kann die Zähne weder zum Kauen (für sich selbst sprechen) noch zum Beißen (seinen Zorn ausdrücken) gebrauchen. Kleinkinder haben nur wenige Zähne und zudem ist bei Nat-m die Zahnung verspätet.

KÖRPER

- ▶ Abmagerung bei gesundem Appetit (Abrot., Calc., Cina, Iod., Petr., Tub.). **Hals und Nacken sind besonders mager** mit hervorstehenden Wangenknochen.
- ▶ **Landkartenzunge** (Merc., Tarax.).
- ▶ Bauchschmerzen besser durch Druck der Kleidung (Fl-ac.).
- ▶ Angeborene Tränengangstenose; bei Neugeborenen tränen ständig die Augen.
- ▶ Verzögerte Entwicklung; spätes Sprechen- und Laufenerlernen.
- ▶ Jungenhaftes Benehmen bei Mädchen (Plat.).
- ▶ Die Haut wirkt blass, anämisch, erdig und schmierig-gelblich.
- ▶ Tränende Augen beim Husten (Puls., Squil.).
- ▶ Vithoulkas sagt: „Oft sieht man eine dünne feine horizontale Linie, die das untere Augenlid in zwei Teile teilt. Man findet sie oft bei jungen Mädchen mit hysterischer Persönlichkeit“ (Asaf., Lil-t., Mosch.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Zu Unfällen neigend** und ungeschickt aus Eile, wird schnell verlegen; lässt schließlich Dinge fallen oder stößt beim Laufen an.
- Beschwerden durch: Alleinsein (Verlassen), **sexuellen Missbrauch**, Konflikt zwischen den Eltern, **Tod einer geliebten Person** (Eltern, nahe Verwandte oder Haustiere), Unterdrückung, Vorwürfe, Verachtung, unterdrücktem Zorn mit **stillem Kummer**.
- **Kann keine Zuneigung zu irgendjemandem zeigen außer zu Tieren**, die sie lieben. Diese Kinder haben für gewöhnlich gern viele Tiere und sind ihnen sehr eng verbunden.
- **Furcht vor Vögeln**, Dunkelheit, Ärzten, Versagen, im Flugzeug fliegen, Geistern, Insekten, Nadeln, Räubern, Spinnen, Gewittern, Tunneln.
- Hasst Mathematik; ist **sehr schwach im Rechnen**.
- Sie sind **sehr kitzelig** und hassen es daher berührt oder liebkost zu werden, besonders von Fremden.
- Zorn mit Schweigsamkeit und sehr blassem Gesicht.
- Abneigung gegen die Schule mit Schwierigkeiten, sich auf das Lernen zu konzentrieren.
- Furchtsame und schüchterne Kinder, die bei der kleinsten Sorge oder aus Zorn weinen und sich schlechter fühlen, wenn sie ermutigt oder getröstet werden.

- Fühlt sich verlassen und ungeliebt von nahestehenden und geliebten Personen, besonders nach der Geburt eines jüngeren Geschwisterchens, aufgrund von Eifersucht.
- Unwillkürliches Lachen zum falschen Zeitpunkt.
- Sanfte und sentimentale Kinder.
- Zwangsneurose; muss dauernd kontrollieren, was er gerade getan hat, immer wieder, ODER muss sich ständig die Hände waschen.
- Frühreife, altkluge Kinder.
- Von Natur aus reserviert, mit Verlangen nach Einsamkeit; mag keine Gesellschaft.
- Kleine Kinder, die schlechte Laune haben und sich sehr schroff und beleidigend gegen ihre Eltern verhalten; neigen dazu, im Zorn zu treten.
- Lampenfieber.
- Schüchterne Kinder, die dauernd an den Nägeln kauen oder ihre Finger in den Mund stecken.
- Gebraucht beim Sprechen die falschen Worte und verdreht beim Schreiben Worte oder Buchstaben.
- Sehr disziplinierte und verantwortungsbewusste Kinder mit starkem Moralempfinden.
- Sehr faul mit der Tendenz, Dinge aufzuschieben.
- Sehr empfindlich gegen Grobheit und Tadel; weint still wegen des geringsten Tadels von Älteren.

KOPF

- Beschwerden durch **Anstrengung** (geistig und körperlich), **fettes Essen** und **Sonne**.
- Kopfschmerzen begleitet von Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen im Nacken; periodische heftige, hämmernde, pulsierende, zerreißende Kopfschmerzen bei Schulmädchen; **schlimmer am Vormittag** (ab 10 Uhr), durch Husten, Essen, Erschütterung, Licht oder durch Lesen; besser im Freien, durch kalte Anwendungen, lokalen Druck auf die betreffende Region und mit festgeschlossenen Augen hinlegen.
- Schmerzhaftigkeit der verletzten Stellen, mit Empfindlichkeit gegen Berührung, lange nach der Verletzung.
- Tuberkuläre Meningitis.
- Schwindel beim Aufstehen und nach Überanstrengung der Augen (z. B. viel Fernsehen oder viel Handarbeiten).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blasige oder **ekzematöse Ausschläge entlang des Haaransatzes**, besonders am Hinterkopf, der wund macht und das Haar wegfrisst.
 - CT: Hirnblutung.
 - Häufiges, unwillkürliches Nicken oder Rucken des Kopfes.
 - Haar fettig oder punktförmiger Haarausfall an Stirn und Schläfen.
 - Hydrozephalus.
 - Kernig-Zeichen +.
 - Weiße Krusten oder Schuppen, besonders am Hinterkopf.
 - Stirnrunzeln mit rotem Gesicht bei Kopfschmerzen.

AUGEN

- Das Kind beklagt sich über schwimmende schwarze Flecken im Gesichtsfeld.
- Trübung der Sicht mit häufigem Flimmern vor den Augen vor und bei Kopfschmerzen.
- Entzündung der Lidränder mit krustigen Ausschlägen und heftigem Jucken.
- Unwillkürlicher Tränenfluss bei Husten, Kopfschmerzen, beim Lachen oder im Wind.
- Augenschmerzen mit Rötung durch Anstrengung bei feinen Arbeiten wie Lesen, Nähen und Schreiben bei künstlichem Licht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verengte Pupillen.
 - Hornhautulzerationen.
 - Ektropion [Auswärtskehrung der Lider],
 - Halb offene Lider.
 - Lähmung der inneren geraden Augenmuskeln; divergenter Strabismus [nach außen Schielen],
 - Perimetrie: Vertikale Hemianopsie [teilweiser Ausfall des Gesichtsfelds],
 - Verengung des Tränenkanals.
 - Gerstenkörner, besonders in den inneren Augenwinkeln.

OHREN

- Katarrh der Eustachischen Röhre.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Ohrenschmalz ++.**
 - Furunkel auf den Ohr läppchen und blasiger Ausschlag hinter den Ohren.
 - Dauerndes Bohren mit den Fingern in den Ohren.
 - Weiße oder gelbliche Absonderung aus den Ohren.

NASE

- **Heftiges krampfartiges Niesen am Morgen** (allergisch gegen Hausstaub und Hausstaubmilben) und durch Aufdecken.
- Reichlicher, eiweißartiger, weißer oder gelber Schnupfen.
- Nasenbluten mit dunklem und klumpigem Blut bei kleinen Kindern, besonders beim Naseputzen.
- Muss ein- oder zweimal niesen vor einem Hustenanfall.
- Neigung, sich häufig die Nase zu schnäuzen, trotz Schmerz an der Nasenwurzel.
- Nasenkatarrh, erstreckt sich zur Stirnhöhle oder nach hinten in den Hals.
- Verstopfung der Nase ist schlimmer im Freien.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Schweiß auf der Nase.**
 - Trockene, schorfige Nasenlöcher; zupft ständig an ihnen.

GESICHT

- Mumps, der zu den Hoden metastasiert.
- Mumps mit Vereiterung der Ohrspeicheldrüsen und vermehrtem Speichelfluss.
- Gesichtsschweiß beim Essen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Vermehrtes Wachstum von kräftigem Haar im Gesicht**, die das Kind

- **Glänzendes oder fettiges** Gesicht.
- Ulzerationen oder **Risse** in den Mundwinkeln oder in der **Mitte der Lippen**.
- Harte und schmerzhaftes Schwellung der submaxillären Lymphknoten.
- Die Lippen sind geschwollen und schälen sich leicht.

MUND

- Das Kind steckt ständig seine Finger in den Mund.
- Trockenheit des Mundes mit gesteigertem Durst.
- Vermehrter Speichelfluss im Schlaf oder bei Beschwerden durch Aphthen, schwierige Zahnung, Fieber oder bei Zahnschmerzen.
- Appetitverlust, kein Geschmacksempfinden bei Schnupfen.
- Wunder Mund bei Säuglingen, daher Schwierigkeiten und Schmerz beim Stillen.
- Neigt dazu, sich häufig auf die Zunge zu beißen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Landkartenzunge oder weiß belegt mit roten inselartigen Flecken.**
 - Ranula [Speichelzyste am Mundboden bedingt durch Verschluss des Ausführungsgangs der Sublingual- oder Submaxillardrüsen],
 - Tinea auf der Zunge.
 - Zahnbeläge.
 - Schwammiges, bläulich-rotes Zahnfleisch in der Umgebung verfallener Zähne; riecht sehr eitrig und blutet schnell.

HALS

- Würgt beim Schlucken von fester Nahrung; **muss mit jedem Mundvoll schluckweise Wasser zu sich nehmen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Abgemagert aussehender Hals.**
 - Dunkler, roter Rachen mit Follikeln.

MAGEN

- **Heißhunger ungefähr zwischen 10 und 11 Uhr.**
- Galliges oder saures Erbrechen mit Bauchschmerzen, schlimmer bei Fieber.
- Vergebliches und zu schwaches Aufstoßen nach dem Essen oder Trinken.
- Unstillbarer Durst auf große Mengen Wasser.
- Schnell Magenverstimmung durch Brot oder geringste Mengen fetter Nahrung, mit vermehrtem Speichelfluss.
- Heftiger Schluckauf.
- Verschlimmerung durch: Übermäßig viel Salz, Honig, ölige oder fettige Speisen.
- Abneigung: Bohnen, Butter, **Hühnchen, Eiweiß**, fette und ölige Speisen, **Honig**, Austern, **Erbsen**, Pudding, Salz, **schleimige Speisen, Gemüse.**
- Verlangen: **Bittere Speisen und Getränke**, schwarzer Pfeffer, **Brot**, verbrannte oder verkohlte Speisen (wie verbrannter Toast etc.), Schokolade, **eiskalte Getränke, Fisch** (besonders wenn er salzig ist), Knoblauch, **unverdauliche Dinge** (Kreide, Ton, Kalk, feuchter Matsch Bleistifte, etc.) Zitronen, Austern, **Pasta, salzige und saure Speisen**, Sauerkraut, **Essig** und warme Suppen.

ABDOMEN

- Eingeklemmte Blähungen, die sich im Bauch hin und her zu bewegen scheinen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ödematöses Abdomen mit abgemagerten Gliedern bei Kindern mit Marasmus.
 - Leber und Milz empfindlich und tastbar, besonders bei Fieber.
 - Hervortretender Nabel, aus dem Absonderungen hervorsickern (Abrot., Calc-p.).

REKTUM

- Verstopfung; das Kind hat jeden zweiten Tag Stuhlgang, der entweder sehr weich ist und zurückschlüpft oder sehr trocken und krümelig am Rande des After, mit oder ohne leichte Blutung.
- Durchfall abwechselnd mit Verstopfung.
- Unwillkürlicher Abgang von Stuhl bei Blähungsabgang.
- Übelriechende Blähungen.
- Schmerzloser Durchfall mit wässrigen, schwallartigen Stühlen, besonders in den Morgenstunden; schlimmer nach Genuss von ungewaschenem Obst oder Freilandgemüse und in den Sommermonaten.
- Wurmbeschwerden bei abgemagerten Kindern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ekzematöse oder herpetische Ausschläge um den Anus.
 - Rektalprolaps nach Stuhlgang.
 - Stuhl: Madenwürmer, Spulwürmer oder Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Kann nur Urin abgeben, wenn er allein im Raum ist (Ambr.).
- Häufiger vergeblicher Harndrang nachts, mit unwillkürlichem Abgang von Urin im Schlaf bei heranwachsenden Jungen.
- Unwillkürliches Urinieren, wenn er den Harndrang auch nur für kurze Zeit zurückhalten muss.
- Nützlich bei Zuständen wie Glomerulonephritis und nephrotischem Syndrom.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Harnröhrenverengung.
 - Urin: Albumin +, erhöhtes spezifisches Gewicht, Epithelzylinder ++, Glukose +, Lymphozyten +, Erythrozyten ++, Sediment ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Ödematöse Schwellung des Skrotums, mit zurückgezogener Vorhaut.
 - Übelriechender Schweiß der Genitalien.
 - Paraphimose.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Reichlicher, eiweißartiger Ausfluss nachts.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Heiser durch stimmliche Überanstrengung oder Singen.
- Tag und Nacht Kitzelempfinden im Kehlkopf, das zu einem trockenen Husten führt.

HUSTEN

- **Hustenanfälle durch Reizung oder Kitzelgefühl im Kehlkopf.**
- Anfälle von trockenem Husten beginnen sofort, **wenn er von draußen in ein warmes Zimmer kommt.**
- Der Husten scheint aus dem Magen zu kommen (Bry., Sep.) mit Würgen.
- Trockener oder rasselnder, krampfartiger Husten, Tag und Nacht, macht ihn atemlos und erschöpft.
- Nasenbluten und erhöhter Speichelfluss sind Begleitsymptome bei Husten.
- Der Auswurf ist blutdurchsetzt.
- Muss seine Brust mit beiden Händen halten beim Husten, um den Schmerz in der Brust zu mildern.
- Gähnen oder Niesen und Husten gleichzeitig.

BRUST

- Ängstliche und anämische Kinder, klagen über heftiges, hörbares Herzklopfen durch jedes seltsame Geräusch und beim Liegen auf der linken Seite; besser durch Liegen auf der rechten Seite.
- Lungentzündung bei Typhus.
- Nützlich in Fällen von verschleppter Rippenfellentzündung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Hervorstehende Schlüsselbeine** mit Abmagerung des umgebenden Bereiches.
 - Herzgeräusche bei Kindern, die an Endokarditis leiden.
 - Übelriechender Schweiß der Achselregion.

RÜCKEN

- Steifheit und krampfartiges Ziehen der Halsregion, besonders auf der linken Seite mit Kopfschmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Abmagerung der Halsregion.
 - Kernig-Zeichen +.

EXTREMITÄTEN

- Die Fußgelenke sind schwach und knicken leicht um (Nat-c.).
- Kontraktion der Muskeln in Waden, Kniesehnen, Händen und Kniescheibenbereich.
- Das Kind ist extrem ungeschickt beim Laufen und Tragen von Dingen; stolpert und lässt Dinge fallen.
- Chorea aus Furcht.
- Risse zwischen den Zehen, die heftig jucken.
- Zittern der Hände beim Versuch zu schreiben und durch Schreck.

- Trockenheit und Risse in der Haut um die Fingernägel.
- Wundheit zwischen den Zehen mit übelriechendem Fußschweiß.
- Nägel: Brüchig, deformiert, splitternd; eingewachsene Zehennägel und entzündete Niednägel.
- Die Haut der Hände ist verschrumpelt und verwelkt.

SCHLAF

- Das Kind hat beängstigende Träume, sogar beim Mittagsschlaf, die den Schlaf stören und ihm nach dem Erwachen real erscheinen.
- Kann nur in Bauchlage schlafen.
- Im Schlaf: Stöhnen, Gliederzucken, Sprechen oder Wimmern.
- Schlaflosigkeit bei Kleinkindern nach jeglichem Kummer.
- Sehr leichter und ruheloser Schlaf; die Kinder werfen sich dauernd herum und schrecken leicht zusammen durch das geringste Geräusch, sogar im Tiefschlaf.

FIEBER

- Vor dem Fieber (Prodromalstadium): Das Kind fürchtet den Frost, weil jeder Frostanfall mit heftigen Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen beginnt.
- Frost:
 - Ausgeprägter Durst im Froststadium mit heftigen Kopfschmerzen.
 - Starker Schüttelfrost in den Füßen, Fingern, Zehen oder im Kreuz (Gels.) beginnend.
 - Schlimmer am Morgen oder in den Vormittagsstunden (Nux-v.), nicht gebessert durch Wärme.
- Hitze:
 - Trockene Hustenanfälle beginnen in diesem Stadium, die einen starken Temperaturanstieg verursachen.
 - In diesem Stadium will sich das Kind abdecken.
 - Kopfschmerzen und gesteigerter Durst setzen sich auch in diesem Stadium fort, aber hier gibt es einen ausgeprägten Betäubungszustand (Bell., Bapt., Op.) mit übermäßiger Schwäche, die das Kind zum Hinlegen zwingen.
 - Das Kind neigt dazu, bei Fieber ungeduldig, gereizt und schläfrig zu werden.
- Schweiß:
 - Reichlicher und schwächender Schweiß nach dem Hitzestadium hinterlässt eine salzige Ablagerung auf Kissenbezügen und Laken.
 - Der Schweiß schwächt allmählich die Kopfschmerzen und das Fieber ab.
- Das charakteristische Merkmal ist der unstillbare Durst auf große Mengen Wasser in allen Fieberstadien.

HAUT

- Atopisches Ekzem, das am Meer schlimmer wird.
- Übermäßiger Haarwuchs bei Kindern, mit Neigung zu Ausschlägen an diesen Stellen.
- Ausgeprägte Trockenheit; kann einfach nicht schwitzen, selbst wenn er sich körperlich anstrengt.
- Ausschläge sondern eine weißliche oder gelbliche Flüssigkeit ab, die sehr ätzend ist und das Haar schädigt (Lyc., Rhus-t.).

- Trockenheit und Risse in der Haut um die Fingernägel.
- Wundheit zwischen den Zehen mit übelriechendem Fußschweiß.
- Nägel: Brüchig, deformiert, splitternd; eingewachsene Zehennägel und entzündete Niednägel.
- Die Haut der Hände ist verschrumpelt und verwelkt.

SCHLAF

- Das Kind hat beängstigende Träume, sogar beim Mittagsschlaf, die den Schlaf stören und ihm nach dem Erwachen real erscheinen.
- Kann nur in Bauchlage schlafen.
- Im Schlaf: Stöhnen, Gliederzucken, Sprechen oder Wimmern.
- Schlaflosigkeit bei Kleinkindern nach jeglichem Kummer.
- Sehr leichter und ruheloser Schlaf; die Kinder werfen sich dauernd herum und schrecken leicht zusammen durch das geringste Geräusch, sogar im Tiefschlaf.

FIEBER

- Vor dem Fieber (Prodromalstadium): Das Kind fürchtet den Frost, weil jeder Frostanfall mit heftigen Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen beginnt.
- Frost:
 - Ausgeprägter Durst im Froststadium mit heftigen Kopfschmerzen.
 - Starker Schüttelfrost in den Füßen, Fingern, Zehen oder im Kreuz (Gels.) beginnend.
 - Schlimmer am Morgen oder in den Vormittagsstunden (Nux-v.), nicht gebessert durch Wärme.
- Hitze:
 - Trockene Hustenanfälle beginnen in diesem Stadium, die einen starken Temperaturanstieg verursachen.
 - In diesem Stadium will sich das Kind abdecken.
 - Kopfschmerzen und gesteigerter Durst setzen sich auch in diesem Stadium fort, aber hier gibt es einen ausgeprägten Betäubungszustand (Bell., Bapt., Op.) mit übermäßiger Schwäche, die das Kind zum Hinlegen zwingen.
 - Das Kind neigt dazu, bei Fieber ungeduldig, gereizt und schläfrig zu werden.
- Schweiß:
 - Reichlicher und schwächender Schweiß nach dem Hitzestadium hinterlässt eine salzige Ablagerung auf Kissenbezügen und Laken.
 - Der Schweiß schwächt allmählich die Kopfschmerzen und das Fieber ab.
- Das charakteristische Merkmal ist der unstillbare Durst auf große Mengen Wasser in allen Fieberstadien.

HAUT

- Atopisches Ekzem, das am Meer schlimmer wird.
- Übermäßiger Haarwuchs bei Kindern, mit Neigung zu Ausschlägen an diesen Stellen.
- Ausgeprägte Trockenheit; kann einfach nicht schwitzen, selbst wenn er sich körperlich anstrengt.
- Ausschläge sondern eine weißliche oder gelbliche Flüssigkeit ab, die sehr ätzend ist und das Haar schädigt (Lyc., Rhus-t.).

- Masern mit dem Begleitsymptom des erhöhten Speichelflusses.
- Nesselausschlag mit intensivem Hautjucken; schlimmer durch die geringste Wärmeeinwirkung und durch körperliche Bewegung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Flache Warzen.
 - Herpetischer Ausschlag mit Fieber.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Fieber, Schreck, Vollmond, Kummer.
- Aura: Geistesabwesenheit mit allgemeinem Gefühl von Angst oder Furcht.
- Während Konvulsionen: Klonisches Zucken, besonders auf der linken Körperseite, unwillkürliches Urinieren, blasses Gesicht und Schwindel.

ALLGEMEINES

- Beschwerden durch Missbrauch allopathischer Medikamente (besonders Chinin) und Masturbation.
- Kinder mit persönlicher oder Familiengeschichte von Tuberkulose, Angst und Depression.
- Fröstelig mit Abneigung, sich aufzudecken, aber hat großes Verlangen, draußen im Freien zu sein und in kaltem Wasser zu baden.
- Chorea durch Ermahnung oder Emotionen (Zorn, Angst, Schreck, Kummer).
- Generalisierte Ödeme aufgrund von Leber- oder Herzerkrankungen.
- Lethargie mit dem Verlangen, sich nach dem Essen hinzulegen, was bessert.
- Lähmungen, die durch Schreck oder andere Emotionen ausgelöst wurden.
- Perniziöse Anämie durch Kummer, Blutungen oder erschöpfende Krankheiten.
- Verstauchungen oder Verrenkungen durch Überdehnung oder Überanstrengung der Muskeln.
- Erkältungsneigung.
- Zitterige Schwäche durch die geringste Anstrengung bei blassen anämischen Kindern.
- Schlimmer im Sommer und bei kaltem feuchtem Wetter

NATRIUM SILICIUM

(Natriumsilikat - Nat-sil.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Kinder mit großem **Mitgefühl für Tiere** und tiefer Zuneigung zu ihnen (eine Art Übertragung der Gefühle vom Menschen auf die Tiere).
- ▶ Das Kind versteckt seine Gefühle und wirkt nach außen sehr ruhig und still.
- ▶ Kinder, die verlassen oder vernachlässigt wurden und von ihren Familien entfremdet sind.

KÖRPER

- ▶ Beschwerden nach Impfung.
- ▶ Abneigung gegen oder schlimmer durch Kälte und im Freien, besser nach einem heißen Bad.
- ▶ Schmale, dünne, schnell abmagernde Kinder mit zarter Konstitution.

EINIGE GEMEINSAME SYMPTOME MIT IGN., NAT-M. UND SIL.:

- Liebevoll, herzlich.
- Ungeschickt.
- Verstopfung mit hartem Stuhl.
- Verlangen zu tanzen, was auch bessert.
- Verlangen nach oder Abneigung gegen Süßes.
- Träume von Geistern, von Wasser.
- Unentschlossenheit.
- Faulheit.
- Sentimental.
- Stiller Kummer.
- Saurer Schweiß.
- Mitfühlend.
- Erkältungsneigung.
- Kleinigkeiten erscheinen wichtig.
- Schlimmer durch Milchtrinken.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Abneigung gegen Gesellschaft mit Verlangen nach Einsamkeit**, was bessert.
- **Ungeschicklichkeit**; lässt Dinge fallen, stößt beim Laufen an Gegenstände usw.
- **Kann niemals weinen, wie traurig er auch sein mag.**

- **Tanzen und Musik bessert die meisten Geistessymptome;** singt auch gern.
- **Dyslexie durch Kummer:** Macht viele Fehler beim Rechnen, Sprechen oder Schreiben; gibt die falschen Antworten oder vergisst oder verdreht die Buchstaben oder Wörter in einem Satz; Abneigung zu schreiben.
- **Faul und unentschlossen, auch bei unbedeutenden Dingen.**
- Liebevolle und gefühlvolle Kinder.
- Antwortet langsam und oft unzutreffend.
- Abneigung zu baden.
- Kann sehr schroff, kritiksüchtig und grob sein; haben einen scharfen Tonfall.
- Kinder, die empfindlich sind gegen Grobheit und die Meinung anderer.
- Hellsichtigkeit.
- Depression und Traurigkeit infolge von Vernachlässigung und Mangel an Liebe. Die Depression ist charakterisiert durch Abneigung gegen Gesellschaft, Abneigung zu lesen, Brüten, Geistesverwirrung, Verzweiflung, Unzufriedenheit mit allem, Langeweile, impulsive Laune, Inaktivität, Gleichgültigkeit gegen die Umgebung, traurige Träume oder Träume von Versagen und steilen Abgründen, Selbstmitleid. Die Depression wird immer gebessert durch Tanzen, Laufen oder jede andere Art physischer Anstrengung.
- Verlangen nach Mitgefühl.
- Furcht vor Versagen mit Vergesslichkeit, besonders vor Prüfungen.
- Erschrickt und fährt zusammen durch das geringste Geräusch oder im Schlaf.
- Unentschlossenheit bei Kleinigkeiten, mit Faulheit.
- Schlägt seinen Kopf im Zorn gegen Dinge.
- Verlust des Selbstvertrauens.
- Tierliebe und sehr mitfühlend mit ihnen.
- Zwangsneurosen; wie ständiges Händewaschen, alles immer wieder kontrollieren etc.
- Fängt viele Hobbys an, aber hält keins durch.

KOPF

- Der Kopf ist extrem empfindlich gegen Kämmen.
- Kopfschmerzen nach jeder Gefühlsregung und vor Gewittern.
- Jucken der Kopfhaut durch Schweiß; muss sich kratzen, um sich besser zu fühlen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kalter Schweiß auf der Stirn.
 - Ausschläge am Haaransatz.
 - Haar: Trocken, brüchig, verwirrt sich leicht und bricht beim Kämmen ab.

AUGEN

- Brennende Augen beim Lesen oder Schreiben.
- Tränenfluss beim Husten, im Freien oder bei Schnupfen.
- Eitrige Absonderungen aus den Augen, die am Morgen verkleben.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Das Kind reibt sich dauernd die Augen.
 - Refraktionsfehler.
 - Schwellung der Oberlider mit Unfähigkeit, sie zu öffnen, besonders morgens beim Erwachen.

OHREN

- Intensives Jucken im linken Ohr; kratzt bis es blutet.
- Untersuchungsergebnis:
 - Ausschläge um die Ohren.

NASE

- Überempfindlicher Geruchssinn.
- Heuschnupfen.
- Verstopfung der Nase nachts und beim Hinlegen.
- Niesanfälle mit Jucken in den Nasenlöchern, besonders dem linken, morgens beim Erwachen, im Freien und durch Gerüche (Blumen, Parfum, Tabak, Rauch etc.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Absonderung der hinteren Nasenhöhle, besonders am Morgen.
 - Gelbe oder gelblich-grüne Absonderung aus der Nase.

GESICHT

- Hitze der Wangen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Trockene und rissige Lippen, besonders in den Mundwinkeln.
 - Ekzematöse Ausschläge am Haaransatz.
 - Fettige Stirn.
 - Schwellung unter den Augen, besonders morgens beim Erwachen.

MUND

- Beißen sich in die Innenseite der Wangen beim Sprechen oder Kauen (Ign.).
- Trockener Mund, trotzdem durstlos.
- Zahnfleisch blutet schnell und ist empfindlich und schmerzhaft beim Kauen.
- Übelriechender Mundgeruch morgens.
- Zahnschmerzen nach Füllung oder anderen zahnärztlichen Eingriffen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Beißt sich dauernd auf die Unterlippe.
 - Zahnkaries, besonders an den Zahnfleischrändern.
 - Zahnfleischentzündung, besonders entlang der Schneidezähne.
 - Zäher Speichel.

MAGEN

- Heißhunger nachts.
- Durst am Morgen beim Erwachen, dann den ganzen Tag durstlos.
- Abneigung: Brokkoli, gekochte Speisen, Fleisch, **Muttermilch**, ölige und fette Speisen, warme Speisen und Getränke.
- Verlangen: **Mandeln**, Käse, Hühnchen, Schokolade, Kaffee, **kalte Speisen**, **hartgekochte Eier**, Fisch, Früchte, Eiscreme, Limonade, Backwaren, scharf Gewürztes, Tee, Tomaten, Joghurt.

REKTUM

- Fettige und klebrige Stühle gehen mit einer Menge übelriechender Blähungen ab.
- Schmerzloser Durchfall beim Aufstehen am Morgen.

HARNWEGE

- Reichlicher, schaumiger, übelriechender, dunkelgelber oder orangefarbener Urin.
- Unwillkürliches Urinieren beim Husten.
- Plötzlicher Harndrang; muss sich beeilen, um zu urinieren, sonst würde Urin vorher abgehen.

ATMUNG

- Atemlos im Schlaf, besonders nach Mitternacht.
- Atemlos durch die geringste Anstrengung.

HUSTEN

- Husten durch Trockenheit und Kitzeln in Hals und Kehlkopf.
- Husten sofort beim Erwachen.
- Schaumiger, grüner Auswurf.
- Plötzliche, krampfartige Hustenanfälle abends beim Schlafengehen; besser durch schluckweises Wassertrinken.

BRUST

- Übelriechender Schweiß der Achselhöhlen.

RÜCKEN

- Schweiß auf dem Rücken.
- Rheumatische Schmerzen in der Halsregion, besser durch heiße Umschläge.

EXTREMITÄTEN

- Ungeschicklichkeit beim Gehen oder Halten von Dingen; stolpert dauernd oder lässt Dinge fallen.
- Muskelkrämpfe und Anspannung in den Waden.
- Übelriechender Fußschweiß, der die Haut wund macht, auch zwischen den Zehen.
- Schmerzen in Hand-, Finger- und Daumengelenken beim Schreiben.
- Schmerzhaftes Schwellen der Fußgelenke.
- Zittern der Hände bei der Ausführung feiner Arbeiten wie Malen oder Sticken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Brüchige Nägel.
 - Trockene, raue Hände.
 - Exostosen an den Fingern.
 - Eisige Kälte der Hände, Füße und Zehen.
 - Blasige Ausschläge an den Unterarmen mit intensivem Jucken.
 - Warzen an den Fingerspitzen.

SCHLAF

- Sehr leichter Schlaf; erwacht durch das geringste Geräusch und durch Husten.
- Hat Alpträume und beängstigende Träume von Geistern; einem steilen Abgrund; wilden Tieren, die ihn verfolgen etc.
- Die ganze Nacht schlaflos und ruhelos mit viel Umherwerfen, deshalb ist es morgens schwierig zu erwachen.

ALLGEMEINES

- Verlangen nach körperlicher Anstrengung, die bessert, aber jegliche geistige Anstrengung verschlimmert.
- Ölige Schweißbildung mit saurem oder üblem Geruch, besonders nachts oder durch die geringste Anstrengung.
- Drüsenverhärtung.
- Mangel an Lebenswärme; schlimmer durch Kälte und im Freien, besser durch ein heißes Bad.
- Rezidivierende Abszesse; nützlich zur Beschleunigung der Eiterung eines hartnäckigen Abszesses.
- Träge und lethargisch mit dauerndem Verlangen, sich tagsüber hinzulegen.
- Erkältungsneigung.
- Schlimmer bei Heraufziehen eines Gewitters und bei Vollmond.

NATRIUM SULPHURICUM

(Natriumsulfat - Nat-s.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Verhaltensstörungen nach einer Kopfverletzung** (Sportverletzungen, Verkehrsunfälle etc.).
- ▶ Kinder, die beim Erwachen gereizt und aggressiv sind; wollen nicht sprechen oder angesprochen werden (Iod, Lyc, Sil).
- ▶ Leidenschaftlicher Ehrgeiz in der Schule und beim Lernen.
- ▶ Sehr verletzlich bei Konflikten, meidet deshalb jede Auseinandersetzung.

KÖRPER

- ▶ **Asthma bei Kindern mit ausgeprägt sykotischer Familienanamnese** (Arthritis, Krebs, Gonorrhoe, Gicht, Rheuma, Warzen etc.).
- ▶ Kinder, die keine Seeluft vertragen und auch kein Gemüse oder Obst essen können, das von der Küste kommt oder aus sumpfigen Gegenden oder in Flussnähe wächst.
- ▶ Kinder, die sich nach einer Neugeborenenengelbsucht oder Hepatitis A nur langsam wieder erholen.
- ▶ Schmutzig-brauner Zungenbelag (Bry., Nat-p.).
- ▶ Hautausschläge oder Ekzeme jeden Frühling (Psor.).
- ▶ Extrem fröstelig, werden sogar im Sommer nicht warm genug.
- ▶ Kolonkarzinom, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn in der Familie.
- ▶ Vererbtes Asthma bei jedem Wechsel zu feuchtem Wetter, Regenschauer oder Kälteeinbruch.
- ▶ Säuglings- oder Blähungskolik zwischen 2-3 Uhr.
- ▶ Neugeborene und Säuglinge, die nie wirklich gesund waren, nachdem sie bei der Geburt eine Kopfverletzung erlitten (Zangengeburt, Saugglocke oder andere Traumata).
- ▶ Nie wieder erholt seit einer Meningitis.
- ▶ Gelbliche oder grünliche, wässrige oder dicke Absonderungen (Schnupfen, Auswurf, Ekzemsekret, Stuhl etc.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Geistesverwirrung, Stumpfheit und Traurigkeit nach Unfällen oder Kopfverletzungen.**
- **Starkes Pflicht- und Verantwortungsgefühl.**
- Liebevolle, herzliche Kinder mit großer künstlerischer Begabung.
- Ungeschickt.
- Heiter nach Stuhlgang.
- Lustlos und faul nach dem Frühstück und nach dem Mittagsschlaf (Nat-c.).
- Furcht vor öffentlichen Auftritten, an engen Orten und vor Geräuschen.
- Hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und sich geistig anzustrengen.
- Reizbarkeit morgens beim Aufstehen, besser abends und nach dem Essen.
- Eifersucht.
- Sentimental.
- Gute Beobachtungsgabe und Selbstwahrnehmung.
- Sehr empfindlich gegen Vorwürfe.

KOPF

- **Hirnödeme** und Verletzungen bei **Zangengeburten.**
- Kopfschmerzen durch Verstopfung, jeden Sommer und geistige Anstrengung; begleitet von Schmerzen im Nacken, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen; besser durch Druck und Waschen des Kopfes mit kaltem Wasser.
- Meningitis.
- Reichlicher Schweiß der Kopfhaut beim Lesen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krusten- oder Schuppenbildung auf der Kopfhaut.
 - Der Kopf wird nach hinten gezogen.
 - Unwillkürliches Kopfrucken von einer Seite zur anderen.

AUGEN

- Brennende Augen, wenn er ins Feuer schaut oder liest, besonders nachts.
- Die Augenlider sind am Morgen verklebt.
- Jucken an den Lidrändern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Granulierte Lider.
 - Ptosis.
 - Bindehautentzündung mit Pustelbildung.

NASE

- **Eitriger, dicker, gelblich-grüner Schnupfen.**
- Nasenbluten im Schlaf.
- Verstopfte Nase in der Nacht.
- Niesen bei Heuschnupfen.
- Untersuchungsergebnis:
 - Schmutzige Nasenlöcher (Sep.), voller trockener, grünlicher Schuppen und Krusten.

GESICHT

- Blasses Gesicht **beim Erwachen** am Morgen.
- **Gesichtschweiß nach dem Stillen.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krustige Ausschläge auf der Nase.
 - Trockene Lippen, die Haut schält sich ab.
 - Eingefallenes Gesicht.
 - Schwellung der submaxillären Lymphknoten.

MUND

- Das Kind steckt dauernd die Finger in den Mund.
- Schwierigkeiten, den Mund zu öffnen.
- Vermehrter Speichelfluss nach Essen.
- Zahnschmerzen sind besser durch kaltes Wasser im Mund.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dicker, gelblich-brauner oder **grünlich-grauer** Zungenbelag, besonders an der hinteren Oberfläche.
 - Mundgeruch.
 - Vereiterung des Zahnfleisches mit Ulzerationsneigung.

HALS

- Würgen beim Schlucken von Flüssigkeiten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Dicker, gelber Schleim** wird aus den hinteren Nasenhöhlen gezogen.
 - Verlängertes Zäpfchen.
 - Geschwollene Mandeln, mit Schwellung der zervikalen Lymphknoten.
 - Pulsierende Halsschlagadern.

MAGEN

- Periodisches, **gelblich-grünes oder schwarzes Galleerbrechen** mit Kopfschmerzen und nach Ärger.
- **Magenstörungen nach dem Verzehr von Mehlspeisen.**
- Aufstoßen nach dem Stillen.
- Völle und Auftreibung in der Magengegend nach dem Füttern, mit Atembeklemmung.
- Schluckauf nach Brot und Butter.
- Viel Durst und Verlangen auf Saures nach Kopfschmerzen.
- Saures Aufstoßen.
- Verschlimmerung: Obst und Gemüse.
- Abneigung: Brot, Fleisch, **Milch**, Kartoffeln, **Joghurt**.
- Verlangen: Eiskaltes Wasser, Eiscreme, **salziger Fisch, Joghurt**.

ABDOMEN

- **Gelbsucht** mit Durchfall und Schmerzen im rechten Hypochondrium **nach Zorn** (Cham.); **schlimmer durch Erschütterung** und beim Husten; besser durch Liegen auf der rechten Seite mit angezogenen Beinen.

- **Laktoseintoleranz.** Tympanitische Auftreibung des Abdomens mit eingeklemmten Blähungen, besonders nach Milch.
- Die Bauchregion ist sehr empfindlich gegen Kleidung.
- Colitis bei feuchtem Wetter (Gels.).
- Schneidende, krampfende Schmerzen im Abdomen bei Säuglingen, begleitet von Blähungen; das Kind fühlt sich besser nach Abgang von Stuhl oder Blähungen und wenn sein Bauch geknetet wird.
- Schmerz in der Ileozoekalregion.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Appendizitis.
 - Entzündliche Schwellung der Mesenterialdrüsen.
 - Empfindlichkeit von Leber- und Milzregion.
 - Colitis ulcerosa.

REKTUM

- **Durchfall nach kalten Getränken im Sommer;** schmerzloser Durchfall nach Mehlspeisen, **Obst**, Eiscreme, Kuchen, **reichhaltigem Essen** und **Gemüse**.
- Brennende Schmerzen und Tenesmus im Rektum beim Stuhlgang.
- Durchfall nach Husten und bei Gelbsucht, besonders bei feuchtem Wetter und im Winter, beim Erwachen am Morgen; gelblich-grüne, übelriechende, laute herausspritzende Stühle, blutgestreift.
- Unwillkürlicher Stuhlgang im Schlaf, beim Abgang von Blähungen und beim Urinieren.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zysten und Trophozoiten von *Entamoeba histolytica*.
 - Zysten von *Giardia lamblia*.
 - Jucken um die Analregion.
 - Prolaps und Ulzeration des Rektums.
 - Stuhl: Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Akute Entzündung des Nierenparenchyms.
- Reichliches Urinieren nachts.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rosafarbener Urin, der gelbliches oder rötliches Sediment in der Windel hinterlässt.
 - Urin: Albumin ++, Galle ++, Glukose ++, erhöhtes spezifisches Gewicht, Phosphate.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Ödematöse Schwellung von Penis und Skrotum.
 - Schweiß des Skrotums.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Reichlicher, dicker, gelblich-grüner Ausfluss.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Geräusch von Schleimrasseln im Kehlkopf nach dem Stillen.

ATMUNG

- **Asthma nach Heuschnupfen oder nach jeder Erkältung.**
- **Asthma durch Kummer** (Tod der Eltern oder eines Haustieres).
- Asthmatische Atmung beginnt im Schlaf.
- Atemlosigkeit durch die geringste Anstrengung oder Bewegung und nach dem Essen aufgrund von Blähungen; besser durch Aufrechtsitzen und im Freien.
- Dauerndes Verlangen, lang und tief durchzuatmen.
- Atemnot bei Säuglingen von 4-5 Uhr.
- Periodisches Asthma, hervorgerufen durch kaltes, feuchtes Wetter.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rasselnde Atmung.
 - Keuchen.

HUSTEN

- **Asthmatischer Husten durch feuchtes Wetter.**
- Trockener Husten durch Kitzeln im Kehlkopf.
- Auswurf von grünem, reichlichem Schleim.
- Unfähigkeit zu husten durch Schmerzen in der Brust.
- Lockerer, rasselnder und heftiger Husten morgens beim Aufstehen und nachts nach 4 Uhr; muss sich im Bett aufsetzen oder ins Freie gehen.

BRUST

- Wunder, wie zerschlagener Schmerz in den Seiten beim Husten; muss sich aufrecht setzen und die Brust beim Husten mit beiden Händen halten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Röntgen/Thorax: Verdichtung im linken unteren Lappen.
 - Krämpfe der Brustmuskulatur.
 - Schwellung der Achseldrüsen.
 - Tuberkulose.

RÜCKEN

- Rückenschmerzen nach Verletzung und bei Fieber.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Opisthotonus.
 - Spinale Meningitis.

EXTREMITÄTEN

- Jucken zwischen den Fingern.
- Zittern der Hände beim Schreiben.
- Schwäche und Schmerz in den Gliedern bei und nach Fieber.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Kälte der Hände und Füße.
 - Ödematöse Schwellung der Füße.

- Niednägel.
- Hitze der Beine und Handrücken bei Fieber.
- Empfindliche Schwielen an den Fußsohlen.
- Blasige Ausschläge an den Händen.
- Warzen an Händen und Fußsohlen.

SCHLAF

- Muskelzucken im Schlaf.
- Wechselt häufig die Schlaflage.
- Schläfrigkeit beim Lesen oder Schreiben.

HAUT

- Neugeborenenengelbsucht mit gelblicher oder grünlicher Verfärbung der Haut, besonders nach Zorn.
- Untersuchungsergebnis:
 - Warzen.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Kopfverletzungen oder cerebrospinale Meningitis.
- Epileptiforme Konvulsionen.

ALLGEMEINES

- **Beschwerden durch** herannahendes Gewitter; Wetterwechsel von kalt nach warm; chronische Verletzungen; **kaltetes, feuchtes Wetter; Kopfverletzungen; Nasswerden;** chininhaltige Produkte.
- Allergische Konstitution.
- Anämie.
- Besser im Freien.
- Abgemagerte Kinder mit juvenilem Diabetes, Laktoseintoleranz oder Malabsorptionssyndrom.
- Intoleranz gegen Kleidung.
- Schweiß bei der geringsten Anstrengung.
- Leukämie (Ben.).
- Deutliche Familiengeschichte von Asthma, Dickdarmkrebs, M. Crohn oder Colitis ulcerosa.
- Schwäche nach Stuhlgang oder Erbrechen.

NITRICUM ACIDUM

(Salpetersäure - Nit-ac.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Unzufriedene Kinder;** immer am Jammern und kaum zufriedenzustellen.
- ▶ **Dickköpfig und unsensibel;** weigert sich, die Gefühle anderer zu verstehen.
- ▶ **Geräuschempfindlich,** besonders gegen Rasseln, Musikspielzeug und Knaller.
- ▶ Heftiger Zorn und Wutanfälle mit Fluchen.
- ▶ Kinder sind untröstlich bei einem Verlust von engen Freunden, Verwandten oder Klassenkameraden.
- ▶ Schnell erregt und zornig nach einer Amalgamfüllung (Quecksilber).
- ▶ Morgens gereizt durch unerquicklichen Schlaf.
- ▶ Bleibt sehr lange feindselig, wenn ihn jemand beleidigt hat.
- ▶ Egoistische Kinder, die weder Kleider noch Schreibzeug oder Spielsachen mit anderen teilen wollen.
- ▶ Empfindliche Kinder, die bei den geringsten Sorgen oder durch Schelte gleich losheulen.
- ▶ Ärgert sich bei jeder Kleinigkeit.

KÖRPER

- ▶ Reichlicher Nachtschweiß.
- ▶ Kinder, die zu Durchfall neigen (Calc., Phos.).
- ▶ Kinder mit Erkältungsneigung.
- ▶ Kinder mit dunkler Hautfarbe, schwarzen Haaren und Augen.
- ▶ Eisige Kälte der Fußsohlen.
- ▶ Die meisten körperlichen und geistigen Symptome werden besser, wenn das Kind auf eine lange Fahrt mitgenommen wird.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Abneigung, liebkost zu werden** (Sacch.) oder getröstet.
- **Grundloses Weinen bei Babys.**
- **Verächtliche Kinder;** entwickeln Hass auf Personen, die sie misshandelt, vernachlässigt, beleidigt, bestraft oder getadelt haben. Der Hass kann über Jahre fortbestehen, selbst bis ins Erwachsenenalter.

- Emotionale Probleme bei Kindern, bei denen es **dauernde Kämpfe zwischen den Eltern** (Mag-m., Nat-m.) gibt oder wenn die Kinder vor Fremden getadelt werden.
- **Erhöhte Empfindlichkeit gegen Geräusche und Musik.**
- **Intelligente, aber hartherzige Kinder**, denen es an Gefühlen oder emotionaler Verbundenheit zu anderen mangelt; sie lächeln fast nie.
- Immer geneigt, Autoritäten zu widersprechen oder zu trotzen (Nat-m., Tub.).
- Abneigung, berührt zu werden aufgrund extremer Empfindlichkeit und Kitzeligkeit.
- Abneigung, gewaschen oder gebadet zu werden.
- Launisch.
- Dauerndes Nägelkauen.
- Unzufrieden mit allem (Frustration wegen Angst um die Gesundheit und Angst vor Vernachlässigung durch die Familie).
- Isst und trinkt hastig und gierig.
- Aufregung durch einen Streit (Caust.), mit heftigem Herzklopfen.
- Fühlt sich verlassen und von seiner Familie entfremdet.
- Erschrickt schnell über Kleinigkeiten; mit deutlicher Furcht vor Gewitter.
- Gierig und selbstsüchtig, mit Mangel an Moralempfinden; sehr schlau und gerissen.
- Ruft sich ständig vergangene unangenehme Erinnerungen ins Gedächtnis zurück und verweilt dabei.
- Dickköpfige Kinder, die Wutanfälle bekommen und in heftige Rage geraten mit Kreischen, Fluchen und Spucken, durch den geringsten Widerspruch, durch Ermahnung oder Vorhaltung und wenn ihre Launen nicht befriedigt werden.
- Starkes Pflichtgefühl.
- Redet in sehr grobem und schroffem Ton.

KOPF

- Heftige Kopfschmerzen, nach Verletzungen oder Prellungen, verbunden mit Übelkeit und Erbrechen; **schlimmer durch das geringste Geräusch oder Erschütterung.**
- Schmerzhaft empfindliche Kopfhaut gegen den Druck einer Kopfbedeckung (Chel., Lyc.).
- Schweiß auf der Stirn beim Essen (Carbo-veg., Nux-v.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Der Kopf wird nach hinten gezogen.
 - Erhöhter intrakranieller Druck.
 - Läuse.
 - MRT: Hirnblutung; raumfordernde Prozesse.
 - Aufgedunsene Schwellung der Kopfhaut bei Säuglingen (nach Saugglocke).
 - Schuppige, ekzematöse Ausschläge entlang des Haaransatzes am Hinterkopf (Nat-m.).

AUGEN

- Verklebung der Lider, die am Morgen schwierig zu öffnen sind.
- Trübsichtigkeit bei Kopfschmerz und beim Lesen.
- Tränenfluss beim Lesen und im Freien.

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Warzen auf den Unterlidern, die bei Berührung leicht bluten.**
 - Hornhauttrübung (Zinc-s.).
 - Erweiterte Pupillen, träge Reaktion auf Licht.
 - Auswärts- oder Einwärtskehrung der Lider.
 - Verhärtete Geschwülste auf den Lidern.
 - Iritis mit Verklebung.
 - Tränengangsfistel.
 - Limbus verstopft (Apis, Kali-bi.).
 - Ptose, des rechten Oberlides.
 - Rötung und Entzündung der Augen.

OHREN

- **Taubheit oder vermindertes Hörvermögen nach Masern oder Typhus.**
- **Vermindertes Hörvermögen durch rezidivierende Mittelohrentzündungen oder vergrößerte Mandeln.**
- Ohrenschmerzen, besonders im rechten Ohr mit Wundheitsschmerz im Hals; schlimmer beim Schlucken.
- Entzündung der Eustachischen Röhre bei Mittelohrentzündung durch rezidivierende Infektionen der oberen Atemwege.
- Kaugeräusche hallen im Ohr wider.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Atopisches Ekzem hinter dem Ohr läppchen.
 - Heraussickern von stinkendem, braunem Ohrenschmalz oder blutigen Absonderungen aus dem rechten Ohr, nach Masern.
 - Schwellung und Eiterung der Lymphknoten vor und hinter den Ohren.

NASE

- **Nasenbluten mit dunklem, dünnem Blut, das schnell gerinnt, nachts im Schlaf und beim Weinen.**
- **Heftiges, anfallsweises Niesen durch den geringsten Luftzug,** mit reichlichem, wässrigem, scharfem, tropfendem Schnupfen, der die Stirn- und Kieferhöhlen verstopft (Kali-i.).
- Dauerndes Zupfen an der Nase durch Jucken in den Nasenlöchern (Cina, Teuer.).
- Absteigende Erkältungen, mit retronasalem Katarrh.
- Die Nasenlöcher sind nachts im Schlaf verstopft, besonders das linke Nasenloch (Kali-bi.), was ihn mit einem Zusammenschrecken erwachen lässt.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Warzen auf der Nase und in den Nasenlöchern (Caust.).**
 - Stinkende, grünliche, wundmachende Absonderung, die harte Krusten und Schuppen hinterlässt; wenn sie abgelöst werden, erscheint eine sehr empfindliche, raue und blutige Oberfläche, bis sich neue Krusten bilden (Kali-bi., Lac-c.).
 - Nasenpolypen.
 - Rote, schuppige Spitze, mit Rissen an den Winkeln der Nasenlöcher.
 - Ulzerationen in den Nasenlöchern.

GESICHT

- **Rissige und vereiterte Lippen und Mundwinkel durch ätzenden Speichelfluss.**
- Totenblasses Gesicht, das beim Husten dunkelrot wird.
- Verzerrung des Gesichtes beim Schlucken wegen Schmerzen.
- Trocken, rissig und geschwollen durch dauerndes Zupfen und Abschälen (Arum-t.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Weiche Akne** mit verhärteter Basis.
 - **Warzen auf den Lippen** (Caust., Kali-s.).
 - Sommersprossen.
 - Blasses, eingefallenes Gesicht.
 - Submaxilläre Lymphknoten und Ohrspeicheldrüsen vergrößert.

MUND

- **Beißt sich in die Wange beim Sprechen und Kauen** (Caust., Ign.).
- Schwierige Zahnung mit schwarzen, fauligen Zähnen (Chin., Kreos.).
- Zahnfleisch blutet schnell, mit Neigung zu Eiterfluss.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schlaaffe Zunge, mit dickem, gelblichem oder grünlichem schleimigem Belag und **Risse in alle Richtungen** (Fl-ac.).
 - Schmutzig aussehende, aphthenartige Ulzerationen an den Seiten der Zunge und im Gaumen, mit speckiger Basis.
 - Fauliger Mundgeruch.
 - Ranula [Mundbodenzyste].
 - Mundsoor.

HALS

- **Halsschmerzen erstrecken sich zu den Ohren beim Schlucken** (Elaps, Phyt.).
- Würgen beim Schlucken von Festem oder Flüssigem, durch Verkrampfung der Speiseröhre.
- Chronische, rezidivierende Mandelentzündungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Schweiß des äußeren Halses nachts.**
 - **Warzen am Hals.**
 - Zervikale Lymphknoten vergrößert und empfindlich durch Eiterungsneigung.
 - Ödematöse Schwellung des Zäpfchens.
 - Dicker, gelber retronasaler Katarrh.

MAGEN

- **Kann keine fetten Speisen oder Milch** in jeglicher Form vertragen; sie verursachen Verdauungsstörungen, Übelkeit etc.
- Abneigung gegen Essen, nachdem er wenige Bissen gegessen hat.
- Aufstoßen nach dem Stillen.
- Muss während der Mahlzeiten oder beim Erwachen am Morgen viel Wasser trinken.
- „Aufstoßen“ bei Schnupfen und nach dem Trinken

Erde, Kalk, Griffel etc.), Limonade, Hammel, Schwein, scharf Gewürztes, **Salz**, salziger Fisch, Süßigkeiten.

ABDOMEN

- **Gluckern beim Essen.**
- Chronische Hepatitis durch Amoebiasis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Leistenlymphknoten vergrößert.
 - Paralytischer Ileus.
 - Milz und Leber vergrößert, hart und berührungsempfindlich.
 - Einklemmter Leistenbruch (Nux-v., Op.).

REKTUM

- **Das Kind ist sehr gereizt und ruhelos nach Stuhlgang durch die Schmerzen im Rektum.**
- Absolute Inaktivität des Rektums oder krampfartige Zusammenziehung der Rektalmuskeln, verursacht schwere Verstopfung bei Kleinkindern mit Schwierigkeiten, selbst weichen Stuhl abzusetzen.
- Scharfe Stühle, die den Anus wund machen oder zerreißen, obwohl sie weich sind.
- Durchfall in den Wintermonaten (Nat-s.).
- Jucken des Anus durch Spulwürmer.
- Übelriechende Blähungen.
- Stuhl: Trocken und hart, wie schwarze Kugeln, mit Blutstreifen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Hervorsickern einer scharfen Feuchtigkeit aus dem Rektum** (Carbo-veg., Merc-c., Thuj.).
 - Fissuren.
 - Polypen.
 - Rektumprolaps.
 - Äußere Hämorrhoiden.

HARNWEGE

- Unwillkürliches Urinieren beim Husten und nachts.
- Spärlicher Urin bei Fieber mit heftigen Schmerzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Krampfartige Verengung der Harnröhre (Canth.).
 - Rötliches Sediment in den Windeln.
 - Rötung, Ulzeration und Zusammenkleben der äußeren Harnröhrenöffnung.
 - Urin: Albumin ++, Bilirubin +, Eiter +, Erythrozyten ++, erhöhtes spezifisches Gewicht, Glukose ++.
 - Der Urin hat einen starken ammoniakalischen Geruch (Mosch.).

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnisse:

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Krupp mit Kehlkopfverengung im Schlaf (Lach., Spong.).
- Heiserkeit bei jeder Erkältung (Ipec.), schlimmer durch Sprechen.

ATMUNG

- Atemlosigkeit morgens beim Erwachen und nach dem Sprechen; besser durch Auswurf.
- Atemnot im Schlaf und beim Husten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Pfeifende, röchelnde Atmung.
 - Pfeifende Atmung beim Einatmen.

HUSTEN

- Bellender Husten abends und im Schlaf.
- Hustenanfälle ausgelöst durch Nasswerden oder kalte Zugluft. Auswurf nur morgens; schleimig-eitrig, gelblich oder grünlich, blutdurchzogen und übelriechend.
- Kurzer, trockener, hackender Husten durch Kitzeln im Kehlkopf nachts bis Mitternacht; lockerer Husten am Morgen.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Übelriechender Achselschweiß.**
 - **Schwellung der Achseldrüsen**, neigen zur Eiterung und Abszessbildung.
 - Herzgeräusche.
 - Verschleppte Lungen- und Rippenfellentzündung.
 - Pneumonische Beschwerden bei Typhus.
 - Lungentuberkulose.
 - Warzen auf dem Brustbein.

HERZ UND KREISLAUF

- Herzklopfen durch die geringste Bewegung oder Aufregung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Puls: schnell, **intermittierend** bei jedem 3., **4.** oder 5. Schlag.
 - Herzgeräusche.

RÜCKEN

- Verletzungen der Wirbelsäule.
- Steifheit der Cervical-Region nach Erkältung (Dulc., Rhus-t.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schweiß der Halsregion.
 - Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

- Reichlicher, stinkender Fußschweiß, der Wundheit der Fußsohlen und Zehen verursacht (Bar-c., Calc., Sil.).
- Knochenschmerzen nachts (Conch., Merc., Syph.).

- Spontane Verrenkung des Hüftgelenks.
- Zittern der Extremitäten durch Zorn.
- Schwäche der Fußgelenke, besonders beim Gehen gefühlt (Nat-c.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Warzen auf den Handrücken und Fingern (Anac., Dulc., Lac-c.).
 - Tiefe, blutende Risse in den Händen.
 - Wundheit zwischen den Gesäßbacken und den Schenkeln.
 - Exostosen der Tibia (Syph.).
 - Nägel: Brüchig, gekrümmt, verkrüppelt und weiß gefleckt.
 - Reichlicher Schweiß der Handflächen und Fußsohlen.
 - Empfindliche Hühneraugen.

SCHLAF

- Im Schlaf: Vermehrter Speichelfluss, Muskelzucken, Stöhnen, Zusammenschrecken, Sprechen, Herumwerfen und Weinen.
- Kopfschweiß nachts im Bett.
- Schlafwandeln.
- Schrickt im Schlaf zusammen durch Alpträume und durch Husten.
- Plötzliches Erwachen um 2 Uhr, gefolgt von Schlaflosigkeit.

FIEBER

- Frost:
 - Frost bei Fieber, aber will sich aufdecken.
- Hitze:
 - Trockene innerliche Hitze, aber die Teile fühlen sich äußerlich kalt an oder heißer Kopf mit kalten Füßen bei Fieber. Die Hitze wird besonders in Achseln, Rücken, Brust und Augen gefühlt.
 - Vermehrter Speichelfluss, Übelkeit, Augenschmerzen, Herzklopfen, tiefe Schwäche und Ruhelosigkeit der unteren Glieder bei Hitze.
 - Schlimmer: Nach Essen; im Schlaf (Samb.).
- Schweiß:
 - Schweiß besonders der Handflächen und Fußsohlen nach Hitze.
- Fieber mit vergrößerter und empfindlicher Leber.

HAUT

- Krustige Ausschläge mit wollüstigem Jucken der Haut, besonders im Freien; muss kratzen, bis es blutet.
- Entzündete, schmerzhaft und blasige Frostbeulen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Tiefe, blutige Risse an den Körperöffnungen und anderen Schleimhautgrenzen.
 - Große, gezackte, hornige oder gestielte Warzen, die bei Berührung oder beim Waschen leicht bluten.
 - Dunkle Sommersprossen.
 - Ausschläge und Ulzera, die bei Berührung leicht bluten.
 - Keloide.
 - Naevi.
 - Ungesund aussehende Haut.

KONVULSIONEN

- Aura / vor Konvulsionen: Ameisenlaufen und Schreien.
- Während Konvulsionen: **Schreien; Steifheit der Glieder; Zungenbiss.**
- Schlimmer auf der linken Körperhälfte und nachts, besonders nach Mitternacht.
- Besser beim Autofahren.

ALLGEMEINES

- **Fröstelig, mit Erkältungsneigung, aber hasst es, sich zuzudecken.**
- Die Beschwerden sind **schlimmer nachts** und bei **kaltem, feuchtem Wetter.**
- **Schwitzt reichlich beim Essen und durch die geringste Anstrengung.**
- Empfindlich gegen **Kälte**, Wetterwechsel, **Zugluft, Geräusche** von Fahrzeugen oder sogar Schritten, Schmerzen.
- Abszesse mit scharfen, blutigen, stinkenden und gelben Absonderungen.
- Beschwerden durch allopathische Medikamente, besonders unüberlegter Gebrauch von Antibiotika gegen virale Infektionen (Nux-v.) oder durch unterdrückten Fußschweiß (Tragen von Nylonsocken oder Segeltuchschuhen) oder unterdrückten Schnupfen (Gebrauch von Antihistaminika in Nasensprays oder Säften).
- Abneigung zu baden.
- Absonderungen (Schnupfen, Auswurf, Erbrochenes, Durchfall, Speichel, Urin, Ekzemflüssigkeit): Scharf, blutig, bräunlich, brennend, übelriechend, dünn, schmutzig, gelblich-grün, Rötung verursachend und Haare zerstörend.
- Wassersucht durch Nierenerkrankungen (Colch., Oxyd.).
- Abgemagerte und anämische Kinder.
- Die Körperöffnungen sind rot, geschwollen oder rissig.
- Reichlicher, stinkender, scharfer Schweiß, besonders an bedeckten Teilen oder dem Teil, auf dem er liegt, färbt das Laken braun.
- Rachitis.
- Nur langsame Heilung von Frakturen.

NUX VOMICA (Brechnuss - Nux-v.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Erfolgsmensch** (will der Beste sein), **ehrgeizig** (von seinen Zielen bestimmt), **feurig und hitzig** (Carc., Med., Sulph.). Fanatisch (eifrig); kann sich nicht entspannen, lernt pausenlos.
- ▶ **Sehr sorgfältige** Kinder, **akribisch und bestimmt**; werden schnell ärgerlich bei Unordnung.
- ▶ Kinder, die **keinen Lärm ertragen** (z. B. laute Musik).
- ▶ **Unabhängige Kinder**, die schon sehr früh am liebsten alles alleine bewerkstelligen.
- ▶ Terminbestimmt, können nicht warten, **extrem pünktlich** in allen Abläufen.
- ▶ Kinder, die immer irgendwie beschäftigt sind (Hyos., Iod., Lach., Op., Sulph., Tarent., Verat.).
- ▶ Kinder, die zu Tücke, Boshaftigkeit und Zorn neigen (Hahnemann).
- ▶ Kinder, die gern ihre jüngeren Geschwister tadeln (sie beherrschen gern andere, die unter ihnen stehen).
- ▶ Sie mögen es nicht, wenn jemand ihre persönlichen Sachen benützt, weil sie fürchten, dass sie nach Gebrauch nicht ordnungsgemäß wieder an ihren Platz gestellt werden [*Rubrik: ruht nicht eher, bis Dinge wieder am richtigen Platz sind*],
- ▶ Kinder mit niedriger Toleranz selbst leichter Erkrankungen.
- ▶ Neidische Kinder, die es nicht sehen können, wenn andere in der Schule besser sind (Hyos., Lach.).
- ▶ Kinder, die leicht zusammenschrecken.
- ▶ Perfektionismus.

KÖRPER

- ▶ Geeignet bei lernorientierten, wissbegierigen Kinder, die **bei zu vielem Lernen** und gleichzeitigem Mangel an körperlicher Betätigung **Magen- und Darmbeschwerden bekommen**.
- ▶ Schon früh **abhängig von übermäßigem Konsum von Stimulantien** wie Tee, Kaffee und Fastfood (würzig und gebraten).
- ▶ Kälteempfindliche Kinder (Luft, Bad, Klima, Zugluft, Getränke, Temperatur, Wetter, Wind etc.).
- ▶ **Nabelbruch** durch Verstopfung oder Weinen.
- ▶ Nützlich, wenn dem Kind **zu viele Medikamente gegeben** wurden, wie Hustensäfte, Antihistaminika, Abführmittel, Antibiotika etc.
- ▶ Die Kinder erwachen oft mit einem Niesanfall.
- ▶ Kinder, die mit Verdauungsstörungen geboren wurden und nie wirklich gesund waren.

- ▶ Kinder, die sich bei einer Prüfungsvorbereitung lange überanstrengt haben und dabei zu wenig schlafen (Cocc., Nit-ac.).
- ▶ Kolikschmerzen bei gestillten Kindern, wenn die Mutter zu viele Stimulantien (Tee, Kaffee, Alkohol, würzige oder scharfe Speisen) zu sich nimmt.
- ▶ M. Crohn, Colitis ulcerosa (Merc.).
- ▶ Extrem geruchsempfindlich.
- ▶ Schweiß auf der Oberlippe.
- ▶ Harnverhaltung bei Neugeborenen, besser durch ein warmes Bad.
- ▶ Dünn, hager, mit fester Faser, dunklem Haar und dunkler Hautfarbe.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch **enttäuschten Ehrgeiz**, z. B. nicht als Klassensprecher gewählt zu werden oder bei schulischen oder sportlichen Wettkämpfen zu verlieren.
- **Hasst es, gestört zu werden, wenn er beschäftigt ist.**
- **Empfindlich gegen Geräusche und Musik**; verschlimmern stark.
- **Neigung, ständig die Stirn zu runzeln.**
- Beleidigend.
- Ungeschicklichkeit aus Schüchternheit; lässt Dinge fallen.
- Launisch.
- Beklagt sich im Schlaf (kritische Naturen).
- Alles und jeder hat Unrecht; nur er hat Recht.
- Werden sehr gereizt, wenn zu viele Fragen über sie selbst gestellt werden (has-sen Leute, die neugierig sind).
- Lernt spät schreiben.
- Macht viele Gesten mit den Armen beim Reden (Arg-n., Lach., Sep.).
- Macht viele Fehler beim Sprechen, Schreiben oder Differenzieren von Objekten.
- Stöhnen vor Schmerzen und im Fieber.
- Nett zu Fremden (liebt es, Außenstehende zu beeindrucken); grob und beleidigend zu Familienmitgliedern.
- Lernschwäche, besonders im Rechnen.
- Frühreife Kinder.
- Eitelkeit.
- Sehr ungehorsame, böartige, dickköpfige, hinterlistige, herausfordernde Kinder mit Verhaltensstörungen; heftige Ausbrüche mit zerstörerischen Tendenzen (zerreißt, zerbricht, tritt, beißt, kreischt, spuckt, schlägt etc.) durch den geringsten Widerspruch oder wenn er gezwungen ist, zu antworten, mit rotem Gesicht.
- Sehr gierige, selbstsüchtige und streitsüchtige Kinder, die es lieben mit anderen Kindern in der Schule zu kämpfen, sie zu verspotten und sie lächerlich zu machen.
- Weinen nach Zorn (schnelle und leichte Reue).

KOPF

- Der Kopf ist **sehr empfindlich gegen Zugluft**.
- Kopfschmerzen durch **Schlafmangel oder übermäßiges Lernen** in der Nacht.
- **Schweiß auf der Stirn beim Essen von stark gewürzten und scharfen Speisen.**
- Kopfschmerz durch Überessen, bei Zahnung, durch Zorn, Kälteexposition, Schreck, Erschütterung, Geräusche oder Klang von Schritten, unterdrückten Schweiß; besser durch Einwickeln des Kopfes oder heiße Anwendungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hirnblutung.
 - Das Kind will den Kopf anlehnen, sich hinlegen oder bei Kopfschmerzen den Kopf mit den Händen halten.
 - Hydrozephalus.
 - Unfähig, den Kopf zu heben oder aufrecht zu halten (cerebrale Lähmung).

AUGEN

- Tränenfluss bei Schnupfen.
- Nützlich in Fällen von **akuter Konjunktivitis bei Säuglingen und Kleinkindern** (Arg-n., Puls.).
- Augenschmerzen am Morgen beim Erwachen oder beim Gebrauch der Augen; besser durch kalte Anwendungen.
- Lichtempfindlichkeit bei Wutanfällen und bei Kopfschmerz.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Sehnervatrophie.
 - Blutunterlaufene Augen mit wildem Blick.
 - Erweiterte Pupillen bei Fieber.
 - Hypermetropie.
 - Nystagmus; pendelartige Bewegungen von einer Seite zur anderen.
 - Periodischer konvergenter Strabismus.
 - Ptose, besonders des linken Oberlides.

OHREN

- **Vermindertes Hörvermögen bei Erkältung** (Cham., Puls.).
- Ohrerkrankungen, besonders rechts.
- Ohrenschmerzen durch Windeinwirkung, im warmen Zimmer oder beim Schlucken.

NASE

- **Überempfindlicher Geruchssinn** besonders gegen den Geruch von Blumen; **langandauernde Niesanfälle.**
- **Reichlicher, wundmachender Schnupfen tagsüber; trockene Nase nachts.**
- Der Katarrh erstreckt sich zu den Stirnhöhlen.
- Dauerndes Zupfen an der Nase durch Jucken in den Nasenlöchern.
- Schnupfen beim Essen; mit übermäßiger Schläfrigkeit.
- Schniefen bei Neugeborenen, besonders nachts und im warmen Zimmer.
- Heftige Niesanfälle beim Erwachen am Morgen und durch Aufdecken, mit frei

- Untersuchungsergebnisse:
 - Krusten und Schuppen in den Nasenlöchern.
 - Scharfe und spitze Nase.

GESICHT

- **Akne auf der Stirn durch Magenprobleme, besonders bei Verstopfung und nach dem Verzehr von Käse.**
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Risse in der Unterlippe, besonders in der Mitte;** dauerndes Zupfen an den Lippen.
 - Dunkle Ringe um die Augen.
 - Der linke Mundwinkel fällt nach unten (linksseitige Lähmung des unteren motorischen VII. Hirnnervs - Nervus facialis).
 - Eine Seite blass und kalt, die andere rot und heiß.
 - Schweiß auf der Oberlippe.
 - Gesichtsröte bei Fieber.
 - Geschwollene submaxilläre Lymphknoten.
 - Zitternde Lippen.
 - Gerunzelte Stirn.

MUND

- **Verlangen, ständig die Zähne fest zusammenzubeißen.**
- **Übler Geruch und schlechter Geschmack im Mund beim Erwachen am Morgen** (Puls.).
- Schwierige Zahnung.
- Zahnschmerzen nach Füllungen.
- Die Zähne sind empfindlich gegen kaltes Wasser (Calc.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Die Zunge ist trocken und rissig, besonders an den Seiten** und hat einen dicken, gelben Belag auf der hinteren Oberfläche (Merc-i-r.).
 - **Stomatitis ulcerosa; der Mund ist voller Aphthen, die das Kind davon abhalten, an der Brust zu trinken.**
 - Reichlicher Speichelfluss nach dem Essen und nachts.
 - Schwammiges, skorbutisches Zahnfleisch, das leicht blutet.
 - Stottern.

HALS

- **Würgen beim Schlafengehen** (Bell., Lach.); muss sich ständig räuspern oder schlucken, um sich besser zu fühlen.
- Muss den Hals immer gut zugedeckt haben (Hep., Kali-c., Sil.).
- Halsschmerzen erstrecken sich beim Schlucken oder Husten zu den Ohren; besser durch warme Getränke.
- Halsweh bei Schnupfen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ödematöse Schwellung des Zäpfchens und der Mandeln.
 - Hervorstehende und geschwollene Halsvenen.
 - Torticollis: der Hals wird zur linken Seite gezogen (Lvc.. Phos.).

MAGEN

- **Galliges, stinkendes, bitteres oder saures Erbrechen mit Übelkeit und kolikartigen Bauchschmerzen, nach Zorn, durch Überessen** und bei Fieber, besser durch Trinken warmer Flüssigkeiten.
- **Intensive Berührungsempfindlichkeit des Abdomens, sogar gegen den Druck der Kleidung.**
- **Heftiger, krampfhafter Schluckauf** beim Erbrechen oder nach dem Essen oder Trinken.
- Magenkrämpfe mit Stuhldrang sofort nach dem Essen (Aloe) (Giardiasis oder Amöben-Infektion); besser durch Zusammenkrümmen.
- Hungrig, aber Abneigung gegen Essen.
- Heißhunger bei Durchfall, Dysenterie oder Husten.
- Würgen und Erbrechen sofort nach dem Trinken oder Husten oder ein paar Stunden nach dem Essen.
- Langsame Verdauung mit Unwohlsein nach Fett, Milch oder sauren Speisen.
- Warmes Essen und Trinken bessert.
- Abneigung: Brot, Kaffee, Speisen, Zitronen, Fleisch, Wasser.
- Verlangen: Bittere Speisen, schwarzer Pfeffer, Fett, unverdauliche Dinge, (Kalk, Bleistiftminen) Pfeffer, Schweinefleisch, Gewürze, **Stimulantien**, Süßigkeiten.

ABDOMEN

- **Kolik bei gestillten Säuglingen durch Stimulantien, die die Mutter zu sich genommen hat.**
- Krampfende, spastische Schmerzen im Abdomen bei Verstopfung, 2-3 Stunden nach dem Essen oder nach Zorn bei Säuglingen; schlimmer durch Berührung, besser nach Stuhlgang, Zusammenkrümmen und durch lokale Wärmeanwendung.
- Gurgeln im Abdomen am Morgen.
- Neugeborenenengelbsucht durch unterdrückten Ärger der Mutter in der Schwangerschaft (Cham.).
- Tympanitische Auftreibung des Abdomens nach dem Essen oder Trinken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Linksseitiger Leistenbruch bei Kindern mit großer Empfindlichkeit, die auf eine Einklemmung hinweisen kann.**
 - **Nabelbruch.**
 - Aszites.
 - Intussuszeption.
 - Die Leber ist hart und empfindlich beim Tasten.
 - Paralytischer Ileus.
 - Peritonitis.
 - Milzvergrößerung.
 - Tabes mesenterica [Darmtuberkulose].

REKTUM

- **Durchfall nach Zorn (Coloc., Gels.) oder Schreck (Gels.).**
- **Hartnäckige Verstopfung bei Neugeborenen.**

- **Tenesmus und brennende Schmerzen im Abdomen, besser nach Stuhlgang.**
- Dauernder vergeblicher Stuhl drang bei Kolik.
- Durchfall abwechselnd mit Verstopfung.
- Durchfall bei Säuglingen nach dem Stillen oder durch den kleinsten Wechsel in der Ernährung.
- Abgang von viel übelriechenden Blähungen beim Stuhlgang (Giardiasis) und beim Husten.
- Unwillkürlicher Stuhlgang beim Abgang von Blähungen.
- Stühle: Schwarz, groß, hart, trocken und sehr übelriechend, mit Streifen blutigen Schleims.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Wundheit des Rektums durch ätzende Stühle.
 - Fissuren.
 - Große, strangulierte, blinde oder reichlich blutende Hämorrhoiden.
 - Feuchtigkeit mit Jucken um den Anus.
 - Polypen.
 - Rektumprolaps bei Stuhlgang.
 - Stühle: Amöbenzysten, Giardia lamblia, Madenwürmer, Spulwürmer und Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Krampfartige Verengung der Harnröhre verursacht schmerzhaftes Harnverhalten bei Neugeborenen.
- Dysurie mit schmerzhaften Blasenkrämpfen; Weinen und Schreien vor dem Urinieren.
- Spasmodische nächtliche Enuresis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schmutzig gelbliches oder rötliches Sediment in den Windeln.
 - Pyelonephritis (durch angeborene Verengung des pyelo-ureterischen Winkels).
 - Urin: Albumin ++, Glukose ++, Leukozyten ++ und Erythrozyten +.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Hodenentzündung nach Mumps.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hydrozele.
 - Paraphimose.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Ausfluss bei jungen Mädchen; anhaltend, mild und übelriechend, färbt die Wäsche gelb.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Rasseln von Schleim in Kehlkopf und Luftröhre, besonders morgens; der Schleim wird nur mit Schwierigkeiten ausgeworfen.
- Rauheit des Kehlkopfes durch Husten und beim Einatmen kalter Luft.

ATMUNG

- **Asthma im Winter.**
- Allergie gegen Staub oder Milben, die Bronchospasmen verursacht.
- Die Atmung ist schwierig oder behindert beim Husten und durch Blähungen.
- Bei Neugeborenen Atmung behindert nach Mitternacht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Heißer Atem.
 - Rasseln von Schleim in der Brust.
 - Pfeifende oder röchelnde Atmung, mit schnaufendem Ausatmen.

HUSTEN

- Dauernder, trockener, anstrengender Husten bei Fieber oder beim Essen.
- Husten, wenn er aus dem Freien in ein warmes Zimmer kommt, besser durch warme Getränke.
- Trockene, nicht endenwollende Hustenanfälle bei Säuglingen durch Zorn.
- Krampfartige, trockene, harte Hustenanfälle nach dem Hinlegen nachts, besser in Seitenlage.
- Das Kind fällt durch den heftigen Husten um.
- Untersuchungsergebnis:
 - Hält sich den Kopf beim Husten.

BRUST

- **Kältegefühl in der Brust; muss die Brust die ganze Zeit warm bedeckt halten.**
- Lungenentzündung bei Säuglingen und Kleinkindern (Ant-t., Ipec.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Übelriechender Achselschweiß, hinterlässt rötliche Färbung auf den Kleidern (Carbo-veg., Lach.).

RÜCKEN

- **Rückenschmerzen nach Ärger und durch Zugluft** (Verat.); schlimmer durch Umdrehen im Bett; muss sich erst aufsetzen und dann umdrehen; **besser durch warme Anwendungen** (Rhus-t.).
- Schweiß im Nacken.
- Steifer Nacken bei Schnupfen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Krampfartiges Ziehen im Nacken, zieht den Kopf nach hinten.**
 - Opisthotonus.
 - Spinale Meningitis.

EXTREMITÄTEN

- Ungeschicklichkeit der Extremitäten; lässt Dinge fallen, stolpert oder prallt gegen Dinge oder fällt beim Laufen.

- Leichte Verrenkung der Fußgelenke (Nat-c., Ruta).
- Die Knie stoßen beim Laufen aneinander, bringen ihn zum Stolpern und Fallen.
- Schweiß, besonders der Handflächen.
- Wunde, schmerzhaft Hühneraugen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Blaue, zyanotische Hände und Fingernägel.
 - Bläulich-schwarze ekchymotische Flecken an den Beinen.
 - Zieht die Füße beim Laufen nach.
 - Genu valgum oder Genu varum.
 - Die Handvenen sind geschwollen.

SCHLAF

- Sehr leichter Schlaf; durch das geringste Geräusch gestört.
- Im Schlaf: Zähneknirschen, Gliederzucken, Stöhnen, offener Mund, Speichelfluss, Zusammenzucken wie durch Schreck, Sprechen, Herumwerfen und Weinen.
- Fällt in Schlaf, wenn er versucht zu sitzen und zu lesen (Gels.), besonders abends.
- Schläft spät in der Nacht ein und hat Schwierigkeiten, am Morgen zu erwachen.
- Schlafstörungen bei Kindern bei Vollmond.
- Kurzer Schlaf erfrischt ihn.
- Schläfrigkeit bei Kopfschmerz und nach dem Essen.
- Schläft auf dem Rücken, mit den Händen flach unter dem Hinterkopf oder über dem Kopf und die unteren Glieder gespreizt.

FIEBER

- Beschwerden durch: Zorn, Herbst, bei Zahnung, verdorbenen Magen, zu vielem Lernen, Gehen im Freien.
- Abneigung, sich aufzudecken in jedem Fieberstadium, mit Verlangen nach Wärme, die nicht bessert.
- Frost:
 - Heftiger Schüttelfrost, mit eiskaltem Körper und bläulichem Gesicht, Händen und Nägeln.
 - Frost mit unregelmäßiger Periodizität bei Kindern, die zu rezidivierender Malaria neigen.
 - Konvulsionen treten in diesem Fieberstadium auf, mit Zittern des Körpers oder abwechselnder Beugung und Streckung der Extremitäten.
 - Schlimmer nach Trinken, durch Bewegung, durch den geringsten Luftzug, am Morgen und im Freien.
- Hitze:
 - Geschärftes Hörvermögen, Rückenschmerzen, Trockenheit und Schmerz im Kehlkopf mit trockenem, anfallsweisem Husten, extremem Durst, Augenschmerzen, reichlichem Speichelfluss und spärlichem, rötlich-braunem Urin, abgegeben nach lange vergeblichem Harndrang.
 - Einseitige trockene, brennende Hitze des Körpers oder nur die Stirn sehr heiß, eiskalte Hände.
 - Das Kind wird schweigsam und ist sehr schläfrig im Hitzestadium.
 - Schlimmer nachts.
- Hitzestadium wechselt mit Froststadium ab.
- Unregelmäßige Fieberanfälle, im Schweregrad ansteigend.

HAUT

- Urtikaria am Abend oder in der Nacht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Gänsehaut (Hell.).
 - Naevi.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: Nach dem Füttern, **Zorn**, Kolik, Zahnung, **Aufregung**, Fieber, Blutung, **Verletzung**, **Licht**, Masturbation, Bewegung, **Geräusche**, **Anblick von Fremden**, beim Stuhlgang, **Würmer**.
- Vor Konvulsionen: Aufstoßen.
- Während Konvulsionen:
 - Konvulsivisches Zusammenballen oder Kontraktion der Sehnen von Händen und Füßen, Doppelbilder, Atemnot, **unwillkürliches Urinieren**, Schweiß, **Raserei**, **rote oder bläuliche Gesichtsfarbe**, **Schreien** und Weinen.
 - Das Kind ist während des epileptischen Anfalls bei Bewusstsein.
 - Das Kind liegt mit ausgestreckten Gliedmaßen.
 - Konvulsionen bei Neugeborenen werden schlimmer durch helles Licht, Zugluft und Berührung.
 - Konvulsivische Bewegungen werden besser durch festes Halten des Kindes und durch gewaltsames Ausstrecken des Körpers.
 - Der Kopf wird nach hinten gezogen oder das Kind fällt rückwärts oder auf die Seite.
 - Die unteren Glieder werden abwechselnd gebeugt und gestreckt.
- Nach Konvulsionen: Schlaflosigkeit oder **Tiefschlaf**.

ALLGEMEINES

- Beschwerden durch Missbrauch von Abführmitteln oder Chinin (und alle anderen Anti-Malaria-Mittel); **Wetterwechsel**; **trockenes, kaltes Wetter**; Blutungen; Masturbation; durch **unterdrückten Schnupfen oder unterdrückte Ausschlüge**.
- Kollaps mit eiskalter Haut.
- Zyanose.
- Entkräftender Schweiß mit übelriechendem, saurem Geruch, färbt die Wäsche rot; Schweiß beim geringsten Anlass.
- Ödeme durch Lebererkrankung (Gallenatresie, die zur Zirrhose führt).
- Abmagerung bei Säuglingen, trotz Heißhunger.
- Ohnmacht in einem überfüllten Raum, durch Gerüche, nach Durchfall, durch Zorn.
- Intoleranz gegen Kleidung.
- Rechtsseitige Beschwerden.

HERKUNFT

- Synonym: *Strychnos nux vomica*. Familie der Loganiaceae.

OENANTHE CROCATATA

(Giftige Rebendolde - Oena.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Gewalttätig, beleidigend und zerstörerisch bei Zorn; Zerreißen von Gegenständen; Abreißen der Knöpfe von den Kleidern; höchst nervös und unzufrieden. Die Kinder verhalten sich so, weil sie von ihren Eltern, die selber an chronischer Epilepsie erkrankt sind, zu sehr verwöhnt werden.
- ▶ Ungeschickte Kinder, die sich immerzu verletzen.
- ▶ Konvulsionen, die ähnlich wie Epilepsie verlaufen, mit geschwellenem, fahlem oder blassem Gesicht, starren oder eingesunkenen Augen: Spasmen erst klonisch und später dann tonisch.
- ▶ Konvulsionen mit Schaum vor dem Mund, Aussetzen der Atmung, Kälte der Extremitäten, schwachem Puls, Zungenbiss, unwillkürlichem Stuhl und Urin, geweiteten Pupillen, Gluckern in der Speiseröhre, bläulich oder rot verfärbtem Gesicht und verkrampften Fingern.
- ▶ Konvulsionen schlimmer im Schlaf, bei Husten und während der Zahnung.
- ▶ Konvulsionen mit Kälte des Körpers.
- ▶ Umfallen nach hinten bei den Konvulsionen.
- ▶ Epilepsie durch Kopfverletzungen.
- ▶ Schläft zwischen den Konvulsionen ein.
- ▶ Unruhig nach den Konvulsionen.
- ▶ Schreit vor und während des Anfalls von Konvulsionen.
- ▶ Verlangen nach Essig und gewürzten Speisen, Abneigung gegen Süßigkeiten und Obst.
- ▶ Vermehrter Durst.
- ▶ Plötzlicher Harndrang mit plötzlichen heftigen Schmerzen, wenn dem Drang nicht nachgegeben wird.
- ▶ Offensiver Schweiß.

HERKUNFT

- Familie der Doldengewächse (Apiaceae/Umbelliferae).

OLEANDER

(Oleander - Olnd.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Geistig schwerfällig, schlechte Konzentration, besonders beim Lesen. Leeregefühl beim Versuch sich zu konzentrieren. Lernprobleme und sehr leistungsschwach bei geistigen Arbeiten. Langsames Begriffsvermögen und Mangel an Gedanken. Aufgrund dieser geistigen Leistungsschwäche entsteht viel gewalttätiger Zorn, der vor allem bei Widerspruch sehr schnell ausgelöst wird.
- ▶ Nässende Ausschläge, besonders am Kopf; am Hinterkopf oder am Haaransatz bilden sich feuchte, dicke Krusten. Milchschorf bei Neugeborenen.
- ▶ Ekzemartige Ausschläge hinter, um und vor den Ohren, im Gesicht, auf der Stirn und auf der Nase. Sie sind brennend, krustig, feucht, abschilfernd. Juckreiz schlechter nachts, Hautausschläge immer schlimmer nach Kratzen.
- ▶ Weiß belegte Zunge.
- ▶ Verlangen nach Orangen und kalten Getränken. Schlimmer nach dem Essen von Orangen, große Abneigung gegen Käse.
- ▶ Durchfall bei Kindern während der Zahnung mit dünnem, gelbem Stuhl, der unverdautes Essen meist vom Vortag enthält. Beim Flatus geht unwillkürlich wässriger, saurer Stuhl mit ab.
- ▶ Durchfall schlimmer morgens, heftiges Brennen am Anus vor und nach dem Stuhl.
- ▶ Durchfall bei Kindern mit viel Tuberkulose in der Familienanamnese.
- ▶ Rumpeln im Darm mit Abgang von Flatus, der stinkt wie faule Eier. Häufig schmutzige Schläpfer oder Unterwäsche durch Flatus. Oleander heilt dieses unangenehme Problem viel besser als jedes andere Mittel der Materia Medica, wenn Stuhl unwillkürlich und unverdaut wie oben beschrieben abgeht.
- ▶ Atopisches Ekzem, allergisches Ekzem und Kontaktdermatitis bei Kindern.
- ▶ Empfindlichkeit der Haut auf geringste Reibung, dann wird sie wund und spröde.
- ▶ Frostig, jedoch durstig und Verlangen nach kaltem Wasser.

HERKUNFT

- Auch Rosenlorbeer genannt gehört diese Pflanze zur Familie der Hundsmilchgewächse (Apocynaceae).

OLEUM ANIMALE AETHEREUM

(Knochenöl - Ol-an.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Depressiv und traurig, deshalb geistesabwesend, verträumt, stumpfsinnig und mürrisch.
- ▶ Entwicklung und Wachstum verzögert.
- ▶ Migräne bei Kindern mit Sehschwäche. Kopfschmerzen meist nach dem Abendessen, schlimmer durch jegliche geistige Anstrengung.
- ▶ Viel Kopfschweiß, Schwitzen beim Essen.
- ▶ Zucken der Augenlider (wie bei Agaricus) und Zucken der Lippen.
- ▶ Bronchialasthma durch unterdrückten Fußschweiß.
- ▶ Verlangen nach weich gekochten Eiern und Abneigung gegen Fleisch.
- ▶ Reichlich Urin mit Geruch nach Fischlake.
- ▶ Geschwollene Hoden und Schmerzen entlang dem Samenleiter.
- ▶ Ruhelose Extremitäten.
- ▶ Heftige Wachstumsschmerzen.
- ▶ Reibung in den Gelenkbeugen, was Wundsein verursacht.
- ▶ Frostig.

HERKUNFT

- Brenzöl; man erhält es durch die Destillation von Hirschhorn.

OLEUM JECORIS ASELLI

(Dorschlebertran - Ol-j.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Tuberkulose in der Familiengeschichte.
- ▶ Abgemagert, unruhig und fiebrig in der Nacht, wie bei Jod., Phos, und Tub.
- ▶ Tuberkulose bei Kindern - hager, dünn und abgemagert; trockener, hackender und kitzelnder Husten, nachts schlimmer, mit Wundheit und scharf stechenden Schmerzen in der Brust; hektisches Fieber mit Nachtschweiß.
- ▶ Rachitis. Sieht blass, kachektisch und alt aus, mit vergrößertem Kopf, weil die Schädelnähte nicht zusammengewachsen sind. Außerdem verzögerte Zahnung; vergrößertes, hervorstehendes Abdomen; vergrößerte Leber und geschwollene Mesenteriallymphknoten; Zwergwuchs durch verzögerte Knochenbildung.
- ▶ Übermäßiger Haarwuchs im Gesicht.
- ▶ Anfällig für katarrhale Infektionen, besonders der Ohren und Nase.
- ▶ Abmagerung nach Durchfall.
- ▶ Verschlimmerung und Abneigung: Milch.
- ▶ Heiße Hände und heißer Kopf.
- ▶ Wachstumsschmerzen hauptsächlich in den Beinen.
- ▶ Erkältungsneigung.

HERKUNFT

- Hergestellt aus der frischen Leber eines Dorsches.

OPIUM

(Papaver somniferum - Schlafmohn - Op.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Waghalsige Kinder**, können Gefahren nicht richtig einschätzen.
- ▶ Verhaltensstörungen und neurologische Probleme, die durch einen **Todesfall in der Familie** oder ein **erschreckendes Erlebnis** entstanden; der Schreck sitzt dem Kind so tief in den Knochen, dass die **Schockangst noch jahrelang wie frisch** weiterbestehen kann.
- ▶ **Gleichgültigkeit gegen Schmerzen** (Prügel oder Bestrafung durch die Eltern). Das Kind wird lieblos und hartherzig, zeigt keine Zuneigung.
- ▶ Unsoziales Verhalten bei Kindern zerbrochener Familien und nach sexuellem Missbrauch.
- ▶ Kinder, die in Kriegszeiten geboren wurden, brauchen oft Op. (Stram.).
- ▶ Nach wiederholten schmerzhaften Erlebnissen zieht sich das Kind von der Außenwelt zurück und kapselt sich ab. Dieser innere Rückzug zeigt sich in gedanklicher Abwesenheit, gleichgültiger Bedürfnislosigkeit, Brüten, Verwirrung, Tagträumen, Dumpfheit, Faulheit, Distanziertheit, Betäubung und Schweigsamkeit.
- ▶ Gedächtnisstörungen und Dumpfheit bei Kindern, die dauernd Phenobarbital gegen Epilepsie einnehmen.
- ▶ Betrügerische, kleptomanische Kinder, die unter ständiger körperlicher Misshandlung und Vorwürfen ihrer Eltern leiden.
- ▶ Latente Aggression bei Kindern, die von ihren Eltern oder Lehrern unterdrückt, beleidigt, bestraft und getadelt werden. Die Aggression kann sich zeigen durch Umherwerfen von Dingen, Schroffheit, Beißen, Zerstörungswut, Bosheit, Streitereien und wildes Ausflippen.
- ▶ Übermütig und voller Energie. Braucht ständig Beschäftigung, besonders nachts; besonders gern Basteln, Zeichnen, Malen etc.

KÖRPER

- ▶ Beschwerden nach **Kopfverletzung** (Zangengeburt, mechanisches Trauma, Unfall, Schädeloperationen).
- ▶ Neugeborene mit **niedrigen Apgarwerten**.
- ▶ Neugeborenenasphyxie.
- ▶ Ängstlicher und wie betrunkenen Gesichtsausdruck mit erweiterten Pupillen, dunkelrotem Gesicht und dicken Lippen.
- ▶ Lichtstarre Pupillen und Anisokorie (ungleich groß) im Koma mit röchelnder Atmung.
- ▶ Hat schon Nahtod-Erfahrungen gemacht, z. B. im anaphylaktischen, kardiogenen oder neurogenen Schock.
- ▶ Neugeborene, die ganz rot sind.

- ▶ Harnverhaltung oder Atemstillstand bei Neugeborenen, deren Mutter eine Narkose hatte (Kaiserschnitt oder schmerzlose Geburt).
- ▶ Plötzliche Unterdrückung von Hautkrankheiten (Skabies, Warzen, atopisches Ekzem) mit nachfolgenden Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, Verhaltensproblemen, Dyslexie, Epilepsie oder Fieberkrämpfen.
- ▶ Opium weckt die Reaktionsbereitschaft, wenn gut gewählte Mittel keine Wirkung zeigen (Psor., Tub., Sulph., Zinc.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Aktiv und heiter bei Fieber** (Acon., Thuj.).
- **Feigheit oder absolute Furchtlosigkeit und tollkühne Verwegenheit.**
- Hat eine Begabung, **gut zu schreiben** und Respektspersonen sowie Freunde zu **überzeugen** (Sprache, überzeugend).
- **Gleichgültigkeit gegen Schmerz und Leiden**, besonders bei Fieber; **sagt, es gehe ihm gut, auch wenn er sehr krank ist.**
- Macht für jedes Projekt **gigantische Pläne.**
- **Gerissene und geistreiche** Kinder, die schnell im Handeln sind.
- Verzögerte Entwicklung bei Kindern mit Neigung zu masturbieren.
- Ungeschicklichkeit; stößt gegen Dinge beim Gehen.
- Launisch; lehnt Dinge ab, um die es gebeten hat.
- Stumpfheit bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, sich aufs Lernen zu konzentrieren.
- Furcht im Dunkeln und vor Ratten.
- Simuliert Krankheit.
- Erschrickt schnell und fährt leicht zusammen; zittert schließlich vor Furcht.
- Unwillkürliches Zupfen an der Bettwäsche im Schweißstadium des Fiebers.
- Reizbarkeit bei Schmerzen, mit Stampfen der Füße und Heulen.
- Lachen über Kleinigkeiten; in ähnlicher Weise neigt er auch zum Weinen und Schluchzen über Kleinigkeiten.
- Spricht laut.
- Lernt nur langsam sprechen (Nat-m.).
- Verzogenes Kind mit heftigem Temperament; wird zornig über Kleinigkeiten oder durch den geringsten Widerspruch; rollt sich auf dem Boden, wirft Dinge umher, wird destruktiv, schlägt den Kopf gegen die Wand etc.
- Spricht mit sich selbst (Autismus).

KOPF

- Unfähig, den Kopf vom Kissen zu heben durch das Empfinden **bleierner Schwere im Hinterkopf** (Hydrozephalus).
- Nützlich in Fällen von Meningitis und Enzephalitis mit **erhöhtem intrakraniell Druck und Hirnödemen.**

- Kopfschmerzen nach Kopfverletzungen und nach Schreck oder Gemütsbewegungen; begleitet von Übelkeit, Schmerz und steifem Nacken, rotem Gesicht, Speichelfluss und Erbrechen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Hirnblutung** (Both., Cocc.).
 - **Kalter Schweiß auf der Stirn** (Carbo-veg., Verat.).
 - Dauernde unwillkürliche Kopfbewegungen; Rollen oder Drehen des Kopfes von einer Seite zur anderen (bei Meningitis).
 - Hydrozephalus; heißer Kopf mit kalten Extremitäten.

AUGEN

- Diplopie [Doppelbilder],
- Verlangen, häufig die Augen zu reiben.
- Tränenfluss bei Husten.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Augen **glänzend**, rot und **starrend**, mit wildem Blick.
 - Pupillen sind verengt und träge oder zeigen keine Reaktion auf Licht.
 - Konvergenter Strabismus.
 - Hippus-Zeichen + [Blinzeln, schneller Wechsel von Enge und Weite der Pupille ohne Reize].

OHREN

- **Überempfindliches Gehör**, sogar im Schlaf.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Gestörtes Hörvermögen durch Lähmung des Hörnervs.
 - Röte der Ohren.

NASE

- Überempfindlicher Geruchssinn.
- Flüssigkeit kommt beim Versuch zu schlucken aus der Nase wieder heraus (Lähmung der Hirnnerven IX (Nervus glossopharyngeus) und X (Nervus vagus)).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bohrt dauernd mit den Fingern in der Nase (Arum-t., Cina).
 - Spitze Nase.

GESICHT

- Zucken der Mundwinkel (Ign.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Kalter Gesichtsschweiß.**
 - Geschwollene Lippen in einem eingefallenen und **faltigen, alt aussehenden Gesicht**, mit erweiterten Venen und einem leeren, dummen Ausdruck.
 - Bläuliche Ringe um die Augen.
 - Offener Mund mit Speichelfluss aus den Mundwinkeln.
 - Kiefersperre.

MUND

- Schwierige Zahnung.
- Zähneknirschen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Dauernde Zungenbewegungen im Mund.**
 - Lähmung der Zungenmuskeln, Zunge nach rechts gezogen (Lähmung des rechten N. hypoglossus).
 - Purpurrote bis schwarze Verfärbung der Zunge.
 - Sprache undeutlich, kloßig und stotternd.

HALS

- Behindertes oder schwieriges Schlucken durch Krämpfe oder Lähmung der Speiseröhre (Stram); Speisen bleiben im Hals stecken und Flüssigkeiten werden durch die Nase herausbefördert (Lähmung der Hirnnerven IX (Nervus glossopharyngeus) und X (Nervus vagus), mit Einbeziehung des Nucleus Ambiguus).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Vergrößerte Mandeln.
 - Exophthalmischer Kropf (M. Basedow).
 - Geschwollene Venen mit sichtbarem Pulsieren der Halsschlagadern (Bell). - Torticollis.

MAGEN

- Das Kind macht vergebliche Versuche zu würgen oder zu erbrechen.
- Krampfartige oder schneidende Schmerzen, mit Auftreibung des Magens nach dem Essen.
- Erbrechen von Schleim durch Husten.
- Abneigung: Essen im Allgemeinen, Fleisch, Zwiebeln.
- Verlangen: Brandy, Zucker.

ABDOMEN

- **Paralytischer Ileus nach Operation.**
- **Umgekehrte Peristaltik mit fäkalem Erbrechen.**
- Krampfende Schmerzen im Abdomen vor Stuhlgang, besonders bei Verstopfung über einige Tage, besser durch Zusammenkrümmen oder durch warme Milch.
- Einklemmte Blähungen mit Rumpeln im Abdomen.
- Starre der Bauchmuskeln, Bauch wie eingezogen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Empfindlicher und entzündeter Leistenbruch, der zu Strangulation neigt** (Bell., Nux-v.).
 - Vergrößerte Milz.
 - Hartes, tympanitisches Abdomen.
 - Intussuszeption.
 - Empfindlichkeit der Ileozoekalgegend (Bell.).
 - Nabelbruch (Nux-m.).

REKTUM

- **Unwillkürlicher Stuhlgang z. B. bei Schreck, Kummer oder plötzlicher Freude.**
- **Schwere Verstopfung bei Neugeborenen;** der Stuhl verbleibt lange im Rektum ohne jeden Stuhldrang.
- Verstopfung wechselt mit Durchfall (Ant-c., Nux-v.).
- Durchfall bei Säuglingen nach Zorn (Coloc., Gels.) oder bei Typhus (Hyos., Phos.).
- Jucken um den Anus.
- Stuhlverhaltung im Ileus, besonders nach einer Operation.
- Stühle: Trocken, hart, krümelig am Anus oder wie schwarze Kugeln, mit sehr üblem Geruch; müssen mechanisch entfernt werden (Nux-m.).
- Tenesmus vor und bei Stuhlgang.
- Unfähig in der Gegenwart anderer Personen Stuhl auszuscheiden (Ambr., Nat-m.).
- Untersuchungsergebnis:
 - Blutiger Schleim quillt aus dem offenen After.

HARNWEGE

- Schmerzhafter Harnverhalt bei gestillten Säuglingen nach Schreck (Acon., Bell.).
- Das Kind trinkt viel, aber uriniert selten.
- Schwieriges Urinieren; das Kind muss warten und sich anstrengen bis der Urin kommt, wegen Sphinkterspasmen.
- Unwillkürliches Urinieren im Schlaf bei Kindern nach Schreck.
- Kein Harndrang, trotz gedehnter, gefüllter Blase (Caust.).
- Schwäche der Blasenmuskulatur, besonders nach einer Operation.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dunkelbraun gefärbter Urin, der rötliche, sandartige Sedimente in der Windel hinterlässt.
 - Urin: Albumin ++, Erythrozyten ++, Glukose +.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Frühe Neigung zu masturbieren bei kleinen Jungen.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Übelriechender Ausfluss bei Kindern, mit Neigung zu masturbieren.

KEHLKOPF

- Stimmverlust bei kleinen Jungen nach einem Schockerlebnis (Acon, Gels).
- Lähmung oder Spasmen der Kehlkopfmuskulatur.

ATMUNG

- **Neugeborenenasphyxie** (Ant-t., Camph.).
- Röchelnde Atmung, raue Einatmung und laute, schnaufende Ausatmung, besonders im Schlaf und nach Konvulsionen.
- Plötzliche Anfälle von spastischem Asthma mit Atemstillstand, wenn er in den Tief Schlaf fällt; muss geweckt werden, um Ersticken zu verhindern (Cin

- Untersuchungsergebnisse:
 - **Zentralnervöse Hyperventilation.**
 - Röntgen/Thorax: Lungenödem.
 - **Cheyne-Stokes-Atmung.**
 - Unregelmäßige Atmung, manchmal langsam, manchmal beschleunigt.
 - Respiratorische Azidose.

HUSTEN

- Heftiger, erstickender Husten, besonders nachts und beim Aufstehen am Morgen;
besser durch kalte Getränke (Caust., Cupr.).
- Spastische, trockene Hustenanfälle nachts durch Kitzelgefühl im Larynx; locker tagsüber, mit blutdurchsetztem Auswurf.
- Untersuchungsergebnis:
 - Zyanose mit bläulicher Verfärbung des Gesichts bei Husten.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:
 - Aspirationspneumonie.
 - Pneumonische Verdichtung bei Kleinkindern.

HERZ UND KREISLAUF

- Herzklopfen nach Schreck.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Herzinsuffizienz.
 - Puls: Unregelmäßig, intermittierend, weich oder hart, beschleunigt oder langsam.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Wirbelsäulenverkrümmung; Opisthotonus.
 - Myelitis oder Spinalmeningitis.
 - Spastisches nach hinten Ziehen von Hals und Kopf.

EXTREMITÄTEN

- Ungeschicklichkeit der Beine; stößt an oder stolpert beim Gehen.
- Neigung, die Füße dauernd auszustrecken.
- Zittern der Extremitäten nach Schreck.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Automatische, unwillkürliche Bewegungen der Glieder, besonders der Arme (Athetose).
 - Zusammengeballte Finger bei gleichzeitig angezogenen Beinen.
 - Konvulsivisches Zucken der Glieder.
 - Zyanose mit bläulicher Verfärbung der Fingerspitzen, Zehen und der Fingernägel.
 - Dünne Nägel.
 - Schwankender Gang; zieht die Beine beim Laufen nach.
 - Handvenen geschwollen (Puls. Sulph.).

SCHLAF

- Im Schlaf: Augen halb offen oder starrend, mit rollenden Bewegungen der Augäpfel; lautes Schnarchen; macht Grimassen und seltsame Gesichter, mit unwillkürlichen Handbewegungen; Stöhnen; offener Mund mit hervortretender Zunge; Seufzen, Schluchzen, röchelnde Atmung (mit einer rauen Einatmung und laut schnaufender Ausatmung) und Wimmern.
- Extrem schläfrig bei fast allen Beschwerden.
- Kann nicht auf der linken Seite liegen.
- Das Kind fühlt sich sehr schläfrig, wenn es versucht, sich aufs Lernen zu konzentrieren.
- Komatöser Schlaf bei Urämie.
- Reichlicher, heißer Schweiß im Schlaf, mit Verlangen sich aufzudecken.
- Der Schlaf ist häufig gestört durch schreckliche Visionen und Alpträume.
- Neigt dazu, vor und im Schlaf sehr redselig zu sein.

FIEBER

- Verlangen, sich aufzudecken in allen Fieberstadien; kann Wärme in keiner Form ertragen.
- Frost:
 - Tiefe Schläfrigkeit, lautes Schnarchen und Steifheit der Glieder bei Schüttelfrost.
 - Der Frost beginnt an Händen und Füßen (Nat-m.).
- Hitze:
 - Aktiv, heiter, ruhelos bei Fieber.
 - Bei Hitze fällt das Kind in einen tiefen, betäubenden Schlaf oder hat Beschwerden wie Nasenbluten, Kopfschmerzen, Abscheu gegen Essen oder Heißhunger, reichlichen Speichelfluss, rotes Gesicht, Harnverhaltung oder spärliches Urinieren, unstillbaren Durst oder absolute Durstlosigkeit, Erbrechen (einer übelriechenden, grünlichen oder fäkalen Substanz).
 - Hitze und Röte von Kopf und Gesicht, mit kalten Extremitäten.
 - Hyperpyrexie [Fieber über 41 °C].
- Froststadium ist gefolgt von Hitze mit heißem Schweiß.

HAUT

- Untersuchungsergebnis:
 - Haarausfall an verschiedenen Körperteilen.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch: **Zorn; Tiefschlaf; Zahnung; Drogen/Medikamente**; Einwirkung von hellem Licht; **Schreck, den die Mutter erlitten hat**; hohes Fieber, Verletzungen; Schock; **Anblick oder Annäherung von Fremden**; unterdrückte Ausschläge oder wenn Ausschläge nicht herauskommen; Urämie; im warmen Zimmer.
- Aura/Vor Konvulsionen: **Blutandrang im Kopf**; Schreien, Erbrechen.
- Während Konvulsionen:
 - Geistig: **Raserei**, mit **Schreien** und Weinen.

- Körperlich: Zungenbiss, kalte Haut mit Zittern, **verengte Pupillen**, Nasenbluten, **Gesicht bläulich-rot** oder sehr blass, nach hinten Fallen, Schaum vor dem Mund, der Kopf wird nach hinten gezogen, übelriechendes grünliches oder fäkales Erbrechen, **Opisthotonus**, rotes Gesicht, seufzende oder langsame flache Atmung, spastische oder konvulsivische Bewegungen der Brustmuskulatur, steife Glieder, **tetanische Starre**.
- Konvulsionen ohne Bewusstsein.
- Schlimmer abends und nachts; besser draußen im Freien.
- Nach Konvulsionen: Raserei, Schläfrigkeit und **röchelnde Atmung**.
- Betäubung mit intensiver Schläfrigkeit zwischen den Konvulsionen.

ALLGEMEINES

- **Zentrale Zyanose bei Säuglingen und Kleinkindern.**
- **Schmerzlosigkeit bei Beschwerden, die normalerweise schmerzhaft sind.**
- **Bewusstlosigkeit mit Cheyne-Stokes-Atmung**, delirantes Sprechen, herabfallender Kiefer, unwillkürlicher Abgang von Stuhl und Urin, Schnarchen, weit offene Augen; antwortet korrekt, wenn er angesprochen wird, aber Delirium und Bewusstlosigkeit kehren sofort zurück.
- Schlimme Folgen von Medikamenteneinnahme, einschließlich Antipyretika (Paracetamol), Analgetika (Brufen), Anästhetika (Chloroform, Diazepam); Einwirkung von Kohlenmonoxid, Missbrauch von Iod (Hustensaft) etc.
- Chorea durch Schreck.
- Kollaps mit reichlichem, durchnässendem, heißem Schweiß am Morgen und im Schlaf, an allen Körperteilen außer den unteren Gliedmaßen, mit Verlangen sich aufzudecken.
- Dunkles, rotgesichtiges und faltiges Kind, das wie ein kleiner, verwelkter alter Mann aussieht.
- Abgemagerte, zwergartige oder behinderte Kinder, die sehr träge sind und sich immer an etwas anlehnen wollen.
- Insulinabhängiger juveniler Diabetes.
- Leukämie.
- Rachitis.
- Septische Zustände.

HERKUNFT

- Familie der Mohngewächse (Papaveraceae).

PALLADIUM METALLICUM

(Pall.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Es ist ein gutes Komplementärmittel zu Platinum.
- ▶ kreative Kinder, die sich die ganze Zeit mit ihren kreativen Interessen beschäftigen wollen
- ▶ adrette, modebewusste, kesse und naseweise Kinder (Hyos., Lyc., Verat.) ▶ Sensible Kinder, die leiseste Ermahnung verschlimmert.
- ▶ Mütter, die in der Schwangerschaft erniedrigt und vernachlässigt wurden und deren Kinder später unter intellektueller Arroganz, Selbstsucht, Gier und Anmaßung leiden
- ▶ Kinder die „stolz wie Pfauen“ sind und überall nach Beifall suchen
- ▶ Palladium-Kinder erinnern an die griechischen Götter Zeus und Pallas Athene. Zeus stürzte seinen Vater Kronos vom Thron und löste dann mit seinen Brüdern Poseidon und Hades um die Herrschaft. Athene wurde direkt aus Jupiters (Zeus¹) Kopf geboren (also nicht auf normale Weise aus den weiblichen Fortpflanzungsorganen).
- ▶ Kinder, die gern prahlen, sie demonstrieren jedermann offen ihren Stolz und ihre Eitelkeit. (Lach., Plat., Sulph.)
- ▶ Gute Verführer. Sie versuchen, Eltern, Geschwister, Freunde und die ganze Gesellschaft mit ihrem Charme und ihrer Brillanz zu verführen. (Fl-ac., Tarent.)
- ▶ Kinder, die ohne Gesellschaft weinerlich und niedergeschlagen werden
- ▶ bildet sich beim geringsten Anlass ein, vernachlässigt zu werden
- ▶ kann es nicht ertragen, sich vernachlässigt zu fühlen (Arg-n., Lac-h.)

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- aufgeweckt und munter in Gesellschaft, gefolgt von Erschöpfung und Schwäche
- Kinder, die großen Wert auf die gute Meinung anderer legen (Calc-sil., Kali-sil.)
- Kinder, die nach einer Party oder einem Vergnügen den ganzen Abend leiden
- tut alles, um die Anerkennung seiner Mitmenschen zu gewinnen
- egozentrische Kinder, die Schmeicheleien lieben (Lyc., Sulph.)
- Furcht, dass etwas Schlimmes geschehen werde
- ungeduldig
- Neigung zu einer aggressiven Sprache
- herablassend und frech in Sprache und Verhalten (Cic., Nux-v.)
- reizbar beim Erwachen (Cycl., Nit-ac.)

- große Vergnügungsliebe (Croc., Tub.)
- will im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen oder eine Stimmungskanone sein
- Gedächtnisschwäche durch Kopfschmerzen oder sonstige Schmerzen (Anac., Hep.)

KOPF

- Migräne. Die Schmerzen erstrecken sich über den Scheitel von einem Ohr zum anderen. Nach seelischer Erregung und Kaffee, besser durch Schlaf.
- reizbar (China) und ungeduldig (Sulph., Zinc.) bei Kopfschmerzen

AUGEN

- Trockenheit
- Untersuchungsergebnisse
 - bläuliche Verfärbung um die Augen

OHREN

- Schmerzen im linken Ohr
- Untersuchungsergebnisse
 - Ekzem hinter dem Ohr (Cic., Psor.)

NASE

- scharfe Wahrnehmung unangenehmer Gerüche
- Schmerzen bei Schnupfen (Bell., Merc.)
- Untersuchungsergebnisse
 - Pickel, Pusteln, Furunkel, v.a. an der Nasenspitze

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse
 - Pickel an der Unterlippe

MUND

- Untersuchungsergebnisse
 - Exkoration der Mundwinkel (Arum-t., Cund.)
 - rote Streifen auf der Zunge

ZÄHNE

- empfindlich
- Untersuchungsergebnisse
 - empfindliche Schneidezähne

HALS

- Untersuchungsergebnisse
 - gallertartiger Schleim (Caust.)

ABDOMEN

- Untersuchungsergebnisse
 - Auftreibung durch Flatulenz
 - Schwere und Unbehagen durch versetzte Winde
 - Das Kind möchte, dass man ihm den Bauch massiert. (Nat-s., Podo.)

REKTUM

- Windabgang beim Stuhlgang
- Stuhl drang beim Gehen (Rheum)
- Untersuchungsergebnisse
 - harter Stuhl, gefolgt von pastösem Stuhl (Ph-ac.)
 - weißer Stuhl (Calc., Podo.)
 - Stuhl verdickt, knotig, klumpig, weiß, wie Kreide

HARNWEGE

- Völlegefühl in der Harnblase, doch es geht nur wenig Harn ab.
- ständiger Harndrang

WEIBLICHE GENITALIEN

- Leukorrhoe wie Eiklar (Graph., Sabin.)
- Kinder mit leicht erregbaren Genitalien, wie Platinum und Origanum
- Kinder von Müttern mit vererbten Genmutationen, z.B. Brustkrebsgen 1 (BRCA1), Brustkrebsgen 2 (BRCA2), mit auffällig vielen Ovarialkarzinomen in der Familiengeschichte oder deren Mutter an einem Ovarialkarzinom oder Brustkrebs erkrankt war
- Untersuchungsergebnisse
 - Tumor des Ovarialepithels
 - zystische Ovarialmasse

ATMUNG

- Asthma nach emotionaler Erregung (Coff., Gels., Ign.)

EXTREMITÄTEN

- Untersuchungsergebnisse
 - Warzen an Fußgelenken, Fingerknöcheln und Händen (Bar-c., Caust.)
 - Zucken der Finger (Nat-c., Phos.)
 - Rotfärbung der Fußgelenke (Cham., Lach.)
 - Kontraktion von Muskeln und Sehnen
 - kalte Hände (Camph., Chel.)

SCHLAF

- Auffahren im Schlaf
- Kinder, die im Auto einschlafen (Lyc., Sulph.)
- überwältigendes Schlafbedürfnis am Nachmittag (Apis, Bell.)
- Schläfrigkeit durch Kopfschmerzen
- träumt davon, verfolgt zu werden

HAUT

- Juckreiz nach dem Entkleiden (Dros., Rumx.)
- Neigung zur Pickelbildung, v.a. im Gesicht, an Nase, Lippen, Hals und Augenlidern
- kleine Pickel wie Flohstiche (Jug-c.)
- Untersuchungsergebnisse
 - Psoriasis

GEMEINSAME SYMPTOME VON PLATINUM UND PALLADIUM BEI KINDERN

- ausfällig, beleidigend
- Beschwerden durch Egoismus
- Beschwerden durch Kränkung
- ehrgeizig
- heftiger Zorn
- herablassend
- erträgt keinen Widerspruch
- Wahnidee, er sei verlassen worden
- Wahnidee, er werde vernachlässigt
- herrisch
- unzufrieden
- Egoismus
- Höhenangst
- hochmütig
- ungeduldig
- unhöflich, grob
- selbstsüchtig
- eitel
- scharfer Geruchssinn
- harter, knotiger Stuhl
- kalte Hände

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN PALLADIUM UND PLATINUM BEI KINDERN

	PALLADIUM	PLATINUM
schroff, brüsk		+
affektiert, geziert		++
liebevoll, warmherzig		+
Beschwerden durch sexuellen Missbrauch		+

	PALLADIUM	PLATINUM
Beschwerden durch Tod eines Elternteils oder Geschwisters		++
Beschwerden durch Kränkung		+
Verlangen nach Vergnügen	+	
ängstlich gegenüber den erfreulichsten Dingen		+
Angst um die Gesundheit von Eltern und Verwandten		+
ungeschickt, lässt Gegenstände fallen		+
kann kein Blut sehen		+
Angeber		+
voller Sorgen		+
Abneigung gegen Liebkosungen		+
heiter in Gesellschaft	+	
Mangel an Selbstvertrauen	+	
Unterhaltung bessert	+++	
Fluchen	+	
Tanzen		+
Wahnidee, misshandelt zu werden	+	
Wahnidee, kritisiert zu werden	+	
Wahnidee, beleidigt zu werden	+	
schmutzig		+
Erregung durch Musik	+	
Furcht vor Unfällen	+	
Furcht, etwas Schlimmes werde passieren	+	
Furcht vor engen Räumen	+	
Verlangen nach Schmeicheleien	+	
geckenhaft		+
schnippisch		+
Weinen nach Kränkung	+	
Kopfschmerz, Lesen agg.		+
Kopfschmerz in überfüllten Räumen		+++
Kopfschmerz, Denken an die Beschwerden amel.	+	

	PALLADIUM	PLATINUM
trockene Augen	+	
schwarzer Stuhl		+
Stuhl hart, wie verbrannt		++
weißer Stuhl	+	
Würmer		+
Abneigung gegen Fleisch		+
dunkler Teint		+

PHOSPHORUS

(Elementarer gelber Phosphor - Phos.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ **Aktive** Kinder, die breite Interessen haben und **kreativ** sind, sich aber schnell erschöpfen.
- ▶ Zuneigung wird spontan ausgedrückt; sie sind **kontaktfreudig** und lieben **menschliche Wärme** (Zärtlichkeit und Küsse) (Puls.).
- ▶ Kinder, die durch ihre charmante, dynamische und extrovertierte Persönlichkeit anziehend wirken; sie strahlen Wärme und Intelligenz aus.
- ▶ Zappelige Kinder, die nicht stillsitzen können.
- ▶ Intelligente, freundliche und sensible Kinder.

KÖRPER

- ▶ Kinder, die zu Beginn der Pubertät (Sulph.) **sehr schnell wachsen**. Dann sind sie mager, dünn und schlaksig.
- ▶ Kinder husten beim Anblick von Fremden (Ambr., Caust.).
- ▶ Rasch Nasenbluten bei geringstem Anlass.
- ▶ Schweiß am ganzen Körper außer an den Füßen.
- ▶ Heißhunger mit Abmagerung und übermäßigem Durst.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Qualvolle Angst und Furcht, wenn sie allein sind.** Es ist eine große Strafe für Phos.-Kinder, allein zu sein. Sie **lieben und brauchen Gesellschaft**.
- **Sorglose** Kinder, die sich nicht viel mit Lernen abgeben, da sie intelligent sind oder Kinder, die sich in wissenschaftlichen Fächern genauso hervortun wie in Aktivitäten außerhalb des Lehrplans.
- **Heiteres, lebhaftes und frühreifes Kind**, das es liebt zu reisen oder auszugehen.
- **Hellsichtig**.
- **Dunkelheit** in jeder Form **verschlimmert**, da das Kind dann schreckliche Visionen hat von toten Verwandten, Freunden, Geistern und bösen Menschen
- **Ist leicht erschreckt** und entwickelt eine starke Furcht, wenn es gebeten wird:
 - Sich Blut abnehmen zu lassen (fällt gewöhnlich in Ohnmacht).
 - Eine geringe Erste-Hilfe-Maßnahme wie das Verbinden einer Verletzung, Wunde etc. durchzuführen.
 - Sich für eine körperliche Untersuchung ausziehen.
 - Wegen einer Untersuchung zum Arzt oder Zahnarzt zu gehen.
- Kaut bei Angst häufig an den Nägeln oder beißt ins Kissen.

- **Fühlt sich emotional zu schnell verbunden** mit Menschen oder Tieren (daher ist **Anklammern** ein wichtiges Symptom).
- Furcht vor Schaben, **Dunkelheit, Geistern, Spinnen**.
- Gibt oft Phantasien Raum und begibt sich in einem Zustand von **Tagträumerei**, um der Realität zu entfliehen (hauptsächlich durch ein Verlassenheitsgefühl).
- **Große Tierliebe**, besonders Hunde und andere zahme Tiere. Würde gerne zusammen mit dem Haustier essen und schlafen. Würde auch gerne streunende Tiere füttern und freut sich sehr über einen Besuch im Zoo.
- **Wachsame, aufmerksame und beobachtende Kinder**.
- Starkes Verlangen nach **kreativen Tätigkeiten** wie Töpfern, Handarbeiten, Zeichnen, Malen etc.
- Starkes Verlangen magnetisiert und sanft gestreichelt zu werden. Das Kind bittet Familienmitglieder häufig, es zu kitzeln oder **sanft zu reiben**.
- Glückliche und zufriedene Kinder (weil sie sanft sind).
- Entwicklungsstillstand.
- Äußerst kitzlig
- Trägt gern hellblaue, rosa oder rote Kleidung mit lustigen Mustern.
- Machen lustige und seltsame Gesten, wenn sie verwirrt sind oder in Gegenwart von Fremden.
- Stöhnen bei Schmerzen.
- Gehorsame Kinder, die Respekt gegenüber Älteren, Familienmitgliedern, Lehrern und Freunden zeigen und daher immer überall willkommen sind.
- Spielt am liebsten mit Barbie-Puppen, Arzt-Köffchen, Scrabble, Uno, Spielzeugautos etc. Phos-Kinder mögen auch Märchen spielerisch darstellen.
- Anfälle von Bewusstlosigkeit oder Ohnmacht, beim Fasten, bei Fieber, durch strenge Gerüche und wenn es Blut sieht.
- Starke Ängstlichkeit, wenn ein Familienmitglied erkrankt.
- Wutanfälle; schlägt seinen Kopf und andere Dinge im Zorn gegen die Wand.
- Tendenz, Leute, Kissen oder Nägel zu beißen durch Trennungsangst, Furcht und Schreck.
- Schlimmer bei Gewittern. Bei Gewittern und Blitz ist das Bedürfnis nach Gesellschaft groß; wenn es in Gesellschaft ist, will das Kind sich anklammern und versteckt sich gern an einem sicheren Platz; umarmt Familienmitglieder ganz fest.

KOPF

- Kopfschmerzen begleitet von **überempfindlichem Geruchssinn**, Übelkeit, schmerzhaftem und steifem Nacken, **Heißhunger** (Psor.) und Erbrechen.
- Periodische Kopfschmerzen bei Schulkindern durch Wetterwechsel, Hunger, mechanische Verletzungen, Sonnenlicht, **vor Gewitter** und in einem **warmen Zimmer**; besser nach Schlaf, im Freien und durch Waschen des Gesichts mit kaltem Wasser.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Büschelweiser Haarausfall**.
 - Hirnblutung durch Ruptur arteriovenöser Missbildungen oder kleiner Aneurysmen.
 - Kalter Schweiß auf der Stirn.
 - Trockene Kopfhaut mit weißen Schuppen oder Pilzinfektionen (Thuj.).

- Hydrozephalus bei Kindern mit Meningitis oder Enzephalitis.
- Offene Fontanellen.
- Gerunzelte Stirn bei Kopfschmerzen.

AUGEN

- **Tränenfluss bei Schnupfen, im Freien, in einem warmen Zimmer, beim Lesen und während Stuhlgang oder Urinieren.**
- Lider morgens durch gummiartige Absonderungen verklebt.
- Verlust des Sehvermögens nach Meningitis.
- Augenschmerzen durch Licht; besser nach Schlaf.
- Photophobie.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Lange, gebogene Augenwimpern.**
 - Divergenter Strabismus.
 - Ödematöse Schwellung des Unterlides.
 - Exophthalmus.
 - Lähmung des Sehnervs.
 - Ptose mit Lähmung der äußeren Augenmuskeln.
 - Eingesunkene Augen.

OHREN

- **Vermindertes Hörvermögen beim Gehen im Wind** durch Katarrh der Eustachischen Röhre.
- Otitis media mit Jucken im Gehörgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Absonderung von blutigem Ohrenschmalz.
 - Mastoiditis.
 - Polypen.
 - Rötung der Ohren.

NASE

- **Verstopfung der Nase, abwechselnde Seiten, besonders im warmen Raum; besser durch Hinausgehen ins Freie.**
- **Die Nase ist empfindlich gegen Gerüche und Zugluft.**
- Absteigende Erkältungen.
- Nasenbluten mit reichlichem, hellrotem Blut bei Fieber, beim Gesichtwaschen am Morgen oder bei der Anstrengung, Stuhl auszuscheiden.
- Anfallartiges Niesen ohne jede Absonderung, durch Gerüche oder beim Händewaschen; besser draußen im Freien.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Fächerartige Bewegung der Nasenlöcher, besonders bei Kindern mit Lungenentzündung.**
 - **Sommersprossen auf der Nase.**
 - Polypen, die **schnell** und reichlich **bluten**.
 - Zupft und bohrt seine Finger andauernd in die Nase, bis es blutet.
 - Die Nase ist geschwollen, rot und glänzend, besonders die Spitze.
 - Einseitiger Schnupfen; reichliche, grünliche, blutgestreifte Absonderung.

GESICHT

- Entzündung und Vereiterung der Ohrspeicheldrüsen und der submaxillären Lymphknoten, mit Tendenz zur Abszessbildung.
- Schwitzt nur im Gesicht.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Umschriebene Gesichtsröte**, aber blass um Nase und Mund.
 - **Sommersprossen.**
 - **Vermehrtes Haarwachstum im Gesicht, sogar zwischen den Augenbrauen** (Med.).
 - Die Kiefer sind entweder fest zusammengepresst oder **machen dauernde Kaubewegungen.**
 - **Deutliche Nasolabialfalte.**
 - Akne rosacea.
 - Blutige Krusten an den Rändern der Nasenlöcher.
 - Risse in der Mitte der Unterlippe, die leicht bluten.
 - Neigung zur Kieferverrenkung.
 - Fettige oder wächserne Haut.
 - Psoriasis der Augenbrauen.
 - Schwellung und Eiterung des Unterkiefers, die zu Karies und Nekrose führt (Amph, Hecla).
 - Geschwüre oder Fieberblasen an den Mundwinkeln.

MUND

- **Reichliches Blüten des Zahnfleisches nach Zahnextraktion.**
- Der Mund ist beim Erwachen am Morgen trocken.
- Langsame Zahnung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Schwierigkeiten, den Mund zu öffnen, Zunge zittert beim Herausstrecken.
 - Zahnfleischentzündung, die zur Vereiterung und Fistelbildung neigt.
 - Das Zahnfleisch löst sich von den Zähnen und blutet leicht, sogar durch Berührung.
 - Unregelmäßig angeordnete untere Zähne.
 - Der Mund ist voller Aphthen, besonders auf der Zunge und am Gaumen.
 - Schon früh sich schnell ausbreitende Karies mit schwarzen Zähnen.
 - Zahnbeläge.

HALS

- Würgen beim Schlucken; die Flüssigkeit wird wieder hochgezogen und zur Nase hinaus befördert (schwacher Hustenreflex bei Kindern mit neurologischen Beschwerden).
- Schluckschwierigkeiten, besonders bei Flüssigkeiten (gegensätzlich zu Kali-c.).
- Trockenheit im Hals beim Erwachen.
- Räuspert käsige Klumpen hoch (käsige Ablagerungen auf den Mandeln).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Trockener, dunkelroter, glänzender Hals.
 - Kropf, besonders rechtsseitig.
 - Hervorsickern von Blut aus den Tonsillen.

- Schwellung der zervikalen Lymphknoten.
- Tonsillen und Zäpfchen geschwollen, das Zäpfchen ist verlängert.
- Torticollis, der Kopf wird nach links gezogen.

MAGEN

- **Erbrechen nach Trinken der geringsten Mengen und sobald das Wasser im Magen warm wird.**
- Appetit: Muss oft etwas essen, wird sonst ohnmächtig; Hunger kurz nach der Mahlzeit, besonders nach dem Abendessen.
- Die Kinder trinken viele kalte Getränke, die kurz darauf erbrochen werden.
- Gurgeln im Magen nach Trinken.
- Übelkeit und Erbrechen bei einem Kind, bei dem Chloroform während einer Operation angewendet wurde.
- Magenschmerzen Stunden nach dem Essen (durch Gastritis), durch warme Speisen oder Getränke und durch Brot; besser durch kalte Speisen und Getränke und durch Eiscreme.
- Schmerzhafter Schluckauf bei Fieber.
- Pylorusverengung; die Nahrung scheint am Mageneingang festzusitzen.
- Heißhunger bei Fieber oder Kopfschmerzen.
- Durstlosigkeit trotz trockener Zunge.
- Heftiges Erbrechen von Galle oder schwarzem Blut.
- Abneigung: **Gekochte Milch**, Brot, Butter, Cornflakes, Kaffee, Fisch, Mehl, Obst, Knoblauch, Zwiebeln, Gebäck, **Kartoffeln**, Pudding, Tee, **Tomaten, Gemüse, warme Speisen und Getränke.**
- Verlangen: Käse, Hühnchen, Schokolade, **Cola, kalte Getränke, kalte Speisen**, Gurken, **Hamburger, Eiscreme, saftige Dinge**, Pizza, Reis, **Salz**, Saures und Gewürztes.

ABDOMEN

- **Abneigung gegen Decken auf dem Bauch** (Lach.).
- **Auftreibung des Abdomens bei Verstopfung und eingeklemmten Blähungen, nicht besser durch Abgang von Blähungen oder Aufstoßen.**
- Schmerz in der Ileocoecalregion, besonders beim Husten.
- Reichlicher Schweiß am Rumpf.
- Kinder mit schwacher Abwehrlage durch Hepatitis A oder B oder durch HIV-Infektion können eine Lungenentzündung entwickeln.
- Reibt das Abdomen zur Erleichterung (Podo., Nat-s.).
- Nützlich in Fällen von „Indian childhood cirrhosis“ [ICC, eine genetisch bedingte und durch Kupferbelastung hervorgerufene Form der Leberzirrhose], von Gelbsucht durch Hepatitis und von Pankreatitis.
- Untersuchungsergebnisse:
 - **Intussuszeption** (Op., Plb.).
 - Blinddarmentzündung.
 - Vergrößertes und schlaffes Abdomen.
 - Kernikterus [Bilirubinzephalopathie].
 - Leber und Milz sind vergrößert, hart und empfindlich bei der Palpation.
 - Schmerzhafter Leistenbruch.

REKTUM

- Chronische Verstopfung, mit **trockenen, gräulichen, hundeartigen, langen, schmalen, harten Stühlen**.
- Durchfall nach stark gewürzten und reichhaltigen Speisen, durch die geringste Unbesonnenheit beim Essen; bei Kindern, die an Tuberkulose leiden; bei warmem Wetter; **besser durch Eiscreme oder kalte Getränke**.
- **Unwillkürlicher Abgang von Stuhl oder Urin im Schlaf oder nach Schreck**.
- **Reiswasserartige Stühle** mit Abmagerung, sauberer Zunge und Eiseskälte von Händen und Füßen bei Säuglingen und Kleinkindern, die an Cholera leiden.
- Morbus Crohn.
- Dysenterie begleitet von einer trockenen, rissigen Zunge.
- Jucken im Rektum nachts.
- Schmerzloser, schwallartiger Durchfall, sofort beim Erwachen am Morgen, hellgelb oder grünlich, blutig, übelriechend, voller Schleim, mit unverdauten Nahrungspartikeln.
- Viele übelriechende Blähungen beim Stuhlgang.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Polypen mit dauerndem Hervorquellen von Feuchtigkeit.
 - Rektumprolaps.
 - Entspannter und offener Anus.
 - Stuhl: Giardia Lamblia ++, Madenwürmer, Leukozyten++, Spulwürmer und Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

- Reichlicher Urin, wasserklar oder wolkig, mit Drang, bei Fieber.
- Blutiger Urin bei akuter Nierenentzündung; scheidet dunkelbraun gefärbten Urin oder roten Sand im Urin aus.
- Chronisch eiweißhaltiger Urin bei Kindern, die an parenchymatöser Nierentzündung leiden.
- Unwillkürliches Urinieren nach Stuhlgang, beim Husten, Niesen oder Gehen.
- Nächtliches Einnässen, besonders in der ersten Schlafphase.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Dicker, milchiger, stark riechender Urin, der reichlich weißes Sediment in der Windel hinterlässt.
 - Urin: Albumin ++, Zylinder (Epithel- und hyaline), Fett +, Glukose +++, Phosphate ++, Eiter +++ und Erythrozyten ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Frühe Neigung zu masturbieren.
- Untersuchungsergebnis:
 - Hydrozele.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Frühe und heftige Neigung zu masturbieren.
- Milchiger oder blutiger, scharfer Ausfluss, der das Schamhaar ausfallen lässt, bei jungen anämischen Mädchen.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Intensive Reizung, Rauheit oder Kitzelgefühl im Kehlkopf, mit unaufhörlichem, trockenem Husten im Freien oder nachts, besonders beim Liegen auf der linken Seite; Kind muss sich dauernd räuspern.
- Plötzlicher, schmerzloser Stimmverlust oder schmerzhaftes Heiserkeit, mit oder ohne Schnupfen, durch den geringsten Wetterwechsel oder durch langes Reden.
- Laryngismus stridulus mit plötzlicher Verengung des Kehlkopfes beim Einschlafen.
- Der Kehlkopf ist wund und schmerzhaft beim Sprechen oder durch Husten; das Kind greift sich an den Hals beim Husten.

ATMUNG

- Atemnot mit Husten; **abends im Bett bis 22 Uhr**, nach Essen oder warmen Getränken, durch Anstrengung, durch **Geruchseinwirkung** oder in Rückenlage; **besser in Seitenlage**.
- Asthma bei Kleinkindern, Atmung behindert durch Blähungen und vollen Bauch
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bauchatmung.
 - Hyperventilation mit beschleunigtem, tiefem Atmen bei nervösen und empfindlichen Kindern.
 - Rasselnde Atmung, wie von reichlich Schleim in der Brust.

HUSTEN

- Asthmatischer Husten durch **Gehen im Freien** oder kalte Getränke; **scheint aus dem Magen oder Abdomen zu kommen**.
- **Der Husten ist schlimmer, wenn das Kind auf der linken Seite liegt und besser sobald es sich auf die rechte Seite dreht** (Rumx, Sep).
- Unaufhörlicher, quälender Husten, Tag und Nacht, mit Würgen, das erschöpft; durch Kitzeln in Kehlkopf und Luftröhre; schlimmer durch **Lachen, lautes Lesen** oder Sprechen und beim Schlafengehen.
- Husten durch den geringsten Wetterwechsel, bei Wechsel vom warmen Raum in die kalte Luft oder umgekehrt.
- Trockener Husten bei Herzklappenerkrankungen (Laur., Spong.).
- Nervöser Husten durch starke Gerüche oder wenn ein Fremder hereinkommt.
- Anfallsartiger kurzer Husten nachts durch Verengungsgefühl im Kehlkopf, das Kind muss sich aufsetzen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Beim Husten hält sich das Kind die Brust und den Hals mit beiden Händen.
 - Keuchhusten.

BRUST

- Schmerz in den Seiten, **besonders in der unteren linken Seite**; schlimmer beim Husten; besser durch warme Anwendungen.
- Bronchitisanfälle nach jeder Erkältung.
- Lungenentzündung mit Beklemmung, schlimmer durch Liegen auf der linken Seite.

- Lungenödem (Ant-t., Merc-sul., Solin-act.).
- Nützlich in Fällen von rezidivierenden Lungenentzündungen oder persistierenden Lungenentzündungen bei immungeschwächten Kindern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Lungenabszess.
 - Bronchialatmung.
 - Hühnerbrust.
 - Rachitischer Rosenkranz.

HERZ UND KREISLAUF

- **Herzklopfen durch die geringste Bewegung** oder Anstrengung, beim Erwachen und beim Aufstehen aus dem Bett; besser durch Liegen auf der rechten Seite.
- Herzinsuffizienz.
- Rheumatische Endokarditis (Aur., Spig.).
- Herzklappenerkrankungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Herzgeräusche.
 - EKG: Dilatation des Herzens und Regurgitation durch Mitralklappeninsuffizienz.
 - Puls: Klein, weich, schwach, beschleunigt am Abend und langsam am Morgen.

RÜCKEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Furunkel der Halsgegend (Kali-i., Sil.).
 - Abmagerung und Wirbelsäulenverkrümmung in der Halsgegend.
 - Myelitis.
 - Opisthotonus.
 - Spina bifida (Sil.).

EXTREMITÄTEN

- Wachstumsschmerzen.
- Syringomyelie [Erkrankung des Rückenmarks].
- Schwäche durch die geringste Anstrengung.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Die Hände zittern beim Schreiben und beim Ausstrecken (Plb.).
 - Zusammengeballte Finger.
 - Psoriasis der Handflächen mit schmerzhaften Rissen.
 - Steht und geht mit gespreizten Beinen.
 - Empfindliche Hühneraugen an den Füßen.
 - Unsicherer Gang, stolpert leicht.

SCHLAF

- Im Schlaf: Unwillkürlicher Zungenbiss, Gliederzucken, Treten, Stöhnen, Schweiß (besonders der Halsgegend), Speichelfluss, Schlafwandeln und pfeifende Atmung.

- Schläft auf dem Rücken mit den Händen unter dem Kopf; kann nicht auf der linken Seite schlafen.
- Schlaflosigkeit bei Kindern während Husten, Zahnung oder durch Hunger.
- Tagsüber schläfrig, schlaflos vor Mitternacht.

FIEBER

- Frost:
 - Aufsteigende Kälte mit Schüttelfrost und Durchfall.
 - Verlangen sich aufzudecken trotz Frost, Wärme bessert nicht.
 - Eisige Kälte der Hände und Füße bei Frost.
- Hitze:
 - Rückenschmerzen, wolkiger Urin, verengte Pupillen, Durchfall, Erweiterung der Handvenen, überwältigende Müdigkeit und Gähnen, rote Augen mit Blutandrang, ruhelose untere Gliedmaßen und unstillbarer Durst auf kalte Getränke.
 - Fieber mit brennender Hitze, besonders an der Brust und unter den Achseln.
 - Je höher die Temperatur, desto heftiger der Husten.
 - Schlimmer nach dem Füttern.
- Schweiß:
 - Reichlicher, kalter und übelriechender Schweiß der Achseln, Füße und Handflächen.
- Fieber abwechselnd mit Frost.

HAUT

- Jucken durch Wolle.
- Ungesunde Haut mit eitrigen, fistulösen Geschwüren und übelriechenden Absonderungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Sommersprossen.
 - Ikterus.
 - Naevi; Petechien; Purpura haemorrhagica.

ALLGEMEINES

- **Beschwerden durch Wetterwechsel**, Masturbation, unterdrückte Ausschläge oder **unterdrückten Fußschweiß**, Gewitter und Impfungen.
- Beschwerden beginnen **nach Narkose (Chloroform)** oder nach Missbrauch von Phetidin, Iod- oder Chininpräparaten.
- Allergische Konstitution, mit **Erkältungsneigung**.
- **Blutungsneigung**; auch nützlich in Fällen von Schock ausgelöst durch Blutungen.
- **Tiefgreifende Schwäche mit Schweiß** durch Durchfall, Fieber oder Blutungen; muss sich anlehnen oder hinlegen.
- Verbrennungen durch Röntgen oder nach elektrischem Schock.
- Kinder mit persönlicher Vorgeschichte von chronischem Durchfall, Lungenentzündung, Tuberkulose, rezidivierender Bronchitis, Krupp, Nasenbluten etc.
- Fröstelige Patienten, die keinen kalten Wind oder frische Luft ertragen.
- Chorea schlimmer durch Gefühlserregung und bei Gewitter.

- Dimorphe Anämie durch chronische Dysenterie, Hakenwurmbefall oder Giardiasis.
- Ödeme durch Nieren- oder Herzerkrankungen.
- Abmagerung bei Kindern trotz Heißhunger.
- Lernt spät Laufen.
- Reichlicher, kalter, feuchter, stinkender, schwächender Schweiß, Tag und Nacht, durch die geringste Anstrengung und nach dem Essen; Schweiß an allen Körperteilen außer den Füßen.
- Rachitis.

PINUS SILVESTRIS

(Kiefer - Pin-s.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Skrofulöse Diathese.
- ▶ Langsame Entwicklung.
- ▶ Neigt zu Rachitis.
- ▶ Schwache Sprunggelenke und lernt deshalb erst spät laufen.
- ▶ Schwerwiegende Mangelernährung.
- ▶ Abmagerung der unteren Gliedmaßen durch Ernährungsstörungen.
Abmagerung der Unter- und Oberschenkel; beginnt an den unteren Gliedmaßen und erstreckt sich nach oben. Versteckte Spulwürmer sind manchmal die Ursache für die Abmagerung.
- ▶ Vergrößerte Leber.
- ▶ Tuberkulose der Lymphdrüsen besonders Hals- und Mesenteriallymphknoten.

HERKUNFT

- Kommt aus Sibirien und gehört zur Familie der Kiefernartigen (Pinaceae).

PITUITARIA ANTERIOR

(Adenohypophyse - Pitu-a.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Weinen wegen Kleinigkeiten.
- ▶ Nächtlicher Kopfschweiß.
- ▶ Migräne, besonders an den Schläfen mit Lichtscheu und Übelkeit, schlimmer durch Licht, Lärm, Sonne und warme Räume.
- ▶ Kopfschmerzen durch zu langes Tragen der Brille.
- ▶ Nasenbluten im Schlaf.
- ▶ Entzündung des Ohrläppchens durch Ohrringe aus Nickel oder aus anderem geringwertigem Material.
- ▶ Landkartenzunge.
- ▶ Großes Verlangen nach Kuchen, Schokolade und gebratenen Kartoffeln; ausgeprägtes Verlangen nach Süßigkeiten.
- ▶ Verschlimmerung durch Eier, Fett und Milch.
- ▶ Laktoseintoleranz. Schlimme Bauchschmerzen mit Rumpeln und Durchfall nach dem Trinken von Milch.
- ▶ Laktoseintoleranz durch enttäuschte Liebe der Mutter in der Schwangerschaft.
- ▶ Verstopfung täglich oder jeden zweiten oder dritten Tag. Der Stuhl ist hart, trocken und groß.
- ▶ Alles, was gegessen wird, verwandelt sich in Gas, besonders Obst und Gemüse.
- ▶ Durchfall durch Erwartungsspannung.
- ▶ Eingezogene Hoden.
- ▶ Langsames Nägelwachstum.
- ▶ Leichter Schlaf, wacht bei kleinsten Geräuschen auf.
- ▶ Allergische Konstitution, Kontaktdermatitis überall am Körper, wo metallische Ketten oder Armreifen die Haut berühren.

HERKUNFT

- Hergestellt aus dem vorderen Hypophysenlappen.

PLATINUM METALLICUM

(Platin - Plat.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Die Platin-Kinder sind sofort **fasziniert von Schönheit, Make-up, Styling und Mode**; schon früh wollen sie entweder Schönheitskönigin oder Filmstar usw. werden.
- ▶ Sie wollen für jede Kleinigkeit **gelobt und umschmeichelt** werden (Lyc., Pall., Verat.).
- ▶ Arrogante, stolze und egoistische Kinder.
- ▶ Sie lieben es, mit teurer und eleganter Kleidung alle Blicke auf sich zu ziehen.
- ▶ Frühes und ausgeprägtes Verlangen nach Masturbation und Geschlechtsverkehr.
- ▶ Empfindlich, weint bei der geringsten Zurechtweisung.
- ▶ Ärgert sich sehr schon bei Kleinigkeiten (Ign., Staph.).

KÖRPER

- ▶ **Empfindliche Geschlechtsorgane**; das Kind schreit bei der Berührung von Windeln oder Unterwäsche.
- ▶ Trockener Husten bei hysterischen Kindern.
- ▶ Unwillkürliche Bewegungen der Mundwinkel und Augenlider.
- ▶ Sensible und leicht ermüdbare Kinder.
- ▶ Schlanke, rundgesichtige Kinder mit fleischigen markanten Lippen und stolzer Haltung.
- ▶ Kleine Mädchen, die ihr eigenes Geschlecht nicht akzeptieren und sich wie Jungs geben (Nat-m.); dagegen sehen Jungen, die Platin brauchen, eher verwehlicht aus (Lyc., Sil.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Beschwerden durch: **Zorn**, Tod der Eltern, Egoismus, Kummer, Tadel oder Verachtung und **sexuellen Missbrauch**.
- **Zeigt unechte Gefühle**, um andere zu beeindrucken, führt oftmals zur **Affektiertheit** (Stram.), wie z. B. jeden zu umarmen und zu küssen.
- **Wunsch, Klavierspielen zu lernen; liebt es, Klaviermusik zu hören**.
- Zeigen schon sehr früh **Führungsqualitäten** (Lyc., Sulph.).
- **Übertreiben** sehr stark die eigenen Verdienste, prahlen und **wenden viel auf für ihre Selbstdarstellung**.
- Sehr **arobe und unhöfliche** Kinder, die sogar ihre eigenen Eltern beleidigen.

- Bulimie oder Magersucht folgen auf unterdrückten Zorn oder das Gefühl, vernachlässigt zu werden.
- Launische Kinder, die dazu neigen, mit allem unzufrieden zu sein.
- Trost verschlimmert.
- Hinterlistige Kinder, erreichen durch Schmeichelei die Erfüllung ihrer Wünsche (Verat.).
- Neigung, andere Kinder, die körperlich und geistig unterlegen sind, zu verspotten und zu kritisieren.
- Furcht vor Geistern.
- Fühlen sich ungeliebt, verlassen und schnell zurückgewiesen (Puls., Staph.).
- Hochmütige, dickköpfige Kinder; können „Nein“ nicht als Antwort annehmen; es ist schwierig, sie auszubilden und zu disziplinieren.
- Keine künstlerischen Fähigkeiten.
- Untröstliches Weinen bei Ermahnung, Zorn und Vorwürfen.
- Ausgesprochen ehrgeizig.
- Übertriebenes Lachen, auch über ernsthafte Dinge.
- Zwangsneurose, sich dauernd die Hände zu waschen.
- Schmerzempfindlich; schreit und weint bei Schmerzen.
- Schamlosigkeit, unanständige Kleidung.
- Bedroht und schlägt seine Freunde in heftigem Zorn, mit blassem Gesicht.
- Sehr formell und korrekt.
- Sehr selbstsüchtige und undankbare Kinder; hartherzig.

KOPF

- Kopfschmerz **durch Zorn**, bei Kindern, die von einem strengen Elternteil oder Lehrer dominiert werden.
- Die Kopfschmerzen treten besonders in den Schläfen oder halbseitig auf, mit verschwommenem Sehen und Tränenfluss; schlimmer durch Überanstrengung der Augen und in einem überfüllten oder stickigen Raum; besser bei geschlossenen Augen und durch Gehen im Freien.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Hydrozephalus.
 - Migräne.

AUGEN

- Untersuchungsergebnisse:
 - Augen nach oben gerollt.
 - Pupillen sind unempfindlich gegen Licht.
 - Starrer Blick.
 - Eingesunkene Augen.
 - Zucken der Lider.

NASE

- Überempfindlicher Geruchssinn.
- Verstopfung der Nase, auf abwechselnden Seiten, im warmen oder geschlossenen Zimmer.
- Untersuchungsergebnis:
 - Nasenbluten mit dunklem, geronnenem Blut.

GESICHT

- Rotes Gesicht bei Wutanfällen (Bell., Hyos., Nux-v., Stram.).
- Untersuchungsergebnisse:
 - Rissige Lippen oder Neigung, sie abzuschälen.
 - Eingefallenes Gesicht mit blauen Ringen unter den Augen und Kälte, besonders der rechten Seite.

MUND

- Schwierige Zahnung.
- Reichlicher Speichelfluss.
- Stottern.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Bläuliche Verfärbung der Zunge.
 - Lockerung kariöser Zähne.

HALS

- Neigung, ständig zu schlucken.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Verlängertes Zäpfchen.
 - Schmerzhafter Kropf.
 - Geschwollene rechte Mandel (Phyt.).

MAGEN

- Schluckauf.
- Lautes Aufstoßen bei Hunger (Nux-v.).
- Durstig nachts nach dem Abendessen.
- Abneigung: **Fleisch**.
- Verlangen: Brot, kalte Getränke, Süßigkeiten.

ABDOMEN

- **Schmerzen im Abdomen durch Schreck und Hunger** (Calc., Sep., Staph.).
- Krampfartige, schneidende Schmerzen im Abdomen, besonders in der Nabelgegend, mit Verstopfung.
- Einklemmte Blähungen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Leistenbruch.
 - Hängebauch.

REKTUM

- **Wollüstiges Jucken um den Anus** (Sulph.).
- Verstopfung auf Reisen, mit vergeblichem Drang und Anstrengung, sogar bei weichem Stuhl; die Stühle müssen mechanisch entfernt werden.
- Schafskot-ähnliche Stühle, die trocken, hart, knotig sind und in schwarze Kugeln zerfallen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Fissuren im Rektum.

HARNWEGE

- Untersuchungsergebnis:
 - Roter Urin, der rotes Sediment in den Windeln hinterlässt.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Neigung zu masturbieren bei kleinen Kindern, besonders im Schlaf.

WEIBLICHE GENITALIEN

- Frühzeitiges und heftiges sexuelles Verlangen bei jungen Mädchen, führt zur Masturbation (Orig.).
- Weißer oder durchsichtiger, schmerzloser Ausfluss, besonders tagsüber mit wolüstigem Jucken der Vulva.

KEHLKOPF

- Heiserkeit durch Knoten auf den Stimmbändern.
- Laryngismus stridulus.

ATMUNG

- Spasmodisches Asthma; schlimmer im Freien oder bei Wind.

HUSTEN

- Husten bei Windpocken (Ant-c.).
- Der Husten fühlt sich an, als ob er aus dem Magen käme (Bry., Kali-bi., Sep.).
- Kurze und trockene Hustenanfälle bei Fieber.

HERZ UND KREISLAUF

- Rheumatische Endokarditis.
- Untersuchungsergebnis:
 - Puls: Schwach.

EXTREMITÄTEN

- Kontraktion der Fingersehnen, dadurch bleiben die Finger zusammengeballt (Lähmung der Fingerstrecker, z. B. Extensor digitorum profundus, Extensor pollicis longus und brevis).
- Neigung, die Beine nachts aufzudecken (Med., Sulph.).
- Schwäche der Beine.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Ruhelosigkeit der unteren Glieder, besonders der Beine, beim Sitzen (Med., Zinc.).
 - Konvulsionen der Arme.
 - Zittern der Hände beim Ausstrecken.

SCHLAF

- Schläft auf dem Rücken mit den Händen über dem Kopf und die Beine gespreizt und aufgedeckt.
- Schläft schnell ein beim Lesen (Gels.) oder nach dem Essen.
- Schweißbildung im Schlaf.

HAUT

- Wollüstiges Jucken in der Nacht, das sich durch Kratzen nicht bessert.
- Untersuchungsergebnis:
 - Kalte, blasse Haut.

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch Zorn, Schreck, Masturbation und Würmer.
- Konvulsionen mit tetanischer Starre.

ALLGEMEINES

- **Extreme Schmerzempfindlichkeit, die allmählich zu- und wieder abnimmt.**
- Beschwerden durch Masturbation und unterdrückten Schweiß.
- Sehr schnell wechselnde körperliche Symptome ODER körperliche Symptome wechseln mit Gemütssymptomen ab.
- Rechtsseitige Symptome.
- Zittern bei Frösteligkeit, durch Schreck oder bei Schmerzen.

PLUMBUM METALLICUM

(Blei - Plb.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Kinder mit langsamer Auffassungsgabe; auch das Nachdenken braucht Zeit und die Antworten kommen entsprechend langsam.
- ▶ Durchschnittliche Lernfähigkeiten, oft auf Förderschulen.
- ▶ Kinder, die ihre Beschwerden übertreiben.
- ▶ Verlangsamte geistige und körperliche Reaktion; nimmt Eindrücke nur schwer auf, öffnet sich nur langsam und braucht Zeit, um sich auszudrücken.
- ▶ Schüchterne und schweigsame Kinder.

KÖRPER

- ▶ Hartnäckige Verstopfung oder Kolik bei Kleinkindern.
- ▶ Das Kind weint und schreit vor dem Urinieren (Lyc, Sanic).
- ▶ Streckt und dehnt sich gern in verschiedenen Positionen.
- ▶ Kinder mit angeborenen oder erworbenen Erkrankungen des Rückenmarks (Phos., Pic-ac., Zinc.), z. B. Astrozytome, Dermoidzysten, Lymphom-Metastasen, Wirbelsäulen-Tb, Kompressionen des Rückenmarks und der Nervenwurzeln, spinaler Dysraphismus und Syringomyelie.
- ▶ Ausgemergelte Kinder mit großem Bauch und abgemagerten Gliedern. ▶ Zitternde Zunge.

GEMEINSAME SYMPTOME VON PLB., BAR-C. UND ALUM.

Plb. erinnert sehr an **Bar-c.** und **Alum**, und kann klinisch leicht mit ihnen verwechselt werden. Die folgenden Symptome haben sie gemeinsam:

- Abneigung gegen geistige Anstrengung.
- Angst mit Furcht.
- Beschwerden durch Erwartungsspannung.
- Drüsenverhärtung.
- Eingezogener Bauch, fühlt sich bei der Palpation hart an.
- Ernsthaft.
- Extremer Durst.
- Faulheit verschlimmert die Symptome.
- Feigheit.
- Geistesabwesend oder in Gedanken versunken.
- Geistige Behinderung, Schwachsinn.

- Harnverhaltung.
- Immer zu spät; niemals pünktlich bei einer Verabredung.
- Kalte Speisen verschlimmern.
- Krämpfe der Speiseröhre.
- Langsamkeit.
- Launisch.
- Lichtempfindlich.
- Neigung zu langsamer Wundheilung.
- Reichlicher Speichelfluss.
- Rektum träge.
- Retronasaler Katarrh.
- Rissige Lippen.
- Ruhelos nachts.
- Schnell erschreckt.
- Spinnwebengefühl.
- Sprechen und Stöhnen im Schlaf.
- Stur und dickköpfig.
- Tadelsüchtig.
- Traurig oder depressiv am Morgen.
- Unentschlossenheit.
- Unzufriedenheit.
- Verlassenheitsgefühl.
- Verminderte Hörfähigkeit.
- Völle der Hände und Füße.
- Widerspenstig.
- Zusammenschrecken im Schlaf oder beim Einschlafen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- **Antwortet langsam**, einsilbig; besonders bei toxischen Erkrankungen (septische Mandeln, Virusinfektionen, Meningitis, Enzephalitis, Sepsis), die Kinder antworten oft langsam, aber korrekt und der Stupor kommt schnell nach dem Antworten zurück (Bapt.); meidet Blickkontakt.
- **Simuliert Krankheit** (und übertreibt manchmal die Symptome).
- **Angst vor öffentlichen Auftritten**, Erwartungsdruck verschlimmert; schüchtern und scheu in der Öffentlichkeit.
- **Langsam in allem** (wie Bar-c., kann Dinge nicht schnell verstehen, nimmt sich seine Zeit).
- **Neigt dazu, alles zu beißen**: Kleidung, Finger, sich selbst und die Nägel.
- Abneigung gegen Gesellschaft; zieht Einsamkeit vor (schüchtern und reserviert, will seine Gefühle nicht zeigen und vermeidet deshalb Gesellschaft).
- Ungeschickt.
- Lernschwache Kinder, mit geringem Selbstvertrauen und deutlichen Konzentrationsschwierigkeiten machen viele Fehler beim Lesen (schwere Dyslexie)

- Kinder, die dauernd lustige Gesten und Possen machen (fühlen sich verlassen und wollen Aufmerksamkeit auf sich ziehen).
- Furcht, berührt zu werden (alle Spinnenmittel und Kali-c.).
- Ängstliche und schüchterne Kinder; besonders fürchten sie sich vor Katzen, Hunden und Fremden, die sich ihnen nähern.
- Inbrünstiges Beten bei kleinen Kindern (betet zu Gott, seine körperlichen Leiden zu lindern).
- Gut darin, andere Kinder anzustacheln, unrechte Dinge zu tun.
- Schwachsinnige Kinder, die dauernd die Stirn runzeln.
- Unwillkürliches, übermäßiges Lachen.
- Eigensinnige Kinder, die „Nein“ nicht als Antwort tolerieren und es hassen, angeschaut, angesprochen oder berührt zu werden; schreien laut (chronische körperliche Krankheiten, die zu körperlichen und geistigen Behinderungen führen, äußern sich häufig in ähnlichem Verhalten).
- Geheimnistuerisch, verschlossen.
- Lernt nur langsam Sprechen (Nat-m.).
- Schlagen, Stampfen mit den Füßen, Anspucken und Beißen anderer im Zorn; kann nur durch sanftes Schaukeln besänftigt werden.
- Plötzliches lautes Schreien bei rasendem Delirium, in Fällen von neurologischem Insult.
- Spricht beim Spielen mit sich selbst.
- Weint wimmernd oder schluchzt laut über Kleinigkeiten, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

KOPF

- **Kopfschmerzen mit Steifheit, Schmerzen im Nacken und schwallartigem Erbrechen** (Bell., Hyos., Phos., Zinc-s.).
- Kopfschmerzen durch Verstopfung, abwechselnd mit Schmerzen im Abdomen.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Zerebrale Lähmung.
 - Kalter Schweiß auf der Stirn.
 - Fettiges Haar.
 - Heißer Kopf mit rotem Gesicht und kalten Extremitäten.
 - Hydrozephalus.
 - Erhöhter intrakranieller Druck.
 - Rucken des Kopfes von einer Seite auf die andere.
 - Zeichen von zerebrovaskulärem Insult.
 - Zeichen von Reizung der Meningen +.
 - Kann seinen Kopf nicht aufrecht halten.

AUGEN

- Verklebung der Lider.
- Untersuchungsergebnisse:
 - Atrophie des Sehnervs.
 - Zentrales Skotom.
 - Hornhauttrübung.
 - Augen halb offen (Bell. Curr. On.)

- Haarausfall der Augenbrauen.
- Hippus pupillae (lichtunabhängige rhythmische Verengung und Erweiterung der Pupillen)
- Iridozyklitis.
- Sehnerventzündung.
- Lähmung der Oberlider, besonders des linken.
- Netzhautentzündung.
- Reibt sich ständig die Augen.
- Schielen.
- Ungleiche Pupillen, eine kontrahiert und die andere erweitert.
- Wilder, starrender Blick.

OHREN

Vermindertes Hörvermögen durch vergrößerte Mandeln.

NASE

Reichlich wässriger oder gelblich-grüner Schnupfen beim Essen.
Verlust des Geruchssinnes.

Untersuchungsergebnisse:

Spitze, rote Nase.

Retronasaler Katarrh mit dicker, zähflüssiger Absonderung.

GESICHT

• Untersuchungsergebnisse:

Fettig und glänzend, wie eingeeölt (Nat-m., Thuj.).

Kaubewegungen.

Kalter Gesichtsschweiß.

Abmagerung der Gesichtsmuskeln.

Blass und aschfahl; wird nur rot bei Fieber oder Kopfschmerzen.

Lähmung der rechten Gesichtshälfte.

Risus sardonius oder Kiefersperre.

Dumm, stumpfsinnig, alt, eingefallen und faltig.

Geschwollene Lippen, die unwillkürlich zittern oder zucken.

MUND

Reichlicher, schaumiger Speichelfluss, bei Konvulsionen, im Schlaf und beim Sprechen.

Süßlicher oder metallischer Geschmack im Mund.

Unverständliche oder stammelnde Sprache.

Untersuchungsergebnisse:

Blasses, schwammiges, skorbutisches Zahnfleisch, **mit einer dünnen, rot-violetten Linie an der Zahngrenze**; es blutet leicht, selbst durch die leichteste Berührung.

Alle Zähne sind schwarz, verfault und haben Karies oder sind gezackt und bröckeln leicht ab.

Kann nur mit vielen Schwierigkeiten die Zunge herausstrecken; sie zittert beim Vorstrecken.

Offener Mund

Widerlicher Mundgeruch.

Lähmung der Zunge; wird zur linken Seite gezogen beim Herausstrecken (Lähmung des XII. (Nervus accessorius) Hirnnervs).

Glatte Zunge mit hervorstehenden, roten Papillen, Zahneindrücken und einem bräunlichen Belag in der Mitte.

Die Zähne werden locker, da sich das Zahnfleisch von den Zähnen löst.

HALS

Ösophagusspasmen; kann nur Flüssigkeiten schlucken, **die geringste feste Nahrung löst Würgen aus.**

Lähmung des Halses (Guillain-Barre-Syndrom); Flüssigkeiten kommen beim Versuch zu schlucken zur Nase wieder heraus (Lähmung der Hirnnerven IX. (Nervus glossopharyngeus) und X. (Nervus vagus)).

Untersuchungsergebnisse:

Aphthen.

Geschwollenes Zäpfchen, mit geschwollenen und verhärteten Tonsillen.

Dicke und zähe retronasale Absonderung.

Schwäche des M. serratus anterior, M. sternocleidomastoideus und M. supraspinatus.

MAGEN

Extremer Durst mit Unfähigkeit, zu trinken, wegen Übelkeit und Erbrechen durch Darmverschluss oder Bauchfellentzündung; durstlos bei Fieber.

Fäkales Erbrechen bei Kotstau oder Darmverschluss; grünlich-gelbe oder grünlich-schwarze Masse, übelriechend und blutgestreift.

Lautes Aufstoßen.

Heißhunger bald nach dem Essen.

Würgen mit heftigem, permanentem Erbrechen und krampfartigen Schmerzen im Bauch, unmittelbar nach dem Essen oder Trinken, sei es auch noch so wenig.

Verschlimmerung: Fisch (besonders wenn er verdorben ist).

Abneigung: Gemüse.

Verlangen: **Kekse**, Brot (besonders Roggenbrot), kalte Getränke, **gebratene Speisen**, Salziges, Saures und Süßigkeiten.

ABDOMEN

Kolik wechselt mit Delirium ab.

Krampfartige, schneidende Schmerzen im Abdomen, besonders der Nabelgegend, mit ausgeprägter Verstopfung; besser durch Zusammenkrümmen.

Schweiß des Abdomens.

Rumpeln im Abdomen beim Aufstehen am Morgen.

Heftige Kolik, die in alle Körperteile ausstrahlt.

Untersuchungsergebnisse:

- **Großes** und **verhärtetes** Abdomen.

Aufgetriebener und tastbarer Dickdarm.

Intussuszeption mit Kotstau und eingeklemmten Blähungen.

Paralytischer Ileus.

Einziehung des Abdomens, in der Nabelgegend, als wäre es mit der Wirbelsäule verbunden (wichtiges Zeichen für Bauchfellentzündung)..

Milz und Leber sind vergrößert und empfindlich.
Eingeklemmter Leistenbruch.
Empfindlichkeit der Ileozoekalregion (Bry., Iris-t., Lach., Merc-c.).
Nabelbruch.

REKTUM

Die Stühle sind klein, schwarz, kugelförmig, krümelig am Anus; sehen aus wie Schafdung, bedeckt mit Schleim.

Völlige Inaktivität des Rektums; schwere, chronische, hartnäckige Verstopfung mit ständig vergeblichem Stuhldrang.

Durchfall abwechselnd mit Verstopfung.

Jucken um den Anus.

Übelriechende Blähungen.

Unwillkürlicher Stuhlgang nachts im Bett.

Untersuchungsergebnisse:

Striktur oder spastische Kontraktion im Rektum (das ist der Hauptgrund für schwere Verstopfung).

Anusfissuren.

Fehlende Anusöffnung.

HARNWEGE

Alle Arten von nephrotischem Syndrom werden von diesem Mittel gut abgedeckt.

Kein Harndrang, trotz gedehnter Blase (durch Lähmung der Rückenmarksnerven) (Ars., Caust.).

Dunkelbrauner oder wolkiger Urin; hinterlässt rotes oder dunkelbraunes Sediment in der Windel.

Dysurie; das Kind weint und schreit vor dem Urinieren; schwacher Fluss führt zum Tröpfeln.

Nierenentzündung mit Bluthochdruck.

Harnverhaltung mit intensivem kolikartigem Schmerz.

Untersuchungsergebnisse:

Nierenbiopsie zeigt Sklerose und Verdickung der glomerulären Basalmembran.

Krampfartige Harnröhrenverengung.

Urin: Albumin ++, Calciumoxalat, Zylinder (Epithel- und hyaline), Glukose ++, geringes spezifisches Gewicht, Leukozyten ++ und Erythrozyten +.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Neigung zu masturbieren.

Untersuchungsergebnis:

- Hodenhochstand.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Heiserkeit oder Stimmverlust durch Stimmbandlähmung.

Untersuchungsergebnis:

- Laryngismus stridulus.

ATMUNG

Atmung setzt aus bei Kolik.

Atemnot abwechselnd mit stuporösem Zustand.

Atemnot beim Liegen im Bett; muss in der Nähe des offenen Fensters sein.

Untersuchungsergebnisse:

Rasselnde Atmung.

Röchelnde Atmung.

HUSTEN

Beständiger, trockener, kurzer Husten, Tag und Nacht.

Schaumiger, blutdurchzogener und eitriger Auswurf.

Schmerzen im Abdomen beim Husten.

Kurze Hustenanfälle beim Liegen nachts, beim tiefen Einatmen und beim Aufstehen am Morgen.

BRUST

Untersuchungsergebnisse:

- Schweiß auf der Brust.

- Schütteln des Brustkorbs bei Husten (Phos).

HERZ UND KREISLAUF

Heftiges Herzklopfen.

Untersuchungsergebnisse:

- Endokarditis.

Herzhypertrophie.

Herzgeräusche.

Puls: Unregelmäßig, schnell, fadenförmig, kaum tastbar.

RÜCKEN

Steifheit und spastisches Ziehen der Halsregion nach hinten.

Untersuchungsergebnisse:

Wirbelsäulenverkrümmung.

Abmagerung der Rückenmuskeln.

Opisthotonus.

Spinalmeningitis.

EXTREMITÄTEN

Unempfindlichkeit der Arme und Finger gegen Hitze des Feuers oder Schmerz (charakteristisch für Syringomyelie).

Ungeschicklichkeit der Finger.

Die Beine werden bei kolikartigen Schmerzen im Bauch krampfhaft angezogen.

Übelriechender Fußschweiß.

Schwache Handgelenke.

Untersuchungsergebnisse:

Kleinhirn-Zeichen +.

Abmagerung der Muskeln der Extremitäten, besonders der Hände, Daumenballen, Unterarme und der Glutealregion.

Zittern der Hände beim Schreiben, beim Halten von Gegenständen, beim Ausstrecken der Hände, beim Essen etc.

Brüchige Nägel.

Kontraktion der Finger durch Lähmung des Extensor digitorum profundus und superficialis und des Extensor pollicis longus und brevis.

Zyanotische Nägel.

Trockene Hände.

Abmagerung der gelähmten Glieder (Lähmung der unteren motorischen Nerven).

Erb-Lähmung [obere Armplexuslähmung].

Ganglion.

Eisige Kälte der Hände und Füße.

Fallhand.

SCHLAF

Schläft auf dem Bauch oder dem Rücken, die Beine dabei angezogen und den rechten Arm zwischen den Beinen.

Schläfrig bei Fieber und nach Konvulsionen.

Im Schlaf: Kalter und feuchter Schweiß, Zähneknirschen, Stöhnen und Ruhelosigkeit; will von einem Bett in das andere gehen.

Schlaflosigkeit bei Nierenstörungen oder Kolik.

Schreckt aus dem Schlaf hoch, aufgrund schrecklicher Träume.

HAUT

Die Haut ist immer trocken und kalt, sogar nach ausgiebiger körperlicher Betätigung oder Spiel.

Intensives Jucken; muss die Stelle kratzen bis sie roh und wund ist.

Untersuchungsergebnisse:

Intertrigo.

Gelbsucht.

KONVULSIONEN

Beschwerden durch: Abdominalkolik, **Fallen**, Blutung, Masturbation und Urämie.

Aura/vor Konvulsionen: Geistesverwirrung, Kreischen, Seufzen, Schwellung der Zunge und **Schwindel**.

Während Konvulsionen: Bläuliche oder gelbliche Verfärbung des Gesichts; klonische und tonische Konvulsionen der Glieder, befallen jeweils nur eine Seite; erweiterte Pupillen; Nasenbluten; **gebeugte Glieder**; Schaum vor dem Mund; Kopf zur linken Seite gedreht; **unwillkürliches Urinieren** auf den Boden bei wildem Delirium und verzerrtem Gesicht; **Raserei**; tetanische Starre; Bewusstlosigkeit; Weinen.

Nach Konvulsionen: Geistesverwirrung, **unzusammenhängende Sprache**, Schweiß, **dumpfer Schlaf** und Bewusstlosigkeit.

Periodische Konvulsionen bei TIA (Transitorische Ischämische Attacke).

ALLGEMEINES

Chronizität aller Beschwerden.**Poliomyelitis.**

Anasarka durch Nierenerkrankung (Oxyd.).

Anämische Kinder, die chronisch verstopft sind.

Unempfindlichkeit ist genauso ausgeprägt wie gesteigerte Erregbarkeit.

Verengung und Spasmen der äußeren Schließmuskeln.

Kinder mit dunkler Hautfarbe, deren Haut sich eiskalt anfühlt.

Reaktionmangel.

Marasmus bei Kleinkindern in anscheinend hoffnungslosen Fällen; das Abdomen ist groß und hart.

Progressive Muskelatrophie durch Wirbelsäulendegeneration.

Rachitis.

Eiternde Wunden oder Wunden, die leicht bluten und langsam heilen.

Teleangiectasien am ganzen Körper.

Zittern durch die geringste geistige oder körperliche Anstrengung.

PSORINUM

(Psora-Nosode - Psor.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Viele unbegründete Ängste. Um ein Psor.-Kind zu verstehen, muss man die Ängste von Calc. und Stram. kombinieren.

Kinder, die im analen Stadium der psychosexuellen Entwicklung (im Sinne Freuds) stehengeblieben sind.

Das Lernen fällt schwer, z. B. Aufmerksamkeitsdefizitstörungen und Legasthenie / Dyslexie.

Minderwertigkeitskomplex (Sulph. hat einen Überlegenheitskomplex).

KÖRPER

Absonderungen und Schweiß haben einen **aasartigen Geruch** (Ars.).

Fettiges Gesicht mit roter, eingesunkener Nase.

Große Empfindlichkeit gegen kalte Luft oder Wetterwechsel.

Kann nützlich sein, **wenn gut gewählte Mittel nicht wirken** oder chronische Fälle (in akuten Fällen: Sulph. und Tub.) sich nicht dauerhaft bessern oder wenn Sulph. zu passen scheint, aber nicht hilft.

Kinder mit familiärer Belastung von Asthma, Allergie, Ekzem oder Krebs.

Frühzeitiges Altern: Das Kind sieht aus wie ein altes Männchen.

Die Hände sehen selbst bei häufigem Waschen schmutzig aus.

Der Kopf hat die Form einer gedrehten Pyramide mit scharfer, langer Nase, langer Oberlippe und großen Ohren.

Mangel an Reaktion (Carbo-veg., Caps., Cupr., Op., Zinc.) nach akuten Erkrankungen wie Masern, Windpocken, Primär-TBC, Lungenentzündung, Bronchitis.

Unklarer Schwächezustand oder Schwäche nach akuten Erkrankungen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Erwartungsspannung, die von einer **pessimistischen Einstellung** oder Versagensangst herrührt.

Fühlt sich **verlassen und entfremdet** von seinen Lieben. Solche Gefühle kommen meist bei Kindern aus großen Familien vor, die extrem arm sind, mit vielen unbefriedigten körperlichen, emotionalen oder ernährungsbedingten Bedürfnissen. Ein klassischer Psor.-Zustand würde sich bei Kindern entwickeln, die aus einem armen Land kommen, in dem dauernd Krieg oder

Faule, unsaubere Kinder, die es hassen zu baden.

Abneigung gegen Gesellschaft; vermeidet den Anblick von Menschen (wie ein Misanthrop, der den Menschen ausweicht, um seine Schwächen zu verbergen).

Das Kind benimmt sich tagsüber gut; neigt aber nachts dazu, sehr launisch, ruhelos und weinerlich zu werden, mit dauerndem Herumwerfen und lautem Schreien.

Leicht frustriert, wenn er unfähig ist, eine Aufgabe zu erfüllen; zeigt eine Art Verzweiflung hauptsächlich durch einen Mangel an Stärke und eine pessimistische Einstellung.

Leicht durch Kleinigkeiten zu ängstigen, mit Zusammenschrecken.

Furcht, Straßen zu überqueren, vor überfüllten Straßen, vor Versagen und vorm Fliegen.

Gesten; ständiges Ringen der Hände oder Zupfen an der Bettwäsche.

Unentschlossenheit, Mangel an Selbstvertrauen und Pessimismus, nachdem ein Ekzem in der Säuglings- oder Kleinkindzeit mittels topischer Steroide unterdrückt wurde.

Tag und Nacht gereizt.

Nervös, ruhelos und leicht zusammenschreckend.

Zwanghaftes Verlangen, sich dauernd die Hände zu waschen.

Eigensinnige Kinder, die immer lamentieren und sich beschweren.

Religiös (Beten und an Gott denken ist die einzige Lösung für das Kind, um aus Armut und Hoffnungslosigkeit herauszukommen).

Schwach in Rechnen und Mathematik.

Schwaches Kurzzeitgedächtnis für das, was er gerade gelesen hat oder was ihm beigebracht wurde.

KOPF

Kopfschmerzen bei Schulmädchen, wie von kleinen Hämmern, jeden Morgen; besser durch Nasenbluten oder warmes Einhüllen des Kopfes.

Jucken der Kopfhaut durch Bettwärme.

Untersuchungsergebnisse:

Fettiger Schweiß auf der Stirn.

Bohrt den Kopf in das Kissen.

Schuppen.

Trockenes, glanzloses Haar, das leicht zusammenklebt und sich verwirrt.

Stellenweises Ausfallen oder Ergrauen des Haares.

Stinkende, feuchte und gelbe Krusten- oder Schuppenbildung am Hinterkopf, blutet leicht beim Kratzen.

Läuse.

Milchschorf.

AUGEN

Verklebung der Augen am Morgen.

Brennender Tränenfluss, besonders nachts.

Bindehautentzündung bei allergischem Schnupfen.

Trübsichtigkeit oder schwarze Flecken im Gesichtsfeld vor Kopfschmerzen.

Rezidivierende Gerstenkörner oder Knötchen an den Lidern (Sil., Sulph.).

- Untersuchungsergebnisse:

- Dauerndes Reiben der Augen.

- Hornhautulzeration.

- Ödematöse Schwellung der Lider.

- Ein- oder Auswärtstülpung der Lider.

- Pustuläre Bindehautentzündung, mit übelriechender, gelber Absonderung.

- Schielen.

OHREN

Chronische Ohrabsonderungen nach Masern (Puls.).

Chronische, eitrige Mittelohrentzündung, mit reichlicher, dünner, gelblicher oder bräunlicher, sehr übelriechender Absonderung.

Jucken in den Ohren, besonders rechts, schlimmer abends.

Hartnäckige Ohrabsonderungen durch Cholesteatom [Perlgeschwulst] (Diph.).

Untersuchungsergebnisse:

Feuchte und schuppige ekzematöse Ausschläge oder Blasen hinter den Ohren (Calc.).

Bohrt dauernd seine Finger in die Ohren.

Vermindertes Hörvermögen durch vergrößerte Mandeln (Kali-bi., Merc.).

Rötliches Ohrenschmalz.

NASE

Schnupfen und Verstopfung der Nase bei Zugluft (Dulc.).

Trockenheit in der Nase zwingt das Kind, dauernd mit den Fingern in der Nase zu bohren oder zu schnäuzen, trotz fehlender Absonderung.

Stinkende Absonderung bei chronischer Rhinitis.

Heuschnupfen mit anfallsweisem Niesen jeden Herbst (Dulc.).

Verlust des Geruchsinns.

Niesen bei oder nach Husten (Agar., Squil.).

Untersuchungsergebnisse:

- Adenoide.

Bohrt ständig mit den Fingern in der Nase.

Nasenpolypen.

Retronasaler Katarrh, mit Absonderung einer eitrigen, zähen Masse.

Rote, geschwollene Nasenspitze.

Dicke gelbliche oder blutige Absonderung der Nase, die sehr schnell eintrocknet und übelriechende, harte Krusten oder Schuppen bildet.

Wenn sie abgelöst werden, hinterlassen sie einen wunden Fleck und bilden sich erneut (Kali-c., Kali-bi., Nit-ac.).

GESICHT

Krustige, schuppige oder feuchte **ekzematöse Ausschläge** im Gesicht mit starkem Jucken, **schlimmer durch jegliche Wärme**.

Untersuchungsergebnisse:

Ausgeprägtes Haarwachstum im Gesicht (Calc., Nat-m., Sulph., Thuj.).

Fettiges Gesicht, besonders die **Stirn**, die wie in Öl gebadet aussieht.

Atopisches Ekzem [Neurodermitis].

Reichlicher Gesichtsschweiß bei Fieber und nach den Mahlzeiten (Cham.).
 Blasses Gesicht; schmutzeliges, schmutziges, unreines Aussehen, wie mit Schmutz bedeckt.
 Geschwollene, entzündete und verhärtete submaxilläre Lymphknoten und Ohrspeicheldrüsen.
 Warzen um den Mund.

MUND

Schwierige Zahnung.
 Essen schmeckt fad bei Schnupfen (Nat-m., Puls.).
 Untersuchungsergebnisse:
 Bläuliches, schwammiges Zahnfleisch, das leicht blutet und sich von den Zähnen löst.
 Trockene und rissige Zunge, mit gelblichem oder weißlichem Belag.
 Übermäßiger Speichelfluss beim Sprechen (Lach.).
 Stinkender Atem.
 Ranula.
 Soor.
 Stomatitis ulcerosa mit Aphthen auf dem Zahnfleisch und der Zunge.

HALS

Chronische und rezidivierende Entzündung und Vereiterung der Mandeln, mit schmerzhaftem Schlucken.
 Trockenheit des Halses ohne jeglichen Durst (Apis, Puls.).
 Zäher Schleim wird aus den hinteren Nasenhöhlen gezogen.
 Untersuchungsergebnisse:
Dunkelroter Hals mit schmierig aussehenden, käseartigen Ablagerungen (Bell., Kali-bi.).
 Verlängertes Zäpfchen.
 Räuspert käsige Klumpen hoch.
 Wunde und entzündete Schwellung der Drüsen, wie perlschnurartig um den Hals.
 Schwellung der Schilddrüse.

MAGEN

Extremer Durst beim Essen und bei Fieber.
 Schluckauf nach dem Füttern.
 Gesteigerter Appetit vor dem Einsetzen jeglicher Beschwerden, besonders vor und während Kopfschmerzen.
 Heißhunger sofort nach dem Essen, besonders nachts.
 Saures Erbrechen jeden Morgen vor dem Frühstück.
 Schnell verdorbener Magen, mit fauligem Aufstoßen, nach dem Genuss von Pflirsichen oder Schweinefleisch.
 Verschlimmerung: Milch, **Pflirsiche** und saures Obst.
 Abneigung: Gekochtes Essen, **Schweinefleisch, Kartoffeln, Süßigkeiten, Tomaten**, warme Speisen.

Verlangen: Holzkohle, Delikatessen, **unverdauliche Dinge** (wie Kalk, Schiefer-Griffel, Erde, Kreide, Ton etc.), saure Speisen.

Untersuchungsergebnis:

- Endoskopie: Gastritis.

ABDOMEN

Chronische Hepatitis, mit Schmerzen im rechten Hypochondrium beim Husten.

Aufgetriebener Bauch (Protein-Mangelernährung) mit Blähungen nach der Mahlzeit.

„Indian childhood cirrhosis“ [ICC, eine genetisch bedingte und durch Kupferbelastung hervorgerufene Form der Leberzirrhose],

Bauchschmerzen nach dem Verzehr von Pfirsichen.

Rumpeln.

Untersuchungsergebnisse:

Leistenbruch.

Leber und Milz vergrößert.

REKTUM

Chronisch verstopftes Kind; muss sich anstrengen selbst bei weichem Stuhl, der lange Zeit im Rektum bleibt, ohne jeden Drang.

Intensives Jucken um den Anus durch Ausschläge oder Würmer.

Unwillkürlicher Stuhlabgang im Schlaf.

Schmerzloser, wässriger Durchfall sofort nach dem Aufstehen am Morgen; nach akuten Erkrankungen, bei Zahnung, durch unterdrückte Ausschläge, im Sommer.

Die Stühle sind dunkel, weich und voller Schleim, riechen wie faule Eier.

Nützlich in Fällen von Zöliakie, Morbus Crohn und Malabsorptionssyndrom.

Untersuchungsergebnisse:

Abgang von **heißen, sehr übelriechenden Blähungen**, deren Geruch das ganze Haus durchdringt.

Angeborenes Megakolon (Morbus Hirschsprung).

Schweiß an Anus und Perineum (Hep., Thuj.).

Rektalpolypen.

Stuhl: Bandwurmsegmente und Spulwürmer.

HARNWEGE

Unwillkürliches Urinieren bei Husten, Lachen, Niesen und nachts im Schlaf, besonders bei Vollmond.

Harnnäckige Fälle von Bettnässen (Lac-c.), mit Familiengeschichte von Ekzemen.

Untersuchungsergebnis:

- Wolkiger oder dunkelbrauner Urin, der dickes, rotes Sediment in der Windel hinterlässt.

MÄNNLICHE GENITALIEN

• Untersuchungsergebnisse:

Hydrozele.

Verhärtung und Hodenhochstand (Kryptorchismus).

Übelriechender Schweiß des Genitalbereichs (Fl-ac., Iod., Sulph.).

WEIBLICHE GENITALIEN

• Untersuchungsergebnisse:

Milchiger oder klumpiger, sehr übelriechender Ausfluss, bei kleinen Mädchen.
Polypen in der Vagina.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Chronische Heiserkeit, schlimmer durch Sprechen.
Wunder Schmerz im Kehlkopf beim Husten.

ATMUNG

Asthma bei Kleinkindern abwechselnd mit atopischem Ekzem.

Atemnot in der frischen Luft, im Freien; besser in Rückenlage mit weit ausgestreckten Armen (Sulph.).

Atemnot bei Kindern, die an rheumatischen Herzerkrankungen leiden (durch Dekompensation des Herzens als Folge einer Herzklappenerkrankung).

HUSTEN

Husten nach Unterdrückung verschiedener Hauterkrankungen mittels lokaler Anwendung von Salben (Dulc.).

Husten begleitet von Speichelfluss (Bar-c.) und in Niesen endend (Agar.).

Husten nach Genuss kalter Getränke und wenn der Bereich um den Gehörgang berührt wird.

Trockener, hackender Husten beim Hinlegen nachts, durch kitzelndes Gefühl im Kehlkopf.

Anfallartiger, lockerer Husten beim Erwachen am Morgen, mit leicht abgehendem grünlichem Auswurf.

Spasmodische Hustenanfälle, die jeden Winter auftreten.

BRUST

Herzklopfen mit Atemnot und Schmerzen in der Herzgegend, durch die geringste Anstrengung; besser durch Hinlegen, besonders in Rückenlage mit ausgestreckten Armen oder durch Liegen auf der rechten Seite.

Schwäche in der Brust durch Husten.

Untersuchungsergebnisse:

Lungenabszess.

Ätzender Achselschweiß, der Löcher in die Wäsche frisst (Iod).

Herzhypertrophie.

Pansystolische Geräusche.

Perikarderguss bei asthmatischen Kindern.

RÜCKEN

• Untersuchungsergebnisse:

Furunkel und Abszessbildung in der Halsgegend.

Ekzeme der Halsgegend mit schrecklichem Jucken.

Kyphose und Skoliose der Wirbelsäule.

Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

Kann weder ertragen, wenn sich die Glieder nachts berühren, noch das Gewicht seiner Arme auf der Brust.

Unbeholfene Kinder, Tendenz zum Stolpern und Fallen und zur Verstauchung und Verrenkung der Fußgelenke.

Jucken bei ekzematösen Ausschlägen und Schuppenbildung an den Beugeseiten der Gelenke, besonders im Winter.

Ruhelosigkeit der Beine morgens im Bett.

Schwäche und Schmerzen in den Gliedern durch den geringsten Wetterwechsel und bei Gewitter (Rhod.).

Untersuchungsergebnisse:

Reichlicher, kalter und übelriechender Schweiß der Hände und Füße.

Brüchige Fingernägel.

Rissige Haut der Hände, zwischen den Zehen und an den Beugeseiten der Gelenke, besonders im Winter (Graph.).

Nagelbettentzündung.

Psoriasis auf den Handflächen.

Empfindliche Hühneraugen an den Fersen.

Warzen an Händen und Fingern.

SCHLAF

Babys sind sehr gereizt und schlaflos von 3 Uhr bis Tagesanbruch.

Verlangen, am Morgen im Bett zu bleiben.

Im Schlaf: Zähneknirschen, Schreien und Sprechen.

Häufiges nächtliches Erwachen durch Hunger oder juckende Haut, bei Neugeborenen.

Zusammenschrecken im Schlaf aufgrund schrecklicher Träume.

FIEBER

Galleerbrechen, Reizbarkeit und enorme Schwäche, mit reichlichem, schwächendem Schweiß bei Fieber.

Sehr fröstelig mit Abneigung sich aufzudecken in allen Fieberstadien.

Delirium am Abend bei hohen Temperaturen.

Hitze abwechselnd mit Froststadium.

Unregelmäßig wiederkehrendes, intermittierendes Fieber, ohne feste Abläufe, aber mit jedem Fieberanfall steigt die Intensität der Symptome an.

Schüttelfrost bei Malaria, beginnt an den Armen und Schenkeln.

HAUT

Verzweiflung durch Juckreiz (Verzweiflung beim Kind und der Familie).

Rezidivierende Skabies.

Ekzem, mit krustigem, stinkendem Ausschlag am ganzen Körper, mit Jucken; schlimmer im Winter und nachts beim Warmwerden im Bett; muss die Stelle kratzen, bis es roh wird und blutet.

Tragen von Wollkleidung verschlimmert das Jucken (Hep., Sulph.).

Nützlich in Fällen, in denen Ausschläge nicht herauskommenn (Stram., Sulph., Zinc.).

- Untersuchungsergebnisse:
Schmutzige, dreckige, ungesunde Haut.
Fettig, wie in Öl gebadet.
Rau und uneben, reißt leicht, blutende Fissuren; schlimmer im Winter.
Warzen.

ALLGEMEINES

Allergische Konstitution, mit Erkältungsneigung.

Abneigung zu baden.

Abmagerung bei Kindern mit Heißhunger; Abmagerung nach unten ausbreitend, mit geschwollenen Drüsen.

Reichlicher, saurer, schwächender Schweiß durch die geringste Anstrengung oder bei akuten Erkrankungen, z. B. beim Gehen oder sogar beim Schreiben und nachts nach 3 Uhr.

Sehr fröstelig, muss mit warmen Decken zugedeckt werden sogar im Sommer; alle Beschwerden werden schlimmer durch Kälte in jeder Form.

Beschwerden durch: Wetterwechsel, unterdrückte Ausschläge, unterdrückten Schweiß (besonders Fußschweiß), Impfung, windiges und stürmisches Wetter, im Winter.

Anämische, blasse, zarte, kränkliche Kinder, mit sehr schmutziger Haut und üblem Geruch.

Kinder mit einer Vorgeschichte von rezidivierenden Infektionen: Abszesse, Bindehautentzündung, Fieber, Gerstenkörner, Mandelentzündung.

Kinder mit einer Familiengeschichte von Alkoholismus, Asthma, Ekzem.

Widersprüchliche und abwechselnde Zustände.

Zyanotische Kinder.

Unverträglichkeit von Wollkleidung.

Nie mehr gesund seit der letzten Grippe oder Infektionskrankheit.

Periodizität der Beschwerden; kommen jeden 2. Tag oder alle 2-3 Wochen wieder.

Rachitis.

PULSATILLA PRATENSIS

(Küchenschelle, Kuhschelle - Puls.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Starke emotionale Bindung an die Mutter (klammert); will keine Sekunde von ihr weg.

Mädchen, die früh heiraten wollen, um **als Hausfrau viele Kinder** zu haben oder Mädchen, die von einem **Beruf im Pflegebereich** träumen.

Passend für Kinder mit folgenden Eigenschaften (im Gegensatz zu Nux-v.):

Gefühlvoll, sanft, unentschlossen, mild, schüchtern und nachgiebig.

Kinder mit persistierendem Ödipus-Komplex oder oraler Fixierung nach Freud.

Kinder, die viel zu viel Aufmerksamkeit fordern.

Kinder, die emotional gestört wirken nach der Geburt eines Geschwisterchens.

Kinder, die sich wegen Bagatellen vernachlässigt fühlen.

Kinder, die die Liebe der Mutter nicht mit anderen Kindern teilen wollen, nicht einmal mit den eigenen Geschwistern.

Eifersucht, wenn ein neugeborenes Geschwisterchen plötzlich die Aufmerksamkeit der Familie bekommt.

KÖRPER

Alle Schleimhautabsonderungen sind **mild** und **gelblich-grün** (Kali-s., Nat-s.).

Die Symptome wechseln ständig (Ign., Tub.).

Passend für Kinder mit blauen Augen, hellem Hauttyp, blassem Gesicht und sandfarbenem Haar.

Für Jungs, die eher wie Mädchen aussehen.

Eine Mumpsinfektion greift auf die Hoden über.

Wandernde Schmerzen, die rasch von einem Körperteil zum anderen überspringen (Kali-bi., Lac-c., Mang-act.).

Schmerzen und viele andere Beschwerden sind begleitet von Kältegefühl.

Durstlosigkeit bei fast allen Beschwerden.

GEMEINSAME MERKMALE VON PULS., CARC, UND PHOS.

Puls, kann mit **Carc**, oder **Phos**, verwechselt werden. Ihre Gemeinsamkeiten sind:

Abneigung: Butter, Eier, Fett, Obst, Fleisch, Milch und Salz.

Angst um die Familie und die eigene Gesundheit.

Aufgeregt nach schlechten Nachrichten.
 Besser im Freien.
 Empfindliche Kinder.
 Furcht vor dem Alleinsein, Menschenmengen, Dunkelheit, Geistern, Insekten,
 Nacht, offene Plätze, Terror.
 Geiz.
 Gewissenhaft.
 Heimweh.
 Launisch.
 Leicht beleidigt.
 Mangel an Selbstvertrauen in der Schule.
 Mitfühlend.
 Nägelbeißen.
 Neugierig.
 Rezidivierende Gerstenkörner.
 Rezidivierender Durchfall.
 Schläft in Bauchlage.
 Schlaflosigkeit durch Lebhaftigkeit.
 Schnell erschreckt.
 Sprechen im Schlaf.
 Stumpfheit bei Kopfschmerzen.
 Tierliebe.
 Trost bessert.
 Unentschlossenheit.
 Verlangen: Käse, Schokolade, kalte Speisen, Eier, Mehlspeisen, Fett, Eiscreme,
 Gewürztes und Süßigkeiten.
 Träume von Gefahr, Alpträume.
 Verlangen nach Gesellschaft.
 Verlassenheitsgefühl.
 Wechselnde Stimmungen.
 Wutanfälle

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Gefühlvolle Kinder, die es lieben und brauchen, Zuneigung zu erhalten in Form von Umarmungen, Küssen und Zärtlichkeit; brauchen ständig Aufmerksamkeit (Carc., Phos.).

Stöhnen ist ein fundamentaler Charakterzug; vor Stuhlgang, im Schlaf, bei Fieber, Schmerz usw.

Jämmerliches Klagen und Weinen bei Schmerz.

Ungeschickt bei allen Tätigkeiten; große Unfallneigung.

Nägelbeißen.

Launische Kinder, die Dinge zurückweisen, um die sie gerade gebeten haben.

Grundloses Weinen und Schluchzen bei Babys.

Wechselhafte Stimmungen.

Das Kind klammert sich ständig an ihm Nahestehende, besonders an die Mutter.
 Lieben die Farbe rosa.
 Weinen oft beim Duschen, fürchten sich davor, dass Wasser über ihren Kopf läuft (Stram.).
 Dunkelheit verschlimmert.
 Verlangen, langsam umhergetragen zu werden, über der Schulter.
 Konzentrationsschwierigkeiten beim Lernen.
 Neidische, selbstsüchtige und gierige Kinder.
 Voller Ängste; fürchtet Dunkelheit oder Dämmerung (Phos., Stram.), Hunde, Geister, Zahnarzt, Insekten, enge und überfüllte Plätze, Zugreisen.
 Stellt sich vor, von seinen Lieben verlassen und vernachlässigt zu sein.
 Stellt sich vor, Geister und schreckliche Gesichter zu sehen.
 Unentschlossene Kinder (hauptsächlich aufgrund von Abhängigkeit).
 Reizbarkeit mit Weinen und Ruhelosigkeit bei Fieber und beim Erwachen am Morgen; besser im Freien.
 Liebt Tiere.
 Macht Fehler beim Schreiben oder Sprechen, vertauscht oder vergisst Buchstaben oder Wörter.
 Manipulierende Kinder, die zum Lügen und Simulieren von Krankheiten neigen, um Aufmerksamkeit zu bekommen (Hyos., Tarent., Verat.).
 Empfindlich gegen Grobheit und Tadel.
 Schreien mit rotem Gesicht bei Zorn.
 Schüchterne Kinder, die leicht erröten und sich hinter ihrer Mutter verstecken; antworten nur einsilbig oder durch Nicken.
 Mangel an Selbstvertrauen bei Schulkindern.
 Gedächtnisschwäche beim Lernen von Versen.

KOPF

Schwere pochende Migräneattacke bei Kleinkindern oder Schulmädchen in der Pubertät.

Beschwerden von und Verschlimmerung durch:

Abends und die ganze Nacht hindurch.

Schreck (Acon., Ign.).

Eiscreme (Ars.).

Wärme in jeder Form (Sonnenhitze, Sommer, warme Speisen oder Getränke, warmer Raum etc.).

Nasswerden oder nach Kopfwäschen.

Bücken.

Zu viel lesen oder lernen.

• Besser durch:

Festes Einwickeln des Kopfes (Arg-n., Sil.).

Kalte Anwendungen (Aloe, Spig.).

Langsames Umhergehen oder Umhergetragenwerden im Freien.

• Begleitsymptome:

Trübsichtigkeit.

Übelkeit und Erbrechen.

Photophobie (Nat-s.).

Steifes Nacken-

Reichlicher und stinkender Schweiß, der nur auf der Kopfhaut ist.

Untersuchungsergebnisse:

Hydrozephalus bei Entzündung der Hirnhäute.

Offene Fontanellen.

Pusteiige Ausschläge am Hinterkopf.

Empfindlichkeit der Nasennebenhöhlen.

Empfindliche Kopfhaut mit Entzündung der Knochenhaut.

Kann den Kopf nicht heben oder aufrecht halten; wird zur Seite gezogen.

AUGEN

Entzündung der Augen bei Neugeborenen und Säuglingen (Arg-n., Merc-c.).

Rezidivierende Gerstenkörner und Knötchen der Lider.

Intensive brennende Schmerzen mit Trockenheit und Jucken der Augen; schlimmer durch Lesen, in einem warmen Raum und abends; besser durch Baden der Augen mit kaltem Wasser und in kalter Luft.

Tränenfluss ist ein wichtiges Begleitsymptom bei den meisten Beschwerden; Wind verschlimmert.

Ophthalmia neonatorum; katarrhalische Erkrankung der Augen durch Gonorrhoe oder Herpes der Mutter.

Photophobie durch künstliches Licht.

Dicke, gelbe, reichliche, milde Absonderung der Augen, dadurch Verklebung der Augen morgens beim Erwachen.

Nützlich in Fällen von Bindehautentzündung nach Augenverletzungen oder nach Eindringen von Fremdkörpern in die Augen (Coc-c.).

Schwäche der Augen nach Masern (Kali-c.).

Untersuchungsergebnisse:

Dauerndes Wischen oder Reiben der Augen.

Keratokonius mit Trübung.

Ödematöse Schwellung und Verdickung der Lider.

Tränenrüsenfistel mit Absonderung einer eitrigen Substanz aus der Tränenrüse bei Druck.

Glaukom.

Granuläre und allergische Bindehaut- und Regenbogenhautentzündung.

Eingewachsene Augenwimpern, mit oder ohne Ausstülpung der Lider.

Lähmung des Sehnervs.

Pendelartige oder rollende Bewegungen des Augapfels.

Schielen.

Tränenkanalverengung.

Eingesunkene Augen.

Lidknorpeltumore.

Trachom.

OHREN

Folgeerscheinungen von Masern: Absonderungen, verminderte Hörfähigkeit, Entzündung etc.

Das Kind weint bei Ohrenschmerzen, die sich im warmen Zimmer und nachts verschlimmern (Cham Ferr-n)

Chronische, eitrige Mittelohrentzündung, mit reichlichen, eitrigen und dicken, gelblich-grünen Absonderungen, besonders aus dem linken Ohr.

Verminderte Hörfähigkeit bei kaltem, feuchtem Wetter oder durch Erkältung, mit Katarrh der Eustachischen Röhre.

Mittelohrentzündung mit hohem Risiko der Perforation in die Kammer des Schläfenbeins, zu einer eitrigen Meningitis führend, besonders bei Neugeborenen.

Untersuchungsergebnisse:

Abszess mit Bildung von Verwachsungen im Mittelohr.

Schwarzes, gehärtetes Ohrenschalz.

Ohr läppchen rot.

Ausschläge auf dem Tragus und im Gehörgang.

Exostose.

Entzündung oder Katarrh der Eustachischen Röhre.

Schweiß der Ohren.

Pustelige Ausschläge mit Schuppenbildung hinter den Ohren.

Schwellung des Gehörganges und der Lymphknoten vor dem Ohr.

NASE

Häufiges anfallsweises Niesen im warmen Zimmer (All-c.).

Schniefen bei Neugeborenen (Lyc., Nux-v., Samb.).

Chronischer wässriger Schnupfen bei feuchtem Wetter (Merc.), im Freien (Nit-ac.) und in einem warmen Zimmer (All-c., Merc., Nux-v.).

Reichliche, freifließende, milde, dicke, gelbliche oder grünliche, übelriechende nasale Absonderung, besonders morgens.

Trockenheit wechselt mit Fließschnupfen ab.

Nasenbluten mit schwarzem Blut, beim Naseschnäuzen und in einem warmen Raum.

Nasenkatarrh erstreckt sich zu den Stirnhöhlen.

Verstopfung der Nase im warmen Raum und nachts; besser im Freien.

Untersuchungsergebnisse:

- Abszess an der Nasenwurzel.

Ölige Nase.

Nasenpolypen.

Schorfige Nasenlöcher.

GESICHT

Schwellung und Entzündung der Ohrspeichel- und Unterkieferdrüsen, die zu den Hoden überspringt.

Untersuchungsergebnisse:

Das Kind reibt sich beim Husten dauernd das Gesicht und die Augen mit den Fäusten.

Trockenheit der Lippen; dauerndes Schmatzen und Lecken.

Krustige und schuppige Ausschläge an der Nase und in den Nasenlöchern.

Das Gesicht ist rot beim Liegen und wird beim Aufrichten blass.

Kieferhöhlenentzündung.

Eine Seite rot und die andere blass, mit bläulichen Ringen um die Augen.

Spasmen der Gesichtsmuskeln.

Zucken oder Zittern der Unterlippe.

Gerunzelte Stirn (Nux-v.).

MUND

Das Baby beißt beim Füttern ins Glas.

Trockenheit von Mund und Zunge beim Erwachen am Morgen, mit Durstlosigkeit.

Mundgeruch, mit schlechtem Geschmack im Mund beim Erwachen am Morgen.

Zahnschmerzen mit Schwellung der Wange; schlimmer durch Kauen und durch Wärme in jeder Form (warmer Raum, Bettwärme, warme Speisen oder Getränke etc.); besser durch kalte Anwendungen und kaltem Wasser im Mund.

Untersuchungsergebnisse:

Abszess der Zahnwurzeln, ersichtlich an der Eiterung des Zahnfleisches.

Schwierige Zahnung mit schwarzen Zähnen, voller Karies.

Unwillkürliches Beißen auf die Zungenspitze beim Sprechen oder Kauen (Ign.).

Dicker gelblicher oder weißlicher Belag auf der Zunge (Kali-bi.).

HALS

Neigung, dauernd zu schlucken, was schmerzhaft ist.

Trockenheit der Kehle besonders beim Erwachen am Morgen, mit absoluter Durstlosigkeit.

Speisen bleiben im Hals stecken, verursachen Würgen (Kali-c.).

Flüssigkeiten kommen beim Versuch zu schlucken zur Nase wieder heraus.

Untersuchungsergebnisse:

Chronisch geschwollene, dunkelrote und entzündete Mandeln und Zäpfchen.

Hervorstehen der Blutgefäße im Rachen.

Geschwollene und verhärtete Lymphknoten am Hals und vor den Ohren.

MAGEN

Hungrig, aber weiß nicht auf was.

Verdauungsstörung mit vielem Aufstoßen, Blähungen und Magenschmerzen nach **fetten oder reichhaltigen** Speisen, besonders Butter, Eiscreme und Schweinefleisch; besser durch kalte Getränke.

Langsame Verdauung.

Schluckauf nach Trinken.

Beißt in seinen Löffel oder Glas, anstatt normal zu essen oder zu trinken.

Übelkeit mit Erbrechen wenige Stunden nach dem Essen, fühlt sich besser nach kalten Getränken.

Würgen und Erbrechen beim Husten; schaumige, grünliche und sauer riechende Masse, die voller Schleim ist.

Durstlosigkeit.

Verschlimmerung: Brot und Butter, Kohl, fette oder reichhaltige Speisen, gefrorene Speisen, Obst, Gebäck, Schweinefleisch, Kartoffeln, rohe Speisen, verdorbener Fisch.

Abneigung: Butter, Eier, Fett, Obst, Schinken, Fleisch, Milch, Schweinefleisch, warme Speisen und Getränke, Wasser.

Verlangen: Käse, kalte Getränke, cremige Sachen, Eier (weichgekocht), gefrorene Speisen, Hering, saftige und erfrischende Dinge, Erdnussbutter, geräucherte Speisen, saure Speisen und saures Obst, Tee.

ABDOMEN

Kolikartige Bauchschmerzen nach fettigen Speisen, Obst oder Eiscreme.

Eingeklemmte Blähungen mit tympanitischer Auftreibung des Abdomens, schlimmer nach dem Essen.

Schmerzen im Abdomen nach Empörung, beim Husten und vor Stuhlgang;

Schmerz zwingt ihn, sich zusammenzukurven.

Rumpeln im Bauch nach dem Essen und vor Stuhlgang.

Untersuchungsergebnisse:

Harte, empfindliche Schwellung der Leistenlymphknoten.

Leistenbruch.

Ringartige Schwellung um den Nabel.

Tabes mesenterica [Darmtuberkulose].

REKTUM

Wechselnde Stuhlbeschaffenheit: Flach, heiß und ätzend ODER teigig und übelriechend mit grünlichem Schleim.

Durchfall ist ein wichtiges Begleitsymptom der meisten Beschwerden, z. B. bei Gelbsucht, Masern, Urtikaria etc.

Durchfall schlimmer nach fetten Speisen, nach Schreck oder Zorn, nach Obst, nach der geringsten Unbesonnenheit beim Essen, bei Zahnung, bei Fieber und bei warmem Wetter.

Unwillkürlicher Stuhlabgang im Schlaf.

Laktoseintoleranz.

Hat zwei- oder dreimal täglich Stuhlgang, was für ihn ganz normal ist.

Abgang von heißen, übelriechenden Blähungen nach dem Essen.

Wollüstiges Jucken und Reiben um die Rektalregion, schlimmer durch Kratzen.

Untersuchungsergebnisse:

Rektumprolaps mit empfindlichen, ulzerierenden Hämorrhoiden; das Kind heult und schreit, wenn die Stelle nach dem Stuhlgang abgewischt wird.

Erschlaffter Anus, mit Feuchtigkeit um dieses Gebiet.

Stuhl: Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

Das Kind schreit und weint am Ende des Urinierens (Sars.), mit blutigen Absonderungen aus der Harnröhre.

Harnverhalten bei Neugeborenen bei jeder Erkältung (Caust., Dulc.) und bei Kindern, deren Mutter eine Vorgeschichte von Gonorrhoe hat.

Häufiger Harndrang bei Kälte oder nassem Wetter.

Grünlich-gelbe, dicke Absonderung aus der Harnröhre, mit Priapismus.

Unwillkürliches Urinieren im Schlaf, besonders in der ersten Schlafphase, beim Abgang von Blähungen, beim Niesen, Lachen, Husten usw.

Spärlicher, brauner, übelriechender Urin.

Untersuchungsergebnisse:

Roter Sand oder Sediment klebt in der Windel.

Spasmodische Harnröhrenverengung.

Urin: Albumin ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Masturbiert häufig.

Untersuchungsergebnisse:

- Angeborene Hydrozele.
- Orchitis oder Epididymitis bei Kindern von Eltern mit Gonorrhoe.
- Schweiß in der Skrotalgegend.
- Roter, verhärteter, geschwollener, heißer und empfindlicher Penis und Hoden, nach Verletzung der Genitalien oder Mumps.
- Hodenhochstand rechts.

WEIBLICHE GENITALIEN

Die Menarche ist verspätet.

Untersuchungsergebnisse:

- Zusammengezogene, rote, verhärtete Vagina, mit Ulzeration darum herum.
- Milchiger oder eitriger, schmerzloser Ausfluss bei kleinen Mädchen, besonders morgens und beim Hinlegen.
- Vaginalpolypen.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Trockenheit, Reizung und Kitzeln im Kehlkopf wie von Staub, schlimmer im warmen Zimmer.

Kehlkopf wie wund und Schmerz beim Husten.

Rauheit der Stimme oder Heiserkeit in einem warmen Zimmer.

ATMUNG

Asthma nach unterdrückten Ausschlägen, besonders nach unterdrückten Masern, Urtikaria oder Nesselfieber.

Allergisches Asthma bei kleinen Babys nach der MMR-Impfung (Carc., Thuj.) und nach Erkältung (Spong.); schlimmer abends bis Mitternacht; besser an der frischen Luft (Kali-s.).

Atemnot im warmen Raum; will ans offene Fenster getragen werden oder hinaus in die kalte, frische Luft.

Atemnot nach dem Essen, durch Blähungen, mit Völle und Auftreibung des Abdomens, besser durch Aufstoßen.

Atemnot beim Liegen, besonders auf der linken Seite (Phos., Spig.).

Untersuchungsergebnisse:

- Laute Einatmung.
- Stöhnende, seufzende, rasselnde und röchelnde Atmung.

HUSTEN

Chronischer, lockerer Husten nach Masern (Dros.); schlimmer durch Hinlegen, Sprechen, warme Speisen und **warmes Zimmer**; das Kind muss sich beim Husten aufsetzen und **fühlt sich besser im Freien** (Am-c.).

Anhaltender asthmatischer Husten abends bis Mitternacht, stört den Schlaf.

Der Auswurf ist reichlich, dick, gelblich oder grünlich; nur tagsüber.

Lockerer Husten am Morgen, der abends trocken und hackend wird, mit Trockenheit und Reizung im Kehlkopf.

Krampfartige, erstickende, anfallsweise, erschöpfende Hustenanfälle am Morgen und nachts beim Hinlegen, die den Schlaf stören.

BRUST

Lungenentzündung bei Säuglingen mit weißlicher Verfärbung der Zunge.

Untersuchungsergebnisse:

Röntgen/Thorax: Verdichtung; Emphysem; Primärkomplex.

Lungenödem.

Schwellung und Verhärtung der Achsel-Lymphknoten bei Kindern, die an Tuberkulose leiden.

HERZ UND KREISLAUF

Heftiges Herzklopfen bei Kindern mit rheumatischen Herzerkrankungen, besonders beim Liegen auf der linken Seite, bei Fieber.

Untersuchungsergebnisse:

Herzhypertrophie.

Herzgeräusche.

Schwacher, kaum tastbarer Puls.

RÜCKEN

Schmerzen in der Lumbalregion beim Husten und beim Hinlegen; besser durch sanfte Bewegung.

Untersuchungsergebnisse:

Dorsale Verkrümmung der Wirbelsäule.

Schweiß auf dem Rücken.

Steife und angespannte Muskeln der Hals- und Lumbalregion.

EXTREMITÄTEN

Brennende Hitze in den Füßen; wirft die Decken ab.

Wadenkrämpfe nachts im Bett.

Jucken der unteren Glieder nachts im Bett.

Ruhelosigkeit der Glieder, besonders der Füße, beim Sitzen und im Schlaf.

Rheumatismus, besonders der Knie, bei feuchtem oder kaltem Wetter, mit Fieber, die Schmerzen und die Schwellung sind besser durch kalte Anwendungen und Bewegung.

Spontane, leicht eintretende Verrenkung des Hüftgelenkes.

Untersuchungsergebnisse:

Kalter, stinkender Schweiß der Füße und der Zehenzwischenräume (Sil.).

Aufgesprungene Hände.

Frostbeulen an Händen, Füßen und Zehen mit bläulicher Verfärbung der Gelenke und Jucken der Teile.

Der Fußrücken ist geschwollen und ödematös.

Wundheit und nesselartige Ausschläge zwischen den Gesäßbacken.

Nagelgeschwür und Ulzeration der Nägel; besser durch Kaltwasser-Anwendungen.

Völle der Handvenen.

Eine Hand und ein Fuß heiß, die andere Hand und der andere Fuß eiskalt.

Schmerzhafte, entzündete Hühneraugen.
 Eiterung des Hüftgelenks.
 Zittern der Hände beim Ausstrecken.

SCHLAF

Im Schlaf: Zähneklappern, Schluckauf, Zucken von Kopf und Gliedern, Lider leicht geöffnet, Stöhnen, reichlicher Speichelfluss, rasselnde oder röchelnde Atmung, Ruhelosigkeit, Rollen der Augäpfel, rumpelnde Geräusche aus dem Bauch, Schreien, Seufzen, Schnarchen und Sprechen.

Große Schläfrigkeit am Nachmittag und Schlaflosigkeit in der Nacht.

Spätes Einschlafen nachts, mit frühem Erwachen am Morgen.

Lage: Auf dem Bauch oder Rücken, mit den Armen über dem Kopf oder über dem Bauch gekreuzt und mit angezogenen Füßen.

Schläft ohne jede Decke.

FIEBER

Absolute Durstlosigkeit in allen Fieberstadien, mit trockenem Mund; der Säugling neigt dazu, dauernd mit den Lippen zu schmatzen.

Frost:

- Kann Decken und Wärme in keiner Form ertragen trotz Frost; will draußen im Freien sein (Apis).

• Hitze:

- Kälte der Hände und Füße, mit Hitze des Körpers ODER Hände und Füße rot und heiß auf einer Körperseite und rot und kalt auf der anderen.

Husten erhöht die Temperatur.

Delirium bei trockener, brennender Hitze.

In diesem Stadium klagt das Kind über braunen und spärlichen Urin, umschriebene Gesichtsröte, erhöhten Speichelfluss, Schmerzen im unteren Rücken und wunde Schmerzen im Kehlkopf mit Heiserkeit.

Das Kind fällt in diesem Stadium allmählich in tiefen, komatösen Schlaf.

• Schweiß:

- Kalter und stinkender, durchnässender Schweiß nach dem Hitzestadium, besonders im Gesicht, mit Erschöpfung und Schläfrigkeit.

Unregelmäßige Periodizität mit wechselhaften Fieberanfällen, die meist mit jedem Mal schlimmer werden.

Nützliches Mittel besonders in Fällen von Ausschlagsfieber.

HAUT

Unerträgliches Jucken, das sich durch Bettwärme verschlimmert (Psor, Sulph); muss die Stelle kratzen, bis sie roh wird und blutet, ohne Erleichterung; gefolgt von intensivem Brennen.

Gelbsucht mit gelblicher Verfärbung der Haut und Durchfall.

Masern mit wässrigen, gelblich-grünen Absonderungen der Hautausschläge und wässrigem Schnupfen mit Tränenfluss.

Die Haut fühlt sich heiß an, besonders beim Erwachen am Morgen, aber das Kind hat kein Fieber.

Nesselausschläge mit intensivem Jucken nachts und mit Durchfall als Begleitsymptom.

- Untersuchungsergebnisse:

- Windpocken mit großen blasigen Ausschlägen.

- Ausgeprägtes Haarwachstum am ganzen Körper bei Säuglingen und kleinen Kindern.

- Sommersprossen.

KONVULSIONEN

Beschwerden durch: Zorn (bei Säuglingen) und Verletzung.

Wechselnde Symptome.

Epileptische Konvulsionen im Schlaf mit blassem Gesicht, besonders beim Liegen auf der Seite.

ALLGEMEINES

Beschwerden durch Missbrauch von Antibiotika, Antipyretika, Eisen-Stärkungsmitteln, oralen Steroiden; **nach Masern** oder **Unterdrückung von Ausschlägen**; durch Wetter- oder Temperaturwechsel, durch **Nasswerden**.

Anämische Kinder mit ausgeprägter Blässe, Mattigkeit und Verstopfung.

Allergie gegen Katzen.

Das Kind verlangt kalte, frische Luft, die bessert, aber Zugluft verschlimmert.

Widersprüchliche und abwechselnde Zustände ODER ständiger und schneller Wechsel der Symptome, mit wandernden Schmerzen.

Absonderungen: Mild oder wundmachend, reichlich, stinkend, heiß, eitrig und gelblich-grün.

Heiße, empfindliche, verhärtete Lymphknoten, mit bläulicher Verfärbung der Stelle.

Unverträglichkeit von Decken und Wollkleidung.

Die meisten Beschwerden sind schlimmer nach der Dämmerung.

Nie mehr gesund seit Mittelohrentzündung und nach Infektionskrankheiten.

Weiche Knochen; Rachitis.

HERKUNFT

Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae).

RHEUM PALMATUM

(Rhabarber - Rheum.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Launische Kinder, die genau die Dinge ablehnen, um die sie vorher gebeten haben (Cham., Cina, Staph.).

Stille und schweigsame Kinder (Hell., Ign., Op.), die nicht gerne mit anderen Kindern spielen und unter Durchfall und Koliken leiden.

Gereizte Ruhelosigkeit und Weinen die ganze Nacht hindurch, aber tagsüber fröhlich (Ant-t., Jal., Psor.).

Klagen, Streit und Weinen im Schlaf (extrem unzufrieden) (Bell., Ign., Nux-v., Stann.).

KÖRPER

Saurer Geruch; das Kind riecht sogar nach dem Baden noch sauer (Hep., Mag-c., Sil., Sulph.).

Die Kopfhaut ist immer schweißfeucht, Tag und Nacht.

Ein gutes Mittel, wenn die Mutter dem Kind viel Magnesium oder Kolikmittel mit oder ohne Rhabarber gegeben hat.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Schreien, mit extremer Gereiztheit bei Tag und Nacht, besonders bei Zahnung, mit extremer Ruhelosigkeit.

Mangel an Empfindsamkeit (Bism., Op., Sep.).

Vertritt seltsame Meinungen und Ansichten.

Ungeschickt.

Möchte getragen werden.

Geistesverwirrung mit Stumpfheit und Faulheit beim Erwachen am Morgen.

Gereiztheit mit Weinen und Ruhelosigkeit die ganze Nacht, aber tagsüber heiter.

Verdrießliche und trübsinnige Kinder, die dazu neigen, ständig die Stirn zu runzeln.

Grobe und ungezogene Kinder (Chin., Staph.), die sehr impulsiv sind.

KOPF

Leicht Kopfschweiß, besonders auf der Stirn, von saurem Geruch, schlimmer durch die geringste Anstrengung oder nach dem Genuss von Suppe.

Untersuchungsergebnis:

Haare feucht, durchnässt (Anac., Calc., Cham., Merc., Sil.).

AUGEN

Augen morgens verklebt.

Tränenfluss im Freien.

Untersuchungsergebnisse:

- Granulierte Lider.
- Krämpfe und Zucken der Lider im Schlaf.

OHREN

• Untersuchungsergebnis:

- Bohrt ständig mit den Fingern in den Ohren.

NASE

Jucken der Nasenspitze.

Untersuchungsergebnis:

- Bohrt ständig mit den Fingern in der Nase (Arum-t., Cina, Sil.).

GESICHT

Leicht eintretende Kieferverrenkung.

Das Gesicht wird blass im Schlaf und beim Stuhlgang.

Untersuchungsergebnisse:

Kalter Schweiß auf der Nase und um die Lippen (Chin.).

Dauerndes Zupfen an den Lippen.

Eine Seite blass, die andere rot.

Glänzendes Gesicht mit Schwellung um die Augen.

Gerunzelte Stirn.

Runzliges Gesicht

Zucken der Mundwinkel.

MUND

Bitterer Geschmack im Mund.

Schwierige Zahnung. **Zahnungsprobleme.**

Speichelfluss bei Stuhlgang.

Zahnschmerzen in kariösen Zähnen, mit vermehrtem Speichelfluss.

Untersuchungsergebnisse:

Zungenlähmung.

Weißer Zungenbelag.

MAGEN

Durstlosigkeit trotz trockenen Mundes bei Fieber (Bry., Chin., Nux-m., Puls.) und **durstig bei Stuhlgang** (Bry., Chin., Sulph., Verat.).

Launischer Appetit; das Kind ist hungrig, aber weiß nicht auf was.

Saures, milchiges Erbrechen bei Stuhlgang.

Durst bei Durchfall.

Absolute Unverträglichkeit von Milch bei Neugeborenen und Kleinkindern. Milch und ganz besonders Muttermilch wird sofort wieder erbrochen.

Abneigung: Kaffee, Fett, Muttermilch.

Verlangen: Erfrischende Dinge, Süßigkeiten.

ABDOMEN

Schneidende, krampfende Schmerzen im Abdomen, besonders bei Stuhlgang; das Kleinkind neigt zum Zusammenkrümmen bei Kolik.

Auftreibung des Abdomens nach Essen.

Gurgeln im Abdomen.

Eingeklemmte Blähungen.

Schmerz in den Leistendrüsen.

Untersuchungsergebnis:

- Leistenbruch.

REKTUM

Durchfall, der Stuhl dünn, bräunlich oder schlammig, schleimig oder wie weißlich, geronnenes Eiweiß, das sich in der Windel grün verfärbt, wenn es der Luft ausgesetzt wird. Stuhl mit grünem Schleim gemischt, riecht sauer, schaumig und vergoren. Der Durchfall ist immer schlimmer während der Zahnung, nach dem Essen und bei heißem Wetter. Bei Durchfall vergeblicher Harndrang und Krampf im Abdomen, der sich durch krümmen bessert. Schlimme Kolik beim Stuhlgang, das Kind schreit, zieht die Beine an oder wird ganz steif. Heftiger Tenesmus nach dem Stuhl. Bei Durchfall Ruhelosigkeit, blasses Gesicht, kalter Schweiß im Gesicht und Übelkeit.

Durchfall nach Essen, besonders durch **unreifes Obst** (Aloe, Ipec., Ph-ac., Sul-ac.).

Durchfall bei abgemagerten, gelbsüchtigen Säuglingen (Bry., Cham., Lyc., Op.).

Der erste Teil der Stühle ist weich und teigig (Alum., Nux-v.).

Saurer, übler Geruch der Stühle (Calc., Hep., Merc., Sulph.), die **geronnen** sind (Calc., Nit-ac.) oder schaumig und voll Schleim zu sein scheinen.

Durchfall mit Stuhldrang nach Essen, Missbrauch von Magnesiamilch, während Zahnung und beim Gehen.

Abgang von sauer riechenden Blähungen beim Erwachen am Morgen.

Ruhelosigkeit und Reizbarkeit nach Stuhlgang.

Schreien bei Kindern vor und bei Stuhlgang.

Untersuchungsergebnisse:

Wundheit der Analregion durch Stuhlgang.

Blutungen aus dem Anus bei Stuhlgang.

HARNWEGE

Schwacher, unterbrochener Urinfluss bei Schwäche der Blasenmuskeln; muss sich sehr anstrengen, um Urin zu entleeren.

Nächtliches Einnässen.

Untersuchungsergebnisse:

Dunkelroter, zitronenfarbener oder grünlicher Urin.

Rosafarbenes Sediment in der Windel.

Urin: Leukozyten +.

ATMUNG

Schwierigkeiten bei der Atmung im Schlaf.

Trockener Husten abends und locker am Morgen.

Untersuchungsergebnis:

- Laute Einatmung.

EXTREMITÄTEN

Hitze in Handflächen und Füßen (Bry., Med., Sep., Sulph.).

Leicht Luxationen.

Rheumatische Schmerzen der Gelenke.

Untersuchungsergebnisse:

Kalter Schweiß der Handflächen.

Geschwollene Handvenen.

SCHLAF

Das Kind braucht sehr wenig Schlaf und nicht viel Essen (Carc, Coff, Sulph.).

Schläft mit den Händen über dem Kopf (Nux-v., Plat., Puls., Sulph.) oder mit den Händen nach hinten abgewinkelt.

Im Schlaf: Klagen oder Streiten, Stöhnen, Schreien, schnarchende Einatmung, plötzliches Zusammenschrecken, Sprechen, Zittern des Körpers, Muskelzucken, Weinen und Wimmern.

Sehr ruhelos, sogar nachts im Schlaf; wirft sich die ganze Nacht herum oder beginnt im Bett herumzugehen.

FIEBER

Beschwerden durch Zahnung.

Angst mit Stöhnen bei Fieber.

Die Temperatur steigt im Schlaf, mit rasendem Delirium.

HAUT

Kalter, reichlicher, sauer riechender Schweiß durch die geringste Anstrengung, der dazu neigt, die Kleidung gelb zu färben.

Untersuchungsergebnisse:

- Bläuliche Pusteln.

Faltige Haut.

Gelbe Verfärbung der Haut.

ALLGEMEINES

Saurer Körpergeruch (Hep., Mag-c., Sil., Sulph.).

Schlüsselsymptom des Mittels ist, dass alles **sauer** ist. Die Absonderungen, wie z. B. der Stuhl und der Schweiß, der Geschmack im Mund und sogar das Gemüt sauer. Das Kind ist so sauer, dass es sogar im Schlaf streitet.

Ein anderes Schlüsselsymptom dieses Mittels ist **reichlicher Schweiß**. Schweiß am Kopf, auf der Stirn, im Gesicht, am Mund und an der Nase.

Wetterwechsel verschlimmert.

Klonische Konvulsionen, die besonders im Schlaf und bei Zahnung auftreten.

Erweiterte Blutgefäße.

Abgemagerte Kinder, die an häufigen Anfällen von Diarrhoe leiden.

Linksseitig.

Der Stupor wird durch Schreianfälle unterbrochen.

Schwäche der Muskeln und Gelenke.

HERKUNFT

Familie der Knöterichgewächse (Polygonaceae).

RIBONUCLEINICUM ACIDUM

(Ribonukleinsäure - RNA - Rib-ac.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Lern- und Persönlichkeitsstörungen.

Geistesarmut, fehlende Konzentration bei geistigen Tätigkeiten; keine Ausdauer bei geistiger Anstrengung.

Müde, schläfrige und hungrige Kinder.

Instabiles Gewicht, plötzliche Gewichtszunahme und dann wieder Gewichtsverlust innerhalb weniger Wochen.

Muss oft essen, Abneigung gegen fettes und heißes Essen, verlangt Fleisch und Zucker. Bevorzugt Essig und gekochte, würzige Speisen.

Rheumatismus, geschwollene Hände und Füße, Schmerzen schlimmer morgens und abends.

Entzündungen rund um die Nägel, besonders am Zeigefinger, am zweiten und am dritten Finger der rechten Hand.

Anfällig für wiederkehrenden Herpes; **atopisches Ekzem, das immer wiederkehrt.**

HERKUNFT

- Wurde von Dr. O. A. Julian in die Homöopathie eingeführt.

SACCHARUM ALBUM

(Weißer Rohrzucker - Sacc-alb.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Schulprobleme, schlechte Konzentration beim Lernen, Fehler beim Schreiben, Verwechseln und Auslassen von Buchstaben, Benutzen von falschen Worten und undeutliche Schrift.
Geringes Selbstvertrauen, braucht viel Unterstützung von Familie und Freunden.
Pflichtbewusst und gewissenhaft.
Vorliebe für Singen und Tanzen.
Vernachlässigung durch die Mutter und die Familie oder häufige Demütigungen wirken sich direkt auf die geistigen Fähigkeiten aus, so dass Lernen sehr schwer fällt. Konfus, verwechseln von Dingen und Gedanken, Verwirrung beim Sprechen, beim Arbeiten und beim Zuhören. Schlechtes Gedächtnis für alles, was zu tun ist, was passiert ist oder für das, was gerade gelesen wurde.
Ruhig und zurückhaltend.
Migräne, mit Schmerzen in der Stirn, schlimmer durch frische Luft.
Stirnschweiß nachts schlimmer.
Rissige Unterlippe.
Verlangen nach Schokolade, Obst, Senf, Suppe und Essig.
Übelkeit beim Autofahren.
Füße, Finger und Hände fühlen sich kalt an.
Hautausschläge durch Aufenthalt in der Sonne.
Schnell eiternde Pickel in der Pubertät.

HERKUNFT

- Synonym: Saccharum officinale (entweder aus Zuckerrohr oder Rüben).

SACCHARUM OFFICINARUM

(Zuckerrohr - Sacch.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Verhaltensstörungen (Anac., Hyos., Stram., Tarent., Tub., Verat.) wie Wutanfälle und ADHS bei Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft einen unterdrückten Zorn oder Kummer hatten.

Nägelkauen.

Steckt gern die Finger oder andere Dinge in den Mund.

Ungeduldige, hyperaktive und ruhelose Kinder (Bac., Cham., Cina, Merc.).

Abneigung gegen Gesellschaft und die Gegenwart von Fremden (Ambr., Bar-c., Cic.).

Launisch, braucht Abwechslung.

Kinder, die sich wegen eines neugeborenen Geschwisterchens vernachlässigt fühlen und aus Neid oder Eifersucht allergisch reagieren oder Infektionen bekommen.

Große Eifersucht zwischen Kindern.

Ärgerliche, verdrießliche und weinerliche Kinder (Cham., Cina, Merc., Tarent., Tub.).

Hinterlistige und durchtriebene Kinder.

Verlangen nach körperlicher Anstrengung und sportlichem Training.

Fassen zwanghaft alles an, sehr zappelig (Carc., Cina, Hyos., Merc.).

Wird gern getragen, gehalten und liebkost (Puls.).

Spielt mutwillige Streiche.

Empfindlich gegen Tadel und Ermahnung.

Reizbarkeit vor, während und nach dem Frühstück.

KÖRPER

Abneigung gegen gekochtes Gemüse (Nicc.).

Lieber Schleckereien als normale Mahlzeiten.

Wurmerkrankungen.

Beschwerden durch Temperatur- oder Wetterwechsel.

Aszites mit schmerzhafter Verhärtung des Abdomens.

Dicke, aufgedunsene Kinder mit langen Gliedern ODER mager bei gutem Appetit.

Abgemagerte Kinder.

Schmerzlosigkeit bei Beschwerden, die normalerweise schmerzhaft sind.

Blasses, hippokratisches Gesicht.

Skorbut und Rachitis bei Flaschenkindern.

Langsame Wundheilung.

Kompakter dick-weißer Zungenbelag.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

- Das Kind hat entweder ein großes **Bedürfnis, gehätschelt und liebkost zu werden** (Carc., Podo., Puls.) und zwingt seine Eltern, bei ihm zu bleiben, bis es eingeschlafen ist ODER es hat Schwierigkeiten, sein Bedürfnis zuzugeben und zeigt Abneigung gegen jede Art von Kontakt. Es braucht viel Liebe, aber weiß nicht, wie es sie bekommen kann.
 - Vernachlässigt von den Eltern, weil diese Geschwister vorziehen oder weil sie zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt sind. Das Kind versucht dann Aufmerksamkeit zu erhalten, indem es an den Nägeln kaut oder unheimlich viel redet oder irgendwelche Possen reißt.

Leicht erschreckt durch Kleinigkeiten (Kali-c., Lyc., Phos.).

Heimweh, will wieder nach Hause (Caps., Ign., Mag-m., Ph-ac.).

Anmaßend (Lyc., Plat., Verat.).

Fühlt sich von den Eltern und anderen Familienmitgliedern nicht geliebt (Mag-c., Puls.).

Schreibt undeutlich und macht viele **Fehler beim Sprechen und Schreiben**; benutzt falsche Wörter oder vergisst Wörter (Lyc., Merc., Stram., Thuj.).

Beschwerden durch Mangel an Zuneigung und Körperkontakt in der frühen Kindheit. Gewissenhaft.

Unzufrieden mit allem.

Ungehorsam und trotzig.

Versagensangst.

Geringes Selbstvertrauen führt zu Ängstlichkeit.

Haben eine hohe Schmerzschwelle; weinen nicht, wenn sie verletzt sind.

Gereizt, besonders wenn sie hungrig sind; besser nach Essen.

Scherzend.

Liebt es zu singen und zu tanzen.

Mangel an Initiative.

Klagen.

Schaukeln bessert.

Verschlossen.

Empfindlich gegen Schmerz, Kritik und moralischen Druck.

Zusammenschrecken durch das geringste Geräusch und im Schlaf.

Schweigsam und ruhig; Abneigung gegenüber dem Sprechen.

Unruhige Kinder, wenn sie zuviel Zucker gegessen haben.

Heimtückisch und bössartig schlimmer nach zu viel Schokolade und Süßigkeiten.

KOPF

Das Haar wächst schnell.

Periodische Schulkopfschmerzen.

Schweiß auf der Stirn, nachts.

Untersuchungsergebnis:

- Trockenes Haar.

AUGEN

Verlangen, häufig die Augen zu reiben (Caust., Op., Puls., Squil.).

Sehschwache.

Ophthalmie.

Untersuchungsergebnisse:

Verklebung.

Katarakt beginnt hinter dem Tränengang und verschließt ihn (Caust., Sil.).

Trockenheit und Röte.

Die Augen sind geschlossen aufgrund von Lidschwellung.

Eingesunkene Augen mit müdem Ausdruck.

Zucken der Oberlider, besonders rechts.

OHREN

Wiederkehrende Mittelohrentzündungen.

Untersuchungsergebnis:

- Eitrige Absonderungen.

NASE

Schnupfen, der in die Brust absteigt und Asthma produziert.

Schnupfen schlimmer besonders am Morgen.

Untersuchungsergebnisse:

Entzündete Nasenflügel.

Nasensekret läuft in den Rachen.

GESICHT

• Untersuchungsergebnisse:

Regloser, maskenartiger Ausdruck (Mang.).

Rissige Unterlippe.

Blasses, ödematöses Gesicht, mit roten Lippen (Chin., Ferr., Verat.).

MUND

Entzündung der Speicheldrüsen mit **erhöhtem Speichelfluss** (Bell., Merc., Puls., Rhus-t.).

Trockenheit des Mundes ohne Durst.

Untersuchungsergebnisse:

Steckt die Finger oder andere Dinge in den Mund (Cham., Ipec., Sulph.).

Weißer Zungenbelag (Ant-c., Bry., Merc., Rhus-t.), so dick, dass er die Zunge steif macht.

Aphthen und Ulzerationen auf der Innenseite der Wangen, auf dem Zahnfleisch und im Gaumen.

Ranula.

HALS

Trockenheit des Halses, besonders am Morgen beim Erwachen, trotzdem überhaupt keinen Durst.

Untersuchungsergebnis:

- Geschwüre im Hals.

MAGEN

Liebt Leckereien und lehnt normale Mahlzeiten ab.

Krankhafter Hunger schon bald nach einer vollen Mahlzeit (Lyc., Phos.) oder Mangel an Appetit.

Unstillbarer Heißhunger.

Lautes Aufstoßen nach dem Essen.

Rezidivierende Übelkeit und Erbrechen bei Magenerkrankungen (Ars.).

Neigung, häufig zwischen den Mahlzeiten zu essen, aufgrund von Schwächegefühl, Schwindel, Zittern, Kopfschmerz usw.

Heftiges Würgen mit Erbrechen von blutigem Schleim.

Schwache Verdauung bei Übersäuerung.

Abneigung: **Gekochtes Gemüse**, Süßigkeiten, Butter und warme Speisen.

Verlangen: Brot und Butter, **Schokolade, kalte Getränke**, Zitrone, Lakritz, Fleisch, **Milch**, Senf, Gebäck, Scharfes, Erfrischendes, Kartoffeln, Salat, Salz, Sprudel, Suppe, Süßsaures, Gewürze, **Zucker oder süße Sachen, Tee, rohes Gemüse** und Essig.

Verschlimmerung: Schokolade und Süßigkeiten.

Möchte Unmengen Wasser trinken.

ABDOMEN

Bauchfelltuberkulose (Bar-c., Calc., Iod.).

Blähungen.

Verdauungsstörungen bei Mangelernährung.

Reizdarm.

Schmerz in der Nabelgegend.

Empfindung von etwas Zusammenschnürendem im Abdomen.

Untersuchungsergebnisse:

- **Aszites** (Apis., Apoc., Lyc.).
- Mesenterialdrüsen geschwollen und ödematös.

REKTUM

Analjucken (Aloe., Merc., Sulph.), besonders am Morgen im Bett.

Verstopfung abwechselnd mit schleimigem Durchfall.

Verstopfung mit dauerndem und häufigem Stuhldrang.

Durchfall: Ätzend, blutig, schwächend, wässrig, mit glänzendem Schleim.

Durchfall nach dem Abendessen.

Stuhl trocken, knotig, mit Kadavergeruch.

Plötzlicher Stuhldrang am Morgen.

Untersuchungsergebnis:

- Wundheit zwischen den Gesäßbacken und in der Analregion durch Stuhlausscheidung.

HARNWEGE

Chronisches Nierenversagen.

Häufiger Harndrang.

Untersuchungsergebnisse:

- Nierensteine.

Urin: Protein ++ (Apis, Hell, Ph-ac).
Weißes Sediment in der Windel.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnis:
 - Enorm geschwollenes Skrotum.

WEIBLICHE GENITALIEN

Vaginaljucken.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Verlangen, tief einzuatmen.

Heiserkeit oder Rauheit der Stimme, besonders am Morgen oder durch nur kurzes lautes Lesen.

Reizung im Larynx verursacht trockenen Husten.

ATMUNG

Kann nur in aufrechter Haltung atmen.

Muss mit angehobenem Kopf liegen wegen Dyspnoe.

Atembeklemmung am Morgen, erleichtert durch Auswurf.

HUSTEN

Reichlicher, gelblicher, cremeartiger, salziger, kalter und **sehr übelriechender** (Borx., Calc., Phel., Sang.) Auswurf, besonders im Freien.

Trockener Husten bei Kindern.

Lockerer rasselnder Husten.

BRUST

Achselschweiß besonders nachts.

Untersuchungsergebnisse:

Abmagerung der Brust, Muskelschwund.

Pneumonie.

Schwellung des unteren Sternums.

HERZ UND KREISLAUF

Herzmuskelbedingte Insuffizienz, ohne Klappenschäden.

Rheumatische Herzerkrankungen.

Untersuchungsergebnisse:

Unregelmäßiger, schwacher Puls.

Thrombose.

EXTREMITÄTEN

Wadenkrämpfe.

Hitze in den Fußsohlen nachts, mit Verlangen, sich aufzudecken.

Untersuchungsergebnisse:

Kälte der Hände und Füße.

Sehr trockene Hände und Füße

Abmagerung von Händen, Gesäß und Schenkeln (Calc., Chin., Plb.).
Harte, ödematöse Schwellung der Arme, Beine, Fußgelenke und Füße (Ars., Chin., Sulph.).
Ruhelosigkeit von Händen und Beinen.
Zucken der Extremitäten beim Einschlafen.

SCHLAF

Fällt leicht in Schlaf, manchmal sogar im Sitzen (Nux-m., Nux-v., Sulph.).
Braucht viele Stunden Schlaf.
Schreckt im Schlaf zusammen.
Gähnen im Freien.

HAUT

Insektenstiche.
Blasige Ausschläge durch Sonneneinwirkung.
Untersuchungsergebnisse:
Trockene Haut; Schweißbildung ist vollkommen unterdrückt (Colch., Graph., Plb.).
Übermäßige Granulation von Geschwüren.
Panaritium.
Skorbut.

ALLGEMEINES

- **Abwechselnde und widersprüchliche Zustände** (Abrot., Lac-c., Lyc., Sulph.).
 - Fröstelig oder heiß.
 - Zwanghaftes Essen oder Anorexie; Fettsucht oder Abmagerung.
 - Verlangen liebkost zu werden oder Abneigung gegen Berührung.
 - Sanft oder aggressiv.
 - Schmerzempfindlich oder schmerzunempfindlich.
 - Empfindlich gegen Tadel oder ungehorsam und frech.
- Ödeme (Apis, Hell., Plb.).
- Abmagerung bei großem Appetit (Abrot., Calc., Iod., Nat-m., Tub.).
- Extreme Trockenheit (Augen, Füße, Haar, Hände, Mund, Nägel, Nase, Rektum, Haut, Hals, Vagina) (Bry., Nat-m., Nux-m.).
- Generell ein heißes Mittel (Calc., Gels., Lach., Sulph.), aber bei starker Depression oder Abgemagerung zeigen sich Frösteligkeit und Zittern.
- Liebt es zu baden (Tarent.).
- Schmerzlosigkeit bei Beschwerden, die normalerweise schmerzhaft sind (Hell., Op., Stram.).
- Nicht verheilte oder langsam heilende Wunden (Hep., Lach., Nit-ac., Sil., Sulph.).
- Nützlich nach Operationen, um die Heilung zu beschleunigen und Sepsis zu verhindern (Ars., Crot-h., Lach., Pyrog.).
- Nützlich bei Mangelernährung und verschiedenen Mineral- und Vitaminmangelerscheinungen: Calciummangel, Chrommangel (verursacht Verhärtung der Arterien), Vitamin C-Mangel (führt zu Skorbut) und Vitamin D-Mangel (führt zu Rachitis), Eisenmangel (führt zu Anämie) und Thiaminmangel (verursacht Beriberi und Herzinsuffizienz/-versagen).

Nützlich in Fällen von geschwächtem Immunsystem, z. B. Kräfteverfall durch AIDS, Candida albicans (Soor), Pneumonie mit abgemagerter Brustmuskulatur, Krebs usw.

Sehr frühe Abhängigkeit: Amphetamine, Cannabis, Zigaretten, Heroin, Junkfood und Opium.

Familiengeschichte von Diabetes mellitus.

Schlimmer: Nachts (um 1 Uhr) und am Morgen.

Besser: Nach den Mahlzeiten und im Freien (Aur., Carbo-veg., lod., Puls.).

HERKUNFT

Saccharum officinale wird aus Zuckerrohr hergestellt.

SAMBUCUS NIGRA

(Schwarzer Holunder - Samb.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Schlimme Folgen von Schreck, insbesondere wiederkehrende Erstickungsanfälle bei Bronchialasthma. Schreckliche Bilder beim Schließen der Augen im Bett.

Kleine Kinder mit Schnupfen, können nicht richtig gestillt werden, weil die Nase verstopft ist. Die Nase ist trocken und völlig verstopft.

Schnupfen, der in Asthma übergeht.

Offene Augen im Schlaf.

Katarrh der Atemwege der Nase und der Bronchien,

Übermäßige Ansammlung von Schleim in den Bronchien, der schwer auszuwerfen ist.

Krampfhafter Husten mit Anfällen um Mitternacht mit ausgeprägter Atemnot und Schnupfen. Trockene und verstopfte Nase.

Ängstliche, laute, keuchende und krächzende Atmung. Wird unruhig, ängstlich und zittrig auf Grund von Erstickungsanfällen, die meist nachts auftreten. Das Kind erwacht fast erstickt plötzlich in der Nacht auf und sitzt aufrecht im Bett. Es ist blau angelaufen und schnappt nach Luft.

Asthmaanfall schlimmer nachts und beim Liegen mit tief gelagertem Kopf.

Anfall meist während der Zahnung, hohler und trockener Husten in der Nacht; die Anfälle sind am beschwerlichsten um Mitternacht. Das Kind erstickt fast zu Tode. Gesicht, Lippen und Hände laufen blau an und dann folgt starkes Schwitzen auf Grund des schweren Anfalls. Das Kind wacht mit einem schlimmen Asthmaanfall aus dem Schlaf auf und schwitzt sehr heftig. Ein plötzlicher Erstickungsanfall oder erstickender Husten beim Einschlafen führt dazu, dass das Kind dann nach Mitternacht schweißbedeckt durch den Schreck aufwacht.

Asthma schlimmer 3 Uhr nachts.

Husten bei Kindern mit Primärkomplex. Reichliches Schwitzen am ganzen Körper, aber nur wenn sie wach sind. **Im Schlaf hört das Schwitzen auf** und die trockene Hitze kommt wieder.

Ein gutes Mittel in vielen Fällen von **Fieber bei Kindern**. Tiefer trockener Reizhusten im Prodromalstadium des Fiebers, der sich bis weit in das Froststadium erstreckt. Husten begleitet von Übelkeit. Schweiß beginnt an Händen und Füßen, die sich kalt anfühlen, und hält ein paar Stunden an. Durstlosigkeit sowohl bei Frost wie auch im Hitzestadium. Reichliches Schwitzen und nachts läuft der Schweiß über das Gesicht und den ganzen Körper.

Frostige Patienten und allgemein durstlos.

Übermäßiges Schwitzen, aber nur beim Wachsein.

Verschlimmerung durch kalte Getränke, Milch und Obst.

HERKUNFT

- Wird auch europäischer Holunder genannt und gehört zur Familie der Holundergewächse (Sambucaceae).

SANICULA AQUA

(Mineralwasser aus einer Heilquelle in Ottawa, Illinois, USA - Sanic.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Kinder, die **von den Pflegeeltern im Stich gelassen, gehasst** (Lach.) und **vernachlässigt** (Mag-c) wurden, brauchen häufig dieses Mittel.

Ein Kind, dessen Mutter während der Schwangerschaft große Not und Sorgen hatte, immer alleine war und keine Unterstützung bekam.

KÖRPER

Reichlicher, faulig-klebriger, wundmachender Fußschweiß mit wund gescheuerten Zehen; der Schweiß frisst die Socken und Schuhe an (Graph., Sec., Sep., Sil.).

Der **Stuhl krümelt** am Anus (Am-m., Mag-m., Merc., Nat-m.) oder weicht wieder zurück, nachdem er teilweise austrat und **muss mechanisch entfernt werden** (Lyc., Nat-m., Op., Sep., Sil.).

Das Kind reibt sich die Nase und Augen beim Erwachen.

Abmagerung trotz Heißhunger.

GEMEINSAME MERKMALE VON SANIC., CINA, CHAM, UND TUB.

Die Geistessymptome von Sanicula werden gewöhnlich mit denen von Cina, Cham, und Tub. verwechselt. Daher ist es unerlässlich, **die gemeinsamen Symptome** aller vier Mittel zu studieren:

Rasch zornig.

Abneigung berührt zu werden.

Gereizte und aufsässige Kinder

Gereiztheit beim Erwachen.

Schreikinder.

Leicht beleidigt.

Wirft mit Gegenständen.

Ruhelose Kinder.

Handschweiß.

GEMEINSAME MERKMALE VON SANIC, UND SIL.

Auf körperlicher Ebene kommt das Mittel sehr nah an **Sil.** heran. **Gemeinsame Symptome** sind:

Abmagerung bei Kindern mit Heißhunger.

Absonderungen aus der Nase krustig, grün und gelb.

Aufgeblähter Bauch bei Abmagerung des restlichen Körpers.

Ausschläge hinter den Ohren.

Durst bei Frost; durstlos bei Hitze.
 Eiterbeulen am Kopf.
 Eisige Kälte der Hände und Füße.
 Erbrechen nach kaltem Wasser oder nach Muttermilch.
 Fußschweiß, wundmachend, kalt, stinkend, reichlich.
 Haarausfall der Augenbrauen.
 Husten: Tief und hohl; schlimmer nachts und beim Hinlegen.
 Katarrh der Eustachischen Röhre.
 Kopfschmerzen, besonders im Hinterkopf, erstreckt sich zur Stirn; schlimmer durch kalte Zugluft, besser durch Zudecken des Kopfes.
 Niednägel.
 Rachitis.
 Schweiß in der Nacht und im Schlaf.
 Schweiß nur am Kopf, besonders am Hinterkopf.
 Stuhl: Hart, knotig und groß.
 Tendenz zur Abszessbildung.
 Tränenfluss in kalter, frischer Luft.
 Tumoren auf den Augenlidern.
 Unfähig, den Kopf aufrecht zu halten.
 Verlangen nach Eiern, Fett, Milch, Salz und Süßem.
 Verstopfung, der Stuhl muss mechanisch entfernt werden.
 Würgen beim Husten.
 Zarte, schwächliche und kränkliche Kinder.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Will nicht getragen werden (Bry.), **aber gern geschaukelt** (Cham.).
Abneigung berührt oder angesprochen zu werden (Ant-c., Arn, Cham., Tarent.); wird sehr ärgerlich und gereizt.
 Furcht im **Dunkeln** (Calc., Cann-i., Lyc., Med., Stram.).
Reizbarkeit wechselt mit Fröhlichkeit (Aur., Borx., Chin., Stram.).
Aufsässige Kinder, die sehr gereizt sind und dazu neigen, beim Erwachen zu schreien, zu heulen und zu treten (Ant-c., Cham., Cina, Tub.).
Ruhelose Kinder (Bac., Merc., Rhus-t.); können nicht einmal für kurze Zeit auf dem gleichen Platz sitzen.
 Nägel kauen.
 Kinder, die ständig gestillt werden wollen (Verlassenheitsgefühl; Neugeborenen-bulimie).
 Furcht in die Luft gehoben und getragen zu werden, da sie fürchten zu fallen (emotionale Unsicherheit).
 Furcht, im Riesenrad zu sitzen, besonders bei der Abwärtsbewegung.
 Schwere geistige Behinderung.
 Lieben es zu reisen.
 Langsam beim Sprechenlernen.
 Will viele Dinge tun, aber lässt sie nur halb erledigt; will seine Arbeiten nicht fertigstellen.

KOPF

Kopfschmerzen durch kalte Zugluft oder kalten Wind; besser durch **Einhüllen des Kopfes** (Nux-v., Sil.).

Kopfschweiß im **Schlaf**, besonders am **Hinterkopf** (Calc.).

Untersuchungsergebnisse:

Das Kind ist unfähig, den Kopf aufrecht zu halten wegen der Abmagerung des Halses.

Schuppen.

Trockene, schuppige Ausschläge auf der Kopfhaut.

Fontanellen bei der Geburt geschlossen.

AUGEN

Verlangen, sich häufig die Augen zu **reiben** (Mez., Op.).

Tränenfluss draußen in kalter frischer Luft.

Photophobie.

Untersuchungsergebnisse:

Krustige Ausschläge auf den Lidern (Graph.).

Tumore auf den Lidern (Staph, Zinc.).

Geschwollene Lider mit roten entzündeten und vereiterten Rändern.

Hornhautulzeration.

OHREN

Stinkender Ohrausfluss.

Untersuchungsergebnisse:

- Katarrh der Eustachischen Röhre.

Mittelohrentzündung.

Feuchte, klebrige Ausschläge und Wundheit hinter den Ohren.

NASE

Schnupfen beim Essen (Nux-v., Plb., Sulph.).

Untersuchungsergebnisse:

Grünliche, dicke, zähe Absonderung aus der Nase, die antrocknet und **harte Krusten** (Bov., Kali-bi.) **in den Nasenlöchern** bildet, die schwierig abzulösen sind (Bov., Graph., Kali-bi., Stict.).

Geschwüre und Verfärbung der Nasenflügel.

GESICHT

Das Kind reibt sich beim Erwachen Augen und Nase mit der Faust.

Untersuchungsergebnisse:

Dauerndes Zupfen an der Oberlippe (Kali-bi.).

Schuppen mit Haarausfall der Augenbrauen (Nit-ac., Ph-ac.).

Alt und schmutzig aussehendes Gesicht (Nat-m., Op.) mit leerem Ausdruck.

Blasige Ausschläge mit Krusten- oder Schuppenbildung um die Lippen, besonders um die Oberlippe.

Gelbliche oder bräunliche Verfärbung quer über der Nase (Sep., Sulph.).

MUND

• Untersuchungsergebnisse:

Trockene, brennende, große, schlaffe Zunge mit **Zahneindrücken** (Chel., Merc., Rhus-t., Sep.), muss sie herausstrecken, um sie kühl zu halten.

Rasches Rein- und Rausschnellen der Zunge, wie bei einer Schlange (Cupr., Cupr-act., Lyc., Merc., Merc-c.; Schlangen-Mittel: Crot-h., Elaps, Lach., Vip.).

Eiterbeulen am Zahnfleisch.

Mund und Gaumen sind mit Geschwüren bedeckt.

Ringelflechte der Zunge.

HALS

Wund im Hals mit Schwierigkeit zu schlucken, mehr bei Flüssigkeiten als bei fester Nahrung.

MAGEN

Heftiges, schwallartiges Erbrechen **von geronnener Milch** (Aeth., Calc., Nat-m., Sil.) unmittelbar nach dem Füttern; schlummert dann ein.

Heißhunger mit Abmagerung (Calc., lod., Nat-m., Sulph., Tub.).

Übelkeit und Erbrechen beim Reisen in Auto oder Bus.

Langsame Verdauung.

Häufiger Durst auf kleine Mengen kalten Wassers, aber durstlos bei Fieber.

Verlangen: **Speck** (Calc-p., Caust., Tub.), Eier (Carc., Puls.), **eiskalte Milch**, Salz.

Untersuchungsergebnis:

- Auftreibung des Epigastriums nach dem Füttern.

ABDOMEN

• Untersuchungsergebnisse:

Schlaff (Calc., Merc., Phos.).

Dickbäuchige Kinder, mit abgemagerten Gliedern (Calc., Ipec.).

REKTUM

Blähungen sind sehr übelriechend, mit einem Geruch wie **faulender Käse**.

Der Stuhl zerkrümelt am Anus (Am-m., Mag-m., Merc., Nat-m.) oder weicht wieder zurück, nachdem er teilweise austrat und **muss mechanisch entfernt** werden (Lyc., Nat-m., Op., Sep., Sil.).

Unwillkürlicher Abgang von Stuhl bei Abgang von Blähungen (Aloe, Olnd.).

Stuhldrang beim Essen.

Untersuchungsergebnisse:

Kreideartige, hellgefärbte Stühle.

Wundheit der Analregion.

HARNWEGE

Enuresis nocturna.

Weint und heult vor dem Urinieren.

Untersuchungsergebnis:

- Der Urin hinterlässt ein rotes Sediment in der Windel.

MÄNNLICHE GENITALIEN

• Untersuchungsergebnisse:

- Kalter Schweiß der Genitalien (Carbo-veg.).
- Ekzematöse Ausschläge in der Inguinalregion.

WEIBLICHE GENITALIEN

Übelriechende Leukorrhoe, die wie fauliger alter Käse stinkt (Hep.).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Gefühl von Schleim im Larynx, mit dauerndem Verlangen abzuhusten, besonders nach den Mahlzeiten.

ATMUNG

Asthma bei kleinen Kindern.

Dyspnoe nach dem Essen (Lach.).

Untersuchungsergebnisse:

- Rasseln.
- Keuchen.

HUSTEN

Hustenanfälle durch Kitzelempfinden im Hals am Morgen beim Erwachen, beim **Reden** (Dros., Rumx.) **oder Lachen** (Bry., Chin.) und nachts beim Hinlegen.

Reichlicher, gelblicher, käseartiger Auswurf, besonders am Morgen beim Erwachen und nach dem Essen.

Der Husten wird schlimmer in einem warmen Zimmer.

Tiefer, lockerer, rasselnder Husten, besonders nach dem Stillen.

BRUST

Reichlicher, ätzender **Achselschweiß** (Petr., Sei.).

RÜCKEN

Schweiß der **Halsregion** (Calc., Hyos., Lach.) besonders im Schlaf.

Untersuchungsergebnis:

- Das Kind kann den Kopf nicht aufrecht halten wegen Abmagerung und Schwäche der Halsmuskeln.

EXTREMITÄTEN

Reichlich faulig-klebriger und wundmachender Fußschweiß mit offenen wunden Zehen, Schweiß greift Socken und Schuhe an (Graph., Sil.).

Neigung, die Füße nachts im Bett aufzudecken (Cham., Med., Puls., Sulph.).

Rheumatische Schmerzen in den Gelenken, besonders in der linken Hüfte, dem linken Knie und der rechten Schulter.

Schwellung und Steifheit der Hände am Morgen beim Erwachen.

Untersuchungsergebnisse:

- Tiefe Risse in den Händen (Nit-ac., Petr.), besonders am Handrücken und an den Fingergelenken, schlimmer im Winter.
- Kalte und feuchte Hände und Füße.

Abmagerung der unteren Gliedmaßen.
Gänsehaut der oberen Gliedmaßen (Phos.).
Niednägel.

SCHLAF

Träumt von Räubern.
Schläfrigkeit nach Erbrechen.
Schläft mit den Händen unter dem Kopf.
Zusammenschrecken im Schlaf.

HAUT

Untersuchungsergebnisse:
Kondylome.
Schmutzige, rissige Haut, besonders im Winter.
Langsam reifende Eiterbeulen.

ALLGEMEINES

Wechselhaftigkeit der Symptome oder abwechselnde Zustände (Abrot., Lac-c.,
Lyc., Sulph.).

Abszesse mit dickem, ätzendem Eiter.

Allergische Konstitution.

Kann keine kalte Luft am Hinterkopf und am Nacken vertragen.

Fröstelig, verträgt aber keine Kleidung oder Decken; strampelt Kleidung beim
kältesten Wetter weg.

Verlangen nach frischer Luft, aber Verschlimmerung durch den geringsten Luftzug.

Kleinkinder und Neugeborene wollen ständig gestillt werden, aber neigen dazu, an
Substanz zu verlieren und abzumagern.

Übelriechende Absonderungen, riechen wie alter Käse oder Fisch.

Reichlicher Schweiß im Genick, am Hinterkopf und anderen Teilen, auf denen er
liegt.

SCUTELLARIA LATERIFLORA

(Sumpfhelmkraut - Scut.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Nervöse Angst, Angst und Schrecken in der Nacht, vor Unheil, dass etwas passieren könnte, vor Katastrophen.

Migräne durch emotionale Erregung, durch übermäßige Freude, durch starke Gerüche; besser durch Essen.

Der nächtliche Schrecken verursacht viele neurologische Symptome wie Chorea, Zuckungen und Konvulsionen.

Zähne sind bei der Zahnung fest zusammengebissen, Schlaflosigkeit während der Zahnung.

Ausgeprägte Schlaflosigkeit aufgrund schrecklicher Träume.

HERKUNFT

- Gehört zu den Lippenblütengewächsen (Labiatae).

SENNA

(Sennesblätter - Senn.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Schreien im Schlaf.

Oft sehr unruhig.

Kolik mit durch Gas aufgetriebenem Abdomen oder Kolik bei Durchfall mit gelb-grünlichem Stuhl und einem Gefühl beim Stuhl „nie fertig zu sein“. Häufiger und blutiger Stuhl.

Vergrößerte und empfindliche Leber.

Verstopfung mit Kolik und Flatulenz bei Säuglingen. Durch den eingeklemmten Flatus schreit das Kind so fürchterlich, dass es ganz blau wird.

Guernsey beschrieb dieses Mittel als geradezu typisch für Koliken bei Kindern, wenn diese voller Luft sind.

HERKUNFT

- Synonym: *Cassia acutifolia*. Diese Pflanze aus Nordafrika gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler (Leguminosen).

SEPIA OFFICINALIS

(Tinte des Tintenfisches - Sep.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Kinder, die **ihre Liebe und Zuneigung nicht so leicht ausdrücken können** (Nat-m.). Das Kind kann beim ersten Besuch verschlossen und gleichgültig wirken.

Unterdrückung (Anac., Carc., Lyc., Staph.) kann bei diesen Kindern zwei Verhaltensmuster hervorrufen:

Trotz (Bar-c., Caust., Lyc.).

Trauer und Depression (Akzeptanz) (Calc., Nat-m.).

KÖRPER

Verspätete Entwicklung der Brust bei Mädchen oder sehr kleine Brüste (Con., Iod., Kali-i., Staph.).

Entwicklungsverzögerung (Bar-c., Calc., Calc-p., Phos., Sil.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Beschwerden durch sexuellen Missbrauch (Carc., Ign., Nat-m., Op., Staph.), Kummer und Ermahnung.

Habsucht und Gier bei Kindern (Ars., Kali-c.), hauptsächlich aufgrund von **Unsicherheit** oder einem **Gefühl von Verlassenheit** oder **Vernachlässigung** (Arg-n., Pall., Puls.).

Kinder, die es lieben **zu tanzen, zu turnen** oder zu laufen, was die meisten Beschwerden **verbessert** (der Herrschaft entfliehen) (Carc., Ign., Tarent.).

Neid und **Eifersucht** unter Kindern (Puls., Tarent., Verat.).

Leicht erschreckt durch Kleinigkeiten; fürchtet besonders den Arzt (Phos., Stram.), Ratten (Calc.), Spinnen (Abel.), Baden, **Gewitter** (Borx., Nat-m.).

Einzelgänger, die ihre Gefühle abschotten (Nat-m., Phos.).

Schwerfällig (Am-m, Caps, Op, Plb), **ungeschickt, unfallgefährdet** (Arn., Aur., Caps., Med., Puls., Staph.); stößt beim Laufen an.

Unsaubere Kinder (fühlen sich wertlos), im Extremfall urinieren und koten sie überall hin (Lach., Psor., Sulph.).

Launisch; verlangt dauernden Wechsel (entstehend aus einer Art Unzufriedenheit durch emotionale Unsicherheit).

Neigung, ständig die Stirn zu runzeln.

Leicht beleidigt; denkt ständig, dass andere Kinder ihn verspotten oder sich über ihn lustig machen.

Emotionale Unsicherheit bei Kindern, die Zeuge wurden von Diskussionen und Streitereien zwischen den Eltern.

Findet es schwierig, seine Aufmerksamkeit und Konzentration auf das zu richten, was er gerade tut.

Lügner (Verat.) mit der Neigung zu stehlen (Puls.) und zwar heimlich (Lach.).

Liebt Gewitter; sehr glücklich und heiter durch Donner und Blitz (braucht Aufregung, um seine depressiven Gefühle loszuwerden).

Macht viele Fehler beim Sprechen und Schreiben; benutzt die falschen Wörter, bezeichnet Gegenstände mit den falschen Begriffen.

Nervöse Kinder, leicht beeinflussbar durch Berührung, Streitereien oder Trost.

Zwangsneurose; wäscht sich ständig die Hände.

Frühreife Kinder.

Verschlossene Kinder.

Gleichgültigkeit wird in Form von Reizbarkeit ausgedrückt, die zu streitsüchtigem, schroffem und unverschämtem Verhalten führt.

KOPF

Das Haar **klebt** an den Enden **zusammen** oder verwirrt sich leicht; nur schwer zu kämmen (Borx., Med., Petr.).

Saurer (Hep., Sil.), kalter Schweiß der Kopfhaut.

Heftige Kopfschmerzen zwingen das Kind vor Schmerz zu schreien; nach Haarschneiden und durch unterdrückten Schnupfen; schlimmer bei künstlichem Licht, beim Bücken und beim Lesen; besser durch Bedecken des Kopfes, **Essen** (Anac., Arg-n., Kali-bi.) und **Schlafen** (Gels., Glon., Pall., Phos.).

Kopfschmerzen bei Gelbsucht.

Untersuchungsergebnisse:

Schuppen.

Trockener, übelriechender, gelber Schorf und Abschuppungen von der Kopfhaut, besonders hinter den Ohren.

Unwillkürliches Zucken oder Nicken des Kopfes vorwärts und rückwärts beim Sprechen (sehr häufig gesehen).

Milchschorf.

Offene Fontanellen.

AUGEN

Verschwommene Sicht vor Kopfschmerzen (Iris, Kali-bi.).

Schwere der Lider (Caust., Gels., Rhus-t.) mit Schwierigkeiten, sie offen zu halten, besonders morgens beim Erwachen und bei Kopfschmerzen (ein mögliches Frühsymptom beim Horner-Syndrom oder bei raumfordernden Prozessen im Hirn).

Entzündung von **Bindehaut** (Arg-n., Euphr., Rhus-t., Sulph.), Hornhaut, **Episklera** (Kalm., Merc., Sep., Thuj.), Lidern und Sklera, besonders im Sommer und durch **katarrhalische Beschwerden von Nase und Hals** (Calc., Dulc., Euphr., Merc., Psor., Puls.); besser durch **kalte Anwendungen** (Arg-n., Bry., Caust., Puls.).

Brennende Schmerzen in den Augen mit Tränenfluss; bei Fieber und draußen in kalter, frischer Luft; besser durch Waschen der Augen mit kaltem Wasser.

Muskuläre Asthenopie (Alum., Gels., Nat-m., Onos.); Sehschwache beim Lesen oder Schreiben.

Dicke, gelbe, eitrige Absonderungen aus den Augen am Morgen, mit Verklebung der Lider nachts.

Untersuchungsergebnisse:

Herabhängende Augenlider (Caust., Gels., Spig.).

Schorfige, schuppige, **herpetische** oder **ekzematöse** Ausschläge oder Pusteln an den Lidrändern (Bry., Calc-sil.).

Krustige Ausschläge um die Augenbrauen.

Knotenbildung und verhärtete Lidknorpelschwellung nach wiederholten Gerstenkörnern.

Hypermetropie.

Trachom.

OHREN

Vermindertes Hörvermögen durch Tubenkatarrh.

Untersuchungsergebnisse:

Risse hinter den Ohren (Graph., Hep., Lyc., Sulph.).

Feuchte **herpetische** oder **bläschenartige** Ausschläge auf den Ohr läppchen und hinter den Ohren, erstrecken sich zum Gesicht (Caust., Puls.).

Vermehrtes, eitriges, übelriechendes Ohrenschmalz.

NASE

Ausgeprägter Geruchssinn, besonders für kochendes Essen.

Nasenbluten mit dunklem, geronnenem Blut (Carbo-veg., Lach., Puls., Sei.), besonders aus dem linken Nasenloch; durch Naseschnäuzen, bei Fieber, Kopfschmerzen oder durch **jeden noch so leichten Schlag gegen die Nase** (Cic., Hydr., See.).

Chronischer Nasenkatarrh und Sinusitis.

Chronischer wässriger Schnupfen bei Laryngitis und Durchfall.

Untersuchungsergebnisse:

Schmale Nase (Camph., Kali-bi., Lyc.) mit gelblichem oder bräunlichem Sattel über der Nase und einer glänzenden roten Nasenspitze.

Retronasaler Katarrh (Ferr-p., Kali-bi., Nat-c., Nat-m., Psor.).

Dicke, gelbliche oder grünliche (Hydr., Kali-br., Merc., Puls., Tub.), **übelriechende** Absonderung aus der Nase, die hart und trocken wird und schmerzhaft, große Krusten und Schuppen bildet, sogar in den hinteren Nasenhöhlen (Bar-c., Calc-ar., Elaps, Kali-c.).

Nasenpolypen.

Schorfige Nasenlöcher.

Schwellung der Nasenmuscheln im linken Nasenloch.

GESICHT

Kalter Gesichtsschweiß (Ars., Camph., Carbo-veg., Cina, Merc., Verat.), besonders bei Aufnahme warmer Speisen und Getränke und im Schlaf.

Untersuchungsergebnisse:

Krustige und **schuppige**, herpetische **Ausschläge** um die Nase und die

Trockene, rissige Lippen, besonders die Mitte der Unterlippe (Kali-c., Nux-v.).

Impetigo auf der Stirn (Ant-c., Med., Rhus-t.).

Warzen um den Mund (Psor.) und auf dem Kinn (Lyc., Thuj.).

Faltige Stirn (Cham., Hell., Lyc., Nux-v., Stram.).

Braune Flecken im Gesicht.

Kaubewegungen im Schlaf.

Sommersprossen.

Haarwachstum über der Oberlippe.

Blasses, alt aussehendes, abgemagertes Gesicht mit dunkelblauen Ringen unter den Augen.

Wächsernes Gesicht.

MUND

Schwierige Zahnung, mit früher und **sehr schnell fortschreitender Karies**, Zähne schwarz verfärbt (Calc., Calc-p., Fl-ac., Med., Phos.).

Speisen schmecken fad bei Schnupfen (Ant-c., Calc., Hep., Nat-m., Puls., Sulph.).

Zahnschmerzen nach Zahnfüllungen, nach Essen von Süßem, durch warme oder kalte Getränke, beim Einatmen kalter Luft und bei Berührung.

Zähne nachts fest zusammengebissen (Ther.).

Untersuchungsergebnisse:

Schlaffe Zunge mit Zahneindrücken und aufgerichteten Papillen.

Mundgeruch.

Schwammiges, geschwollenes, dunkelrotes, empfindliches Zahnfleisch, das leicht blutet, durch die geringste Berührung oder Druck.

Ulzerative Stomatitis.

HALS

Kann nichts Enges um den Hals haben, wegen eines Würgegefühls (Cench., Crot-c., Crot-h., Lach.).

Schmerzen in der **linken** Halsseite und **linken** Tonsillengegend (Crot-h., Lach.).

Verlangen, dauernd zu schlucken wegen Kloßgefühl im Hals, aber Schlucken bessert nicht.

Halsschmerzen beim Leer-Schlucken.

Untersuchungsergebnisse:

Chronische Pharyngitis, mit dunkelroter Verfärbung (Calc., Fl-ac., Lac-c., Merc., Nat-m., Sil.).

Schwellung und Vereiterung der Tonsillen, besonders der **linken** (Bar-c., Iod., Lach., Phos., Sulph.), mit Pustelbildung.

Struma, rechtsseitig.

Geschwollene, verhärtete Drüsen um den Hals.

MAGEN

Schluckauf, bitteres Aufstoßen und Schmerzen im Abdomen am **Morgen**, nach dem **Frühstück** (Plat.).

Übelkeit durch **Gerüche** (Colch., Dig.) und **morgens** vor dem **Frühstück** (Calc., Lyc., Nit-ac., Tub.), Besserung durch **Essen** (Kali-bi., Nat-c., Petr.).

Übelkeit beim **Autofahren** (Calc., Cocc., Mag-c., Petr.).

Durstlos im Hitzestadium, trotz trockenem Mund, aber extrem durstig bei **Frost** (Apis, Caps., Cina, Ign., Nat-m., Nux-v., Verat.).

Gesteigerter Appetit bei Kopfschmerzen.

Milchiges oder galliges Erbrechen einer bitteren und übelriechenden Flüssigkeit, beim Husten oder bei Fieber.

Seekrankheit.

Verschlimmerung: **Fette** (Ferr., Graph.) oder reichhaltige Speisen, **Früchte** (Ars., Bry.), **Milch** (Calc., Chin.), **Kartoffeln** (Alumn., Coloc.), Erdbeeren (Ant-c.).

Abneigung: Brot, Fett, **Fleisch** (Calc., Graph., Nux-v., Puls., Sil.), **Milch** (Aeth., Lac-d., Nat-c., Staph.), Kartoffeln, **rohes Gemüse** (Ant-c., Ant-t., Nat-n.).

Verlangen: Bittere Speisen und Getränke (Graph., Nat-m., Nux-v.), Schokolade, kalte Getränke, Nüsse, **Essiggurken** (Nat-c., Lach., Sulph.), gewürzte Speisen, Rettich, **Saures** (Cor-r., Hep., Verat.), Süßigkeiten, **Essig** (Cor-r., Hep., Nat-m.).

Untersuchungsergebnisse:

Endoskopie: Peptische Ulcera.

Verhärtung des Pylorus.

ABDOMEN

Ein nützliches Mittel bei **cholestatischer Gelbsucht** (Chin., Chion., Lyc.) **durch Crigler-Najjar-Syndrom, Dubin-Johnson-Syndrom, Gilbert Meulen-gracht-Syndrom und „Indian childhood cirrhosis“** [ICC, eine genetisch bedingte und durch Kupferbelastung hervorgerufene Form der Leberzirrhose] (Cupr., Iod., Phos., Sulph.).

Kann keine **enge Kleidung** um den **Bauch** ertragen (Arg-n., Calc., Crot-c., Lach., Lyc., Nux-v.).

Auftreibung des Abdomens nach **Essen** (Carbo-veg., Chin., Lyc., Sulph.) und bei **Verstopfung** (Bry., Iod., Lach.), besser durch Aufstoßen.

Neugeborenengelbsucht (Acon., Bry., Chin., Nat-s., Podo.).

Bauchschmerzen nach dem Aufstehen, beim Husten oder nach einer **Suppe** (Kali-c., Mag-c.); besser durch Wärme, Abgang von **Blähungen** (Carbo-veg., Tarent.) oder Aufstoßen und besser durch Anziehen der **Beine** (Bell., Bry., Coloc.).

Untersuchungsergebnisse:

Vergrößerte, harte, empfindliche Leber (Chin., Iod., Mag-m., Phos.).

Aszites mit aufgetriebenen Venen des Abdomens.

Schwellung der Leistendrüsen.

REKTUM

Durchfall: **Grünlich** bei Kleinkindern (Cham., Gamb., Merc.); schlimmer nach Zorn oder Schreck, bei Zahnung, durch **gekochte Milch** (Nux-m.), kalte Getränke; mit rapider Erschöpfung und Gelbsucht. Die durchfallartigen Stühle machen das Perineum und die Haut zwischen den Gesäßbacken wund.

Inaktivität des Rektums ohne Stuhldrang, die Stühle müssen **mechanisch entfernt** werden (Nux-m., Sil.) und sind wie Schafskot oder knotig und mit Schleim bedeckt.

Saure, **übelriechende** Blähungen (Asaf., Carbo-veg., Lach., Nat-s., Sulph.).

Wollüstiges Jucken in der Rektalregion durch Würmer.

• Untersuchungsergebnisse:

Rektumprolaps (Ferr., Nux-v., Podo., Ruta).

Blutige, stinkende Flüssigkeit aus dem Rektum.

Abgang von Bandwurmsegmenten und Madenwürmern im Stuhl.

Schweiß um Anus und Perineum vor und während Stuhlgang.

HARNWEGE

Chronische Nephritis (Lyc., Nat-m.).

Unwillkürliches Urinieren beim Lachen oder Husten.

Milchiger (Apis, Ph-ac.), scharfer, sauer riechender Urin; die ausgeschiedenen Mengen scheinen größer zu sein als die zuvor zugeführte Flüssigkeit.

Enuresis nocturna, besonders in der ersten Hälfte des Schlafes (Caust., Kreos., Ph-ac., Puls.), gewöhnlich, wenn das Kind vom Urinieren träumt (Kreos., Ph-ac., Sulph.); es ist sehr schwierig, das Kind aus dem Schlaf zu wecken.

Urin: Albumin ++, Gallefarbstoff, Harnsäurezylinder und Zucker.

Weißes, tonartiges oder rotes Sediment in der Windel oder Unterwäsche, das sehr schwierig herauszuwaschen ist.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Neigung, dauernd mit den Genitalien zu spielen und zu masturbieren.

Untersuchungsergebnisse:

Ödematöse Schwellung von Skrotum und Vorhaut (Apis, Graph., Rhus-t.).

Die Genitalien fühlen sich kalt an (Agn., Gels., Sulph.).

Geschwollener und verhärteter linker Hoden (Clem., Puls., Rhod., Spong.).

Paraphimose und Phimose.

WEIBLICHE GENITALIEN

• Untersuchungsergebnis:

- Reichliche, ätzende und stinkende, milchige (Calc., Kali-m., Puls.) oder grünlich-gelbe, eitrige Leukorrhoe bei kleinen Mädchen (Calc., Med., Merc., Puls.); besonders nach Urinieren, das wollüstiges Jucken (Calc., Kreos., Nit-ac.) in der Vaginalregion verursacht.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Kitzeln in Larynx und Trachea, aufgrund dessen das Kind ständig hustelt und sich räuspert.

Heiserkeit bei Schnupfen oder Fieber.

ATMUNG

Das Asthma beginnt **im Schlaf** (Kali-bi., Kali-c.) oder beim Erwachen am Morgen, Auswurf bessert.

Atemlos durch Husten, beim Hinlegen oder beim Erwachen am Morgen; **besser durch Vorwärtsbeugen des Kopfes** (Ars., Kali-bi., Kali-c., Lach., Spong.) oder durch **schnelles Gehen**.

Dyspnoe bei Kindern mit rheumatischen Herzerkrankungen.

Untersuchungsergebnis:

- Lautes Einatmen und langsames Ausatmen mit Keuchen.

HUSTEN

Dauernder, trockener, erschöpfender Husten, die ganze Nacht, beim Liegen; **muss sich im Bett aufsetzen** (Bry., Con., Phos., Puls.).

Der Husten ist schlimmer beim **Zähneputzen** (Carbo-veg., Coc-c., Staph.), beim Essen von etwas **Saurem** (Brom.), bei **nebligem** (Menth.) oder **stürmischem** Wetter (Rhod., Sil.), in Rückenlage oder beim Liegen auf der linken Seite; besser durch Auswurf, mit **erhöhtem Kopf** liegen (Carbo-veg., Chin.) oder auf der **rechten Seite** (Phos., Rumx.).

Der Husten scheint aus **dem Magen oder Bauch zu kommen** (Arn., Bry., Kali-c., Nux-v.).

Auswurf: **Milchig** (Ars., Sulph.) oder gelblich, übelriechend und salzig.

Kinder mit Erkältungsneigung beim kleinsten Wetterwechsel oder wenn sie aus einem warmen Raum in kalte Luft kommen und umgekehrt.

Plötzlicher, krampfartiger, lang anhaltender, anfallartiger und erstickender Husten durch Kitzeln im Larynx, bei dem in kurzen Abständen ein Anfall dem anderen folgt.

Untersuchungsergebnis:

- **Hält die Brust** mit beiden Händen beim Husten (Arn., Bry., Dros., Phos.).

BRUST

Verschleppte Pneumonie.

Dünn und flachbrüstig.

Untersuchungsergebnis:

- Rasseln von Schleim in der Brust beim Husten.

RÜCKEN

Kalter Schweiß in der Nacht.

Untersuchungsergebnis:

- Wirbelsäulenverkrümmung.

EXTREMITÄTEN

Unbeholfen (Apis, Bov., Calc., Hell.); lässt Dinge fallen oder stößt dagegen.

Reichlicher, kalter und ätzender Schweiß der Handflächen, Füße, Oberschenkel und zwischen den Zehen, die Haut wird rau (Petr.) und wund (Sanic.).

Leicht eintretende, spontane Gelenkluxationen (Calc.).

Neigung, die Füße unbedeckt zu lassen (Cham.).

Unwillkürliches Rucken und Zucken der Glieder im Schlaf.

Untersuchungsergebnisse:

Einschlagen der Daumen (Cupr., Merc.).

Abschuppung der Handflächen.

Ekzematöser Ausschlag in den Gelenkbeugen.

Flache, verhornte Warzen auf den Händen.

Entzündete und sehr empfindliche Hühneraugen.

Nägel: Brüchig, krümelig, deformiert, abblättern, verkrüppelt, dick.

Osteomyelitis.

SCHLAF

Schläft auf dem Bauch oder in Knie-Brust-Stellung (Calc-p., Lyc., Med., Tub.), Knie und Gesicht in das Kissen gepresst.

Saurer (Hep., Sil.), kalter Kopfschweiß.

Spricht laut im Schlaf (aufgrund von Unterdrücktwerden).

Kinder, die nachts in sehr tiefen Schlaf fallen, aus dem sie nur schwer zu wecken sind.

Träume vom Urinieren und Kämpfen mit Geistern.

Schläft beim Lesen ein (Nat-m.).

Schlaflosigkeit nachts durch Aufregung oder durch Furcht, mit Schläfrigkeit am Morgen.

FIEBER

Beschwerden durch: Zorn (Staph.) oder nach Essen (Lyc., Phos.).

Bei Fieber: Kalter und saurer (Hep, Sil) Kopfschweiß, die Glieder werden kalt (Stram.), Röte des Gesichts, Seufzen (Arn.).

Das Fieber wird besser nach Trinken von kaltem Wasser (Caust., Cupr., Op., Phos.).

Wärme ist unerträglich, trotz heftigen Schüttelfrostes mit eisiger Kälte des Körpers (Apis, Camph., Ipec., Puls., See.).

HAUT

Chronisches trockenes Ekzem, das auf keine Behandlung anspricht, mit Verdickung der Haut (Ant-c., Graph.) durch Kratzen.

Kälte der Haut mit innerem Brennen, das durch Kratzen schlimmer wird.

Reichlicher, kalter, stinkender Schweiß (Graph., Lyc., Nit-ac., Rhus-t.), der erschöpft, färbt das Laken gelb oder braun und ist schwierig auszuwaschen.

Abschuppung der Haut mit Rissen, besonders im Winter (Calc., Petr.).

Ausschläge sind schlimmer nach Fisch (Ars.) oder Milch (Calc.) und im Winter (Calc., Dulc., Hep., Psor., Rhus-t.).

Pilzinfektionen bei immungeschwächten Patienten (Thuj.).

Reichlicher Schweiß am Morgen beim Erwachen, bei und nach dem Essen (Carbo-veg., Kali-c., Merc., Nit-ac.).

Rezidivierende Tinea cruris und Tinea circinata an verschiedenen Körperteilen, die jeder antifungiziden Behandlung widersteht (Bac., Nat-ar., Tell.).

Neugeborenenengelbsucht mit gelblicher Verfärbung der Haut.

Untersuchungsergebnisse:

Ausgeprägter Haawuchs am Körper (Cortiso., Med.).

Hypopigmentierte Flecken oder weiße Flecken auf der Haut (Ars., Kali-c., Sil.).

Pityriasis versicolor (Bac., Lyc., Nat-ar., Tell.).

Windpocken.

Sommersprossen.

Verhornte oder flache, harte Warzen.

Intertrigo.

ALLGEMEINES

Beschwerden durch Nasswerden, Masturbation, unterdrückten Fußschweiß, unterdrückte Hautausschläge und **Impfung** (Vac., Zinc.).

Abneigung gegen Baden (Rhus-t.).

Das Kind ist überempfindlich gegen **allopathische Medikamente** und **Hochpotenzen** homöopathischer Mittel (Cham., Puls., Sulph.).

Fröstelig in extremem Ausmaß (Bar-c., Calc-ar., Kali-p., Sil.) mit Verschlimmerung durch den geringsten Luftzug und Erkältungsneigung.

Helle Kinder mit blauen Augen, roten oder schwarzen Haaren und **Abmagerung** (Calc., Iod., Nat-m., Sil.).

Vorgeschichte von rezidivierender Tonsillitis (Bar-c., Sil., Tub.) oder **Zystitis** (Hep., Lyc., Med., Puls., Tub.).

Knochenerweichung (Asaf., Calc., Merc., Sil.); nützlich bei Kindern mit Rachitis.

Schwäche und **Erschöpfung** durch die **geringste Anstrengung** (Ars., Calc., Crot-h., Nat-c., Rhus-t., Tub.), durch Laufen, durch Schweiß.

Reisekrankheit (Kinetose); können nicht mit Bus oder Auto reisen.

Schleimsekretion: Scharf, ätzend, wundmachend, übelriechend, eitrig, fadenziehend und zäh.

Plötzliche Ohnmacht im warmen Zimmer oder bei Fieber.

SILICEA TERRA

(Siliciumdioxid; Kieselerde; Bergkristall - Sil.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Liebevoll und **empfindsam** (Ars., Lyc, Sulph).

Körperlich ausgelaugt, gibt aber geistig nicht auf (Gels., Kali-p., Pic-ac geben auf). Ein ausgezeichnetes Mittel für Lernende.

Extrovertierte, wohlerzogene, **elegante** Kinder, die mit Phos, verwechselt werden können.

Intelligent (Ars., Lyc., Phos., Plat.), freundschaftlich mit jedem, hält aber am Ende doch an seiner Meinung fest.

Mangel an Bestimmtheit, Kinder ohne Rückgrat (Bar-c., Calc.).

Kinder, die sich schon früh für einen Beruf entscheiden; meist in Richtung Künstler, Arzt, Ingenieur, Rechtsanwalt, Mathematiker, Lehrer usw.

Emotionale und körperliche Störungen bei Jugendlichen, die man zwingt, den Beruf der Eltern zu übernehmen.

Überempfindlich, geistig und körperlich.

Frühreif.

Behütete Kinder (Calc).

KÖRPER

Elegant gekleidet; wie aus dem Ei gepellte Kinder (Lyc., Plat.).

Unbeholfen in ihren Handlungen.

Kinder mit heller Hautfarbe, blassem Gesicht und feiner trockener Haut; ihre Konstitution wirkt schwach und zart, die Muskeln sind eher schlaff.

Die Mutter hatte schwierige Wehen mit Atem- und Kreislaufproblemen unter der Geburt.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Antwortet **einsilbig** (Arg-n., Puls., Tub., Zinc.); nur ein leises „Ja“ oder „Nein“ oder antwortet flüsternd und spricht nur mit der Mutter, nicht direkt zum Arzt.

Erwartungsspannung mit Prüfungsangst (Aeth., Anac., Gels.), wie gut vorbereitet er auch immer sein mag.

Hellsichtigkeit (Lach., Med., Phos., Verat-v.).

Gewissenhaft bei Kleinigkeiten (Ars., Ign., Lyc., Puls., Sep., Staph., Sulph., Thuj.); nimmt es sehr genau mit der **Sauberkeit**; alle Dinge müssen an ihrem Platz sein (Ars., Ign., Thuj.).

Furcht vor dem Alleinsein, Katzen, Dunkelheit, Hunden, Blitz, **Nadeln** und **Injektionen** (Alum., Apis, Spig.), **Fremden** (Bar-c., Con., Cupr., Thuj.), **starkem Wind** (Cham., Rhod., Tarent.), Gewitter.

Fühlt sich **verlassen** und **ungeliebt**; Verlangen, magnetisiert zu werden (Calc., Phos.); sind schnell von etwas fasziniert.

Unentschlossen; kann sich einfach nicht entscheiden (Bar-c., Hell., Lyc., Op., Staph.).

Mangel an jedweder Initiative, insbesondere wenn es erforderlich ist, etwas Neues auszuführen (Agar., Aur., Calc., Lach.).

Mathematik ist ein Fach, das sie hassen und womit sie Schwierigkeiten haben (Nux-v., Plb.).

Stecken die Finger in den Mund und **kauen** dauernd an den **Nägeln** (Arum-t., Bar-c., Med., Nat-m., Verat.), besonders wenn sie nervös sind.

Empfindlich gegen die geringste Berührung; ist sehr **kitzelig** (Kali-c., Phos.).

Schüchterne und verlegene Kinder mit Mangel an Selbstvertrauen, besonders in der Schule (Calc-p., Carc., Phos., Puls.).

Beschwerden durch Erwartungsspannung (Arg-n., Gels., Lyc., Med., Puls.), schlechte Nachrichten (Calc., Gels., Ign.), Unterdrückung, Schreck (Acon., Gels., Lyc., Op.) und geistige Anstrengung (Lesen und Schreiben).

Ungeschickt durch Verlegenheit (Bar-c., Calc., Nat-m.), besonders bei Fremden.

Vorsichtige und umsichtige Kinder (Bar-c., Lyc., Puls.).

Die Kinder haben Schwierigkeiten, sich auf das Lernen zu konzentrieren; sind nicht fähig, ihre Aufmerksamkeit zu fixieren.

Geistige Verwirrung mit Trägheit und Vergesslichkeit beim Erwachen am Morgen; beim Sprechen, Lesen, Schreiben; besser nach Essen.

Dunkelheit verschlimmert.

Furcht zu fallen, besonders bei Abwärtsbewegung, z. B. beginnt das Kind zu weinen, wenn es in die Wiege gelegt wird.

Ermüdet durch die geringste geistige Anstrengung, mit Gedächtnisschwäche.

Ungeduldig und hastig, besonders beim Trinken.

Kleptomanie.

Liebt es zu tanzen, was bessert.

Aufsässige, dickköpfige und streitsüchtige Kinder, die zum ständigen Weinen und Jammern neigen.

Verschiebt alles auf den nächsten Tag.

Langsam im Sprechen- und Schreibenlernen (Caust.).

Auffahren wie im Schreck, besonders bei Berührung, durch das geringste Geräusch (Borx., Kali-c., Nat-c., Nux-v., Op., Phos.) oder im Schlaf, besonders bei Fieber.

Weint beim Getragenwerden (Cina); hasst es, getröstet zu werden (Ign., Nat-m., Sep., Syph.).

KOPF

Katarrhalische Kopfschmerzen, besonders über den **Stirnhöhlen** (Kali-bi.); durch Schnupfen, der durch Antihistaminika oder Dekongestiva unterdrückt wurde.

Chronische Kopfschmerzen, schlimmer durch jede Art geistiger Anstrengung (Aur., Calc., Nat-c., Pic-ac.); besser durch Nasenbluten (Bufo, Kali-bi., Meli., Psor.) und häufiges Wasserlassen (Acon., Gels., Ign., Meli.).

Kopfschmerzen über den Augen durch **Brilletragen** (Lyc.).

Die Kopfschmerzen sind **schlimmer** vor Gewitter, durch Wetterwechsel, **kaltes Wetter** (Bry, Dulc, Hep, Nux-v, Rhus-t), **Luftzug** (Bell., Chin., Kali-c., Merc., Nux-v., Sulph.) und Licht; besser durch **heiße Anwendungen** (Kali-ar., Mag-p.), den **Kopf einhüllen** (Arg-n., Puls.) und durch Liegen in einem dunklen Raum mit fest geschlossenen Augen.

Schmerzhafte Empfindlichkeit der Kopfhaut gegen den geringsten kalten Luftzug, die **kleinste Erschütterung** (Bell., Bry., Glon., Nit-ac.), gegen **das Bürsten der Haare** (Bry., Cina, Mez.) und sogar gegen das **Tragen eines Hutes** (Carbo-veg., Lach., Nit-ac., Valer.).

Die Kopfschmerzen sind begleitet von Nackenschmerzen und Nackensteifheit.

Heftige Kopfschmerzen, besonders bei Zahnung, periodisch jede Woche wiederkehrend (Lac-d., Phos., Sang., Sulph., Tub.).

Untersuchungsergebnisse:

Großer Kopf mit verzögertem Schluss der Fontanellen (Calc., Calc-p., Sep., Sulph.); **das Kind scheint unfähig, den Kopf aufrecht zu halten, er scheint nach hinten oder zu den Seiten gezogen zu werden** (Aeth., Calc-p., Gels., Op., Verat.).

Reichlicher, **kalter Schweiß** (Carbo-veg., Op., Verat.) mit saurem Geruch an Stirn und Hinterkopf, besonders im Schlaf.

Kephalhämatom.

Trockener, schorfiger ekzematöser Ausschlag auf der Kopfhaut, mit Abschuppung; schlimmer im Winter.

Frühes Ergrauen und Ausfallen der Haare.

Exostose.

Milchschorf.

Offene Fontanellen (Calc., Calc-p., Ipec.) bei Hydrozephalus (Apis, Calc., Lyc.).

Tuberkulöse Meningitis.

Talgretentionszysten (Atherome).

AUGEN

Entzündung der Augen nach Verletzung oder Eindringen eines Fremdkörpers (Acon., Arn., Calc., Coc-c., Puls.).

Sehschwäche; Buchstaben scheinen beim Lesen oder Schreiben ineinander zu fließen; muss dauernd seine Augen reiben, um besser zu sehen (Calc., Puls.).

Brennender Tränenfluss in kalter Luft (Calc-sil., Puls., Sep.).

Chronische pustuläre oder granuläre Konjunktivitis, besonders in kaltem, feuchtem Wetter (Dulc., Rhus-t.).

Sehschwäche bei Kopfschmerzen und durch unterdrückten Fußschweiß.

Untersuchungsergebnisse:

Hornhaut- und **Tränenfistel**, die bei Druck gelben, dicken Eiter absondert (Puls., Stann.).

Trübung der rechten Hornhaut (Am-c., Kali-c., Nit-ac.).

Wiederkehrende harte Gerstenkörner, besonders am inneren Augenwinkel (Lach., Lyc., Nat-m., Puls.).

Schwellung und **Entzündung der Tränendrüsen** (Calc., Nat-m., Puls.) und des Tränenganges, die zu **Strikturbildung** führt (Abrot., Nat-m., Puls., Rhus-t.), **besonders bei Neugeborenen**.

Eiterbeulen um die Augen.

Ekzematöse und pustuläre Ausschläge auf den Lidern.

Ausfall der Wimpern.

Hypermetropie [= Weitsichtigkeit],

Entropium oder Ektropium [= Lid nach innen oder außen gekehrt],

Iritis mit Hypopyon [= Eiter in der Vorderkammer] (Hep., Merc-c.).

Orbitale Zellulitis [= Entzündung der Augenhöhle].

Strabismus [= Schielen],

Lidknorpelschwellung oder zystische Knoten am Lidrand (Staph.).

Ulzeration der Hornhaut durch Narben.

OHREN

Chronische, **käsige** (Hep.), übelriechende, **eitrige** (Calc-s., Hep., Kali-bi., Merc., Puls.), dicke oder wässrige Absonderungen (Calc-s., Hep., Kali-bi., Kali-s., Puls.), besonders des **rechten** Ohres (Lyc., Merc., Nit-ac.).

Ohrenschmerzen durch **Wetterwechsel** (Mang., Rhus-t.) und bei feuchtem Wetter (Calc-p., Dulc., Nat-s.).

Chronische oder rezidivierende eitrige Otitis media (Calc-s., Hep., Kali-bi., Merc.), besonders nach Impfung.

Jucken in der Eustachischen Röhre, zwingt das Kind zum Husten oder Schlucken (Mang.).

Untersuchungsergebnisse:

Bohrt mit den Fingern in den Ohren (Arund, Cina, Psor.), besonders im Schlaf.

Katarrh der Eustachischen Röhre (Asar., Calc., Ferr-p., Kali-s., Puls.).

Cholesteatom.

Gerötetes Trommelfell bei Periostitis des Mastoids (Caps.).

Risse hinter den Ohren.

Verhärtung der Parotis bei Ohrinfektionen.

Feuchte Ausschläge hinter den Ohren, die zu Schuppenbildung führen (Bar-c., Graph., Lyc.).

Trommelfellperforation (Iod., Kali-bi., Merc., Merc-d.).

Ohrpolypen.

Reichliche Absonderung von dünnem Ohrenschmalz (Cham., Hep., Merc., Tell.).

Schwellung und Abszessbildung hinter den Ohren, drohende Karies des Mastoids (Aur., Caps., Nit-ac.).

Ulzeration des Gehörgangs (Calc., Lyc., Merc., Puls.).

NASE

Chronische Trockenheit (Am-c., Ambr., Caust.) und jeden Morgen **Verstopfung der Nase** (Calc., Hep., Kali-bi., Lyc., Nat-ar., Phos.), mit Fließschnupfen tagsüber.

Heuschnupfen mit Asthma (Ars., Iod., Nat-s., Nux-v.).

Hartnäckige Erkältungen mit Ohrbeschwerden (Dulc., Merc., Puls.).

Häufiges heftiges, anfallartiges Niesen ohne Schnupfen.

Verlust des Geruchssinns durch chronische Verstopfung der Nase (Hep., Kali-bi., Puls.).

Retronasaler Katarrh, der sich auf die Stirnhöhlen ausbreitet (Lyc., Merc.).

Untersuchungsergebnisse:

Bohrt ständig mit dem Finger in der Nase, bis es blutet (Arum-t., Cina).

Dicke, eitrige, gelblich-grüne (Hydr., Kali-bi., Merc., Puls., Sep., Tub.), übelriechende **Absonderungen** mit Schuppenbildung im rechten Nasenloch.

Karies der Nasenknochen (Asaf., Aur., Hecla).

Risse in den Nasenflügeln (Dulc., Merc.).

Leuchtend rote Nase (Phos.), besonders beim Essen und nach körperlicher Anstrengung.

GESICHT

Schmerzen in **Stirn- und Kieferhöhlen** (Bell., Kali-bi., Kali-i.).

Untersuchungsergebnisse:

Ekzematöse Ausschläge oder Knötchen in den Mundwinkeln (Mez., Nat-m.).

Schmieriges und wächsernes Gesicht (Nat-m., Rhus-t.).

Verhärtete **Risse** und **Fissuren** in den **Mundwinkeln** (Arum-t., Cund., Graph., Nit-ac.).

Acne rosacea, die unansehnliche Narben hinterlässt.

Zusammengepresster Kiefer.

Sommersprossen.

Entzündung, Verhärtung und Eiterung der Unterkieferdrüsen und Parotiden, führt zu Abszessbildung.

Gesichtsschweiß bei schlafenden Babys.

Anschwellen der Wange bei Zahnschmerzen.

MUND

Chronische Entzündung des Zahnfleisches, rot, von den **Zähnen abgelöst** (Carbo-veg., Kali-p., Merc.) und **blutet leicht** (Caust., Lach., Merc-c., Phos.), mit **weißem Zungenbelag** (Ant-c., Bry., Calc., Kali-bi., Merc., Nit-ac., Puls., Sulph.).

Trockenheit des Mundes mit Durstlosigkeit.

Langsame Zahnung mit vermehrtem Speichelfluss.

Geschmacklosigkeit der Speisen bei Schnupfen.

Zahnschmerzen schlimmer durch Kaltes und beim Kauen, besser durch warme Anwendungen.

Untersuchungsergebnisse:

Schaum vor dem Mund im **Schlaf** (Stram.) und bei **Konvulsionen** (Bufo, Caust., Cham., Cina, Cupr., Hyos., Op.).

Reichlicher Speichelfluss, zähflüssig.

Rezidivierende Eiterbeulen (Carbo-veg., Kali-chl., Kali-i., Lyc., Merc., Nux-v.) und blasige Ausschläge mit Abszess- und Fistelbildung des Zahnfleisches.

Zähne: Brechen leicht ab (Calc-f., Lach., Plb.), **mangelhafter Zahnschmelz** (Calc-f., Nat-m.).

Die Kinder stecken ständig die Finger in den Mund.

Stinkender Mundgeruch am Morgen.

Frühzeitige Karies der unteren Zähne, bei der besonders die **Wurzeln** betroffen sind (Am-c., Fl-ac., Merc., Thuj.).

Rote, verhärtete Zunge mit braunem Schleimbelag.

Wunder Mund bei gestillten Kindern.

HALS

Schmerzen in der **linken Tonsille** beim Schlucken (Arg-met, Lach, Merc-i-r).

Lähmung der Hirnnerven XI. (Nervus accessorius) und XII. (Nervus hypoglossus); deshalb kann das Kind feste Nahrung nur schwer schlucken; Flüssigkeit kann aufgenommen werden, die aber durch die Nase wieder herausläuft.

Untersuchungsergebnisse:

Gurgelnde Geräusche aus dem Hals beim Trinken (Ars., Cina, Cupr., Elaps, Hell., Hydr-ac., Laur.).

Chronische Entzündung und Ulzeration im Hals.

Kalter Abszess der Halsdrüsen, mit Neigung zu Fistelbildung (Cist.).

Verhärtete, schmerzhafte Schwellung der Halsdrüsen, die eine Perlschnur um den Hals bilden.

Rezidivierende Pharyngitis.

Rechtsseitige Struma.

Geschwollenes Zäpfchen.

Thyreoglossus-Zyste.

Tonsillen geschwollen, entzündet und eitrig.

Warzen am Hals.

MAGEN

Abneigung gegen den Anblick und Geruch von Speisen (Ars., Colch., Mosch., Sep.).

Lautes, unkontrollierbares **Aufstoßen** nach jeglichem **Essen** (Arg-n., Carbo- veg., Ferr., Nat-m., Puls., Sulph.).

Übelkeit nach Impfung.

Übelkeit und Erbrechen beim **Reisen** mit Bus oder Auto (Cocc., Mag-c., Sep.).

Sehr **langsame** und schwache Verdauung (Chin., Sulph., Tarent.), besonders von **Fleisch** (Ferr., Ferr-p., Ptel.) und **Nüssen** (Symph.).

Erbrechen von **geronnener Milch** (Aeth., Calc., Nat-m., Valer.) wenige Stunden nach dem Stillen.

Schmerzen in der epigastrischen Region, nach jeglichem Essen oder schnellem Herunterschlucken von Wasser; besser durch warme Anwendungen und durch Hinlegen mit angezogenen Beinen.

Schwacher Appetit, verabscheut Speisen.

Würgen bei Husten.

Erbrechen bei oder nach jeglichem Essen oder Trinken, besonders am Morgen.

Verschlimmerung: Bohnen, kalte Speisen, Honig, Erbsen.

Abneigung: Brüste, Käse, gekochte Speisen, **Fleisch** (Calc., Chin., Graph., Nux-v., Puls., Sep.) und **Muttermilch** (Calc-sil., Cina, Nat-sil.).

Verlangen: **Kalte Speisen** (Phos, Puls), **gebratene Eier** (Calc-p., Nat-p., Tub.), Eis, Eiscrème, unverdauliche Dinge wie **Kreide, Kalk und Sand** (Alum., Calc., Lach., Tarent.), Austern, rohe Speisen.

Untersuchungsergebnis:

ABDOMEN

Krampfende Schmerzen im Abdomen bei Verstopfung, nach Aufnahme von **Milch** (Bufo, Cupr., Lac-d., Mag-c., Mag-s.) oder Speisen; besser durch Abgehen von Blähungen oder durch **warme Anwendungen** (Cham., Mag-p., Nux-v.).

Chronische Appendizitis.

Chronische Hepatitis mit Schmerzhaftigkeit der Lebergegend, schlimmer beim Liegen auf der rechten Seite.

Eingeklemmte Blähungen bei Kindern nachts.

Untersuchungsergebnisse:

Aufgetrieben, hart und heiß, bei abgemagerten Gliedmaßen (Calc., Sulph.).

Ascites bei chronischem Durchfall.

Verhärtete und geschwollene Leber.

Paralytischer Ileus.

Eingeklemmter Leistenbruch (Bell., Nux-v., Op.).

Schwellung und Entzündung der Leistendrüsen, besonders auf der linken Seite.

Tabes mesenterica [Mesenteriallymphknotentuberkulose].

Geschwüre um den Nabel (Aesc., Calc., Rhus-t.).

Ultraschallbild: Leberabszess.

REKTUM

Schmerzloser Durchfall bei **abgemagerten** Kindern (Chin., Ferr., Hyos., Podo., Nat-m., Phos., Sulph., Tub.); durch schwierige Zahnung, **heißes Sommerwetter** (Bry., Chin., Crot-t., Dulc., Gamb., Podo.), nach Aufnahme von kalten Getränken oder Muttermilch und nach Impfung; besser durch **warmes Einhüllen des Kindes**.

Wechselhaftigkeit des Stuhls (Dulc., Podo., Puls., Sulph.); Verstopfung abwechselnd mit Durchfall.

Erfolgloser Drang und Anstrengung Stuhl auszuscheiden; wenn teilweise ausgeschieden, weicht er wieder zurück; der Stuhl muss mechanisch entfernt werden (Bry., Calc., Nat-m., Sep., Sulph.); sogar weiche Stühle sind schwierig auszuscheiden.

Weißer, kreideartige Stühle bei cholerischen Kindern.

Untersuchungsergebnisse:

Fissuren im Rektum (Cham., Graph., Nit-ac., Rat., Sep., Thuj.).

Spärliche, trockene, harte, **schafsdungartige** (Alum., Chel., Mag-m., Nat-m., Nit-ac., Op., Plb., Sulph.), übelriechende Stühle.

Abszess und Fistel des Rektums wechseln mit Brustbeschwerden (Berb., Calc-p.).

Abszess in der Perinealregion (Ant-c., Caust., Hep., Merc.).

Rektumprolaps mit Hervorsickern blutiger Feuchtigkeit aus dem Anus (Sulph.).

Stuhl: Madenwürmer, Spulwürmer und Bandwurmsegmente.

HARNWEGE

Unwillkürliches Tröpfeln von Urin nach dem Urinieren (Agar., Cann-i., Staph.) und beim Sitzen (Caust., Nat-m., Puls., Rhus-t., Sars.).

Reichliche Enuresis nocturna, durch Würmer (Cina).

Untersuchungsergebnisse:

Chronische, gelbe Absonderung aus der Urethra (Agn., Arg-met., Merc., Nit-ac., Puls., Sep., Thuj.).

Blasensteine.

Blasenpolypen (Calc., Teuer.).

Rötliches oder gelbliches Sediment in der Windel.

Urin: Eiter ++ und Zucker ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Jucken am Penis und Skrotum durch Schweißbildung (Calc., Thuj.).

Neigung zu masturbieren.

Untersuchungsergebnisse:

Verhärtung der Hoden, besonders des rechten (Aur., Nit-ac., Rhod.).

Phimose (Merc.).

Hydrozele (Puls., Rhod.).

WEIBLICHE GENITALIEN

Reichliche, ätzende, übelriechende (Carb-ac., Kali-ar., Nit-ac., Nux-v., Psor., Sep.), milchige Leukorrhoe, die die Umgebung wund macht (Borx., Graph., Lyc., Merc., Nit-ac., Sep.); besonders nach sauren, säurehaltigen Speisen oder Zitrusfrüchten.

Jucken im gesamten vaginalen Bereich aufgrund von Leukorrhoe.

Leukorrhoe, nachdem das Kind sich über kolikartige Schmerzen im Abdomen beklagt hat oder nach Urinieren (Kreos., Nat-c., Sep.).

Untersuchungsergebnisse:

Schweiß der Genitalregion.

Madenwürmer in der Vagina (Sabad., Sulph.).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Gefühl von Enge im Larynx während des Schlafes, welches das Kind mit Atemnot aufstehen lässt, mit Stridor (Lach., Nux-v., Spong.).

Heiserkeit mit Reizung im Larynx am Morgen, besonders durch kaltes, feuchtes Wetter (Carbo-veg., Dulc., Rumx., Sulph.).

Rauheit und Schmerz im Larynx in kalter Luft (Carbo-veg., Nat-m., Nux-v., Phos., Rumx., Sulph.).

ATMUNG

Asthmatische Atmung bei kaltem, feuchtem Wetter (Dulc., Med., Nat-s., Verat.) oder vor einem Gewitter (Sep., Syph.); durch **Luftzug**, **Staub** oder **Heu** (Carbo-veg., Dulc., Iod., Lach., Nat-s., Op.).

Atemnot nach Mahlzeiten, bei **Fieber** (Apis, Kali-c., Lach., Tub.) und beim **Husten** (Ant-t., Ars., Cupr., Dros., Ipec., Op.).

Atemlosigkeit durch die **geringste Anstrengung** (Nat-sil., Stann.), sogar durch Bewegung der oberen Gliedmaßen, durch Reden, schnelles Gehen oder **Laufen** (Cupr., Hyos., Phos.).

Schnarchen im Bett mit **Dyspnoe** beim Hinlegen (Ars., Carbo-veg., Kali-c., Tub.), besonders in Rückenlage, die das Atmen behindert, wacht deshalb auf.

Untersuchungsergebnis:

Beessende Atmung

HUSTEN

Husten durch **Wetterwechsel** (Dulc., Lach., Nit-ac., Phos., Rumx., Spong.), in **kalter Luft** (All-c., Ars., Hep., Kali-n., Nux-v., Rumx.) und bei stürmischem, feuchtem Wetter (Rhod., Sep., Sulph.).

Der Husten ist schlimmer durch Weinen, hastiges Essen und Trinken, kalte Getränke, Sprechen; **besser durch Aufnahme warmer Flüssigkeiten** (Ars., Lyc., Nux-v., Rhus-t.) und warmes Zudecken.

Tief klingender Husten (Kali-bi., Stram.), der von tief unten aus dem Hals zu kommen scheint, schlimmer beim Erwachen am Morgen, mit grünlichem Auswurf.

Auswurf: Reichlich und schaumig tagsüber, mit Blut und Schleim (Arn., Dros., Hep., Phos.) ODER übelriechend, reichlich, gelb und klumpig.

Husten durch Reizung und Kitzeln in Larynx und Trachea.

Untersuchungsergebnis:

- Das Gesicht des Kindes wird rot oder bläulich beim Husten.

BRUST

Verschleppte Pneumonie (Am-c., Lach., Lyc., Sulph.).

Beginnende Tuberkulose (Calc., Calc-p., Kali-c., Med., Puls., Tub.).

Zwerchfelllähmung (Cupr., Mosch.).

Verzögerte Genesung von Pneumonie.

Schwäche in der Brust beim Sprechen (Ph-ac., Stann., Sulph.).

Untersuchungsergebnisse:

Übelriechender Achselschweiß (Hep., Nit-ac., Petr., Sulph.).

Furunkel in der Achselregion mit Tendenz zum Eitern oder einen Abszess zu bilden (Hep., Merc., Nit-ac., Rhus-t.).

Karies der Schlüsselbeine.

Empyem.

RÜCKEN

• Untersuchungsergebnisse:

Schweiß der Hals- (Calc., Chin., Ph-ac., Sulph.) **und Lumbalregion nachts.**

Schwellung und **Verhärtung** der **Halsdrüsen** (Bar-c., Bar-m., Hell.).

Karies der Lumbalwirbel.

Wirbelsäulenverkrümmung, besonders der Dorsalregion, mit Schmerzen.

Schmerzhafte pustuläre Ausschläge oder Eiterbeulen auf dem Rücken, besonders der Halsregion, mit Jucken.

Spina bifida (Calc., Calc-s., Psor.).

EXTREMITÄTEN

Unbeholfen (Agar., Apis, Bov., Calc., Hell., Ipec.); lässt Dinge unabsichtlich fallen; stolpert beim Gehen durch Schwäche der Fußgelenke (Calc-p., Nat-c.).

Lernt spät laufen (Calc., Calc-p., Nat-m.).

Rheumatische Schmerzen der oberen Gliedmaßen; schlimmer nachts, durch Wetterwechsel und feuchtes Wetter (Dulc., Rhod., Rhus-t.); besser durch warmes Einhüllen (Ars., Graph., Mag-p.).

Krämpfe in Waden und Fußsohlen vom Gehen.

Nützlich bei verzögerter Heilung von Frakturen (Calc., Calc-p., Ruta., Symp.).

Wollüstiges Jucken der Fußsohlen, schlimmer durch Kratzen.

Schwäche und Zittern der oberen Gliedmaßen, besonders der Hände, beim Schreiben oder Halten von Gegenständen.

Untersuchungsergebnisse:

Abszess des Psoasmuskels (Cupr., Ph-ac., Syph.) und der Gelenke der Gliedmaßen.

Verformte Glieder (Calc., Calc-p.).

Rissige Hände und Risse zwischen den Zehen (Graph., Nat-m., Sars.) und an den Fingerspitzen (Aur-m., Graph., Petr.), besonders um die Nägel.

Reichlicher, übelriechender, ätzender Schweiß zwischen den Zehen (Bar-c., Kali-c., Lyc., Puls.), auf den Handflächen und an den Fußsohlen, macht die Haut rau und wund und greift sogar Kleidung und Schuhe an (Lyc., Nat-m., Sep.).

Exostosen (Calc-f., Dulc., Ruta) der Gelenke, besonders der Finger und Zehen.

Nägel: Atrophiert oder verkümmert (Carc., Caust., Graph., Nit-ac., Thuj.), brüchig, zerbröckelnd, deformiert, abblättern, rau, gespalten, dick, mit weißen Flecken darauf.

Synovitis ++ der Gelenke (Berb., Bry., Caust., Hep., Rhus-t., Sulph.).

Dünne, abgemagerte Finger (Lach., Thuj.).

Arthritische Knoten der Fingergelenke, die gebeugt bleiben.

Ödematöse, schwammige Schwellung der Kniegelenke und Füße.

Ganglion auf dem Handrücken oder dem Handgelenk (Calc., Mag-m., Thuj.).

Niedrägel und eingewachsene Zehennägel mit Ulzerationen.

Eisige Kälte von Händen und Füßen (Camph., Verat.).

Schlecht behandelte Nagelbettentzündung, mit Empfindlichkeit und Entzündung um und unter den Fingernägeln, nach Verletzung durch Glassplitter.

Eiterung am Oberarm nach Impfung.

Knochenerweichung, besonders des Femur.

Empfindliche, hornartige Hühneraugen, Verhärtungen und Warzen an den Händen und Fußsohlen (Calc., Nat-c., Nit-ac., Sep.).

SCHLAF

Das Kind schläft erst spät ein und hat einen leichten Schlaf.

Im Schlaf: Gliederzucken, Lachen (Hyos., Lyc., Stram., Sulph.), Klagen (Aur., Bar-c., Stram.), Aufschreien (Borx., Lyc., Puls., Tub.), Sprechen (manchmal laut) (Ambr., Lach., Psor.) und Weinen oder Wimmern.

Fühlt sich schläfrig nach Essen und beim Lesen (Carbo-veg., Gels., Nat-m.).

Schläft mit tiefliegendem Kopf (Nux-v., Spong.).

Häufiges Gähnen.

Krämpfe in Waden und Fußsohlen vom Gehen.

Nützlich bei verzögerter Heilung von Frakturen (Calc., Calc-p., Ruta., Symp.).

Wollüstiges Jucken der Fußsohlen, schlimmer durch Kratzen.

Schwäche und Zittern der oberen Gliedmaßen, besonders der Hände, beim Schreiben oder Halten von Gegenständen.

Untersuchungsergebnisse:

Abszess des Psoasmuskels (Cupr., Ph-ac., Syph.) und der Gelenke der Gliedmaßen.

Verformte Glieder (Calc., Calc-p.).

Rissige Hände und Risse zwischen den Zehen (Graph., Nat-m., Sars.) und an den Fingerspitzen (Aur-m., Graph., Petr.), besonders um die Nägel.

Reichlicher, übelriechender, ätzender Schweiß zwischen den Zehen (Bar-c., Kali-c., Lyc., Puls.), auf den Handflächen und an den Fußsohlen, macht die Haut rau und wund und greift sogar Kleidung und Schuhe an (Lyc., Nat-m., Sep.).

Exostosen (Calc-f., Dulc., Ruta) der Gelenke, besonders der Finger und Zehen.

Nägel: Atrophiert oder verkümmert (Carc., Caust., Graph., Nit-ac., Thuj.), brüchig, zerbröckelnd, deformiert, abblättern, rau, gespalten, dick, mit weißen Flecken darauf.

Synovitis ++ der Gelenke (Berb., Bry., Caust., Hep., Rhus-t., Sulph.).

Dünne, abgemagerte Finger (Lach., Thuj.).

Arthritische Knoten der Fingergelenke, die gebeugt bleiben.

Ödematöse, schwammige Schwellung der Kniegelenke und Füße.

Ganglion auf dem Handrücken oder dem Handgelenk (Calc., Mag-m., Thuj.).

Niedrägel und eingewachsene Zehennägel mit Ulzerationen.

Eisige Kälte von Händen und Füßen (Camph., Verat.).

Schlecht behandelte Nagelbettentzündung, mit Empfindlichkeit und Entzündung um und unter den Fingernägeln, nach Verletzung durch Glassplitter.

Eiterung am Oberarm nach Impfung.

Knochenerweichung, besonders des Femur.

Empfindliche, hornartige Hühneraugen, Verhärtungen und Warzen an den Händen und Fußsohlen (Calc., Nat-c., Nit-ac., Sep.).

SCHLAF

Das Kind schläft erst spät ein und hat einen leichten Schlaf.

Im Schlaf: Gliederzucken, Lachen (Hyos., Lyc., Stram., Sulph.), Klagen (Aur., Bar-c., Stram.), Aufschreien (Borx., Lyc., Puls., Tub.), Sprechen (manchmal laut) (Ambr., Lach., Psor.) und Weinen oder Wimmern.

Fühlt sich schläfrig nach Essen und beim Lesen (Carbo-veg., Gels., Nat-m.).

Schläft mit tief liegendem Kopf (Nux-v., Spong.).

Häufiges Gähnen.

Schreckliche Träume, von Geistern oder wilden Tieren verfolgt zu werden etc., mit erfolglosen Anstrengungen zu schreien (Am-m., Ars., Mag-m.); wacht dann mit einem Ruck auf, mit kaltem Schweiß.

Reichlicher, saurer Schweiß im Schlaf.

Sieht schreckliche Gesichter, kann deshalb nicht einschlafen.

Schläfrigkeit tagsüber, schlaflos nachts.

FIEBER

Abneigung sich aufzudecken bei Fieber (Nux-v., Psor., Puls., Rhus-t., Stram.).

Bei Fieber: Nasenbluten mit hellrotem Blut, ausgeprägter Durst und reichlicher Speichelfluss, zähflüssig (Bell., Carbo-veg., Nit-ac., Nux-v., Rhus-t., Sulph.).

Kontinuierliches Fieber bei Zahnung (Calc., Cham., Gels., Sulph., Verat-v.).

Hitzestadium beginnt im Schlaf (Calad., Mez., Op., Samb.).

Ruhelos, Klagen und Murmeln bei hohem Fieber (Bell., Coff., Ipec., Lach.).

HAUT

Ungesunde Haut (Alum-p., Borx., Graph., Psor.); Wunden heilen nur langsam und Ausschläge neigen zum Eitern (Calc., Graph., Hep., Nat-m., Sulph.).

Wollüstiges Jucken der Haut (Anac., Merc., Sulph.), schlimmer durch Kratzen; mit einem Brenngefühl.

Pickel jucken sehr (Ant-c., Graph., Sulph.).

Untersuchungsergebnisse:

Nützliches Mittel in Fällen von Schwielen, Keloiden, Muttermalen, Dellwarzen, Talgretentionszysten (Atherome) und Warzen (Ant-c., Med., Thuj.).

Warzen: Fleischig, hart, groß, gestielt (Caust., Lyc., Med., Nit-ac., Rhus-t., Staph., Thuj.), eitrig und empfindlich.

Trockene Gangrän (Ars., See.).

Dekubitusgeschwüre bei Babys (Calc., Cham., Med., Sep., Sulph.).

Trockene Skabies (Ars., Sep., Sulph.).

Fistelnde oder gangränöse Ulzera mit bläulich-schwarzer Basis und erhabenen, gezackten, glänzenden, schwammigen und verhärteten Rändern; neigen zur Vereiterung mit reichlich faulig-blutiger Absonderung.

Gänsehaut.

Intertrigo.

Feuchte, krustige Ausschläge oder Blasen auf der Haut.

Blassrote oder braune Naevi auf der Haut.

Blasse, wächserne Haut.

KONVULSIONEN

Beschwerden durch: Zahnung, **Schreck** (Calc., Hyos., Ign., Kali-br., Op., Stram., Zinc.), Verletzungen, Masturbation, **Neumond** (Bufo, Caust., Cupr., Kali-br.), starke Gerüche, **unterdrückten Fußschweiß** (Form.), **Impfung** (Carc., Cic., Thuj.), Würmer.

Während Konvulsionen: Klonisch-tonische Spasmen, Kälte der linken Körperhälfte (Calc-p., Ipec., Sulph.), Schaum vor dem Mund, Klagen, Murmeln, blasses Gesicht, Schreien, Bewusstlosigkeit, Schwindel.

Nach Konvulsionen: Schlaflos trotz extremer Erschöpfung (Cic., Kali-br.).

Schlimmer **nachts** im Schlaf (Bufo).

ALLGEMEINES

Knochen: Brüchigkeit, Karies und Erweichung (Calc., Merc., Sep.).

Beschwerden: Vor und bei **Gewitter** (Bry., Gels., Med., Nat-c., Phos., Rhod., Sep.), bei Wetterwechsel (Dulc., Rhus-t., Tub.), durch **kaltetes feuchtes Wetter** (Ars., Calc., Dulc., Nat-s., Rhod., Rhus-t., Tub.), kalten Wind, Nasswerden (Alum., Calc., Caust., Nat-s., Puls., Rhus-t.), unterdrückte Absonderungen oder Hautausschläge (Bry., Dulc., Ipec., Kali-bi., Nux-v., Stram., Sulph., Zinc.), unterdrückten Fußschweiß (Bar-c., Cupr., Sep., Thuj., Zinc.), Impfung (Mez., Sulph., Thuj., Zinc.), **Würmer** (Calc., Spig., Sulph.).

Fröstelig (Ars., Calc., Dulc., Hep., Kali-c., Nit-ac., Nux-v., Rhus-t.), mit Abneigung gegen und Verschlechterung durch kalte oder frische Luft.

Jede kleine Verletzung eitert und heilt sehr langsam (Hep., Lach., Nit-ac., Petr., Sulph.).

Harte, knotige, verhärtete Drüsen, mit Abmagerung (Bar-m., Iod., Tub.).

Verzögerte Entwicklung der **Knochen**; Entwicklungsverzögerung mit Zwergwuchs (Bar-c., Calc.).

Nützlich in Fällen von **komplizierten Frakturen** (Arn., Calc., Lach., Ruta); **Stoßverletzungen** (Arn., Bad., Hyper., Nat-s.), **Luxationen** (Agn., Arn., Calc., Ign., Lyc., Nat-c., Phos., Rhus-t.), langsames Zusammenwachsen der Knochen nach Brüchen, Verstauchung usw.

Warmer Schweiß bei **Konvulsionen** und **kalter Schweiß** bei **Durchfall** (Ars., Camph., Sec., Tab., Verat.).

Kinder, die überempfindlich sind gegen allopathische Medikamente, besonders Analgetika, Antibiotika und Expektorantien.

Reichlicher, übelriechender, erschöpfender Schweiß durch Schreck, die geringste Anstrengung und beim Essen.

Geschwüre mit Fisteln auf der Haut, um die Gelenke, Drüsen, Knochen usw.

Magere, schnell wachsende Kinder mit hängenden Schultern und feinen Haaren.

Rachitische Kinder, die trotz Heißhunger sehr schnell abmagern (Calc., Iod., Nat-m., Petr.).

Rachitis.

Nützlich in Fällen von Abszessen, bei denen Absorption von Eiter notwendig wird (Iod., Lach., Phos.).

Nützlich zur Austreibung von feinen Fremdkörpern wie Glassplittern usw. (Arn., Hep.).

SQUILLA MARITIMA

(Meerzwiebel - Squil.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Reibt beim Husten das Gesicht mit der Faust.

Reibt beim Aufwachen die Nase mit der Faust.

Virusbedingte Infektionen der oberen und unteren Atemwege.

Schnupfen schlimmer in frischer Luft; Schnupfen begleitet von Tränenfluss; reichliche Absonderungen tröpfelnd, wund machend und grünlich. Die Flüssigkeit kommt schwallartig, ist klebrig und zäh.

Heuschnupfen mit scharfen wässrigen Absonderungen aus der Nase, schlimmer frühmorgens, durch kalte Luft, kalte Getränke und kaltes Essen und mit juckenden Augen, Tränenfluss, Niesen und Speichelfluss.

Trockener, rauer Reizhusten, obwohl es den Anschein hat als ob viel rasselnder Schleim in der Brust sei. Spärlicher überaus zäher Auswurf.

Heftiger, krampfartiger, quälender Husten ausgelöst durch tiefes Einatmen oder durch Getränke. Niesen immer nach dem Husten. Husten schlimmer vor und nach Mitternacht, früh morgens, in warmen Räumen, durch kalte Getränke und durch Wetterwechsel von warm nach kalt. Husten Tag und Nacht konstant, besser nach reichlichem Auswurf von Schleim.

Husten mit Fieber und während des Fiebers schlimmer. Durch Husten gestörter Schlaf mit Aufwachen. Reichlicher Tränenfluss beim Husten. Lockerer Husten morgens, gegen Abend zunehmend trocken. Beim Husten Stechen unter den Rippen vor allem links.

Husten bei oder nach Masern.

Aus dem Husten können sich Atemprobleme und Asthma entwickeln, schlimmer durch Trinken, bei Fieber und beim Aufwachen.

Atemnot während Husten mit viel Rasseln im Kehlkopf und in der Luftröhre mit unwillkürlichem Harnabgang.

Pneumonie, Pneumonitis nach Masern. Bei Pneumonitis hackender Husten, reichlich Urin, hohes Fieber, schneller Puls und viel rasselnder Husten.

Lippe erwähnt, dass alle Speisen einen süßen Geschmack haben.

Verlangen nach sauren und kalten Getränken mit ausgeprägter Abneigung gegen Essen.

Unwillkürlicher Stuhl beim Husten oder Niesen.

Durchfall bei oder nach Masern.

Madenwürmer.

Schlüsselsymptom von Squil ist **übermäßiger Harnfluss**.

Plötzlicher Harndrang, muss sich beeilen, sonst geht Urin ab, unwillkürliches Urinieren nachts.

Unwillkürlicher Harnabgang beim Husten.

Bettnässen.

Brüchige, abgenutzte, gespaltene und abfallende Nägel.

Sehr frostig, schlimmer durch kalte Luft und kalte Getränke.

HERKUNFT

- Synonym: *Urginea maritima*. Kommt aus der Familie der Liliengewächse (Liliaceae).

STAPHISAGRIA

(Delphinium staphisagria, Rittersporn - Staph.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Feinsinnige Kinder mit **ästhetischem** Empfinden (Carc., Lach., Sil.).

Exzessives Masturbieren durch ein **Gefühl der Vernachlässigung** (Arg-n., Carc., Hyos.), der Verlassenheit oder durch ein Zerwürfnis in der Familie (Lach., Merc.).

Zu fügsam, **nachgiebige Resignation** (Carbo-veg., Carc., Puls., Sil.).

In der Schwangerschaft hatte die Mutter häufig Streitigkeiten, die Beziehung zerbrach, ihre Liebe wurde enttäuscht und sie reagierte darauf **empört mit unterdrücktem Zorn** (Ign., Lyc., Nat-m.).

Kinder sind rasch entrüstet (Aur-m-n., Carc., Ign., Kali-p., Puls.) und können sich über alles mögliche aufregen; selbst harmlos gemeinte Worte beleidigen sie (Calc., Carc., Nat-m.).

In gesunden Tagen schüchtern (Bufo, Carc., Sacch., Sil.), **freundlich, reserviert und lieb; bei Krankheit ärgerlich, klagend und launisch** (Lyc.).

Kinder, die allen gefallen wollen (Carc., Lyc., Puls., Sil.).

Unterdrückter Zorn nach emotionalen Verletzungen.

Es ist unter ihrer Würde, zu kämpfen wenn sie beleidigt werden (Aur., Coloc., Ign.).

KÖRPER

Darmkolik nach Entrüstung (Coloc.).

Bulimie durch emotionale Störungen (Ign., Nat-m.).

Chronische Tonsillitis jeden Winter (Bar-c., Dulc., Hep.).

Krustige, schuppige Ausschläge der Kopfhaut (Dulc., Graph., Merc., Nat-m., Psor., Sulph.); wenn die Schuppen abgehoben werden, sickert eine wässrige Absonderung heraus; darunter ist die Haut wund und extrem berührungsempfindlich.

Sehr empfindlich: Abdomen, Haut, Magen, Zähne, Wunden usw.

Die Zähne sind schon schlecht beim Hervorbrechen (Calc., Calc-f., Kreos.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Geistesabwesende Kinder mit ausgeprägter Neigung zu **Tagträumereien** (ein Fluchtmechanismus aufgrund emotionaler Verletzung).

Beschwerden durch: **Zorn mit Entrüstung** (Aur., Coloc., Nat-m., Nux-v.) und Demütigung, Erwartungsspannung, sehr frühen **sexuellen Missbrauch**

(Carc., Med., Nat-m., Plat., Sep.), Tod der Eltern, Peinlichkeit oder Scham, Emotionen, extreme elterliche Unterdrückung, Bestrafung und Ermahnungen.
Kann keine Wunden und nicht einen Tropfen oder die geringste Spur von Blut ansehen (Alum., Calc., Phos.).
Unbeholfene (Apis, Caps., Nat-m.) und stark **unfallgefährdete** Kinder (Arn., Caps., Med., Puls.).
Dreckige und unsaubere Kinder; neigen dazu, überall zu urinieren oder ihren Darm zu entleeren (Hyos., Sep., Sil., Sulph.).
 Furcht vor **Ärzten** (Arn., Ign., Phos., Stram.), Aufzügen, dem Bösen, **engen Plätzen** (Arg-n., Stram.) und **Gewittern** (Bry., Gels., Nat-m., Phos., Rhod.).
Bösartig (Anac., Ars., Stram., Tub.); Hass gegen diejenigen, die sie **beleidigt** haben (Aur., Lach., Nat-m., Nit-ac., Sulph.).
Aufsässige, unverschämte und schnippische Kinder (Ant-c., Cham., Cina, Tub.), die viele Wutanfälle haben; leicht zornig und gewalttätig werden durch den geringsten Widerspruch, schlagen andere oder verstümmeln sich selbst, werfen oder zerbrechen Gegenstände; mit rotem Gesicht und Atemnot.
Schwach in Mathematik (Calc., Kali-c., Nat-m., Psor.), besonders in Algebra und Rechnen.
Empfindlich gegen Schmerz (Cham, Coff, Hep, Sil) **und Maßregelungen** (Carc., Med., Nat-m., Sacch.), **weint dann sehr viel** (Carc., Plat.).
 Schweigsam und **unfähig zu antworten, wenn sie sich emotional verletzt fühlen** (Ign., Kali-c., Mag-m., Nat-m., Phos., Puls.).
 Neigung, sehr oft zu **masturbieren**, führt zu Schuldgefühlen (Bufo, Med.).
Schüchterne und **verlegene** Kinder (Bar-c., Calc., Coca., Puls.); meiden Gesellschaft.
 Zärtlich.
 Launisch; das Kind weist die Dinge zurück, um die es vorher gebeten hat.
 Lachen oder Weinen über Kleinigkeiten (Bufo, Ign., Op., Puls.).
 Liebt Weiß und Blau; will alle Spielsachen und Kleider nur in diesen zwei Farben haben (Nux-v., Sep., Sil., Tub.).
 Schlecht im Zeichnen und in Kunst.
 Neigt zum ständigen Nägelkauen.
 Nützlich in Fällen, in denen linkshändige Kinder gewaltsam gezwungen wurden, mit der rechten Hand zu schreiben.

KOPF

Kopfschmerzen nach **Zorn** (Bry., Cham., Lyc., Nux-v., Plat.) oder geistiger Anstrengung (Aur., Calc-p., Lyc., Nat-m., Ph-ac., Sil.).
Schmerzen am Hinterkopf nach **Verdauungsstörung** (Cann-s., Ipec.).
 Fleckiger Haarausfall, besonders am Hinterkopf und den Seiten, nach einem Todesfall in der Familie, Demütigung oder Enttäuschung.
 Untersuchungsergebnisse:
Schuppen (Carbn-s., Graph, Nat-m., Phos., Sulph.).
 Trockene, schuppige Ausschläge der Kopfhaut mit Schuppenbildung oder feuchtem, fauligem, fressendem Milchschorf, der sehr **berührungsempfindlich** ist (Hep., Nit-ac.).

Ekzematöse Ausschläge am Hinterkopf (Caust., Lyc., Petr., Sil., Sulph.) und hinter den Ohren, die stark jucken (Caust., Lyc., Petr., Sil., Sulph.).

Läuse (Carb-ac., Lyc., Merc., Psor.).

Kalter Schweiß der Stirn (Carbo-veg., Op., Verat.).

Vorzeitiges Ausfallen und Ergrauen der Haare.

AUGEN

Augenschmerzen nachts, beim **Lesen** (Con., Dulc., Nat-m., Ruta, Sep.) oder in künstlichem Licht; besser im Dunkeln.

Rezidivierende Gerstenkörner (Con., Graph., Psor., Sil.) nach Genuss von Schweinefleisch oder fettigen Speisen (Puls), nach Kummer oder auf systemischen Antibiotika-Missbrauch folgend.

Nützlich nach **Verletzungen des Augapfels** (Symph.) oder nach Operation an den Augen.

Ätzender Tränenfluss und Jucken der Lidränder (Calc., Nat-s., Puls., Sulph.) im Freien.

Katarrhalische Entzündung der Augen bei Schnupfen (All-c., Calc., Dulc., Euph., Merc., Puls.).

Das Kind kann morgens wegen Lidkrämpfen kaum die Augenlider öffnen.

Untersuchungsergebnisse:

Chalazion (Platan-oc., Thuj.).

Dunkle Ringe um die Augen (Cina).

Gerstenkörner auf dem linken Oberlid mit Neigung zur Verhärtung (Puls., Sil.).

Ekzematöse Ausschläge um die Augen.

Eversion der Lider (Ektropium).

Wimpern fallen aus.

Entzündung der Lidränder, Bindehaut und Iris.

Strabismus.

Eingesunkene Augen.

Lidknorpelschwellung (Ferr-py.).

OHREN

Vermindertes Hörvermögen durch Adenoide und vergrößerte Tonsillen (Kali-bi., Merc., Nit-ac.).

Ohrenschmerzen durch Luftzug.

Drohende Karies des Processus mastoideus.

Untersuchungsergebnisse:

Feuchte Ausschläge hinter und in den Ohren, die stark jucken (Hep., Mez., Nit-ac., Psor.).

Polypen.

NASE

Einseitige Verstopfung der Nase, besonders der Seite, auf der er liegt.

Plötzliche und heftige Niesanfälle und Schnupfen; dicke, gelbe Absonderung, die antrocknet und Krusten und Schuppen in den Nasenlöchern bildet (Lac-c., Stict.).

• Untersuchungsergebnisse:

Adenoide (Agra., Spig., Sulph., Thuj.).

Spitze Nase (Camph., Verat.).

Krusten und Schuppen in den Nasenlöchern.

Polypen.

Wundtheit und Empfindlichkeit von Septum und linkem Nasenloch.

GESICHT

Gesichtsschmerzen durch kariöse Zähne oder nach Zahnextraktion.

Untersuchungsergebnisse:

Rote Verfärbung des Gesichtes beim **Husten** (Bell., Cupr., Ipec., Kali-c., Sang.) oder bei **Zorn** (Bell., Bry., Cham., Nux-v.).

Acne rosacea und Acne vulgaris.

Ausschläge um den Mund, besonders der Oberlippe, die geschwollen und rissig ist.

Parotiden, Unterzungen-, Unterkiefer- und Unterkinnlymphknoten sind vergrößert und empfindlich.

Alter, spitzer, eingefallener, kränklicher Gesichtsausdruck.

MUND

Die Zähne sind **sehr empfindlich** (Ant-c., Lach., Merc., Sulph.), besonders gegen Berührung und kaltes Wasser; das Kind **kann keine Zahnbehandlung ertragen** (Ant-c., Fl-ac., Ign., Mag-c.).

Zahnschmerzen, besonders in den unteren rechten Molaren, erstreckt sich zum Ohr; schlimmer nach Mitternacht, **durch Kälte** in jeder Form (Calc., Caust., Cham., Merc.), im Freien, beim Kauen, beim Zähneputzen; besser durch äußere Wärme.

Zahnschmerzen in **schlechten Zähnen** (Ant-c., Cham., Kreos., Merc., Thuj.), nach Ärger oder nach Zahnbehandlungen.

Das Zahnfleisch blutet beim Bürsten.

Schwierige Zahnung.

Reichlicher Speichelfluss im Schlaf.

Untersuchungsergebnisse:

Frühe Karies der Zähne (Calc-f., Calc-p., Kreos., Mez., Plan.), besonders der Zahnseiten, sobald die Zähne hervorbrechen.

Abszess und Fistelbildung des Zahnfleischs.

Mundgeruch.

Ranula.

Wunde Aphthen mit gelblicher Basis bei Säuglingen und Kleinkindern.

Wundes, empfindliches, skorbutisches, schwammiges Zahnfleisch, neigt zu Eiterung bei verschorfenden Geschwüren; das Zahnfleisch blutet schnell und löst sich leicht von den Zähnen.

Die Zähne sind schwarz und bröckelig, mit dunklen Streifen.

HALS

Halsschmerzen erstrecken sich zum **linken** Ohr beim Schlucken (Nit-ac., Nux-v.).

Chronische Tonsillitis.

• Untersuchungsergebnisse:

Schwellung und Verhärtung der **Halsdrüsen** durch Ausschläge auf der Kopfhaut (Bar-c., Cist., Hell., Sil.).

Dauernde Neigung, beim Sprechen zu schlucken, besonders bei Aufregung. Struma.

Rote, geschwollene, verhärtete Tonsillen.

MAGEN

Heißhunger, auch wenn der Magen voll ist (Chinin-s., Iod., Phos.).

Magenschmerzen nach Kummer, Zorn oder Ärger; besser **durch nach vorn gebeugtes Sitzen** (Bry., Coloc., Nux-v.) oder **nach Abgang von Blähungen** (Hep., Tarent.).

Durstig nach Mittagsschlaf (Ther.).

Aufstoßen nach fettigen und reichlichen Speisen.

Häufiger Schluckauf nach Essen.

Heißhunger im nicht-fiebrigen Stadium; d. h. vor oder nach Fieber.

Langsame Verdauung.

Abneigung: Käse, **Milch** (Aeth., Calc., Cina, Lac-d., Nat-c.), **feste Speisen** (Bry., Ferr., Sulph.) und Wasser.

Verlangen: Brot, Schokolade, **Saftiges oder flüssige Speisen** (Suppe, kalte Milch) (Ant-t., Ars., Chin., Ph-ac., Verat.), vielerlei (Cina), **Fleisch** (muss Fleisch haben) (Arum-t., Mag-c., Sanic.), **rohe Zwiebeln** (All-c., Carc., Lac-del., Sabad., Thuj.), **Reis** (Alum., Phos.), Zucker und **Süßigkeiten** (Arg-n., Chin., Lyc., Phos.).

ABDOMEN

Hält sich ständig **den Bauch** (Carbo-veg., Merc., Sep.), aus einem Gefühl von Unbehaglichkeit.

Aufgetriebener Bauch mit vielen Blähungen und kneifenden Schmerzen bei Neugeborenen und Kleinkindern.

Eingeklemmte Blähungen mit Schmerzen in der hypogastrischen Region.

Bauchschmerzen nach Essen oder Trinken, nach Gefühl von Entrüstung oder nach dem Urinieren; besser durch Wärme und durch vorgebeugtes Sitzen.

Schweiß am Abdomen nachts.

Untersuchungsergebnisse:

Aufgetriebener Bauch.

Leistendrüsen vergrößert.

Palpable und empfindliche Leber.

Paralytischer Ileus.

REKTUM

Chronischer Durchfall (Ars., Bac., Calc., Graph., Phos.) bei Kindern nach dem Essen oder Trinken, besonders von kalten Getränken.

Durchfall nach **Schreck** (Arg-n., Cham., Coff., Gels., Nux-v., Op.) oder anderen Emotionen wie **Entrüstung** (Coloc., Gels., Ipec.), **Demütigung** (Aloe, Bry., Cham., Coloc.) oder **Ärger** (Calc-p., Cham., Coloc., Petr., Sulph.).

Abgang von heißen, **stinkenden Blähungen mit Geruch nach faulen Eiern** (Arn., Cham., Psor., Sulph.) beim Stuhlgang, was bessert.

Unwillkürlicher Abgang von Stuhl bei Blähungsabgang (Aloe, Nat-p., Podo.).
Verstopfung mit vergeblichem Stuhldrang und Anstrengung, sogar bei weichem Stuhl.

Jucken um den Anus nach Stuhlgang.

Untersuchungsergebnis:

- Der Stuhl enthält Spulwürmer.

HARNWEGE

Brennen in der Urethra, wenn nicht uriniert wird (Berb., Graph., Merc.).

Unwillkürliches Harnträufeln nach dem Urinieren (Agar., Cann-i., Sil.).

Schmerzen in Blase oder Urethra nach Katheterisierung oder Zystoskopie (Arn., Coloc., Hyper.).

Rezidivierende Infektionen des Harntraktes bei empfindlichen jungen Mädchen.

Dunkelroter und ätzender Urin.

Dysurie bei Stuhldrang.

Enuresis nocturna.

Untersuchungsergebnisse:

- Steine.
- Urin: Lymphozyten, Erythrozyten: ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Frühe sexuelle Reife, macht dem Kind seine Genitalien bewusst (Hyos., Lach., Merc., Phos.).

Extreme Empfindlichkeit (Kali-c., Ph-ac., Plat.) und Hitze der Genitalien, besonders des Skrotums und der Hoden.

Gesteigertes sexuelles Verlangen mit häufigen Erektionen (Hyos., Lach., Merc., Phos.), schon früh besteht Neigung zur Masturbation.

Orchitis, besonders auf der linken Seite (Puls., Rhod.), durch Mumps.

Nützlich nach jeder Art von Verletzung der Genitalien.

Untersuchungsergebnisse:

- Filzläuse (Cocc., Sabad.).
- Schweiß am Skrotum, besonders nachts (Ham., Mag-m., Sil.).

WEIBLICHE GENITALIEN

Extreme Empfindlichkeit der Vagina gegen Berührung (Lyss., Plat.).

Cremeartige Leukorrhoe mit intensivem Jucken des Genitale.

Gesteigertes sexuelles Verlangen bei jungen Mädchen, mit Neigung zu masturbieren, insbesondere in Verbindung mit Jucken der Genitalien.

Untersuchungsergebnis:

- Candida albicans ++ (Calad., Nit-ac., Sep.).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

- Einschnürung in der Halsgrube beim Schlucken, mit einer schwachen, leisen Stimme (Ant-t., Canth., Hep., Stann., Verat.); schlimmer nach Gefühlen wie Zorn.

• Untersuchungsergebnisse:

Näselnder Klang der Stimme (Caust., Kali-bi., Phos.) bei vergrößerten Tonsillen.

Glottisödem.

ATMUNG

Atemlosigkeit bei Erkältung, durch Kummer, Schmerz oder Demütigung, besser durch **Essen** (Graph., Iod., Spong.) und **Laufen** (Dros., Ferr., Nicc.).

Asthmatische Atmung mit Spasmen des Zwerchfells.

Untersuchungsergebnis:

- Langsame Einatmung.

HUSTEN

Das Kind greift beim Husten nach den Genitalien (Zinc.).

Husten nach Gefühlen wie **Zorn** und **Ärger** (Ant-t., Arn., Cham., Cina, Ign., Nat-m.).

Trockener Husten nach Trinken, lockerer Husten nach **Essen** (Bell., Nux-m., Phos., Sanic., Sil., Thuj.); bei Fieber.

Niesen und Husten gleichzeitig (Agar., Bell., Cina, Squil.).

Chronische, andauernde, häufige und lästige Hustenanfälle.

Husten nach Fleisch oder kalten Getränken, nach Zähneputzen.

Husten durch Kitzeln im Larynx und hinter dem Sternum; beginnt, sobald er sich nach dem Abendessen hinlegt.

Muss gelösten Auswurf herunterschlucken.

Anfallartiger Husten tagsüber, besonders von 9-12 Uhr.

BRUST

Schmerzen in der Brust durch kalte Getränke (Carbo-veg., Psor.).

Untersuchungsergebnisse:

Achseldrüsen vergrößert.

Röntgen: Primärkomplex.

RÜCKEN

Schwäche und Steifheit der Zervikalregion.

Untersuchungsergebnis:

- Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

Ungeschicklichkeit der Glieder (Agar., Apis, Bov., Calc., Hell., Ipec., Lach.).

Wachstumsschmerzen (Ferr-act., Guaj., Ph-ac.).

Schwache Knie, besser durch Sitzen (im Gegensatz zu Coloc., Mag-c., Phos.).

Krämpfe in Waden und Fußsohlen beim Erwachen, besonders auf der Seite, auf der er liegt.

Krämpfe in den Fingern, wobei die Daumen eingeschlagen sind.

Schmerzen in den Gelenken durch Liegen in der falschen Position.

Untersuchungsergebnisse:

Röte der rechten Hand (Agar., Apis, Bell., Fl-ac., Sulph.).

Brüchige Fingernägel

Gänsehaut, besonders an den Beinen (Aur., Calc., Rhod.).
Entzündete und empfindliche Hühneraugen.
Entzündung und Schwellung der Fingerknochen, der Füße und Fußgelenke.
Eingewachsene Zehennägel.
Reichlicher, kalter, stinkender Fußschweiß, besonders nachts.
Ruhelosigkeit der unteren Glieder durch Schmerzen und Wadenkrämpfe.
Empfindliche Sohlen und Fingerspitzen.
Eiterung des Hüftgelenks.

SCHLAF

Träume: Kämpfe (Ferr., Nat-m., Nux-v., Stram.), Streitereien, Alpträume usw.
Schläfrig nach einer Mahlzeit (Agar., Calc., Nux-v.).
Schlaflosigkeit nach Masturbation oder Demütigung (Calc., Coloc., Ign.).
Schläft mit nach vorne gebeugtem Kopf (Cic., Cupr., Stann.).
Das Kind erwacht, stößt alles fort und will, dass alle Weggehen; ruft oft nach der Mutter.
Zucken der Muskeln im Schlaf.
Ruheloser Schlaf durch Alpträume.
Den ganzen Tag schläfrig, schlaflos in der Nacht.
Heftiges Gähnen und Strecken, die Augen beginnen zu tränen.

FIEBER

Fieber durch Zorn (Bry., Cham., Sep.) mit Erweiterung der Blutgefäße (Chin., Hyos., Puls.).
Durstlosigkeit bei Fieber (Apis, Cina, Gels., Puls.).
Reichlicher, sehr stinkender, nach faulen Eiern riechender Schweiß, besonders nachts, was verschlimmert.
Will aufgedeckt sein bei Fieber, was bessert.

HAUT

Psoriasis (Aur-m-n., Lyc., Nat-m.) durch Kummer oder unterdrückten Zorn.
Heftiges Jucken, das schlimmer wird durch kalte Luft, nachts, beim Ausziehen (Cocc., Dros., Nat-s., Psor., Rumx.) und durch Kratzen; gefolgt von Brennen; das Jucken wechselt die Stelle beim Kratzen (Anac., Canth., Mez.).
Chronischer Hautausschlag, Neigung zu Urtikaria-Ausschlägen oder rezidivierenden Eiterbeulen.
Ausschläge in den Beugeseiten der Gelenke.
Empfindliche Haut, mit Neigung zu Entzündung und Eiterung.
Untersuchungsergebnisse:
Starre Haut (als wäre sie zu eng) (Asaf., Canth., Ph-ac., Sil.).
Atopisches Ekzem.
Lichen simplex chronicus.
Gestielte und filiforme Warzen; berührungsempfindlich und leicht blutend.
„Ringworm“ (Tinea, Flechte).
Gelbe, krustige, feuchte, ekzematöse Ausschläge, aus denen beim Kratzen Flüssigkeit sickert.

KONVULSIONEN

Beschwerden durch: **Zorn** bei Säuglingen (Cham., Cupr., Nux-v., Puls.).

Während Konvulsionen: **Eingeschlagene Daumen** (Bufo, Caust., Cic., Lach., Stann.), Konvulsionen in den Fingern beim Strecken, Schaum vor dem Mund und Bewusstlosigkeit.

ALLGEMEINES

Beschwerden durch **Masturbation** (Calc., Gels., Ph-ac., Sep., Thuj.), Überanstrengung der Muskeln und Sehnen, unterdrückte Hautausschläge (besonders Skabies) und **Operationen** (Arn., Bell-p., Calen., Hyper., Stront-c.).

Chorea nach Kummer oder durch Bestrafung (Agar., Caust., Ign., Nat-m.).

Sichtbares **Zittern** des Körpers **durch Zorn oder emotionale Erregtheit** (Cocc., Plb., Psor., Zinc.).

Abneigung zu baden.

Abgemagerte und anämische Kinder.

Geschichte von rezidivierender Zystitis, Gerstenkörnern oder Lidknorpelschwellungen.

Verhärtung und Schwellung der Drüsen bei abgemagerten Kindern.

Extreme Schmerzempfindlichkeit.

Nützlich in Fällen von Karies und Erweichung der Knochen, Rachitis und Skorbut.

Langsame Heilung der Knochen nach Brüchen; sehr nützlich bei komplizierten Brüchen.

Erkältungsneigung.

Nützlich bei Erschütterung, Verrenkung, Schnitten, Verletzungen durch scharfe Instrumente, Stichwunden, Splitterwunden, Risswunden usw., die leicht bluten und sehr langsam heilen, mit ungesunder Eiterung.

Schlimmer bei feuchtem und besser bei trockenem Wetter.

HERKUNFT

Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae).

STRAMONIUM

(Stechapfel - Stram.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Geistig zurückgebliebene Kinder oder Kinder mit einer angeborenen Missbildung, deren Mutter emotional oder körperlich verletzt wurde, z. B. durch Enttäuschung in der Liebe, Schreck, Kummer, Misshandlung in der Ehe, Vorwürfe usw. (Bufo, Carc., Hyos., Kali-br., Op., Ph-ac.).
Anklammern und unterwürfiges Verhalten gegenüber den Eltern, in erster Linie aus Unsicherheit oder aus Angst, sie zu verlieren.

KÖRPER

Unwillkürliche Bewegungen (Crot-c., Cupr., Hell., Merc., Zinc.) wie Tremor, Chorea und Zuckungen durch Schreck oder Tadel.
Bekommt leicht Fieberkrämpfe.
Neurologische Beschwerden nach starken Emotionen wie Schreck oder Demütigung oder durch unterdrückte Ohrabsonderung.
Lähmungen einer Körperhälfte, mit Konvulsionen der anderen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Verhält sich komisch und macht ständig **alberne Gesten** (Bell., Hyos., Verat.).
Abneigung gegen Wasser (Bell., Hyos., Lyss., Phos.); sogar das Geräusch laufenden Wassers ängstigt ihn.
Verhaltensstörungen (Anac., Cham., Cina, Hyos., Med., Tarent., Tub., Verat.)
durch Missbrauch (Anac., Carc., Lyss., Med.), **Schreck** (Carc., Op.), **Vorwürfe** (Ambr., Op., Plat., Staph.) und **Gewalt** (Aur., Bry., Carc.).
Das Kind ist sehr **aktiv** und **gut gelaunt**, möchte ständig **springen, klettern und tanzen** (Bell., Cic., Hyos., Tarent.).
Die Kinder neigen dazu, **im Zorn** andere zu **beißen, kratzen** oder zu **treten** (Bell., Cham., Tub.), an den **Haaren zu ziehen** (Bell., Lil-t., Tarent., Tub.), **mit den Füßen zu stampfen** (Verat.) und zu **schlagen** (Cham., Cina, Cur., Tub.).
Destruktiv (Carc., Cupr., Hyos., Tub.); Verlangen, Dinge zu zerbrechen und Kleidung und Kissen zu zerreißen.
Ungehorsame, sture, böartige, streitsüchtige und beleidigende Kinder (Cham., Hyos., Nux-v., Tub., Verat.).
Furcht vor Geistern und Tieren, besonders **schwarzen Hunden** (Bell.) und Spinnen (Arg-n., Cupr., Nat-m., Phos., Sep., Tarent.).

Ängstlich nachts, besonders durch die **Dunkelheit; braucht Gesellschaft und Licht** (Arg-n., Ars., Hep., Lyc., Phos.).

Redseligkeit und Delirium bei Fieber (Bapt., Lach., Sulph.).

Macht viele Fehler beim Sprechen oder Schreiben (Cham., Sil.); vergisst oder vertauscht Buchstaben oder Wörter; nennt Dinge beim falschen Namen; schlechte Handschrift, schreibt unklar (Lyc.).

Weigert sich, Medizin einzunehmen (Arn., Hyos., Lach.).

Schweigsames Kind (Cocc., Gels., Op., Puls., Verat.); sitzt steif da, in tiefe Gedanken versunken, ohne Bewegung.

Heftiger Zorn, der meist ganz plötzlich ausbricht, abwechselnd mit Heiterkeit und spielerischer Laune (Aur., Coff., Ign.).

Angst und Furcht in der Gegenwart von Fremden; vermeidet Blickkontakt.

Abneigung gegen die Farbe Schwarz.

Errötet leicht.

Launische Kinder; brauchen dauernd Abwechslung.

Das Kind weigert sich zu antworten oder antwortet irrelevant und unrichtig.

Kinder, die gern prahlen und unwahre Geschichten erfinden.

Verträumte Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich auf das Lernen zu konzentrieren.

Furcht zu fallen oder verletzt zu werden; sie sind deshalb extrem vorsichtig und vorausschauend.

Ungenauere Einschätzung von Entfernungen, stößt daher mit Dingen zusammen.

Liebt es, extravagante Geschichten zu lesen.

Krampfartiges und lautes Lachen über Kleinigkeiten (Bell., Cann-i., Hyos., Mosch.).

Schreit häufig laut auf, besonders vor (Cic, Cupr) und bei Konvulsionen (Lyc., Op.), bei Fieber (Bell., Caps.) und im Schlaf (Borx., Lyc., Puls., Zinc.).

KOPF

Basale Meningitis (Bell., Hell., Op.) und Enzephalitis durch **unterdrückte Otor-rhoe**.

Hochroter Kopf (Blutandrang) bei **Wutanfällen** (Bell., Op.).

Heftige Kopfschmerzen (Bell., Cact., Glon., Meli.), besonders in der Hinterkopfregeion, mit Tränenfluss und Erbrechen; schlimmer in der Sonne, durch Erschütterung, auf helle Gegenstände schauen; besser durch **kalte Anwendungen** (Aloe, Psor., Spig.) und Sitzen in einem **dunklen Raum** (Bell., Lac-d., Sang., Sil.).

Untersuchungsergebnisse:

Bohrt den Kopf in das Kissen (Apis, Bell., Hell., Tub.).

Kann den Kopf nicht aufrecht halten, scheint ständig seitwärts oder rückwärts zu fallen.

CT: Hirnblutung.

Hydrozephalus.

Erhöhter intrakranieller Druck.

Unwillkürliche Kopfbewegungen (Agar., Cann-i., Caust., Hell., Zinc.); Zucken, krampfartiges Anheben des Kopfes vom Kissen, Rollen, Werfen des Kopfes nach hinten.

Kernig-Zeichen +.

Stirnrunzeln bei Kopfschmerzen und in Fällen von Hirnschäden.

AUGEN

Lähmung des **Sehnervs** (Bell., Gels., Kali-i., Phos., Puls., Sil.).

Photophobie, besonders bei Zorn (Acon., Bell., Hyos.).

Strabismus nach Schreck (Cic., Nux-m.).

Untersuchungsergebnisse:

Augen halb offen im Schlaf (Bell., Cocc., Lyc.) und **im Delirium** (Crot-h.)

Starrende, glänzende, weit geöffnete Augen bei Kopfschmerzen (Bell., Glon, Spig.).

Wilder Blick, (Bell., Lyss., Nux-v.), Augen scheinen hervorzutreten (Bell., Ferr-i., Nat-m.).

Dauerndes Rollen oder pendelartiges Schwingen der Augen von einer Seite zur anderen.

Kortikal bedingte Blindheit.

Kurzsichtig.

Pupillen erweitert, besonders nach Ermahnung oder Tadel.

Schielen bei Hirnerkrankungen.

Zucken der Oberlider.

OHREN

Vermindertes Hörvermögen mit Ohrgeräuschen (Caust., Lyc., Merc., Sil.), als ob er eine Art Musik oder **Singen** hört (Chin., Kali-c.).

Karies des Processus mastoideus greift auf die Meningen über.

Beschwerden aufgrund von Unterdrückung der Ohrabsonderungen (Carbo-veg., Merc.).

NASE

Anfallartiges Niesen.

Verstopfung des linken Nasenloches.

Untersuchungsergebnisse:

Nasenbluten mit **schwarzem, geronnenem Blut** (Cham., Chin., Ipec., Rhus-t.).

Falten von der Nase zu den Mundwinkeln (Calc., Staph., Sulph.).

Nasenflügel sind blass.

GESICHT

• Untersuchungsergebnisse:

Bläuliche Verfärbung des Gesichtes bei **Dyspnoe** (Arg-n., Brom., Bry., Op.).

Kaubewegungen (Bry., Calc., Hell., Lyc., Phos., Verat-v.).

Kalter Gesichtsschweiß (Carbo-veg., Cina, Merc-c., Verat-v.).

Markante **Linea nasalis** (Aeth., Ant-t., Cina, Ipec., Phos., Tarent.).

Zittern der **Lippen** beim **Sprechen** (Agar., Bell., Gels., Zinc.).

Leerer (Camph, Hell, Phos) und **erschreckter** (Acon., Bapt.) Ausdruck.

Herunterfallender Kiefer.

Erysipel einer Gesichtshälfte und der Nase.

Heißes, rotes und geschwollenes Gesicht mit kalten Gliedern.

Schwellung und Entzündung von Unterkieferdrüsen und Parotiden, besonders der rechten.

Schwellung, Ulzeration und Risse in den Lippen, besonders der Unterlippe, durch dauerndes Zupfen und Schälen.

MUND

Schwierige Zahnung (Borx., Calc., Cham., Mag-m., Nux-v., Sil., Sulph.).

Sprechen fällt schwer durch **Chorea** (Agar., Bufo, Caust., Cupr., Mag-p.).

Zähneknirschen im Schlaf (Bac., Bell., Cina, Tub.) **und im Zorn** (Hyos., Kali-c., Lyc.).

Aphasie bei Zungenlähmung.

Ausgeprägtes Stottern (Bell., Caust., Merc.); muss sich lange anstrengen, bevor er auch nur ein einziges Wort äußern kann.

Untersuchungsergebnisse:

Zungenbiss bei Konvulsionen (Art-v., Bufo, Cic., Cupr., Oena., Op.).

Verlangen, ständig die **Zähne zusammenzubeißen** (Bell., Cic., Hyos., Merc.).

Spitze (Chel., Lach., Plb.), **rissige** (Ars-i., Fl-ac., Hyos., Nit-ac., Phos., Rhus-t.) Zunge **mit Zahneindrücken** (Merc., Rhus-t., Sep.), weiß belegt, mit aufrechten roten Papillen, erscheint steif, zittert beim Herausstrecken.

Offener Mund mit Speichelfluss.

Blasse Verfärbung um den Mund.

Dunkle schmutzige Plaques auf den Zähnen.

HALS

Würgen beim **Trinken** (Hyos., Nat-m.) durch **Schwierigkeiten beim Schlucken, besonders von Flüssigkeiten** (Brom., Coc-c., Hyos., Ign., Lach.), durch **Lähmung** oder **Spasmen des Ösophagus** (Alum., Ars., Caust., Gels., Op., Plb.).

Trockenheit des Halses, nicht besser durch Trinken, häufiges Räuspern und Aus-husten.

Untersuchungsergebnisse:

Struma.

Sichtbares Pulsieren der Karotiden.

MAGEN

Unstillbarer Durst auf große Mengen Wasser bei Fieber (Bry., Eup-per.) **und beim Erwachen am Morgen** (Acon., Mag-m., Nat-m.).

Heftiger Schluckauf mit Konvulsionen (Cic., Cupr., Hyos., Nat-m.).

Erbrechen von grüner Galle beim Husten und durch die geringste Anstrengung.

Fauliges Aufstoßen am Abend.

Intensives Würgen, sogar nach dem Erbrechen.

Heißhunger bei Durchfall.

Erbrechen bei Fieber und durch Einwirkung von hellem Licht.

Abneigung: **Kalte Getränke** (Lyc., Sabad., Verat.), **Muttermilch** (Borx., Calc-sil., Cina, Sil.) und **Wasser** (Hyos., Nux-v., Staph.).

Verlangen: Buttermilch, **saure Speisen** (Acon., Cor-r., Hep., Verat.), **Spinat** (Calc-p., Lac-leo., Symph.) und Essig.

ABDOMEN

Krampfende, kniefende Schmerzen im Abdomen vor Stuhlgang (Aloe, Arg-n., Chin., Coloc., Mag-c., Podo., Sulph.); besser durch nach vorne Beugen.
Entzündung des **Blinddarms** (Apis, Bell., Bry., Lach., Merc., Rhus-t.).

Untersuchungsergebnisse:

Schwellung der Leistendrüsen.
Tympantische Auftreibung des Abdomens.

REKTUM

Cholera infantum.

Durchfall bei Kindern, wenn sie auf hell leuchtende Dinge sehen oder wenn sie im Dunkeln alleine sind.

Abgang von stinkenden Blähungen.

Stuhlverhalt, mit erfolglosem Drang und Anstrengung.

Wässrige, schwarze, eitrige Stühle; unwillkürlich beim Urinieren entleert.

HARNWEGE

Enuresis nocturna, ausgiebig, durch emotionale Störungen wie Schreck (Op.) oder Maßregelung (Staph.).

Unwillkürliches Tröpfeln von Urin nach Stuhlgang oder Urinieren (Arg-n., Ars., Hyos., Mur-ac., Phos., Zinc.).

Harnverhalt bei Epilepsie und Fieber (Ferr-p., Op.).

Akute Glomerulonephritis.

Reichlicher und häufiger Urinfluss bei Fieber oder nach Delirium; sonst uriniert er selten.

Verzögerter Urinfluss; muss warten und lange Zeit pressen, damit der Urin fließt; der Urin hört auf zu fließen, wenn er zu atmen aufhört.

Untersuchungsergebnisse:

Krampfartige Urethrastriktor (Canth., Nit-ac.).
Urin: Albumin++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Das Kind berührt dauernd seine Genitalien und masturbiert, sogar während Konvulsionen (Bufo, Calc., Lach., Plat.).

Untersuchungsergebnis:

- Hodenhochstand.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

• Untersuchungsergebnisse:

- Glottisödem.

Laryngismus stridulus [Stimmritzenkrampf].

Lähmung des Larynx.

Veränderte Stimme: Bekommt einen piepsigen oder sehr heiseren, undeutlichen Klang.

ATMUNG

Hörbares Schleimrasseln in der Brust während des Schlafes, schlimmer vor Mitternacht.

Atemlosigkeit beim Sprechen, besser im Freien.

Behinderte, keuchende Atmung durch Spasmen der Brust.

Asthma bei nervösen Kindern, die in tiefen Schlummer fallen bei einem akuten Anfall, mit Schnarchen.

Untersuchungsergebnisse:

Bauchatmung (Ant-t., Ferr., Phos., Spong.).

Stöhnende (Ant-t, Op), **seufzende** und **röchelnde** (Am-c., Op.) Atmung.

Langsame Einatmung und gewaltsame, ausgestoßene, schnelle Ausatmung.

HUSTEN

Asthmatischer, **rasselnder** Husten am Morgen (Agar.).

Chronischer, tiefer, **bellender** (Bell., Dros., Hep., Spong.), **erschöpfender Husten Tag und Nacht** (Cupr., Kali-c., Spong., Stann.).

Husten durch kalte Getränke, **Schreck** (Acon., Arg-n., Bell., Cina, Ign., Rhus-t.), Wind oder kalte Luft und beim Schauen auf helle oder leuchtende Dinge.

Das Gesicht wird **dunkelrot** (Bar-c., Cor-r., Kali-c., Squil.), mit Hochzucken der Beine beim Husten.

Anfallsweiser, trockener Husten durch Berührung am Larynx oder beim Sprechen oder Singen.

BRUST

Chronische, allergische Bronchitis bei **immungeschwächten Kindern** (Kali-c., Tub.).

Pneumonie nach Typhus (Ant-t., Bry., Op., Phos.).

Untersuchungsergebnisse:

Infiltration des **rechten** Lungenunterlappens (Brom., Bry., Kali-c., Lyc., Merc., Sang.).

Lungenabszess.

Konvulsionen der Brustmuskulatur.

HERZ UND KREISLAUF

Heftiges Herzklopfen in der Brust nach Anstrengung, **Schreck** (Acon., Aur-m., Coff., Op.) oder beim **Husten** (Calc., Nat-m., Puls., Sulph.).

Untersuchungsergebnisse:

Herzgeräusche.

Puls: Langsam, weich, schwach, fast nicht tastbar ODER voll, hart, schnell.

RÜCKEN

Wirbelsäule empfindlich gegen den **geringsten Druck** (Chinin-s., Zinc.).

Intensives Kältegefühl, das sich den Rücken hinunter zu erstrecken scheint.

Untersuchungsergebnisse:

Opisthotonus (Bell., Cic., Cupr., Hyos., Nux-v., Op., Stry.).

Verkrampfter, steifer Nacken; kann den Kopf nicht nach hinten beugen.

EXTREMITÄTEN

Unbeholfen; lässt Dinge fallen oder verfehlt eine Stufe, wenn er die Treppe hinunter geht; stolpert dann oft und fällt (Agar., Apis, Bov., Nat-m.).

Chorea durch Furcht (Calc., Caust., Ign., Kali-br., Laur., Nat-m., Zinc.), Ängstlichkeit oder nach übermäßigem Tanzen (Bell., Hyos.).

Rheumatische Beschwerden oder Eiterung mit intensiven Schmerzen und Empfindlichkeit des Hüftgelenks (Calc., Calc-p., Kali-c., Nat-s., Sil., Tub.), besonders auf der linken Seite (Nat-s.).

Kalter Schweiß der Füße und Beine.

Schmerzlose Lähmung der Beine nach Spasmen.

Zittern der Füße oder der Hände, wenn er etwas hält.

Untersuchungsergebnisse:

Eiterbeulen an den Füßen (Calc., Led., Lyc., Sil.).

Unwillkürliches Rucken oder Zucken eines Fußes und einer Hand (Cina, Graph., Hyos., Kali-br.).

Chorea-artige Bewegungen des linken Arms und des rechten Beins; kann nicht gehen, muss rennen oder springen und sich umherbewegen.

Die Finger werden krampfhaft zur Faust geschlossen, besonders der Daumen wird eingeschlagen.

Eisige Kälte mit bläulicher Verfärbung der Fingernägel, Hände und Füße.

Langsame Kontraktion der Muskeln und Sehnen der Hände, abwechselnd auch in den Füßen.

SCHLAF

Träume: Kämpfe, Streitigkeiten, schreckliche Alpträume (Borx., Carc., Kali-p.).

Im Schlaf: Augen geöffnet, Schaum vor dem Mund (Sil), knirscht mit den Zähnen (Ars., Bac., Bell., Cina, Tub.), lacht, stöhnt laut, ruhelos, wirft sich hin und her, schreit auf, schluchzt, schnarcht, redet, weint, wimmert.

Schläft in Knie-Brust-Lage (Calc-p., Carc., Lyc., Med., Phos., Tub.), den Kopf in das Kissen gebohrt.

Schläfrigkeit nach jeglicher Aufregung.

Plötzliches Zusammenfahren im Schlaf durch Schreck.

FIEBER

Abneigung, sich aufzudecken in allen Fieberstadien.

Fieber mit Exanthem wie Scharlach oder Masern (Acon., Apis., Bry., Euphr., Puls., Sulph.).

Frost:

Eisige Kälte der Hände und Füße, mit bläulicher Verfärbung.

Heftige absteigende Fröste, mit Delirium.

Schlimmer durch das geringste Aufdecken; besser durch warmes Einhüllen.

• Hitze:

Heißer Kopf, heißes Gesicht, mit bläulicher Verfärbung der Hände und Füße, die sich eiskalt anfühlen (Eup-per., Lyc., Meny., Phos., Verat.) ODER brennende, trockene Hitze des Körpers mit Kälte von Kopf und Gesicht, bei heftigem Delirium.

Unstillbarer Durst auf große Mengen Wasser (Bry., Eup-per., Nat-m.).
Redseligkeit (Bapt, Gels, Lach., Pyrog., Tub.), Ruhelosigkeit (Ars., Op., Puls., Rhus-t.) und Schreien (Bell., Caps., Cham., Coff., Op.); das Kind wirft sich herum und wandert von einem Bett zum anderen.

Selbst in diesem Stadium erträgt das Kind es nicht, aufgedeckt zu sein, trotz brennender, trockener Hitze des Körpers.

Konvulsionen, reichliches und häufiges Verlangen zu urinieren, Hitze und Schmerz in den Augen.

Fällt in tiefen Schlummer mit lautem Schnarchen.

• **Schweiß:**

- Reichlicher, kalter Nachtschweiß, der bei Tagesanbruch abklingt.

Kontinuierliches Fieber bei Meningitis mit totalem Stupor und schnellem, sehr hohem Temperaturanstieg besonders in der Nacht, besonders zwischen 16 Uhr und Mitternacht.

HAUT

Schwitzt viel, wenn er zornig ist (Cham., Petr., Sep.) oder nervös (Calc., Ph-ac.) und bei Stuhlgang (Merc., Verat.).

Nützlich in Fällen, wenn die Ausschläge nicht ausbrechen bei Masern oder anderen Krankheiten mit Hautausschlägen.

Untersuchungsergebnisse:

Öliger Schweiß (Chin., Mag-c., Thuj.) mit sehr üblem Geruch.

Feuerrote oder scharlachrote Punkte auf der Haut.

Gangränöse Hauterkrankungen.

Raue, schmutzig aussehende Haut.

KONVULSIONEN

Beschwerden oder Verschlimmerung durch: Husten, Zahnung, Trinken von Wasser oder **Kaffee**, Fieber, **Schreck** (Calc., Hyos., Ign., Kali-br., Op.), Verletzung (Cic., Hyper., Nat-s.), Anschauen von hellen oder glänzenden Gegenständen, Masturbation, beim Versuch zu schlucken, **Anblick von Wasser** (Bell., Canth., Lyss.), Schlaf, starke Gerüche, unterdrückte Absonderungen, unterdrückte Ausschläge oder wenn diese nicht ausbrechen, Würmer.

Vor Konvulsionen: Schreien (Cham., Cic.).

Während Konvulsionen:

Zungenbiss (Art-v., Bufo, Caust., Cic., Cupr., Op.).

Nach innen eingezogene Daumen (Bufo, Caust., Cic., Lach., Stann.).

Rotes Gesicht (Cic., Cupr., Op.) mit stumpfem Aussehen.

Schreien (Op.).

Steife und **gebeugte Glieder** (Hyos., Plb.).

Abwechselnd klonische und tonische Konvulsionen, von wechselhaftem Charakter.

Konvulsionen der oberen Gliedmaßen sind ausgeprägter als die der unteren
ODER sie wechseln miteinander ab.

Husten.

Diplopie.

Hydrophobie.

Intensive Hitze oder absolute Kälte der Haut.

Übertriebenes Lachen.

Masturbation.

Opisthotonus.

Spasmen einer Körperhälfte (gewöhnlich der linken Seite), mit absoluter Unbeweglichkeit der anderen.

Neigung, nach hinten zu fallen.

Tetanische Starre mit **Trismus** (Bell., Cic., Hyper., Nux-v., Op., Stry.).

Schlimmer nach **3 Uhr** (nach Mitternacht: Nit-ac.).

Nach Konvulsionen: Kalter Schweiß, Schläfrigkeit und Schwäche.

ALLGEMEINES

Beschwerden durch Masturbation, Medikamente wie Antibiotika oder topische Steroide, **unterdrückte Absonderungen** (z. B. Unterdrückung von Eiter aus einem Abszess, unterdrückter Schweiß usw.) (Asar., Graph., Psor., Sil.) und **unterdrückte Hautausschläge** (Bry., Dulc., Psor., Sulph., Zinc.).

Zucken und Zittern im **Schlaf** (Hyos., Zinc.), durch **Schreck** (Ign., Op.) und nach **emotionaler Erregung** (Cocc., Staph.).

Verlangt nach frischer Luft, aber Verschlimmerung durch jede Zugluft, durch bewölkttes feuchtes Wetter und im Herbst.

Reaktionsmangel.

Schlimmer im und nach **Schlaf** (Crot-c., Lach., Spong., Sulph.), besonders nach langem Schlaf.

HERKUNFT

Synonym: *Datura stramonium*. Familie der Nachtschattengewächse (Solana- ceae).

SULPHUR

(Schwefel - Sulph.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Will nicht gewaschen oder gebadet werden, besonders ungern an den Ohren (mit kaltem Wasser: Ant-c.) (Am-c., Calc., Psor., Rhus-t.).

Kinder, deren Eltern sich zu sehr einmischen und Druck ausüben (Anac., Carc., Lyc., Staph.), sie verächtlich behandeln (Bry., Cham., Nat-m., Nux-v.), sie kritisieren (Coloc., Ign., Lyc., Nat-m., Pall., Staph.) und unterdrücken; am Ende sind sie gedemütigt und werden typische Sulphur-Kinder.

Wissbegierige (Agar., Aur., Lach., Lyc., Puls., Sep., Verat.) und neugierige Kinder; wenn sie etwas nicht verstehen, sind sie verunsichert und beginnen dann als Ausgleich zu theoretisieren.

In der Praxis verhalten sich Sulphur-Kinder destruktiv; sie fassen alles an (Bell., Cina, Hyos., Merc., Sacch., Thuj.) und hinterlassen ein Chaos.

Ihre äußere Erscheinung ist ihnen egal (Aur-s., Calc., Nat-sil.); meist schmutzig, verlottert und unordentlich. Aber auch der entgegengesetzte Typ kommt vor: Sehr sauber, wie blankgeputzt und reinlich.

Frühreife Kinder (Aur., Calc-p., Lach., Med., Merc., Verat.); sehr intelligent und hellwach.

Diese Kinder leben im ständigen inneren Konflikt zwischen Ego und Ehre einerseits (Aur-s., Nat-m., Nux-v., Pall., Staph.) und auf der anderen Seite Demütigung und Verlegenheit (Ambr., Bar-c., Merc., Op.). Wenn sie etwas älter sind, scheren sie sich nicht mehr um die Eltern und werden frech und gleichgültig.

Kinder, die ständig mit den Geschwistern verglichen werden und die sich deshalb in ihren Fähigkeiten und Eigenschaften blamiert (Mag-s., Nat-s., Nux-v., Plat., Staph.), verachtet (Bry., Cham., Nat-m., Nux-v.) und unwichtig vorkommen. Sie lernen, in ihrer eigenen Welt zu leben, wo sie sich wohler und sicherer fühlen.

Selbstsüchtige (Calc., Lyc., Med., Nux-v., Pall., Plat., Verat.) und schäbige Kinder.

Neidisch und eifersüchtig auf andere Kinder in der Familie oder in der Schule; das bezieht sich besonders auf Liebe, Zuneigung, Wissen, gemeinsame Unternehmungen usw.

Im Spiel mit anderen Kindern übernehmen Sulphur-Kinder meist die Führungsrolle (Caust., Lyc., Nux-v., Plat., Sil.) und sind meist wählerisch mit ihren Freunden.

KÖRPER

► Klinisch findet man drei „Konstitutionen“:

Dick, rundlich und wohlgenährt, mit **rotem Gesicht und Ohren** und einer ungepflegten Erscheinung.

Schmal, mager, aber mit dickem Bauch (Bar-c., Calc., Iod., Nat-m., Sil.) und **vornüber gebeugter Haltung** (Carbo-veg., Mang., Phos., Sil., Tub.); Kinder mit Wurmerkrankungen, die gebeugt sitzen und gehen wie ein alter Mann.

Verschumpelte (Ant-t., Apis, Merc., Op., Plb.) und zerzauste Kinder, die ungewaschen aussehen und unangenehm riechen, auch wenn sie sich gerade gewaschen haben.

Leuchtend rote Körperöffnungen (Apis, Bac., Med., Merc.): Augenlider, Lippen, Mund, Nase, Ohren, Anus und Urethra.

Sehr empfindlich auf Wetterwechsel (Hep., Psor.).

Gefühl von Brennen, höllisches Brennen am ganzen Körper.

Reaktionsmangel, besonders bei Unterdrückung äußerer Krankheitserscheinungen durch Salben, Operationen oder orale / parenterale Einnahme von Antibiotika.

Trinkt viel und isst wenig.

Sulphur-Kinder stehen nicht gern (Cocc., Merc.); Stehen ist für sie die schlimmste Haltung.

DD: Vergleiche Oxyg mit diesem Mittel.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Prahlerei (Lyc., Med., Plat., Stram.).

Launisch (Ant-c., Cham., Cina, Plat., Verat-v.).

Kinder, die **immer ungeduldig** sind (Cham., Ign., Ipec., Nux-v., Sep., Sil.); können nicht warten, alles muss sofort geschehen, sonst sind sie gereizt.

Lieben es, im Mittelpunkt zu stehen (Calc-s., Hyos., Ign., Mag-m., Phos., Pall., Plat., Puls., Stram., Tarent., Tub.), **da sie viel Liebe und Bestätigung von ihren Freunden oder der Gruppe brauchen.**

Schlecht gelaunte, gereizte Kinder, extrem nörgelig; ständig in schlechter Stimmung (Ars., Cham., Nux-v., Tub.).

Liebe zu Katzen (Aeth., Lac-f., Lach., Tub.).

Liebt es, Dinge zu sammeln und zu horten, wie alt, zerfetzt und nutzlos sie auch sein mögen (Ars.).

Liebt es, Bücher über Zivilisation, Kultur, Geschichte und Philosophie zu lesen (Aur., Nat-c., Stram., Tub.).

Unkontrollierbares Verlangen, Dinge anzufassen und alles in den Mund zu stecken (Calc., Merc.).

Beißt dauernd die Nägel und andere Dinge.

Immer tätig; stets mit diesem oder jenem beschäftigt.

Kritisch.

Furcht, gebadet oder gewaschen zu werden; nachts Angst vor Geistern; Furcht vor hohen Plätzen.

Hochmütig.

Kleptomanie.

Lieben es, Schach und Puzzles zu spielen oder draußen Fußball und Cricket.

Manipulierende Kinder (Puls., Sil., Staph., Tarent., Tub.), die schmeicheln und gefällig sind, um ihre Pläne durchzusetzen.

Verurteilen sich selbst (Aur., Lac-c., Naja, Nux-v.); Mangel an Selbstvertrauen.

Wutanfälle; stampfen mit den Füßen und rollen sich auf dem Boden, wenn sie zornig sind.

Neigung, andere Kinder zu ärgern und zu ignorieren; sehr boshaft (Anac., Cham., Cina, Nux-v.).

Sehr destruktiv mit ihren Spielsachen und der Kleidung; lieben es, Dinge zu zerbrechen.

Ringern der Hände (Kali-p., Phos., Psor., Stram., Tarent.).

KOPF

Das Haar ist brüchig, trocken, **verknötet** (Borx., Lyc., Med., Petr.), **glanzlos** (Med., Psor., Thuj.) und schwierig zu kämmen (Thuj.).

Berührungsempfindlich (Bell., Chin., Gels., Mez., Nux-v., Sil.).

Kopfschmerzen durch Überanstrengung beim Lernen, unterdrückte Absonderungen (wie Schnupfen), unterdrückte Ausschläge und vom Haarewaschen (lange Haare junger Mädchen).

Migräne, der Schläfrigkeit vorausgeht, mit Kopfschweiß.

Untersuchungsergebnisse:

Bohrt den Kopf in das Kissen (Apis, Bell., Hell., Med., Stram., Tub.) bei Meningitis, Migräne und Wutanfällen.

Heißer Kopf (Apis, Bell., Glon., Lach., Phos.).

Kernig-Zeichen ++ (Bell., Hell., Op., Stram., Zinc.).

Offene Fontanellen (Calc., Calc-p., Sil.).

Rollen des Kopfes (Bell., Stram., Tarent., Tub.).

CT: Hirnblutung.

Ekzematöse Ausschläge der Kopfhaut und entlang des Haaransatzes, mit einer gelben, übelriechenden Absonderung, die antrocknet und Krusten und Schuppen bildet.

Kopf vorwärts gebeugt beim Gehen.

Hydrozephalus.

Tinea capitis.

Zieht bei Kopfschmerzen die Stirn in Falten.

AUGEN

Trockenheit der Augen, wenn er sich drinnen aufhält (Puls.), **mit Absonderung von ätzenden Tränen draußen im Freien** (Calc.).

Entzündung der Augen bei Kleinkindern nach einer Erkältung (Arg-met., Calc., Dulc., Euphr., Merc., Puls., Thuj.).

Die Lider sind geschwollen, brennen und jucken (Puls.), **schlimmer beim Waschen der Augen** (Gegenteil von Puls.).

Rezidivierende Neugeborenen-Ophthalmie (Apis, Arg-n., Ars., Calc., Nit-ac., Puls., Thu.) **mit reichlichen, eitrigen, dicken, gelben Absonderungen** (Arg-n., Euphr., Kali-bi., Puls., Sil.) **und geschwollenen Lidern.**

Verklebung der Lider am Morgen (Arg-n., Graph., Med., Rhus-t.).

Sehschwäche beim Lesen oder bei Kopfschmerzen.

Häufiges Verlangen, die Augen zu reiben.

Nachtblindheit durch Mangelernährung.

Schmerzhafte Augenentzündung durch Fremdkörper im Auge (Coc-c.).

Photophobie.

Rötung und Kongestion der Augen, schlimmer in den Morgenstunden.

Retinitis durch Überanstrengung der Augen.

Untersuchungsergebnisse:

Ekzem mit Trockenheit und Krustenbildung auf den Lidern.

Wimpern fallen aus.

Entropium (Inversion der Lider).

Unwillkürliches Schließen der Augen (Caust., Chinin-s., Con.).

Tränengangfistel.

Blutung der Retina (Bell., Crot-h., Lach., Phos.).

Strabismus.

Gerstenkörner und Hagelkörner [Chalazion].

Eingesunkene Augen, mit blauen Ringen.

Trachom.

Zucken der Lider.

OHREN

Katarrh der Eustachischen Röhre (Asar., Calc., Ferr-p., Kali-s., Puls.).

Reichliche, ätzende (Ars-i., Calc-p., Hep., Merc.), **blutige** (Calc-s., Merc., Psor., Sil.), **übelriechende** (Aur., Cist., Lyc., Merc., Psor., Sil.) **und eitrige** (Calc-s., Kali-bi., Merc., Puls., Sil.) **Absonderungen; treten periodisch jeden 7. Tag auf,** schlimmer durch **unterdrückte Ausschläge** (Aur-s., Mez.) oder **Impfung** (Sil.).

Katarrhalische Taubheit durch Schnäuzen der Nase.

Chronische Otitis media, besonders des linken Ohres.

Jucken der Ohren, besonders des linken.

Untersuchungsergebnisse:

Rote Ohren (Agar., Apis, Chin., Puls.).

Ekzematöse Ausschläge und Eiterbeulen hinter den Ohren.

Verhärtung oder Perforation des Trommelfells (Tub.).

Ohrpolypen.

NASE

Chronischer trockener Katarrh mit Krustenbildung, blutet leicht beim Entfernen (Arg-n., Kali-bi., Nit-ac.).

Nasenbluten am Morgen, beim Schnäuzen und beim Husten.

Jucken und Brennen der Nasenlöcher.

Verstopfung der Nase, besonders im warmen Zimmer, besser im Freien.

Heftiges, anfallartiges Niesen mit ätzender, wässriger Absonderung.

• Untersuchungsergebnisse:

Adenoide (Agra., Spig., Staph., Thuj.) und Polypen.

Bohrt ständig mit dem Finger in der Nase (Arum-t., Cina).

Fächelnde Bewegungen der Nasenflügel (Ant-t., Brom., Iod., Lyc., Phos., Spong.).

Geschwollene Nase mit leuchtend roter Nasenspitze (Aur., Kali-c., Lach., Rhus-t.).

Dicke, gelbe, eitrige, übelriechende, ätzende Absonderung aus der Nase, die die Lippen wund macht.

Geschwüre in der Nase.

GESICHT

Mumps.

Untersuchungsergebnisse:

Wangen abwechselnd rot und blass (Acon., Ferr., Lac-c.) ODER **eine Wange rot und die andere blass** (Cham., Ipec., Mosch., Nux-v., Puls.).

Alt aussehend (Arg-n., Calc., Nat-m., Op.).

Sehr rote, trockene und rissige Lippen (Apis, Arum-t., Bell., Merc., Rhus-t.).

Schwarze Mitesser und Sommersprossen im Gesicht, besonders um die Nase. Harte, schmerzhaft Drüsenschwellung.

Schwellung der Parotiden und der Unterkieferdrüsen, mit Neigung zur Abszessbildung.

Zucken oder Zittern der Lippen.

MUND

Vermehrter Speichelfluss, besonders bei Fieber und im Schlaf.

Übelriechender oder **saurer** Mundgeruch (Eup-per., Graph., Nux-v., Verat.) am Morgen.

Schwierige Zahnung.

Wunder Mund bei gestillten Babys.

Untersuchungsergebnisse:

Aphthen bei Kleinkindern (Bry., Merc., Nux-v., Sul-ac.) wollen wegen der Schmerzen nicht saugen.

Beißt dauernd die Zähne zusammen (Bell., Hyos., Stram.).

Trockene, braune oder **weiße Zunge mit roter Spitze und roten Rändern** (Rumx., Verat.).

Steckt die Finger (Calc., Cham., Ipec., Sacch.) und **alles, dessen er habhaft werden kann**, in den Mund.

Abwechselndes Herausstrecken und Zurückziehen der Zunge bei Kindern mit Hydrozephalus.

Fistel im Zahnbereich.

Das Zahnfleisch ist geschwollen, blutet leicht und bildet sich zurück.

Zähneknirschen

Skorbut.

Soor.

HALS

Halsschmerzen durch kalte Getränke (Lyc., Sabad., Syph.).

Eiterungsneigung oder sehr langsame Rekonvaleszenz nach Tonsillitis oder Diphtherie (Bar-c., Bar-m., Hep., Merc.).

Chronische Halsentzündung, mit dauerndem Räuspern und Abhusten.

Schwellung der Tonsillen, mit Schmerz, der sich zu den Ohren erstreckt beim Schlucken.

Untersuchungsergebnisse:

Verlängertes Zäpfchen (Bar-m., Crot-t., Hyos., Kali-i., Lach., Phos.).

Verhärtung der Drüsen um den Hals, wie eine **Perlenschnur** (Bar-i., Bar-m., Calc-i., Tub.).

Torticollis.

MAGEN

Aufstoßen nach dem Essen (Arg-n., Carbo-veg., Ferr., Nat-m., Puls.) **oder beim Drücken auf den Magen.**

Verdauungsstörung durch Milch (Aeth., Chin., Mag-m., Nit-ac.) oder fettige Speisen (Carbo-veg., Chin., Kali-m., Ptel., Puls.).

Erbrechen von saurer, geronnener Milch sofort nach dem Stillen (Ant-c., Calc., Ipec., Mag-c., Nat-m., Sil.).

Ansammlung von Speichel im Mund nach dem Essen.

Die Verdauung scheint nur langsam einzusetzen.

Würgen und Erbrechen bei Husten.

Saures oder fauliges Aufstoßen.

Unersättlicher Appetit, besonders gegen 11 Uhr (Iod., Lach., Nat-m., Zinc.).

Verschlimmerung: **Brot** (Bry, Puls), **Butter** (Carbo-veg., Puls.), Kohl, Getreide, Eier, **Gebäck** (Ant-c., Lyc., Puls.), Erbsen, Pfeffer und Zucker.

Abneigung: **Gekochte Eier** (Bry.), Brot, Fett, Fisch, **Gruyere und pikanter Käse** (Hep., Merc., Nit-ac.), **Hühnchen** (Bac., Nat-m.), Kaffee, Fleisch, **Milch** (Lac- d., Nat-m., Staph.), **Oliven**, rohe Speisen, Erdbeeren, Süßigkeiten.

Verlangen: Schokolade, Kaffee, **Gurken** (Ant-c., Ant-t., Phos., Verat.), Eier, Mehlspeisen, **Fett** (Calc-p., Nit-ac.), Früchte, **Knoblauch** (Agar., Phos., Thuj.), Fleisch, **Gebäck** (Calc., Puls., Sacch.), Essiggurken, Salz, Gewürztes, **Süßigkeiten** (Arg- met., Aur-s., Chin., Lyc.), Tomaten und **Gemüse** (Kali-i., Mag-c., Mag-m.).

ABDOMEN

Gurgelnde und rumpelnde Geräusche vor Stuhlgang (Aloe, Crot-t., Gamb., Olnd., Podo.).

Chronische oder rezidivierende Gelbsucht (Aur., Chel., Iod., Phos.).

Kneifende Schmerzen bei Säuglingen am frühen Morgen (Caust., Dios., Nux-v.) **und vor, bei und nach Stuhlgang** (Aloe, Am-c., Op., Podo.).

Chronische, rezidivierende Appendizitis (Kali-c., Sul-i.).

Chronische Colitis ulcerosa.

Kolikartige Schmerzen mit geblähtem Bauch nach Essen (besonders Süßigkeiten) oder Trinken von Milch, Kind krümmt sich zusammen.

Intussuszeption.

Reizdarm.

Eingeklemmte Blähungen bei Verstopfung.

Pfortaderhochdruck.

Untersuchungsergebnisse:

Abszess der Bauchwand (Hep., Rhus-t., Sil.), der nicht heilen will.

Leber und Milz vergrößert und palpabel (Chin).

Übelriechender Schweiß auf dem **Bauch** (Ambr., Anac., Arg-met., Cocc., Phos., Sei.) und in der **Leistenbeuge** (Ambr., Sep., Thuj.).

Ultraschallbild: **Verkalkung der Mesenterialdrüsen** (Aur., Calc., lod.).

Auftreibung des transversen Kolons.

Leistenbruch, entzündet und stranguliert.

Paralytischer Ileus.

Peritonitis.

Geschwüre um den Nabel.

REKTUM

Verstopfung bei Neugeborenen durch Stase des Pfortadersystems (Med., Nux-v., Op.); Sogar um weichen Stuhl abzusetzen ist Anstrengung erforderlich, Stuhl weicht immer wieder zurück.

Durchfall nach einer akuten Erkrankung wie Erkältung (Dulc., Nux-m.), bei Zahnung, durch **Milch** (Calc., Lyc., Mag-c., Mag-m., Nat-c., Sep., Sil.) und durch **unterdrückte Ausschläge** (Bry., Hep., Lyc., Psor., Urt-u.).

Durchfall am Morgen (wacht mit StuhlDrang auf) (Aloe, Cench., Graph., Lyc., Tub.), der schmerzlos und von wechselnder Art ist.

Laktoseintoleranz bei Kleinkindern und Säuglingen (Calc., Lyc., Mag-c., Mag-m., Nat-c.).

Durchfall abwechselnd mit Verstopfung.

Unwillkürliche Stuhlausscheidung beim Niesen, Lachen oder Abgang von Blähungen.

Abgang von sehr stinkenden Blähungen mit Geruch nach faulen Eiern.

Wollüstiges Jucken in der Analregion, besonders nachts im Bett; reibt die Stelle, bis sie wund ist.

Untersuchungsergebnisse:

Rektumprolaps bei und nach **Stuhlgang** (Aesc., Merc., Nit-ac., Podo.).

Rötung und Ulzeration um den **Anus** (Cham., Sil.).

Stuhluntersuchung: **Fettgehalt sehr hoch** (Caust., Iris, Phos.) (Anzeichen für Malabsorptionssyndrom), **Würmer** (Cina) (Spulwürmer, Madenwürmer, Bandwurmsegmente, Fadenwürmer).

Abszess.

Blutige Absonderungen aus dem Anus nach Kratzen.

Fissuren- oder Fistelbildung.

Hämorrhoiden, innere und äußere, die leicht brennen oder bluten.

HARNWEGE

Unwillkürliches Urinieren nachts, wenn er vom Urinieren träumt (Kreos., Ph-ac., Sep.).

Harnverhalt durch Erkältung (Acon., Caust., Dulc., Puls.) oder nach unterdrückten Ausschlägen (Ars., Calc., Camph., Con.).

Urin ätzend (Med., Merc.), albuminös, wolkig (Apis, Canth., Chin., Cina, Graph., Merc., Phos., Sep.) und übelriechend; hinterlässt weißes oder kreideartiges Sediment in der Windel.

Juveniler Diabetes mellitus (Caps., Lyc., Tarent.).

Nephrotisches Syndrom (Apis, Apoc., Merc.).

Untersuchungsergebnisse:

Rote und entzündete Harnröhrenöffnung, mit wollüstigem Jucken (Hep., Led.).

Ultraschallbild: Steine.

Urin: Albumin +, erniedrigtes spezifisches Gewicht, hyaline Zylinder +, Eiter ++, Erythrozyten +, Zucker ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Neigung zu masturbieren.

Wollüstiges Jucken, besonders durch Bettwärme nachts.

Untersuchungsergebnisse:

Die Genitalien fühlen sich eiskalt an (Agn., Dios., Gels., Lyc.).

Hydrozele (Puls., Rhod., Sil.).

Phimose mit roter Vorhaut (Merc., Nit-ac.).

Ödematöse Schwellung des Penis.

Wundheit der Skrotalregion durch ätzenden, übelriechenden Schweiß.

WEIBLICHE GENITALIEN

Jucken des Schambereichs und der Vulva.

Untersuchungsergebnisse:

Reichlicher, übelriechender Schweiß der Genitalien.

Madenwürmer und Geschwüre in der Vaginalregion.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Dauerndes Räuspern (Ant-t., Brom., Nux-v., Phos., Rumx.).

Einengung oder Spasmen des Larynx; schlimmer durch Zorn, Weinen und beim Einschlafen.

ATMUNG

Asthma durch unterdrückte Hautausschläge (Ars., Carbo-veg., Dulc., Ipec., Psor.)
oder abwechselnd mit Hautausschlägen (Crot-t., Hep., Psor.).

Will Türen und Fenster bei einem Asthmaanfall offen haben (Am-c., Bry., Carbo-veg., Ipec., Lach., Puls., Tub.).

Beschleunigte oder schwierige Atmung beim Hinlegen.

Verlangen, tief zu atmen.

Fühlt sich nach Lockerung oder Entfernung der Kleidung besser.

Untersuchungsergebnis:

- Rasselnde Atmung, besser nach Auswurf.

HUSTEN

Reichlicher, grünlicher (Calc-sil., Carbo-veg., Kali-i., Merc., Nat-s., Puls.), eitriger und übelriechender Auswurf.

Husten, besonders nachts, sobald das Kind in tiefen Schlaf fällt (Lach., Lyc.).

Trockener Husten nachts, locker am Tage (Arg-met., Hep., Lyc., Puls.).

Blutiger Auswurf.

Husten nach Masern.

Husten beim Liegen auf der linken Seite, besser beim Liegen auf der rechten Seite.

Husten endet gewöhnlich mit Niesen (Agar., Bell., Carbo-veg., Squil.).

Reizung des Larynx löst meistens einen krampfartigen Hustenanfall aus.

Keuchhusten.

Untersuchungsergebnis:

- **Hält beim Husten den Kopf mit den Händen** (Bry., Nicc., Nux-v.).

BRUST

Verschleppte Pneumonie (Carbo-veg., Kali-c., Lyc., Tub.).

Schleimrasseln in der Brust beim Husten.

Spasmen der Brust beim Husten.

Untersuchungsergebnisse:

Röntgen/Thorax: Verschattung des **linken unteren Lungenlappens** (Chel., Nat-s.).

Pleuraerguss (Ant-ar., Ars.).

Atelektasen.

Empyem.

Knoblauchartiger Geruch der Achseln.

Hydrothorax.

Primärkomplex.

HERZ UND KREISLAUF

• Untersuchungsergebnisse:

Perikarditis mit Erguss (Ars., Psor., Spig.).

Herzhypertrophie.

Puls schneller am Morgen als am Abend.

RÜCKEN

Schweiß der Zervikalregion im Schlaf (Calc., Chin., Ph-ac.).

Schwäche in der Lumbalregion (Calc); muss sich ständig **anlehnen** (Chel.).

Rutscht beim Sitzen nach unten wegen Schwäche und Erschöpfung.

Nackensteifigkeit.

Untersuchungsergebnisse:

Eitrige Schwellung der Halsdrüsen (Bar-c., Hep., Merc., Sil.).

Geht gebeugt wegen Schmerzen und Verkrümmung der Wirbelsäule

(Calc-f., Merc-c., Phos., Sil.).

Abszess mit Fistelbildung.

Eiterbeulen im Nacken.

Die Halsmuskeln sind schwach und abgemagert; kann den Kopf nicht aufrecht halten.

Wirbel werden weich (Knochenhärte lässt nach).

Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

Brennende Schmerzen in Handflächen und Fußsohlen nachts (Lach.); will sie aufdecken (Cham., Med., Puls.).

Krämpfe in Waden und Fußsohlen, besonders nachts (Calc., Cham., Gels., Lyc., Nux-v., Sil.).

Lässt Dinge fallen durch Ungeschicklichkeit.

Juvenile rheumatoide Arthritis.

Spontane Hüftgelenksluxation.

Spannung und Kontraktion der Kniesehnen.

Zittern der Hände beim Schreiben.

Untersuchungsergebnisse:

Arthritische Knoten (Apis, Calc-f., Led., Lyc.) der Finger- und Zehengelenke, wie bei Still-Syndrom.

Dauernde Bewegung der Füße, sogar im Liegen (Caust.).

Epileptische Konvulsionen in den Armen beginnend.

Eisige Kälte (Camph., Lach., Phos., Verat.) oder intensive Hitze (Cham., Led., Puls., Sep., Staph.) der Hände und Füße.

Rötung, Schwellung und Steifheit der Gelenke (Cocc., Kali-bi., Rhus-t.).

Abszesse mit Gelenkfisteln.

Risse und Rhagaden zwischen den Fingern.

Ödematöse Schwellung und Steifheit der Knie- und Fußgelenke.

Ekzematöse Ausschläge auf den Beugeseiten der Gelenke.

Niednägel und eingewachsene Zehennägel.

Unkoordiniertheit der Beine beim Laufen.

Liegt mit gespreizten Gliedern.

Osteomyelitis.

Dicke Haut, mit Schwielen und schmerzhaften Hühneraugen an Handflächen und Fußsohlen.

Tuberkulose der Knie- und Hüftgelenke.

Weißer Flecken auf den Nägeln.

SCHLAF

Ein kurzer Schlaf genügt (Fl-ac., Nux-v.) und wirkt erfrischend.

Alpträume beim Liegen auf dem Rücken (Cadm-s., Mang-s., Nicc-s.).

Schlafwandeln (Bry., Cycl., Nat-m., Op., Phos., Zinc.).

Im Schlaf: Augen halb geöffnet, Speichelfluss (Lyc., Merc., Puls., Rhus-t.), Zittern und Zucken der Beinmuskeln (Arg-n., Phos.), Jammern, Aufschreien, Seufzen und lautes Reden (besonders über alles, was er gelesen oder gelernt hat).

Kann zwischen 2 und 5 Uhr keinen Schlaf finden.

Schlaflos durch Bettwärme; dauernde Suche nach einem kühlen Platz.

Schläft auf dem Rücken mit den Händen über dem Kopf.

FIEBER

Beschwerden durch: Zahnung, Masern.

Hitze:

Hitze von Kopf und Gesicht mit kalten Händen und Füßen (Sep., Stram.).

Umschriebene Rötung der Wangen (Bell., Chin., Sep.).

Verlangen sich aufzudecken bei Fieber.

• **Schweiß:**

- Kalter Schweiß mit starkem schwefelartigem Geruch.

Remittierendes oder hartnäckiges intermittierendes Fieber bei Kleinkindern (Calc., Op., Sep.).

Septisches Fieber.

HAUT

Ausschläge im Wechsel mit anderen Beschwerden (z. B. Asthma) (Ars., Psor.).

Ausschläge: Eiterbeulen, Windpocken, Ekzeme, Herpes, Masern usw.; mit wol-
lüstigem Jucken, besonders nachts durch Bettwärme (Ant-c., Lyc., Merc.,
Psor.); übelriechende Absonderungen und Krustenbildung.

Jede kleine Verletzung eitert.

Untersuchungsergebnisse:

Wund gelegene Stellen bei Kleinkindern und Säuglingen (Calc., Cham., Chin.,
Lyc., Med., Sep.).

Übermäßiges Haarwachstum bei Kindern (Carc., Nat-m., Sep., Thuj.).

Skabies (Ars., Carbo-veg., Kali-s., Psor., Sep.).

Rissige, trockene, schuppige, ungesunde Haut.

Ekchymotische Flecken.

Intertrigo.

Naevi.

KONVULSIONEN

Beschwerden oder Verschlimmerung durch: **Zorn** (Calc., Cham., Cupr., Nux- v.);
Husten; Schlaf; **unterdrückte Ausschläge** (Bry., Camph., Cupr., Ipec., Stram.,
Zinc.) oder wenn die Ausschläge nicht ausbrechen.

Während Konvulsionen: Eingeschlagene Daumen; Tiefschlaf; Zucken und unwill-
kürliche Bewegungen, **die in den Armen beginnen** oder auf der linken Seite
und sich zur rechten ausbreiten.

Nach Konvulsionen: Tiefer, fast komatöser Schlaf und Erschöpfung.

ALLGEMEINES

Alle Beschwerden sind **schlimmer nachts und durch Bettwärme** (Apis, Cham.,
Merc., Op., Puls.).

Abneigung gewaschen oder gebadet zu werden (Am-c., Ant-c., Psor., Sep.).

Das Kind fühlt sich sehr **unwohl in stehender Haltung** (Cocc., Puls., Sep.); lehnt sich
ständig an beim Stehen oder zieht es vor zu sitzen.

Absonderungen sind ätzend, blutig, **übelriechend** (Bapt., Kreos., Lach., Nat-c., Nit-
ac.) und verursachen **Brennen** (Ars., Gels., Kali-i., Merc., Nit-ac.), **Jucken** und
Wundheit.

Abmagerung trotz unersättlichen Appetits (Calc., Cina, Iod., Nat-m.).

Alles hat Auswirkungen auf das Epigastrium (Kali-c., Mag-p.).

Allergisch auf allopathische Medizin, besonders Antibiotika.

Impffolgen: Otorrhoe und pustelige Ausschläge.

Gang: Mit hängenden Schultern.

Wenn sorgfältig gewählte Mittel versagen, besonders bei akuten Erkrankungen
(Carc., Mosch., Op., Tub.).

Wunden heilen langsam oder eitern; Wiederaufbrechen alter geheilter Wunden.

SULPHUR IODATUM

(Schwefeljodid - Sul-i.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Empfindlich auf alles (Canth., Kali-p., Mag-p.).

KÖRPER

Marasmus bei Kindern mit gesteigertem Appetit (Calc., Iod., Nat-m.).

Tuberkulose in der eigenen Vorgeschichte oder in der Familie (Bac., Carc., Kali-c., Phos., Tub.).

Passend für Sulph-Kinder, die gleichzeitig auch nervös, hektisch und abgemagert sind, mit geschwächter Vitalität.

Kinder mit hartnäckigen Hauterkrankungen, die auf offensichtlich angezeigte Mittel nicht ansprechen (Carbo-veg., Carc., Psor., Sulph., Tub.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Kann sich beim Lernen nicht konzentrieren (Aeth., Hell., Nux-v.).

Furcht vor jeder **körperlichen Anstrengung** (Calc-sil., Guaj., Mez., Ph-ac., Phos.), eine Art Faulheit, die vom Sulphur-Anteil herrührt.

Leichtes Zusammenfahren im Schreck beim Erwachen (Bell., Bry., Kali-c., Lach., Pall.).

Geht schnell, als ob stets in **Eile** (Arg-n., Sul-ac., Tarent.).

Geistige Verwirrung mit Zerstreuung beim Lesen.

Faul; Abneigung gegen jegliche Arbeit im Haushalt.

KOPF

Meningeale Kopfschmerzen; besser durch **kalte Anwendungen** (Bell., Stram, Zinc) und in kalter Luft (Glon., Puls., Seneg.).

Tuberkuläre Entzündung der Meningen.

Untersuchungsergebnisse:

Kopf erscheint im Vergleich zum Körper groß (Calc., Calc-p., Sil.).

Schuppen.

Ekzematöse Ausschläge auf der Kopfhaut, die oft jucken.

Die Fontanellen bleiben zu lange offen.

Kernig-Zeichen +.

Milchschorf.

Schweiß der Kopfhaut

AUGEN

Katarrhalische Entzündung der Augen durch Erkältung.

Tränenfluss bei kalter Luft.

Untersuchungsergebnisse:

Erweiterte Pupillen (Bell, Gels, Hell, Hyos, Stram).

Eingesunkene Augen (Ant-t., Chin., Sec., Spig.).

Verklebung der Lider.

Heraustretende, starrende Augen.

Rötung der Bindehaut.

OHREN

Einschränkung des Hörvermögens durch vergrößerte Tonsillen (Aur., Kali-bi., Merc., Staph.).

Gefühl wie verstopft.

Untersuchungsergebnisse:

Trommelfellperforation (Calc-i., Kali-bi., Sil., Sulph., Tub.).

Entzündung der Eustachischen Röhre.

Juckende Ausschläge im Gehörgang (Merc., Psor., Sulph.).

Eitrige, übelriechende Otorrhoe.

Rote Ohren, die sich kalt anfühlen (Chin., Kali-c., Merc., Nit-ac., Psor.).

NASE

Absteigende Erkältungen (All-c., Bry., Ipec., Merc., Nux-v.).

Chronischer Schnupfen, besonders im Freien (Dulc., Kali-bi., Nit-ac., Puls.).

Niesen, besonders am Abend (Iod., Puls., Sulph.).

Dicker, grüner, wundmachender Schnupfen bei Husten.

Untersuchungsergebnisse:

Bohrt dauernd mit den Fingern in der Nase (Arum-t., Cina, Sil., Zinc.).

Fächelnde Bewegung der Nasenflügel, besonders in Fällen von Pneumonie bei Kleinkindern (Ant-t., Kreos., Lyc., Phos., Sulph.).

Die Nasenspitze oder die Nasenflügel sind rot und geschwollen (Aur., Calc., Kali-c., Sulph.).

GESICHT

• Untersuchungsergebnisse:

Umschriebene Rötung der Wangen (Chin., Ferr. Lyc., Phos., Sulph., Tub.)
mit rotem Kinn (Canth., Colch., Merc., Nat-m., Zinc.) **und Lippen** (Apis, Bell., Lach., Sulph., Tub.).

Schmutzig, alt aussehend (Arg-n., Ars., Calc., Iod., Lyc., Merc., Sulph.),
bläss, kränklich und eingefallen.

Gesichtsschweiß beim **Gefüttertwerden** (Ign., Kali-p., Nat-m., Sulph.).

Acne rosacea oder pustelige Ausschläge, besonders um die Lippen
(Borx., Caps., Hydr., Psor.).

Sommersprossen.

Schwellung und Verhärtung der Parotiden und Unterkieferdrüsen.

Zucken.

MUND

Schwierige Zahnung.

Zahnschmerzen nach Essen.

Untersuchungsergebnisse:

Zunge: Rissige Oberfläche mit **roter Spitze** (Ars., Lach., Nit-ac., Rhus-t., Sulph.), **roten** Rändern (Ars., Chel., Merc., Sulph.) und **gelber** Basis (Merc., Merc-i-f., Nat-p., Nat-s., Nux-v.).

Abszesse an den Zahnwurzeln (Bar-c., Hecla., Hep., Lyc., Merc., Sil.).

Aphthen und Soor.

Kariöse Zähne.

Zähneknirschen.

Zahnfleisch von den Zähnen abgelöst, geschwollen, blutend mit Ulzerationen.

Mundgeruch.

Wunder Mund bei gestillten Säuglingen.

Stottern.

HALS

Chronische Tonsillenhypertrophie (Bar-c., Bar-m., Calc., Lac-c., Sil., Tub.).

Schlucken von **Flüssigkeiten** ist **schwierig** (Cic., lod., Lach., Lyss., Stram.).

Trockenheit im Hals, ständiges Bedürfnis zu schlucken.

Halsschmerzen beim Schlucken oder Husten.

Wundheit am Morgen beim Erwachen.

Untersuchungsergebnisse:

Verlängertes und geschwollenes Zäpfchen.

Struma.

Geschwollene, verhärtete, empfindlicher Halsdrüsen, wie eine Perlschnur (Bar-i., Bar-m., Calc-i., lod., Merc., Sil., Sulph., Tub.).

MAGEN

Isst wenig, aber trinkt viel (Calc., Colch., Ferr., Kali-n., Phos., Sulph.).

Hungrig, aber trotzdem abgemagert (Calc., Cina, lod., Nat-m., Sulph.); das Kind hat einen unstillbaren Appetit, greift nach allen Speisen, als ob es ausgehungert wäre.

Würgen und Erbrechen bei Husten (Carbo-veg., Cina., Coc-c., Dros., Hep.).

Schluckauf.

Erbrechen nach Essen und Trinken, besonders nach Milch.

Abneigung: Fleisch.

Verlangen: **Limonade** (Bell., Nit-ac., Ptel., Puls.), Essiggurken und **saure Dinge** (Acon., Cor-r., Hep., Puls., Verat.).

ABDOMEN

Chronische **Appendizitis** (Kali-c., Merc-d., Plb., Pyrog., Sil., Sulph.).

Schneidende, kneifende Schmerzen in der Nabelgegend bei Stuhlgang (Dulc., lod., Phos.).

Bauchschmerzen nach Essen.

• Untersuchungsergebnisse:

Verhärtete, geschwollene, empfindlicher Mesenterial- (Bar-c., Bar-m., Calc., Lyc., Nat-s.) und Leistendrüsen (Dulc., Hep., Tub.).

Geschwollene, harte, empfindliche Milz und Leber.

Trommelbauch mit dünnen Beinchen und Ärmchen.

REKTUM

Durchfall bei unterernährten Kindern mit Heißhunger (Calc., Calc-p., Iod., Rheum., Sil., Sul-ac.), **besser nach Essen** (Brom., Chel., Hep., Iod., Lyc., Nicc., Petr.).

Stühle: Faulig, schaumig, gräulich, schmerzlos, glänzend, wässrig, gelb; schlimmer nach **Milch** (Calc., Mag-m., Nat-c., Sep.) ODER groß, **trocken, schwarz** (Bry., Nat-m., Nit-ac., Op., Plb.), übelriechend und schmerzhaft; Furcht, Stuhl abzusetzen wegen der Schmerzen (Graph., Nit-ac., Nux-v., Rat., Sil.).

Brennen im Anus nach Stuhlgang.

Kotet überall hin.

Jucken im Rektum.

Untersuchungsergebnisse:

Rötung um den Anus (Aloe, Med., Nat-m., Petr., Sulph., Zing.).

Würmer.

HARNWEGE

Unwillkürliches Urinieren überall (Arg-met., Caust., Chin., Kali-p., Lyc., Staph.).

Chronische Pyelonephritis mit Albuminurie (Apis, Merc-c., Rhus-t., Ter.).

Übelriechender Urin, manchmal mit einem Geruch wie Himbeeren.

Untersuchungsergebnisse:

- Rotes Sediment in der Windel.

Urethralklappe.

Urinuntersuchung: Albumin ++.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Tuberkulose der Samenstränge und Hoden.

Untersuchungsergebnisse:

Hydrozele kleiner Kinder (Abrot., Ars., Aur., Calc., Calc-s., Graph., Puls., Rhod., Sil., Sulph.).

Fissuren der Vorhaut.

Schweiß des Skrotums mit stinkendem Geruch (Thuj.).

Geschwollene und verhärtete Hoden, tief herabhängend.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Heiserkeit am Morgen (Calc., Caust., Phos., Sulph.).

Kitzeln und Rauheit im Larynx mit ständigem Räuspern.

Schwache oder näselse Stimm (Caust., Kali-bi., Lach., Phos., Staph.).

Untersuchungsergebnisse:

Entzündung des Larynx.

Laryngismus stridulus (Bell., Gels., Ign., Mosch., Op.).

Tuberkulose des Larynx (Caust., Iod., Mang., Spong., Stann.).

ATMUNG

Asthma durch Heu (Ars-i., Carbo-veg., Iod., Lach., Nat-s., Nux-v., Sabad., Sil.).

Dyspnoe, besonders beim Aufwärtssteigen; schlimmer nachts und durch jegliche Aufregung (Calc-ar., Ipec., Merc., Nat-m., Nit-ac.).

Untersuchungsergebnisse:

Keuchende Atmung (Ars., Carbo-veg., Ipec., Kali-c.).

Unregelmäßiges Atmen (Bell., Cupr., Dig., Op.).

HUSTEN

Würgen durch Husten (Alum., Coc-c., Ipec., Kali-c., Nux-v., Puls.).

Trockener, hackender, krampfartiger, erschöpfender Husten; schlimmer durch **Reden** (Dros., Rumx., Sanic.), beim Hinlegen nachts (Caust., Hyos., Puls., Rumx.); nur besser, wenn das Kind in die **frische Luft** hinaus **getragen** wird (Brom., Bry., Coc-c., Iod., Kali-s., Mag-p., Puls.) und nach Auswurf.

Muss sich aufsetzen beim Husten (Ant-t., Bry., Con., Kali-bi., Phos., Puls., Sep.).

Der Auswurf ist zäh, übelriechend, eitrig oder blutig.

BRUST

Verschleppte Pneumonie (Lyc., Sil., Sulph.).

Schmerzen in den Seiten beim Husten.

Herzklappenerkrankung.

Untersuchungsergebnisse:

Häufig Rasseln von Schleim in der Brust.

Geräusche.

Pleuraerguss (Ars., Ars-i., Nat-m., Sil., Sulph.).

Primärkomplex.

Schwellung der Achseldrüsen.

EXTREMITÄTEN

Kalter Handschweiß (Acon., Cham., Tub.).

Brennender oder wunder Schmerz in den Fußsohlen beim Stehen.

Kälte der Füße nachts im Bett (Aur., Calc., Ferr., Sil., Zinc.).

Untersuchungsergebnisse:

Arthritische Knoten an den Fingergelenken.

Ödematöse Schwellung der Füße und Kniegelenke.

Eingewachsene Zehennägel.

Schmerzhaft empfindliche Hühneraugen (Ant-c., Calc-s., Nit-ac., Sulph.).

SCHLAF

Kurze Schlafintervalle (Camph., Rhus-t., See., Sulph.) mit offenem Mund.

Schlaflos nachts und schläfrig am Tage.

Ruheloser Schlaf, mit häufigem Erwachen durch Alpträume (Lyc., Stram., Sulph., Zinc.).

HAUT

Reichlicher, saurer Schweiß im Schlaf (Graph., Hep., Merc., Sulph.).

Urtikarielle Ausschläge mit starkem Juckreiz und Brennen.

Sommersprossen (Lyc., Phos., Sep., Sulph.).

Feuchte, ekzematöse Ausschläge.

Papillome (Calc., Caust., Graph., Lyc., Nit-ac., Staph., Thuj.).

ALLGEMEINES

Schnell **erschöpft durch die geringste Anstrengung** (Ars., Lach., Nat-c., Phos., Rhus-t., Tub.), schlimmer nach Durchfall (Ars, Chin, Nat-s, Phos, Podo., Verat.), Hunger (Crot-h., Iod., Phos., Sulph., Zinc.) und Schweiß (Camph., Chin., Merc.).

Abmagerung bei Kleinkindern trotz Heißhunger (Calc., Cina, Iod., Nat-m., Sulph.).

Die meisten Beschwerden werden **schlimmer nachts** (Ars., Lach., Merc., Sulph.), in **feuchtem Wetter** (Am-c., Ars., Calc., Dulc., Nat-s., Puls., Rhod., Rhus-t.) und **durch Wärme in jeder Form** (Sommer, warme Luft, warmer Raum, warmes Bett, warmes Einhüllen). **Besser draußen an der kalten oder frischen Luft** (Apis, Arg-n., Iod., Kali-s., Puls., Sec.).

Die Beschwerden sind schlimmer auf der rechten Körperhälfte.

Harte, verhärtete, knotige Drüsen, mit Tendenz zu Krebserkrankungen.

Reaktionsmangel.

Das Mittel ist dafür bekannt, die Rückresorption von Exsudaten zu beschleunigen (Ant-t., Ars., Kali-i., Lyc., Phos., Sulph.).

SYPHILINUM

(Syphilisnosode - Syph.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Unsoziales Verhalten (Anac., Aur., Cupr., Hyos., Nat-c.); perfekte Lügner (Morph., Op., Verat.).

Zwangsneurosen (Arg-n., Ars., Cupr., Iod., Kali-c., Nat-m., Nux-v., Sulph., Tub.) wie ständiges Händewaschen, häufiges Kleiderwechseln usw.
Aufsässige, **ungehorsame** Kinder (Chin., Merc., Sacch., Tarent., Tub., Verat.).
Andauerndes grundloses Weinen bei Neugeborenen (Cham., Hyos., Ign., Kali-c., Puls., Thuj.).

KÖRPER

Sehr **mager** (Abrot., Iod., Nat-m., Stann., Tub.).

Entwicklungsverzögerung (Bar-c., Calc., Calc-p., Phos., Sil.); verspätete Entwicklungsschritte.

Körperliches Erscheinungsbild: Kahler Kopf; Zahnkaries; deformierte Nägel (Graph., Sil., Thuj.); dicker Bauch; rissige Zunge; flache, breite Nase; vorgewölbte Stirn (Bell., Cupr., Hell.); offene Fontanellen (Calc., Calc-p., Merc., Sil., Sulph.); eingesunkene Augen; dicke, aufgeworfene Lippen (Bufo, Op., Plat., Zinc.).

Angeborene Missbildungen (Agar., Bufo, Caust., Hell., Med., Merc., Op.). ►

Plötzliche unerklärliche Fehlgeburten in der Anamnese der Mutter.

Reaktionmangel (Am-c., Hell., Laur., Op., Sulph., Tub.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Unsoziales Verhalten (Anac., Aur., Cupr., Hyos., Nat-c.); sehr **gute Lügner** (Morph., Op., Verat.).

Ständiges Händewaschen (Lac-d., Med., Merc., Nat-sil., Sulph.) aus Furcht vor ansteckender Krankheit (Borx., Calc., Lach., Sulph.).

Grundloses andauerndes Weinen bei Neugeborenen (Cham., Hyos., Ign., Kali-c., Puls., Thuj.).

Konzentrationschwierigkeiten beim Lernen oder Rechnen; führt dazu, dass er alles **wiederholt kontrollieren** muss (Arg-n., Ars., Brom., Carc., Iod., Nat-m.); besonders schwach in Mathematik (Alum., Aur., Merc., Nat-c., Ph-ac., Psor.,

Aufsässige und **ungehorsame** Kinder (Merc., Sacch., Tarent., Tub., Verat.).
 Schreien und Kreischen bei geringstem Zorn; schlägt mit der Faust gegen die Wand oder schlägt den Kopf gegen die Wand (Bell., Hyos., Med., Nat-c., Tub.).
Schlechtes Kurzzeitgedächtnis; schlechtes Gedächtnis für Orte, Namen, Gesichter, Daten usw.; gutes Langzeitgedächtnis (Bell., Elaps., Hyos.).
 Abneigung gegen Gesellschaft.
 Nägelbeißen (Bar-c., Carc., Med., Sacch.).
 Extravagant; neigt zur Geldverschwendung.
 Furcht vor Katzen (Bac., Med., Tub.) und Schlangen (Elaps, Lac-c., Lac-f., Lach.).
 Simulieren Krankheiten (Bell., Ign., Op., Puls., Tarent., Verat.).
 Hochmütig; fühlt sich als große Persönlichkeit (Agar., Cupr., Lach., Plat., Verat.).
 Hypochondrie (Ars., Ign., Mag-m., Nux-v., Puls., Sulph.).
 Gleichgültigkeit gegenüber Familienmitgliedern und nahestehenden Menschen (Hell., Phos., Sep.).
 Kleptomanie.
 Verschlissen.
 Lampenfieber.
 Verzweifelt häufig beim geringsten Anlass.

KOPF

Kindliche Migränen, die allen Behandlungen widerstehen (Nat-m., Sil., Sulph., Tub.); **heftige, pochende und pulsierende Schmerzen** (Bell., Gels., Glon., Nat-m., Sang.) mit Photophobie (Ferr-p., Kali-p., Nat-s.).
Wahnsinnige Schmerzen; schlägt mit dem Kopf gegen die Wand (Ars., Bell., Stram.).
 Migränen, die **bei Sonnenuntergang beginnen und bis Sonnenaufgang andauern** (Hep., Merc.).
 Schmerzen erstrecken sich die Wirbelsäule hinunter, **ziehen den Kopf nach hinten** (Arg-n., Cic., Hell., Nux-v., Op., Stram.).
 Sonnenstich (Aml-ns., Bell., Glon., Nat-c., Ther.).
 Untersuchungsergebnisse:
Angeborene Alopezie (Bar-c., Fl-ac., Graph., Nat-m., Phos., Sil., Zinc.).
Angeborene Gliomatose (Bar-c., Bell., Plb.).
Offene Fontanellen (Calc., Calc-p., Merc., Sil., Sulph.).
 Beerenaneurysma im Gehirn.
 Angeborene Hirnatrophie.
 Angeborene Missbildung des Hirns, wie Dandy-Walker-Syndrom.
 Schmutzig aussehende Ausschläge (Psor., Sulph., Thuj.).
 Frühes Ergrauen der Haare; das Haar fällt büschelweise aus.
 Vorgewölbte Stirn.
 Hydrozephalus.
 Großer Kopf (Calc., Calc-p., Merc., Sil.).
 Schmerzhaftes Exostosen (Aur., Kali-i., Merc.).
 Faltige Stirn (Cham., Hell., Lyc., Nux-v., Stram.).

AUGEN

Chronisch **rezidivierende phlyktänulöse** (bläschenartige) **Entzündung** am Bindehautrand, die auf die **Cornea** übergreift (Calc., Merc., Sulph., Thuj.) und zu Ulzerationen führt.

Frühe **Myopie** (Agar., Phos., Phys., Puls.) bei Kleinkindern.

Augenschmerzen **nachts** schlimmer (Merc., Merc-c., Zinc.), besser durch Baden der Augen in **kalttem Wasser** (Apis, Aur., Form., Phos., Puls.).

Verklebte Augen nachts (Alum., Graph., Lyc., Sep.).

Chronische pustuläre Konjunktivitis (Apis, Calc., Graph., Puls., Sulph.), mit eitrigen Absonderungen.

Reichliche, ätzende, wundmachende Tränen.

Vertikale Diplopie (Cic., Kali-bi., Stram.); sieht ein Bild unter dem anderen.

Untersuchungsergebnisse:

Akute Ophthalmia neonatorum (Apis, Arg-n., Ars., Nit-ac., Puls., Thuj.).

Atrophie des Sehnervs.

Angeborener konvergenter Strabismus (Camph., Cic., Cina, Cycl., Lyc., Op.).

Kortikal bedingte Blindheit (Merc., Sil., Stram.).

„**Schläfriges Aussehen**“ durch herabhängende Lider (Caust., Gels., Graph.).

Angeborener grauer Star.

Geschwüre der Hornhaut.

Haarausfall der Augenbrauen, Ausfall der Wimpern.

Foster-Kennedy-Syndrom.

Horner-Syndrom.

Entzündung mit deutlicher Rötung der Lidränder.

Interstitielle Keratitis.

Iritis.

Ptoxis; Lähmung des M. Obliquus superior (Caust., Gels., Rhus-t., Spig.).

Schwellung der Oberlider.

OHREN

Chronische Otitis media.

Chronische Ulzeration an Stellen, die durchbohrt wurden (Kali-m., Lach., Med., Stann.).

Eingeschränktes Hörvermögen oder Taubheit ohne ersichtliche Ursache.

Neuralgien, die das Kind schreiend (Cham., Ferr-p.) aus dem Schlaf aufwachen lassen.

Untersuchungsergebnisse:

Extreme Empfindlichkeit des Processus mastoideus (Caps.).

Völlige Taubheit (Caust., Hep., Lyc., Sulph.).

Abszessbildung oder Eiterbeulen im Mittelohr.

Bera-Test positiv.

Kalkablagerungen auf dem Trommelfell (Calc-f.).

Katarrhalische Taubheit (Calc., Kali-m., Kali-s., Puls., Sil.).

Lähmung des VI. Hirnnervs (Nervus abducens).

Rinne-Test: Knochenleitung stärker als Luftleitung.

Wässrige, eitrige, sehr stinkende Otorrhoe (Kali-bi., Kali-s., Merc., Psor., Sil.).

NASE

Häufig Schnupfen (Merc., Nit-ac., Nux-v., Puls.).

Trockenheit der Nasenschleimhäute, mit chronischer Verstopfung nachts (Am-c., Ferr-i., Lyc., Mag-c., Nux-v.).

Ozäna mit dicker, gelblich-grüner, übelriechender Absonderung.

Schniefen bei Neugeborenen (Dulc., Lyc., Merc., Nux-v., Puls., Samb.).

Neigung zu rezidivierendem Nasenbluten (Ferr., Ferr-p., Sil.).

Untersuchungsergebnisse:

Chronischer **retronasaler Katarrh** (Hep., Kali-bi., Nat-c., Nat-m., Sep.) mit Krusten- oder Schuppenbildung in den hinteren Nasenhöhlen (Bar-c., Bufo, Calc-ar., Sep.).

Breite und flache Nase.

Bräunliche oder gelbliche Verfärbung, wie ein Sattel, über dem Nasenrücken (Lyc., Op., Sanic., Sep., Sulph.).

Karies der Nasenknöchel (Asaf., Aur., Hecla, Phos., Sil.).

Perforiertes Nasenseptum (Alum., Kali-bi., Kali-i., Merc., Sil.).

GESICHT

Einseitige Gesichtslähmung mit Problemen beim Sprechen (Dulc.).

• Untersuchungsergebnisse:

Kinder, die **alt aussehen** und **faltig** (Calc., Nat-m., Op., Sep.).

Angeborene asymmetrische Entstellung des Gesichts.

Risse in den Mundwinkeln, bei verdickten Lippen (Bufo, Mez., Op.).

Eczeme mit Krustenbildung, besonders am Kinn (Graph., Merc-i-r.).

Das Gesicht wird bei Kopfschmerzen rot (Bell., Glon., Mill., Op.).

Verhärtete Schwellung der Unterkieferdrüsen.

MUND

Reichlicher Speichelfluss nachts, besonders im Schlaf (Bar-c., Lyc., Merc., Puls., Rhus-t.).

Abbrechende Zähne (Borx., Calc-f., Lach., Plb., Sil.) durch dauerndes Zusammenpressen der Kiefer.

Schwierige Zahnung.

Verspätetes Sprechen.

Untersuchungsergebnisse:

Gaumenspalte.

Schmutzig-weißer Zungenbelag mit **zwei tiefen Längsrissen**, die parallel zur Medianlinie verlaufen.

Schwammige Landkartenzunge, mit **deutlichen Zahneindrücken** (Chel., Merc., Rhus-t., Sep.).

Zähne: Verformt, verkümmert, gezackt; Hutchinson-Zähne; schneller Zerfall, besonders an den Wurzeln und den Zahnfleischrändern (Am-c., Fl-ac., Merc., Mez., Sil., Thuj.).

Aphasie mit Heraustreten der Zunge (Crot-h., Lach., Plb., Stram.).

Zähneknirschen.

Mundgeruch.

Ranula (Ambr., Calc., Nat-m., Thuj.).
Schwellung und Ulzeration von Zunge, Gaumen und Mundschleimhäuten, mit
Ablösung, Bluten, speckiger Basis.
Dicke Lippen (Bufo, Op., Plat.).
Ulzerative Stomatitis.

HALS

Akute, schmerzhaft Pharyngitis.
Chronische Tonsillenhypertrophie (Bar-c., Calc-i., Tub.).
Halsschmerzen nach kalten Getränken (Lyc., Sabad.); breiten sich meistens von
der rechten zur linken Seite aus (Bell., Merc-i-f.).
Untersuchungsergebnisse:
Harte, palpable Halsdrüsen.
Tracheoösophagealfistel (Phos., Sil.).

MAGEN

Gallengang-Atresie (Nat-s.).
Keine Speise sagt ihm zu oder stellt ihn zufrieden (Ant-c., Nux-v.).
Gesteigerter Appetit bei Kopfschmerzen (Phos., Sep.).
Unstillbarer Durst auf große Mengen Wasser.
Hartnäckige Neugeborenenengelbsucht.
Erbrechen beim Husten (Bry., Ipec.).
Abneigung: Fleisch (Chin., Nux-v.).
Untersuchungsergebnis:
- Angeborene hypertrophische Pylorusstenose.

ABDOMEN

- Untersuchungsergebnisse:
Abszess in der Leistenregion.
Angeborenes Megakolon.

REKTUM

Hartnäckige Verstopfung, die ein Albtraum für die ganze Familie ist; **zeitweise kein Stuhlgang über Wochen** (Bry., Coll., Nat-m., Nux-v., Plb.).
Schmerzloser Durchfall, besonders **nachts** (Chin., Puls., Verat.) und in den frühen Morgenstunden.
Ätzende, gelbliche oder orange Stühle (Colch., Lach., Sul-ac.).
Jucken im Anus.
Hartnäckiger Durchfall.
Schmerzen im Rektum bei Stuhlgang.
Untersuchungsergebnisse:
Anus imperforatus (angeborene Fehlbildung, anorektale Atresie).
Abszessbildung oder Ulzeration im Rektum.
Fissuren in Anus und Rektum (Mur-ac., Thuj.).
Feuchte Absonderungen aus dem Rektum (Nit-ac., Sulph.).
Rektumprolaps (Aloe, Podo.).
Rektalpolypen (Kali-br., Phos.).
Strikatur oder Fissur der Rektalschleimhaut (Calc-sil., Ruta).

HARNWEGE

Das Kind uriniert selten (Canth., Merc.), vielleicht nur einmal alle 24 Stunden, aber hat einen reichlichen Fluss.

Reichliches Urinieren nach dem Froststadium bei Fieber (Med.).

Das Kind muss warten, bis der Urin zu fließen beginnt (Lyc., Sep.); kann ihn leichter im Stehen abgeben (Caust., Sars.).

Angeborene Missbildung der Nieren.

Schaumiger und brennender Urin.

Nephrotisches Syndrom.

Enuresis nocturna (Caust., Puls.).

Untersuchungsergebnis:

- Alport-Syndrom.

MÄNNLICHE GENITALIEN

- Untersuchungsergebnisse:

- Entzündung von Hoden und Samensträngen (Spong.).

- Angeborene Hydrozele (Puls.).

- Kindliche Genitalien noch in der Pubertät.

- Phimose (Merc., Nit-ac.).

- Hodenhochstand (Kryptorchismus) (Clem., Rhod.).

WEIBLICHE GENITALIEN

Reichliche, ätzende, übelriechende und gelbliche Leukorrhoe bei jungen Mädchen, besonders nachts.

Extreme Empfindlichkeit der Genitalien gegen Berührung.

Jucken durch Leukorrhoe (Calc., Kreos., Sep.).

Rezidivierende Vulvovaginitis.

Untersuchungsergebnisse:

- Candida albicans ++.
- Trichomonaden-Vaginitis.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Rezidivierende Aphonie.

Untersuchungsergebnis:

- Tracheomalazie.

ATMUNG

Asthmatische Atmung im **Sommer** (Arg-n.), bei **feuchtem Wetter** (Aur., Chin.) und besonders **vor und bei Gewitter** (Sep., Sil.); besser in bergigen Gegenden.

Chronisches Asthma, abwechselnd mit Ausschlägen.

Schwierige Atmung nachts, besonders von 1-4 Uhr (Kali-bi., Kali-c.).

Untersuchungsergebnisse:

- Deutliche Rasselgeräusche auf beiden Lungenseiten.
- Keuchen.

HUSTEN

Der Husten ist schlimmer **im Winter und Frühling** (Cina, Gels., Verat.).

Kann nicht auf der rechten Seite liegen durch Husten (Cina, Merc., Phos., Spong., Stann.); **besser in Bauchlage** (Am-c., Calc., Med., Phos.).

Trockener, harter, schüttelnder Husten schlimmer nach dem Abendessen (Cocc., Ipec.) und nachts, weckt das Kind aus dem Schlaf; besser nach Sonnenaufgang (Agar., Coc-c.).

Keuchhusten, mit eitrigem Auswurf.

HERZ UND KREISLAUF

Herzklappenfehler.

BRUST

Untersuchungsergebnisse:

Rachitischer Rosenkranz (Calc., Merc., Sil.).

Entzündung der Rippenknorpel (Arn.).

Hühnerbrust.

RÜCKEN

Rheumatische Schmerzen im Rücken von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang (Nat-m., Nit-ac.) und besonders nach dem Urinieren (Caust.).

Autoimmunerkrankungen, Kollagenosen.

Rheumatische Arthritis.

Untersuchungsergebnisse:

Verkrümmung von Cervical- und Dorsalregion (Calc., Phos.); Kyphoskoliose.

Vergroßerte Halsdrüsen (Bar-m., Calc., Iod., Sil.).

Halsrippe.

Meningomyocele (Bell, Gels, Op).

Spina bifida (Calc, Calc-s, Psor, Sil).

Tuberkulose der Wirbel (Aur., Calc-p., Iod., Phos., Tub.).

EXTREMITÄTEN

Die Schmerzen in den Knochen und die rheumatischen Beschwerden sind schlimmer nachts (Kali-i., Phyt.).

Verlangen, seine Hände ständig bedeckt zu haben (Ign.).

Steifheit der Fingergelenke.

Untersuchungsergebnisse:

Krümmung und Beugung der langen Röhrenknochen (Calc., Calc-p., Lyc., Sil.).
Osteosarkom.

Empfindlichkeit der Tibia (Lach., Rhus-t.).

Angeborene Hüftluxation (Calc., Caust., Thuj.).

Kontraktion der Muskeln und Sehnen der Glieder, besonders der Beugemuskeln der oberen Glieder.

Verkrüppelte Nägel, mit Umlauf.

Abmagerung der Glieder.

Exostose.

Hände kalt und feucht.
 Die Perkussion der Knochen ist schmerzhaft.
 Psoasabszess.
 Überzählige Finger oder Zehen.

HAUT

Rezidivierende Abszessbildung (Arn., Pyrog., Sulph., Tub.).

Untersuchungsergebnisse:

- Papierdünne Haut (Nat-m.).
 Erysipel.
 Intertrigo.
 Warzen.

SCHLAF

Schlaflosigkeit bei Säuglingen, die ohne ersichtlichen Grund weinen (Coff.).

ALLGEMEINES

Periodische Verschlechterung **jeden 2. Vollmond.**

Kaltes Baden bessert (Apis, Aur-m., Calc-s., Nat-m., Puls.).

Abmagerung und gehemmtes Wachstum bei Kindern (Abrot., Calc., Nat-m., Sil.).

Unerträgliche Schmerzen, die allmählich kommen und gehen (Nat-m., Plat., Stann.).

Langsame kontinuierliche Bewegung bessert fast alle Beschwerden (Ferr., Mag-m., Puls., Sulph.).

Das Kind ist völlig gesund beim Aufenthalt im Gebirge und in **Höhenluft** (Tub.).

Kinder mit Familiengeschichte von Alkoholismus, Apoplexie, chronischen Depressionen, Geisteskrankheit, Syphilis, Herzklappenfehlern etc.

Kinder mit einer Geschichte von rezidivierenden Abszessen, Eiterbeulen oder Tonsillitiden.

Feuchtes Wetter verschlimmert allgemein (Rhus-t.).

Übelriechender Schweiß.

Schwellung und Verhärtung der Drüsen.

Neigung zu Knochenerkrankungen wie Exostose, Osteomyelitis, Osteoklastom, Osteosarkom, Osteochondritis und Periostitis.

Schwäche am Morgen beim Erwachen.

TARENTULA HISPANICA

(Spanische Spinne, Tarantel - Tarent.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Der **Typ des quirligen Gauners**, wie ein Schachtelteufel: Unglaubliche Schnelligkeit; springt plötzlich auf; kann keine Sekunde stillsitzen (Hyos., Merc., Rhus-t.); plötzliche Impulse.

Wollen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen (Calc-s., Hyos., Ign., Mag-m., Plat., Puls., Stram., Tub.); das tun sie, weil sie sich verlassen und vernachlässigt fühlen, wenn die Eltern beruflich zu sehr beschäftigt sind oder sich streiten.

Kann jede x-beliebige **Krankheit simulieren** (Bell., Plb., Puls., Verat.).

Voller Aktivität und grenzenloser Energie, wie ein unermüdliches Pferd; unglaublicher Überfluss an Energie.

Uneheliches Kind, dessen Mutter unter unerwiderter Liebe litt (Hyos., Ign., Nat-m., Staph.).

Zappelig (Sulph., Stram., Zinc.), greift sich alles und muss es anfassen.

Schlau (Lach., Med., Nux-v., Sacch.) und destruktiv (Carc., Tub.).

KÖRPER

Tanzen bessert (Ign, Sep).

Isst Unverdauliches wie Sand, Asche, Kreide, rohe Kartoffeln etc.

Will dauernd kaltes Wasser in großen Mengen trinken (Ars., Bry., Phos., Verat.).

Besonders hartnäckige Verstopfung, bei der auch Einläufe und Abführmittel versagen (Calc., Nux-v., Op.).

Sehr empfindliche Fingerspitzen (Lac-c., Staph., Sulph.).

Schnelle Bewegungen.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Beschwerden durch: **Zorn**, schlechte Nachrichten, bestraft oder getadelt werden, **Gefühlerregung**, übermäßige Freude, Kummer.

Antwortet sehr schroff und grob (Calc., Hep., Nux-v., Puls.). Sie können sogar beleidigend und kränkend gegenüber ihren eigenen Eltern sein (Lyc., Plat., Tub.).

Abneigung gegen Gesellschaft, mit Furcht vor dem Alleinsein (Con., Nat-m., Sep.).

Abneigung gegen Licht; sie **lieben die Dunkelheit** (Aur., Bry., Phos.).

Kinder, die sehr aktiv, energiegeladen und ruhelos sind; rennen herum oder

Schlaue und hinterlistige (Lach., Nux-v., Op., Sacch.) Kinder; **sehr manipulative Naturen** (Puls., Sulph., Thuj., Tub.).

Aufregung beim Hören von Musik, mit Singen und Tanzen (Aur., Carc., Croc., Nat-sil.).

Unwillkürliches und maßloses Lachen über Kleinigkeiten (Cann-i., Ign.).

Bösartig, mit Hass und Rachsucht gegenüber denen, die ihn beleidigt haben (Aur-m., Nat-m., Sulph.).

Schamlose Kinder mit Verlangen sich auszuziehen und nackt zu bleiben (Hyos., Phos., Verat.).

Plötzlich wechselnde Stimmung; **Gleichgültigkeit, Traurigkeit oder Schreien abwechselnd mit Heiterkeit und Gelächter** (Androc., Stram.).

Wutanfälle (Bell., Cham., Cina, Hyos., Nux-v., Tub.); rollt sich auf dem Boden von einer Seite zur anderen (Ars., Calc., Op., Sulph.) und schlägt seinen Kopf mit den Händen (Ars., Bell., Hyos., Stram., Tub.) oder schlägt ihn im Zorn gegen die Wand (Bell., Mill., Tub.); zieht an Haaren (Bell., Cupr., Med., Tub.).

Diese Kinder empfinden oft **Farben** sehr stark; sie haben entweder eine **Abneigung oder ein Verlangen nach dunklen** (Ign., Lach., Nux-v., Sep.) oder intensiven Farben wie **Schwarz** (Ign.), Blau, Rot, Gelb und Grün.

Bedrohen ihre Eltern und Verwandten (Hep., Stram., Tub.).

Heftiger Zorn durch Widerspruch und bei **Berührung** (Ant-c., Cham., Cina, Iod.), mit Verlangen anzugreifen oder zu kämpfen.

Mangel an Moralempfinden (Bell., Hyos., Stram., Verat.); große Lügner mit kleptomanischen Tendenzen; stehlen heimlich Geld.

Nägelbeißen.

Hellsichtigkeit.

Auflehndes Benehmen; trotzig, tut das Gegenteil.

Ungehorsam und destruktiv (Bell., Stram., Tub.), neigt dazu, Dinge zu zerreißen, besonders Kleidung, im Zorn oder wenn seine ewigen Launen nicht befriedigt werden.

Lässt Dinge fallen aus Ungeschicklichkeit.

Furcht vor Spinnen und Monstern.

Simuliert Krankheit.

Sind gerne dauernd aktiv und beschäftigt, auch wenn nichts dabei herauskommt (Apis, Lil-t.).

Lieben Puzzles und Spiele, bei denen Denkvermögen und Intelligenz gefordert sind. Monomanie.

Selbstsüchtig und habgierig.

Sehr impulsive und hastige Kinder, gehen sehr schnell (Arg-n., Sul-ac.).

Ringt andauernd die Hände (Asar., Kali-p., Phos., Stram., Sulph.); macht unwillkürliche Bewegungen, als würde er stricken oder greifen; spielt dauernd mit den Fingern (Calc., Mur-ac.).

KOPF

Will ständig die Haare **gebürstet** haben oder an ihnen **ziehen** und **den Kopf gerieben** und **massiert** bekommen (Bell., Cupr., Med., Tub.).

Bohrt den Kopf ins Kissen (Apis, Bell., Hell., Med., Stram., Tub.).

Kopfschmerzen durch Verdauungsstörung (Ant-c., Bry., Ipec., Nux-v., Puls., Sulph.).

- Untersuchungsergebnisse:

Ruckt, rollt oder wirft den Kopf ständig unwillkürlich umher (Agar., Cupr., Hyos., Stram.).

Kopfschweiß beim Husten (Ant-c., Calc., Ipec., Merc., Sil.).

Heißer Kopf mit rotem Gesicht (Aeth., Bry., Mag-c., Nat-c., Plb.).

Schaukelt den Kopf von einer Seite zur anderen, um die Schmerzen zu erleichtern (Agar., Cina, Med.).

AUGEN

Die Augenlider sind am Morgen verklebt.

Photophobie bei Kopfschmerzen; unfähig, die Augen offen zu halten (Nux-v., Ph-ac.).

Starrer Blick, wenn er Musik hört.

Untersuchungsergebnisse:

- Virale Konjunktivitis ++.

Hornhauttrübung.

Rollende Bewegungen des Augapfels (Agar., Bufo, Cupr., Stram., Zinc.).

OHREN

Ohrenschmerzen, wenn er mit den **Fingern** in den Ohren **bohrt** (Anac., Ruta, Sep.).

Untersuchungsergebnisse:

Reichliche, **bräunliche Absonderungen** aus den Ohren (Anac., Kali-s., Nit-ac., Psor.).

Rote Ohren (Apis, Chin., Puls.).

NASE

Schnupfen aus dem rechten Nasenloch (Ars., Calc-s., Sang.).

Nasenbluten mit dunklem, schwarzem, geronnenem Blut, besonders aus dem **linken** Nasenloch (Ferr., Kali-n., Sep.), wenn er sich das Gesicht wäscht (Am-c., Arn., Calc-s., Kali-c.).

Untersuchungsergebnisse:

- **Bohrt** dauernd **mit den Fingern in der Nase** (Arum-t., Cina, Sil., Zinc.).

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:

Markante Nasolabialfalte (Cina, Phos., Stram.).

Dauerndes Zupfen an den Lippen (Arum-t., Bry., Lach., Nit-ac., Nux-v., Stram.).

Zusammengepresste Kiefer.

Verzerrung des Mundes.

Abmagerung des Gesichts.

Dummer (Agar., Laur., Lyc., Stram.) oder erschreckter Gesichtsausdruck.

Impetigo (Ant-c., Calc., Graph., Mez., Rhus-t.) besonders um die Lippen.

Gesichtsschweiß bei Husten (Ipec.).

Schwellung und Entzündung der Unterzungendrüsen.

MUND

Langsame Zehrung (Calc., Calc-n., Sil., Tub.).

Nahrung schmeckt sauer oder salzig (Merc., Nat-m.).

Untersuchungsergebnisse:

Steckt dauernd die Finger in den Mund (Calc., Cham., Ipec., Sacch., Sil.).

Aphthöse Geschwüre auf der Zunge.

Blutendes Zahnfleisch.

Dauerndes Verlangen, die Zähne zusammenzubeißen (Bufo, Hyos., Phyt.).

HALS

Der äußere Hals ist sehr empfindlich gegen Kleidung (Cench., Lach., Sep.).

Spasmen und Schmerzen im Hals, erstrecken sich zu den Ohren beim Schlucken (Elaps, Gels., Lac-c., Nit-ac., Nux-v.).

Untersuchungsergebnisse:

Dunkelrote oder violette Verfärbung des Pharynx (Ail., Lach.).

Schwellung und Entzündung der Tonsillen, besonders der rechten.

Schwellung der Halsdrüsen.

MAGEN

Entweder durstlos oder **unstillbarer Durst auf große Mengen Wasser** (Ars., Bry., Nat-m., Phos., Sulph.).

Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen nach Essen (Nux-v., Phos.); besser durch Abgang von Blähungen und Aufstoßen.

Galleerbrechen am Morgen.

Würgen und Erbrechen bei Husten.

Verdauungsstörung nach Kummer oder Ärger (Cham., Ign.).

Heißhunger, besonders nachts (Chin., Pos., Psor.).

Langsame Verdauung.

Abneigung: Brot, **Schokolade** (Chin., Sacch.), Kakao, Fleisch.

Verlangen: Kalte Getränke, stark gewürzte Speisen (Hep., Puls.), **unverdauliche Dinge** (wie **Asche**, Kreide, Ton, Erde, **Sand**, Griffel etc.) (Lach., Sil.), Zitrone, rohe Speisen (Lycps-v., Mag-s., Sulph.), salzige Speisen.

ABDOMEN

Die Bauchschmerzen reichen bis in die Leistengegend herab, besonders beim Husten, besser durch Zusammenkrümmen (Coloc., Kali-c., Puls.).

Intussuszeption (Ars., Bell., Op., Plb., Verat.).

Eingeklemmte Blähungen (Aur., Chin., Nit-ac., Puls.).

Untersuchungsergebnisse:

Aszites.

Vergrößerte Leber.

Schwellung der Leistendrüsen.

REKTUM

Lähmung des Rektums (Mur-ac., Plb., Sil.).

Schwere Verstopfung, die durch Abführmittel oder Einläufe nicht erleichtert wird; **die Stühle bleiben lange im Rektum ohne Stuhldrang** (Bry., Nat-m., Nux-v., Plb., Sulph.).

Stühle: **Schwarz** (Coll., Merc., Op., Plb., Verat.), übelriechend und **ölig** (Caust., Iod., Iris, Phos.).

Blutung aus dem Anus bei Stuhlgang.

Die Stühle sind anfangs hart, gefolgt von einer wässrigen Flüssigkeit.

Untersuchungsergebnisse:

Stuhl: **Fett ++** (Caust., Iod., Phos.), Erythrozyten ++.

Koloskopie: Angeborenes Megakolon.

HARNWEGE

Unwillkürliches Urinieren bei Verstopfung (Lyc.).

Hält den Urin zurück; kann ihn nur abgeben, wenn er allein ist (Ambr., Hep., Lyc., Nat-m.) oder wenn er laufendes Wasser oder Musik hört (Lyss., Zinc.).

Unterdrückung von Urin durch Wirbelsäulenverletzung (Arn.).

Zystitis oder Glomerulonephritis mit dauerndem vergeblichem Harndrang, mit Abgang von dunkelrotem oder braunem Urin (Benz-ac., Chin., Merc.), der sehr aggressiv ist (Apis, Bapt., Carbo-veg., Dulc., Nit-ac., Sep.).

Unwillkürliches Urinieren beim Laufen, Husten, Niesen oder Lachen.

Untersuchungsergebnisse:

- Reichliches, rotes Sediment in der Windel (Canth., Lyc., Merc-c., Nat-m., Sep.).

Urin: Albumin +, Erythrozyten ++ (Bufo), Zucker ++ (Helon., Lyc., Plb.).

Blasensteine.

Urethralklappe.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Tendenz zu masturbieren (Hyos., Lach., Merc., Phos.).

Untersuchungsergebnisse:

Hodentumor (Aur.).

Gangränöse Infektion des Penis durch Paraphimose (Ars., Lach., Merc.).

Schlaffes Skrotum.

Hoden verwachsen mit dem Skrotum, sehr berührungsempfindlich.

WEIBLICHE GENITALIEN

Extreme Empfindlichkeit der Genitalien (Lyss., Plat., Staph.).

Jucken und Trockenheit der Vulva.

Masturbation bei kleinen Mädchen (Hyos., Lach., Merc., Phos.).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Trockenheit, Reizung und Kitzeln in Larynx und Trachea reizen das Kind dauernd zum Räuspern (Brom., Phos., Rumx.).

Heiserkeit am Tage, besonders beim Erwachen am Morgen (Iod., Par.).

Laryngismus stridulus.

ATMUNG

Schwierige Atmung beim Sitzen im Bett oder **Hinlegen** besonders auf der **linken Seite** (Apis, Kali-c., Puls., Spig.).

Keuchende Atmung nachts und **am frühen Morgen um 5 Uhr** (Kali-i.).

Keuchen bei körperlicher Anstrengung.

HUSTEN

Husten durch **Geräusche** (Arn., Ph-ac.) und durch **Aufregung** (Cham., Op., Spong.), mit Würgen und Erbrechen.

Husten beim Erwachen am Morgen, durch Reizung oder Kitzelgefühl im Larynx. Krampfartiger, erstickender, anfallsweiser und meist anstrengender Husten, besonders **nachts** (Caust., Hyos., Puls.).

BRUST

Die Herzgegend ist empfindlich auf Kleiderdruck (Caust., Lach., Merc.).

Untersuchungsergebnisse:

Abszessbildung in der Achsel.

Bronchialatmen.

Röntgen/Thorax: Letztes Stadium von Lungentuberkulose mit Kavernenbildung.

Keuchen.

HERZ UND KREISLAUF

Rheumatische Schmerzen im Herzen oder Herzklappenerkrankung mit erschwerter Atmung (Adon., Laur., Lycps-v.).

Rheumatische Endokarditis (Aur., Kalm., Lach., Phos.).

Untersuchungsergebnisse:

Puls: Klein und langsam oder frequent, schwach und intermittierend.

Systolische und diastolische Geräusche (Ferr-i., Naja., Spig.).

RÜCKEN

Schmerzhaft **empfindliche Wirbelsäule; Berührung ruft Schmerz** in Brust und Herzgegend hervor (Agar., Chinin-s., Zinc.).

Untersuchungsergebnis:

- Wirbelsäulenverkrümmung.

EXTREMITÄTEN

Ein nützliches Mittel bei verschiedenen Typen von erblicher Ataxie (Friedreich- Ataxie, Kleinhirnataxie) und Chorea (Sydenham-Chorea).

Rucken und choreatische Bewegungen der Glieder (Agar., Caust., Mygal.).

Ruhelosigkeit der unteren Glieder, besonders nachts im Bett (Caust., Rhus-t.); besser durch Bewegung (Ars., Rhus-t.) und durch Musikhören.

Torkelnder Gang; kann besser rennen als gehen (Bufo, Nat-m, Stram).

Schwache Beine (Cocc., Nat-s., Nux-v., Plb., Rhus-t.); kann nicht sicher auftreten; sie scheinen seinem Willen nicht zu gehorchen.

Multiple Sklerose.

Schweiß der Handflächen und Füße.

Nützlich in Fällen von Verletzungen des Hüftgelenks.

Untersuchungsergebnisse:

- Abszess.

Blaue Fingernägel.

Kontraktion der Muskeln und Sehnen der unteren Gliedmaßen und Finger.

Ruhelose, zapplige Hände und Finger, die dauernd an etwas zupfen müssen.

HAUT

Ungesunde Haut mit tiefen schmerzhaften Abszessen, Eiterbeulen und Geschwüren von bläulichem Farbton (Tarent-c.), die oft stark brennen (Anthraci., Ars., Pyrog., Tarent-c.).

Abszesse, die aus Insektenstichen entstanden sind.

Untersuchungsergebnisse:

- Konfluierende Pickel (Cic., Ph-ac.).

Ekzem.

Impetigo.

Pigmentflecke.

FIEBER

Kalte Füße bei Fieber (Arn., Lach., Stram., Sulph.).

Schnupfen oder trockener Husten, mit intensiver Schläfrigkeit (Bapt., Nux-m.) bei Fieber.

Nützlich bei meningitischem Fieber.

SCHLAF

Will häufig das Bett wechseln, wegen dauernder Ruhelosigkeit (Cina, Hyos., Lach.).

Träumt, von wilden Tieren verfolgt zu werden (Lac-leo., Nux-v., Sil., Sulph.).

Schlaflos vor Mitternacht durch Aufregung.

Schlaflosigkeit oder leichtes Erwachen durch das geringste Geräusch.

KONVULSIONEN

Beschwerden durch: Tiefen Schlaf (Nux-v., Op.), Aufregung (Hyos., Op.), Schreck (Calc., Hyos., Ign., Kali-br., Op.), **Druck auf die Wirbelsäule** und durch den Anblick fremder Menschen (Lyss., Nux-v., Op.).

Während Konvulsionen: Zungenbiss, **bohrt den Kopf** ins Kissen, zusammengebissene Zähne, Verzerrung des Mundes, Zähneknirschen, **Eiseskälte des Körpers** (Camph., Hell., Oena., Verat.), unwillkürlicher Stuhlabgang, Risus sardonicus, Rollen oder Zucken des Kopfes, Strabismus oder **rollende Bewegungen der Augäpfel**, Stupor oder Bewusstlosigkeit.

Konvulsionen, Zucken oder choreatische Bewegungen, besonders der rechten Körperseite (Bell., Lyc., Nux-v.).

Epileptiforme oder klonische Konvulsionen, die periodisch auftreten (Bufo, Cedr., Chion., Cupr., Stram.), meist alle 15-20 Tage.

ALLGEMEINES

Fröstelig, aber verlangt nach frischer Luft (Camph., Puls., Tub.).

Abmagerung bei Hyperaktivität (Op., Tub.).

Reaktionsmangel (Am-c., Carbo-veg., Gels., Hell., Op., Sulph., Tub.).

Rechtsseitige Beschwerden (Apis, Crot-c., Lyc., Nux-v.).

Beschwerden durch Masturbation.

Kollaps, mit eisiger Kälte des Körpers (Camph., Verat.).

Beschwerden, die oft mit dem Mond zu- und wieder abnehmen (Clem., Phel.).

Verlangen, sich im Dunkeln hinzulegen.

Harte und verhärtete Drüsenschwellungen.

Intoleranz gegen Kleidung.
 Neurologische Beschwerden mit taubem Gefühl am ganzen Körper bei Berührung.
 Sepsis.
 Zittern des Körpers bei Gefühlen wie Schreck oder Freude.

GEMEINSAME MERKMALE VON TARENT., BELL., STRAM., TUB. UND VERAT.

Tarent, kann leicht mit Mitteln wie Bell., Stram., Tub. und Verat, verwechselt werden, da sie viele gemeinsame Symptome haben. Ich habe sie in der Verschreibung oft verwechselt. Die folgenden Symptome sind allen gemeinsam:

Beleidigend.
 Zerbricht Dinge.
 Chorea.
 Destruktivität.
 Epilepsie.
 Nasenbluten.
 Extremer Durst.
 Furcht vor dem Alleinsein.
 Frechheit.
 Intensiver und heftiger Zorn.
 Böartig und streitsüchtig.
 Krankhafter Impuls zu rennen.
 Aufsässig, dickköpfig.
 Photophobie.
 Ruhelos.
 Schamlos.
 Erstickender Husten.
 Heftiger Ärger mit Schlagen.
 Mangel an moralischem Empfinden.

ZINCUM METALLICUM	TARENTULA
Unterschiede:	
Ist leicht erschöpft. Ruhelosigkeit der Füße.	• Erhöhter Energielevel mit Gewalttätigkeit. • Ruhelosigkeit am ganzen Körper.
Gemeinsame Symptome:	
Verstopfung. Die geringste Berührung am Rücken löst einen Reflex aus, mit Reizung der Interkostalmuskeln. Dünn.	

PHOSPHORUS	TARENTULA
Unterschiede:	
• Getrieben und beeinflusst vom äußeren Geschehen. • Taubheit der Fingerspitzen.	• Hauptsächlich bestimmt durch innere Antriebe. • Kribbeln in den Fingerspitzen.

PHOSPHORUS	TARENTULA
Gemeinsame Symptome:	
Abmagerung. Kopfschmerzen, schlimmer durch Geräusche, Licht, Berührung. Gesteigertes sexuelles Verlangen. Liebe zu rohen Speisen. Kälteempfindlich. Linderung durch Reiben des betroffenen Körperteils.	

IODUM	TARENTULA
Unterschiede:	
Das Kind fürchtet Menschen und meidet daher jeden. Das Kind ist körperlich nicht so ruhelos wie Tarent und ist statt dessen leichter erschöpft, mit reichlicher Schweißbildung. Drüsenatrophie und Drüsenverhärtung sind markanter. Heißer Patient, mit Verlangen nach kühlerer Umgebung. Verlust an Substanz trotz Heißhunger. Nicht so konkurrenzbetont und hinterlistig. Das sexuelle Verlangen ist nicht so stark wie bei Tarent.	Das Kind lehnt Gesellschaft ab, aber will jemanden in der Nähe haben. Sehr ruheloses Kind, körperlich und geistig. Hysterische und nervöse Symptome sind charakteristisch. Frösteliger Patient. Abmagerung nicht durch Appetitmangel, sondern durch schnelle Sättigung. Sehr konkurrierende und hinterlistige Kinder, die jedes mögliche Mittel nutzen, um andere daran zu hindern, sie zu überholen. Frühes und starkes sexuelles Verlangen.
Gemeinsame Symptome:	
• Die meisten Beschwerden sind besser im Freien.	

ARSENICUM ALBUM	TARENTULA
Unterschiede:	
Ängstlichkeit und Ruhelosigkeit kommen durch innere Unsicherheit und sind mehr emotional gesteuert. Sehr fordernd, aber sind oft recht abhängig.	Ruhelosigkeit durch Überstimulation des ZNS. Nicht so abhängig. Sprechen sehr schnell und antworten schnell und schroff. Sie brauchen nur 2-3 Stunden Schlaf in der Nacht. Sie gehen sehr schnell, können auf niemanden warten und werden leicht ärgerlich, wenn andere Kinder vor ihnen langsam sind. Bedrohen Eltern und Geschwister und können gewalttätig reagieren. Sehr konkurrenzbetont (Nux-v.).
Gemeinsame Symptome:	
• Abmagerung.	

NUX VOMICA	TARENTULA
Unterschiede:	
• Das Kind braucht eine Menge Stimulantien wie Tee und Kaffee, um sein Lebenstempo aufrechtzuerhalten.	
Gemeinsame Symptome:	
• Hoher Energielevel. • Intensive und anstrengende Kinder, angetrieben durch Konkurrenzdenken.	

Beobachtungen bei Kindern, die ein Spinnenmittel brauchen

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE DER SPINNENMITTEL

GEIST

Ein starkes **Verlassenheitsgefühl** ist bei vielen Spinnenmitteln charakteristisch. Das kann sich psychisch ausdrücken, z. B. in Form von Beschwerden durch unerwiderte Liebe (Tarent.), in Wahnvorstellungen, dass Fremde im Raum seien (Tarent.) oder durch Träume vom Tod von Verwandten (Aran-ix.).

Die Hände und Finger sind ständig in Bewegung. Die Kinder spielen gern mit Seilen; Mädchen stricken sehr gern.

Die Kinder spielen gern mit Farben, Text-Markern etc. Sie **lieben dunkle oder kräftige Farben** wie Schwarz, Rot, Grün usw.

Schlau und hinterlistig. Sie wissen, wie sie bekommen, was sie wollen, denn sie sind Meister der Manipulation.

Voller Energie. Das Umfeld fragt sich, woher all diese Energie kommt.

Imitieren die Eltern, Lehrer, Schulfreunde, Straßenhändler etc. sehr gut.

Starkes Gefühl für **Rhythmus in der Musik** (Aur-Kinder bevorzugen normalerweise religiöse und symphonische Musik, während Nat-c.-Kinder romantische Musik genießen).

Ersinnen Geschichten als Ausdruck ihrer Vorstellungskraft oder auch um jemanden hereinzulegen (kann wie das „Seemannsgarn“ mit dem Spinnen von Netzen verglichen werden).

Wahnvorstellungen und Gehörstäuschungen; Sprache erscheint weit weg. Hier zeigt die Rubrik an, dass die Stimme der Person, die sie am meisten lieben, weit weg klingt. Die eigene Stimme kann jedoch unwirklich scheinen - eine Art Verlassenheitsgefühl.

Simulieren gern Krankheit; lamentieren und übertreiben ihre Symptome.

Geistig retardiert.

Brauchen viel Aufmerksamkeit.

Ruhelosigkeit führt zu Eile und Ungeduld.

Starker Impuls, Dinge anzufassen.

Bekommen Wutanfälle und sind sehr aggressiv und destruktiv.

Sie sind interessiert an Computerspielen wie Game Boy und Nintendo.

Nützliches Mittel bei Zuständen wie Aufmerksamkeitsdefizitstörung und Dyslexie/Legasthenie.

Kleine Kinder lieben es, auf dem Rücken der Eltern getragen zu werden.

ALLGEMEINES

Fröstelig.

Nimmt lieber flüssige Nahrung als feste zu sich.

Ausgeprägte tuberkulinische Züge.

Neigen schon als Kinder zum Drogenmissbrauch und rauchen in sehr jungen Jahren; großer Hang zu Sex und Pornographie in sehr frühem Alter.

Epilepsie, Chorea und verschiedene andere Formen von Dyskinesie.

Extreme Ruhelosigkeit des ganzen Körpers, besonders von Händen, Füßen und Kopf.

Viele Spinnenarten versteifen sich und sind wie erstarrt, wenn sie bedroht oder dem Sonnenlicht ausgesetzt werden; in ähnlicher Weise mag ein Kind, das ein Spinnenmittel braucht, die Sonne nicht und fühlt sich wohler im Dunkeln.

Geringer Appetit oder andere Essstörungen.

Starkes Verlangen nach Obst und Milch.

Neigung zu Erkältung und zur Entwicklung von Fieberkrämpfen.

Neigung zur Auszehrung (außer bei Aran-ix., eher fettleibig).

Neigung zu Hysterie und Ohnmacht.

Zucken und Rucken der Muskeln, besonders im Schlaf.

Kinder mit starkem Haarwuchs (wie die Spinnen, die normalerweise haarig sind).

KOPF

Meningitis.

SCHLAF

Träume: vom Fliegen; lange Reisen auf der Suche nach den toten Eltern, toten Verwandten, toten Freunden oder Bekannten. Hier kommen die Spinnenmittel sehr nah an Convo-d. und Rhus-g. heran. (Die Träume vom Fliegen können auch verbunden sein mit dem Interesse des Kindes an UFOs.)

SPINNENMITTEL IM VERGLEICH ZU VERWANDTEN MITTELN

Kinder, die ein Spinnenmittel brauchen, können leicht verwechselt werden mit: -
Ars.-Kindern, wegen der Ängste.

Phos.-Kindern, wegen ihrer gesteigerten Erregbarkeit.

Zinc.-Kindern, wegen der körperlichen Ruhelosigkeit.

TEUCRIUM MARUM VERUM

(Katzengamander - Teuer.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Die Symptome dieses Mittels erinnern sehr an Cina und Santin.

Starkes Tuberkulose-Miasma.

Extrem empfindlich und gereizt. Aufgeregt und nervös bei Fieber;

sehr gereizt bei Kopfschmerzen; sehr redselig. Empfindlich besonders

während der Pubertät und unwiderstehlicher Drang zu singen, singt

unwillkürlich. Redseligkeit, reden und reden. Empfindlich und wählerisch.

Erregung nach dem Hören von schrecklichen Geschichten.

Blasses Gesicht.

Fibröse Tumoren der Augen, Tumoren der Meibom-Drüse am Lid.

Nasen-, Oral- und Rektalpolypen.

Guernsey beschreibt ein gutes Leitsymptom: Nasenpolypen und verstopfte

Nase auf der Seite, auf der man liegt.

Chronischer Nasenkatarrh, besonders auf der linken Seite durch Nasenpolypen,

chronischer Fließschnupfen schlimmer in frischer Luft; anhaltende, reichliche

Absonderung bildet Schorfe und Krusten in der Nase, und wenn man diese

entfernt, wird die Nase wund. Absonderung grünlich, klumpig oder dick, gelb

und schmutzig.

Bei Schnupfen ausgeprägter Juckreiz im Innern der Nase. Verstopfte Nase

schlimmer abends, durch lautes Lesen oder Sprechen. Permanentes

Nasenbohren.

Schweiß auf der Nase.

Anfällig für Stirnhöhlenvereiterung nach jeder Erkältung.

Niesen durch heftiges Krabbeln und Kribbeln in der Nase.

Chronische Mittelohrentzündung mit dauerndem Zupfen an der Nase oder

Nasenbohren.

Alle Arten von Wurmbefall: Madenwürmer, Spulwürmer, Bandwürmer, und

Hakenwürmer. Nachts, im Bett heftiger Juckreiz am Anus oder krabbelndes

Gefühl im Rektum, schlimmer abends und durch Bettwärme. Extrem unruhig

und reizbar; reibt die Nase; Durchfall durch Wurmbefall; Schlaflosigkeit

durch heftiges Jucken im Rektum; Jucken im Rektum beim oder nach dem

Stuhl; Jucken rund um den Anus nach dem Stuhl.

Große Abmagerung bei unersättlichen Appetit.

Heftiger andauernder Schluckauf mit Aufstoßen nach dem Stillen.

Leistenbruch.

Unüblicher Hunger, der vom Schlafen abhält.
Verlangen nach Salz und Abneigung gegen Brot.
Eingewachsene Zehennägel.
Großes Verlangen nach frischer Luft.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Lippenblütengewächse (Labiatae).

THERIDION CURASSAVICUM

(Orangenspinne - Ther.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Versucht sich dauernd zu beschäftigen aus **innerer Unruhe**, aber hat an nichts Freude.

Erregte **Gesprächigkeit** (Cupr., Lach.); ein überschwänglicher Zustand, der an Hyos erinnert.

Phantasievoll und **kreativ** nachts, wie Agar und Med (Tarent, und Ther, sind die einzigen kreativen Spinnen).

Sehr geräuschempfindlich; selbst das Rascheln von Papier oder Kratzen auf Leinen (Asar., Nat-c.) ist unerträglich.

Schwierigkeiten mit dem vergleichenden methodischen Denken in der Schule, aber höchst kreativ. Geringe analytische Fähigkeiten in Mathematik (Lyc., Psor.).

Schrickt bei Kleinigkeiten schnell zusammen (Borx., Sil.).

KÖRPER

Kinder magern ab ohne ersichtlichen Grund (Ars., Calc-p.).

Überempfindlichkeit der Nerven, besonders gegen Geräusche.

Vergrößerte Lymphknoten bei abgemagerten Kindern.

Nie wieder gesund seit einer Tuberkulose oder Fälle von Tuberkulose bei nahen Verwandten.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Unzufrieden mit allem (Hep., Merc., Nat-m.).

Große Abneigung gegen Arbeit (Chin., Graph.).

Trägheit mit Abneigung, am Morgen aufzustehen.

Mangel an Selbstvertrauen (Anac., Bar-c.).

SCHWINDEL

Ohr- oder Innenohrschwindel bei Prozessen im Bereich von Kleinhirn oder Brücke.

Schwindel mit **Übelkeit und Erbrechen** (Petr., Verat.) **durch die geringste Bewegung** (Bell., Mosch.) besonders **im Auto oder auf dem Schiff** (Cocc., Petr.), schlimmer beim Augenschließen (Lach., Sep.) (trotz großer Lichtempfindlichkeit) und durch jedes Geräusch (Asar., Nux-v.).

KOPF

Heiter bei Kopfschmerzen.

Migräne bei Kindern, schlimmer nach Stuhlgang (Agar., Carbn-s.).

Kann sich bei Kopfschmerzen nicht hinlegen, muss sitzen oder herumlaufen.

AUGEN

Verschwommene Sicht bei tuberkulärer Meningitis.

Lichtempfindlich (Bell., Chin.).

Untersuchungsergebnis:

- Zucken des rechten Augenlides (Falco-pe., Lach.).

OHREN

Unerträgliches Jucken hinter den Ohren.

NASE

Chronischer Nasenkatarrh.

Niesanfälle (Gels., Sabad.), muss sich ständig die Nase putzen (Stict., Teucr.).

Untersuchungsergebnisse:

Dicke, gelblich-grüne (Hydr., Kali-bi.), **übelriechende Absonderung** (Asaf., Hep.).

Retronasaler Katarrh (Psor., Sep.).

GESICHT

Leichenblässe bei Seekrankheit.

MUND

Die Zähne sind empfindlich gegen kaltes Wasser (Calc., Lach.) und schrille Geräusche; **jedes schrille Geräusch scheint die Zähne zu durchdringen.**

Salziger Geschmack.

Untersuchungsergebnisse:

Beißt sich auf die Zungenspitze im Schlaf (Med.).

Schaum vor dem Mund bei Frost.

Mund bleibt unwillkürlich offen stehen; kann ihn nicht schließen.

MAGEN

Dauerndes Verlangen zu essen und zu trinken, aber weiß nicht was (Bry., Chin., Ign.). **Kindliche Bulimie und Essstörungen** sind höchst charakteristisch für Spinnenmittel.

Übelkeit und Erbrechen **beim Schließen der Augen** (Lach, Tab), bei Bewegung (Ars., Kali-c.) und durch Geräusche (Cocc.); besser durch Trinken von **warmem Wasser.**

Extremer Durst.

Verlangen: Saure Getränke, saure Früchte, **Bananen** (Tub.) und **Orangen** (Cub., Elaps).

Untersuchungsergebnis:

- Berührungsempfindlichkeit des Epigastriums.

ABDOMEN

Heftig brennende Schmerzen.

Untersuchungsergebnis:

- Leberabszess.

REKTUM

Durchfall ohne Kolik.

Stuhlgang schwierig zum Ende hin, obwohl nicht hart.

Untersuchungsergebnisse:

Der Anus tritt hervor und schmerzt besonders beim Sitzen (Lyc., Rat., Sep.).

Krampfartige Kontraktionen des Afterschließmuskels.

HARNWEGE

Häufiges Urinieren nachts, tagsüber selten (Borx.).

MÄNNLICHE GENITALIEN

Untersuchungsergebnis:

- Geschrunpftes Skrotum (Crot-t., Zinc.).

ATMUNG

Neigen zum Seufzen, muss oft tief durchatmen (Bry., Ign.).

HUSTEN

Heftiger Husten, begleitet von **krampfartigem Rucken** des Körpers, mit dem **Kopf nach vorne gebeugt und den Knien nach oben** (vergleiche Agar.).

Nächtlicher Husten.

BRUST

Untersuchungsergebnisse:

RöntgenThorax zeigt Fibrosierung an der Spitze der linken Lunge.

Feine Reibegeräusche (Krepitation) über der ganzen Lunge.

HERZ UND KREISLAUF

- Untersuchungsergebnis:

- Langsamer Puls.

RÜCKEN

Große Empfindlichkeit zwischen den Wirbeln (Agar.).

Sehr vorsichtig, wenn er auf einem Stuhl sitzt; **sitzt seitwärts**, um keinen Druck auf die Wirbelsäule auszuüben, weil es wehtut.

Spinale Reizung, besonders an der dorsalen Wirbelsäule (Phos., Tell.).

Untersuchungsergebnisse:

CT der Wirbelsäule zeigt Tuberkulose der Wirbel und Psoasabszess.

Wirbelsäulenverkrümmung (Asaf., Sil.) bei Mädchen im Wachstum.

EXTREMITÄTEN

• Untersuchungsergebnisse:

Unwillkürliches Spielen der Finger (Calc., Mur-ac.) oder Ringen der Hände (Asar., Kali-p.).

Jucken (Caust., Mag-c.) und knotige Schwellung der Gesäßbacken (Colo., Ph-ac.).

Aufwärtsrucken der Knie bei Husten.

Liegt oder sitzt mit überkreuzten Füßen; kann sie nicht gerade stellen.

Osteomyelitis der Knochen (Dros., Tub.).

SCHLAF

Schlaflosigkeit durch das geringste Geräusch (Coff., Nux-v.).

Schlaflosigkeit trotz Müdigkeit (Cham., Tarent.).

HAUT

Berührungsempfindlich (Lac-c., Ran-b.).

Heftiges Jucken.

ALLGEMEINES

Knochenkaries oder -abszesse (Asaf., Fl-ac.).

Knochenerweichung (Osteomalazie) (Calc., Merc.).

Nützlich in Fällen von **Sonnenstich** mit unerträglichen Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen (Bell., Nat-m.).

Verschlimmerung durch Schließen der Augen.

Allergische Diathese.

Epilepsie mit tetanischer Starre und Trismus.

Ohnmacht nach der geringsten Anstrengung (Lach., Sep.), mit kaltem Schweiß (Dig., Verat.).

Verletzungen sind besonders schmerzhaft wegen der erhöhten nervlichen Anspannung.

Periodizität der Beschwerden; erscheinen jährlich (Ant-t., Lach.).

Rachitis.

Zittern vor Schwäche (Anac., Stann.).

Das Wasser fühlt sich beim Baden zu kalt an.

THIOSINAMINUM

(Derivat aus Senfkornöl - Thiosin.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- ▶ Striktur des Tränengangs.
- ▶ Schwerhörigkeit durch Verwachsungen und Katarrh im Mittelohr.

THUJA OCCIDENTALIS

(Lebensbaum - Arbor vitae - Thuj.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

- ▶ Ein Gefühl von **Selbstmissachtung** (Lac-c., Naja.), hauptsächlich durch Unterdrückung, Verlassenheitsgefühl, Masturbation und bei sexuellem Missbrauch. Siehe Rubriken: Stimmung, veränderlich; Selbstvertrauen, Mangel an; Selbsttherabsetzung; Wahnidee, sie ist nicht anerkannt; Wahnidee, Fortbestand des Körpers würde sich auflösen; Wahnidee, sie sei eine Ausgestoßene; Wahnidee, sie sei wertlos; Unentschlossenheit, Unentschiedenheit etc.
- ▶ Kinder, denen **zu viele Vorschriften** gemacht wurden, besonders durch eine **überbehütende oder zu strenge Mutter** (Carc., Lyc., Staph.). Siehe Rubriken: Beschwerden durch Unterdrückung; Wahnidee von Abmagerung; Wahnidee, sie könne nicht länger existieren; Wahnidee, Kopf würde einem anderen gehören; Wahnidee, er stehe unter einem mächtigen Einfluss.
- ▶ **Verlassenheitsgefühl bei Unterdrückung führt zu Bulimie.** Siehe Rubriken: Wahnidee, verlassen; Wahnidee, er habe die Zuneigung des Freundes verloren; Wahnidee, er habe keine Freunde; Wahnidee, sie wäre eine Ausgestoßene; Wahnidee, unter übermenschlicher Kontrolle zu sein; Furcht, vernachlässigt zu werden.
- ▶ **Geistig und körperlich zurückgeblieben.** Körperlich sieht man ein verzögertes Wachstum; die Gefühle sind recht einfach strukturiert und ohne Subtilität. Als Heranwachsende sind sie verschlossen und reserviert. Siehe unter den Rubriken: Furcht, Näherkommen, Annäherung, von anderen; Furcht vor Ärzten, Furcht vor Versagen bei Prüfungen.

KÖRPER

- Allergische Konstitution** (Apis, Dulc.); allergisch gegen Äpfel, Kaffee, Farbstoffe, Fisch, Knoblauch, Hausstaubmilben, Zwiebeln, Parthenium, Zucker, Weizen, Gluten etc.
- Kinder mit **multiplen angeborenen Missbildungen** wie Beerenaneurysmen cerebraler Gefäße, angeborene Chorea, zyanotische Herzerkrankungen, Anus imperforatus, Osteogenesis imperfecta und offener Urachus (Urharngang).
- Kinder, die mit unzureichend ausgesuchten homöopathischen Mitteln in hoher Potenz (Nit-ac., Nux-v.) behandelt wurden, besonders mit Sulph., das zu chronischen trockenen Ekzemen, nervöser Reizbarkeit, Durchfall und Abmagerung geführt hat.
- Verzögerte Rekonvaleszenz nach Antibiotika (Ars., Nit-ac.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Die Kinder **schaffen sich oft bewusst ein bestimmtes Image, um ihre Schuldgefühle und ihren Kummer** vor Gesellschaft oder Familie **zu verstecken** - religiöse Neigungen, starkes Pflichtgefühl, anderen zu Gefallen sein und dauernd nachgeben.

Kinder, deren **Eltern dauernd streiten**.

Kinder, die **fasziniert sind vom Sport** und alle ihre Anstrengungen und Energie in diesen Bereich stecken. Sie lieben den Sport im Fernsehen oder Live- Spiele und sind bei solchen Gelegenheiten ganz aus dem Häuschen; eine Art Fanatismus.

Chronischer Ärger, sehr zornige Kinder, die schon bei Kleinigkeiten explodieren (Cham., Plat.).

Zwangsneurosen, die sich schon in früher Kindheit zeigen; bedingt durch eine stark sykotische Familienvorgeschichte. Zum Beispiel müssen die Haare alle paar Stunden gekämmt werden; das Kind ist übermäßig vorsichtig, kontrolliert alles immer wieder; überzogen sorgfältig mit seinem Eigentum, sorgfältig bis zur Selbstsucht; Zwangsverhalten beim Gehen, entweder auf der Kante des Fußweges oder auf dem Mittelstrich der Straße; entwickelt eigenartige Gesten; Händewaschen nach jedem Gebrauch der Hände etc.

Schwere geistige Zurückgebliebenheit nach Antibiotikamissbrauch, nach Impfungen oder bei einer **Vorgeschichte von Infektionen wie Toxoplasmose, Zytomegalie oder Röteln der Mutter während der Schwangerschaft**.

Schüchterne, scheue und verschämte Kinder (Coca., Lach.), die keine Courage zeigen. Stille Gemütsart (Ign., Ph-ac.).

KOPF

Haar trocken, glanzlos; **kann nicht gekämmt werden**.

Kopfschweiß **im Schlaf** (Calc., Sil.), der **wie Honig riecht**.

Katarrhalische Kopfschmerzen (Dulc., Hep.).

Untersuchungsergebnisse:

CT: Hirnblutung, Hydrozephalus.

Seborrhoe ++.

Weißer, abblätternde Schuppen.

Faltige Stirn.

AUGEN

Entzündung von Konjunktiva, Iris, Retina und Sklera, **nach Impfung oder durch Autoimmunerkrankungen** wie M. Crohn, Hashimotothyreoiditis, Reiter-Syndrom, rheumatoide Arthritis, rheumatisches Fieber, Colitis ulcerosa etc.

Augenentzündung durch **bakterielle oder virale Infektionen** wie Chlamydien, Gonorrhoe, Herpes, Toxoplasmose, Tuberkulose etc.

Wiederkehrende Gerstenkörner mit Verhärtung (Sep., Staph.).

Katarrhalische Entzündung der Augen (Arg-n., Asaf.).

Diplopie beim Lesen (Camph., Graph.).

Augen morgens häufig verklebt (Arg-n., Med.).

Augenverletzung (Arn., Euphr.).

Tränenfluss in kalter, frischer Luft (Phos., Sulph.).

Photophobie.

Kurzsichtigkeit.

Untersuchungsergebnisse:

Chalazion (Platan.-oc., Staph.).

Foster-Kennedy-Syndrom.

Spaltlampenuntersuchung: Hornhautgeschwüre, Episkleritis, **Iridozyklitis** (Bry., Merc.-c.), Iritis **mit Hypopyon** (Hep., Sil.), phlyktänuläre Konjunktivitis, **rheumatische Iritis** (Rhus-t., Spig.) und Trachom.

Lähmung des linken Oberlides (Caust., Plb.).

Chemosis.

Absonderungen: Dicker, gelber Schleim (Puls., Sil.).

Epitheliom der Lider.

Exophthalmus durch Tumore hinter dem Augapfel.

Die Augenlider bleiben halb offen (Bell., Op.).

Haarausfall der lateralen Hälfte der Augenbrauen.

Erhöhter Augeninnendruck.

Lähmung des Sehnervs.

Pupillen kontrahiert oder erweitert.

Hornhautstaphylom (Aur-m., Chel.).

Lidknorpelschwellung.

OHREN

Chronische Otitis media, mit stinkender, eitriger Absonderung aus den Ohren.

Untersuchungsergebnisse:

Dauerndes Bohren mit den Fingern in den Ohren (Mez., Psor.).

Ekzeme hinter den Ohren, mit Hervorsickern von dicker, übelriechender, klebriger Substanz (Graph.).

Otoskopie: Vermehrtes Cerumen, Trommelfellperforation, Polypen, die weich sind und leicht bluten (Calc., Merc.).

Tonaudiometrie: Sensorisch bedingte Taubheit.

Rinne-Test ++.

Weber-Test ++.

Röntgen der Pars petrosa des Schläfenbeins: Destruktion der lufthaltigen Zellen des Mastoids.

NASE

Katarrh nach Masern und Windpocken.

Katarrh der Nase erstreckt sich zu den Stirnhöhlen (Kali-br., Merc.).

Schnupfen besser im Freien (All-c., Nux-v.).

Nasenbluten bei Fieber (Bell., Sil.) durch Polypen.

Heuschnupfen.

Untersuchungsergebnisse:

Risse an den Nasenflügeln (Caust., Merc.).

Wundmachende, grünlich-eitrige, übelriechende Absonderung, die blutige Krusten oder Schuppen bildet, die schwierig abzulösen sind. Geschwüre in der Nase (Aur Nit-ac.)

Hoch auflösendes CT (HRCT) der Nebenhöhlen: **Polypen**, die aus der Wand der Siebbeinzellen oder Kieferhöhlen entstehen; **Verdickung der Schleimhaut der Nasennebenhöhlen**.

Linksseitiger Schnupfen (Arum-t.).

Retronasaler Katarrh (Kali-bi., Psor.).

Röntgen des Nasopharynx: **Weiche Gewebeschwellung, auf Adenoide hinweisend**.

Röntgen der Nasennebenhöhlen (Water- und Caldwell-Ansichten): **Flüssigkeitsspiegel in den Nebenhöhlen, unscharfe Darstellung der Nebenhöhlen** und Nasenseptumdeviation.

Bohrt mit den Fingern in der Nase (Arum-t., Cina).

Ozäna.

Warzen auf der Nase (Caust.).

GESICHT

Akne bei anämischen Mädchen (Aster., Graph.).

Untersuchungsergebnisse:

Akne an **Kinn** (Hydr., Viol-t.) und **Nase** (Caust., Sulph.), hinterlässt **unansehnliche Narben** (Kali-br., Sil.).

Fettiges, glänzendes, wächsernes Gesicht (Ars., Med.).

Blasses Gesicht bei jedem Fieberanfall (Croc., Hyos.).

Zupft dauernd an den Lippen (Arum-t., Bry.).

Rote Ausschläge auf der Nase (Androc., Lach.).

Ödematöse Schwellung des Gesichts (Apis, Graph.).

Vergrößerung der Parotiden.

Sommersprossen.

Glühendrotes Gesicht oder umschriebene Rötung des Gesichts.

Haare an ungewöhnlichen Stellen; männliche Haarverteilung bei Mädchen (Puls., Sep.).

Herpes labialis (Nat-m., Rhus-t.).

Geistig behindertes Aussehen (Agar., Lach.).

Schweiß auf der Oberlippe (Ign., Med.).

Warzen am Kinn (Lyc., Sep.).

MUND

Reichlicher Speichelfluss besonders bei Husten (Am-m., Mez.).

Langsame und schwierige Zahnung (Calc., Sil.).

Stammelnde, undeutliche Aussprache (Merc., Stram.).

Beißt sich auf die Zunge (Bufo, Ign.).

Untersuchungsergebnisse:

Das Zahnfleisch blutet leicht und löst sich von den Zähnen (Carbo- veg., Phos).

Landkartenzunge mit rissigen Rändern (Lach., Nux-v.) und **roter Spitze** (Ars., Rhus-v.).

Ranula (Mundbodenzyste) (Ambr., Calc.).

Zähne: Gelbe oder schwarze Verfärbung der Zähne bei **Karies an den Seitenflächen und Wurzeln** (Mez.); die Zähne sind brüchig und bröckeln leicht ab (Plb., Stanh.).

Zahnabszess.
Pyorrhoe.
Stomatitis ulcerosa (Kali-i., Nux-v.).
Geschwüre auf der Zunge (Bapt., Nit-m-ac., Psor.).

HALS

Chronische und rezidivierende Tonsillitis (Bar-c., Tub.).

Speisen bleiben im Hals stecken (Lach., Nit-ac.).

Häufiges erfolgloses Räuspern und Abhusten (Arg-n., Med.).

Untersuchungsergebnisse:

Vergrößerte Halsdrüsen.

Retronasaler Katarrh (Kali-bi., Psor.).

Kleine blumenkohlartige **Warzen und Hautanhängsel** am Hals (Nit-ac., Sil.).

Tonsillen vergrößert und hypertrophiert, besonders die linke (Lach., Phos.).

Verlängertes Zäpfchen (Kali-i., Sulph.).

Geschwüre im Pharynx (Merc-i-r., Mez.).

Lähmung der Hirnnerven IX. (Nervus glossopharyngeus) und X. (Nervus vagus) durch Meningitis oder Enzephalitis.

MAGEN

Brennender, starker Durst auf kaltes Wasser (Bry., Phos.) **ist üblich**; Durstlosigkeit ist selten.

Das Kind kann Äpfel (Ant-t., Phos.), **Butter** (Carbo-veg., Puls.), **Fett, Fisch** (Kali-s., Sep.), **Zwiebeln** (Lyc., Puls.), **Schweinefleisch** (Cyc.l, Graph.), **Zucker** (Arg-n., Sulph.) **in keiner Form verdauen**.

Galleerbrechen bei Fieber (Ant-t., Nat-m.).

Übermäßiges Würgen bei Husten (Cina, Dros.).

Unstillbarer oder gesteigerter Appetit, besonders bei Kopfschmerzen (Phos., Psor.).

Geräuschvolles Schlucken; lautes Rülpsen (Arg-n., Plat.).

Abneigung: Fleisch, Zwiebeln (Sabad.) und **Kartoffeln** (Phos., Sep.).

Verlangen: **Schokolade** (Carc., Staph.), Knoblauch (All-s.), **rohe Zwiebeln** (All-c., Rhus-g.), Saures und Salziges (Carbo-veg., Verat.), saure Früchte (Med.) und **Tee** (Chin., Sacch.).

ABDOMEN

Darmkollern, Blähungen.

Untersuchungsergebnisse:

Linker Leistenbruch und Nabelbruch treten hervor, wenn das Kind schreit; das Kind schreit unaufhörlich und ist nur still, wenn die linke Leistengegend durch Druck entlastet wird oder der Schenkel an das Abdomen gebeugt wird.

Bei Auskultation: **Stilles Abdomen**.

Paralytischer Ileus (Plb., Op.).

Empfindlichkeit in der rechten Fossa iliaca.

Abszess der Leistendrüsen.

Aszites +.

Angeborene Leistenbrüche.
 Leber vergrößert und empfindlich.
 Tympanitische Auftreibung.

REKTUM

Durchfall durch Aufregung (Ars., Op.), **fettige Speisen** (Kali-chl., Puls.), **Zwiebeln** (Lyc., Nux-v.) ODER periodischer Durchfall, immer zur selben Stunde auftretend (Apis).

Lähmung des Rektums nach Operation einer Spina bifida oder Meningomyozele.

Stuhl: **Schwarze, ballartige Klumpen** (Calc-p., Plb.), nach Gas riechend, hart oder vermischt mit heraussprudelnder Flüssigkeit (Crot-t., Podo.), **ölig** (Iod.), explosionsartig herausspritzend.

Unwillkürlicher Stuhlgang im Schlaf oder bei Abgang von Blähungen (Nat-s., Ph-ac., Podo.).

Untersuchungsergebnisse:

Ätzende Feuchtigkeit um den Anus (Merc-c., Nit-ac.).
 Blumenkohlartiges Wachstum um den Anus.
 Viel Fett im Stuhl (Caust., Iris).
 Hämorrhoiden ++.
 Rektalabszess oder Strikturbildung.
 Stuhlkultur: Vibrio cholerae.
 Stuhl: Entamoeba histolytica, Spulwürmer, Madenwürmer.

HARNWEGE

Unintröpfeln durch Vorhandensein einer Harnröhrenklappe.

Geteilter Strahl (Cann-s., Merc-c.).

Enuresis.

Rezidivierende Harnwegsinfekte bei einem Kind mit Nierensteinen oder Anomalien des Urogenitaltrakts.

Tröpfelndes Urinieren nach Wirbelsäulenoperation.

Unwillkürliches Urinieren, wenn dem Harndrang nicht gleich nachgegeben wird (Lach., Sep.).

Schaumiger Urin (Lyc., Sei.).

Untersuchungsergebnisse:

Urin: Albumin +, Gallenfarbstoffe ++, Gallensalze, Erythrozyten +, Zucker.
 Urinkultur: E. coli.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Anfassen der Genitalien (Hyos., Merc., Stram.).

Stinkender Schweiß der Genitalien (Iod., Sulph.).

Neigung zu masturbieren, sogar im Schlaf (Camph., Plat.).

Bettnässen.

Untersuchungsergebnisse:

Paraphimose und Phimose (Merc., Nit-ac.).
 Windelausschlag.
 Ekzeme am Skrotum (Crot-t., Graph.).

Rötliche Verfärbung des Skrotums (Chel., Petr.).
Hodenretention, besonders links (Calc., Par.).
Pilzbefall in der Leistengegend (Tinea cruris).

WEIBLICHE GENITALIEN

Neigung zu masturbieren, besonders im Schlaf.
Chronische übelriechende Leukorrhoe (Carb-ac., Kali-ar.) bei kleinen Kindern mit
Vulvovaginitis und sykotischer Familienvorgeschichte.
Untersuchungsergebnisse:
Stinkender Schweiß.
Pilzbefall in der Leistengegend (Tinea cruris).
Warzen in der Nähe der Labien.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Chronische Heiserkeit (Arum-t., Kali-bi.) durch Polypen auf den Stimmbändern.
Stimmritzenkrampf oder Spasmen besonders im Schlaf (Chlor., Lach.).
Heiserkeit bei Schnupfen (Caust., Phos.).
Untersuchungsergebnisse:
Laryngoskopie: Polypen im Larynx (Arg-n., Sang.) und auf den Stimmbändern
(Berb.).
Nasaler Klang der Stimme (Kali-bi.).

ATMUNG

Asthma bei sykotischen Kindern **nach Impfung** (Carc.) oder bei **kaltem, feuchtem Wetter** (Dulc., Nat-s); schlimmer nachts (Ars., Chel.).
Untersuchungsergebnisse:
Zentrale Zyanose.
(pleuritische) Reibegeräusch ++.
Pfeifende Atemgeräusche ++.

HUSTEN

Trockener, bellender, erschöpfender, hackender, kurzer, krampfartiger **und** erstickender **Husten, schlimmer** durch kalte Getränke (Ars., Psor.), tagsüber (Arg-met., Euphr.), beim Essen, **am Morgen** (Coc-c.) und **beim Liegen auf der linken Seite**; besser durch Drehen auf die rechte Seite (Phos., Rumx., Sep., Sulph.).

Andauernder Husten nach Impfung (Carc.).

Husten begleitet von vermehrtem Speichelfluss (Am-m., Bar-c.).
Auswurf: Kugelförmig, grünlich, schmeckt wie Käse (Chin., Lyc.).

BRUST

Hartnäckige Pneumonien, z. B. Metacyclinresistente Staphylococcus-aureus-Pneumonie.

Vernachlässigte oder schlecht ausgeheilte Pneumonie (Sil., Sulph.), besonders durch Staphylokokken und bei immungeschwächten Patienten.

Untersuchungsergebnisse:
Zyanose der Schlüsselbeinaeend.

RÜCKEN

Verletzungen der Wirbelsäule (Hyper., Nat-s.).

Untersuchungsergebnisse:

Atrophie der langen Muskeln, wie M. trapezius, M. serratus anterior.
Kyphoskoliose.
Spina bifida.
Steht nach vorne gebeugt.
Warzen.

EXTREMITÄTEN

Ankylosierende Spondylitis (M. Bechterew), juvenile rheumatoide Arthritis, Still-Syndrom, jeweils mit Gonorrhoe oder ausgeprägtem sykotischem Miasma in der Familienvorgeschichte.

Zerrungen von Bändern und Sehnen durch übermäßige Beteiligung bei Sportarten wie Fußball, Hockey, Baseball, Cricket etc.

Ungeschicklichkeit (Apis, Bov.).

Knacken in den Gelenken beim Strecken.

Auszehrung der oberen Gliedmaßen nach Impfung (Maland.).

Perthes-Calve-Legg-Krankheit.

Rezidivierende Verrenkung des Hüftgelenkes (Calc., Caust.).

Untersuchungsergebnisse:

Kälte der Fingerspitzen (Chel., Zinc.) und der Unterarme (Graph., Phos.).

Abmagerung von erstem Finger (Lach.) und Daumen.

Fauliger, ätzender Fußschweiß (Nit-ac., Sil.).

Nägel: Blau, brüchig (Calc., Graph.), geriffelt, verkrüppelt, verkrümmt, weich und verkümmert; Niedrnägel (Nat-m., Sulph.), eingewachsene Zehennägel (Graph., Teucr.) und weiße Flecken auf den Fingernägeln (Nit-ac.).

Warzen an den Fingerspitzen, besonders am Zeigefinger (Caust.).

Karies durch Osteomyelitis.

Hühneraugen.

Verzögerte Bruchheilung.

Ekzeme in den Beugeseiten der Ellbogengelenke.

Mangelhaftes Schließen der Suturen.

Multiple Frakturen durch Osteogenesis imperfecta.

SCHLAF

Babys mit ruhelosem Schlaf nach Impfungen.

Kann nur mit den Armen über dem Kopf schlafen (Nux-v., Puls.).

Schlaflosigkeit beim Liegen auf der linken Seite (Ars., Lach., Phos.) oder kann nur auf der linken Seite schlafen (Nat-s., Sulph.).

Schläft beim Schreiben ein (Ph-ac.).

Zähneknirschen im Schlaf (Ars., Tub.).

Andauernde Schlaflosigkeit durch Angst oder Traurigkeit (Ign., Kali-c.).

HAUT

Untersuchungsergebnisse:

Üppiger Haarwuchs an normalerweise unbehaarten Körperteilen (Sep.).
Der Schweiß riecht nach Honig.

Blutende Warzen bei jungen Mädchen (Caust., Nit-ac.), die feucht sind und wie alter Käse riechen (Calc., Hep.).
Braune, schmutzig-gefleckte, behaarte Haut.
Ausschläge nur an bedeckten Körperstellen (Led.).
Faulige Pusteln mit eingesunkenen Spitzen.

ALLGEMEINES

Kinder mit **ausgeprägter Familienvorgeschichte** von Krebs, Diabetes, Ekzemen, Hypertonie oder rheumatoider Arthritis.

Kinder **mit angeborenen Neubildungen** wie Angiomen, Lipomen, Muttermalen, Papillomen etc.

Kinder mit **angeborenen Stoffwechselstörungen** wie Laktoseintoleranz.

Fröstelige Kinder, die sehr empfindlich gegen die geringste kalte Zugluft sind, aber frische Luft verlangen.

Verzögerte Rekonvaleszenz nach Antibiotika.

Anämie.

Katarrhe aller Art; Leukorrhoe, nasale, urethrale Katarrhe etc.

Vorgeschichte von rezidivierenden Infektionen wie Mononukleose, Sinusitis und Tonsillitis.

Kinder mit vielen Zahnbehandlungen, in denen große Mengen an Quecksilber-Amalgam verarbeitet wurden und die in der Folge ein atopisches Ekzem entwickelt haben.

Beschwerden nach Unterdrückung von Schweiß durch kritiklosen Gebrauch von Babypuder, was zu Allergien, Asthma und Verhaltensproblemen führen kann.

Dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, ungesunde Haut, braune oder rote marmorierte Flecken, tiefe Linea nasalis, weiße Schuppen, unansehnliche deformierte Nägel, schlaffe Muskeln, helles Haar, süßlicher Geruch.

Kinder, deren Entwicklung durch eine starke sykotische Familiengeschichte vorbelastet ist.

Absonderungen ätzend, blutig, angreifend, wund machend, stinkend, grau, übelriechend, gelb.

Linksseitige Symptome.

Periodizität: Zunehmender Mond verschlimmert.

Schweiß: Honigartiger Geruch, modrig, ranzig, sauer, süßlich, ölig; Schwitzen im Schlaf, besser beim oder nach dem Erwachen; reichlicher Schweiß unbedeckter Teile außer am Kopf.

Rezidivierende Abszessbildung, staphylokokkenbedingt.

Rachitis.

HERKUNFT

Familie der Cupressaceae.

THYREOIDINUM

(Schilddrüsenhormon - Thyr.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Retardierte, dumme und idiotische Kinder. Down-Syndrom.
Heranwachsende mit schrulligem, launischem Verhalten.
Dünne, dünne und kachektische Kinder.
In der Familiengeschichte häufig Schilddrüsenprobleme, Diabetes, Allergien und Fettleibigkeit.
Langsame und gehemmte Entwicklung, Verzögerung sowohl beim Längenwachstum wie auch bei der Weiterentwicklung (mental und physisch).
Vielfältige Allergien wie Heuschnupfen, allergische Konjunktivitis, allergisches Asthma, Urtikaria, angio-neurotische Ödeme. Allergisches Asthma bei jedem Wetterwechsel.
Abmagerung bei Kindern.
Sehenschwäche.
Wenig Haarwachstum bei Kindern. Ungewöhnlicher Haarwuchs bei jungen Mädchen. Haare auf der Oberlippe bei jungen Mädchen.
Konvulsionen bei der Zahnung.
Husten beim Eintreten in ein warmes Zimmer.
Großes Verlangen nach Süßigkeiten und kaltem Wasser.
Abneigung gegen Fett.
Chronischer und hartnäckiger Durchfall.
Durstig; verlangt große Mengen Wasser.
Hodenhochstand, wobei die Hoden entweder noch im Abdomen sind oder schon kurz vor dem Intimbereich. Eingezogene Hoden.
Unwillkürliches Urinieren in der Nacht bei schwächlichen anämischen Kindern.
Bettnässen, wenn alle anderen Mittel versagen.
Knochenbrüche, die lange nicht zusammenwachsen und lange nicht heilen.
Kalte Hände und Füße.
Reichlicher öliger Schweiß.
Psoriasis bei Kleinkindern.
Sehr frostig.

HERKUNFT

- Wird hergestellt aus der Schilddrüse eines Schafes oder eines Kalbes.

TUBERCULINUM AVIS

(Nosode aus einer tuberkulösen Hühnerleber - Tub-a.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Häufig Tuberkulose in der Vorgeschichte und Familienanamnese.

Abmagerung bei tuberkulösem Hintergrund.

Primärkomplex Masern, asthmatische Bronchitis und virusbedingte Bronchitis.
Nasenpolypen.

Nasenkatarrh mit erst wässriger, später eitriger Absonderung. Verstopfte
Nase. Permanentes Niesen. Erkältung wandert nach unten und befällt
Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien.

Wiederkehrende Mittelohrentzündung.

Mittelohrentzündung des linken Ohres.

Wiederkehrende Tonsillitis.

Atmen geht schwer, viele Rasselgeräusche beim Husten, aber kein Auswurf.

Schmerzhafter Reizhusten, deutliche Rasselgeräusche in der Lunge.

Bronchitis und Husten nach Masern.

Verlangen nach Obst und Verschlimmerung durch Fett.

HERKUNFT

- Diese Tuberkulose-Nosode wurde von Dr. Cartier aus Frankreich aus einer Hühnerleber hergestellt.

TUBERCULINUM BOVINUM

(Nosode aus einem tuberkulösen Abszess - Tub.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Beleidigende, zornige und **unverschämte** Kinder, die oft ihre Eltern beschimpfen (Lyc., Plat.) und sie in ihrem Zorn mit Gegenständen bewerfen (Cina, Staph.).

Unzufriedenes, **trotziges** Kind (Bar-c., Caust.) mit Neigung zur Boshaftigkeit, besonders wenn seine Forderungen von den Eltern oder Autoritätspersonen nicht erfüllt werden.

Kinder **voller Energie**, die nicht stillsitzen können (Coff., lod., Merc., Rhus-t.); wollen immer irgendwie beschäftigt werden; kaum sind sie mit etwas fertig, wollen sie schon das nächste tun.

KÖRPER

Abmagerung mit Schwäche und Heißhunger (Calc., lod., Nat-m.).

Allergische Konstitution: Allergisch auf Tierhaare, besonders Katzen (Ars., Dulc., Kali-c., Lac-f., Sulph.).

Starkes Verlangen nach frischer Luft (Calc-i., Carbo-veg., Kali-c., Puls., Sulph.); sitzt im Auto, Bus oder Zug gern am Fenster, um sich frische Luft holen zu können.

DAS **ABC** VON TUBERCULINUM

- A** - Artistic (künstlerisch)
- B** - Behavioral problems (Verhaltensstörungen)
- C** - Courageous (mutig)
- D** - Defiant (trotzig)
- E** - Extroverted (extrovertiert)
- F** - Fearful (furchtsam)
- G** - Gestures, automatic (automatische Gesten)
- H** - Heedless (unachtsam)
- I** - Ideas, abundant (Ideenreichtum)
- J** - Jump, desire to (Verlangen zu springen)
- K** - Kicking in sleep or in anger (Treten im Schlaf oder im Zorn)
- L** - Lascivious (lüstern)
- M** - Mischievous (boshaft)
- N** - Notorious (berüchtigt)
- O** - Obstinate (aufsässig)
- P** - Precocious (altklug, frühreif)
- Q** - Quarrelsome (streitsüchtig)
- R** - Restless (rastlos)

- S** - Shameless (schamlos)
- T** - Talented (talentiert)
- U** - Unfeeling (gefühllos)
- V** - Violent when cross (gewalttätig bei Ärger)
- W** - Weeping at trifles (Weinen bei Kleinigkeiten)

Weitere wichtige Symptome

GEMÜT

Charmante, freundliche und extrovertierte Kinder (Lach., Sulph.), die leicht mit jedem Freundschaft schließen, sogar mit Fremden im Bus, im Zug oder im Park.

Tagsüber ist das Kind glücklich und lustig; aber sobald der Abend oder die Nacht naht, kommen viele Ängste (Ars., Calc., Lach., Puls.).

Extrem ängstliche Kinder, mit starker Furcht vor **Vögeln** (Apis, Nat-m.), Pelztieren, einschließlich **Katzen** (Bac., Chin., Merc.) und **Hunden** (Bell., Chin., Stram.).

Eins der wichtigen Mittel in der Homöopathie für ausgeprägte **nächtliche Panik** (sehr ähnlich wie Aur-br., Cina, Gal-ac., Kali-br., Stram.).

Redselig und voller Enthusiasmus; schwatzt dauernd mit Eltern, Verwandten und Freunden (Lach., Stram., Sacch.).

Manipulierend (Puls., Sanic., Sulph., Tarent.).

Kinder, die immer nach den letzten Modetrends gekleidet sein wollen (Puls., Verat.).

Kinder, die selten zu Hause bleiben; sind immer im Garten, im Park oder bei Freunden.

Verlangen nach Abwechslung (Bry., Sacch., Sep.).

Destruktiv; macht gern sein Spielzeug und andere Dinge kaputt (Carc., Stram., Tarent.) und reißt sich im Zorn an den Haaren.

Während eines Kampfes mit anderen Kindern zieht er sie meistens an den Haaren, beißt oder tritt sie (Bell., Stram., Tarent.).

Schmeichelndes, verführerisches Verhalten bei Kindern (Lach., Phos., Verat.).

Liebt es, am Strand zu laufen oder im Meer zu schwimmen (Bar-c., Lac-leo., Med., Tarent.).

Sieht mit Vorliebe aufregende Filme; kann sogar eine Mahlzeit auslassen, um einen Film zu sehen.

Das Kind ist ganz begeistert und aufgeregt, sobald es erfährt, dass es zu einem Picknick oder einem Ausflug geht. Will ins Freie, selbst wenn es sehr krank ist.

NEUGEBORENE UND KLEINKINDER

Blaue Skleren.

Leuchtend rote Lippen (Bell., Lach., Sulph.).

Schwierige Zahnung.

Früher Verfall der Zähne (Calc-f., Kreos., Mez., Staph.).

Ausgeprägter Haarwuchs auf dem Rücken.

Die Fontanellen bleiben lange offen (Calc., Calc-p., Sil.).

Geschichte von intrauteriner Wachstumsverzögerung.

Mangelhafte Zähne wachsen in unregelmäßiger Anordnung (Bac., Phos.).

Häufige Familien- oder mütterliche Vorgeschichte von Tuberkulose (Bac., Carc., Dros., Kali-c., Sulph., Ther.).

Untergewicht.

Sehr feines Haar.

KOPF

Extrem empfindlich gegen Bürsten oder Kämmen (Arn., Carbo-veg., Nit-ac., Sil., Sulph.); lässt sich nicht gern die Haare kämmen.

Schlägt den Kopf gegen die Wand (Bell., Mill., Phos., Tarent.), **besonders im Zorn, bei Frustration oder bei Wutanfällen, wenn Forderungen nicht erfüllt werden.**

Kopfschweiß nachts (Calc., Merc., Sil.).

Rollt den Kopf oder bohrt ihn in das Kissen im Schlaf (Bell., Hell., Stram., Sulph., Tarent.).

Untersuchungsergebnisse:

CT: Unschärfe von Vorder- und Hinterhorn; **Erweiterung der Ventrikel** (Hell.); multiple Infarkte; Verschiebung der Mittellinienstrukturen durch erhöhten intrakraniellen Druck.

Offene Fontanellen (Calc., Calc-p., Sil.).

Kernig-Zeichen + (Bell., Hell., Stram., Zinc.).

Läuse (Carb-ac., Lyc., Merc., Psor., Staph.).

CSF: Kultur zeigt H. influenzae, Meningokokken und Tuberkel-Bazillen; Bildung von Spinnwebgewebegerinnsel Padey-Test +; Protein ++ und Zucker ++.

Trockenes, glanzloses Haar (Thuj.).

Extrem hervortretende Stirn (Cupr., Hell.).

Kopf seitwärts gezogen (Bar-c., Lyc.).

Herpes circinatus auf der Kopfhaut.

Milchschorf bei Neugeborenen.

Plica polonica (verfilztes Haar).

Seborrhöe.

AUGEN

Astigmatismus (Sep.).

Kurzsichtigkeit.

Tränenfluss beim Husten.

Photophobie.

Untersuchungsergebnisse:

Blaue Skleren.

Chalazion.

Hornhauttrübung.

Ekzeme an den Lidrändern (Graph.).

Hordeolum, besonders im rechten Auge.

Lange, gebogene Wimpern (Calc., Phos.).

Perimetrie: Horizontale und vertikale Hemianopsie.

Pupillen kontrahiert, ungleichmäßig, unempfindlich gegen Licht.

Schuppige Augenlider.

Spaltlampen-Untersuchung: Hornhautgeschwüre, Keratitis und tuberkuläre Iritis.

Strabismus bei Meningitis.

OHREN

Neigung zu wiederkehrender Otitis media.

Das Kind erwacht nachts mit starken Ohrenscherzen.

Untersuchungsergebnisse:

Atopisches Ekzem hinter den Ohren.

Bera-Test: **Angeborene Taubheit.**

Rechtsseitige Otitis media mit übelriechender eitriger Absonderung aus dem Ohr.

Trommelfellperforation (Hydr., Kali-bi.) **mit gezackten Rändern.**

Audiometrie: Taubheit mit fehlender Knochenleitung.

NASE

Chronischer Schnupfen.

Neigung zu wiederkehrenden Erkältungen und Heuschnupfen.

Erkältung gefolgt von Durchfall.

Schnupfen grünlich, stinkend, eitrig und gelb.

Nasenbluten bei Kopfschmerzen.

Untersuchungsergebnisse:

Nasenlöcher mit Krusten und Schuppen bedeckt.

Viele kleine Eiterpickel auf der Nase.

HRCT: Chronische Sinusitis mit Verdickung der Schleimhaut. Schwellung der Nasenmuscheln mit Deviation des Nasenseptums.

Schweiß auf der Nase.

Retronasale Absonderung per Spekulum.

Rhinoskopie: Adenoide und Nasenpolypen.

GESICHT

Rötung des Gesichtes bei Husten (Bell., Sang.) **oder bei Fieber** (Sep.).

Neigung zu Gesichtsakne, mit Vor- oder Familiengeschichte von Tuberkulose.

Untersuchungsergebnisse:

Rote Lippen (Bell., Lach.).

Akne mit Komedonen, die sehr leicht zur Eiterung neigen.

Bläuliche Ringe um die Augen.

Schmutzig aussehendes und fettiges Gesicht.

Schwellung der Oberlippe.

MUND

Schwierige und langsame Zahnung.

Untersuchungsergebnisse:

- Zahnfleisch: **Blut oder Eiter quellen bei Druck hervor; Eiterfluss;**

Zähne: Karies; verkümmerte Zähne mit **gezackten Rändern** (Med., Plb.).
Zunge: Cremiger Belag auf der vorderen Hälfte der Zunge mit roten Streifen, die in der Mitte abwärts laufen ODER **Landkartenzunge** (Ars. Nat-m.) mit vergrößerten und aufrechten Papillen; Geschwüre auf der Zunge.
Mundgeruch.

HALS

Chronische oderwiederkehrende Entzündung der Tonsillen.
Häufig Halsschmerzen nach Genuss von geringsten Mengen von Farbstoffen, die in vielen Fastfood-Artikeln benutzt werden.

Trockenheit der hinteren Nasenhöhlen.

Die Halsschmerzen erstrecken sich zu den Ohren.

Untersuchungsergebnisse:

- **Struma.**

Halslymphknoten vergrößert, hart, paketbildend und empfindlich.

Entzündete und vereiterte Tonsillen, mit sichtbaren Follikeln.

Retronasale Absonderung.

MAGEN

Unstillbarer Heißhunger, schlimmer nachts, mit Abmagerung.

Übelkeit beim Anblick oder Geruch von Speisen, mit gesteigertem Durst.

Erbrechen bei Durchfall.

Abneigung: Käse, Eier, Fleisch, Milch, Ananas und saure Speisen.

Verlangen: **Speck** (Ars., Sanic.), Bananen, Käse, Schokolade, **kalte Milch** (Apis, Rhus-t.), Fett, **Schinken** (Uran-n.), Fleisch (roh und **geräuchert**), Eiscreme, **Schweinefleisch** (Crot-h., Mez.), Kartoffeln, Scharfes, Salz, **Salami** (Calc-p.), **Wurst** (Sil.), Gewürze und Süßigkeiten.

ABDOMEN

Schmerz in der Nabelgegend bei Durchfall.

Untersuchungsergebnisse:

- Aszites ++.

Bei Palpation: Leistenlymphknoten vergrößert und verhärtet.

Bei Perkussion: Tympanitische Auftreibung.

Kugelig aufgetriebenes Abdomen.

Ultraschallbild: Leber und Milz vergrößert, mit Vergrößerung der Mesenterialdrüsen.

REKTUM

Durchfall durchtuberkuläre Prozesse irgendwo im Körper.

Frühmorgendlicher Durchfall (Cench.) **ohne Erschöpfung** oder Schwäche (Ph-ac., Sulph.).

Chronischer, schmerzloser Durchfall mit übermäßigem Schweiß bei unterernährten Kindern.

Unwillkürlicher Stuhlgang beim Abgang von Blähungen oder beim Urinieren.

Stühle: Braun, schwallartig unter Druck entleert, faulig, übelriechend, plötzlich herauspritzend, unverdaut und wässrig.

Untersuchungsergebnisse:

Koloskopie: M. Crohn.

Wundheit am Anus.

Proktoskopie: Fissuren, Fisteln und Hämorrhoiden.

Routine-Stuhluntersuchung: Madenwürmer und Spulwürmer.

Sigmoidoskopie: Colitis ulcerosa.

HARNWEGE

Nephrotisches Syndrom.

Spritzender Strahl.

Glomerulonephritis nach eitriger Angina.

Untersuchungsergebnisse:

Nierenbiopsie: Membranproliferative Glomerulonephritis.

Urin: Albumin ++ und granuläre Zylinder.

Urinkultur: säurebeständige Bakterien positiv.

GENITALIEN

Schon sehr früh übermäßiges sexuelles Verlangen.

Neigung zu masturbieren.

Untersuchungsergebnisse:

Erhöhter Serum-Testosteron-Spiegel bei jungen Mädchen.

Schlaffes Skrotum.

Hodenhochstand (Kryptorchismus).

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Laryngitis.

Untersuchungsergebnis:

- Direkte und indirekte Laryngoskopie: Glottisödem, Knoten auf den Stimmbändern und Schwellung der Stellknorpel.

ATMUNG

Asthma schlimmer nachts, beim Hinlegen oder **in einem zu warmen Zimmer; besser im Freien** (Am-c.).

Allergien der Atemwege hauptsächlich durch kalte Speisen, Tiefkühlkost, Konserven oder Speisen, die viel Farbstoffe und Emulgatoren enthalten.

Allergisches Asthma bei Kindern mit einer ausgeprägten Familiengeschichte von Tuberkulose oder tuberkulösem Miasma.

Untersuchungsergebnisse:

Atemfrequenz beschleunigt ohne Dyspnoe.

Bronchialatmen ++.

Muss häufig tief durchatmen.

Keuchendes Atemgeräusch +.

HUSTEN

Trockener, bellender und erstickender Husten oder Keuchhusten.

Husten im Schlaf, verhindert den Schlaf und ist schlimmer beim Liegen auf der rechten Seite; besser durch kalte Getränke.

Grünlicher, dicker gelber Auswurf, der morgens blutig wird.

- Untersuchungsergebnisse:
Kongestion des Rachens ++.
Hält sich die Brust beim Husten (Dros.).
Die hintere Wand des Pharynx ist entzündet.

BRUST

Tendenz, dass sich jede Erkältung in der Brust festsetzt und zur Bronchitis oder Bronchopneumonie wird oder zum Keuchen führt.

Miliar- oder Lungentuberkulose.

Tuberkulöser Pleuraerguss.

Untersuchungsergebnisse:

Röntgen/Thorax: Lungenspitzen unscharf oder streifig verdichtet; Schmetterlingsartige Verschattung über beiden Lungenfeldern; Kavernenbildung; Adhäsionen im Pleurawinkel; **Vergrößerung der Hilusdrüsen ++** (Calc., Iod.); Verdichtung im linken unteren Lappen und **multiple miliare Trübungen**.

Verdichtung des rechten oberen Lappens (Chel., Nat-s.).

Rasselgeräusche ++ und Giemen.

Abmagerung der Brust, besonders um Schlüsselbeine und Rippen.

Empyem.

Stinkender Achselschweiß.

Pes Cavus.

Pleuraerguss.

Pleurareiben +.

Rachitischer Rosenkranz.

RÜCKEN

Spinalmeningitis.

Untersuchungsergebnisse:

CT: **Kalter Abszess** (Sil.); Wirbel- und Deckplatteneinbrüche; Degeneration der Bandscheiben; Degeneration der Lenden- und Halswirbel; entzündliche Schwellung mit Knochenzerstörung.

Verkrümmung der Wirbelsäule.

Haarwuchs auf der Wirbelsäule.

Kernig-Zeichen +.

Kyphoskoliose.

SLR (Lasegue) +.

Röntgen: Spina bifida.

EXTREMITÄTEN

Reiter-Syndrom.

Sjögren-Syndrom.

Still-Syndrom.

Untersuchungsergebnisse:

Verkrümmte, brüchige, mandelförmige Nägel, mit weißen Flecken darauf.

Anti-ANA und Anti-DNA-Test +.

C-reaktives Protein ++.

Erguss im Kniegelenk.

Beugungsdeformität an Knie-, Hüft- und Ellbogengelenken.

Genu valgum.

Mendel-Mantoux-Test positiv, bei Verhärtung und Entzündung mit mehr als 20 mm.

Rötliche Verfärbung der Zehen.

Serum RA-Test ++.

SCHLAF

Position: Genupektoral (Knie-Brust-Lage) (Med., Phos.), auf dem Bauch, das Gesicht ins Kissen gepresst.

Schlaflosigkeit durch Hunger (Lyc.); können nicht schlafen, bis sie etwas essen.

Im Schlaf: Husten, Zähneknirschen, Zucken der Muskeln, Aufschreien oder plötzliches Zusammenfahren vor Schreck.

FIEBER

Trockener hackender Husten während des Frost- und Hitzestadiums.

Übelkeit und Erbrechen mit gesteigertem Durst bei Fieber.

Extrem nützlich bei Fieber entzündlichen oder septischen Ursprungs oder bei Pyrexie unbekannter Herkunft.

Pyrexie bei malignen Erkrankungen, besonders M. Hodgkin, Lymphom und Leukämie.

HAUT

Atopisches Ekzem; Ekzeme, die sich nach Missbrauch von Antibiotika und zu vielen Impfungen entwickeln, besonders nach BOG, Hepatitis B und Polio.

Bei Ekzemen kratzt das Kind heftig, sobald kaltes Wasser die Haut berührt und sucht dann die Nähe der Heizung, um Erleichterung zu bekommen.

Allergische Hautausschläge nach Milchkonsum.

Trockene, raue und empfindliche Haut, die leicht gebräunt wird.

Das Jucken ist schlimmer beim Ausziehen und besser durch Ofenwärme.

Untersuchungsergebnisse:

Erythema nodosum.

Impetigo.

Keloid.

Blasse, dünne und durchscheinende Haut.

Psoriasis.

ALLGEMEINES

Allergische Konstitution; besonders gegen Tierhaare (Pelze) und Katzen (Ars.).

Abmagerung mit Schwäche und Heißhunger.

Starkes Verlangen nach frischer Luft (Sulph.); will im Auto, Bus oder Zug nahe am Fenster sitzen, um den direkten Luftzug zu haben.

Verzögerte Rekonvaleszenz von jeglicher Infektionskrankheit, wie Windpocken, Influenza, Masern, Mumps oder Typhus.

Nie wieder gesund nach Impfungen oder Antibiotika.

Oft hilfreich, wenn gut gewählte Mittel versagen und es Hinweise auf das tuberkulinische Miasma gibt; wenn viele Symptome vorhanden sind; wenn das Bild unklar ist oder wenn die Symptome sehr häufig wechseln.

Reichlicher Schweiß im Schlaf, nach Mitternacht, besonders in der Halsregion, mit großer Schwäche.

Wiederkehrende Abszesse.

Neigung zu Eiterung von Knochen und Drüsen.

TUBERCULINUM MARMORECK

(Tuberkulinum Nosode vom Pferd - Tub-m.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Tuberkulose in der Familienanamnese.

Immer müde, hager, dünn und abgemagert mit sehr wenig Appetit.

Blasses Gesicht, aber die Lippen sind rot, dunkel, trocken und rissig.

Rot verfärbte Zunge.

Vergrößerte und verhärtete Unterkieferlymphknoten.

Verlangen nach geräuchertem Fleisch, gesalzenem Fleisch und eingelegten Speisen.

Schlimme Verstopfung durch Untätigkeit des Rektums; trockener, harter Stuhl, kalte Finger und Zehen.

Jede körperliche Anstrengung verschlimmert.

Wandernde rheumatische Schmerzen bei Kindern.

Schlaflosigkeit bei jungen Schulkindern.

HERKUNFT

- Marmoreck stellte 1903 dieses Arzneimittel her, indem er ein Pferd mit einer aufbereiteten Kultur frischer Tuberkulose-Bazillen impfte.

VACCINE ATTENUÉE BILIE

(BCG Impfnosode - V-a-b.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Hager, dünn und abgemagert.

Vorgeschichte von wiederkehrender Bronchitis und ausgeprägte

Familiengeschichte von sich wiederholender Tuberkulose.

Schwächlich und Beschwerden durch geistige Anstrengung.

Kommt jeden Tag mit Kopfschmerzen von der Schule nach Hause.

Kopfschmerzen schlimmer durch geistige Anstrengung oder durch Konzentration beim Lernen.

Eingerissene Mundwinkel.

Heftige Schmerzen im linken Ohr.

Wiederkehrende Tonsillitis mit vergrößerten Halslymphknoten. Chronische

Entzündung der Halslymphknoten kann auch in Eiterung übergehen.

Trockener, erschöpfender, hackender Husten.

Wenig Appetit.

Schwäche der Wirbelsäule; Wirbelsäulenverkrümmung.

Erkältungsneigung.

Sehr frostig.

Impfschäden von der BCG-Impfung.

VERATRUM ALBUM

(Weißer Germer - Verat.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Gekünstelt (Stram.); ziert sich gern mit affektierter Gestik und geschraubten Worten.

Ehrgeizige Kinder (Nux-v.); schon früh wissen sie genau, was sie später werden wollen, z. B. Arzt, Ingenieur, Wissenschaftler etc.

Neugierig (Lyc., Puls.); stellt viele Fragen und will das Wie und Warum von allem wissen.

Dandyhaft bis affig (Chin.).

Hochmütig (Plat., Sulph.), prahlt gern, kleiner Aufschneider.

Ruhelose Kinder (Merc., Rhus-t.); von einem Platz zum nächsten getrieben; können nicht stillsitzen.

Stellen religiöse Fragen.

Kindliche Verhaltensstörungen durch Kummer, Schreck oder Furcht.

Wohlverhalten gegenüber Autoritäten (z. B. Eltern oder Lehrer), wird aber zum Teufel gegenüber Schwächeren.

Muss alles anfassen.

Frühreif.

Neigt zum absichtlichen Lügen und Simulieren von Krankheiten.

Eitelkeit (Bell.).

KÖRPER

Durst auf viel kaltes Wasser.

Das typische Bild eines Schockzustands durch Hypovolämie oder zu geringes Herzminutenvolumen, periphere Gefäßstörungen und Septikämie.

Charakterisiert durch Kollaps mit Zyanose und kaltem Schweiß, hippokratisches Gesicht und Eiseskälte des ganzen Körpers mit kleinem, kaum fühlbarem Puls und nicht messbarem Blutdruck.

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Beißt Nägel.

Das Kind wandert ruhelos im Haus und in der Schule umher.

Hinterlistig (Lach., Nux-v.), nutzt die Situation schlau aus.

Schreibt, zeichnet und malt gern. Sehr kreativ.

Will nackt sein (Hyos., Phos.); lieber keinen Schlafanzug oder Nachthemden tragen.

Destruktiv (Stram., Tarent.), **macht gern Sachen kaputt**: zerschneidet oder zerreit Kleidung, Papier, Notizbcher, zerbricht Bleistifte, Mbel, Instrumente und Spielzeug.

Ungehorsam und trotzig, besonders gegenber schwcheren oder sanfteren Personen.

Furcht vor rzten (Ign., Phos.), **Hunden** (Chin., Stram.) **und Wasser**.

Schwierig zu fttern und launisch beim Essen.

Eifersucht zwischen Kindern oder seit der Ankunft eines neugeborenen Geschwisterchens in der Familie.

Verspottet Klassenkameraden und Freunde mit Leidenschaft.

Steckt die Finger in den Mund.

Lchelt dauernd dmmlich (Merc.).

Heftige Wutanflle; runzelt die Stirn, zieht an den Haaren, kreischt und **spuckt** (Cupr., Lyss.).

Verlangen, getragen zu werden.

Schmutzig.

Extravagant (Bell., Caust.) in Sprache und Kleidung.

Groe Angst vor schwarzem Spielzeug oder schwarzen Wohnungsgegenstnden.

Treibt den ganzen Tag lang nur Unfug.

Reist und streunt gern umher.

Boshaft.

Weinen im Schlaf und bei Schmerzen.

AUFMERKSAMKEITSDEFIZITSTRUNG (ADS)

Hyperaktivitt mit Ungehorsam.

Stampft mit den Fen.

Enorme Ruhelosigkeit, die sich in repetitivem Verhalten ausdrckt; zerschneidet Kleidung und Papier in winzige Stckchen, isst Radiergummis, steckt Dinge in den Mund, kaut auf Bleistiften oder Hemdkragen herum usw.

Will sofortige Antworten auf alle seine Fragen.

Umarmt oder ksst jeden, um sich beliebt zu machen.

Zorn mit Gewaltttigkeit.

Die Phasen der Aufmerksamkeit sind kurz und schwach; kann sich keine Minute hinsetzen zum Lernen; strt auch andere Schler seiner Klasse.

Redselig.

Rennt herum.

Schamlos.

Schreit leicht.

Kindliche Frustration durch:

- Disharmonie bei den Eltern.

Pltzlicher Wechsel im sozialen/finanziellen Status.

Zu wenig Aufmerksamkeit durch berehrgeizige Eltern.

Diese Frustration macht das Kind unzufrieden und es wird trotzig und ungehorsam.

Unaufrichtig.

Beim Mittagessen rennt er ums Haus und die Mutter luft hinter ihm her; so kann es durchaus vier Stunden dauern, bis er gegessen hat.

KOPF

Bohrt im Schlaf den Kopf in das Kissen.

Das Haar verfilzt leicht.

Untersuchungsergebnisse:

Kalter Schweiß auf der Stirn.

Reibt die Stirn mit der Hand.

Brudzinski-Zeichen +.

Zerebrale Hämatome bei Neugeborenen nach der Geburt.

CT: Hirnblutung; Hydrozephalus.

Kernig-Zeichen +.

Rollen des Kopfes.

Unfähig, den Kopf aufrecht zu halten.

Faltige Stirn.

AUGEN

Tränenfluss bei Schnupfen.

Lähmung des Sehnervs.

Photophobie.

Untersuchungsergebnisse:

Die Augenlider sind halb offen.

Perimetrie: Hemianopsie.

Spasmen des M. orbicularis palpebrarum.

Blepharitis.

Blaue Ringe um die eingefallen aussehenden Augen.

Blaue Skleren.

Die Augen werden auswärts und aufwärts gedreht.

Lähmung des linken Oberlides (Gels, Spig).

NASE

• Untersuchungsergebnisse:

Schmale (Lyc.) und spitze Nase (Camph.).

Bohrt ständig mit den Fingern in der Nase.

Eisige Kälte, besonders der Spitze (Apis).

GESICHT

• Untersuchungsergebnisse:

Bläulich, kalt, hippokratisch (Ant-t, See.), spitz und leichenblass beim Aufstehen; wirkt erschreckt.

Presst die Kiefer zusammen.

Bläuliche Gesichtsfärbung bei Konvulsionen, beim Husten, bei Durchfall oder im Zorn.

Rissige Lippen.

Linke Wange rot (Phos.).

Schwellung der submaxillaren Lymphknoten.

MUND

Beißt beim Füttern in das Glas (Cina, Cupr.).

Zähneknirschen, besonders im Schlaf (Bac., Bell., Cina, Tub.).

Schwierige Zahnung.

Erhöhter Speichelfluss bei Husten und Fieber.

Untersuchungsergebnisse:

Beißt sich auf die Zunge.

Schaum vor dem Mund.

Lispelnde und stammelnde Sprache.

Schwellung des Zahnfleischs.

Zunge: Schlaff, blass, mit einem roten Streifen in der Mitte ODER weiß, mit roter Spitze.

HALS

Schlucken unmöglich.

Aufgenommene Flüssigkeiten werden mit Druck aus der Nase wieder herausgebracht.

Untersuchungsergebnisse:

Lähmung des **Ösophagus** (Ars., Bapt., Gels., Op.).

Exophthalmische Struma.

Lähmung der Hirnnerven IX. (Nervus glossopharyngeus) und X. (Nervus vagus).

MAGEN

Obst wird nicht vertragen, verursacht schmerzhaftes Auftreibung (Ars., Chin., Lach., Merc.).

Heißhunger (Am-c., Cina, Graph., Iod., Psor.).

Erbrechen beim Stuhlgang (Ars., Camph., Tab.); heftiges Erbrechen bei reichlichem Durchfall.

Erbrechen mit Würgen sofort nach dem Essen (Ferr., Sanic.) **oder nach Trinken von kaltem Wasser** (Bry., Cupr., Kali-c., Verat-v.).

Will nur Fleisch essen und Milch trinken, was bessert (Apis, Ars., Chel., Nux-v.).

Schluckauf tritt auf bei Erbrechen.

Erbrechen während Zahnung.

Erbrochenes: Gallig, schwarz, schaumig, grün, gelb oder reiswasserartig, saurer Geruch.

Abneigung: Frühstück, warme Getränke und warmes Essen.

Verlangen: **Kalte Getränke** (Ars., Cham., Chin., Cina, Nat-s., Phos.), **Gurke** (Ant-c., Phos., Sulph.), **Eis** (Calc., Elaps, Med., Nat-s.), Eiscreme, **Zitronen** (Bell., Merc., Sabad., Sacch.), erfrischende Dinge, **Salz** (Carb-v., Lac-c., Nat-m., Phos.), Sardinen und **saure Früchte** (Ars., Cist., Med., Thuj.).

ABDOMEN

Gastrointestinale Beschwerden begleitet von kaltem Schweiß auf der Stirn (Carbo-veg., Chin., Op.).

Sehr nützlich bei Peritonitis, die durch Intussuszeption, rupturierten Appendix oder strangulierte Hernien (Bell., Lyc., Nux-v., Plb.) **entsteht.**

Eingeklemmte Blähungen.

Schmerzen im Abdomen, erstreckt sich zum Skrotum und den Samensträngen, schlimmer beim Husten.

Schmerzhaftes Einziehen des Abdomens beim Erbrechen.

Umgekehrte Peristaltik.

Untersuchungsergebnisse:

- **Leistenbruch** (Bell., Guaj., Lyc., Nux-v.).

Bei Palpation: **Kalt** (Ambr., Hell., Meny., Phos., Sulph.), hart und empfindlich.

Der Nabel ist empfindlich bei Berührung (Kali-c., Lyc., Sep., Sil.).

McBurney-Punkt empfindlich.

REKTUM

Cholera infantum begleitet von reichlichem, kaltem Schweiß (Ars., Camph., Sec., Sil., Tab.).

Verstopfung bei Kleinkindern (Alum., Bac., Caust.); schwieriger Stuhlgang, obwohl weich.

Schmerzloser Durchfall nach Zorn, Furcht, **Gurken**, Trinken von kaltem Wasser an einem heißen Tag (Carbo-veg., Nat-s., Nux-m.), **Früchten** (Ars., Bry., Chin., Coloc., Nat-s., Puls.) oder nach Nasswerden im Regen (Acon., Calc., Rhus-t.).

Stuhl geht **unwillkürlich ab durch Schreck** (Gels., Op., Phos.) oder mit Flatus.

Stühle: Scharf-ätzend, gallig, schwarz oder grün, geruchlos; wässrig und in großen Mengen schwallartig entleert.

Untersuchungsergebnisse:

Stuhl: Leukozyten ++ (Arn., Merc., Puls.), Erythrozyten und Bandwurmsegmente.

Stuhlkultur: E. coli, Salmonella typhi, Shigella und V. cholerae.

HARNWEGE

Unwillkürliches Urinieren beim Husten oder Niesen (Caust., Nat-m., Puls.).

Kein Harndrang trotz gedehnter Blase (Ars., Caust., Hyos., Phos., Plb.).

Harnverhaltung bei Kindern, die unter hypovolämischem Schock durch Dehydratation leiden (Camph., Canth., Lach., Op.).

Spärlicher, dicker, grünlicher Urin (Camph., Merc-c.).

Untersuchungsergebnis:

- Urin: E. coli, granuläre Zylinder + und Leukozyten ++.

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRE

Laryngismus stridulus (Bell., Gels., Ign., Mosch.).

Spasmen im Larynx durch Husten (Cor-r., Cupr., Dros., Hyos., Sulph.).

ATMUNG

Asthma bei feuchtem Wetter (Aur., Chin., Dulc., Nat-s.) **oder durch Gefühlserregung** (Acon., Coff., Gels., Ign.); **mit kollaptischem Zustand.**

Das Kind atmet leichter durch Überstrecken des Kopfes nach hinten (Bell., Cham., Spong.).

Untersuchungsergebnis:

- Unregelmäßige, rasselnde und ungleichmäßige Atmung.

HUSTEN

Vernachlässigter Keuchhusten mit Komplikationen.

Andauernder heftiger Husten mit Würgen (Carbo-veg., Dros., Nit-ac., Puls.).

Husten besonders beim Weinen (Arn., Bell., Cina, Hep.).

Hohl und anfallsweise, mit jeweils 3-4 Hustenstößen.

Keuchhusten mit Konvulsionen (Cupr., Kali-br., Meph., Sep.).

Untersuchungsergebnis: Schnappt nach Luft beim Husten.

BRUST

Pneumonie bei Typhus (Ant-t., Arn., Ars., Bry., Op., Phos., Sulph.).

Rheumatische Endokarditis.

Zwerchfellospasmen (Arg-n., Bell., Mosch., Stram.).

Untersuchungsergebnis:

- Röntgen/Thorax: Kollaps; Verdichtung; vermehrte bronchovaskuläre Markierungen; Pleuraerguss; Lungenembolie.

RÜCKEN

Der Hals ist so schwach, dass er kaum den Kopf aufrecht halten kann (Gels., Nux-m.).

Untersuchungsergebnisse:

- Abmagerung der Nackenmuskeln (Calc, Lyc, Nat-m, Sanic).
- Spasmen der Nackenmuskeln beim Drehen des Kopfes.

EXTREMITÄTEN

Rucken und Zucken der Extremitäten nachts im Bett.

Untersuchungsergebnisse:

- Gang: Taumeln, Schwanken, Torkeln und Wanken (Arg-met., Bar-c., Caust., Nux-v., Plb., Rhus-t.).
- Eisige Kälte der Hände und Füße (Camph., Carbo-veg., Eup-per., Nux-m.).
- Schrumpelige Hände und Finger (Ph-ac., Phos.).
- Blaufärbung der Hände und Fingernägel mit Frösteln (Ars., Chin., Nat-m., Nux-v., Rhus-t.).

HAUT

Gänsehaut, besonders nach Trinken (Chin.).

Untersuchungsergebnisse:

- Bläuliche Verfärbung (Carbo-veg., Dig., Lach., Op., Verat-v.).
- Eisige Kälte (Ars., Calc., Camph., Carbo-veg., Nat-m.).
- Krätze (Ars., Kali-s., Psor., Sulph.).

SCHLAF

Komatöser oder verlängerter Schlaf über mehrere Tage (Lach., Sep.).

Im Schlaf: Nasenbluten, Zähneknirschen (Ars., Bac., Cina, Tub.), Stöhnen (Bar-c., Bry., Op., Stram.), Aufschreien (Borx., Lyc., Puls., Tub., Zinc.) und plötzliches Zusammenfahren (Hyos., Kali-c., Op., Tarent.).

Schläfrigkeit bei Fieber (Anac., Apis, Borx., Rhod., Sulph.).

FIEBER

Frost, gefolgt von Hitze, gefolgt von Schweiß.

Frost:

- Schlimmer am Morgen, nicht besser durch Wärme in jeder Form (Chin., Cina, Lach., Merc., Nux-v., Phos.).

• Hitze:

Wärme wirkt befriedigend (Apis, Chin., Ferr., Op., Puls., Stram.).

Enge Pupillen.
Nasenbluten.
Rötung des Gesichtes.

- Schweiß:
Zusammengezogene Pupillen.
Langandauernder, saurer (Colch., Hep., Iod., Merc., Psor., Sulph.) Schweiß,
sogar im fieberfreien Stadium.
- Untersuchungsergebnisse:
Blutbild: Anämie und Leukozytose.
CSF: H. influenzae +, Meningokokken +.
Ausstrich/dicker Tropfen: Malariaparasiten (cerebrale Malaria).

KONVULSIONEN

- Beschwerden durch:
Fieber (von Malaria oder meningal) (Bell., Caust., Cina, Ferr-p., Hyos., Nux-v., Stram.).
Zorn oder Schreck bei Säuglingen (Cham., Cupr., Nux-v., Op., Puls., Staph.).
Husten (Cina, Cupr., Ipec.).
- Während Konvulsionen:
Kaubewegungen oder festes Zusammenpressen der Kiefer (Bry., Calc., Hell., Lyc., Phos., Stram.).
Eisige Kälte von Gesicht und Extremitäten (Bell., Camph., Cic., Cupr., Hell.).
Deutliche Zyanose mit bläulicher Verfärbung des Gesichts (Bell., Cic., Cina, Cupr., Hydr-ac., Hyos., Ipec., Oena.).
Klonisch-tonische Kontraktionen.
Schaum vor dem Mund.
Zuckungen, die in den Extremitäten beginnen.
Stöhnen.
Rollende Kopfbewegungen (Bell., Cupr., Stram., Tarent., Tub.).
Aufschreien.
Heftiges Temperament (Bell., Stram.).
- Nach Konvulsionen:
- Ohnmachtsartige Schwäche mit kaltem Schweiß (Cupr., Nux-v.).

ALLGEMEINES

Dieses Mittel bietet das typische Bild des Schocks mit Herz-Kreislauf-Versagen, entweder ausgelöst durch Hypovolämie oder zu geringes Herzzeitvolumen, peripheres Kreislaufversagen oder Sepsis; es ist charakterisiert durch Kollaps mit eisiger Kälte des ganzen Körpers, kalten Schweiß, Zyanose, facies hippocratica, kleinen, kaum fühlbaren Puls und nicht messbaren Blutdruck.

Wird leicht ohnmächtig schon bei geringen Verletzungen oder Schmerzen (Cham., Hep., Nux-v.).

Schwäche durch Schweiß (Arn., Camph., Chinin-s., Iod., Merc., Psor.).

Schlimmer durch Wetterwechsel von warm nach kalt (Caust., Dulc., Merc., Rhus-t., Sil.).

HERKUNFT

Synonym: Weiße Nieswurz. Familie der Liliaceae.

VINCA MINOR

(Immergrün - Vine.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Reizbar durch geistige Anspannung. Verdrießlich und streitsüchtig, aber bereut dies bald und entschuldigt sich.

Ekzem der Kopfhaut und des Gesichts. Nässende, eitrige Ausschläge, die schlecht riechen. Milchschorf; übermäßiger Juckreiz am Kopf, schlimmer nachts.

Haarausfall, das nachwachsende Haar ist grau. Verfilztes Haar (Weichselzopf). Leichtes Verfilzen der Haare. Auf der Kopfhaut Beißen und Brennen mit Juckreiz durch Kopfläuse.

Nässendes Ekzem im Gesicht, besonders um die Nase herum; fettige Gesichtshaut.

Krätze bei Kindern, unangenehm riechender Ausschlag mit abschilfernden Schuppen. Am Kopf unwiderstehliches Verlangen zu kratzen.

Rote Nase bei Zorn.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae).

VIOLA ODORATA

(Märzveilchen - Viol-o.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Große Abneigung gegen Musik.

Große, dünne Mädchen mit hellem Teint und dunklem Haar.

Anhaltendes Gefühl von Spannung auf der Kopfhaut und deshalb runzelt das Kind die Stirn.

Anfällig für Migräne genau über den Augenbrauen.

Choroiditis (Entzündung der Aderhaut des Auges).

Durch allopathische Medizin (Antibiotika und entzündungshemmende Ohrtropfen) unterdrückte Mittelohrentzündung und dann Taubheit als Spätfolge.

Ohrabsonderungen von Geburt an. Mittelohrentzündung des linken Ohrs, Eiterung im Ohr mit heftigen, stechenden und schießenden Schmerzen.

Wurmbefall.

Übermäßige Schwäche der Nackenmuskeln. Kann den Kopf nicht gerade halten, da er zu schwer ist.

Rheumatismus bei Kindern, besonders auf der rechten Seite, im rechten Deltamuskel, im rechten Handgelenk und im rechten Knie. Nach Dr. Hering das spezifische Mittel für Rheumatismus des Handgelenks.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Veilchengewächse (Violaceae).

VIOLA TRICOLOR

(Stiefmütterchen - Viol-t.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Schlecht gelaunt und griesgrämig. Hastig bei allen Tätigkeiten. Fröhlich am Abend und schlecht gelaunt tagsüber.

Kinder mit Impetigo und chronischem Ekzem. Leiden seelisch durch Ablehnung oder Ungerechtigkeit von Familienangehörigen, von denen sie emotional abhängig sind. Die Situation ist deshalb so schlimm, weil das Kind nicht ausweichen kann, aber auch nicht in der Lage ist, seine Rechte zu verteidigen.

Impetigo und Akne rosacea. Der Ausschlag im Gesicht dehnt sich auf die Kopfhaut aus.

Milchschorf oder Kopfgrind mit dicken Verkrustungen und reichlichen Absonderungen von dicker, gelber Flüssigkeit, die die Haare verfilzen.

Wunder Ausschlag mit exzessivem, unwiderstehlichem Jucken. Juckreiz schlimmer nachts, kurzfristig besser durch Reiben. Ekzem schlimmer im Winter. Vergrößerte, geschwollene und verhärtete Halslymphknoten.

Nervöse Beschwerden, insbesondere Muskelzuckungen durch unterdrückte Hautausschläge.

Gesichtsschweiß beim Essen.

Wurmbefall bei Kindern.

Picklige Ausschläge in den Achselhöhlen, ungesunde Haut, jeder Kratzer eitert oder heilt nur schwer.

Urin mit strengem Geruch wie Katzen-Urin.

Leukorrhoe bei jungen Mädchen.

Extrem frostig.

Schlaf mit nach hinten gebeugtem Kopf.

HERKUNFT

- Gehört zur Familie der Veilchengewächse (Violaceae).

ZINCUM METALLICUM

(Elementares Zink - Zinc.)

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

GEIST

Schwatzhaft bei Fieber (Bapt., Gels., Lach., Pyrog., Stram., Teucr., Tub.).

Kitzelig (Kali-c., Phos., Sil.).

Viele Gesten: Tics (Agar., Cupr., Stram., Verat.), steckt die Finger in den Mund (Calc., Cham., Ipec., Sacch.), steht oder sitzt in seltsamen Positionen (Agar., Cina, Coloc., Nux-m., Op., Plb.).

Hastiges Essen und Trinken (Bell., Coff., Hep., Sulph.).

Nachtschreck (pavor nocturnus) (Aur-br., Cina, Kali-br., Stram.).

KÖRPER

Ruhelose Beine, besonders ruhelose Füße, schlimmer im Bett (Sulph.) und beim Sitzen (Alum., Bar-c., Puls.).

Empfindlich gegen kalte Zugluft (Calc., Kali-c., Rhus-t., Sil., Sulph.).

Überstimulation des ZNS führt zu Ruhelosigkeit und unwillkürlichen Bewegungen (Agar., Hyos., Stram.); danach folgt ein Zustand der Dumpfheit (Anac.).

Nervöse Erschöpfung durch Lernstress in der Schule (Bar-c., Lyc., Nux-v., Sil.).

Zuckt im Schlaf, mal hier mal da (Cham., Hyos., Stram.).

Weitere wichtige Symptome

GEIST

Dumpfheit mit Unfähigkeit, sich zu konzentrieren (Agar., Bar-c., Bar-m., Op.).

Schrickt schnell zusammen, bei Kleinigkeiten und im Schlaf (Borx., Hyos., Kali-c., Merc., Puls., Tarent., Verat.).

Nächtliche Angst bei Kindern (Ars., Borx., Calc., Cina, Kali-br., Stram., Tub.).

Grundloses Weinen (Apis, Cina, Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.).

Das Kind ist extrem empfindlich gegen Musik und Geräusche; sogar das Rascheln von Papier ist nicht zu ertragen (Asar., Ferr., Lyc., Nat-c., Nat-s.).

Gefügige Kinder.

Vorliebe für Pink (Ign., Nux-v., Phos., Sep., Sil.) und Weiß (Ars-i., Lach., Nux-v., Phos., Sep., Sil., Staph., Tub.).

Furcht in der Dunkelheit (Carc., Cann-i., Med., Stram., Tub.), vor Geistern (Lyc., Med., Phos.) und Räubern (Ars., Lach., Merc., Nat-m., Phos.).

Geringe künstlerische Fähigkeiten (Bell., Calc., Hyos., Mag-c., Plat., Staph., Stram.).

Schreien im Zorn (Cham., Iod., Lac-e., Nux-v.) und im Schlaf (Borx., Lyc., Puls., Tub.).

Sehr unzufrieden (Anac., Carc., Hep., Merc., Tub.).

Schwaches Erinnerungsvermögen.

KLINISCHE BEOBACHTUNGEN BEI EINEM GEISTIG ZURÜCKGEBLIEBENEN

ZINC.-KIND

Denkt lange Zeit nach, bevor er antwortet (Bar-c., Cocc., Hell., Ph-ac., Phos.).

Vorgeschichte: Die Mutter erlitt in der Schwangerschaft einen schweren Schock mit Zorn oder Demütigung und bekam ein geistig behindertes Kind (Bufo, Carc., Cham., Kali-br., Op.).

Sprache: Wiederholt immer das Gleiche (Coff-t, Lach., Plat.).

Antwortet einsilbig (Kali-br., Ph-ac., Puls., Verat.).

Antwortet sehr langsam (Alum., Gels., Hell., Merc., Ph-ac., Phos.).

Chaotisch.

Dumpf und schläfrig, versteht nicht das Geringste von einem Gespräch, das in seiner Gegenwart stattfindet (Calc-sil., Sacch., Staph.).

Lacht dauernd und über Belanglosigkeiten (Cann-i., Hyos., Lyc., Mosch., Puls., Stram., Stry.).

Jede geistige Anstrengung verschlechtert (Arg-met., Calc., Ign., Kali-p., Lyc., Nat-c., Nux-v., Pic-ac., Staph., Tub.).

Sprache unzusammenhängend.

Sprache langsam.

Sprache unintelligent (Bell., Hyos., Ph-ac., Stram.).

KOPF

Kopfschmerzen bei Kindern, die mit ihren Studien überlastet sind (Bar-c., Calc-p., Kali-p., Pic-ac.).

Hydrozephalus nach Cholera infantum oder Durchfall.

Untersuchungsergebnisse:

Kalte Stirn mit heißem Hinterkopf (Agar., Camph., Sulph., Verat.).

Kinder mit Hydrozephalus, die gern den Kopf im Kissen vergraben oder ihn gegen Dinge schlagen und dauernd mit den Zähnen knirschen (Apis, Bell., Tub.).

Unwillkürliche Kopfbewegungen beim Sprechen (Acon., Cocc.).

Gerunzelte Stirn (Caust., Cham., Graph., Lyc., Nux-v., Stram.).

Brudzinski-Zeichen +.

Das Kind kann den Kopf nicht aufrecht halten.

Haare: Gefühl, als ob sie sich sträubten, Empfindlichkeit.

Kernig-Zeichen +.

Rollen des Kopfes.

AUGEN

Tränenfluss beim Essen (Ol-an.).

Photophobie.

Untersuchungsergebnisse:

Hippus (springende Pupillen).

Hornhauttrübung (Arg-n., Con.).

Pupillen: Eine eng, die andere weit (Phys., Rhod.).

Lidknorpelschwellungen (Staph., Thuj.).

Argyll-Robertson-Zeichen.

Chalazion.

Konjunktivitis.

Foster-Kennedy-Syndrom.

Holmes-Adie-Pupillen.

Iritis.

Lähmung der Oberlider (Caust., Gels.).

Pterygium.

Rollen, Nystagmus.

Schielen.

Eingesunkene Augen.

OHREN

- Untersuchungsergebnisse:

Otorrhoe mit stinkendem Eiter.

Schweiß um die Ohren (Calc., Puls.).

NASE

- Untersuchungsergebnis:

- Bohrt und zupft ständig mit den Fingern an der Nase (Arum-t., Sil.).

GESICHT

- Untersuchungsergebnisse:

Hippokratischer Gesichtsausdruck (Aeth., See.).

Lippen zusammenklebend, trocken und rissig.

MUND

- Untersuchungsergebnisse:

Rissige Mundwinkel (Cund., Graph.).

Zahnfleisch schwammig, von den Zähnen abgelöst (Kali-p., Merc.).

Mundgeruch.

Herpes auf der Zunge (Nat-m.).

HALS

Speisen bleiben im Hals stecken beim Versuch zu schlucken (Lach., Nit-ac.).

Würgen beim Schlucken (Lyc., Puls.).

Schleim: Grünlichgelb und schwer abzu husten.

Untersuchungsergebnisse:

Lähmung des Nervus vagus.

Tonsillen vergrößert und entzündet.

MAGEN

Große Hast beim Essen und Trinken (Coff., Hep.).

Flüssigkeiten werden sofort nach dem Trinken erbrochen (Ant-c., Phos.).

Heißhunger um 11 Uhr (Iod., Sulph.).

Heftiger Schluckauf (Nat-m., Nicc., Stram.).

Extremer Durst.

Appetitverlust mit sauberer Zunge.

Erbrochenes: Schwarz und blutig.

Verschlimmerung: Brot (Bry.), Milch (Aeth., Mag-m.) und Melonen (Ars., Puls.).

Abneigung: **Fisch** (Colch., Graph.), Zucker (Caust.) und **Süßigkeiten** (Graph., Phos.).

Verlangen: Kalte Getränke und kalte Speisen (Phos., Verat.).

Untersuchungsergebnis:

- Endoskopie: **Cardia-Achalasie**, Ösophagusspasmen, Gastritis und *Helicobacter pylori*.

ABDOMEN

Unwillkürlicher Abgang von Stuhl (Podo., Psor.) **und Harn** (Aloe, Mur-ac.) **im Schlaf.**

Untersuchungsergebnisse:

Angeborenes Megakolon.

Paralytischer Ileus.

Leistenbruch.

Leber vergrößert und hart.

Eingezogene Bauchwand.

REKTUM

Schwierigkeiten beim Stuhlgang, obwohl weich (Nux-m., Sep.).

Nervöser Durchfall (Arg-n., Gels.).

Stühle groß, trocken und schwierig zu entleeren (Bry., Mag-m.).

Untersuchungsergebnisse:

Ätzende Feuchtigkeit um den Anus (Carbo-veg., Nit-ac.).

Rektumprolaps.

Würmer.

HARNWEGE

Unwillkürliches Urinieren beim Husten (Nat-m., Puls.).

Untersuchungsergebnisse:

Harngrieß, bildet in der Windel ein Sediment.

Urodynamische Untersuchung: Lähmung des Detrusor vesicae, mit schwachem Sphinkter.

HUSTEN

Das Kind greift sich bei jedem Husten an die Genitalien (um das unwillkürliche Urinieren zu vermeiden).

Starker Husten (Anac., Nux-v.).

ATMUNG

Asthma, das nach unterdrückten Masern beginnt (Carbo-veg.).

Möchte zugefächelt bekommen bei Asthma.

Bei Asthma hat das Kind Schwierigkeiten abzu husten.

Schwierige Atmung durch Blähungen (Carbo-veg., Nux-v.).

- Untersuchungsergebnisse:

Die Atmung stockt beim Husten (Ant-t., Cupr., Dros.).

Beschleunigte, ängstliche, hechelnde, rasselnde und langsame Atmung.
Giemen über der ganzen Brust.

BRUST

- Untersuchungsergebnisse:

Perikarderguss.

Pleuraerguss.

MÄNNLICHE GENITALIEN

Neigung zu masturbieren.

Untersuchungsergebnis:

- Nicht deszendierte Hoden sind im Abdomen zu palpieren.

RÜCKEN

Rücken empfindlich gegen Berührung oder Druck.

Untersuchungsergebnis:

- Opisthotonus bei Konvulsionen (Ars., Cic.).

EXTREMITÄTEN

Empfindliche Fußsohlen (Kali-c., Lyc., Med.).

Untersuchungsergebnisse:

Dauernde automatische Bewegungen der Finger (Lach., Stram.), Hände (Kali-i.) und Beine (Caust.): unwillkürlich (Crot-c., Stram.) und nervös.

Blaue Hände.

Zahnradphänomen.

Kontraktion der Muskeln und Sehnen der oberen und unteren Glieder.

Tiefe Sehnenreflexe sind zu stark.

Die Hände zittern, wenn sie auf dem Tisch ruhen (Stann.).

Muskeltonus ++.

Stolpernder, spastischer Gang; torkelt beim Gehen (Agar., Caust.) besonders im Dunkeln und bei geschlossenen Augen (Hinterstrangsymptome).

SCHLAF

Im Schlaf: Kaubewegungen der Kiefer (Calc., Ign.); Zähneknirschen (Ars., Tub.);
offener Mund; Aufschreien; Muskelzucken und Weinen (Cham.).

Schläft mit im Kissen vergrabener Kopf (Apis, Hyper.).

FIEBER

Eitrige oder Kryptokokken-Meningitis.

Starkes Schauern bei Fieber.

Schweiß nach Fieber.

Nützlich in Fällen von Continua-Fieber, Fieber mit Exanthem (besonders Masern) und Typhus.

Untersuchungsergebnis:

- Bräunliche Verfärbung der Zunge.

KONVULSIONEN

Beschwerden durch Kopf- (Cic., Nat-s.) oder **Wirbelsäulenverletzungen** und nach **unterdrückten Ausschlägen** (Cupr., Hyos.).

Bei Konvulsionen springt das Kind vom Bett auf, **knirscht mit den Zähnen, mit nach oben gerollten Augen, rollt oder bohrt den Kopf ins Kissen oder schlägt ihn gegen Dinge** und lässt unwillkürlich Urin unter sich (Bufo, Hyos.).

ALLGEMEINES

Jede Form von Absonderung (Durchfall, Schweiß etc.) bessert (Lach., Phos.).

Bringt keine Exantheme heraus bei schwer immunsupprimierten Zuständen.

Abmagerung bei Kindern, obwohl sie gut essen (Calc-p., Nat-m.).

Neurologische Beschwerden, die nach unterdrückten Ausschlägen (Bry., Dulc.) **oder nach unterdrückten Absonderungen entstehen.**

Schwierige Zahnung mit Durchfall.

Absonderungen: Ätzende, blutige, angreifende und wundmachende Schleimabsonderungen, Eiter, Stühle, Geschwüre, Urin und Erbrochenes.

Essen bessert im Allgemeinen (Iod., Nat-c.).

Vergrößerung der Drüsen, M. Hodgkin.

Empfindlich gegen kalten Luftzug (Rhus-t., Sil.).

Erkältungsneigung (Bar-c., Kali-c., Tub.).

TEIL III

REPERTORIUM

KLINISCHES REPERTORIUM DER KINDLICHEN KONSTITUTIONSMITTEL

(Anmerkung des Herausgebers: Das Repertorium erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Mittel, welche im Repertorium genannt werden, sind nicht alle in der Arzneimittellehre vorhanden.)

A

Abführmittelmisbrauch	Agar, Ant-c, Bry, Coloc, Lach, Nux-v, Op, Puls
Abmagerung	Abrot, Acet-ac, Ambr, Apis, Ars, Arum-t, Bac, Bar-c, Bar-m, Bell, Bor, Bufo, Calc, Calc-hp, Calc-sil, Carc, Caust, Chin, Chir-f, Cina, Cupr, Ferr, Graph, Iodof, Iod, Kali-p, Kreos, Lac-ac, Lach, Led, Lyc, Mag-c, Maland, Mosch, Mygal, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Ol-j, Op, Phos, Pin-s, Plb, Psor, Puls, Sacch, Sanic, Sec, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Teuer, Ther, Thuji, Thyr, Tub, Tub-a, Tub-m, V-A-B, Verat
Abszesse	Anan, Ant-c, Ant-t, Apis, Arn, Ars, Asaf, Aur, Bac, Bar-c, Bar-s, Bell, Berb, Bor, Brom, Bry, Bufo, Calc, Calc-hp, Calc-m, Calc-p, Calc-pic, Calc-sil, Caps, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Con, Crot-h, Elat, Fl-ac, Hecla, Hep, Ign, Iod, Jug-r, Kali-br, Kali-c, Kali-i, Kali-p, Lac-c, Lac-h, Lach, Led, Lyc, Mag-c, Merc, Narc-ps, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Phos, Pyrog, Psor, Puls, Rhus-t, Sanic, Sil, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Tarent-c, Ther, Thuji, Tub
Achalasie	Zinc
Addison M.	Ant-c, Bac, Calc, Calc-p, Caust, Chin, Iod, Nat-m, Phos, Sil
Adenitis	Apis, Bar-s, Kali-c, Kali-m, Merc
Adenoide	Agra, Calc, Calc-p, Carc, Lyc, Mag-c, Psor, Spig, Staph, Sulph, Thuji, Tub
Adipositas s. Fettleibigkeit	
Adenopathie	Bar-c
AIDS s. HIV	
Akne	Amph, Ant-c, Aran, Ars-i, Bar-s, Bell-p, Bov, Brom, Bufo, Calc, Calc-pic, Caps, Carb-v, Carc, Chlorpr, Graph, Hydr, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Lyc, Mag-m, Maland, Med, Nit-ac, Nux-v, Psor, Puls, Sep, Sil, Staph, Thuji, Tub, Viol-t
Akne rosacea	Ars, Aur, Calc, Calc-sil, Caust, Kreos, Phos, Sil, Staph, Sulph-i, Viol-t
Akromegalie	Bar-c, Carc, Med, Thyr

Alkaptonurie	Ambr
Alkoholismus	Agar, Caps, Carc, Psor, Syph
Allergien	Apis, Agar, Agath-a, Ambr, Anth, Antip, Ant-t, Ars, Bac, Bar-m, Bor, Bov, Brom, Calc-sil, Chin, Chlor, Coc-c, Cupr, Des-ac, Kali-c, Lac-c, Lac-d, Lac-del, Lach, Med, Merc-d, Nat-s, Nux-v, Olnd, Phos, Pitu-a, Psor, Puls, Sanic, Sulph, Ther, Thuj, Thy, Tub
Alopecia areata s. a.	Aur, Bac, Calc-p
Haarausfall Alport-Syndrom	
Amblyopie Amöben	Syph Cina Anis, Anth, Ant-t, Calc-p, Caps, Gamb, Lyc, Merc, Merc-d, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Thuj
Anämie	Abrot, Ant-t, Bor, Bry, Calc-lac, Calc-p, Calc-sil, Carc, Chin, Chlorpr, Cupr, Ferr, Kali-c, Kali-p, Lach, Lyc, Merc, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Phos, Plb, Psor, Puls, Sacch, Staph, Thuj, Verat
Anästhesie	Op, Phos
Analblutungen	Apis, Bac, Bar-s, Calc, Calc-p, Ign, Nat-m, Rheum, Tarent
Analfissuren	Calc-sil, Cham, Graph, Ign, Mur-ac, Nit-ac, Plat, Plb, Rat, Ruta, Sep, Sil, Sulph, Syph, Thuj, Tub
Analfisteln s. a. Fisteln	Ant-c, Berb, Calc-p, Caust, Hep, Merc, Sil, Sulph, Tub
Anasarka	Tub
Aneurysma	Acet-ac, Aeth, Apis, Oxyd, Plb
Angiome	Aur, Bar-c, Kali-br, Lyc, Phos, Syph, Thuj
Angioneurotisches (Quincke-) Ödem	Ant-t, Kreos, Lach, Thuj
Anorexie	Agar, Antip, Apis, Thy Ant-c, Bar-c, Carc, Cham, Chin, Cina, Ferr, Ign, Kali-br, Kali-m, Kali-p, Lach, Merc, Nat-m, Plat, Psor, Sacch, Sil, Tarent, Zinc
Antibiotika	Ant-t, Ars, Bry, Coff, Lyc, Mosch, Nit-ac, Nux-v, Puls, Sil, Staph, Stram, Sulph, Thuj, Tub
Aortenklappenfehler	Aran, Aur, Sacch, Syph
Aortenstenose Apoplex s.	Aur
Schlaganfall Appendizitis	Apis, Bell, Bry, Echi, Kali-c, Lach, Merc, Merc-d, Nat-s, Phos, Plb, Pyrog, Rhus-t, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Verat
Aphthen	Aeth, Agar, Anis, Ant-c, Aran, Ars, Bapt, Bor, Bry, Caps, Carc, Chin, Chlor, Con, Hell, Kali-br, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-ac, Lac-c, Lac-del, Lac-h, Lyc, Med, Merc, Merc-cy, Merc-d, Mur-ac, Nat-m,

Aphthen (Forts.)	Nit-ac, Nux-v, Phos, Plb, Psor, Sacch, Sanic, Sars, Staph, Sulph, Sulph-i, Sul-ac
Arthritis	Abrot, Acon, Ant-c, Apis, Aur, Bry, Calc-f, Calc-p, Caust, Cham, Cic, Graph, Hipp, Led, Lith-c, Lyc, Med, Merc, Nat-s, Nux-v, Rhus-t, Sil, Sulph, Sulph-i, Syph, Thuj
Arthrose	Benz-ac
Asperger-Syndrom	Androc, Ant-c, Bar-c, Bufo, Hyos
Asthenopie	Agar, Alum, Art-v, Calc, Caust, Cina, Gels, Jab, Nat-m, Onos, Ruta, Sep
Asthma	Acon, Aeth, Agar, Am-c, Ambr, Ant-c, Ant-t, Apis, Aral, Aran, Arg-n, Ars, Ars-i, Aur, Bac, Bar-c, Bar-m, Bar-s, Bell, Brom, Bry, Bufo, Calc, Calc-p, Calc-sil, Camph, Caps, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chel, Chin, Chlor, Coff, Crot-t, Cupr, Des-ac, Dulc, Ferr, Gels, Grin, Hyos, Ictod, Ign, Iod, Ipec, Kali-bi, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kali-s, Kreos, Lac-del, Lach, Lyc, Med, Merc, Mosch, Naphtin, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Ol-an, Op, Phos, Plat, Psor, Puls, Sabad, Sacch, Samb, Sanic, Sep, Sil, Spong, Squil, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Thuj, Thyr, Tub, Verat, Zinc
Astigmatismus Astrozytome	Ferr, Lil-t, Med, Sep, Tub
Aaszites	Plb Abrot, Acet-ac, Ant-t, Apis, Apoc, Ars, Bry, Camph, Caust, Chin, Colch, Cupr, Dig, Ferr, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Lach, Lyc, Merc, Nit-ac, Nux-v, Oxyd, Sacch, Sep, Sil, Tarent, Thuj, Tub
Ataxie	Agar, Alum, Con, Hyos, Tarent
Atelektasen	Hyos, Sulph
Atherom s. Talgretentionszysten	
Athetose	Agar, Op
Atopisches Ekzem s. Neurodermitis	Aeth, Agar, Bell, Mag-c, Mygal, Op, Psor, Sacch, Tarent, Ther, Verat
Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS)	Apis, Arg-n, Ars, Bad, Calc, Coc-c, Euphr, Hep, Ign, Kali-bi, Med, Merc, Naphtin, Nit-ac, Phos, Puls, Rhus-t, Sacch, Sil, Sulph, Thuj
Augenentzündung	
Augenerkrankung Augengeschwür Jab	
Augenschmerzen	Apis, Ars,
Augenverletzungen	Calc-p, Jab, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Staph, Syph Acon, Arn, Calc, Cic, Coc-c, Euphr, Merc-c, Nit-ac, Puls, Sil, Staph, Spong, Thuj
Ausschlag s. Ekzem	Abrot, Aeth, Agar, Ail, Androc, Ant-c, Ant-t, Ars, Aur, Bac, Bar-c, Bar-s, Bor, Bry, Calc, Calc-p, Calc-sil, Canth, Caps, Carc, Caust, Cham, Cic,

	Cist, Clem, Coff, Cupr, Dulc, Graph, Hell, Hep, Hydr, Hyos, Ign, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-d, Lac-del, Lac-h, Lach, Led, Lyc, Maland, Med, Merc, Mez, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Olnd, Op, Petr, Phos, Psor, Puls, Rhus-t, Sacch, Sacch-a, Sanic, Sep, Sil, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Thuj, Tub, Vac, Vinc, Viol-t, Zinc
Austrocknung s. Dehydratation	
Auszehrung s. Abmagerung	
Autismus	Aeth, Bar-c, Bufo, Hyos, Op
Autoimmunerkrankungen	Syph, Thuj
B	
Balanitis	Merc
Bandscheibendegeneration	Tub
Bandwurm	Ambr, Ars, Calc, Caust, Cina, Cinnb, Coff, Cupr, Fil, Ign, Kali-c, Lyc, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Phos, Plat, Psor, Puls, Sep, Sil, Sulph, Teuer, Verat
Bauchfellentzündung s. Peritonitis	
Bauchschmerzen	Ant-c, Ant-t, Ars, Cina, Ign, Merc, Nat-m, Nux-v, Pitu-a, Psor, Puls, Sep, Staph, Sul-i, Tarent
Bauchwandbruch	M-aust
BCG-Impfung	Abrot, Calc, Tub, V-A-B
Bettnässen s. Enuresis	
Bindehautentzündung s. Konjunktivitis	
Bipolare Störung	Andoc
Bisswunden (auch Zungenbiss)	Absin, Ars, Art-v, Bufo, Caust, Cic, Cupr, Hyos, Lach, Nit-ac, Op, Phos, Phos-ac, Stram, Tarent
Blähungen	Agar, Agath-a, Aloe, Ambr, Anis, Ant-c, Ant-t, Arge, Arg-n, Arn, Ars, Asaf, Aur, Bac, Bar-c, Bars, Bell, Bism, Bor, Bry, Bufo, Calc, Calc-p, Carb-v, Castm, Caust, Cham, Chin, Coff, Ferr, Gamb, Hep, Hyos, Ign, Jal, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Lac-c, Lac-del, Lac-leo, Lach, Lyc, Mag-c, Mag-p, Merc, Mosch, Nat-m, Nat-p, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Olnd, Op, Ph-ac, Phos, Plat, Plb, Podo, Psor, Puls, Raph, Rheum, Sacch, Sanic, Senn, Sep, Sil, Staph, Stram, Sulph, Tarent, Thuj, Tub,
Blasenentzündung s. Zystitis	
Blasenpolypen	Calc, Sil, Teuer
Blasensteine	Ambr, Kreos, Sil, Tarent

Blepharitis	Aeth, Ant-c, Arg-met, Ars, Bac, Bar-c, Bar-s, Borax, Calc, Carbn-s, Cham, Graph, Kali-c, Lyc, Mag-c, Med, Petr, Syph, Teil, Verat
Blinddarmenzündung s. Appendizitis	
Blutschwämmchen s. Hämangiom	
Blutungsneigung	Acon, Bac, Bell, Carc, Ferr, Hyos, Kali-c, Kreos, Lach, Mosch, Phos, Sabin
Borderline-Syndrom	Androc
Bronchitis	Ant-t, Ars, Bac, Bar-c, Bar-m, Bar-p, Bar-s, Bry, Calc-act, Calc-sil, Carc, Cham, Cina, Diph, Diphtox, Hyos, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kreos, Lach, Phos, Psor, Stram, Tub, Tub-a, V-A-B
Bronchiektasen	Bac, Med
Bronchopneumonie	Ant-t, Bac, Med, Tub
Buckel	Bac, Calc-p, Plb, Tub
Bulimie	Agar, Agath-a, Anan, Ant-c, Aur, Caps, Carc, Graph, Hyos, Ign, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Nat-m, Op, Plat, Sanic, Staph, Ther, Thuj
Bursitis	Kali-m
c	
Candida-Infektion s. Soor	
Carpenter-Syndrom	Aur
Chalazion	Benz-ac, Platan-oc, Psor, Puls, Staph, Sulph, Thuja, Tub, Zinc
Chemose	Acon, Apis, Bell, Bry, Euphr, Lach, Lyc, Merc, Thuj, Vesp
Chinin, Missbrauch von	Aran, Ign, Merc, Nat-m, Nux-v, Phos
Chlamydien	Thuj
Cholera	Ant-t, Bell, Calc, Calc-p, Cupr, Gamb, Guaj, Jatr-c, Kali-br, Kali-p, Phos, Sal-ac, Thuj, Verat
Cholera infantum	Aeth, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Calc-p, Camph, Cham, Chin, Ferr, Guaj, Kali-br, Med, Phos, See, Sil, Tab, Stram, Verat, Zinc
Cholesteatom	Calc, Calc-f, Diph, Kali-m, Psor, Sil
Chorea	Abrot, Agar, Agarin, Ant-t, Art-v, Bell, Bufo, Calc, Castm, Caust, Cham, Chlorpr, Cic, Cina, Coff, Cupr, Cypr, Hell, Hyos, Ign, Indg, Kali-br, Kali-p, Laur, Lyc, Mag-p, Mygal, Nat-m, Nux-v, Op, Ph-ac, Phos, Scut, Spig, Staph, Stram, Tarent, Ther, Thuj, Ziz
Chorea minor (Sudenham-Chorea)	Art-v
Chorioretinitis	Kali-m

Choroiditis	Jab, Viol-o
Colitis	Aloe, Ars, Gels, Lyc, Nat-s, Merc
Colitis ulcerosa	Bac, Calc-p, Cham, Ign, Merc, Nat-s, Nux-v, Sulph, Thuj, Tub
Commotio s. Gehirnerschütterung	
Costochondritis	Arn, Syph
Coxa vara	Calc, Calc-p
Cri-Du-Chat-Syndrom	Aur, Carc
Crohn Krankheit	Calc-p, Nat-s, Nux-v, Phos, Psor, Thuj, Tub
Cytomegalie s. Zytomegalie	
D	
Dakryozystitis	Ant-c, Cupr, Lach
Darmverlegung	Atro-s
Darmverschlingung s. Intussuszeption	
Dehydratation (Austrocknung)	Aeth, Ant-c, Ant-t, Ars, Camph, Canth, Chin, Cupr, Kreos, Lach, Op, Verat
Dekubitus	Calc, Cham, Ign, Kreos, Med, Sep, Sil, Sulph
Delirium	Aeth, Agar, Ail, Ant-t, Apis, Ars, Bapt, Bell, Bry, Bufo, Carb-v, Cina, Crot-h, Hyos, Ign, Lach, Kali-c, Kali-m, Merc, Op, Ph-ac, Phos, Plb, Psor, Puls, Rheum, Stram, Sulph, Teuer, Verat
Dellwarzen s. Molluscum contagiosum	
Dengue-Fieber	Aran, Hyos
Depression	Agath-a, Aur, Calc-sil, Caust, Ign, Kali-br, Lac-h, Lac-cp, Lach, Nat-m, Nat-sil, Ol-an, Plb, Sacch, Sep, Syph
Dermoidzysten	Plb
Deviation s. Nasenseptumdeviation	
Diabetes	Alumn, Ambr, Ars, Calc, Calc-p, Carc, Caps, Caust, Chlorpr, Cupr, Ferr, Kali-c, Lac-ac, Lac-d, Lach, Lyc, Mag-c, Mosch, Nat-s, Op, Sacch, Sulph, Tarent, Thuj, Thy
Diabetes in Schwangerschaft	Ant-t
Diarrhoe s. Durchfall	
Diphtherie	Caust, Lac-c, Sulph
Diphtherie-Impfung, Folgen von	Diphtox
Diplopie	Agar, Med, Nux-v, Op, Stram, Thuj
Down-Syndrom	Aur, Bar-c, Bufo, Calc-p, Carc, Des-ac, Med, Thy
Drogenmissbrauch	Merc
DTP-Impfung, Folgen von	Merc-cy

Durchfall	Abrot, Acon, Aeth, Agar, Agath-a, Agra, Aloe, Anth, Ant-c, Ant-t, Apis, Aran, Arg-n, Ars, Asaf, Aur, Bac, Bapt, Bar-c, Bar-s, Bell, Benz-ac, Bism, Bor, Brom, Bry, Calc, Calc-act, Calc-p, Calc-sil, Camph, Caps, Carb-v, Carc, Castm, Caust, Cench, Cham, Chel, Chin, Chion, Cina, Coff, Coli, Coloc, Crot-h, Crot-t, Cupr, Dig, Dulc, Eucal, Ferr, Flor-p, Gamb, Gels, Graph, Hell, Hep, Hyos, Ign, Iodof, Iod, Ipec, Jab, Jal, Jatr-c, Kali-br, Kali-c, Kali-chl, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-d, Lac-del, Lac-h, Lach, Lith-c, Lyc, Mag-c, Mag-m, Med, Merc, Merc-d, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nicc, Nit-ac, Nux-m, Nux-v, Olnd, Ol-j, Op, Petr, Ph-ac, Phos, Pitu-a, Podo, Psor, Puls, Rheum, Rhus-t, Rumx, Sacch, Sanic, Sec, Senn, Sep, Sil, Squil, Staph, Stram, Sul-ac, Sulph, Sulph-i, Syph, Tab, Teuer, Ther, Thuj, Thyr, Tub, Urt-u, Verat, Zinc
Dysenterie	Caps, Ferr, Kali-p, Merc, Nux-v, Phos
Dyslexie (Legasthenie)	Bar-p, Bell, Calc-p, Calc-sil, Caust, Hyos, Ign, Kali-br, Lac-h, Lach, Lyc, Mag-c, Merc, Mygal, Nat-sil, Op, Plb, Psor, Tarent, Ther
Dysraphismus	Plb
E	
E. Coli	Ant-t, Ars, Cupr, Gamb, Hyos, Lach, Merc-d, Thuj, Verat
Entamoeba histolytica s. Amöben	
Ehlers-Danlos-Syndrom	Calc
Eisenmenger-Syndrom	Laur
Eiterbeulen s. Abszesse Eiterung	Anthraci, Apis, Ars, Bar-c, Bar-s, Bell, Bor, Bufo, Calc, Calc-hp, Calc-p, Calc-s, Calend, Cham, Chin, Tarent, Thuj, Cupr, Ign, Kali-c, Kali-chl, Kali-m, Lach, Merc, Merc-cy, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Phos, Plb, Psor, Puls, Sacch, Sep, Sil, Staph, Staphycoc, Stram, Streptoc, Sulph, Tub, V-A-B, Viol-o
Ekchymose	Apis, Arn, Bell, Chin, Ferr, Kreos, Lac-c, Lac-h, Lyc, Nux-v, Sulph
Eklampsie (Folgen beim Kind)	Ant-t, Cic, Hyos, Kali-br
Ektropion/Ektropium	Apis, Nat-m, Sil, Staph
Ekzem s. a. Ausschlag	Agar, Anac, Anan, Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Anthraci, Aur, Bac, Bar-c, Bar-s, Bor, Bry, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-sil, Carb-v, Carc, Caust, Chel, Cic, Crot-t, Cupr, Ferr, Graph, Ign, Kali-m, Kreos, Lach, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Merc-i-r, Mez, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Olnd, Op, Petr,

	Psor, Sanic, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Thuj, Tub, Vinc, Viol-t
Ekzem, atopisches s. Neurodermitis	
Empyem	Apis, Ars, Ferr, Kali-c, Sil, Sulph, Tub
Endokarditis	Abrot, Ant-t, Ars, Aur, Hyos, Kali-c, Kalm, Kreos, Lach, Nat-m, Phos, Plat, Plb, Spig, Tarent, Verat
Enuresis	Aeth, Apis, Bac, Bac-t, Bar-s, Benz-ac, Calc-sil, Caps, Carc, Caust, Cham, Chlol, Chlorpr, Cina, Equis-h, Ferr, Gels, Hyos, Ign, Kali-br, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lach, Lyc, Mag-c, M-aust, Nux-v, Op, Ph-ac, Phos, Psor, Puls, Rheum, Sanic, Sep, Sil, Squil, Staph, Stram, Sulph, Syph, Thuj, Thyr
Enzephalitis	Agar, Bac, Bar-c, Bell, Bor, Bry, Calc, Cham, Chin, Cic, Cina, Cupr, Hell, Hyos, Lac-c, Lach, Merc, Mosch, Op, Phos, Plb, Stram, Thuj
Enzephalopathie	Des-ac, Hyos, Phos
Eosinophilie	Carc
Ependymom	Helo-s
Epididymitis	Puls
Epilepsie s. a. Konvulsionen	Aeth, Agar, Am-br, Anan, Ant-t, Aran, Arg-n, Art-v, Aur, Bufo, Calc, Castm, Chlorpr, Cic, Cupr, Indg, Kali-br, Lach, Lyc, Mill, Mosch, Nat-s, Oena, Op, Plb, Puls, Stram, Sulph, Tarent, Ther, Zinc
Episkleritis	Aur, Kalm, Merc, Sep, Thuj
Epitheliom	Cic, Con, Kali-m, Kreos, Thuj
Epstein-Barr-Virus s. a. Mononukleose Ail	
Erbrechen	Abrot, Aeth, Agar, Androc, Ant-c, Ant-t, Apis, Apom, Ars, Bac, Bar-c, Bell, Bism, Bor, Bry, Bufo, Calc, Calc-m, Calc-p, Camph, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chin, Chlorpr, Cic, Cina, Coc-c, Cocc, Coff, Colch, Cupr, Cur, Dros, Elaps, Elat, Ferr, Gels, Hell, Hep, Hyos, Ign, Ipec, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kreos, Lac-d, Lach, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Op, Petr, Phos, Plb, Podo, Psor, Puls, Rheum, Sacch, Sanic, Sep, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Tab, Tarent, Ther, Thuj, Tub, Valer, Verat, Verat-v, Zinc, Zinc-s
Erkältung	All-c, Apis, Ars, Bac, Bar-c, Bar-m, Bar-s, Brom, Bry, Calc, Calc-caust, Calc-p, Calc-sil, Caps, Carc, Cham, Dulc, Flav, Graph, Ign, Ipec, Jab, Jal, Kali-c, Kali-m, Lac-h, Mag-c, M-arct, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Ol-j, Phos, Psor, Puls, Rhus-t, Sep, Sil, Spong, Staph, Stict, Sulph, Sulph-i, Tarent, Tub, Tub-a, V-A-B, Zinc

Erysipel	Ant-c, Apis, Bell, Bufo, Cham, Euphr, Graph, Kali-p, Lac-c, Lach, Rhus-t, Stram, Syph Tub
Erythema nodosum	Aran, Kali-m
Erythem	Acon, Apis, Bry, Euphr, Lach, Puls, Stram, Sulph, Zinc
Exanthem	
Exophthalmus	Ars, Aur, Phos, Thuj
Exostose	Aur, Calc, Calc-f, Calc-p, Dulc, Kali-i, Lach, Nat-sil, Nit-ac, Phos, Puls, Ruta, Sil, Syph

F

Fallhand	Plb
Farbenblindheit	Carbn-s, Merc, Santin
Farbstoffunverträglichkeit	Thuj, Tub
Fehlgeburten	Syph
Fettleibigkeit	Bad, Bar-p, Bufo, Calc-caust, Graph, Thyr
Fibrose, zystische s. Mukoviszidose	
Fieber	Abrot, Acon, Aeth, Agar, Ail, Alum, Ambr, Ant-c, Ant-t, Apis, Arg-n, Arn, Ars, Atra-r, Aur, Bapt, Bar-c, Bell, Bell-p, Bor, Bry, Bufo, Calad, Calc, Calc-p, Camph, Caps, Carb-v, Caust, Cham, Chin, Chlor, Cic, Cina, Coff, Con, Cop, Croc, Cupr, Eup-p, Ferr, Ferr-p, Gels, Glon, Graph, Hed, Hell, Hep, Hyos, Ign, Ipec, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-del, Lach, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Mosch, Mur-ac, Mygal, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Ol-j, Op, Ph-ac, Phos, Plat, Plb, Podo, Psor, Puls, Pyrog, Rheum, Rhod, Rhus-t, Sabad, Samb, Sanic, Sec, Sep, Sil, Squil, Staph, Stram, Sulph, Syph, Tarent, Teuer, Thuj, Tub, Verat, -
Fieber Fortsetzung	Bell, Bry, Cham, Hell, Hyos, Lach, Mygal, Op, Stram, Tarent, Ther, Thuj
Fieberkrämpfe	Cocc, Sabad, Staph
Filzläuse s. a. Läuse	Agar, Ambr, Apis, Bar-c, Berb, Calc, Calc-m, Calc-p, Caust, Cist, Kreos, Lach, Lyc, Merc, Nit-ac, Phos, Puls, Sil, Stann, Staph, Sulph, Syph, -
Fisteln	
Flatulenz s. Blähungen	
Flechtengrind	Ars, Bac
Fontanellen offen	Ant-c, Ant-t, Apis, Aur, Bar-c, Bry, Calc, Calc-p, Ipec, Lyc, Mag-c, Merc, Phos, Puls, Sep, Sil, Sulph, Sulph-i, Syph, Tub, Zinc
Foster-Kennedy-Syndrom	Aur, Syph, Thuj, Zinc Des-ac
Fragile-X-Syndrom (Martin-Bell-Syndrom)	

Frakturen	Arn, Calc, Calc-p, Cic, Hed, Lach, Nit-ac, Ruta, Sil, Symph, Thuj, Thyр
Frostbeulen	Agar, Bufo, Ign, Nit-ac, Petr, Puls
Frühgeburt	Ant-t
Furunkel s. Abszesse	
G	
Gallenatresie	Aur, Lyc, Nat-s, Nux-v, Syph
Ganglion Gangrän	Calc, Mag-m, Plb, Sil, Thuj Ars, Caps, Kali-chl, Kali-p, Lach, Merc, Tarent, See, Sil, Stram, Tarent
Gastritis	Aeth, Ant-c, Bell, Bry, Phos, Psor, Zinc
Gastroenteritis	Aeth, Ant-t, Ars, Calc, Calc-p, Carc, Cupr, Cupr-ac, Elat, Ferr, Kali-p, Sal-ac, Verat
Gaumenspalte	Syph
Gehirnerschütterung	Carc, Cic, Cupr, Hyos, Kali-br, Nat-s
Gelbsucht s. Ikterus	
Genu valgum	Agar, Calc, Cocc, Nux-v, Tub
Genu varum	Calc, Nux-v
Gerstenkorn	Agar, Ant-t, Apis, Ars, Aur, Bar-c, Bry, Carbn-s, Carc, Caust, Con, Cupr, Ferr, Graph, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Ph-ac, Psor, Puls, Sep, Sil, Staph, Sulph, Thuj
Geschwüre	Aesc, Ail, Ant-c, Anthraci, Apis, Ars, Aur, Bac, Bapt, Bor, Bufo, Calc, Calc-m, Calc-sil, Caps, Carc, Cham, Kali-c, Kali-chl, Kali-p, Kreos, Lac-c, Med, Merc, Merc-cy, Merc-i-r, Mez, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nit-m-ac, Phos, Psor, Puls, Pyrog, Rhus-t, Sacch, Sanic, Sep, Sil, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Tarent-c, Thuj, Tub, Zinc
Giardiasis s. Lambliasis	
Gicht	Abrot, Ant-c, Benz-ac, Calc, Lith-c, Lyc, Med, Nat-s Med
Gigantismus	
Gingivitis	Aran, Aur, Bar-c, Bufo, Calc, Cham, Caps, Carc, Cupr, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Phos, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Tub
Glaukom	Lac-c, Puls
Gleichgewichtsstörung	Helo-s
Gliomatose	Bar-c, Bell, Plb, Syph
Gliome des Gehirns	Apis, Helo-s, Hyos
Glomerulonephritis	Apis, Ars, Bufo, Caps, Chin, Coli, Kali-p, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Nat-s, Phos, Plb, Sep, Stram, Tarent, Tub
Glossitis	Apis, Bor, Carc, Merc, Sil, Syph

Glottisödem Apis, Ars, Bell, Brom, Chin, Crot-h, Ign, Lach, Merc, Phos, Spong, Staph, Stram, Tub

Glottisspasmus s. Laryngismus

Glutenunverträglichkeit

Calc-p, Carc, Thuj

Gonorrhoe

Benz-ac, Med, Nat-s, Puls, Thuj

Grippe s. Influenza

H

Haarausfall

Ant-c, Aur, Bac, Bufo, Carb-v, Chin, Graph, Ign, Lyc, Med, Nat-m, Nit-ac, Op, Ph-ac, Phos, Psor, Rhus-t, Sep, Sil, Staph, Vinc

Haarausfall an den Wimpern

Apis, Ars, Aur, Bufo, Cali-c, Calc-s, Med, Merc, Rhus-t, Sel, Sil, Staph, Sulph, Syph

Haarausfall der Augenbrauen

Agar, Anan, Bell, Bor, Caust, Med, Merc, Nit-ac, Ph-ac, Plb, Sanic, Sel, Syph, Thuj

Haarwuchs übermäßig

Aur, Calc, Carc, Ign, Lac-c, Med, Mygal, Nat-m, Phos, Psor, Puls, Sep, Sulph, Tarent, Thuj, Tub

Hagelkorn s. Chalazion

Hämangiom Hämophilie

Abrot, Lach, Phos, Thuj

Hämorrhoiden

Ferr, Kreos

Abrot, Bac, Bar-s, Bufo, Caust, Lac-d, Nit-ac, Nux-v, Puls, Sulph, Thuj, Tub

Hakenwürmer s. a. Würmer

Chen-a, Ferr, Lyc, Phos, Teuer

Halsentzündung s. a. Tonsillitis,

Pharyngitis, Laryngitis

Apis, Ars, Bac, Bar-s, Bell, Calc, Hep, Lac-c, Lach, Merc, Sil, Staph, Sulph, Tub

Halsschmerzen

Abrot, Aeth, Ail, Apis, Ars, Atra-r, Bac, Bad, Bapt, Bar-c, Bar-m, Bell, Bell-p, Bry, Calc, Calc-p, Calc-sil, Caps, Carc, Cham, Chin, Coff, Diph, Diphtox, Elaps, Hep, Ign, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Lac-del, Lac-h, Lac-leo, Lach, Lyc, Mag-c, Merc, Merc-cy, Merc-i-f, Nit-ac, Nux-v, Phyt, Sabad, Sep, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Tub

Hashimoto-Thyreoiditis

Apis, Aran, Thuj

Harnröhrenreizung

Hep, Lac-leo, Led, Nit-ac, Sulph

Harnröhrenverengung s.

Urethrastriktor

Harnverhalt

Bell, Borx, Bufo, Caust, Chin, Coff, Cop, Cupr, Hyos, Ign, Kali-c, Lach, Lyc, Merc, Nux-v, Op, Plb, Puls, Stram, Sulph, Verat

Harnwegsinfekte s. a. Zystitis

Coli, Cop, Kali-m, Staph, Thuj

Heiserkeit

Ant-c, Ant-t, Ars, Arum-t, Bar-c, Bar-s, Bell, Bry, Bufo, Calc, Calc-caust, Calc-sil, Caps; Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chlor, Coff, Cupr, Dros, Ferr,

	Graph, Hyos, Ipec, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lyc, Mang, Merc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plat, Plb, Psor, Puls, Rumx, Sacch, Sep, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Tarent, Thuj
Helicobacter pylori-infektion	Ant-c, Bac, Bism, Zinc
Hemianopsie	Ars, Aur, Hyos, Lith-c, Lyc, Mur-ac, Nat-m, Tub, Verat
Hepatitis	Ant-c, Ars, Cham, Chin, Kreos, Lach, Merc-d, Nat-s, Nit-ac, Phos, Psor, Sil, Tub
Hepatitis B-Impfung	Tub
Hernien s. Leistenbruch	
Herpes	Agar, Anan, Bac, Bar-s, Calc-m, Cic, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-h, Nat-m, Puls, Rhus-t, Rib-ac, Sep, Sulph, Thuj, Tub, Verat, Zinc
Herzerkrankungen	Ant-t, Apis, Aran, Ars, Aur, Bor, Calc, Dig, Jab, Kali-c, Kali-m, Kalm, Lach, Laur, Lyc, Nat-m, Phos, Psor, Puls, Sacch, Sep, Sulph-i, Thuj
Herzflimmern	Aur
Herzhypertrophie	Apis, Aur, Calc, Plb, Psor, Puls, Sulph
Herzinsuffizienz	Ant-t, Apis, Aur, Op, Phos, Sacch
Herz-Kreislauf-Stillstand	Ant-t, Ars, Carb-v, Hydr-ay, Laur, Verat
Heuschnupfen (Heufieber)	Agar, Antip, Ars, Calc-sil, Carc, Dulc, Iod, Naphtin, Nat-sil, Nat-s, Nux-v, Psor, Sil, Squil, Thuj, Thy, Tub
Hirnabszess	Apis
Hirnatrophie	Syph
Hirnblutungen	Ars, Bar-c, Bell, Both, Bry, Cocc, Coff, Cupr, Hyos, Ipec, Kali-m, Kreos, Lach, Lyc, Merc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Stram, Sulph, Thuj, Verat
Hirnhautentzündung s. Meningitis	
Hirnnervlähmung s. a. Lähmung	Apis, Aur, Bell, Carbn-s, Caust, Crot-h, Gels, Lac-c, Lach, Lyc, Nux-v, Op, Plb, Sil, Syph, Thuj, Verat, Zinc
Hirnödem	Apis, Nat-s, Op
Hirnschlag s. Schlaganfall	
Hirntumor	Apis, Helo-s, Kali-br, Kali-p, Sil
HIV	Caust, Phos, Sacch
Hodenhochstand s. Kryptorchismus	
Hodenentzündung s. Orchitis	
Morbus Hodgkin	Kali-m, Tub, Zinc
Hordeolum s. Gerstenkorn	
Horner-Syndrom	Sep, Syph
Hornhautabszess	Calc-m
Hornhautentzündung	Kali-m, Sep

Hornhautgeschwür	Apis, Ars, Bac, Bar-c, Brom, Calc, Euphr, Kali-c, Kali-m, Kreos, Med, Merc, Nat-m, Nit-ac, Psor, Sanic, Sil, Syph, Thuj, Tub
Hornhauttrübung	Am-c, Arg-n, Ars, Aur, Bar-c, Bar-s, Bell, Calc, Calc-sil, Caust, Chin, Con, Ign, Kali-c, Kali-m, Mag-c, Naphtin, Nit-ac, Plb, Psor, Puls, Sil, Sulph, Tarent, Tub, Zinc, Zinc-s
Hüftluxation, angeboren	Bell, Calc, Calc-p, Caust, Syph, Thuj
Hühneraugen	Agar, Ant-c, Ars, Bar-c, Bar-s, Bry, Bufo, Calc-sil, Calc-s, Caust, Chin, Ign, Iod, Kali-c, Lyc, Med, Nit-ac, Nux-v, Phos, Puls, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Thuj
Husten	Acon, Aeth, Agar, Ambr, Am-br, Anac, Antip, Ant-c, Ant-t, Apis, Aran, Arg-n, Arg-m, Arn, Ars, Bac, Bad, Bar-c, Bar-m, Bar-s, Bell, Bor, Brom, Bry, Bufo, Calc, Calc-act, Calc-p, Calc-sil, Camph, Caps, Carb-an, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chin, Chlor, Cina, Coc-c, Coff, Coloc, Con, Cor-r, Cupr, Diphtox, Dros, Eucal, Euphr, Ferr, Flav, Gels, Glon, Graph, Hep, Hyos, Ign, Iod, Ipec, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-del, Lac-h, Lac-leo, Lach, Lact, Laur, Lob, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Merc-cy, Mosch, Naphtin, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nicc, Nit-ac, Nux-v, Oena, Ol-j, Op, Petr, Phos, Plat, Plb, Psor, Puls, Rheum, Rhus-t, Rumx, Sacch, Samb, Sang, Sanic, Sep, Sil, Spong, Squil, Stann, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i
Hydrozele	Abrot, Apis, Ars, Aur, Bry, Calc, Calc-sil, Calc-s, Kali-chl, Merc, Nux-v, Phos, Psor, Puls, Rhod, Sil, Sulph, Sulph-i, Syph
Hydrozephalus	Abrot, Apis, Apoc, Ars, Aur, Bac, Bar-c, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Calc-sil, Caust, Chin, Cina, Cupr, Ferr, Hed, Hyos, Ign, Iodof, Kali-p, Lyc, Merc, Nat-m, Nux-v, Op, Phos, Plat, Plb, Puls, Sil, Stram, Sulph, Syph, Thuj, Verat, Zinc Lyc Hyos Calc, Calc-sil, Caust, Chin, Hyos, Jab, Nux-v, Sep, Sil
Hyperbilirubinämie	
Hyperkapnie	
Hypermetropie	
Hypertelorismus s.	
Schädelanomalie	Ant-t, Aur, Chlorpr, Lyc, Plb, Thuj, Zinc
Hypertonie	Hyos
Hypoglykämie	Lyc, Med
Hypogonadismus	Hep, Merc, Merc-c, Phos, Sil, Thuj
Hypopyon	Caust
Hypothyreose	

Hypovolämischer Schock	Camph, Canth, Coff, Cupr, Hyos, Lach, Op, Plb, See, Stram, Verat
Hypoxie	Bar-c, Hyos

I

Ichthyosis	Ars-i, Aur, Lac-c, Syph
Ikterus	Acon, Ars, Aur, Bov, Bry, Calc-m, Calc-sil, Caust, Cham, Chel, Chin, Chion, Cina, Cupr, Dig, Ferr, Ign, Iod, Kali-c, Lach, Lyc, Merc, Merc-d, Nat-c, Nat-s, Nux-v, Op, Phos, Plb, Podo, Puls, Rheum, Sep, Sulph, Syph
Ileus	Ars, Caust, Merc, Plb, Verat
Ileus, paralytischer	Ars, Bry, Cham, Hyos, Kali-c, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Op, Plb, Rhus-t, Sil, Staph, Sulph, Thuj, Zinc
Immunschwäche	Apis, Ars, Bac, Carc, Chlorpr, Cop, Des-ac, Kali-c, Lach, Merc, Phos, Psor, Sacch, Saroth, Sep, Stram, Syph, Thuj, Tub, Tub-r, Zinc
Impetigo	Ant-c, Ant-t, Ars, Bac, Bar-c, Calc, Calc-m, Calc-p, Caust, Cic, Graph, Crot-t, Cupr, Graph, Lach, Lyc, Maland, Med, Merc, Mez, Rhus-t, Sep, Tarent, Tub, Viol-t
Impfung, Folgen von	Abrot, Ant-t, Apis, Bapt, Bar-c, Calc, Calc-sil, Carc, Caust, Cic, Cupr, Diph, Ferr, Kali-m, Maland, Med, Merc, Mez, Nat-sil, Phos, Psor, Puls, Sars, Sep, Sil, Sulph, Thuj, Tub, Zinc
Influenza	Ars, Bry, Calc-p, Carc, Cypr, Hyos, Kreos, Psor, Tub, Verat
Insult, zerebrovask. s. Schlaganfall Intertrigo	Aeth, Ambr, Ant-c, Ant-t, Ars, Bar-c, Bor, Calc, Calc-sil, Calc-s, Caust, Cham, Graph, Ign, Kali-c, Kali-m, Kreos, Merc, Petr, Plb, Sep, Sil, Sulph, Syph
Intrakranieller Druck erhöht	Apis, Apom, Bell, Cocc, Hell, Hyos, Merc, Nit-ac, Op, Plb, Stram, Tub, Zinc
Intussuszeption	Ars, Bell, Bry, Cupr, Kreos, Merc, Nux-v, Op, Phos, Plb, Sulph, Tarent, Verat Ars, Atro-s, Cupr Bell, Bry, Merc-c, Plb, Thuj
Invagination Iridozyklitis Iritis	Bry, Chin, Hep, Kalm, Merc, Merc-c, Nit-ac, Sil, Spig, Staph, Syph, Thuj, Tub, Zinc

J

Jod, Missbrauch von	Bell, Merc, Op, Phos
Juckreiz	Anth, Bad, Bar-c, Bar-s, Brom, Calc-p, Coc-c, Coff, Fil, Oind, Psor, Sul-l, Teuer, Vinc, Viol-t

K

Katarakt	Caust, Jab, Lyc, Naphtin, Sacch, Sil, Syph
Katarrh	Aeth, All-c, Ant-t, Apis, Asar, Arg-n, Ars, Aur, Bac, Bar-c, Bell, Brom, Bry, Calc, Calc-br, Calc-caust, Calc-hp, Calc-lac, Calc-m, Calc-p, Calc-sil, Caps, Caust, Cham, Cinnb, Cupr, Des-ac, Diph, Dulc, Eucal, Euphr, Ferr, Ferr-p, Graph, Hep, Ign, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kali-chl, Kali-i, Kali-m, Kali-s, Kreos, Lac-del, Lac-h, Lach, Lyc, Med, Merc, Merc-d, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Ol-j, Phos, Plb, Psor, Puls, Sacch, Samb, Sanic, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Teuer, Ther, Thiosin, Thuj,
Kehlkopf s. Larynx	
Keloide	Carc, Caust, Lach, Nit-ac, Sil, Tub Bell, Calc,
Keratitis	Kali-m, Sep, Syph, Tub Calc, Merc, Merc-n,
Keratokonjunktivitis Keuchhusten	Ran-b
s. Pertussis Kinetose	
	Ars, Calc, Calc-m, Calc-p, Carc, Coff, Cocc, Ferr, Petr, Sep, Ther
Kleinhirnentzündung	Helo-s
Kleinhirntumor	Helo-s
Kleinwuchs	Bac, Bar-c, Bar-p, Bar-s, Bor, Calc, Calc-p, Carc, Med, Ol-j, Sil, Syph
Kleptomanie	Bell, Calc, Caust, Hyos, Kali-br, Lach, Op, Puls, Sep, Sil, Sulph, Syph, Tarent, Verat
Kniegelenkserguss	Bry, Sil, Sulph-i, Tub
Knochenentzündung s. Osteomyelitis	
Knochenkaries	Asaf, Aur, Bac, Bufo, Calc, Caps, Chin, Fl-ac, Hecla, Merc, Nit-ac, Phos, Sep, Sil, Staph, Stram, Syph, Ther
Knochenschmerzen	Aeth, Aran, Asaf, Aur, Chin, Merc, Nit-ac
Knoten auf den Stimmbändern	Berb, Plat, Thuj, Tub
Kolik	Aeth, Agar, Anis, Anth, Ant-c, Ant-t, Arge, Ars, Atra-r, Atro-s, Aur, Bell, Bor, Bry, Calc, Calc-p, Caps, Carb-v, Castm, Caust, Cham, Chin, Cic, Cina, Coff, Coloc, Crot-t, Cupr, Fil, Graph, Hyos, Ign, Jal, Kali-br, Kali-c, Kreos, Lach, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Nat-c, Nat-s, Nux-v, Plb, Puls, Rheum, Senn, Sep, Sil, Staph, Sulph, Ther, Verat
Kollagenose	Carc, Syph
Kollaps	Aeth, Ant-c, Ant-t, Ars, Camph, Carb-v, Cupr, Hydr-ac, Hyos, Kali-br, Kali-p, Laur, Nux-v, Op, See, Tarent, Verat
Koma	Acon, Ant-t, Ars, Atro, Bell, Bor, Bufo, Cic, Hyos, Lach, Op, Plb, Puls, Sep, Sulph, Verat

Komedonen	Graph, Sulph, Tub
Kondylome s. a. Warzen	Sanic, Staph, Thuj
Konjunktivitis	Aeth, All-c, Ant-c, Ant-t, Apis, Arg-n, Ars, Bar-c, Bar-s, Bell, Bor, Bry, Calc, Cham, Chin, Dulc, Euphr, Graph, Ign, Kali-c, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Merc-n, Nat-s, Nux-v, Psor, Puls, Ran-b, Rhus-t, Sep, Sil, Spig, Staph, Sulph, Syph, Tarent, Thuj, Thyr, Zinc
Kontaktdermatitis	Ars, Merc, Olnd, Pitu-a
Kontinuafieber	Zinc
Konvulsionen	Absin, Aeth, Agar, Ant-t, Apis, Apoc, Aran, Arg-n, Arn, Art-v, Ars, Atra-r, Aur, Bell, Bufo, Calc, Calc-p, Camph, Carc, Caust, Cedr, Cham, Chin, Chion, Chlol, Cic, Cina, Coc-c, Coff, Coloc, Con, Cupr, Cur, Cypr, Ferr-p, Form, Gels, Glon, Hell, Hyos, Hyper, Ign, Indg, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lach, Lyc, Lyss, Mag-c, Mag-p, Med, Meph, Merc, Mill, Mosch, Mygal, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Oena, Op, Phos, Plat, Plb, Puls, Ran-b, Rheum, Scut, Sep, Sil, Stann, Staph, Stram, Stry, Sulph, Tarent, Thuj, Thyr, Verat, Viol-t
Kopfgrind	
Kopfschmerzen	Acon, Aeth, Agar, Agath-a, Aloe, Alum, AMP, Anac, Androc, Ant-c, Ant-t, Apis, Arg-n, Ars, Art-v, Asar, Atra-r, Aur, Bad, Bar-c, Bell, Bor, Brom, Bry, Bufo, Cact, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-sil, Cann-s, Carb-v, Carbn-s, Carc, Caust, Cham, Chin, Cina, Coff, Con, Cupr, Dulc, Ferr, Gels, Glon, Graph, Hep, Hyos, Hyper, Ign, Ind, Iodof, Ipec, Iris, Jab, Kali-ar, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Lac-c, Lac-cp, Lac-d, Lac-f, Lac-h, Lach, Led, Lyc, Mag-c, Mag-p, Med, Meli, Merc, Mez, Mill, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Oena, Ol-an, Op, Pall, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Pitu-a, Plat, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Sacch-a, Sang, Sanic, Scut, See, Seneg, Sep, Sil, Spig, Staph, Stict, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Teuer, Ther, Thuj, Tub, V-A-B, Viol-o, Zinc, Zinc-s
Kopfverletzungen	Art-v, Carc, Cic, Cupr, Glon, Hed, Hyos, Kali-m, Kali-p, Lac-c, Merc, Nat-s, Oena, Op, Zinc
Krampf, allgemein s. Tetanie	
Krätze s. Skabies	
Krebs	Alumn, Aur, Bar-s, Brom, Calc, Calc-ar, Calc-an, Calc-p, Carc, Con, Crot-h, Cund, Fl-ac, Kali-chl, Kreos, Lach, Med, Merc, Nat-ar, Nat-s, Ph-ac, Psor, Sacch, Scir, Staph, Sulph-i, Syph, Thuj
Kretinismus	Alumn, Bac, Calc-p, Med

Kropf s. Struma

Krupp

Calc, Chin, Chlor, Cor-r, Cupr, Kali-m, Lach, Mosch, Nit-ac, Phos, Spong

Kryptorchismus / Hodenretention

Aur, Bar-c, Bell, Bor, Calc, Calc-p, Caust, Chin, Clem, Cupr, Iod, M-aust, Par, Pitu-a, Plb, Psor, Puls, Rhod, Sil, Stram, Syph, Thuj, Thyr, Tub, Agar, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Bufo, Chin, Graph, Jab, Lyc, Phos, Phys, Puls, Stram, Syph, Thuj,

Kurzsichtigkeit

Kyphose

Aur, Calc, Calc-f, Calc-p, Lyc, Psor

Kyphoskoliose

Bac, Calc-p, Syph, Thuj, Tub

s. a. Wirbelsäulenverkrümmung

L

Lähmung

Agar, Apis, Arn, Ars, Art-v, Aur, Bapt, Bar-c, Bar-s, Bell, Both, Bufo, Calc-p, Carbn-s, Caust, Chen-a, Chin, Chlorpr, Cic, Crot-h, Dulc, Gels, Hyos, Ign, Kali-i, Kali-p, Lac-c, Lach, Lyc, Merc, Morph, Mosch, Mur-ac, Nat-m, Nux-v, Op, Phos, Plat, Plb, Puls, Rheum, Rhus-t, Sec, Seneg, Sil, Spig, Stram, Syph, Tarent, Thuj, Verat, Zinc
Agar, Apis, Arn, Aur, Bar-s, Bell, Bufo, Caust, Gels, Hyos, Kali-i, Kali-p, Merc, Nat-m, Phos, Plb, Puls, See, Sil, Seneg, Spig, Stram, Syph, Thuj, Verat, Zinc

Lähmung der Augen

s. a. Lähmung

Lähmungen des Hörnervs

Bar-c, Chen-a, Hyos, Op

Läuse

Apis, Bac, Carb-ac, Cocc, Graph, Lyc, Lach, Lyc, Merc, Nit-ac, Psor, Sabad, Staph, Tub, Vinc

Laktoseintoleranz

Aeth, Bac, Calc, Lac-h, Lyc, Mag-c, Mag-m, Nat-c, Nat-s, Pitu-a, Puls, Sulph, Thuj

Lambliasis (Giardiasis)

Calc-p, Gamb, Nat-s, Nux-v, Phos

Landkartenzunge

Agar, Ant-c, Ant-t, Ars, Bac, Bor, Calc, Cham, Graph, Kali-m, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Nux-v, Pitu-a, Syph, Tarax, Thuj, Tub

Laryngitis

Am-br, Ant-c, Bufo, Caust, Cham, Chin, Chlor, Coff, Lach, Merc, Phos, Sep, Sulph-i, Tub

Laryngismus stridulus

Bell, Brom, Chlor, Coff, Cor-r, Cupr, Gels, Hyos, Ign, Kali-br, Lach, Mosch, Op, Phos, Plat, Plb, Stram, Sulph-i, Tarent, Thuj, Verat

Larynxlähmung s. a. Lähmung

Stram

Larynxstridor

Agar, Ant-c, Ant-t, Ars, Bell, Cham, Chlor, Lach, Mosch, Nux-v, Op, Samb, Sil, Spong

Larynx tuberkulose

Caust, Iod, Kreos, Mang, Spong, Stann, Sul-i

Leberabszess

Bufo, Lyc, Sil, Ther

Lebererkrankungen

Agar, Ambr, Ant-c, Ant-t, Ars, Aur, Bell, Bry, Calc, Calc-m, Calc-sil, Carc, Cham, Chin, Cupr,

	Graph, Ign, Iod, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Lach, Lyc, Mag-c, Mag-m, Merc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plb, Psor, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Tarent, Ther, Thuja, Tub, Zinc
Leberzirrhose	Aur, Lach, Lyc, Nux-v, Op, Phos, Psor, Sep, Zinc
Leberflecke	Carc
Leckekzem	Agar
Legasthenie s. Dyslexie	
Leistenbruch	Amph, Apis, Ars, Aur, Bar-c, Bell, Bry, Caps, Carc, Cham, Cic, Cina, Guaj, Ign, Kali-c, Lach, Lyc, Mill, Mag-c, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plat, Plb, Psor, Puls, Rheum, Sil, Sulph, Tab, Thuja, Verat,
Leistenbruch, eingeklemmt	Ars, Aur, Bell, Cham, Coff, Lach, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Op, Plb, Sil, Sulph, Tab, Verat
Leukämie	Ars, Bar-p, Ben, Calc-p, Carc, Chin, Ferr, Kali-p, Lac-c, Lach, Lyc, Merc, Nat-ar, Nat-s, Op, Tub
Leukorrhoe	Ant-c, Ars, Bar-c, Bor, Calc, Calc-p, Cann-s, Carb-ac, Carb-an, Caust, Chlorpr, Cub, Ferr, Graph, Hydr, Iod, Kali-ar, Kali-bi, Kali-m, Kreos, Lyc, Med, Merc, Mill, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plat, Psor, Puls, Sanic, Sep, Staph, Syph, Thuja, Viol-t
Leukozytose	Ant-c, Arn, Ars, Calc-sil, Caust, Ferr, Nux-v, Lach, Merc, Phos, Plb, Puls, Rheum, Verat
Lichen simplex Lichen planus	Ambr, Staph
Lichtscheu s. Photophobie	Apis
Lidkrampf	
Lidlähmung s. a. Lähmung	Agar, Jab, Nux-v, Rheum, Staph
Lipome	Apis, Bell, Caust, Gels, Plb, Spig, Verat, Zinc
Luftröhrenentzündung	Aur, Bar-c, Bell, Med, Thuja
Lungenabszess	Apis, Aran
Lungenentzündung s.	Phos, Psor, Stram
Pneumonie Lungenembolie	
Lungenemphysem	Verat
Lungenerkrankungen	Puls
Lungenödem	Jab
	Ant-ar, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Hyos, Kali-c, Kali-p, Lyc, Merc-sul, Op, Phos, Puls, Solin-act
Lupus erythematoses	
Lymphangitis	Aran, Kreos
Lymphom s. Hodgkin	Apis, Ars, Bufo, Mygal Lac-c, Lyc, Merc, Plb, Tub

M

Madenwürmer s. a. Würmer	Abrot, Ambr, Ant-c, Ars, Bar-c, Bar-s, Calc, Chen-a, Cina, Cupr, Ferr, Hyos, Ign, Jatr-c, Kali-c, Kali-m, Lyc, Mag-c, Mill, Nat-m, Nux-v, Phos, Plat, Sabad, Sep, Sil, Squil, Sulph, Teuer, Thuj, Tub
Mandelentzündung s. Tonsillitis	
Mangelernährung	Aeth, Ars, Bar-c, Calc-p, Caust, Ferr, Lac-c, Lyc, Merc, Pin-s, Psor, Sacch, Sulph
Magen-Darm-Entzündung s. Gastroenteritis	
Magenschmerzen	Ambr, Ant-c, Asaf, Aur, Bell, Bism, Bry, Calc-sil, Carb-v, Carc, Caust, Chel, Cina, Colch, Coloc, Ferr, Graph, Hep, Nux-v, Op, Phos, Ptel, Puls, Staph, Tarent
Malabsorption	Bac, Calc-p, Carc, Caust, Ferr, Lac-h, Lyc, Nat-s, Psor, Sulph
Malaria	Apis, Aran, Bry, Carc, Chin, Kreos, Lach, Nux-v, Psor, Verat
Manie	Lac-cp
Marasmus s. Abmagerung	
Masern	Acon, Ail, Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Bapt, Bar-c, Bov, Bry, Carc, Caust, Cham, Chin, Chlor, Cina, Coff, Cupr, Dros, Euphr, Hyos, Ign, Kali-c, Lyc, Maland, Merc, Nat-m, Nit-ac, Psor, Puls, Squil, Stram, Sulph, Thuj, Tub, Tub-a, Zinc
Mastoiddestruktion	Aur, Caps, Hep, Nit-ac, Phos, Sil, Staph, Stram, Thuj
Mastoiditis Medulloblastom	Caps, Kali-m, Merc, Phos
Megakolon Mekoniumaspiration	Helo-s
Meningitis	Alumn, Lach, Plb, Psor, Syph, Tarent, Zinc Ant-t, Kali-br Abrot, Aeth, Agar, Ant-t, Apis, Ars, Art-v, Bac, Bar-c, Bell, Bry, Bufo, Calc, Cham, Cic, Cina, Cupr, Cupr-act, Gels, Glon, Graph, Hed, Hell, Hyos, Ign, Iodof, Kali-br, Kali-m, Kali-p, Lac-c, Lach, Lyc, Med, Merc, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Op, Phos, Plb, Puls, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Tarent, Ther, Thuj, Tub, Zinc
Meningomyelozele	Bell, Gels, Op, Syph, Thuj
Migräne s. Kopfschmerzen	
Milchintoleranz	Aeth, Ambr, Ant-c, Ant-t, Ars, Bar-c, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Cham, Chin, Cupr, Ferr, Ipec, Kali-c, Lac-c, Lac-d, Lach, Lyc, Mag-c, Mag-m, Merc, Merc-d, Nat-c, Nat-s, Nit-ac, Rheum, Sanic, Sep, Sil, Sulph, Sulph-i, Tub, Valer

Milchschorf	Ambr, Ant-t, Calc, Dulc, Hep, Kali-chl, Kali-m, Mag-c, Mez, Olnd, Psor, Sep, Sil, Staph, Sulph-i, Tub, Vinc, Viol-t
Missbildungen	Agar, Ant-t, Aur, Bufo, Carc, Caust, Hell, Med, Merc, Op, Phos, Stram, Syph, Thuj
Mittelohrentzündung s. Otitis media	
Mitralinsuffizienz	Apis, Aur, Kali-c, Lach, Phos, Carc, Puls, Thuj
MMR-Impfung	Bry, Carc, Cupr, Med, Sil, V-a-b Ail, Carc, Merc,
Molluscum contagiosum	Thuj
Morbus Asperger s. Asperger-Syndrom	
Morbus Hirschsprung s.	
Megakolon Mukoviszidose	Apis, Aran, Calc-p, Lac-h, Lyc
Multiple Sklerose	Tarent
Mumps	Abrot, Ail, Bapt, Carc, Cham, Coc-c, Jab, Merc, Nat-m, Nux-v, Puls, Staph, Sulph, Tub
Mundschleimhautentzündung s. Stomatitis	
Muskelatrophie	Calc-p, Kali-p, Plb, Thuj
Muskeldystrophie	Ambr, Calc-p, Plb
Muskelschmerzen	Bell-p
Muttermale	Abrot, Acet-ac, Carc, Fl-ac, Med, Nit-ac, Nux-v, Phos, Sil, Sulph, Thuj
Myasthenia gravis	Calc-p
Myelitis	Abrot, Cic, Op, Phos
Myopie s. Kurzsichtigkeit	
N	
Nabelbruch	Amph, Calc, Lach, Nux-v, Op, Plb, Thuj
Nabelgeschwüre	Apis
Nachtblindheit Naevi s.	Sulph
Nagelkaugen	
	Am-br, Am-c, AMP, Ant-t, Ars, Arum-t, Bar-c, Brom, Calc, Carb-v, Carc, Castm, Caust, Cina, Hyos, Kali-br, Lyc, Med, Nit-ac, Plb, Sacch, Sanic, Staph, Verat
Nagelpilzinfektion	Anan
Nasenbluten	Abel, Abrot, Acon, Agar, Ambr, Ant-c, Ant-t, Arn, Ars, Aur, Bar-c, Bar-s, Bell, Bell-p, Bor, Bry, Bufo, Calc-p, Calc-s, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chin, Cic, Cina, Cor-r, Crot-c, Cupr, Dros, Ferr, Ferr-act, Ferr-p, Glon, Hyos, Ign, Ipec, Kali-bi, Kali-c, Kali-m, Kali-n, Kali-p, Kreos, Lach, Lyc, Mag-c, Meli, Merc, Merc-cy, Mill,

Nasenbluten (Forts.)	Mosch, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Op, Phos, Pitu-a, Plat, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Sel, Sep, Sil, Stram, Sulph, Syph, Tarent, Thuj, Tub, Verat, Vip
Nasenpolypen s. a. Polypen	Agra, Alumn, Apis, Aur, Bac, Bar-c, Bell, Calc, Galc-sil, Caust, Form, Lac-c, Lac-h, Lyc, Merc, Nit-ac, Phos, Psor, Puls, Sep, Staph, Teuer, Thuj, Tub, Tub-a
Nasenseptumdeviation	Lac-c, Thuj, Tub
Nasenseptumperforation	Alum, Kali-bi, Kali-i, Merc, Sil, Syph
Nekrose (Knochen)	Amph, Aur, Bell, Caps, Hecla, Merc, Phos, Syph
Nephritis s. Glomerulonephritis	
Nephrotisches Syndrom	Ambr, Apis, Apoc, Calc, Carc, Chin, Kali-c, Kali-m, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Plb, Sulph, Syph, Tub
Nesselsucht s. Urtikaria	
Netzhautablösung/-degeneration	Ben-d, Merc, Napht, Naphtin, Pilo, Phos, Syph
Netzhautentzündung s. Retinitis	
Neugeborenenasphyxie	Acon, Ant-c, Ant-t, Bell, Bor, Camph, Chin, Hydr-ac, Hyos, Lach, Laur, Op
Neuralgie	Bry, Cham, Ferr-p, Med, Syph
Neuritis	Bell, Coff, Iodof, Lach, Plb, Syph
Neurodermitis s. a. Ausschlag	Aeth, Agar, Ant-c, Ant-t, Apis, Bar-c, Bell-p, Bor, Bov, Calc, Calc-p, Carc, Caust, Cupr, Graph, Ipec, Lach, Lyc, Merc, Nat-m, Nit-ac, Olnd, Op, Petr, Psor, Rib-ac, Staph, Sulph, Thuj, Tub
Niednägel	Carc, Nat-m, Nat-s, Sanic, Sil, Staph, Sulph,
Nierenerkrankungen	Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Aur, Colch, Jab, Lyc, Merc, Nit-ac, Oxyd, Phos, Plb, Sacch, Sal-ac,
Nierensteine	Cupr, Chin, Lyc, Med, Sacch, Thuj
Nierenversagen	Aur, Cupr, Hyos, Jab, Kali-br, Lyc, Sacch
Nystagmus	Agar, Calc, Cupr, Gels, Nux-v, Sulph, Zinc

0

O-Beine s. Genu varum
Obstipation s. Verstopfung
Ödeme

Ödem der Augen

Antip, Ant-ar, Ant-t, Apis, Ars, Aur, Bac, Bell, Brom, Bry, Chin, Colch, Crot-h, Ferr, Graph, Hell, Hyos, Ign, Jab, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lach, Lyc, Merc, Merc-sul, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Sacch, Sal-ac, Sep, Sil, Solid, Solin-ac, Spong, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Thuj, Tub
Apis, Ars, Ferr, Hep, Kali-c, Lach, Lyc, Phos, Psor, Puls, Rhus-t

Ödem der Beine	Ant-t, Apis, Ars, Bry, Chin, Kali-c, Kali-m, Kreos, Lach, Nat-s, Puls, Sacch, Sil, Sulph, Sulph-i
Ödem der Genitalien	Apis, Ars, Graph, Nat-m, Nat-s, Rhus-t, Sep,
Ödem des Gesichts	Sulph Ant-t, Apis, Aur, Chin, Ferr, Graph, Sacch, Thuj, Verat
Ödem, peripheres	Ant-t, Apis, Ars
Ödem des Kehlkopfs s. Glottisödem	
Ödem der Lungen s. Lungenödem	Alum, Ars, Bapt, Caust, Gels, Op, Plb, Stram,
Ösophaguslähmung	Verat
s. a. Lähmung	Alum, Ars, Bar-s, Caust, Cic, Cupr, Gels, Nit-ac,
Ösophagusspasmen	Op, Plb, Stram, Zinc
Ösophago-Trachealfistel	Ambr, Caust
Ohnmacht	Acon, Aeth, Ars, Asaf, Bar-c, Bry, Bufo, Cham, Chin, Coff, Cupr, Dig, Ferr, Hep, Hyos, Ign, Lach, Laur, Lyc, Mosch, Nux-v, Phos, Phyt, Sep, Tarent, Ther, Verat
Ohrenschmerzen	Agar, Anac, Ars, Bar-c, Bar-m, Bar-s, Bell, Bor, Calc-p, Caps, Cham, Caust, Dulc, Ferr-p, Hep, Kali-bi, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Mang, Merc, Mygal, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Puls, Rhus-t, Ruta, Sep, Sil, Staph, Tarent, Tub
Ohrpolypen	Calc, Calc-p, Caust, Kali-m, Lach, Lyc, Nit-ac, Phos, Sil, Staph, Sulph, Thuj
Oligurie	Apis
Ophthalmie	Apis, Arg-n, Ars, Calc, Euphr, Hep, Kali-bi, Merc,
s. a. Augenentzündung	Nit-ac, Puls, Rhus-t, Sacch, Sil, Sulph, Thuj
Orbitalzellulitis	Ars, Merc, Sil
Orchitis	Aur, Chin, Kali-m, Lyc, Nux-v, Puls, Rhod, Rhus-t, Staph
Osteogenesis imperfecta	Calc, Carc, Thuj
Osteoklastom	Aur, Syph
Osteomyelitis	Asaf, Bac, Dros, Lach, Sep, Sulph, Syph, Ther, Thuj
Osteosarkom	Syph
Ostitis	Aur, Bac
Otitis media	Alumn, Apis, Atra-r, Aur, Bac, Bar-c, Bar-m, Bell, Bor, Bov, Bufo, Calc, Calc-caust, Calc-hp, Calc-m, Calc-s, Caps, Caust, Cham, Chen-a, Chin, Cina, Flav, Graph, Hep, Hydr, Ign, Iod, Kali-bi, Kali-c, Kali-chl, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lach, Lyc, Med, Merc, Merc-d, Nit-ac, Phos, Psor, Puls, Sacch, Sanic, Sil, Spig, Sulph, Syph, Teuer, Thuj, Tub, Tub-a, Viol-o

Otorrhoe	Aeth, Ars, Bor, Bufo, Calc, Calc-sil, Caust, Kali-bi, Kali-s, Lyc, Merc, Psor, Sanic, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Zinc
Ozäna	Ars, Syph, Thuj

P

Panaritium (Umlauf)	Apis, Bufo, Calc-sil, Caust, Sil, Psor, Puls, Sacch, Syph
Panenzephalitis, sklerosierende	Bar-c, Hyos
Pankreatitis	Bad, Phos
Papillom	Ant-t, Calc, Caust, Graph, Lyc, Nit-ac, Staph, Sulph-i, Thuj
Paraphimose	Ars, Lach, M-ambo, Merc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Sep, Tarent, Thuj
Parotitis	Ars, Aur, Bar-c, Bell, Calc-m, Calc-p, Kali-p, Lach, Lyc, Nat-m, Phos, Psor, Puls, Rhus-t, Sil, ~
Peitschenwurm s. a. Würmer	Chen-a
Perikarderguss	Apis, Aur, Psor, Sulph, Zinc
Perikarditis	Apis, Ars, Aur, Psor, Spig, Sulph
Periostitis	Apis, Aur, Puls, Sil, Syph
Peritonitis	Abrot, Apis, Ars, Bell, Bry, Kali-m, Lach, Lyc, Merc, Nux-v, Plb, Sulph, Tab, Verat
Perthes-Calve-Legg-Krankheit	Bell, Calc-p, Thuj
Pertussis	Am-br, Arn, Bar-s, Carc, Chlor, Coc-c, Cor-r, Cupr, Kali-br, Kali-m, Kali-p, Merc, Meph, Mosch, Naphtin, Phos, Sep, Sulph, Syph, Tub, Verat
Petechien	Ars, Phos
Pfortaderhochdruck	Lyc, Sulph
Pharyngitis	Ail, Bar-m, Bry, Bufo, Calc, Calc-sil, Eucal, Flav, Hyos, Kali-chl, Lac-c, Lach, Lyc, Merc, Merc-cy, Sep, Sil, Syph, Tarent, Tub
Phenylketonurie	Carc, Hyos
Phimose	Calc, Cinnb, Lyc, M-ambo, Merc, Nit-ac, Sep, Sil, Sulph, Syph, Thuj
Phlyktaena	Calc, Merc, Sulph, Syph, Thuj
Photophobie	Acon, Aeth, Agar, Ant-t, Apis, Ars, Bar-c, Bar-s, Bell, Bufo, Calc-p, Chin, Cina, Con, Ferr-p, Hyos, Ign, Kali-c, Kali-p, Lac-c, Lac-del, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Ph-ac, Phos, Pitu-a, Plb, Puls, Stram, Puls, Sanic, Sulph, Syph, Tarent, Ther, Thuj, Tub, Verat, Zinc
Pigmentflecken	Ars, Kali-c, Sep, Sil, Tarent
Pityriasis	Aran, Bac, Sep

Pleuraerguss	Ant-ar, Ars, Ars-i, Bac, Calc-m, Kali-m, Lyc, Nat-m, Sil, Sulph, Sulph-i, Tub, Verat, Zinc
Pleuritis	Calc-m, Kali-c, Nat-m, Nit-ac
Plica polonica	Ant-t, Bac, Bar-c, Bor, Fl-ac, Graph, Lyc, Psor, Tub, Vinc
Pneumokokken	Calc-p, Hyos
Pneumonie	Acon, Am-c, Ant-t, Arn, Ars, Aur, Bac, Bapt, Bar-c, Bry, Calc, Calc-sil, Camph, Carb-v, Carc, Chin, Coff, Ferr, Hell, Hep, Hyos, Ign, Ipec, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lac-del, Lach, Laur, Lyc, Merc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Op, Ph-ac, Phos, Phyt, Psor, Puls, Pyrog, Sacch, Sep, Sil, Spong, Squil, Stram, Sulph, Sulph-i, Teuer, Thuj, Tub, Verat
Pneumonitis Polioimpfung	Squil
Poliomyelitis Polypen	Tub
	Apis, Calc-p, Caust, Kali-p, Merc, Plb
	Agra, Apis, Aur, Bac, Bar-c, Bar-m, Bell, Calc, Calc-p, Calc-sil, Caust, Form, Kali-br, Kali-m, Lac-c, Lac-h, Lach, Lyc, Med, Merc, Nit-ac, Nux-v, Phos, Psor, Puls, Sep, Sil, Staph, Sulph, Syph, Teuer, Thuj, Tub
Prellungen	Bell-p, Cic, Nit-ac
Pseudokrupp	Verat
Psoriasis	AMP, Apis, Aran, Aur-m-n, Calc-sil, Chin, Graph, Kali-br, Kreos, Lyc, Mag-c, Nat-m, Phos, Psor, Staph, Thyr, Tub
Pterygium	Ars, Bac, Zinc
Ptosis	Ars, Bar-c, Caust, Gels, Kali-p, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Rhus-t, Sep, Spig, Syph
Purpura Pyelonephritis	Bell, Coff, Cupr, Ferr, Hyos, Lach, Phos
Pyloruskonstriktion	Apis, Bry, Chin, Merc-c, Nux-v, Rhus-t, Sulph-i,
Pylorusstenose	Ter Phos
	Abrot, Aeth, Dys-co, Kreos, Lyc, Syph
Q	
Quincke-Ödem (Angioödem)	Agar, Antip, Apis
R	
Rachenentzündung s.	
Pharyngitis	Bar-c, Calc, Calc-hp, Calc-p, Caust, Cic, Ferr, Hed, Iod, Lac-c, Lac-h, Merc, Nat-m, Nit-ac, Ol-j, Op, Petr, Phos, Pin-s, Plb, Psor, Puls, Sacch, Sanic, Sep, Sil, Staph, Syph, Ther, Thuj, Tub
Rachitis	
Ranula	Ambr, Calc

Reiter-Syndrom	Thuj, Tub
Rekonvaleszenz	Ars, Bar-c, Bar-m, Calc-p, Carc, Caust, Ferr, Hep, Merc, Nit-ac, Sil, Sulph, Thuj, Tub
Rektalpolypen	Bac, Calc, Kali-br, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Phos, Psor, Syph
Rektumprolaps	Aesc, Aloe, Ant-c, Apis, Ars, Aur, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Carc, Caust, Cic, Ferr, Ign, Kali-c, Kali-p, Med, Merc, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Podo, Puls, Ruta, Sep, Sil, Sulph, Syph, Zinc
Retinale Blutung	Bell, Crot-h, Lach, Phos, Sulph
Retinitis	Kali-m, Kali-p, Lach, Naphtin, Plb, Sulph, Thuj
Retinoblastom	Aur, Syph
Retinopathia pigmentosa	Lach, Lyc
Rhagaden in den Mundwinkeln	Ambr, Ant-c, Arum-t, Graph, Nit-ac, Sil, V-A-B
Rhagaden in den Augenwinkeln	Ant-c, Lyc, Nat-m
Rhagaden zw. den Fingern	Sulph
Rheumatische Erkrankungen	Abrot, Acon, Adon, Ant-c, Ant-t, Aran, Ars, Aur, Benz-ac, Bry, Calc, Calc-p, Caust, Cham, Chin, Dulc, Form, Graph, Hep, Hyos, Ign, Kali-i, Kali-m, Kali-s, Kalm, Lac-ac, Lac-c, Lach, Laur, Lith-c, Lyc, Lycps-v, Mag-p, Med, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Phyt, Plat, Psor, Puls, Rheum, Rhod, Rhus-t, Rib-ac, Sacch, Sanic, Sep, Sil, Spig, Stram, Sulph, Syph, Tarent, Thuj, Cic, Plb, Stram, Tarent
Risus sardonicus	Cic, Plb, Stram, Tarent
Ritalin	Coff
Roberts-Syndrom	Aur
Röteln	Caust, Coff, Hyos, Thuj
Rota-Viren	Aeth, Ant-t, Ars, Bac, Bry, Cupr, Cupr-ar, Phos, Puls, Verat

S

Salmonellen	Gamb
Sarkom	Aur, Croth-h, Kali-chl, Kali-m, Merc, Syph
Scharlach	Abrot, Apis, Bell, Coff, Stram
Schielen s. Strabismus	
Schilddrüsenentz. s. Hashimoto	
Schlafllosigkeit	Agar, Apis, Aran, Ars, Aur, Bar-s, Bor, Bry, Calc, Calc-br, Caps, Carc, Caust, Cham, Chin, Cic, Cina, Coff, Coloc, Cupr, Cypr, Daph, Ferr, Hyos, Ign, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kalm, Kreos, Lac-h, Lac-leo, Lach, Lyc, Mag-c, Merc, Mez, Mosch, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Scut, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Teuer, Ther, Thuj, Tub

Schlafwandeln	Cham, Chlol, Kali-br, Kali-p, M-arct, Mosch, Nit-ac, Phos, Sulph
Schlaganfall Schluckauf	Bar-c, Bell, Cic, Kali-p, Lach, Lyc, Plb, Syph Aeth, Alum, Ant-t, Arg-n, Ars, Bar-s, Bor, Bry, Caust, Cham, Cic, Coff, Cycl, Cupr, Hyos, Ign, Kali-br, Kali-c, Kreos, Lac-h, Lyc, Mag-m, Merc, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nicc, Nux-v, Phos, Plat, Psor, Puls, Ran-b, Rat, Samb, Sep, Staph, Stram, Sulph-i, Teuer, Verat, Zinc
Schnarchen	Aeth, Apis, Ars, Bufo, Caps, Carb-v, Cham, Chin, Cupr, Des-ac, Hyos, Ign, Kali-c, Op, Puls, Rheum, Sil, Stram, Tub
Schnittwunden	Kali-m, Staph
Schnupfen	Aeth, Agar, All-c, Anac, Anth, Antip, Ant-c, Ant-t, Arg-n, Ars, Arum-t, Aur, Bac, Bapt, Bar-c, Bar-s, Bell, Bell-p, Bov, Brom, Bry, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-s, Calc-sil, Caps, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chin, Chlor, Cina, Coc-c, Cor-r, Cupr, Diphtox, Dros, Dulc, Eucal, Euph, Gels, Glon, Graph, Hep, Hyos, Jab, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kreos, Lac-c, Lac-d, Lac-del, Lach, Lyc, Mag-c, Mang, Merc, Merc-d, Mosch, Naphtin, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Pall, Phos, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Sacch, Samb, Sang, Sanic, Sep, Sil, Squil, Staph, Stict, Sulph, Sulph-i, Syph,
Schock, allgemein	Acon, Agar, Ambr, Ant-ar, Ant-t, Ars, Bufo, Camph, Canth, Carc, Cham, Coff, Cupr, Gels, Hyos, Kali-br, Kali-p, Lach, Op, Phos, Sec, Verat,
Schock, anaphylaktischer	Abrot, Ant-t, Op
Schwäche	Abrot, Aeth, Agar, Ambr, Anac, Antip, Ant-c, Ant-t, Arn, Ars, Aur, Bar-c, Bell, Calc, Calc-p, Calc-sil, Caust, Cic, Cina, Cupr, Cypr, Dig, Diph, Elaps, Ferr, Ferr-act, Graph, Helo-s, Hyos, Ign, Ipec, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-del, Lac-leo, Lach, Laur, Lyc, Mag-m, Merc, Merc-cy, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Psor, Puls, Rheum, Sacch, Samb, Sep, Sil, Staph, Stram, Sulph, Sumb, Syph, Ther, Tub,
Schwerhörigkeit	Ägra, Calc-br, Calc-caust, Calc-hp, Chen-a, Merc-d, Thiosin
Schwielen	Ant-c, Ars, Bar-c, Bor, Calc, Graph, Lyc, Nat-s, Sep, Sil, Sulph
Schwindel	
Seborrhoe	
Seekrankheit s. a. Kinetose	Apis, Plb, Ther
Sehnervatrophie	Thuj, Tub Calc, Sep, Ther Nux-v, Plb, Syph

Sehnerventzündung s. Neuritis

Sehnervlähmung

s. a. Lähmung

Sehschwäche

Selbstverletzung

Septikämie / Sepsis

Shigellen

Sinusitis

Sjögren-Syndrom

Skabies

Skleritis

Skoliose

Skorbut

Skotom Sodbrennen

Sonnenstich

Soor

Spider naevi

Spina bifida

Spinalmeningitis

Splitterverletzungen Spondylitis

ankylosans Sprue s. Zöliakie

Spulwürmer s. a. Würmer

Bar-s, Bell, Gels, Kali-i, Merc, Phos, Puls, See, Sil, Stram, Thuj, Verat

Cina, Jab, Kali-p, Ol-an, Sacch, Sep, Sil, Sulph, Thyr

Ars, Lil-t, Lyss

Antip, Ant-t, Apis, Ars, Bell, Crot-h, Cupr, Kali-p, Lach, Merc, Op, Plb, Pyrog, Sacch, Sulph, Tarent, Verat

Gamb

Agra, Alumn, Ars, Bar-c, Calc, Calc-sil, Carc, Cinnb, Flav, Ign, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Lac-del, Lac-f, Lac-h, Lach, Merc, Nit-ac, Puls, Sep, Teuer, Thuj, Tub

Tub

Ant-c, Ant-t, Ars, Bry, Bufo, Calc, Carb-v, Caust, Cupr, Ferr, Kali-s, Kreos, Lyc, Merc, Op, Psor, Sep, Sil, Staph, Sulph, Verat, Vinc

Aur, Kalm, Sep, Thuj

Aur, Bac, Bufo, Calc-p, Psor, Syph, Thuj, Tub

Ars, Bry, Caps, Caust, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lyc, Merc, Nux-v, Plb, Sacch, Staph, Tub

Nat-m, Plb, Psor

Ant-t, Calc-p, Carc, Kali-c,

Agar, Alm-ns, Bell, Glon, Nat-c, Nat-m, Syph, Ther

Aeth, Ant-t, Ars, Bor, Bry, Calad, Caust, Chlorpr, Kali-br, Kali-chl, Merc, Nit-ac, Psor, Sacch, Sep, Staph, Silph, Sulph, Thuj, Verat

Carc, Med

Ars, Bac, Bar-c, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Calc-s, Merc, Nit-ac, Phos, Psor, Sil, Staph, Sulph, Syph, Thuj, Tub

Abrot, Apis, Ars, Bell, Cic, Gels, Hyos, Nat-s, Nux-v, Op, Plb, Tub

Arn, Cic, Hep, Sil, Staph

Thuj

Abrot, Anth, Ars, Bar-c, Bell, Bor, Calc, Caust, Cham, Chen-a, Cic, Cina, Ferr, Gran, Hyos, Ign, Jatr-c, Kali-c, Mag-c, Merc-d, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Pin-s, Psor, Scir, Sil, Spig, Staph, Sulph, Teuer, Thuj, Tub, Verat

Ant-t, Ars, Calc-sil, Caust, Hyos, Kreos, Lach,

Staphylokokken Staphyloma

Thuj

Still-Syndrom	Abrot, Merc, Thuj, Tub
Stimmritzenkrampf s.	
Laryngismus	Thuj
Stoffwechselstörungen	Astac, Bor, Bufo, Flor-p, Kali-i, Kali-p, Med, Merc,
Stomatitis	Merc-d, Nit-ac, Nux-v, Psor, Sep, Sulph, Syph, Thuj
Strabismus	Aeth, Agar, Ant-c, Ant-t, Apis, Bufo, Calc, Calc-p, Camph, Caust, Cic, Cina, Cycl, Hyos, Jab, Kali-br, Kali-p, Lyc, Nat-m, Nux-v, Op, Phos, Plb, Psor, Puls, Sil, Staph, Stram, Sulph, Syph, Tarent, Tub, —
Streptokokken	Ail, Ant-t, Ars, Bapt, Calc-p, Cinnb, Hyos, Lac-c, Lyc, Merc-cy
Struma	Apis, Aran, Aur, Bufo, Calc-sil, Iod, Kali-c, Lyc, Mag-c, Op, Phos, Plat, Psor, Sep, Sil, Spong, Staph, Stram, Sulph-i, Tub, Verat
Stupor	Aeth, Ail, Ant-t, Ars, Bufo, Cic, Diph, Hyos, Iodof, Lach, Plb, Rheum, Stram, Tarent
Suizid	Carc, Lac-c
Synkope s. a. Ohnmacht	Mosch
Synovitis	Apis, Berb, Bry, Caust, Hep, Lyc, Rhus-t, Sil, ~~Sil-lch~~
Syringomyelie	Phos, Plb

T

Tabes mesenterica	Abrot, Ars, Bac, Bar-c, Calc, Cina, Iod, Nux-v, Puls, Sil, Tub
Talgretentionszysten (Atherom)	Bar-c, Calc, Calc-sil, Graph, Kali-br, Kali-c, Lyc, Sil
Taubheit	Asar, Bor, Calc, Caust, Helo-s, Hep, Kali-m, Kali-p, Kalc-s, Lac-c, Lyc, Med, Nit-ac, Sulph, Syph, Thuj, Tub, Viol-o
Teleangiektasien	Plb
Tenesmus	Calc-p, Lac-c, Merc, Merc-d, Nat-s, Nux-v, Op, Rheum
Tetanie	Aeth, Agar, Anth, Ant-t, Aran, Arge, Ars, Apis, Bar-s, Bell, Brom, Bry, Bufo, Calc, Calc-p, Camph, Canth, Carc, Caust, Cham, Chlor, Cic, Cina, Coff, Cupr, Ferr, Gels, Hep, Hyos, Ign, Jab, Jatr-c, Kali-br, Kali-c, Kreos, Lac-c, Lac-del, Lac-leo, Lach, Lyc, Merc, Mosch, Mygal, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Op, Ph-ac, Plat, Plb, Puls, Rheum, Sacch, Sil, Staph, Stram, Sulph, Ther, Thuj, Verat
	Cic
	Ferr
Tetanus	Sacch
Thalassämie	
Thrombose	Sacch
Thrombozytopenie	Chlorpr, Ferr

TIA (Transitorisch ischämische Attacke)	Plb
Tinea, allgemein	Ambr, Bac, Bell, Calc-m, Canth, Lach, Nat-ar, Nat-m, Sep, Staph, Sulph, Thuj
Tinea capitis	Bac, Brom, Calc-m, Dulc, Graph, Med, Sulph,
Tinea circinata	Teil
Tinea cruris	Bac, Nat-ar, Tell, Sep
Tinea pedis	Ambr, Bell, Canth, Lach, Sep, Thuj
Tinea tongualis	Lach
Tinnitus	Nat-m
Tollwut	Caust
Tonsillenhypertrophie	Ars, Hyos
	Agra, Ail, Alumn, Aur, Bac, Bar-c, Bar-m, Bell, Calc, Calc-i, Calc-p, Carc, Gins, Graph, Kali-bi, Lac-c, Merc, Sil, Staph, Sulph-i, Syph, Thui, Tub
Tonsillitis	Agar, Ail, Alumn, Amph, Ant-t, Apis, Ars, Aur, Bad, Bapt, Bar-c, Bar-m, Bar-p, Bell, Brom, Bry, Calc-p, Calc-sil, Caps, Carc, Cham, Chen-a, Cinnb, Cupr, Diph, Diphtox, Dulc, Eucal, Ferr, Hep, Ign, Iod, Kali-c, Kali-chl, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-del, Lach, Lyc, Merc, Merc-cy, Nat-s, Nit-ac, Phos, Plb, Psor, Puls, Sep, Sil, Staph, Sulph, Syph, Tarent, Thuj, Tub, Tub-a, V-A-B, Zinc
Torticollis Tourette-Syndrom	Caust, Cupr, Ign, Mygal, Nux-v, Op, Phos, Sulph
Toxoplasmose Tracheomalazie	Agar
Tracheoösophagealfistel s. a.	Thuj
Fisteln Trachom	Syph
Tränendrüsensfistel s. a. Fisteln	Syph
Tränengangstriktur	
Tränensackentzündung s.	Apis, Ars, Aur, Bell, Kali-m, Puls, Sep, Sulph,
Dakryozystitis Trichomonaden	Thuj
Trichophytie Trismus	Agar, Apis, Calc, Kreos, Lach, Lyc, Merc, Nit-ac, Puls, Sil, Stann, Sulph
Trommelfellperforation	Sil, Thiosin
	Syph
	Bac
	Aeth, Ambr, Cic, Nux-v, Op
	Aur, Bufo, Calc, Calc-i, Caps, Graph, Hydr, Iod, Kali-bi, Kali-m, Kali-p, Merc, Merc-d, Sil, Sulph, Sulph-i, Thuj, Tub
Tuberkulose	Abrot, Agar, Apis, Ars, Aur, Bac, Bar-c, Bufo, Calc, Calc-caust, Calc-hp, Calc-lac, Calc-p, Calc-sil, Carc, Caust, Chin, Chlorpr, Coli, Dros, Eucal,

	Flor-p, Hyos, Iodof, Iod, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lyc, Mag-c, Mang, Med, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Olnd, Ol-j, Phos, Pin-s, Psor, Puls, Sacch, Sil, Spong, Stann, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Ther, Thuj, Tub, Tub-a, Tub-m, V-A-B
Tumor der Augen	Teuer
Tumor der Meibom-Drüse	Kreos, Teuer
Turner-Syndrom	Carc
Tympanitis	Aeth, Agar, Bell, Bry, Carb-v, Chin, Lach, Lyc
Typhus	Ant-t, Apis, Arn, Ars, Bapt, Bry, Chin, Cic, Hyos, Kali-p, Lach, Lyc, Nat-m, Nit-ac, Op, Phos, Stram, Sulph, Tub, Verat, Zinc
u	
Übelkeit	Aeth, Ambr, Androc, Ant-c, Ant-t, Apis, Arge, Ars, Asaf, Bar-c, Bell, Bism, Bor, Bry, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-sil, Camph, Carc, Caust, Cham, Cina, Cocc, Coff, Colch, Cupr, Des-ac, Dig, Ferr, Hyos, Ign, Ipec, Jab, Jatr-c, Kali-bi, Kali-c, Kreos, Lac-ac, Lac-c, Lac-d, Lac-del, Lac-h, Lac-leo, Lach, Lyc, Mag-c, Merc, Mosch, Mygal, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Op, Petr, Phos, Pitu-a, Plb, Puls, Rheum, Sacch, Sacch-a, Sanic, Sep, Sil, Tarent, Ther, Tub, Zinc
Ulzeration s. Geschwüre	
Umlauf s. Panaritium	
Untergewicht	Abrot, Kreos, Tub
Urachus offenliegend	Hyos, Thuj
Urämie	Acon, Apis, Ars, Hyos, Mosch, Op, Plb
Urethrastriktur	Apis, Canth, Cic, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Plb, Puls, Stram
Urethralklappe	Sulph-i
Urtikaria	Anan, Antip, Ant-c, Apis, Ars, Bar-s, Bov, Bry, Calc, Calc-p, Caust, Chlol, Chlor, Cop, Kreos, Lach, Lyc, Med, Nat-m, Nux-v, Puls, Staph, Thy
v	
Vaginalpolypen	Psor, Puls
Ventrikelseptumdefekt	Aur, Laur
Verbrennungen	Apis, Ars, Canth, Caust, Phos
Verdauungsbeschwerden	Aeth, Ambr, Androc, Ant-c, Aran-ix, Ars, Bar-c, Bry, Calc, Calc-p, Cann-s, Caps, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chin, Cina, Coff, Colch, Cop, Cupr, Cypr, Ferr, Ferr-p, Graph, Hyos, Ign, Iod, Ipec, Jab, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Lyc, Mag-c, Mag-m,

Verdauungsbeschwerden (Forts.)	Merc, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Petr, Ph-ac, Phos, Psor, Ptel, Puls, Sacch, Sanic, Sep, Sil, Staph, Sulph, Symph, Tarent
Verrenkung	Agn, Arn, Ars, Bell, Bry, Calc, Caust, Ign, Lyc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Psor, Puls, Rheum, Rhus-t, Ruta, Sep, Sil, Staph, Sulph, Thuj
Verstauchung	Bell, Bry, Calc, Cic, Nat-m, Psor, Sil
Verstopfung	Abrot, Aeth, Agar, Aloe, Alum, Alumn, Ambr, AMP, Amph, Ant-c, Bac, Bar-c, Bar-s, Bell, Bry, Bufo, Calc, Calc-sil, Carc, Caust, Cham, Chlorpr, Coll, Coloc, Cop, Cupr, Fil, Graph, Hyos, Ign, Indg, Iod, Kali-br, Ketogl-ac, Kreos, Lac-c, Lac-d, Lac-f, Lach, Lyc, Mag-c, Mag-m, Mag-s, Med, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plat, Plb, Psor, Pitu-a, Puls, Rhus-t, Sacch, Sanic, Senn, Sep, Sil, Staph, Sulph, Syph, Tarent, Tub-m, Verat, Zinc
Vitiligo	Ant-t, Calc-sil, Chlorpr, Ign Bor, Canth, Syph,
Vulvovaginitis	Thuj
W	
Wachkoma	
Wachstu mssch merzen	Acon, Bell, Hyos, Lach, Op
	Aeth, Agar, Ap-g, Asaf, Aur, Bar-c, Calc-p, Caust, Conch, Ferr-act, Guaj, Hep, Hipp, Ictod, Lac-del, Lach, Mag-met, M-aust, Merc, Nit-ac, Ol-an, Ol-j, Ph-ac, Phos, Sil, Staph
Warzen	Anac, Ant-c, Ant-t, Aur, Bar-c, Bar-s, Bell, Bufo, Calc, Calc-sil, Carc, Caust, Cina, Cupr, Dulc, Ferr, Hep, Kali-c, Kali-s, Lac-c, Lach, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Op, Psor, Rhus-t, Sabin, Sanic, Sars, Sep, Sil, Staph, Syph, Thuj
Wassereinlagerungen s. Ödeme	
Weichselzopf s. Plica polonica	
Weitsichtigkeit s. Hypermetropie	
Werdnig-Hoffmann-Krankheit	Calc-p
Wilson-Mikity-Syndrom	Ant-t
Windeldermatitis Windpocken	Canth, Caust, Kali-chl, Merc, Thuj
	Ail, Ant-c, Ant-t, Bapt, Bry, Calc, Coff, Hyos, Kali-m, Maland, Merc, Plat, Psor, Puls, Sep, Sulph, Thuj, Tub
Wirbelsäulenverkrümmung	Asaf, Aur, Bar-c, Bell, Bufo, Calc, Calc-f, Calc-p, Caust, Kali-c, Lyc, Merc, Merc-c, Op, Phos, Plb, Psor, Puls, Sep, Sil, Sulph, Syph, Tarent, Ther, Thuj, Tub, V-A-B

Wirbelsäulenverletzung	Arn, Cic, Hyper, Kali-c, Nat-sNit-ac, Tarent, Thuj, Zinc
Würmer	Abrot, Ambr, Anis, Anth, Ant-c, Arge, Ars, Art-v, Atra-r, Bapt, Bar-c, Bar-s, Bell, Bor, Calad, Calc, Calc-caust, Calc-p, Carc, Caust, Cham, Chen-a, Chin, Cic, Cina, Coff, Coli, Cupr, Eucal, Ferr, Fil, Gran, Hyos, Ign, Indg, Jab, Kali-c, Kali-m, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plat, Psor, Puls, Sabad, Sacch, Scir, Sep, Sil, Spig, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Teuer, Thuj, Tub, Verat, Viol-o, Viol-t, Zinc
X	
X-Beine s. Genu valgum	
Z	
Zähneknirschen	Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Bell, Bor, Bufo, Calc, Carc, Caust, Cic, Cina, Coff, Cop, Cupr, Ferr, Hell, Hyos, Ign, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Lyc, Merc, Mygal, Nux-v, Op, Plb, Psor, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Thuj, Tub, Zinc
Zahnabszess	Calc, Cham, Merc, Puls, Sil, Staph, Thuj
Zahnfistel s. a. Fisteln	Bar-c, Sil, Staph, Sulph
Zahnfleischabszess	Bar-c, Bufo, Calc, Cham, Caust, Hecla, Hep, Lyc, Med, Merc, Puls, Sil, Staph, Sulph
Zahnfleischbluten	Agar, Ambr, Ant-c, Apis, Aran, Ars, Aur, Bar-c, Bar-s, Bell, Bov, Bufo, Calc, Calc-sil, Carb-v, Carc, Caust, Chlorpr, Cic, Graph, Hyos, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-h, Lach, Lyc, Med, Merc, Merc-c, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plb, Psor, Sep, Staph, Sulph, Sulph-i, Tarent, Thuj, Tub
Zahnfleiscentzündung s.	
Gingivitis Zahnfleischrückgang	Ant-c, Aur, Bry, Calc, Caps, Carb-v, Caust, Cic, Cupr, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Lyc, Merc, Nat-m, Phos, Plb, Psor, Staph, Sulph-i, Syph, Thuj, Tub, Verat
Zahnkaries	Am-c, Ambr, Amph, Ars, Bar-c, Bor, Calc, Calc-f, Calc-p, Calc-sil, Carc, Chin, Coff, Fl-ac, Hecla, Ign, Kreos, Lach, Mag-c, Med, Merc, Mez, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Phos, Plan, Plat, Plb, Puls, Sep, Sil, Staph, Stram, Sulph-i, Syph, Thuj, Tub, Zinc
Zahnschmerzen	Ant-c, Bar-c, Bor, Calc, Calc-sil, Cham, Coff, Ferr, Ign, Kali-c, Kreos, Lac-c, Lyc, Mag-c, Mag-p, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nux-v, Puls, Rheum, Sep, Sil, Staph, Sulph-i, Thuj
Zahnstellung, ungeordnet	Tub

Zahnungsbeschwerden	Agra, Aeth, Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Bar-c, Bell, Bism, Bor, Bry, Calc, Calc-br, Calc-p, Caust, Cham, Chlol, Chlor, Cic, Cina, Coff, Cupr, Cypr, Ferr, Fl-ac, Gels, Hyos, Ign, Ipec, Jal, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lach, Mag-c, Med, Merc, Merc-d, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Oena, Olnd, Op, Phos, Plat, Psor, Puls, Rheum, Scut, Sep, Sil, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Thuj, Thyr, Tub, Verat, Verat-v, Zinc
Zehennägel, eingewachsen	Caust, Kali-m, M-aust, Nat-m, Sil, Staph, Sulph, Sul-i, Teuer, Thuj
Zerebral parese	Apis, Bar-c
Zerrungen	Bry, Thuj
Zöliakie	Calc-p, Lac-h, Lyc, Psor
Zungenbiss s. Bisswunden	
Zungenentzündung s. Glossitis	
Zungenlähmung s. a. Lähmung	Agar, Both, Caust, Hyos, Op, Plb, Rheum, Stram
Zwangsneurose	Arg-n, Ars, Carc, Cupr, Iod, Kali-c, Manc, Nat-m, Nat-sil, Nux-v, Plat, Psor, Sep, Sulph, Syph, Thuj, Tub
Zwechfelllähmung s. a. Lähmung	Cupr, Mosch, Sil
Zwergwuchs s. Kleinwuchs	
Zyanose	Agar, Ant-t, Ars, Aur, Bell, Bor, Bry, Calc, Calc-p, Carb-v, Cic, Cina, Cupr, Dig, Hydr-ac, Hyos, Ipec, Kali-c, Lach, Lyc, Mosch, Nat-m, Nux-v, Oena, Op, Plb, Psor, Stram, Thuj, Verat
Zystitis	Apis, Bapt, Benz-ac, Cann-s, Carb-v, Chin, Coli, Cop, Dulc, Equis-h, Hep, Kali-m, Lach, Lyc, Med, Merc, Nit-ac, Puls, Sep, Staph, Tarent, Tub
Zytomegalie	Caust, Thuj



Henry Newell Guernsey

HOMÖOPATHIE IN GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE

664 Seiten, geb., € 79,-

Das Werk von Henry Newell Guernsey ist das wohl umfassendste Standardwerk über die homöopathische Behandlung in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe.


Guernsey verfügte als Leiter einer großen homöopathischen Frauenklinik über einen immensen Erfahrungsschatz. Er vermag die Symptombeschreibung auf das Wesentliche zu beschränken und gilt als Meister der Verschreibung nach Schlüsselsymptomen. Dadurch ist

eine schnelle, gezielte Mittelwahl möglich.

Damit die Zeit der Schwangerschaft auf völlig physiologische Weise überstanden werden kann, muß man alle Gewohnheiten ablegen, die unphysiologisch und unphilosophisch sind, und alle schädlichen Praktiken weglassen.

Die Schwangere sollte danach streben, in sich die größtmögliche Ruhe und Fröhlichkeit des Gemüts zu kultivieren, sollte sich bemühen, mit sich und der Welt in Frieden zu leben, denn ihr geistiger und emotionaler Zustand wird sich, das ist sicher, auf ihre Nachkommenschaft übertragen. Die Erziehung der zukünftigen Generation beginnt bereits im Uterus!

Henry Newell Guernsey



Kate Birch

IMPF-FREI

Homöopathische Prophylaxe & Behandlung von Infektionskrankheiten

416 Seiten, geb., € 35,-

Ein praktischer Ratgeber für die homöopathische Behandlung und Vorbeugung von Infektionskrankheiten.

Im vorliegenden Werk gibt sie neben einer gutverständlichen Einführung in die Grundprinzipien der Homöopathie einen umfassenden

Überblick über bekannte Infektionskrankheiten, deren Erreger, übliche Impfungen und Behandlungen sowie die mögliche homöopathische Prophylaxe und Therapie. Dies umfasst neben den bekannten Kinderkrankheiten wie Windpocken, Masern, Röteln und Scharlach, häufige Infektionskrankheiten wie Otitis media, Grippe, Mononukleose und Lungenentzündung, sowie weitere Infektionen wie Tollwut, Tetanus, Diphtherie und Tuberkulose. Einen ausführlichen Teil widmet sie auch sexuell übertragbaren Krankheiten wie Herpes, Gonorrhoe, Syphilis, AIDS und Hepatitis.

Auch Tropenkrankheiten wie Gelbfieber, Dengue-Fieber, Malaria und Typhus werden detailliert diskutiert. Ein ausführlicher Teil beschäftigt sich mit Fieber, den verschiedenen Formen und homöopathischer Behandlung, ein weiteres Kapitel mit Impfschäden und deren Therapie. „Das Buch verliert sich nicht im Detail - ist aber auch nicht zu oberflächlich - Kate Birch hat es geschafft, den Sachverhalt auf fast perfekte Weise darzustellen. Ich schätze den praktischen Nutzen des Buches wirklich sehr. Es gibt genaue und konzentrierte Auskunft auch für Eltern, die sich unschlüssig sind, ob sie impfen sollen. Ich kann dieses Buch jedem Homöopathen wärmstens empfehlen.“

Dr. J. Rozencwajg, Homeopathic Links



Farokh Master

DIE HOMÖOPATHISCHE BEHANDLUNG VON HAUTKRANKHEITEN

Lehrbuch und Materia Medica - mit über 150 Hauterkrankungen und zahlreichen farbigen Abbildungen

568 Seiten, geb., € 69.-

Das wohl umfassendste Werk über die homöopathische Therapie von Hautkrankheiten. Farokh Master besticht durch Klarheit, fundiertes klinisches Wissen und außergewöhnlich detaillierte Beschreibungen der dermatologischen Symptombilder. In diesem Buch gelingt es dem Autor

enorme klinische Erfahrung mit einer ausgezeichneten homöopathischen Verbindung. Dr. Master beschreibt in seinem Buch rund 150 Erkrankungen der Haut (z.B. Ekzeme, Psoriasis, Dermatitis, Infektionen, Lepra und Tuberkulose). Er erörtert homöopathische Behandlungsansätze für akute Zustände (z.B. infektiöse Dermatosen) sowie für chronische und schwere Dermatosen (z.B. Psoriasis, Lepra und Tuberkulose).



Farokh Master

MILCHMITTEL IN DER HOMÖOPATHIE

192 Seiten, geb., € 29,-

Der bekannte indische Arzt präsentiert hier das rundeste und klinisch fundierteste Werk über die Milchmittel. Mit 15 Mittelbeschreibungen ist es eine umfassende Sammlung dieser Familie. Alle dargestellten Mittel werden durch klinische Erfahrungen bereichert. Es werden nicht nur Prüfungssymptome aufgelistet, sondern auch der Sinn der Symptome gezeigt und differentialdiagnostische Hinweise gegeben.

Den Themen der Milchmittel folgt eine Beschreibung der Arzneimittelbilder von Lac caninum (Schaf), Lac suinum (Schwein), Lac lupinum (Wolf), Lac asinum (Esel) und Lac delphinum (Delphin). Lac equinum (Pferd), Lac caprinum (Ziege), Lac felinum (Katze), Lac caninum (Hund), Lac vaccinum defloratum (entrahmte Kuhmilch), Lac taurinum (Rind), Lac ovinum (Schaf), Lac suinum (Schwein), Lac lupinum (Wolf), Lac asinum (Esel) und Lac delphinum (Delphin).



Frans Kusse

KINDERTYPEN

56 homöopathische Konstitutionsmittel

280 Seiten, geb., € 39.-

Der einfühlsame und liebenswürdige holländische Arzt Frans Kusse beschreibt aus seiner großen klinischen Erfahrung 56 häufige homöopathische Kindertypen. Gekonnt schildert er besonders die psychischen Merkmale der einzelnen Mittel und lässt anschauliche Mittelbilder entstehen, die leicht wiederzuerkennen sind.

Kindertypen riginell und stammt aus der Feder eines Praktikers. Neben Polychresten wie Beryll, Lithium, Mangan, Saccharum officinale. Diese sind bei Kindern sehr oft angezeigt, doch wurden sie bei Erwachsenen und auch nur vereinzelt in Fachzeitschriften geschildert.



Didier Grangeorge

DAS KINDER-HOMÖOPATHIE-HANDBUCH

Homöopathische Behandlung im Akutfall


344 Seiten., geb., € 39,-

Didier Grangeorge ist weltweit einer der erfahrensten homöopathischen Kinderärzte. In diesem Buch vermittelt er sein immenses Wissen und erläutert bewährte Mittel bei den verschiedensten Erkrankungen im Kindesalter. Das Buch zeigt die ganze Bandbreite der homöopathischen Behandlung bei Kindern.

Ein besonderes Kapitel behandelt Erkrankungen während der

Schwangerschaft, Geburt und Neugeborenenzeit bis zu den typischen Kinderkrankheiten. Dr. Grangeorge erläutert auch die tiefere Bedeutung von Symptomen und gibt so wertvolle Hinweise für das zugrunde liegende Problem.

Man merkt, dass die Mittelhinweise direkt aus der Erfahrung des großen Klinikers kommen, was dem Buch eine ungewöhnliche Originalität verleiht. Wissen aus erster Hand - eine wahre Fundgrube!



Patricia Le Roux

SCHMETTERLINGE IN DER HOMÖOPATHIE

13 Schmetterlinge - Prüfungen, Essenzen und Fälle

152 Seiten., geb., € 28,-

Die bekannte französische Kinderärztin Patricia Le Roux betritt in diesem Werk das nahezu unbekannte Reich der Schmetterlinge in der Homöopathie und eröffnet damit ungeahnte Therapiemöglichkeiten. Das Werk enthält Arzneimittelpfahrungen, Fälle und Essenzen von 13 Schmetterlingen und Faltern: Der kalifornische Eisvogel, der geschweifte Eichelhäher, der Fliederspanner, der Prozessionsspinner, der Goldafter, der Zitronenfalter, der Totenkopf, der wärmere, der blaue

Morphofalter, das Tagpfauenauge, der Scheckenfalter, der große Kohlweißling, der kleine Fuchs und der Brombeerspinner.



Rosina Sonnenschmidt

SET DER SCHRIFTENREIHE

ORGAN - KONFLIKT - HEILUNG IN 12 BÄNDEN

Mit Homöopathie, Naturheilkunde und Übungen


1884 Seiten, geb., € 365,-

Eine Krankheit manifestiert sich gemäß dem Resonanzprinzip am passenden organischen Ort und vermittelt den Konflikt und die Lösung.

Rosina Sonnenschmidt verbindet in der Schriftenreihe Organ-Konflikt-

Heilung in einer einmaligen Kombination verschiedene ganzheitliche Heilansätze aus Homöopathie, Miasmatik, chinesischer Medizin, gezielter Ernährung, Konfliktlösung und Übungen zu einem ganzheitlichen Therapiekonzept.

Das Set umfasst folgende 12 Bände plus Register: Band 1: Blut, Band 2: Leber und Galle, Band 3: Verdauungsorgane, Band 4: Das Atemsystem, Band 5: Nieren und Blase, Band 6: Herz und Kreislauf, Band 7: Endokrine Drüsen, Band 8: Weibliche und männliche Sexualorgane, Band 9: Gehirn und Nervensystem, Band 10: Sinnesorgane, Band 11: Gliedmaßensystem, Band 12: Häute und Lymphsystem. Alle Bände sind auch einzeln erhältlich.



Helmuth Lehmann

KINDERHOMÖOPATHIE LEICHT GEMACHT FÜR ELTERN

Schnell zum richtigen Mittel bei über 80 häufigen Beschwerden

208 Seiten, geb., € 19,90

Der Titel des Buches spricht für sich: In KINDERHOMÖOPATHIE LEICHT GEMACHT FÜR ELTERN gibt Dr. med. Helmuth Lehmann Eltern die wichtigsten Informationen rund um die Beschwerden und Erkrankungen im Säuglings- und Kleinkindalter an die Hand. In seiner eigenen Praxis konnte der Allgemeinmediziner, der sich auf Homöopathie für Kinder spezialisiert hat, die notwendigen Erfahrungen sammeln, um die Kinder-

homöopathie maßgeblich weiterzuentwickeln.

Das Besondere an diesem Buch ist neben der differenzierten Beschreibung der verschiedenen homöopathischen Mittel und ihrer Schlüsselsymptome auch der Vergleich mit ähnlichen Mitteln zur Differenzialdiagnose. Besorgte Eltern finden unter der Berücksichtigung des Charakters ihres Kindes wirksame Heilmittel zur sanften Unterstützung.



Manfred von Ungern-Sternberg

VOM SINN DER KINDERKRANKHEITEN

Scharlach, Masern, Mumps, Röteln und Windpocken homöopathisch behandeln

296 Seiten, geb., € 29,-

Manfred von Ungern-Sternberg ist einer der erfahrensten homöopathischen Ärzte Deutschlands und hat im Laufe seiner Praxistätigkeit viele Fälle von Kinderkrankheiten betreut.

Nach seiner Beobachtung sind Kinderkrankheiten von enormer Wichtigkeit für die Entwicklung des Immunsystems und der kindlichen Persönlichkeit. Klar und überzeugend wägt er deren Vor- und Nachteile ab und diskutiert stichhaltig die Rolle von Impfungen.

Das Werk besticht durch die Erfahrung aus erster Hand dieses großen Homöopathen und inspiriert, diese wichtige Phase der kindlichen Entwicklung ganzheitlich zu betreuen.



Judyth Reichenberg-Ullman / Robert Ullman / Ian Luepker

HOMÖOPATHIE BEI AUTISMUS UND ASPERGER-SYNDROM

320 Seiten, geb., € 24,-

Das Autismus-Spektrum ist häufiger anzutreffen, als allgemein angenommen wird. Im Prinzip sollte man bei jedem verschlossenen Kind, das auffallend intelligent wirkt, aber kein normales Gefühl für soziale Umgangsformen hat und eine besondere Einzelbegabung besitzt, an diese Diagnose denken.

Das bekannte amerikanische Autorenpaar Reichenberg-Ullman und ihr Praxiskollege Luepker haben sich solchen Kindern besonders gewid-

met und zeigen, dass man diese Verhaltensstörungen erfolgreich homöopathisch behandeln kann. Zuerst wird gezeigt, wie man eine Verhaltensstörung aus dem Autismus-Spektrum erkennt. Dann wird die neue homöopathische Methode Rajan Sankarans beschrieben, die eine „vitale Empfindung“ als zentrale Störung hervorhebt und weltweit Beachtung findet. Damit ist das Buch nicht nur für Eltern wertvoll, sondern allen zu empfehlen, die eine Einführung in diese neue Methode suchen.



Robin Murphy

KLINISCHE MATERIA MEDICA & KLINISCHES REPERTORIUM IM PAKET

4.704 Seiten, geb. € 263.-

Paketpreis mit der 2. überarbeiteten Auflage der Klinische Materia Medica (€ 138.-) und der 3. überarbeiteten Auflage des Klinisches Repertorium der Homöopathie (€ 125.-)
Einzelpreis der 2 Titel zusammen 263.-

Die Klinische Materia Medica („Nature's Materia Medica“) ist die 3. Ausgabe der „Lotus Materia Medica“ von Murphy und ist in ihrem Umfang und gleichzeitiger Prägnanz unübertroffen. Über 1.400 homöopathische und phytotherapeutische Arzneimittel werden besprochen. Murphy kombiniert das

Wissen der Arzneimittelpfahrungen mit der historischen Anwendung, Folklore, Legenden, der klinisch-therapeutischen Anwendung sowie der Toxikologie. Die Symptome sind nach dem gleichen alphabetischen Schema wie im Repertorium geordnet. Damit ist das Buch die ideale Materia Medica in Kombination mit Murphys „Klinischem Repertorium“.

Das Klinische Repertorium von Murphy erfreut sich großer Beliebtheit. Ein Vorteil ist seine einfache alphabetische Struktur, die die Handhabung erleichtert und selbst Anfängern einen schnellen Zugang ermöglicht. Viele Homöopathen bestätigten, dass das Werk handlich und praktisch ist, und dass sie nur noch mit dem Murphy arbeiten, seit sie ihn kennengelernt haben. Vom Umfang steht es anderen großen Repertorien nicht nach (über 2.300 Arzneimittel).



Christiane Maute

HOMÖOPATHIE FÜR PFLANZEN - DER KLASSIKER IN DER 15. AUFLAGE

Der praktische Leitfaden für Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen
Mit Ergänzungen von Cornelia Maute
244 Seiten, geb., € 28.-

Mit dem Erscheinen von Homöopathie für Pflanzen ist eine grüne Revolution losgetreten worden. Das Buch wurde über 76.000 mal verkauft und in viele Sprachen übersetzt.

Es ist ein handlicher Ratgeber über die häufigsten Pflanzenerkrankungen, Schädlinge und Verletzungen und deren homöopathische Behandlung. Christiane Maute® ist eine der Vorreiterinnen, die seit vielen Jahren bei ihren Nutz- und Zierpflanzen Homöopathie einsetzt.

Ob bei Blattflecken-Krankheit der Rosen, Braunjähre der Tomaten, Feuerbrand an Obstbäumen, Blattläusen, Kräusel-Krankheit, Krebs, Mehltau, Monilia-Fruchtfäule, Schneckenbefall, Sternrußtau oder schwachem Wachstum - Frau Maute erläutert zu den häufigsten Erkrankungen die bewährten Mittel. Auch bei Folgen von Frost, Hagelschäden, Verletzungen, Schnittwunden nach Baum- und Strauchschnitt, Hitzeschäden und Umtopfen sind die Anweisungen klar und für Laien leicht umsetzbar.

Die meisten Erkrankungen sind mit Bildern dargestellt, damit man leicht die Erkrankung erkennen kann und zum richtigen Mittel findet. Dosierung und Anwendung wurden überarbeitet und mit einer handlichen Tabelle zum Herausnehmen sehr übersichtlich gestaltet. Ein kurze Arzneimittellehre rundet das Werk ab.



Farokh Master

Das Werk von Farokh Master erfreut sich seit seinem Erscheinen ungebrochener Beliebtheit und ist zu einem der großen Standardwerke der homöopathischen Behandlung von Kindern geworden.

Neben den „großen“ Kindermitteln enthält es auch „kleinere“, weniger bekannte Mittel, die sich in Farokh Masters Praxis bei Kindern besonders bewährt haben. So empfiehlt Farokh Master *Equisetum* als Hauptmittel bei nächtlichem Einnässen, *Alcoholus* bei ADHS, *Jaborandi* bei Mumpsepidemien, *Magnetis poli ambo* bei Phimose und *Sambucus* bei nächtlichem Asthma. Mit insgesamt über 180 Arzneimitteldarstellungen ist das Werk eines der umfassendsten Werke der Kinderheilkunde. Die große pädiatrische Erfahrung des Autors schlägt sich in der Darstellung der Mittel nieder, denn er beschreibt sie so, wie er sie selbst klinisch beobachtet hat.

Detailliert schildert Farokh Master auch die Stadien der kindlichen Entwicklung und gibt wichtige Hilfestellung bei der Behandlung von Neugeborenen und Säuglingen, wo oft nur wenige Symptome zu erheben sind.

Den abschließenden Teil bildet ein ausführliches klinisches Repertorium, das die Auffindung der Mittel erleichtert. Das Buch ist damit ein abgerundetes Werk und in seiner Art einzigartig.

„Das umfassendste homöopathische Werk der Kinderheilkunde, das ich kenne.“ *Misha Norland*

„Ein Meisterwerk der homöopathischen Literatur.“
Didier Grandgeorge

Folgende Mittel wurden in der 4. Auflage ergänzt:
Lac vaccinum defloratum. Folliculinum. Elaps coralli-