

Klinische Homöopathie in der Kinderheilkunde

Farokh Master



Narayana-Verlag

5. Auflage

ФАРОХ МАСТЕР

КЛИНИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ В ПЕДИАТРИИ

5-е ИЗДАНИЕ



Фарох Мастер
Клиническая гомеопатия
в педиатрии

Название оригинального английского издания:
Клинические наблюдения за детскими средствами
Третье расширенное издание 2006 г.
а также работа
Менее известные средства в педиатрии 2009 г.

1. Немецкое издание 2006 г.
2. расширенное издание 2007 г.
3. полностью переработанное и расширенное издание 2010 года
4. расширенное издание 2013 г.
5. Издание 2021 г.

ISBN 978-3-941706-34-7

© 2006, Издательство Нараяна
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, 79400 Кандерн
Телефон: +49 7626 9749700
Электронная почта: info@narayana-verlag.de
Домашняя страница: www.narayana-verlag.de

Изображение на обложке © istockphotos

Перевод Силке Бурцлафф и Хайди Барт
Под редакцией Ульриха Вельте

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена, скопирована, переведена или сохранена в какой-либо форме или каким-либо способом — механическим, электронным или фотографическим — без письменного разрешения издателя, за исключением кратких отрывков для рецензий на книги.

Если используются зарегистрированные товарные знаки, торговые наименования и общепринятые названия, применяются соответствующие положения о защите (даже если они не обозначены как таковые).

Рекомендации, представленные в этой книге, были составлены и проверены автором и издателем по мере их осведомленности. Однако никаких гарантий не дается. Ни автор, ни издатель не несут ответственности за любые недостатки или ущерб, возникшие в результате использования информации, представленной в этой книге.

В той мере, в какой это разрешено законом, издатель не несёт никакой ответственности за содержание внешних

ссылок. Операторы сайтов, на которые ведут ссылки, несут исключительную ответственность за содержание, правильность, точность, полноту, качество и/или удобство использования

информации, представленной на этих сайтах

Медицинские знания постоянно меняются в результате исследований и клинического опыта. Автор и переводчик данной работы приложили все усилия, чтобы представленная в ней терапевтическая информация (особенно в отношении показаний, дозировки и побочных эффектов) соответствовала текущему уровню знаний. Однако это не освобождает пользователя данной работы от обязанности самостоятельно проверять, используя

СОДЕРЖАНИЕ

- Предисловие редакторов к третьему изданию	8
- Предисловие Фароха Мастера ко второму изданию	9
- Благодарности	11

Часть I – ТЕОРИЯ

- Введение	14
- Расстройства поведения	15
- Искусство и наука гомеопатической педиатрии	20
- Отчет о случае	22
- Наблюдение за новорожденными, младенцами и детьми младшего возраста 24	
- Физическое обследование	31
- Как гомеопатический анамнез и физикальное обследование Отличие осмотра ребенка от осмотра взрослого?	45
- Маркеры и сигналы тревоги в развитии ребенка	46
- Подозрение на детский церебральный паралич	47
- Клинико-диагностическое обследование	47
- Вопросы для рассмотрения	47
- Как правильно обращаться с новорожденными	49

Часть II – ФАРМАКОЛОГИЯ

- Абельмош*	54	- Androctonus amurreuxi hebraeus*	90
- Абротанум	55	- Анисум звездчатый*	91
- Аденозин монофосфорикум*	58	- Anthemis nobilis*	92
- Aethusa cynapium	59	- Антимониум крудум	93
- Агарик мухомор	66	- Антимониум тартарикум	102
- Агатис южный*	75	- Антипирин*	114
- Аграфис поникающий*	77	- Apis mellifica	115
- Айлант железистый*	78	- Апиум пахучий*	123
- Алкоголюс*	79	- Аранья диадема*	124
- Алоэ сокотрина*	80	- Аранья иксобола	125
- Алюмен*	81	- Земляничное дерево Мензиса*	128
- Ambra grisea	82	- Argemone mexicana*	129
- Бромистый аммоний*	87	- Arsenicum album	130
- Амфисбена червеобразная*	88	- Полынь обыкновенная*	146
- Anantherum muricatum*	89	- Аса фетида*	147

* Ресурсы добавлены в 3-м издании

** Новые ресурсы, добавленные в 4-е издание

- Копытень европейский*	148	- Cina maritima	320
- Atrax robustus*	149	- Киновари*	328
- Атропинум сульфурикум*	150	- Кокковые кактусы*	329
- Aurum metallicum	151	- Coffea cruda	330
- Бациллина Бернетта	159	- Колибациллин*	335
- Бадяга*	164	- Копайва лекарственная*	336
- Баптизия красильная*	165	- Кораллий рубрум*	337
- Барий карбоникум	166	- Кроталус каскавелла*	338
- Барий муриатикум*	176	- Cuprum metallicum	339
- Барий фосфорикум	177	- Башмачок пушистый*	351
- Барий сернистый	179	- Дезоксирибонуклеиновая кислота*....	352
- Белладонна	184	- Дифтеринум*	353
- Bellis perennis*	195	- Дифтеротоксин*	354
- Бензойная кислота*	196	- Элапс кораллину*	355
- Висмут субнитрикум*	197	- Элатериум*	365
- Borax veneta	198	- Equisetum hyemale*	366
- Bovista lycoperdon*	206	- Эвкалипт шаровидный*	367
- Бром*	207	- Феррум уксусный*	368
- Bryonia alba	208	- Феррум металликум	369
- Bufo rana	218	- Filix mas*	376
- Уксусный кальций*	234	- Флавус*	377
- Кальций бромистый*	235	- Каменный цветок*	378
- Кальций карбоникум	236	- Фолликулину*	379
- Кальций каустикум*	247	- Гамбоджия*	384
- Кальций гипофосфорикум*	248	- Графит	385
- Кальций летний*	249	- Гекла лава*	390
- Кальций муриатикум	250	- Hedera helix*	391
- Кальций фосфорикум	252	- Heloderma suspectum*	392
- Кальций пикрикум*	260	- Гиппоман*	393
- Силикат кальция	261	- Hyoscyamus niger	394
- Капсикум	267	- Ictodes foetida*	405
- Карцинозин	272	- Игнатия Амара	406
- Кастореум канадский*	278	- Индиго красильная*	417
- Каустикум	279	- йодоформий*	418
- Хамомилла	289	- Джаборанди*	419
- Chenopodium anthelminticum*...	297	- Халапа*	420
- Cina лекарственный	298	- Jatropha curcas*	421
- Chironex fleckeri*	309	- Калий бромистый	422
- Хлоралум гидратум*	310	- Калиум карбоникум	427
- Хлорпромазин	311	- Хлорид калия*	438
- Хиорум*	313	- Калиум муриатикум	439
- Cicuta virosa	314	- Калиум фосфорикум	444

- Кетоглутаровая кислота*	449	- Фосфор	618
- Креозотум	450	- Сосна лесная*	628
- Лак канинум	457	- Передняя доля гипофиза*	629
- Lac caprinum*	464	- Платиновый металл	630
- Лак дельфинум	465	- Plumbum metallicum	635
- Lac felinum*	468	- Псоринум	644
- Lac humanum	469	- Pulsatilla pratensis	652
- Lac leoninum	473	- Ревень пальчатый	663
- Lac vaccinum defloratum**	476	- Рибонуклеиновая кислота*	667
- Lachesis muta	481	- Сахарный альбом*	668
- Лаэтикум ацидум*	492	- Сахар лекарственный	669
- Лавроцеразус*	493	- Бузина черная*	676
- Ликоподий	494	- Sanicula aqua	678
- Магний карбоникум	505	- Scutellaria lateriflora*	684
- Magnetis poli ambo*	514	- Сенна*	685
- Magnetis polus arcticus*	515	- Сепия лекарственная	686
- Magnetis polus australis*	516	- Silicea terra	695
- Маландринум*	517	- Squilla maritima*	707
- Манцинелла*	518	- Стафизагрия	709
- Медорринум	519	- Страмоний	718
- Меркурий цианатус*	532	- Сера	727
- Меркуриус дульцис*	533	- Sulphur iodatum	738
- Меркурий солюбилис	534	- Сифилин	744
- Миллефолиум*	545	- Tarentula hispanica	752
- Маск	546	- Teucrium marum verum*	763
- Mygale lasiodora	552	- Theridion curassavicum	765
- Наджа Трипудианс**	556	- Тиозинамина*	769
- Нафталин*	562	- Туя западная	770
- Натрий муриатикум	563	- Тиреоидин*	779
- Натрий кремний	572	- Туберкулинум авис*	780
- Натрий сернокислый	577	- Туберкулинум бычий	781
- Азотная кислота	583	- Туберкулинум марморек*	790
- Nux vomica	591	- Вакцина аттеню били*	791
- Oenanthе crocata*	600	- Чемерица альбом	792
- Олеандр*	601	- Винея малая*	799
- Oleum animale aethereum*	602	- Фиалка душистая*	800
- Oleum jecoris aselli*	603	- Фиалка трехцветная*	801
- Опиум	604	- Zincum metallicum	802
- Палладий металлический**	612		

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ

К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Высокий спрос и частая публикация новых изданий этой книги говорят сами за себя. Она стала бестселлером в области гомеопатической детской медицины. С момента выхода первой версии в 2006 году, постоянное переосмысление и расширение книги позволило создать исчерпывающий справочник. Фарох Дж. Мастер — один из самых опытных коллег в мире. Он понимает необходимость отделения важных, клинически значимых знаний от несущественной информации в обширной гомеопатической литературе. Это ясно видно в этой книге. Каждая запись о препарате тщательно составлена — назначение, основанное на этом каталоге симптомов, имеет высокую вероятность успеха.

Мы тем более рады, что в это 4-е издание вошли пять новых, специально отобранных средств:

- Elaps corallinus
- Фолликулинум
- Lac vaccinum defloratum
- Наджа трипудианцы
- Палладий металлический

Пусть они будут полезны читателям и практикам и принесут им множество успехов в исцелении.

Кандерн, октябрь 2013 г.

Редакторы

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ

К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Книга «Клиническая гомеопатия в педиатрии» пользуется неизменной популярностью с момента своей первой публикации в 2007 году. Это новое, значительно расширенное третье издание было полностью переработано и дополнено 108 новыми препаратами. В основном это «малые», менее известные препараты, доказавшие свою особую эффективность в практике Фароха Мастера с детьми. Иллюстрации препаратов зачастую краткие, но содержательные, с ценными ключевыми симптомами для этих часто упускаемых из виду препаратов. Книга также включает симптомы, имеющие непосредственное отношение к современным проблемам, а также дифференциальную диагностику других гомеопатических препаратов.

Мы находим такие средства, как *Agraphis nutans*, который доказал свою эффективность против носовых полипов, *Apium graveolens* от болей роста, *земляничное дерево Мензиса* для апатичных детей, *полынь обыкновенная* от эпилепсии, *бромид* от угревой сыпи, *хлоралум гидратум* при прорезывании зубов с ночными кошмарами, *плющ обыкновенный* при гидроцефалии, *Jatropha curcas* при холероподобной диарее, *Laeticum acidum* при ювенильном диабете, *Laurocerasus* при синюшной болезни сердца, *Squilla maritima* при сенной лихорадке и *Viola tricolor* от импетиго. Новые препараты отмечены звездочкой в содержании. Восемь существующих препаратов были расширены. Третье издание теперь содержит 187 препаратов, доказавших свою особую эффективность у детей.

Главный труд Фароха Мастера продолжает пленять своей неповторимой оригинальностью. Известный индийский врач по профессии обладает богатым клиническим опытом, который он воплощает в своих описаниях лекарств. Это приводит к ярким описаниям, которые имеют огромную ценность в повседневной практике.

Первая глава книги также пользуется популярностью и содержит ценные рекомендации по сбору анамнеза, включая сбор анамнеза матери и конкретные рекомендации по сбору анамнеза у новорожденных и младенцев. Благодаря тщательному наблюдению, характер плача, особенности грудного вскармливания, аппетит, жесты, игровое поведение, реакции на шумы, а также предпочтения в купании и сне могут быть использованы в качестве важных симптомов для определения лечебных мер. Также подробно описывается физикальное обследование ребенка.

Дети — наше будущее. Успешное гомеопатическое лечение детей часто позволяет предотвратить развитие хронических заболеваний на протяжении всей жизни. Мы надеемся, что это расширенное издание предоставит множество новых рекомендаций по этому перспективному методу лечения детей.

ПРЕДИСЛОВИЕ ФАРОХА МАСТЕРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Меня очень порадовал огромный отклик на первое издание, который я получил как от практикующих гомеопатов, так и от студентов-гомеопатов в Индии и по всему миру, которые сочли книгу чрезвычайно полезной. Эти отзывы вдохновили меня на публикацию нового, полностью переработанного второго издания моей книги «Клиническая гомеопатия в педиатрии».

Особенно при общении с молодыми гомеопатами я всегда подчеркиваю важную роль тщательного изучения случая и детального систематического обследования, что особенно актуально для детей.

На своих лекциях и семинарах я стараюсь научить этому «искусству наблюдения», потому что тщательное наблюдение часто дает решающую информацию, которая приводит к успешному назначению лечения.

«Симптомы» в этой книге, в отличие от любой традиционной *Materia medica*, не получены в результате испытаний, а основаны исключительно на моём опыте, моих собственных клинических наблюдениях (или подтверждениях), собранных мной за 23 года практической работы в больницах и моей собственной загруженной клинике (где под моим руководством работают и обучаются несколько гомеопатов). Поэтому описанные препараты не обязательно охватывают всю *Materia medica* других учебников.

По сравнению с первым изданием, клинический осмотр и вводные главы были переработаны. В остальную часть текста я включил несколько новых личных наблюдений и полезных ссылок. Было добавлено несколько новых препаратов, благодаря чему общее количество препаратов во втором издании достигло 76.

Описание лекарств в этой книге представлено в совершенно новом формате. Каждое описание разделено на два раздела: А. Характерные признаки и В. Другие важные симптомы. Каждый из этих двух основных разделов - дополнительно подразделяется на психические и физические симптомы, каждый из которых сопровождается кратким пояснением.

Характерные черты:

Я намеренно поместил психические симптомы в начало характерных черт, поскольку ребенка легко узнать по его или ее особым психическим и физическим симптомам.

- Симптомы в этом разделе взяты из психологического анализа детей и получены с помощью клинической психологии.

- В главу также включены симптомы, взятые из случаев моих пациентов-детей; к ним относятся структура семьи, успеваемость в школе, психическое состояние матери во время беременности, родов и кормления грудью, а также психическое состояние ребенка и т. д.
- Он также включает симптомы, которые неоднократно подтверждались в моей практике за последние 23 года. Примерно четверть из них — это психические и физические симптомы, основанные на моих личных наблюдениях.

Другие важные симптомы:

Эти симптомы я обычно использую только после подтверждения характерных признаков. Этот раздел содержит обширную клиническую и патологическую информацию, такую как результаты физикального осмотра, рентгенографии, КТ и МРТ, рутинных анализов мочи и кала, общего анализа крови, анализа слюны, посевов крови и т. д. Они описаны по схеме «с головы до ног». Ключевые симптомы («ключевые симптомы») выделены **жирным шрифтом**. Это симптомы, которые помогают идентифицировать данное лекарство, исключая другие. Они подобны ключу, который может открыть только один конкретный замок и никакой другой. Я настоятельно рекомендую студентам и практикующим врачам обращать внимание на эти яркие симптомы у ребенка.

Симптомы, напечатанные обычным шрифтом, не являются ключевыми симптомами, но тем не менее являются важными симптомами препарата, которые могут дополнительно подтвердить ключевые симптомы и, таким образом, сделать выбор препарата гораздо более надежным.

По возможности я перечислил в скобках () другие препараты, где можно сделать то же самое наблюдение. В некоторых местах я представил более подробную дифференциацию от других важных рассматриваемых препаратов в табличной форме.

Эту книгу не следует считать исчерпывающей. Как и любая клиническая *Materia medica*, она всегда открыта для дополнений, основанных на серьезных, честных и подробных наблюдениях. Я открыт для любых комментариев и предложений по содержанию этой книги, которые помогут мне в дальнейшем дополнять будущие издания. Лучший способ использовать эту книгу — взять её с собой к постели больного и попытаться найти соответствия перечисленным симптомам. Поэтому сравните клинические данные пациента, патологические отклонения, лабораторные данные и т. д. с клиническими наблюдениями в этой книге. Гомеопат также может задать пациенту вопросы из этой книги, чтобы подтвердить возможное назначение препарата.

Я уверен, что второе издание также побудит студентов-гомеопатов и врачей проводить точные (объективные) клинические наблюдения за своими пациентами-детьми, не жертвуя при этом человеческой близостью.

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

работать с Пинки Билиморией, которая самоотверженно и добросовестно помогала мне в подготовке этого второго издания. Я также хотел бы выразить особую благодарность Джаешу Дхингреджа и Гиришу Сони, которые работали допоздна, напрягая шеи и глазные мышцы, исключительно из любви к гомеопатии и ко мне. Я хотел бы поблагодарить Роксанну Мирзу за то, что она с такой готовностью согласилась на мою просьбу вычитать рукописи. Я благодарю Рене Оттера за всё, что он сделал для меня, и за его помощь в редактировании и публикации этой работы. Я благодарю г-жу Суниту Шах за её помощь в исследовании системы «Radar» и «Encyclopedia Homeopathica». Питер Райт взял на себя ответственность за вычитку рукописи своим орлиным глазом.

Я особенно благодарен моей жене Дильнаваз, моим дорогим дочерям Махазивер и Рукшин и моей сестре Абан.

Во всем мире есть люди и друзья, которым я так или иначе благодарен. Друзья, которые приглашали меня к себе домой или в клиники, друзья, которые учились у меня, друзья, с которыми я вел плодотворные гомеопатические беседы или которые поделились со мной своим гомеопатическим опытом. Я не могу поблагодарить их всех лично, но могу кратко упомянуть их имена здесь:

Аджай Джайн, Альфонс Геукенс, Ализе Тиммерман, Амит Панчал, Андре Сейн, Энн Верварке, Антуанетта ван Хис, Аса Хершофф, Бенайфер Ададжания, Бинал Шах, Бритта Гаджонс, Карло Реццани, Камилла Хольмстрем, Сис Баас, Хаим Розенталь, Чемла Шанталь, Кристиан Озанон, Корин Терстегге, Дэйл Эмерсон, Дени Лафорг, Дидье Гранджорж, Эдвард Миллс, Элизабет Вайс, Эрик ван Воен-сел, Эрвин Доевр, Фархад Адаяния, Фарзана Мебельвала, Фредерик Шройенс, Гай Кокеленберг, Харша Сидху, Хорват Каталлин, Джавахар Шах, Жан-Франсуа Вермейр, Жан-Пьер Янсен, Джено Эберт, Ким Элиа, Калдип Джайн, Манфред Брэйг, Манси Гор, Матиас Медер, Марина Афанасьева, Морис Грегуар, Михаил Костадинов, Мики Элиа, Мира Дорчи, Нандкишор Сонаване, Патриция Ле Ру, Питер Винт, Фил Эдмондс, Филипп Вуа, Пуджа Багри, Прия Джани, Роб Виллемс, Рейнхард Роуз, Стивен Уотерс, Саба Хан, Саудамини Сурьяванши, Сигрид Крузе, Санни Сидху, Таруна Таккар, Варша Вора и все остальные друзья, которых я, возможно, забыл в этом списке.

преданность

Бхагван Шри Сатья Саи Баба

За то, что научил меня религии человечества,
которую я смогу практиковать на протяжении всей своей жизни.

Фарох Дж. Мастер

ЧАСТЬ I

ТЕОРИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Развитие человека раскрывает множество уникальных и важных деталей. На ребёнка влияют как «природа» (унаследованные биологические характеристики), так и «воспитание» (влияние окружающей среды).

Психология развития изучает изменения в теле, поведении, восприятии и личности, происходящие с момента зачатия, в течение детства и далее. Она учит нас, что существует базовая структура определённых **базовых эмоций**, которые дети выражают с раннего возраста. Первое проявление таких эмоций у ребёнка связано с физическими или биологическими потребностями или целями, такими как физическая защита или выживание. По мере взросления дети также начинают выражать более сложные эмоции, такие как грусть, гнев, страх и т. д.

Эти эмоциональные реакции часто временны, но если они достаточно сильны или сохраняются достаточно долго, они могут закрепиться в эмоциональном **«состоянии»** и стать **«настроением»**. Это «состояние» затем постепенно влияет на то, как ребёнок воспринимает мир и взаимодействует с ним. Когда эти эмоции становятся доминирующей характеристикой личности ребёнка, они часто становятся основным источником симптомов, указывающих на гомеопатическое подобие.

Очень важно, чтобы врач-гомеопат хорошо разбирался в эмоциональных особенностях, общих для всех детей (благодаря знаниям в области психологии развития), чтобы отличать «нормальные» симптомы от «необычных». Только тогда он сможет выявить характерные симптомы, определяющие индивидуальность пациента, и назначить успешное лечение.

Здоровое интеллектуальное развитие ребёнка проявляется в повседневном поведении, в соответствующем возрасту развитии и в общем удовлетворении. Интеллектуальное удовлетворение отражается в том, как ребёнок справляется со своими чувствами, мыслями и желаниями, которые, в свою очередь, возникают из физического, психологического и социального опыта, приобретаемого ребёнком на протяжении всей его жизни. Изучая психологию развития и сравнивая поведение многих детей, становится легче определить, что является нормой, а что – отклонением.

Ребенок (маленький) в силу своей естественной зависимости и незрелости не способен запомнить и передать факты и переживания, которые часто необходимы для оценки. Поэтому задача врача — использовать собственные наблюдения и наблюдения других людей, а также оценить и проанализировать описание поведения и анамнеза, предоставленное родителями.

РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ

Следующий список аномального поведения можно наблюдать на упомянутых стадиях развития.

НОВОРОЖДЕННЫЕ (0-1 МЕСЯЦ)

- «Синдром трудного ребенка»: характеризуется нарушениями сна, питания и выделительной функции, которые могут быть ранним признаком будущих патологических состояний.
- К другим проявлениям поведения относятся: трудности с успокоением ребенка, сопротивление грудному вскармливанию, защитные реакции на боль, громкие звуки и яркий свет, а также слабый мышечный тонус.
- Особенности личности ребенка можно определить по его темпераменту.

МЛАДЕНЦЫ (1-12 МЕСЯЦЕВ)

• ДЕТСКИЙ АУТИЗМ

- Агрессия без причины (неспровоцированная).
- Задержка роста, амбидекстрия (владение обеими руками, ни одна из сторон не доминирует).
- Никаких улыбок в ответ на лица или голоса людей; никаких признаков связи.
- Эхолалия. Ребёнок лепечет бессмысленные повторения обращённых к нему слов, вместо того чтобы реагировать на тон голоса говорящего и его высказывание.
- Не способен на хороший зрительный контакт.
- Нарушения сна, постоянное недержание мочи и/или загрязнение кала.
- Температура не повышается при инфекционных заболеваниях. Жалоб на боль, ни словесных, ни жестовых, нет. Дискомфорта во время болезни нет. Поведение ребёнка может даже улучшиться во время болезни.
- Причинять себе вред.

РАННЕЕ ДЕТСТВО

- Синдром дефицита внимания и гиперактивности (**СДВГ**)

У маленьких детей

- Ранним признаком может быть повышенная чувствительность к раздражителям, которая может привести к недифференцированным, отчетливым защитным реакциям.
- Малыши обычно начинают самостоятельно вылезать из кроватки в очень раннем возрасте, и родителям нелегко их остановить.

У детей

- Отвечает за других и разговорчив.
- Невозможно сосредоточиться более чем на одном стимуле и на каком-либо одном стимуле дольше десяти секунд.
- Непрерывная деятельность, которую невозможно остановить при необходимости.
- Нарушение различения правого и левого, определения времени суток, зрительного и слухового восприятия, координации рук и глаз.
- Взрывная раздражительность по пустякам, эмоциональная неустойчивость, смех, перемежающийся с плачем. Непредсказуемое поведение.
- Повышенная кислотность желудка.
- Поспешный; часто пропускает слова при письме. Работа выполняется неряшливо и небрежно.
- Импульсивный, неспособный откладывать приятные вещи, склонный к несчастным случаям.
- Навязчивая озабоченность водой и вращающимися предметами.
- Беспокойный, быстрый рост.
- Короткая концентрация внимания, легко отвлекается.
- Очень переменчивое настроение.

- **ДЕТСКИЕ НЕВРОЗЫ**
- Страх собственной смерти или смерти других людей из-за ложных представлений о смерти.
- Настаивает на мытье рук после прикосновения к чему-либо, что он считает грязным, опасаясь, что грязь может навредить ему.
- Фобии: Страхи настолько иррациональны, настойчивы или сильны, что они существенно нарушают нормальное функционирование, например, страх животных, людей, грома и т. д.
- Тревога разлуки: ребёнок цепляется за родителей, когда они ожидают разлуки, боится потеряться или остаться один и чувствует себя бездомным . Это сопровождается соперничеством со сверстниками, братьями и сёстрами и нарушением социального поведения.

- **ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ**
- Дети, находящиеся в состоянии стресса, могут сопротивляться осмотру, отталкивать руку врача, пинать его или косвенно проявлять свою защиту, направляя агрессию на других, например, на игрушки, других детей и т. д.

- **РЕАКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ПРИВЯЗАННОСТИ У МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА**
- Сниженный интерес к окружающей среде и отсутствие игрового инстинкта.
- Отсутствие нормальной фиксации взгляда на глазах и лице, отсутствие типичной ответной мимики, дефицит внимания.
- Потеря веса, слабый тонус, отсутствие подвижности, слабые хватательные и пищевые рефлексы, слабый голос, повышенная сонливость.

- **«РВОТА У ДЕТЕЙ»**
- Раздражительность и голод чередуются с эпизодами отрывания пищи.
- Повторная рвота непереваренной пищей с потерей веса, чередующаяся с эпизодами нормальной функции без тошноты или других желудочно-кишечных расстройств.
- Удовлетворение через отрывание.

- ПРОБЛЕМЫ С ЯЗЫКОМ
- Эпизодическая немота: это может быть реакцией ребенка на проблемные - ситуации.
- Заикание и запинание.
- ИСТЕРИКИ

Дети в возрасте 2–3 лет ещё не научились контролировать свои чувства гнева или фрустрации. Они ещё не умеют эффективно сообщать о своих потребностях. Вспышки гнева могут случаться у них и тогда, когда они чувствуют усталость, скуку или просто дискомфорт. Это может быть просто способом привлечь внимание. В крайних случаях гнев может привести к спазмам с одышкой.

ПОЗДНЕЕ ДЕТСТВО

- ДЕТСКИЕ ПСИХОЗЫ
 - Ненормальная фиксация на определенных игрушках, предметах или людях, мономания .
 - Нетипичные и непредсказуемые реакции на чувственные впечатления.
 - Искорженное или странное двигательное поведение: продолжительное раскачивание вперед и назад в положении сидя на полу или повторяющиеся крыловидные движения руками.
 - Нарушения речи: иногда тишина, затем причудливые или бессмысленные фразы, эхолоалиа и т. д.
 - Увлечён определёнными движениями, например, веером, вращающимися - предметами и т. д.
 - Трудности социализации: замкнутость, отворачивание и избегание зрительного контакта.
 - В раннем детстве заметно, что у детей отсутствуют жесты ожидания, такие как поднятие рук, чтобы их взяли на руки, следование за родителями по дому или бег навстречу им, когда они возвращаются домой. Они не обращаются к родителям за утешением, когда им больно или они расстроены. Они не целуются, не обнимаются и не отвечают им взаимностью.
 - Неправильное обращение с опасностью: подвергает себя опасности или проявляет опасный интерес.
 - Умственная отсталость при нормальных или даже выше средних способностях в некоторых областях.
 - Устойчивость к изменениям окружающей среды.
 - По-видимому, не осознавая своей личности и имея ложные представления о собственном теле. Они исследуют и изучают своё тело или хотят причинить себе вред.
- МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ ЭПИЗОДЫ В ДЕТСТВЕ
 - Нетипичные и непредсказуемые реакции на чувственные впечатления.
 - Дети смотрят в будущее с безнадежностью, становятся вялыми и пассивными, у них развиваются нарушения питания и сна, они имеют низкую самооценку и склонны к самоупрекам.
 - Искорженное или странное двигательное поведение: сидение на полу и раскачивание вперед и назад в течение длительного периода времени или повторяющиеся движения руками, напоминающие крылья.

- Фиксация на определенных игрушках, предметах или людях, мономания.
- Во время депрессии наблюдается тяжелое, в целом несчастливое настроение .
- Неправильное отношение к опасности, чрезмерный или недостаточный страх.
- Умственная отсталость при нормальных или даже выше средних способностях в некоторых областях.
- Мания (с теми же симптомами, что и в разделе выше, посвященном детской психике).
- Постоянно приподнятое, радостное, импульсивное или раздражительное настроение.
- Устойчивость к изменениям окружающей среды.
- Не осознавая своей личности и имея ложные представления о своём теле, они исследуют и изучают своё тело или пытаются причинить себе вред, например, ударяясь головой о предметы.
- РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ
- Агрессивное поведение с гиперактивностью.
- Обвиняет или запугивает других; ведет себя жестоко, вызывая гнев, враждебно и оскорбительно.
- При неагрессивной форме пациент чувствует себя слабым, брошенным, оскорбленным , никчемным, беспомощным и безнадежным.
- Отсутствие заботы о других; бесчувственность.
- Неприспособленность, антисоциальное поведение; хвастливость; нарциссическое отношение.
- Постоянное ночное недержание мочи.
- Постоянная ложь, непослушание, частые прогулы, воровство, вандализм или демонстрация сексуального характера, даже в общественных местах.

Расстройства поведения могут протекать по двум схемам:

- Застенчивый и робкий; лживый; склонный к манипуляциям; эмоционально незрелый, ведет себя по-детски; например, нытье, требовательность, вспышки гнева, подозрительность.
- Эгоистичное, эксплуататорское, манипулятивное, искусственное поведение.

• ДИСЛЕКСИЯ/ДИСЛЕКСИЯ

- Трудности с чтением. Часто также наблюдаются нарушения обучения, языка, математики и артикуляции .

• НЕПОКОРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

- Часто наблюдаемые сопутствующие симптомы: ночное недержание мочи, недержание мочи, временная потеря речи , побеги из дома, пропуски школы, проблемы с питанием и сном.
- В крайних случаях ребёнок становится склонным к спорам, бунтарству, агрессивным и даже склонным к преступлениям. Это приводит к потере друзей и формированию неудовлетворительных отношений. В конечном итоге школьная успеваемость снижается, а социальное поведение ребёнка становится всё более затруднительным.
- Упрямство, промедление, непослушание, беспечность, негативизм, откладывание дел в долгий ящик, провокация, сопротивление переменам, избегание правил.
- Постоянное неповиновение и неподчинение всем властям.
- Это расстройство развивается в тот период, когда ребёнок стремится выразить свою растущую автономию. Оно проявляется в неповиновении родителям, чрезмерной агрессии в ситуациях, когда он воспринимается как опасность, и в поиске роли среди сверстников.

- ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

- Астма.
- Конверсионный невроз.
- Расстройства пищевого поведения.
- Патологические пищевые пристрастия: могут быть вызваны нарушенными отношениями с матерью, в результате которых оральные потребности ребенка не удовлетворяются.
- Язвенный колит.

- ЗАДЕРЖКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РОСТА

- Аутистимулирующее поведение, такое как раскачивание, бодание головой, мочеиспускание, ковыряние кожи и т. д.
- Уменьшение роста в длину при увеличении веса.
- Испуганное выражение лица.
- Гипокинезия, вялость, апатия и снижение активности.
- Отсутствие реакции или сниженная реакция на раздражители.
- недоедание.
- Выступающий живот, зловонный стул, маразм, слабый мышечный тонус, кожа холодная, бледная и пятнистая.
- Грустное, несчастное, безрадостное и жалкое выражение.

- ШКОЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ

- Ребенок впадает в панику и испытывает физические реакции, такие как рвота, при мысли о необходимости идти в школу. У детей младшего возраста это может быть связано с тревогой разлуки. У детей старшего возраста это может быть связано с проблемами дома, плохой успеваемостью, проблемами в отношениях с одноклассниками или страхом перед начальством.

ИСКУССТВО И НАУКА

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ

ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА-ГОМЕОПАТА

Доктор Мехарбан Сингх, один из ведущих педиатров Индии, прекрасно описывает качества врача-гомеопата в своей книге «Клинические вопросы педиатрии». Это вдохновило меня записать следующие моменты.

Определенные качества и характеристики необходимы врачу-гомеопату при лечении ребенка:

- Хотя гомеопатия — это терапевтическая медицинская система и практикуется профессионально, её следует практиковать как служение Божественному. Бог встречается с нами в каждом ребёнке и в каждом родителе, который его сопровождает. Жизнь безмерно драгоценна, и жизнь ребёнка не следует оценивать по материальным меркам.
- Врач должен обладать научным складом ума и использовать логически выстроенную технику постановки вопросов, но он не должен становиться рабом этой техники ради неё самой. Он должен всегда оставаться учеником, непрестанно стремясь постичь истину и отбросить ложные идеи, тем самым превращая свои знания в мудрость.
- Он должен быть очень внимательным наблюдателем, подмечая каждую деталь в поведении и отношении ребёнка и родителей. Его наблюдения должны основываться на здравых принципах, а не на гипотезах и теориях.
- Он должен уметь вселять в родителей уверенность в своей компетентности, поскольку большинство из них отягощены мифами и заблуждениями о возможностях гомеопатии при различных детских заболеваниях. Слишком много гомеопатов из-за недостатка опыта и знаний оставили родителей с травмирующим опытом, доверив их судьбу ему.
- Он должен излучать доверие, терпение и вежливость.
- Он должен подходить по-человечески.
- Он должен обладать приятным характером и любящим взглядом, чтобы ребенок чувствовал себя с ним комфортно и не испытывал страха.
- Он должен испытывать искреннюю любовь к детям.
- Им не следует быть догматичными и осознать ограничения гомеопатии и своих собственных знаний. Они должны без колебаний направлять пациентов к более опытному гомеопату или педиатру.
- Его главным мотивом всегда должно быть благополучие ребенка, превыше всех других соображений, таких как собственное эго и финансовая выгода.
- В детской клинике или амбулаторном учреждении гомеопат должен поддерживать хорошие отношения с коллегами. Его долг — демонстрировать надлежащее поведение у постели больного и подавать пример своим ученикам.

КАЧЕСТВА ВРАЧА-ГОМЕОПАТА

Хороший врач-гомеопат, приступающий к обследованию пациента, должен обладать следующими качествами:

- Ловкость и скорость кролика (быстрые решения и мгновенные реакции).
- Выносливость черепахи (не меняйте лекарства слишком часто, если на то нет веской причины).
- Память слона (знание фармакологии и реперториума).
- Острые чувства тигра (наблюдайте внимательно).

За последние десятилетия в гомеопатической науке произошла колоссальная революция, в результате которой *Materia Medica* пополнилась многими **новыми препаратами**, а также были опубликованы многочисленные современные клинические наблюдения за распространенными и редкими препаратами.

Вместо того, чтобы изначально занимать позицию «за» или «против» использования чего-то нового, нам следует в полной мере использовать то, что доступно, и взвесить все «за» и «против». Кроме того, нам не следует быть чрезмерно амбициозными, так как это может привести к сокрытию информации или даже к ложным заявлениям.

Знания гомеопата в первую очередь основаны на:

- Его академическое образование.
- Его клинический опыт.
- Его интуиция.

Знания о болезни поступают из:

- Отчет пациента.
- Медицинский осмотр.
- Дополнительные исследования (лабораторные данные, процедуры визуализации и т. д.).

Объединяя опыт гомеопатии, общей медицины и клинических исследований, становится возможным систематический анализ. Это приводит к постановке диагноза и, в конечном итоге, к различным вариантам лечения, таким как:

- Назначение только гомеопатических средств.
- Применение только аллопатических средств.
- Аллопатические средства в сочетании с гомеопатическими средствами.
- Хирургическое вмешательство (как самостоятельная мера или в сочетании с другими видами лечения).
- Гомеопатия и психотерапия.
- (Молитвы о благодати Божией).

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА: ПРЕДЫСТОРИЯ

Анамнез должен состоять из двух частей: анамнеза матери и анамнеза ребенка.

ИСТОРИЯ МАТЕРИ

Большинство заболеваний, возникающих у ребенка в первые годы жизни, напрямую или косвенно связаны с физическим и эмоциональным состоянием матери во время зачатия, беременности и родов.

К ним относятся следующие вопросы:

- Личность матери.
- Причины, по которым она хотела забеременеть.
- Окружающая среда во время ее беременности и любые случаи получения плохих новостей или другие факторы, влияющие на ее душевное состояние (например, похищение, терроризм, война, беспорядки, религиозные войны и т. д.).
- Ваши чувства и душевное состояние (особенно сильные чувства, такие как грусть, шок, страх, разочарование, ненависть, пренебрежение и т. д.) во время беременности и родов.
- Любые физические травмы во время беременности.
- Медицинские проблемы, такие как дородовые или послеродовые осложнения.
- Попытки аборта.
- Социально-экономическое и культурное положение.
- Первые ощущения, когда она впервые услышала или увидела ребенка после рождения.
- Ощущения во время кормления грудью.

ИСТОРИЯ РЕБЕНКА

Большинство заболеваний, возникающих у ребёнка в первые годы жизни, напрямую или косвенно связаны с состоянием матери во время зачатия, беременности и родов. Следующие вопросы всегда полезны:

- Всегда выясняйте, является ли это местным или системным заболеванием.
- Всегда тщательно обследуйте органы и системы, пораженные патологическим процессом.
- Всегда следует попытаться выяснить, является ли заболевание острым, подострым или представляет собой острое проявление хронического заболевания.
- Начало, развитие и течение заболевания всегда следует подробно регистрировать.
- Этнические и генетические факторы имеют важное значение, поскольку экологические и социальные характеристики часто влияют на течение заболевания.
- Необходимо выявить психологические, социальные, географические и экологические факторы, влияющие на течение заболевания.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

- Хороший анамнез заболевания — это половина успеха на пути к выздоровлению.
- Ни одно замечание матери или отца, каким бы глупым, незначительным или незначительным оно ни казалось, не следует игнорировать, даже если оно не полностью соответствует вашему диагнозу или общей картине симптомов. Мой опыт подсказывает, что такие замечания почти всегда оказываются очень полезными для разрешения даже самых сложных случаев.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ, МЛАДЕНЦАМИ И ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Эти группы пациентов сложнее всего наблюдать, но за многие годы следующие наблюдения оказались для меня очень полезными, и поэтому я хотел бы поделиться ими с вами. Как только наблюдение зафиксировано, я стараюсь найти подходящую рубрику в реперториуме. Выбор правильной рубрики также является важнейшим шагом на пути к успеху в гомеопатической педиатрической практике.

Я часто использовал следующие наблюдения:

• **Чувствует ли себя новорожденный комфортно в утробе матери?**

Например:

- **Не чувствует себя комфортно на руках у матери:** Тудж.
- **Веселый и счастливый, когда лежит на коленях у матери:** Ant-t, Bism-sn, Cham, Gels, Kali-c, Lyc, Phos, Puls, Sanic.

• **Как плачет новорожденный?**

- **Крик голода, крик боли и крик о внимании** следует различать и выбирать соответствующие категории.
- Крик от **боли** — это громкий крик, за которым следует пауза, а затем еще один сильный крик.
- Плач, вызванный **голодом**, постепенно усиливается от тихих всхлипов до громких криков.
- Плач ребенка, требующий **внимания**, состоит только из тихих, плаксивых звуков.
- Обратите внимание, что при криках от боли всегда присутствуют слезы, тогда как при криках от голода слез обычно не видно.

• **Виды крика:**

- **Тихий, жалобный крик:** пульс.
- **Раздражённый крик:** Cale, Cham, Ipec., Sep и т. д.
- **Частые рыдания:** Cham, Cupr, Hell, Hyos, Ign, Lyc, Op, Stram и т. д.
- **Скулит и хнычет беспрестанно:** Bell, Borx, Bry, Cham, Cina, Cupr, Nux-v, Rheum, Stram.

• **Какая сторона груди предпочтительнее?**

- Разделы «Общие»; «Сторона» — *правосторонние* или *левосторонние жалобы* следует рассматривать соответственно.

• **Ребенок сосет медленно или энергично?**

- О **медленном сосании** см. Mind ; *Медлительность* — *Еда и питье* : Cale, Hell, Sulph.
- При **сильном всасывании** следует смотреть вверх под *настроением*; *торопиться - есть, во время и пить, во время* : Caust, Hep, Lyc, Zinc.

• Как часто заказывают еду?

Некоторым новорождённым достаточно короткого прикладывания к груди, и они сразу же насыщаются, в то время как другие сосут грудь долго, а затем, через несколько минут, отчаянно требуют снова. Другие же не хотят сосать, но им нужен сосок во рту для успокоения.

- **Ребенок снова чувствует голод сразу после кормления грудью:** Cale, Cic, Iod, Lyc, Mere, Phos, Psor, Sil.

- **Очень плохой аппетит:** Alum, Bar-c, Cina, Lac-def, Lac-h, Tub.

- **Насыщает уже после нескольких глотков:** Am-c, Cina, Lyc, Rheum, Sil.

• Засыпает ли ребенок во время кормления грудью или он радуется, плачет или беспокоен?

- *Сон; сонливость, перенапряжение - Еда после:* Cale, Carbo-veg, Lyc, Nux-v и т. Д.

- *Сон; сонливость - Пить после:* Nux-m, Ph-ac.

- *Спать; Засыпать - Ешьте, после:* Arum-t, Bov, Calc-p, Graph, Lyc.

- *Разум; Беспокойство - Еда:* Borx, Petr.

- *настроение; веселое - еда, после:* пульс.

- *Разум; плач - еда, после:* Iod, пульс.

- *Разум; Плач - Еда, при:* Белле, Стафилококке.

- *Желудок; икота - Еда, когда:* Lac-h, Mag-m, Mere, Samb.

• Потеет ли ребенок во время кормления грудью?

- *Пот; Еда, at:* Ant-t, Bar-c, Cale, Carbo-veg, Kali-c, Mere, Nat-m, Puls, Sep, Sil и т.Д.

• Ребенок отказывается сосать грудь?

- *Отвращение к грудному молоку:* Borx, Calc-sil, Cina, Mere, Sil и т. д.

• Выделяет ли ребенок газы, мочу или стул во время или после кормления грудью?

- *Прямая кишка; позывы к дефекации - во время еды, при:* Sanic.

- *Прямая кишка; Flatus - Еда после:* Aloe, Ant-c, Op.

• Какое влияние оказывает купание на новорожденного?

- Новорожденных обычно купают в теплой воде после рождения.

- Если ребенок **плачет, впадает в судороги или становится напряженным во время купания**, используйте Общую рубрику ; *Купание - горячее купание - агрегация:* Apis, Bell, Bry, Gels, Iod, Lach, Nat-m, Sulph и т. д.

- Некоторые дети **не любят купаться**, даже становясь старше. *Общее ; Купание - Отвращение к купанию:* Am-c, Ant-c, Bell, Borx, Cham, Psor, Puls, Sep, Sulph, Zinc.

- Некоторые дети **любят купаться и играть в воде:** *Happy - Купание, во время или с желанием играть с водой:* Calc-s, Lac-del, Lac-Leo, Tarent.

- Для детей, которые **боятся купания**, могут быть полезны Ант-С или Сульф.

- После купания новорождённых заворачивают в ткань, как египетскую мумию. Малыши, которые **дрожат, любят** такое **тепло и комфорт**, например, при заболеваниях типа Sil, Calc, Нер и Psor. **Вспыльчивые малыши** сначала растягиваются.

Медленно размотайте сначала одну руку, затем другую, и через несколько минут снова **размотайте** . К этой категории относятся медиум, йод и сульфид.

• **Как выглядят глаза?**

Глаза — зеркало разума. Осмотр глаз даёт гомеопату много информации.

- При **испуге** глаза становятся большими и смотрят в одну точку с расширенными зрачками. *Глаза; зрачки расширены:* Acon, Bell, Cale, Cupr, Gels, Hyos, Lac-c, Lyss, Op, Stram, Stry, Tarent.
- У **грустного ребёнка** глаза кажутся маленькими, тусклыми и непрозрачными, а зрачки сужены. См. *Глаза; Тусклые, мутные глаза:* Ant-t, Bapt, Bar-c, Mere, Nux-v, Sulph.
- Глаза **счастливого и возбуждённого** ребёнка большие и яркие. *Глаза; Блестящие:* Белл, Камф, Оп, Страм.

• **Какое выражение лица у новорожденного, когда его купают, одевают (особенно в свитер) или вынимают из кроватки?**

Все эти наблюдения важны и могут дать много информации, необходимой для выбора правильного средства. Дети с синдромом Страм и синдромом Кальция испытывают выраженный **страх перед водой на лице** и, следовательно, не позволяют себя купать или громко плачут и кричат, когда их купают или брызгают водой им в лицо.

- Новорожденным, которые сопротивляются одежде с высоким воротником, нужен смех.
- Ребенок Ворх **плачет** из-за страха движений вниз, когда его **кладут в кроватку или поднимают из нее** .
- Кейл и Лайк тоже плачут, когда их **поднимают из кроватки** , но в данном случае это происходит из-за их страха упасть.

• **Какую позу для сна вы видите?**

Наиболее распространенные позиции с соответствующими категориями:

- **Сон на животе:** Abrot, Bell, Cale, Calc-p, Lac-c, Lyc, Med, Nat-m, Phos, Puls, Stram, Sulph, Tub.
- Купр также лежит на животе, но имеет тенденцию **спазматически подтягивать таз вверх во время сна**.
- **Спит, свернувшись калачиком, как собака:** Ars, Bapt, Bry, Psor.
- **Спит по-лягушачьи или подтянув колени к груди (положение «коленно-грудная клетка»):** Calc-p, Care, Lyc, Med, Phos, Tub.
- **Часто меняет свое положение:** Ars, Lyc, Mosch, Phos, Sil, Tub.
- **Спит, поджав ноги:** Cham, Hell, Merc-c, Puls, Stram.
- **Раздвиньте ноги:** Плат, Чам.
- **Зарывает голову в подушку:** Апис, Белл, Ад, Верат.
- **Скрипит ли ребенок зубами, пускает слюни, потеет, плачет, кричит, смеется или дергает конечностями во время сна?**
- **Скрип зубов:** Ars, Bac, Bell, Bry, Cina, Hell, Hyos, Mere, Stram, Tub, Verat.

- **Обильное слюнотечение:** Lyc, Mere, Phos, Puls.
- **Обильное потоотделение:** Bell, Calc, Cham, Hyos, Plat, Puls, Rhus-t, Sil, Sulph, Thuja.
- **Всхлипывания или крики:** Bar-c, Cham, Иpec., Merc, Op.
- **Крики:** Apis, Calc-p, Puls, Rheum, Sulph, Tub.
- **Смех:** Белл, Хайос, Лайк, Сил, Страм, Сульф.
- **Непроизвольные подергивания конечностей:** Cupr, Kali-c, Sil, Zinc.
- **Судороги ночью во время сна:** Bufo.
- **Очень важно наблюдать за потоотделением новорожденного ребенка.**

Потоотделение в определенной части тела может дать нам важную информацию о лекарстве.

- **Пот на носу:** Bac, Bell, Cina, Hell, Nat-m, Rheum, Tub.
- **Пот на верхней губе:** Med, Rheum, Thuja. У Rheum также есть пот на **нижней губе.**
- **Потливость вокруг век и бровей, особенно во время сна:** Calc-p.
- **Потливость головы, особенно ночью:** Calc, Med, Mere, Sanie, Sil.
- **Потеет везде, кроме головы:** Bell, Rhus-t, Samb, Thuja.
- **Пот на животе:** Ambr, Anac, Arg-met, Cic, Phos, Thuja.
- **Потливость шеи:** Bell, Cham, Mang, Rhus-t, Samb, Sulph.
- **Также следует отметить изменение цвета щек.**
- **Синеватый оттенок:** Cham.
- **Бледные:** Anac, Ant-t, Bufo, Cale, Camph, Carbo-veg, Cina, Cupr, Graph, Med, Op, Puls, Rheum, Tub.
- **Локализованное покраснение щек:** Ant-t, Camph, Caps, Cina, Ferr, Iod, Lyc, Phos, Puls, Sulph, Tub.
- **Также обратите внимание на любые морщины и складки на лбу.**
- **Морщинистый лоб:** Bry, Cham, Caust, Graph, Hell, Lyc, Nux-v, Rheum и Stram.
- **Морщинистый лоб при жалобах на мозг:** Черт, Страм.
- **Обращайте внимание на любые непроизвольные движения.**
- **Непроизвольные, быстрые движения языка вперед и назад:** Cupr, Elaps, Lach, Lyc, Mere, Sanic.
- **Нистагм:** Агар, Кале, Купр, Гели, Нукс-Ви, Сульф.
- **Маятникообразное движение глаз:** Агар, Белл, Купр, Гели, Гиос, Страм.
- **Непроизвольное движение руки и ноги:** Апок, Кок, Ад.
- **Непроизвольные движения нижних конечностей:** Mere, Stram.
- **Непроизвольные движения любого рода, исчезающие во время сна:** Мигал, Агар.
- **Непроизвольные подергивания конечностей во время сна** — уже упоминалось ранее и может быть применено и здесь.
- **Какое выражение лица у ребенка?**
- **Заинтересованы:** Акон, Эт, Арс, Белл, Боркс, Кейл, Камф, Колок, Купр, Верат.
- **Умственно отсталые:** Агар, Буфо, Кейл, Чик, Лор, Стрэм.
- **Старый облик:** Abrot, Op, Sars, Sil.
- **Пустой взгляд:** Анак, Белл, Камф, Ад, Фак, Страм.
- **Страдание:** Ant-t, Ars, Kali-c, Lyss, Mang, Puls, Sil, Sulph.

- **Обратите внимание на цвет волос.**
- **Красный:** Calc-p, Ferr, Lach, Phos, Puls, Rhus-t, Sep.
- **Коричневый:** Ars, Carc, Iod.
- **Темные:** Lach, Lyc, Nat-m, Sep.
- **Обратите внимание на цвет, запах и консистенцию стула.**
- **Черные:** Apis, Merck, Op, Plb, Stram, Verat.
- **Цвета глины:** Cale, Card-m, Dig, Gels, Iod, Mere, Nat-s, Podo, Sil.
- **Зеленый:** Aeth, Agar, Borx, Cham, Cupr, Mere, Nat-m, Nat-s, Phos, Plb, Puls, Sanic, Sulph, Verat.
- **Запах тухлых яиц:** кейл, чам.
- **Галлиг:** Крот-х, Мере, Нат-с, Подо, Пульс и Верат.
- **Переменные:** Cham, Dulc, Puls, Sanic, Sulph.
- **Коагулированные:** Cale, Nit-ac, Rheum, Sanic.
- **Жирный или маслянистый:** йод, фос.
- **Пенистые:** Borx, Cale, Graph, Iod, Kali-bi, Merc, Op, Rheum, Sil, Sulph.
- **Сначала жесткие, потом мягкие:** Аэт, Бов, Кейл, Лик.
- **Маленькие, как шарики:** Alum, Calc-p, Mag-m, Med, Mere, Nat-m, Op, Plb, Sil, Sulph.
- **Оцените цвет и запах мочи.**
- **Черт:** Буфо.
- **Выделение гиалиновых цилиндров (микроскопия):** Borx.
- **Коричневатые:** Ars, Bry, Chel, Hell, Merc-c, Phos, Puls.
- **Зеленоватый:** Camph, Cina, Iod, Merc-c, Rheum.
- **Молочный:** arap, Apis, Calc, Cina, Lyc, Phos, Sep.
- **Интенсивный запах аммиака:** Cale, Iod, Mosch, Petr, Tub.
- **Кислый запах:** Cale, Graph, Merc, Sep.
- **Оставляет коричневый осадок:** Ambr, Apis, Lach.
- **Оставляет в подгузнике осадок, похожий на кофейную гущу:** Apis, Hell.
- **Какая часть тела ощущается горячей или холодной, когда у вас жар?**
- **Горячий живот при лихорадке:** Apis, Ars, Bry, Cham, Cic, Ferr, Graph, Ipec., Lyc, Sil.
- **Горячие уши с лихорадкой:** Alum, Calc, Merc, Puls.
- **Горячая голова и холодные конечности при лихорадке:** Arn, Bell, Bry, Ferr, Ipec., Stram.
- **Жар, особенно в горле, с лихорадкой:** Bar-c, Calc, Mere, Nux-v, Puls, Sulph.
- **Горячие подошвы ног с лихорадкой:** Cupr, Ferr, Graph, Sulph.
- **Холод, исходящий от ступней:** Bar-c, Rhus-t, Sulph.
- **Холодный нос с лихорадкой:** Bell, Nux-v, Verat.
- **Признаки реакции страха или тревоги.**
- Примерно в четыре месяца ребёнок уже понимает, кто принадлежит к семье, а кто нет. Когда у ребёнка развивается **страх перед незнакомцами**, можно вспомнить Ambr, Bar-c, Bufo, Cupr, Puls, Sil и Thuja.
- **Наблюдайте за реакцией ребенка на такие шумы, как работающая дрель, стиральная машина и т. д.**
- **Вздрагивает от малейшего шума:** Borx, Calc, Cic, Kali-c, Med, Mere, Nat-c, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Op, Phos, Sil.

- Пробуждается в испуге от малейшего шума: Nux-v.
- Чувствительность к резким звукам: Bar-c, Cale, Iod, Lyc.
- Чувствительны к звуку плещущейся воды: Бром, Лисс, Страм.
- Мы также наблюдали страх перед масками, воздушными шарами и мягкими игрушками.
- Сильный страх масок или отвратительных лиц: Bar-c, Bell, Cale, Phos.
- Страх увидеть блестящие или светящиеся предметы: Lyss, Stram.
- Отвращение к мягким и пушистым игрушкам или плюшевым мишкам: Calc, Carc, Med, Puls, Tub.
- Также обратите внимание на жесты ребенка во время бодрствования и сна.
- Большие пальцы свело судорогой: Aeth, Apis, Bufo, Cham, Cic, Cupr, Merc.
- Все время играет пальцами: Bell, Cale, Hyos, Tarent, Ther.
- Постоянно кладет пальцы или другие предметы в рот: Cale, Cham, Ipec., Lyc, Med, Mere, Sacch, Sil, Sulph, Tarent.
- Постоянно требует соску. Плачет и скулит, когда её отнимают: Хам, Мед.
- Закрывает лицо руками и смотрит сквозь пальцы: Бар-к.
- Во время сна цепляется за свою мать: Борх.
- Дергает других за волосы: Белл.
- Часто топает ногами: Чам, Чина, Оп, Страм.
- Дёргает ногами во сне: Белл, Игн.
- Постоянно играет с пуговицами на своей одежде: Мош.
- Как ведет себя ребенок по дороге из дома в ясли или детский сад?
- Тревога разлуки: Cale, Bar-c, Puls.
- Любит ходить в школу или детский сад: Кальк-п, Туб.
- Какие игры или игрушки предпочтительны?
- Много играет руками: Кейл.
- Трава: Элапс.
- Прятки: Белл, Страм, Тарентум.
- Военные игры: «Колокол», «Страм», «Туб».
- Копы и грабители или пистолеты: Агар, Белл, Купр, Таб.
- Марионетки: Aeth, Bar-c, Calc-p, Puls.
- Лего: Кейл, Лик, Фос, Сил.
- Видеоигры: Буфо, Кейл, Сил, Тарент, Таб.
- Скрэббл: Calc-p, Calc-sil, Lyc, Sil, Sulph.
- Есть ли какие-то особые предпочтения в одежде?
- Предпочтительны точечные образцы: Calc-p, Phos, Sep.
- Маленькие девочки хотят носить мальчишескую одежду: Nat-m, Plat, Staph.
- Дети, которые часто стоят перед зеркалом и проверяют, как они выглядят: Палл, Плат, Пульс, Страм, Верат.

- **Нравится ли ребенку играть с другими детьми?**
- **Предпочитает находиться в одиночестве и не любит компанию других детей:** Бар-к, Кейл, Чам, Чик, Нат-м.
- **Не любит играть, сидит в углу:** Bar-c, Rheum.
- **Любит компанию и легко вступает в контакт с другими:** Ars, Hyos, Lac-c, Lys, Phos, Puls, Stram.
- **Игривые и озорные:** Анац, Белл, Буфо, Чам, Сина, Купр, Лах, Мере, Страм, Тарент, Чань, Верат.
- **Известный своими злыми розыгрышами в адрес других детей и учителей:** Смех, Цинк.

ФИЗИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Медицинский осмотр позволяет оценить текущее состояние здоровья ребёнка. Точность осмотра зависит, прежде всего, от опыта, профессионализма и тщательности гомеопата. Во время осмотра гомеопат должен быть особенно дружелюбен и играть с ребёнком, чтобы завоевать его доверие и готовность к сотрудничеству. Он должен стремиться проявить к ребёнку искреннюю любовь, которую тот может почувствовать.

При этом врач должен придерживаться систематического подхода. Менее опытному врачу рекомендуется начинать осмотр с головы и последовательно переходить к ногам.

Первый шаг — определить, здоров ли ребёнок, болен ли он в лёгкой форме или серьёзно. Простые наблюдения, которые вы проведёте во время разговора с родителями, могут многое прояснить. Например, ребёнок, который удобно лежит на спине и у которого ясные глаза, может быть здоров. Ребёнок, который удобно лежит в постели, свернувшись калачиком, или спит, поджав ноги и держа большой палец во рту, может быть не серьёзно болен. Однако ребёнок, который беспокойно и раздражительно ведёт себя на руках, вялый, пронзительно плачет или стонет, дышит хрипло или не может лежать на спине, серьёзно болен.

ПОЗА

Поза может дать ценную информацию для диагностики.

- Раздражительность и одышка в положении лежа на спине могут быть признаками **застойной сердечной недостаточности**.
- Ребенок, **страдающий астмой**, часто сидит на краю кровати, свесив ноги, наклонив корпус вперед, сгорбив плечи и подперев их руками. У него бочкообразная грудная клетка, и он использует вспомогательную дыхательную мускулатуру.
- При **коликах в животе** ребенок становится беспокойным, ворочается от боли или прижимает руки к животу.
- Вытянутая шея, согнутые плечи и локти, повернутое внутрь предплечье при вытянутых ногах характеризуют **позу при децеребрации** (нарушении мозговых функций вследствие разобщения участков мозга).
- Декортикационная **поза** характеризуется согнутыми локтями и запястьями, поджатыми большими пальцами рук и прямыми ногами. У пациентов с травмами спинного мозга и врожденным дефицитом мышечного тонуса конечности свисают, словно цепи, и они лежат на спине, раскинув конечности, подобно анатомической лягушке с перерезанным спинным мозгом.

- Ребенок, который пытается лежать неподвижно с закрытыми глазами, может страдать от **головокружения**.

РЕАКТИВНОСТЬ

Также следует понаблюдать за реакцией ребенка.

- **Слепой** ребёнок особенно чувствителен к звукам и легко пугается внезапных шумов. Слепого ребёнка можно узнать по следующим признакам: пустой взгляд вдаль, лёгкое покачивание глазных яблок и необычные нервные звуки.
- С другой стороны, ребенок, который очень чувствителен к визуальным впечатлениям, вероятно, **глухой**.
- Ребенок, **страдающий аутизмом**, не смотрит в глаза.
- Ребенок, побывавший **в разных приемных семьях**, часто находится в состоянии сонливости, даже если он или она бодрствует.
- Младенцы с **синдромом сенсорной депривации** принимают позу, характеризующуюся «тонической ригидностью» рук, с согнутыми локтями, плечом, согнутым и повернутым наружу, и кистями, повернутыми вовнутрь.

ПИТАНИЕ

Общее состояние питания ребёнка можно определить ещё до начала систематического медицинского осмотра. Важно определить, есть ли у ребёнка избыточный вес, худоба, недоедание или обезвоживание.

ЗАПАХ

В начале осмотра обратите внимание на характерные запахи, которые могут помочь в диагностике. Например, запах ацетона при дыхании при **сахарном диабете**, фруктово-сладкий запах при **дифтерии** и – при отравлении – запах соответствующего токсина (например, керосина). Другие запахи, имеющие диагностическое значение, описаны в

Заболевания, сопровождающиеся характерным запахом изо рта, кожи или мочи ребенка	
БОЛЕЗНЬ	ЗАПАХ
Сахарный диабет	Ацетон
дифтерия	Сладкий и фруктовый
Болезнь кленового сиропа	Карамельный (кленовый)
Фенилкетонурия	Мускусный (запах мыши)
Болезнь Оастхауса (нарушение всасывания)	Сушеный солод (пивоварня)
Гиперметионинемия	Прогорклое масло

Таблица 1. Кроме того, опытные врачи могут почувствовать запах диареи, вызванной кишечной палочкой, в детской комнате, а также характерный запах синегнойной палочки в инфицированной ране.

КОРИДОР

Когда ребёнок приходит в клинику, его походка может быть красноречивой. Осмотр потёртостей на обуви даёт много подсказок для постановки диагноза.

- Обувь, которая носится спереди без износа на пятке, указывает на **укорочение ахиллова сухожилия (шагающая походка, как при церебральном параличе) или свисающую стопу** . При свисающей стопе на пальце ноги также появляются царапины от контакта с полом.
- Дети, страдающие **артритом** и болями в плюсневых суставах, переносят вес на внешнюю часть стопы, что приводит к большему износу внешней части обуви.
- Некоторые дети очень щепетильно относятся к своей обуви и меняют ее каждые два-три месяца, в то время как другие носят ее, по крайней мере, до тех пор, пока не вырастут до следующего размера.
- **Некоторые отклонения, которые можно обнаружить в положении стоя:**
- Избыточный боковой контакт стопы указывает на **пронационную слабость** малоберцовой кости.
- Выраженный лордоз указывает на **контрактуру сгибателя бедра** .
- **Х-образные колени.**
- Переразогнутое колено указывает на **перенапряжение четырехглавой мышцы** .
- Боковой наклон туловища в сторону опорной ноги указывает на **слабость средней ягодичной мышцы** с этой стороны. Причиной может быть заболевание тазобедренного сустава или мышц, например, дерматомиозит .
- Переразгибание туловища назад указывает на **паралич большой ягодичной мышцы** .
- Шлепающий контакт стопы с полом, при котором носок касается пола раньше пятки, указывает на слабость передней большеберцовой мышцы.
- **Некоторые отклонения, наблюдаемые при ходьбе:**
- Наклон туловища вперед указывает на **слабость четырехглавой мышцы бедра** .
- Подпрыгивания вверх и вниз с чрезмерным вертикальным движением бедра выше и ниже воображаемой линии, проходящей через пупок, указывают на **слабость сгибателя бедра или подколенного сухожилия** и отличаются от ходьбы на бедрах тем, что вертикальное движение происходит только выше линии пупка без подпрыгивания вниз, чтобы избежать касания пола.
- Циркумдукционная походка, наблюдаемая при **гемиплегии** , **возникает при слабости подколенных сухожилий или сгибателей.**
- Болтающееся положение стопы указывает на **слабость передней большеберцовой мышцы** ; причиной может быть изолированное заболевание периферических нервов или общая слабость мышц ног, как это происходит при полиомиелите или менингомиелоцеле.

- Походка с поднятием бедра (вертикальное поднятие бедра) указывает на **асимметричную длину ног** . Нога длиннее на стороне, с которой происходит походка, и короче на противоположной. Походка с поднятием бедра также встречается при спазме сгибателей бедра или слабости подколенных сухожилий.
- Неадекватный отталкивающий удар. В этом случае от земли отрывается вся стопа одновременно , а не сначала пятка, затем средняя часть стопы и, наконец, пальцы. Это происходит при **слабости икроножных мышц и синдроме боли в стопе** .
- Боковое отклонение стороны в фазе переноса указывает на **слабость средней ягодичной мышцы** на нагруженной стороне.

РОСТ ТЕЛА

Рост следует измерять в положении лёжа (длина) у младенцев и детей до трёх лет, а рост – стоя (рост) у детей старшего возраста. При измерении стоя очень важно следить за правильной осанкой и положением ребёнка: ноги вместе, спина прямая (затылок, спина и пятки касаются измерительной линейки), глаза смотрят прямо перед собой так, чтобы линия от слуховых проходов до дна глазниц проходила параллельно полу.

ЛИЦО И ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА

Выражение лица не только даёт ценную информацию об эмоциях ребёнка, но и служит диагностическим инструментом. Оно включает в себя движение различных лицевых мышц, раскрытие век, а также цвет и размер зрачков. Взволнованное, сердитое или радостное лицо говорит о многом.

- Синюшное лицо с петехиями и подкожными кровоизлияниями указывает на **обструкцию грудной клетки** , вызванную различными причинами, такими как смещение первого ребра, обвитие пуповины вокруг шеи, коклюш и т. д.
- **синдроме Стерджа-Вебера** наблюдается пламенеющий невус на одной стороне лица .
- **синдроме Горнера** наблюдается одностороннее уплощение лица с широкой глазной щелью, энофтальмом и птозом .
- Невыразительное, пустое, похожее на маску лицо — результат передозировки **седативных препаратов**.
- **дерматомиозите** наблюдается фиолетовое окрашивание век (напоминающее аметист) .
- При **системной красной волчанке на щеках** наблюдается сыпь в форме бабочки, которая характеризуется изменением цвета, сухостью, шелушением и закупоренными фолликулами, напоминающими угри, по обе стороны переносицы.
- Уже много лет известно, что проблемы в **области головы и шеи** проявляются в виде морщин в верхней части лица ребенка, тогда как морщины в нижней половине лица указывают на проблемы в **области груди или живота** .

- Спазм челюстных и мимических мышц при **столбняке** приводит к выражению лица со стиснутыми зубами, плотно сжатыми губами и подтягиванием периоральных мышц (сардоническая улыбка).
- У здоровых детей щёки розовые. Бледность щёк часто является признаком **тревожности, анемии или недостаточности аортального клапана**.
- Выпученные глаза при **гипертиреозе**, широко расставленные глаза с выступающим лбом при **болезни Крузона (дизостоз краниофациальный)**, свистящее лицо при **синдроме Фримена-Шелдона** и округлые щеки при **болезни Кушинга** — другие типичные примеры того, как внешний вид лица может помочь в постановке диагноза.

КОЖА

- **сыпи** в начале осмотра , чтобы при подозрении на инфекционное заболевание можно было быстро принять меры предосторожности, прежде чем заразятся другие дети в клинике или на практике.
- Также проверьте наличие **отёков** конечностей, особенно на передней - поверхности голеней и стоп. Двусторонний отёк указывает на генерализованное заболевание, такое как **сердечная недостаточность, заболевание почек или дефицит белка** .

РУКА

осмотреть кисть руки на предмет наличия клинических признаков.

- **Ногти в виде часового стекла** (выпуклые изогнутые ногти на пальцах с утолщенными концами) могут быть наследственными или являться следствием цирроза печени, обструктивной болезни легких и т. п.
- На кончиках пальцев появляется **цианоз** .
- **Бледность и желтуха** также становятся заметны в линиях на руках.

ДВА ПЛАНОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ: «БЕДРО» И «АОРТА»

На этом этапе общего обследования, особенно у младенцев, нельзя забывать о двух вещах: об осмотре тазобедренных суставов на **предмет вывиха** и о пальпации пульса на бедренных артериях для диагностики **сужения аорты** .

ПЛАКАТЬ

Многие диагностические подсказки можно получить, просто прислушиваясь к плачу. Раздраженный плач больных новорожденных можно легко распознать, немного попрактиковавшись.

- Нормальная раздражительность снижается, когда ребенка берут на руки и с ним взаимодействуют.

- Напротив, раздражительность и плач, связанные с **раздражением мозга**, не уменьшаются при прикосновении, а, наоборот, усиливаются. При **болях в костях и суставах** ребёнок плачет даже при прикосновении.
- **заболеваниях центральной нервной системы** крик пронзительный, визжащий и высокочастотный, при **нервно-мышечном параличе** — очень слабый, при **параличе голосовых связок** или после **трахеотомии** — **глухой**, при **синдроме** кошачьего крика — напоминает кошачий, при **ларинготрахеобронхите** и рецидивирующем параличе гортани — хриплый.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура от 36,6°C до 37,4°C считается нормальной. Температура от 37,5°C до 38°C считается субфебрильной. Лихорадка наблюдается при температуре выше 39,5°C, а гиперпирексия — при температуре выше 41°C.

Существует три классических варианта лихорадки:

- Персистирующая лихорадка (континуум), при которой суточные колебания температуры не превышают 1°C.
- Перемежающаяся лихорадка, при которой температура тела остается нормальной в течение нескольких часов в день.
- Ремиттирующая лихорадка, при которой наблюдаются суточные колебания температуры более 2°C, но температура тела никогда не достигает нормальных значений.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Для измерения артериального давления у новорожденного следует использовать манжету шириной 2,5 см. Исследователь может полагаться исключительно на измерение систолического давления методом притока воздуха. Этот метод заключается в легком нажатии на ладонь измеряемой конечности, а затем нагнетании воздуха в манжету, продолжая прижимать ладонь. Ладонь при этом побледнеет. Давление в манжете медленно снижают, ожидая начала притока воздуха в ладонь. В этот момент показания манометра будут находиться примерно между систолическим и диастолическим давлением.

Для правильного измерения давления у детей старшего возраста манжеты для измерения артериального давления выпускаются размерами 3, 5, 8, 12 и 18 см.

ДЫХАНИЕ

Подсчитайте количество дыханий в течение целой минуты после того, как ребёнок несколько минут помолчит или пока он спит. Также обратите внимание на ритм, глубину дыхания, неудобные позы, шумы и запах изо рта.

ГОЛОВА

- Обратите внимание на характерные аномальные формы, такие как:

Плоский затылок (как у здоровых новорожденных, когда они лежат только в одном положении, и у умственно отсталых детей, которые лежат исключительно на спине).

Выступающий лоб, как при рахите, синдроме Крузона (кранофациальный дисморфизм) и синдроме Гурлер.

Выступающий затылок.

- Также осмотрите **черепные швы**. У новорожденных они обычно перекрываются из-за давления во время изгнания. У детей старшего возраста линии швов (особенно венечный) иногда могут быть выражены. Линии швов должны быть пальпируемыми в возрасте 5-6 месяцев. Аномально широкие линии швов в возрасте 5-6 месяцев могут указывать на патологический процесс, например, гидроцефалию.
- Далее следует осмотреть **кости черепа на наличие углублений и дефектов**, которые могут быть аномальными (например, перелом) или нормальными (например, роднички).
- присутствуют шесть **родничков**, каждый из которых может быть прощупан, а может и нет. Два наиболее важных — большой и малый роднички. Большой родничок в 3 месяца имеет размер чуть меньше 3 x 3 см. Затем он уменьшается и закрывается; большинство родничков закрываются в возрасте от 9 до 18 месяцев. Малый родничок при рождении имеет небольшие размеры (примерно с кончик пальца) и закрывается к 2 месяцам.
- Следующий этап осмотра головы — пальпация **сосцевидных отростков за ушами**. Эти кости обычно развиваются только к 2–3 годам. Необходимо проверить припухлость, температуру и болезненность.

ЛОБ

Вертикальная высота лба увеличивается при гидроцефалии, болезни Крузона и синдроме Аперта. Лоб выступает вперёд при рахите, несовершенном остеогенезе и синдроме Гурлер.

БРОВИ

Выпадение бровей может быть частью общей потери волос, например, той, которая возникает при гипотиреозе.

СЛЕЗЫ

- Сухость глаз вследствие дефицита слезной жидкости наблюдается при синдроме Райли-Дея и синдроме Шегрена.
- Избыточное слезотечение возникает из-за местного раздражения глаз, аллергии и, конечно же, плача.

КОНЪЮНКТИВА

- Конъюнктив бледная при анемии.

- При бактериальном конъюнктивите наблюдается выраженная инъекция (покраснение) с гнойным отделяемым .

СКЛЕРЫ

- Голубые склеры можно наблюдать у многих здоровых людей, но также и при несовершенном остеогенезе и синдроме Элера-Данлоса.
- Черные пятна на склере могут быть вызваны либо невусами, либо слишком тонкой склерой, через которую просвечивает цвет сосудистой оболочки.
- Пожелтение склер указывает на желтуху.

УЧЕНИКИ

- Нормальный зрачок круглый и расположен в центре.
- «Узкий зрачок» придает ребенку острый, подозрительный вид, в то время как «широкие» зрачки делают детей приятными.
- Двусторонне суженные зрачки могут быть нормальными или указывать на миелинолез моста (как при рассеянном склерозе).

Нос

- Маленький или короткий нос может быть признаком какого-либо заболевания, например, синдрома Аперта.
- «Курносик» у новорожденных хорошо известен и может быть следствием адаптации к грудному вскармливанию.

УШИ

- Выделения из уха могут быть водянистыми (спинномозговая жидкость), гнойными (воспаление слухового прохода, инфекция среднего уха) или кровянистыми (наружный отит, средний отит, инородное тело, травма).
- Всегда проверяйте наличие посторонних предметов, таких как насекомые, детали игрушек и горох .

РОТ

- Цвет губ может указывать на анемию, цианоз или отравление угарным газом.
- Губы могут быть большими (расово обусловлено, синдром Гурлер, ангионевротический отек) или необычно сжатыми («свистящее лицо» при синдроме Фримена-Шелдона).

Язык

- Относительная сухость языка является отличным показателем степени обезвоживания, особенно у младенцев.
- Бледный язык наблюдается при анемии.

- Язык синий, с центральным цианозом.
- Язык, похожий на сырое мясо и покрытый грибовидными сосочками, называется «клубничным языком» (наблюдается на поздних стадиях лихорадочных заболеваний и при скарлатине).
- Важно помнить, что некоторые дети сосут язык вместо большого пальца. Это легко заметить по движениям дна полости рта и кончику языка, зажатому между передними зубами.

ДЕСНЫ

При гипертрофии десен, вызванной фенитоином, десны краснеют.

ЗУБЫ

- У ребёнка 20 молочных зубов. Они должны прорезаться к 24-му месяцу жизни. Так называемый шестилетний моляр — это первый постоянный зуб, появляющийся в течение шести лет.
- Полное отсутствие отдельных зубов часто связано с местными нарушениями, такими как расщелина неба или локальная склеродермия лица.
- Черные зубы появляются у детей, принимающих пероральные препараты железа ; желтоватый оттенок зубов появляется у детей, получавших в младенчестве тетрациклин.

СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ЩЕК

Искать:

- Красноватое возвышение вокруг отверстия протока Стенсена (ductus paroti - deus) при эпидемическом паротите.
- Пятна Коплика (мелкие голубовато-белые точки, окруженные красноватой - зоной в области коренных зубов) в продромальной фазе кори.
- Дрозд.

НЁБО

Нормальное нёбо равномерно изогнуто в целом, тогда как «готическая арка» (заострённое дугообразное нёбо) связана с различными синдромами врождённых пороков развития.

МИНДАЛЬ

Миндалины могут казаться увеличенными и срастающимися в центре. В этом случае следует определить, вызвано ли это истинным увеличением миндалин (рецидивирующим тонзиллитом) или тканью вокруг миндалин, которая смещает их к центру, как это может происходить при перитонзиллярном абсцессе

(«загар горла») – это именно тот случай. Иногда увеличенные миндалины могут быть ранним симптомом лимфосаркомы. Также осмотрите остальные отделы горла.

ШЕЯ

- Шея может быть укорочена из-за аномалий позвоночника или из-за синдрома Ульриха-Тернера (UTS) с крыловидным гребнем, низкой линией роста волос на затылке и инвертированной линией роста волос.
- При кривошее затылок наклонён в одну сторону, а подбородок — в противоположную. При длительном течении кривошеи происходит атрофия лицевых структур, что приводит к асимметрии лица.
- В случаях тяжелого атланта-аксиального подвывиха ребенок должен поддерживать подбородок рукой, пока сидит.

ГОРЛО

- Зернистые отеки вдоль задней стенки глотки обнаруживаются при хроническом фарингите и у лиц, страдающих аллергией, с воспаленными носовыми полипами.
- При хроническом тонзиллите и воспалении аденоидов у ребенка могут наблюдаться следующие признаки «аденоидного лица»: открытый рот, круги под глазами, характерный гнусавый голос, храп по ночам и невозможность произносить слова, оканчивающиеся на «нг» (например, «ринг»).

Грудь

- Вспомогательные дыхательные мышцы обычно неактивны. Однако при обструкции верхних дыхательных путей (круп, дифтерия) или нижних дыхательных путей (астма) они также задействованы.
- Боковые углубления по ходу диафрагмального прикрепления (борозда Харрисона) наблюдаются при рахите и хронических обструктивных заболеваниях легких.
- При обструкции верхних дыхательных путей происходит втяжение грудины, тогда как при обструкции нижних дыхательных путей более вероятно втяжение нижних межреберных промежутков.
- **Нормальное дыхание** подразделяется на везикулярное и бронхиальное. Везикулярное дыхание – это нормальное дыхание, выслушиваемое по всей грудной клетке, особенно в подмышечной впадине и между лопатками. Бронхиальное дыхание обычно выслушивается при аускультации стетоскопом над трахеей и средней линией верхней передней поверхности грудной клетки.
- Выступление одной стороны передней части грудной клетки указывает на аномалии ребер, сколиоз или проблемы с сердцем.
- Выпячивание грудины («куриная грудь») наблюдается при рахите и остеомаляции.

СЕРДЦЕ

Верхушечный толчок соответствует самой нижней и наиболее удаленной точке сердечного сокращения. Аускультацию следует проводить систематически, начиная с митрального отдела и затем перемещаясь по часовой стрелке или против часовой стрелки ко всем четырем основным отделам, соответствующим четырем сердечным клапанам. Шумы, выслушиваемые вплоть до сердца, являются органическими; функциональные шумы не распространяются так далеко от точки максимальной интенсивности. Интенсивность первого тона сердца увеличивается при лихорадке, гипертиреозе и митральном стенозе. -

Шумы в сердце	
Типичные причины, место и время	
ПРИЧИНА	Шум в сердце

Недостаточность аортального клапана	Аортальный клапан, диастолический
Дефект межпредсердной перегородки	Второе и третье межреберье слева, парастеральная линия
Митральная регургитация	Митральный клапан, систолический
Митральный стеноз	Митральный клапан, диастолический
Персистирующий артериальный проток	Назад и вперед под левой ключицей
Стеноз легочной артерии	Легочный клапан, систолический
Дефект межжелудочковой перегородки	Третье-пятое межреберье слева, парастеральное пространство, парастеральная линия

ЖИВОТ

- Твёрдый и напряжённый живот обычно указывает на воспаление в брюшной полости. Твёрдый, как доска, живот — признак перитонита. Разлитая твёрдость может указывать на заболевание грудной клетки или мышечные спазмы, например, при столбняке.
- Расширенные вены в эпигастрии могут указывать на обструкцию нижней полой вены, тогда как выбухание вен брюшной стенки вокруг пупка может быть признаком портальной гипертензии.
- Очень плоский живот наблюдается у обычно худых детей, в случаях недоедания, задержки развития и в случаях нервной анорексии.
- У новорожденных живот обычно округлый; плоский живот указывает на диафрагмальную грыжу.
- В норме брюшная стенка движется в ритме дыхания: она расширяется при вдохе и сокращается при выдохе.
- Пуповина обычно отпадает через 6–8 дней после рождения.

- Иногда после родов наблюдаются выделения из пупка. Обратите внимание, водянистые ли они, гнойные или серозно-кровянистые.
- Печень обычно расположена с правой стороны, ее размер варьируется в зависимости от возраста и телосложения ребенка.
- Селезёнка обычно расположена слева. Обычно она не пальпируется, если её размер не увеличен как минимум в три раза.
- Обычно при рождении наблюдается небольшой дефект брюшной стенки в области пупка, что приводит к незначительной грыже.

АНУС И ПРЯМАЯ КИШКА

- При некоторых врожденных пороках развития прямой кишки ее отверстие может располагаться слишком далеко впереди, вблизи половых органов.
- Также проверьте наличие остриц или сегментов ленточных червей около анального отверстия.
- Выделение мекония через влагалище или уретру указывает на ректоуретральный или ректовагинальный свищ.

ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

- У новорожденных девочек половые органы сильно пигментированы и отёчны, особенно после тазового предлежания; малые половые губы также увеличены сразу после рождения.
- В норме у каждого полностью развитого новорожденного мальчика должны быть хорошо развитые половой член и мошонка.
- Мошонка у новорождённых сильно пигментирована. Оба яичка расположены в мошонке глубиной около 1 см.

КОЖА

- Чрезмерная бледность конечности может быть вызвана артериальной непроходимостью.
- Чрезмерное покраснение всей кожи может наблюдаться при лихорадке, после физической нагрузки, после воздействия солнечного света, на ранних стадиях скарлатины, а также при отравлении белладонной.

МЫШЦЫ

Определенные данные анамнеза дают важную информацию о существующем заболевании мышц.

• **Неонатальный период**

- Респираторный дистресс у новорожденных.
- Слабый сосательный рефлекс.
- Ограниченная подвижность конечностей.
- Во время беременности слабые движения плода в матке.
- Неравномерный хватательный рефлекс, который свидетельствует о параличе руки, когда одна рука не двигается.

- Младенцы и дети ясельного возраста

- Задержка развития.
- Двоение в глазах к концу дня.
- «Хромой ребенок».
- Искажение речи после употребления холодной пищи (миотония).
- Мышечная боль (спонтанная или после нагрузки).
- Пациент легко устает.
- Пациент часто спотыкается и падает.
- Затрудненное глотание.
- Трудности при подъеме по лестнице и вставании из положения сидя.
- Трудности с отпусанием предметов.
- Трудности при ходьбе или беге.

СУСТАВЫ И КОСТИ

Боль в суставах — самый распространённый симптом, заставляющий ребёнка обращаться к врачу. Дети так часто падают и травмируются, что наличие травм в анамнезе обычно не помогает в постановке диагноза.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА**• Появление**

- Ребенок может говорить нормально, но не может открыть рот в присутствии незнакомых людей или в кабинете врача. Если ребенок не может произнести ни слова к 18 месяцам или построить осмысленные предложения к 3 годам, это считается отклонением. Полное отсутствие речи называется немотой и может указывать на глухоту, слабоумие или аутизм.
- У ребёнка с децеребрационным стазом ноги полностью вытянуты. Плечи и локти также разогнуты, предплечья повернуты внутрь, большие пальцы - поджаты.
- Ребенок с менингитом или субарахноидальным кровоизлиянием не хочет, чтобы к нему прикасались, реагирует раздражительно, лежит с плотно закрытыми глазами и отворачивает голову от света.
- Ребенок в коме не реагирует и не осознает происходящего вокруг.
- Полностью парализованный ребенок может не реагировать, но осознавать окружающее.
- У нормального, здорового ребенка наблюдаются равномерные, спонтанные движения всех частей тела.
- Нормальный ребёнок в разумных пределах радуется или не любит прикосновений незнакомца. Дети в возрасте от 9 до 24 месяцев боятся прикосновений незнакомцев. Но дети, подвергшиеся насилию, могут бояться любого человеческого контакта.
- Некоторые дети после черепно-мозговой травмы или менингита осознают происходящее вокруг, но не могут ничего о нем сказать.

- При тяжелом менингите и столбняке у ребенка наблюдается опистотонус, он прижимает затылок к подушке.
- Большинство нормально развивающихся детей могут различать право и лево на своем теле к 6 годам, а на теле другого человека — примерно к 9 годам.
- Пустой взгляд умственно отсталого или слепого ребенка легко распознать, имея небольшой опыт.

- Рефлексы развития

У всех детей на протяжении всего развития проявляются определённые нейронные рефлексы и реакции, вплоть до овладения типичным для человека прямохождением . Существуют различные механизмы автоматического позиционирования тела и балансирующие рефлексы, помогающие поддерживать равновесие при ходьбе. Некоторые из этих рефлексов контролируются спинным мозгом, другие – стволом мозга, промежуточным мозгом и корой больших полушарий. Они развиваются от каудального уровня контроля к цефалическому.

При естественном развитии спинномозговые рефлексы появляются сразу после рождения и исчезают в течение 1–2 недель. Стволовые рефлексы появляются примерно на второй неделе жизни и должны исчезнуть к шестому месяцу. Дизэнцефальные рефлексы проявляются примерно на четвёртом месяце, но подавляются к двум годам под влиянием коры головного мозга.

Другими словами, **рефлексы спинного мозга и ствола головного мозга являются примитивными и должны исчезнуть через 6 месяцев. Сохранение этих рефлексов после этого срока указывает на возможное повреждение мозга внутриутробно или в течение первых месяцев жизни.**

АНАМНЕЗ И ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТАКОВЫХ У ВЗРОСЛОГО?

Новорожденные и младенцы не умеют говорить и, следовательно, не могут выразить свои проблемы. Особенно в Индии мы сильно зависим от образованности и интеллекта родителей, а также от их способности внимательно наблюдать за поведением ребёнка. Примечание: Иногда менее образованные родители лучше других наблюдают за симптомами своего ребёнка; образованные родители иногда игнорируют очевидное или искажают симптомы, представляя ложную картину, основанную на собственных выводах.

- Младенца лучше всего осматривать, когда он кормится грудью и сидит на коленях у матери.
- Описание родов и стрессовых событий во время беременности чрезвычайно полезно в педиатрических случаях.
- Дыхание у младенцев учащенное и проявляется как брюшным, так и грудным типом дыхания. Часто наблюдается втяжение межреберных промежутков и надгрудинной области. Грудная клетка ребёнка более звучна при перкуссии. Узость дыхательных путей обуславливает частое возникновение крупа, хрипов, храпа и ателектаза. При аускультации грудной клетки нормальное дыхание может быть глухим или выражено везикулярным. Кроме того, из-за небольшого объёма грудной клетки дополнительные звуки могут проводиться с одной стороны на противоположную.
- Артериальное давление у детей, измеренное с помощью манжеты правильного размера, обычно довольно низкое. Для измерения артериального давления у младенцев может потребоваться метод промывания или доплерографии.
- Поскольку дефициты встречаются у детей гораздо чаще, их следует изучать очень тщательно. У детей с недоеданием классические результаты анализов часто отсутствуют, и типичные признаки распространённых детских заболеваний могут отсутствовать.
- Функциональные систолические шумы сердца и венозный шум являются нормой у детей.
- При осмотре глазного дна выявляется бледность диска зрительного нерва. Оёк диска зрительного нерва возникает только у детей старше 3 лет, после - заращения черепных швов.
- Очень важно наблюдать за процессом роста и развития.
- Следует учитывать осложнения после вакцинации.
- Гиперплазия лимфатической ткани очень распространена в детском возрасте, особенно это касается отека миндалин, полипов носа и т. д.
- Неврологические признаки наблюдаются также при нарушениях обмена веществ и других заболеваниях, не связанных с ЦНС.
- Примитивные автоматические рефлексy (рефлекс Моро, ладонно-хватательный рефлекс, тонический шейный рефлекс и т.д.) являются врожденными и исчезают к 5-6 месяцам. Сохранение их после этого срока может указывать на нарушение ЦНС. Задержка появления социальной улыбки, сохранение автоматических рефлексов

Зрительные рефлексy, сжатые кулаки, повышенный мышечный тонус и невозможность приблизиться к предмету — всё это ранние признаки детского церебрального паралича. У младенцев часто наблюдается повышение сухожильных рефлексов, а также кремастерного рефлекса. У детей до двух лет подошвы стоп могут быть разогнуты в обе стороны. В этом возрасте часто встречается односторонний разгибательный подошвенный рефлекс.

- У младенцев пульс очень частый и его трудно прощупать. Часто встречается синусовая аритмия.
- Отказ от сотрудничества и страх перед врачами, инъекциями, иглами и больничной атмосферой могут сделать медицинский осмотр невозможным. Детям, которые особенно неохотно сотрудничают во время медицинского осмотра, могут потребоваться препараты Aeth, Arn, Cale, Ign, Lac-f, Mere, Nat-m, Nux-v, Phos, Sil, Stram, ThuJ или Tub .
- Гипертрофия правого желудочка чаще встречается у новорожденных; гипертрофия левого желудочка чаще встречается у взрослых.
- У младенцев живот вздут и мягкий, иногда визуализируется пупочная грыжа. Печень при пальпации мягкая и в детском возрасте может прощупываться на глубине до 2 см под реберной дугой. Верхушку селезенки можно пропальпировать до 3 месяцев.
- Верхушечный толчок расположен в четвёртом межреберье или немного кнаружи от среднеключичной линии. Раздвоение второго тона сердца нормальное, а у младенцев P2 громче A2.
- У младенцев трудно прощупать пульс на яремной вене из-за короткой шеи.

Поскольку гомеопатия пользуется большой популярностью среди матерей как безвредная система медицинской терапии, крайне важно, чтобы гомеопат - выполнял свою задачу целителя не только назначая правильное лекарство, но и выявляя любые отклонения на ранних стадиях и тем самым снижая риск последующих осложнений .

«Глаз орла и память слона».

Любой практикующий гомеопат должен немедленно заподозрить задержку развития у ребенка, если следующие этапы развития не достигаются в течение нормального периода времени.

МАРКЕРНЫЕ ТОЧКИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА!

- Отсутствие социальной улыбки в возрасте 2 месяцев.
- Отсутствие стабильности головы спустя более 4 месяцев.
- Не узнает мать в возрасте 6 месяцев.
- Не может сидеть свободно после 8 месяцев.
- После 9 месяцев все еще не может ползать.
- После 9 месяцев все еще не может стоять свободно.
- Спустя 18 месяцев я все еще не могу выйти на свободу.
- Отсутствие хватательного захвата через 12 месяцев.
- Отсутствие попыток развития речи в возрасте одного года.

- Не может формулировать осмысленные предложения в возрасте 3 лет.

ПОДОЗРЕНИЕ НА ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ

Детский церебральный паралич — распространенное заболевание, с которым обеспокоенные родители по всему миру обращаются к гомеопатам. Мы должны быть осторожны и своевременно диагностировать это инвалидизирующее заболевание.

- Отсутствие беспокойства в возрасте 2–3 месяцев.
- Асимметрия позы, движения, тона.
- Спазм больших пальцев и сжатые кулаки у детей старше 2 месяцев жизни.
- Чрезмерный плач.
- Причмокивание губами.
- Сохранение тонического положения шеи после 6-й недели жизни.
- Спонтанный хватательный рефлекс (рефлекс Моро).

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

подтверждения диагноза, составления прогноза и оценки степени распространения заболевания могут быть целесообразны дополнительные клинические исследования .

• **Золотые правила**

- Никогда не будьте рабом результатов обследования; всегда контролируйте ситуацию.
- Информация из истории болезни и результатов физикального обследования важнее лабораторного отчета.
- В Индии противотуберкулёзные препараты назначаются всем детям с дефицитом массы тела и воспалением шейных лимфатических узлов. Подобная практика должна быть прекращена, поскольку она нарушает основополагающий принцип обследования и, следовательно, подтверждения диагноза. В то же время, своевременное обследование может спасти жизнь ребёнка, например, в случае головной боли со спазмами, когда люмбальная пункция чрезвычайно полезна для дифференциальной диагностики менингита и эпилепсии.

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ

• **Вы хороший гомеопат, если вы**

- информировать родителей о позитивной профилактике заболеваний.
- могут предотвратить болезни, — это миф .
- Забудьте о своем эго и обратитесь к более опытному коллеге или обсудите с ним ситуацию, которая, по всей видимости, не улучшается.
- осознаете пределы и ограничения своих знаний в области гомеопатии.
- провести тщательное физическое обследование и организовать необходимые клинические исследования.

- Обратитесь к предыдущим гомеопатам пациента, чтобы получить необходимую информацию об истории его болезни.
- Наблюдайте за ребенком, когда он входит в вашу клинику, когда он сидит в зале ожидания и когда он входит в лечебный кабинет.
- посоветуйте правильную диету.
- своевременно передать случай на консультацию к педиатру.
- своевременно госпитализировать ребенка.
- знать, как преобразовывать симптомы в рубрики репертория.
- Знайте свои лекарства и всегда имейте *Materia Medica* под рукой.
- уделите достаточно времени пониманию проблемы пациента и ее правильному анализу.

- ***Вы поступаете глупо, если вы***
 - являются предвзятыми.
 - не рекомендовать клинические обследования, когда они необходимы.
 - не осматривать пациента.
 - не госпитализировать ребенка в случае необходимости.
 - не изучайте гомеопатию и не обновляйте свои знания.
 - почувствуйте, что вы настолько умны, что вам не нужны книги и справочники, чтобы раскрыть дело.
 - не хватать терпения и запутывать дело.
 - возьмите за привычку назначать редкие лекарства по редким показаниям.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С НОВОРОЖДЕННЫМИ

Ребенок приходит в этот мир полным доверия и невинности.

Дети, чьи потребности удовлетворяются в этот важный период жизни, лучше адаптируются, не плачут слишком много и имеют меньше симптомов в течение первого года жизни.

Если у ребенка отсутствует это чувство безопасности, возникают симптомы.

Если потребности ребенка не удовлетворяются, его поведение может превратить жизнь родителей в ад.

Это стратегия выживания организма, основанная на зависимости.

Новорожденный полностью способен воспринимать и выражать эмоции.

Поза и положение тела, выражение лица и глаза являются воротами в царство эмоций.

Новорожденный может выражать гнев, печаль и страх, а также чувства отвращения, скорби или покинутости.

У ребенка развивается интерес к окружающему миру, он становится восприимчивым к таким стимулам, как свет, звуки и движение.

Он реагирует на окружающую среду по-разному: например, может насторожиться, испугаться, убежать или заснуть.

Приступая к работе с маленьким ребенком, самое главное — понять его семейную обстановку.

Если ребенок все еще находится на грудном вскармливании, существует прямая связь в эмоциональном общении: чувства, которые испытывает мать, передаются младенцу и могут продолжать оказывать влияние на него в раннем детстве.

Например, если мать расстроена, ребенок часто отражает ее недовольство и проявляет его в форме напряжения, слез, гнева и т. д.

Ощущения и ход родов могут дать ключ к подобию. Важно изучить поведение матери во время родов.

Если мать испытала сильный страх, боль или другую травму, это могло повлиять на ребенка.

Другие важные моменты:

- Как долго длились схватки? Были ли они очень болезненными? Как с ними справлялась мать?
- Каково было состояние матери с медицинской точки зрения?
- Кто сопровождал ее во время родов и как себя вел этот человек(а)?

- Были ли какие-либо медицинские вмешательства, такие как медикаментозная стимуляция родовой деятельности, вакуум-экстракция или кесарево сечение?
- Каково было состояние ребенка при рождении (оценка по шкале Апгар)?

Физический контакт с матерью после рождения — один из важнейших элементов развития доверия ребёнка. Отсутствие такого контакта может привести к возникновению симптомов и дискомфорта.

Физический контакт может быть нарушен:

- Временное или длительное разлучение матери и ребенка после рождения.
- Болезнь матери или ребенка.
- Чувство неполноценности и стресса у одного или обоих родителей.

Обратите внимание на взаимодействие матери и ребенка:

- Как мать относится к ребенку?
- Насколько тесный контакт, насколько интенсивно общение между матерью и ребенком?
- Как ребенок реагирует на мать?
- Расслаблен ли ребенок, комфортно ли он чувствует себя на руках у матери, нравится ли ему ее физическая близость?

Кроме того, необходимо учитывать способность ребенка общаться с другими людьми и с внешним миром.

Другим важным аспектом обследования является наблюдение за выражением глаз ребёнка. Это также позволяет специалисту, обладающему чуткостью, получить доступ к его эмоциональному состоянию.

- Гнев выражается прищуренными или лишь слегка приоткрытыми глазами.
- От страха глаза могут выпячиваться.
- Грусть может проявляться в редком трепетании век, фиксированном взгляде и отсутствии реакции.

Плач ребёнка также является способом сообщить нам о его эмоциональном состоянии. Мы можем научиться отличать один тип плача от другого, понимать его значение, а затем решать, является ли плач симптомом или нет.

- Плач от голода можно распознать по тихим, воющим звукам, которые, если их игнорировать, постепенно перерастают в громкие крики.
- Злой крик обычно громкий с самого начала. Ребёнок, выражая гнев таким образом, обычно ярко краснеет (Hyos, Sulph).
- Плач от боли начинается с крика, за которым следует длительная пауза для вдоха, а затем начинается снова с новой силой.
- Также может наблюдаться притворный плач или возбуждение, возникающие после первого месяца жизни, когда ребенок хочет выразить свою потребность во внимании (Med.).
- У некоторых младенцев плач больше похож на нытье (Кальк-п).

Все дети испытывают тревогу на определённых этапах жизни, и младенцы не являются исключением. Выбор гомеопатического средства для новорождённых зависит от того, тревожны ли они в ответ на внезапные изменения ситуации или экстремальные раздражители, такие как

- громкий шум,
- яркие источники света,
- быстрое движение.

Дети могут инстинктивно бояться, что их уронят (Borh, Phos). Некоторые малыши боятся, когда их одевают или раздевают (Sulph, Med). Некоторые дети весьма беспокойно реагируют на изменение своего распорядка дня или привычной обстановки. Такое изменение воспринимается как нарушение доверия.

- Это включает в себя, например, случай, когда родитель надевает маску (Кейл, Мед).
- Беспокойство и тревогу может также вызывать отец, если на его лице есть пена для бритья (Phos, Med).

Дети Фос, Карц и Кальций ужасно боятся боли.

В зависимости от лекарства могут наблюдаться различные реакции на внешние раздражители:

- Например, ребенок породы Кальций боится пылесоса, тогда как ребенок породы Сульф подходит к нему без всякого страха.
- Некоторые дети хотят, чтобы их плотно завернули в одеяла (Арс, Псор, Пульс).
- Другие хотят больше свободы передвижения (Med, Sulph).
- Другие дети предпочитают быть укутанными, чтобы избежать сквозняков (Nux-v, Calc-p).

У ребёнка могут проявиться признаки сепарационной тревоги уже в самом раннем возрасте. Он плачет и кричит вслед родителям и ведёт себя так, будто умрёт без них (Phos, Calc, Med, Calc-p, Лус, Sil).

У некоторых детей страх перед незнакомцами развивается уже в раннем возрасте (Бар-к, Кейл). Этот страх обычно развивается примерно в возрасте шести месяцев.

Некоторые дети громко кричат и визжат, как будто их напугало чудовище (Мед), или прячут лицо под одеялом (Бар-к, Кейл).

Гомеопат должен понять корень проблемы и выбрать лекарство, которое устранил ее корень.

Чтобы понять состояние ребенка в период бодрствования, гомеопат должен наблюдать за ним у груди матери.

- Насколько хорошо он сосет грудь?
- Как долго ребенок хочет находиться на грудном вскармливании?
- Предпочитает ли он «легкие перекусы» или «длительные приемы пищи»?
- Некоторые важные разделы:

Общее; Еда - Насыщение, до

Общее; Еда, фастфуд

Желудок; Аппетит - Пристрастия к еде, после еды, вскоре после еды

Желудок; отсутствие аппетита - возвращается после малейшего укуса

- Предпочитает ли ваш ребенок одну грудь другой? [*Общие; Страница*]
- Некоторые дети предпочитают левую грудь (Sulph), другие — правую (Lyc, Nux-v).
- Ребенок спит у груди?
- Усталость после еды? [*Общие; Усталость - После еды*]
- Чувствует ли ребенок себя лучше после еды? [*Общие; после еды - улучшение.*]

Сон дает нам ценную информацию для выбора правильного лекарства.

- Многие дети не спят всю ночь.
- Существует множество причин бессонницы: голод, прорезывание зубов, газы, мокрые подгузники, ребенок слишком замерз или слишком жарко.
- Иногда ребенок просыпается, потому что соска выскальзывает у него изо рта (Med, Кейл).
- Поза во время сна также может быть симптомом: положение коленей и груди (genu pectoral), которое наблюдается у некоторых детей, может указывать на или подтверждать Carc, Lyc, Med или Tub .
- Беспокойство во время сна также является характерным симптомом таких препаратов, как Ars, Bar-c, Cina, Lyc, Med, Rhus-t, Sulph.
- Очень глубокий сон может указывать на такие препараты, как Bell или Puls.
- Время засыпания и пробуждения может дать важную информацию о конституции ребенка.
- Sulphur и Medorrhinum, как правило, «совы». Они ложатся спать поздно.
- Дети циприпедиума тоже долго не спят. Они просыпаются среди ночи, желая поиграть.
- Высыпается ли ребенок после ночного или дневного сна?
- Неосвежающий сон характерен для таких препаратов, как Lach, Nux-v, Med, Tub.
- Дети, которые просыпаются во сне — это Белл, Боркс, Кауст, Таб.
- Дети, которые издают звуки во время сна: Bufo, Calc-p, Hyos.
- Дети, которые часто спят с полуоткрытыми глазами, — это Sulph, Cham.

В течение первого года жизни ребёнок испытывает сильную потребность в общении. Поэтому гомеопат должен определить, разговаривает ли мать с ребёнком. Когда мать разговаривает с ребёнком, звук её голоса успокаивает его, и он чувствует себя комфортно, получая от неё внимание. Это способствует развитию уверенности в себе, и такие препараты, как Lyc или Анас, часто можно исключить.

Время, которое мать проводит с ребёнком, имеет решающее значение для его развития, здоровья и благополучия. Дети, которые с самого начала растут в спокойной, любящей и безопасной обстановке, полны надежды, бесстрашны и находятся в гармонии с собой. Поэтому им, возможно, даже не нужны лекарства.

Умение наблюдать и интерпретировать проявления эмоций, а также чуткость к восприятию внутреннего состояния организма имеют первостепенное значение в гомеопатическом лечении детей.

ЧАСТЬ II

ФАРМАКОЛОГИЯ

АБЕЛЬМОШ

(Мускусный гибискус - Авель.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Сильный страх.** В этом отношении его можно спутать с Phos., Cale или Crot-c. Дети полностью охвачены страхами всех видов, такими как страх животных вообще, ядовитых животных, мух, насекомых, скорпионов, змей или пауков. Страх настолько силен, что ребёнок прячется и пытается защитить себя; он запирает окна и двери, а иногда не спит всю ночь до рассвета. Ночью, в темноте и в одиночестве, существующий страх перед животными и насекомыми ещё больше усиливается. Дети также чрезвычайно нервны, тревожны и испытывают страх, находясь в окружении большого количества людей, например, в многолюдных местах или в кино.
- ▶ Утром он крайне вялый и заторможенный, но вечером очень оживлённый. Как только стемнеет, он снова становится очень тревожным; затем становится вялым и заторможенным.
- ▶ Носовые кровотечения.
- ▶ Повышенный аппетит, особенно к холодной еде и холодным напиткам.

Источник

- Также известное как гибискус, оно принадлежит к семейству мальвовых (Malvaceae). Доктор Д. Легеритт из Мексики поделился с нами рядом прекрасных симптомов этого средства.

АБРОТАНУМ

(Artemisia abrotanum — Eberruute — Abrot.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Ворчливый и раздражительный.
- ▶ Неуклюжий и неловкий.
- ▶ Ребенок сопротивляется любому воздействию и не хочет, чтобы его трогали.
- ▶ Непослушный.
- ▶ Ужасно жалуется, стонет и ноет.
- ▶ Настойчивый.

Тело

- ▶ Не может держать голову.
- ▶ Общая, быстро прогрессирующая потеря веса, особенно в ногах, при очень хорошем аппетите.
- ▶ Синие круги вокруг тусклых и впалых глаз.
- ▶ Холодные пальцы, особенно кончики пальцев, и холодные ступни.

Другие важные симптомы

Дух

- Гнев и раздражительность у детей при глистной инвазии.
- Вялость у детей.
- Немного испуган.
- Чувствительный к прикосновениям.

Голова

- **голову из-** за слабости мышц шеи .
- Результаты теста:
 - Гидроцефалия.
 - Сосуды на лбу и висках опухли.

Глаза

- **Невозможность открыть веки** из-за слабости глазных мышц.
- Результаты теста:
 - Синие круги вокруг тусклых, запавших, пустых глаз.
 - Сужение слезного протока.

Нос

- Сухость носа и **носовые кровотечения** ярко-красной кровью.

Лицо

- **Распространение эпидемического паротита на яички или молочные железы.**

- Результаты теста:
 - Гемангиома на лице.
 - Кожа морщинистая, холодная, сухая и бледная, как у старика.

РОТ

- Во рту жарко и сухо.
- Болит язык.

ЖЕЛУДОК

- **Пристрастия к еде: ребенок постоянно плачет, требуя еды.**
- **Рвота большим количеством зловонной жидкости.**
- Не любит: сладости.
- Пристрастия: кипяченое молоко, хлеб и **хлеб, приготовленный на молоке.**
- Результат теста:
 - Пилоростеноз у новорожденных.

ЖИВОТ

- **Задержка заживления пупка после отпадения пуповины.**
- Туберкулезный перитонит и сухотка брыжейки.
- Результаты теста:
 - Асцит.
 - Раздутый и опухший.
 - Увеличенные брыжеечные лимфатические узлы.
 - В различных областях живота прощупываются твердые уплотнения.
 - Выделение крови и жидкости из пупка у новорожденных.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Диарея, чередующаяся с запорами.**
- Диарея, чередующаяся с ревматизмом.
- Внезапная подавленная диарея, за которой следует выпячивание геморроидальных узлов.
- Результат теста:
 - Анализ кала: **аскариды** и острицы.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- **Гидроцеле после скарлатины или подавленных кожных высыпаний.**
- Опухание яичек после свинки.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

- Нарушение дыхания.
- Респираторные заболевания, вызванные подавленными кожными высыпаниями.

СЕРДЦЕ

- **Острый эндокардит.**
- **Последствия подагры или ревматизма для сердца.**
- Результат теста:
 - Малый и слабый пульс.

НАЗАД

- **Шея слабая и истощенная; он не может держать голову прямо.**
- Спинальный менингит и миелит.
- Результат теста:
 - Знак Кернига +.

КОНЕЧНОСТИ

- **Неуклюжий и неповоротливый**, склонный легко ронять вещи (Апис).
- **Последствия** подагры или ревматизма для сердца.
- **Укорочение мышц и сухожилий.**
- **Стремится лечь из-за боли и слабости всех мышц.**
- Артритические узелки (ювенильный артрит и синдром Стилла).
- Ревматизм после внезапно подавленной диареи.
- Результаты теста:
 - Холодность пальцев рук, особенно кончиков пальцев и стоп.
 - Походка: хореоподобная, нескоординированная.
 - Подагрический отек суставов кистей и голеностопных суставов.
 - Маразм нижних конечностей, распространяющийся вверх.

КОЖА

- Жалобы на подавленные высыпания на коже.
- Результаты теста:
 - Наросты, гемангиомы.
 - Невусы.

КРОВЬ

- **Гемолитическая анемия.**
- **Железодефицитная анемия.**
- **Дефицит витамина В12 или мегалобластная анемия.**

СПАТЬ

- **Лежа с подтянутыми кверху ногами.**
- Беспокойный сон; ребенок видит страшные сны и просыпается с дрожью.

Общий

- **Анафилаксия после вакцинации БЦЖ.**
- **Противоречивые и чередующиеся состояния.**
- **Застой в развитии.**
- **Генерализованный и быстро прогрессирующий маразм, особенно нижних конечностей, с очень хорошим аппетитом.** (Нэш отмечает, что Abrot теряет вес снизу вверх — в отличие от Lys, Nat-m и Sanic, которые теряют вес сверху вниз.)
- **«Метастазы» возникают либо спонтанно, либо в результате местного лечения:** например, ревматизм сменяется болью в горле, или боль в горле распространяется на сердце, или боль в горле проходит, но впоследствии у ребёнка развивается ревматизм. У детей, неправильно лечившихся туберкулостатическими препаратами, впоследствии развивается артрит или ревматизм.
- **Очень холодно** , состояние ухудшается от холода и сырости.

АДЕНОЗИН МОНОФОСФОРИКУМ

(Аденозинмонофосфат - АМФ)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Очень нервный и тревожный.
- ▶ Неуверенность в себе и, как следствие, привычка грызть ногти и частые головные боли.
- ▶ Достаточно активный и живой, но неуверенный в себе из-за плохого воспитания и ослабленного эго.
- ▶ Головная боль усиливается утром после пробуждения.
- ▶ Еще одним важным клиническим симптомом являются потрескавшиеся губы.
- ▶ Усиливается тяга к мясу, апельсинам, сладостям и яйцам, а также картофелю в любом виде.
- ▶ Запор.
- ▶ Спите на животе.
- ▶ Псориаз на коже, особенно потрескавшиеся пальцы.

АЕТHUSA CYNAPIUM

(Петрушка дурака - Эт.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Выглядит старо, уныло и глупо.
- ▶ Любит игрушечных животных (Carc., Lac-leo., Phos.) и вообще любит животных (Cale., Calc-p., Lac-del., Med., Nat-m.); испытывает к ним много чувств, любви и глубокого понимания; хочет получить животное на день рождения (Phos.).
- ▶ Замкнутые дети; не принимают активного участия в простых социальных играх; предпочитают все делать в одиночку; живут в своем собственном мире (также может быть признаком аутизма: Helium).
- ▶ Тревожность сопровождается различные физические недомогания, такие как колики, обезвоживание, диарея, эпилепсия и гастрит.
- ▶ СДВ (синдром дефицита внимания): неспособность концентрировать или удерживать внимание.
- ▶ Агония с плачем (Гернси).
- ▶ Нарушение социальной активности и общения с членами семьи и друзьями; слабый или отсутствующий интерес к заведению друзей; неспособность устанавливать отношения со сверстниками (Cic., Nat-c., Stann.).
- ▶ Разговаривает сам с собой (стафилококк) и не осознает ничего вокруг себя (важная аутистическая черта).

Тело

- ▶ Характерные симптомы **Эйта** : обеспокоенное, болезненное лицо, широко раскрытые ноздри, истощение, сонливость и рвота свернувшимся молоком (это настолько легко распознать, что даже новички в гомеопатии быстро находят лекарство).
- ▶ **Расстройство пищеварения во время прорезывания зубов;** характеризуется сильной внезапной рвотой пенистой, похожей на молоко субстанцией, за которой следуют творог (Cale., Sil., Valer.) и сыроподобные массы ИЛИ срыгивание пищи примерно через час после кормления.
- ▶ Доктор Кент говорит, что **лицо** помогает нам идентифицировать детей Aeth.: «Бледное, лицо Гиппократ с беловато-синюшной бледностью вокруг губ и **запавшими глазами**». (Я не наблюдал бледности вокруг губ в своей практике.)
- ▶ Не может держать голову (Abrot., Calc-p., Sil.) или стоять из-за **выраженной слабости** .
- ▶ **Общее ухудшение от молока** (Mag-c., Nat-c.; рассмотрите также одно из молочных средств — Lac-c. или Lac-d.).

Не переносит молоко ни в каком виде; сразу после питья возникает рвота большими комками, после чего наступает **слабость и сонливость**.

- ▶ Полное отсутствие жажды (Apis, Gels., Nux-m., Puls.).
- ▶ Жаркая летняя погода может стать причиной многочисленных заболеваний у детей.
- ▶ Различные физические заболевания во время прорезывания зубов.
- ▶ Слабость с сонливостью после рвоты (Ars., Bell., Cupr., Ipec.), после стула (Elaps., Sulph.) или после спазмов (Cic., Stram.).

Aeth. очень похож на Ant-c. и Cale (при болях в животе), а также на Cic. (при спазмах).

Другие важные симптомы

Дух

- **Неуклюжие** дети (Apis, Bov., Ign., Nat-m.).
- Дети, которые **плачут во время кормления грудью** (Lac-c., Puls.).
- Дети, которым **очень трудно** плакать, **даже если** они **грустят** (Ign., Nat-m.).
- Сильный страх потери членов семьи (Sacch.), проявляющийся симптомами спутанности сознания, судорог, диареи, обмороков, рвоты и т. д.; сильная **тревога перед экзаменами** из-за напряжения ожидания; страх неудачи - (Anac., Arg-p., Cupr., Nux-v., Sil., Thuj.).
- **Увлечён домашними животными**, особенно собаками и кошками (Cale., Carc., Med.).
- Шутки; склонность шутить **в неподходящих ситуациях (Как.)** [Категория - **Шутки, Остроумие**]
- **Тихая**, смущенная, медленная речь.
- Хотелось бы принять участие в общественной деятельности, например, в поиске доноров крови или лекарств, сборе средств на медицинские нужды.
- Желание что-нибудь перекусить в течение всего дня.
- Страх удушья в темноте (Chin., Lyc., Puls.).
- Остроумные дети (соч.).
- Дети, которые в раннем возрасте всецело погружаются в академические знания и переоценивают свои силы, что в конечном итоге ухудшает их концентрацию (Кали-п., Пик-ак.) и приводит к замешательству.

Голова

- Периодические головные боли, сопровождающиеся тошнотой, рвотой и икотой, с мучительной болью в шее.
- Результаты теста:
 - Не может держать голову прямо (Cale., Calc-p., Op., Sil.) из-за слабости мышц шеи (Abrot.); голова неоднократно запрокидывается назад.
 - Горячая голова от лихорадки.

ГЛАЗА

- Вращательные и **вращательные движения глаз во время сна** (Apis).
- Светобоязнь.
- Результаты теста:
 - Блефарит.
 - Конъюнктивит.
 - Расширение зрачков во время эпилептических припадков (Bell., Cina).
 - Липкие глаза.
 - Блестящие глаза (Белл.).
 - Во время судорог глаза направлены вниз.
 - Стекланный вид глаз (Op., Ph-ac.).
 - Выпуклые глаза (Nat-m., Stram.).
 - Зрачки не реагируют на свет (Hyo., Op.).
 - Пристальный взгляд в бессознательном состоянии.
 - Косоглазие.
 - Отек мейбомиевых желез.

УШИ

- Результат теста:
 - Желтоватая, гнойная оторрея.

Нос

- Насморк, когда ребенок выходит на свежий воздух.
- Тщетная попытка чихнуть.
- Нос заложен при пробуждении утром (Кейл.).
- Результат теста:
 - Кожная сыпь (чаще на кончике носа).

Лицо

- Результаты теста:
 - **Холодный пот** лица (Camphora, Spong, Verat.).
 - Новорожденные со сморщенным, старческим видом (Cale., Nat-m., Op.), **сморщенным** (Cina, Verat.), лицом Гиппократы (Abrot.); со страдальческим выражением (Ars., Kali-c.).
 - **Выраженная носогубная складка** (признак боли и беспокойства) (Cina, Phos., Stram.).
 - Потрескавшиеся губы.
 - Бледное, одутловатое лицо; бледность, особенно вокруг губ (Cina, Stram.).
 - Тризм (Cic., Nux-v., Op.).

РОТ

- Чрезвычайная **сухость во рту** (Ars., Bry.).
- Затрудненное прорезывание зубов.
- Слюноотделение во время сна.
- Результаты теста:
 - Чистый или **беловатый** язык с язвами.

- Во время спазмов изо рта выделяется беловатая, молочная пена (Cis., Supr., Hyos., Lach.).
- Мягкое нёбо красное и опухшее.
- Молочница (Borh., Kali-chl., Merc.).

ШЕЯ

- Хроническая боль в горле, усиливающаяся на холодном воздухе и в сырую погоду, характеризующаяся ощущением жара и дискомфорта; после тонзиллэктомии.
- Постоянное желание сглотнуть.
- Результаты теста:
 - Воспаленные, увеличенные шейные лимфатические узлы (кисты).
 - Выделение слизи из ретроназальной полости.
 - Опухший, воспаленный язычок.
 - Горло красное и воспаленное.

ЖЕЛУДОК

- **Смертельная тошнота** при виде еды.
- **Повышение аппетита после рвоты** (Cina, Colch., Podo.).
- **Непереносимость молока**, особенно у новорожденных и младенцев: рвота молоком происходит почти сразу после глотания, с внезапной, судорожной силой (Ipec., Sanic.), оно почти створожено (иногда не створожено).
- **Отсутствие жажды при лихорадке** (пульсе).
- Рвота створоженным молоком (Ant-c., Cale., Nat-m., Sil., Valer.) и творожистой массой у младенцев, которая с силой извергается в больших количествах вскоре после кормления (Ars., Tab., Verat.), после чего ребенок погружается в **глубокий сон** (Ant-t., Bell., Ipec.).
- Рвота при прорезывании зубов (Ant-c., Bry., Ipec.), при поносе (Ant-t., Apis).
- Расстройство пищеварения из-за частых перекусов, эмоционального возбуждения (Bry., Cham., Nux-v.) и умственного истощения из-за чрезмерных усилий во время учебы.
- Отрыжка в течение часа после еды (Sulph).
- Спазматическая икота.
- Внезапная, сильная, пенистая рвота зеленоватым цветом с лихорадкой, особенно после употребления молока или обильной жирной пищи.
- Обострение: **Молоко** (Сил, Валер).
- Не любит: кофе, жирное, фрукты и молоко.
- Пристрастия: к сыру, деликатесам, мучному, соленому и сладкому.
- Результаты теста:
 - Гастроскопия: Врожденный пилоростеноз (Дис-ко.).
 - Тимпанит (Carbo-veg., Chin., Lyc.).

ЖИВОТ

- Кишечный катар у младенцев, в области пупка (Verat.).
- Результаты теста:
 - Ощущение холода.
 - Обезвоживание: 2 степени с гипонатриемией и тахикардией с малым, почти незаметным пульсом.
 - Чувствительность к прикосновениям.
 - Тимпанит +.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Диарея, почти всегда сопутствующий симптом обезвоживания.**
- Стул: жидкий и зеленый; сильное натуживание перед дефекацией и во время нее, за которым следует **коллапс** (Ars., Camph., Verat.).
- Детский понос (Bry., Nux-v., Op.) с выделением непереваренной пищи, жидкого, водянистого (Gamb., Grat.), светло-желтого (Chel.) или зеленого, желчного стула, особенно после полуночи; в теплую погоду, от напряжения ожидания (Gels., Ph-ac.), во время прорезывания зубов.
- Постоянные запоры у детей, находящихся на грудном вскармливании.
- Сонливость после дефекации (Nux-m.).
- Стул, похожий на створоженное молоко, выделяется обильно через 1-2 часа после кормления.
- Результаты теста:
 - Вирусный гастроэнтерит, вызванный **ротавирусами** (Ars., Cupr-ar., Verat.) или **холерным вибрионом** (Calc., Calc-p., Guaj., Sal-ac.).
 - Спазмы толстой кишки.
 - Скрытая кровь в кале (Наемосcult® положительный) ++.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Хроническое ночное недержание мочи (Lac-c.).
- Беловатый осадок в подгузнике.
- Прекращение выделения мочи вследствие обезвоживания (Ars., Chin.).
- Результат теста:
 - Гематурия при рутинном анализе мочи.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Частая потеря голоса.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

- Астма, всегда усиливающаяся в темной комнате, с сильным **страхом удушья**; ребенок хочет, чтобы **двери и окна были открыты** (Apis, Arg-n., Lach., Puls., Sulph.).
- Астма и кашель делают ребенка полностью **безмолвным** (Apis).
- Результат теста:
 - Дыхание: прерывистое и короткое; храп.

КАШЕЛЬ

- Сухой, щекочущий кашель **ночью** (Cina, Kali-c.) из-за раздражения гортани.
- Короткий, сухой, приступообразный кашель после обеда.

ГРУДЬ

- Результат теста:
 - Опухшие, болезненные подмышечные железы.

КОНЕЧНОСТИ

- **Неуклюжесть** конечностей (Agar., Hell.); постоянное падение предметов.

- **Нарастающие боли в бедрах и икрах**, облегчающиеся при растирании или массаже.
- Результаты теста:
 - **сжаты** (Bell., Cupr., Hyos.), большой палец оттянут внутрь (Cupr., Merc.).
 - **Покраснение** ладоней (Fl-ac.).
 - Морщинистая кожа рук.

Спать

- Частые пробуждения из-за **голода** (Ant-c., Lyc., Psor.).
- Интенсивная или непреодолимая **сонливость** со слабостью во время и после **стула** (Nux-m., Sulph.), после **рвоты** (Ipec.) или после судорог (Cic., Cur.).
- **Боль в костях** мешает спать (Ph-ac., Merc.).
- Ужасные кошмары, которые будят его ото сна.
- Беспокойный сон с **подергиванием мышц** (Cham., Cina) и закатыванием глаз.
- Сонливость в течение дня, за исключением пребывания на свежем воздухе.

Высокая температура

- Стадия озноба: сильный озноб с ощущением холода снаружи во время сна, особенно в области живота; **красное лицо**; полное отсутствие жажды.
- Стадия жара: **жажды нет**, хочется даже капли воды; озноб.
- Стадия потливости: **обильное потоотделение при засыпании** (Ars., Merc.); не может находиться без одежды в течение этой фазы (Acon., Nux-v.); все жалобы улучшаются в течение этой фазы.
- Лихорадка начинается сразу же, как только ребенок встает и начинает двигаться утром.
- Результаты теста:
 - Доброкачественный асептический хориоменингит.
 - Вирусный менингит.

Кожа

- Легкое **раздражение** кожи (Calc-s., Graph., Merc., Petr.), вызванное подгузником, трусиками, нижним бельем, трением бедер.
- Потеет при малейшей нагрузке.
- Зуд, усиливающийся от согревания в постели, при нагревании тела (Nat-m.), в теплом климате или в теплом помещении.
- Результаты теста:
 - **Холодная, липкая** кожа как сопутствующий симптом большинства жалоб (особенно диареи, обезвоживания и рвоты).
 - Нейродермит.
 - Кожа абсолютно сухая, без тенденции к потоотделению даже после физической нагрузки (наследственная или врожденная особенность).

Судороги

- Жалобы: из-за прорезывания зубов, при засыпании (Sulph.) или после глубокого сна, после рвоты (Cupr.).
- Во время судорог: большой палец **прижат** (Bufo, Caust, Cic.), холодные конечности, взгляд направлен вниз или в сторону вправо и вверх.

направленный; фиксированные, расширенные зрачки (Bell., Cina); **пена** у рта (Bufo, Op.); безумный, ярский бред, красное лицо (Cic., Glon.); малый, поверхностный пульс и сильные спазмы со ступором и делирием.

- После судорог: выраженная слабость, упадок сил и сонливость.

Общий

- Непереносимость лактозы (Кальк-п.).
- Проблемы с питанием у детей, вскармливаемых **искусственным сухим молоком** или искусственными пищевыми добавками.
- **Внезапное истощение** после острых заболеваний, судорог, дефекации или рвоты, сопровождающееся холодом и сонливостью.
- Ребенок часто **переедает** (Нат-п.).
- **Насилие и жестокость** во всех состояниях: сильные судороги, бред, боль, рвота и т. д.
- Анасарка.
- Склонность к коллапсу (Camph.).
- Затвердевшие железы.
- Отсутствие реакции (Туб.).
- Пульс: частый и малый, почти незаметный.
- Летние жалобы младенцев и детей.

Источник

- Семейство Зонтичные (Apiaceae/Umbelliferae)

АГАРИК КРАСНЫЙ

(Мухомор - agar.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Рассеянные и **мечтательные** дети (Nat-m., Op., Phos.), глубоко погружающиеся в свои фантазии.
- ▶ **Неуклюжий**, умственно и физически (Apis, Nux-v.).
- ▶ Дети, которые любят **преувеличивать**: свои страдания, свои способности, свои потребности (Cann-i., Plat., Stram.) и т. д.
- ▶ Дети, которые по утрам довольно ленивы и вялы, но **к вечеру становятся бодрее**, а их ум становится все более ясным (Lach., Sulph.).
- ▶ Дети и подростки, которые практически **не контролируют свою зависимость** от алкоголя, кокаина или опиума; неоднократное злоупотребление наркотиками, что приводит к прогулам, плохой успеваемости, плохим оценкам и, в конечном итоге, к исключению из школы.
- ▶ **Зависимый** от других.
- ▶ **Увлекается** барабанами; любит играть на них; ритм барабанов полезен для его психики.
- ▶ Страх перед привидениями, грабителями и водой; но может быть и **бесстрашным** (Bell., Cocain., Op., Sil.). Благодаря этому бесстрашию ребенок считает себя великим героем и убежден, что он силен, как Супермен. [Рубрика: *Разум; Бред — расширенный; Бред — лёгкий — он лёгкий; Бред — офицер — он офицер*]. Смельчак; хочет вести себя как Супермен или Человек-паук.
- ▶ **Гиперактивные** (группа пауков).
- ▶ Ребенок **злобен** и **угрожает** другим; он или она с полной самоотдачей перемещается в самых опасных местах (нет чувства опасности: Falcore., Merc., Op., Stram., Tub.) (см. Смелость), например, у окна, прислоняется к перилам балкона, лазает по деревьям и т. д.
- ▶ Отрицательно до мозга костей.
- ▶ **Глупый восторг** (Bufo, Hyos.).
- ▶ Любит игры, требующие большой **физической силы** и выносливости. Агрессивный и необузданный в спорте (футбол, регби, волейбол).
- ▶ Очень **любопытный** (предательство), хочет всё знать.
- ▶ Избегает ответственности (Лик.).
- ▶ Дети, которые чувствуют себя слишком комфортно под защитой других (обычно единственные дети в богатой семье).
- ▶ Дети, любящие играть в военные игры с солдатиками, винтовками и пистолетами (Supr., Stram.).
- ▶ Легко возбуждается: повышенная жизнерадостность, разговорчивость и преувеличенные фантазии; разговорчив (смеется), но избегает вопросов.

- ▶ Склонность к бреду с лихорадкой или болью (Bell.); шумы.
- ▶ Большой эгоизм.
- ▶ Похотливые дети препубертатного возраста хотят целоваться.
- ▶ Ленивые дети, нежелание работать.
- ▶ Любит резвиться и танцевать особенно гротескно.
- ▶ Умственная отсталость со стереотипным или самоповреждающим поведением.
- ▶ Умственно отсталые дети с синдромом дефицита внимания (СДВ) отказываются учиться, не могут сосредоточиться во время учебы и испытывают отвращение к любым умственным усилиям.
- ▶ Неврологические или поведенческие проблемы у маленьких детей после того, как их наказали, высмеяли или сделали козлами отпущения сверстники или члены семьи.
- ▶ Слабая воля контролирует.
- ▶ Намеренное, ситуативное молчание с компульсивными порывами и вспышками гнева.
- ▶ Расстройства стереотипных движений, характеризующиеся повторяющимся, кажущимся неконтролируемым и бесцельным двигательным поведением. Например:
 - укусить себя (Elaps., Hura, Lyss.).
 - произвольные жесты рук, как будто они тянутся к чему-то.
 - произвольные жесты рук, как будто он что-то сматывает в клубок.
 - Жесты, тики.
 - наносит себе увечья во время припадков ярости (Lyss.).
 - поворачивает голову из стороны в сторону (Апис).
 - Склонность разрывать вещи на части (Bell., Stram.).
- ▶ Упрямые дети (Bry., Cham., Nux-v.).
- ▶ Талантливые дети, которые умеют писать стихи и петь уморительно смешные песни.
- ▶ Необычное желание посещать больных в больницах [Категория: *Разум - Любящий; Доброжелательность*], наблюдать за хирургическими операциями и присутствовать на похоронах.
- ▶ Сильный гнев с демонстрацией огромной силы, угрожающей разрушением.

Тело

- ▶ **Нервничающий** с головы до ног (Мерк.).
- ▶ **Зловонные** выделения (стул, отрыжка, дыхание).
- ▶ Позвоночник чувствителен к прикосновению (Ther.).
- ▶ Выраженный **туберкулезный диатез**; туберкулез в анамнезе или в семейном анамнезе или наличие первичного комплекса.
- ▶ **Зевание** перед эпилептическим припадком или в ожидании боли.

- ▶ Отдельные части тела чрезвычайно чувствительны к давлению и холодному воздуху.
- ▶ Дети со светлыми волосами, светлой кожей и дряблыми мышцами.
- ▶ Распространенные побочные эффекты нейролептиков (Цинк.).
- ▶ Непроизвольные движения во время бодрствования, которые исчезают во время сна.
- ▶ Поздно учится ходить (Кейл.) и говорить (Нат.).
- ▶ Ночная потливость.

Другие важные симптомы

Дух

- Недомогания, вызванные **испугом** (Gels., Phos., Verat.), **наказанием** (Dig.) и **упреками** (Staph .).
- **Кусает себя, когда сердится** на себя (Кур., соч., табл.).
- Булимия.
- Капризные и сварливые дети.
- Ребенок не способен отреагировать, если его чувства задеты.
- Дети с очень плохой памятью, даже на то, что они только что услышали, сделали или подумали.
- Легкомысленный (Merc., Puls.).
- Ненависть к тем, кто его каким-либо образом обидел, со склонностью замышлять месть (Нат.-м.).
- Неправильная оценка расстояний и размеров объектов.
- Громкий, произвольный смех (Borx., Ign., Nat-m.) и шутки по пустякам.
- Делает много ошибок в письме и разговоре.
- Корчит странные рожицы и принимает странные позы и положения.
- Нервные дети, выделяющие очень мало мочи (ребенок Ign. выделяет много мочи).
- По природе хитрый (Тарент.) и лживый.
- Расточительность в обращении с деньгами (измена).
- Ночной страх удушья, особенно во время первого сна.

Голова

- Головная боль: усиливается в холодную погоду (с насморком), при чрезмерном чтении или просмотре телевизора; вынуждена закрывать глаза (Bell., Sil.); облегчается от закрывания глаз (Bry., Sep., Sulph.), укутывания головы, ходьбы или поворота головы, после мочеиспускания, после стула; усиливается после сна и при вставании утром; с носовым кровотечением.
- Менингит (Bell., Hell., Stram., Zinc.).
- Мигрень у детей, страдающих хореей со спутанностью сознания (Bry.); после любого напряжения глаз или вследствие нервных причин.
- Вращение головой из стороны в сторону, сопровождающееся болью (Chin., Kali-i.).
- Солнечный удар.

- Результаты теста:
 - Не может держать голову прямо; имеет тенденцию запрокидывать ее назад из-за слабости мышц шеи (Camph., Cic., Op., Tarent.).
 - Постоянные, произвольные движения головы (Agar., Hell., Zinc.), особенно вперед и назад (Cina).
 - Лоб (Ars., Zinc.) и макушка (Calc-p., Verat.) холодные как лед на ощупь.
 - Голова положена набок, как бы покоится на плечах (Hydr-ac.).
 - Горячая голова при холодном теле (Ars., Bufo).
 - Знак Кернига +.
 - Пот на лбу (Nat-c., Phos.).
 - Чешуйчатые, герпетические или экзематозные высыпания на коже головы, сопровождающиеся сильным зудом.
 - Кожа головы чувствительна к прикосновению (Bell., Nux-v.).

ГЛАЗА

- Все проблемы со зрением излечиваются при использовании холодной воды.
- Астенопия (Cina, Jab., Ruta) вследствие длительного напряжения глаз (Т. Ф. Аллен).
- Ребенку трудно открывать и держать глаза открытыми из-за спазма или спастического смыкания век.
- Диплопия при чтении (граф.).
- Слезотечение при простуде (Euph.), кашле (Nat-m.) и головной боли (Puls.).
- Светобоязнь при искусственном освещении (Con., Nat-m.).
- Подергивание век и глазных мышц (Cod.) при чтении (Kali-bi.) и перед эпилептическим припадком; облегчается промыванием глаз холодной водой.
- Результаты теста:
 - Частое, произвольное **моргание** (Bell., Euph.).
 - **Непроизвольные** (Cale., Mag-p.), **судорожные** (Hyos., Stram.) вращательные или маятникообразные движения глазных яблок из одной стороны в другую (Supr., Gels.), улучшающиеся только во время сна.
 - **Веки полуоткрыты** (Bell., Supr., Op.).
 - **Пристальный взгляд** (Страм.).
 - Спазм века (Яб.).
 - Расходящееся косоглазие (Nat-m.).
 - Глаза обращены вверх (Bufo, Supr., Op.).
 - Частое желание вытереть или потереть глаза (Cale., Puls.).
 - Покраснение внутренних уголков глаз.
 - Свищи слезных желез (Puls., Sil.).
 - Боковой нистагм (Supr., Gels.).
 - Мышечная астенопия.
 - Миопия (Фос.).
 - Паралич внутренней прямой мышцы (морф., нац.).
 - Зрачки попеременно сужаются и расширяются при постоянном освещении (ярком).
 - Спазмы век и цилиарных мышц.
 - Зерна ячменя.

УШИ

- Боль в ушах при воздействии **холодного воздуха** (Нер.); облегчается при сверлении уха пальцем (Mez.).
- Результаты теста:
 - Сверление уха пальцами (Arund., Cina, Sil.).
 - Повышенное образование ушной серы (углеводы).
 - Красные уши (Акон.).

Нос

- **Носовые кровотечения из-за головной боли** и сморкания рано утром (Ambr., Bry.).
- Частое или приступообразное **чихание при пробуждении утром** (Am-c., Nux-v.), при **воздействии солнца** (Merc., Sang.), во время и **после кашля**.
- Повышенная чувствительность к резким запахам (Bell., Coff.).
- Обильный, капающий катар, начинающийся в левой ноздре и распространяющийся на правую ноздрю.
- Сухость в носу с ощущением инородного тела, заставляющее ребенка часто сморкаться, но без выделений (заложенности носа).
- Сенная лихорадка с приступообразным чиханием из-за щекотания в правой ноздре, ушах и нёбе, с раздражением в гортани.
- Ночью нос имеет тенденцию закладываться.
- Боль в корне носа с головной болью.
- Результаты теста:
 - **Покраснение** кончика носа.
 - Образование корочек или струпьев в ноздрях (Lac-c.).
 - Болезненность ноздрей (Arum-t.).

Лицо

- Постоянное облизывание (Nat-c., Stram.) сухих губ и причмокивание приводит к образованию прыщей вокруг губ (экзема от облизывания).
- Результаты теста:
 - Синюшно-красное окрашивание лица и губ, особенно вокруг глаз и рта, с лихорадкой (Acon., Bell., Stram.) и головной болью (Glon.).
 - Стиснутые челюсти.
 - Потрескавшиеся губы, особенно в середине нижней губы (Nat-m.).
 - Искажение рта при разговоре.
 - Дистония.
 - Выпадение бровей (Caust., Nit-ac.).
 - Жирное лицо (Nat-m., Thuja.).
 - Ледяное лицо из-за холодного пота.
 - Идиотское выражение лица (Cale., Lyc.).
 - Бледное, осунувшееся лицо.
 - Подергивание мышц лица и верхней губы (Carbo-veg., Zinc.).

РОТ

- Угол рта опущен (паралич Белла); непроизвольное слюнотечение изо рта.

- Жжение кончика языка при лихорадке (Calc-p., Nat-s.).
- Речевые нарушения у детей, страдающих хореей.
- Частое, непреднамеренное прикусывание языка (Bell., Bufo).
- Заикание из-за волнения.
- Результаты теста:
 - Афты на кончике языка (Bry.).
 - Кровоточивость десен.
 - Сухой (Ars., Bell.) картированный язык с торчащими сосочками.
 - Дистония.
 - Пена у рта (Cupr., Hyos.).
 - Язык карты (Бак.).
 - Паралич языка (Оба).
 - Белый налет на языке.
 - Желтушность основания языка.

ШЕЯ

- Постоянное желание сглотнуть.
- Результаты теста:
 - Увеличенные шейные железы.
 - Уплотненные миндалины (Cham., Plb.).

ЖЕЛУДОК

- Повышенный аппетит после еды (или после кормления грудью) (Лус., Phos.).
- Рвота творогом после употребления молока.
- Вздутие живота после еды.
- Удушье и тошнота от кашля (Cina) и после еды.
- Желание поест вечером (натур.).
- Постоянная жажда.
- Ухудшение: Холодная вода.
- Не любит: яйца, хлеб и мясо.
- Пристрастия: **яйца** и соль.

ЖИВОТ

- **Обильное газообразование** (Carbo-veg., Лус.).
- Колики у новорожденных, сопровождающиеся повышенным газообразованием, облегчающиеся дефекацией (Coloc., Nat-s.) или выносом ребёнка на свежий воздух. Во время этих приступов колик **наблюдается болезненность в области пупка** (Plb., Verat.).
- Вздутие живота во время дефекации.
- Газы с отталкивающим, чесночным запахом (Mosch., Ph-ac., Phos.).
- Бульканье.
- Результаты теста:
 - Урчание в животе (урчание и бульканье в кишечнике).
 - Увеличенная печень.
 - Селезенка едва прощупывается.
 - Тимпанит +.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Понос** со стулом **травянисто-зеленого цвета** (Ipec., Mag-c.), водянистым (Chin., Podo.) и зловонным; понос от солнечного тепла (Camph., Carbo-veg.), утром после подъема (Aloe, Podo., Rumx., Sulph.) и в сырую погоду (Nat-s., Dulc.), с вонючими газами и стулом.
- Запор после злоупотребления слабительными (Coloc., Nux-v.); дефекация через день (Nat-m.).
- Стул: сначала твердый, позже жидкий (Bov); зеленый, тестообразный, жидкий, затем твердый стул.
- Результат теста:
 - Болезненность, трёт анус до тех пор, пока он не станет болезненным (Carbo-veg., Graph.).

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Непроизвольное мочеиспускание вследствие возбуждения (Гели).
- Молочная моча (Apis, Нер.).
- Задержка мочи.
- Скудные и редкие выделения мочи.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Результат теста:
 - **Стридор гортани** (Bell., Chlor., Mosch.).

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

- Результаты теста:
 - Частые вздохи (Игн.).
 - Хрипы и глубокое дыхание.

КАШЕЛЬ

- **Кашель заканчивается чиханием** (Bell., Carbo-veg., Squil.) или сопровождается чиханием (Cina, Nat-m.).
- **Сильные приступы кашля заставляют ребенка сворачиваться калачиком** (Ther).
- Аллергический кашель, внезапный (Squil.) и приступообразный, при котором приступы быстро следуют один за другим (Cor-r., Dros.), за которыми следует обильное отделение мокроты (Arg-n., Cос-c.); хуже при пробуждении утром (Thu.j.), при отходе ко сну (Lach., Lyc.) и при прикосновении к наружному слуховому проходу (Lach.); вынужден сидеть прямо во время кашля (Bru., Con., Phos.).
- Белая мокрота.

ГРУДЬ

- Обильная ночная потливость (Кейл).
- Результаты теста:
 - Потрескивание, когда лежишь на спине.
 - Рентгенограмма: Первичный комплекс (Примечание: клинический термин для обозначения типа туберкулеза легких, при котором туберкулезные палочки, вдыхаемые в альвеолы, вызывают субплевральное воспалительное повреждение и инфекцию регионарных лимфатических узлов, что обычно разрешается с образованием местной кальцификации, т. е. туберкулезных бугорков).

НАЗАД

- Слабость в шее после физической нагрузки (Kali-c., Sil.).
- Результат осмотра: ригидность мышц шеи.

КОНЕЧНОСТИ

- **Болезни роста** (Calc-p.).
- **Подергивания**, особенно нижних конечностей, при засыпании (Ars., Kali-c., Zinc.).
- **Спотыкается при ходьбе** (Caust., Ipec.).
- Очень **неуклюжий** и **неловкий** (Calc., Ipec.). Часто роняет вещи и спотыкается при ходьбе.
- Ночная потливость ног (Calc., Merc.).
- Подергивание нижних конечностей при засыпании (Arg-met., Ars.).
- Результаты теста:
 - Атаксия (Alum., Con.).
 - Атетоз +.
 - Ягодицы холодные на ощупь (Кейл.).
 - Хореоподобные движения +.
 - Повышение сухожильных рефлексов (Lath., Nux-v.).
 - Дистония +.
 - Связывание мышц +.
 - Ледяные ступни (Camph., Carbo-veg., Sil.).
 - Х-образные колени (Кокк.).
 - Миоклонус.
 - Болезненные мозоли на руках и ступнях.
 - Беспокойные пальцы (Kali-br., Med.) и кисти рук (Tarent.).
 - Чувствительность голени (Lach.).
 - Синдром Туретта.

СПАТЬ

- **Ребенок засыпает во время** (Calc-p., Kali-c., Phos.) **или после кормления грудью** (Nux-v.).
- Бессонница из-за возбуждения (Coff.), **зуда** (нейродермит) (Apis, Merc., Sulph.) или **боли в ногах** (Kali-bl., Mez., Syph.).
- Частое, прерывистое, спазматическое зевание.
- Крики во сне.
- Вздрагивает при засыпании.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Озноб: дрожь на свежем воздухе или от малейшего движения.
- Жар: Жар в верхней части тела. Гиперпирексия.
- Потоотделение: обильное во время сна. Холодный пот на лице, шее и груди.

КОЖА

- Результаты теста:
 - Ангионевротический отек (отек Квинке) (Антип.).
 - Нейродермит, характеризующийся чрезмерным, сильным зудом; ребенок расчесывает кожу до тех пор, пока она не станет болезненной и не начнет кровоточить (Граф., Петр.).

ХОРЕЯ

- Хорея от **мастурбации** (Calc., Cina) и **наказания** (Ign., Nat-m., Staph.); хуже от холода, свежего воздуха и эмоционального возбуждения (Ign., Op., Phos.), такого как ужас (Caust.); лучше во время **сна** (Cupr., Hell., Mygal.).
- **Хорея с выраженными мышечными подергиваниями** (Hyos., Mygal.).
- **Сиденгамская хорея** (Агарин., Арт-в., Зиз.).

Судороги

- Недомогания, вызванные: энцефалитом или менингитом, возбуждением (Hyos., Op.), страхом (Cale., Kali-br.), **гиперпирексией** (Nux-v., Stram.), травмами (Arn.), **наказанием** (Cham., Cina) или **упреками** (Ign.), шоком (Op.), подавлением кожных высыпаний (Cupr., Sulph.) и гневом (Cupr., Staph.).
- При судорогах: **цианотичное лицо** (Cic., Verat.), пена у рта и увеличение физической силы.
- Тип: Grand Mal, Petit Mal или простые судороги, вызванные лихорадкой.
- Модальности: **Судороги облегчаются рвотой** (многие симптомы Agar облегчаются секрецией, как у Lach., Phos., Puls и Sulph.) [*Общее; Судороги - Рвота - во время: Cupr., Ipec.*].
- Судороги у агарового ребенка не следует подавлять фенобарбитолом, вальпроатом, карбамазепином, клобазамом, клоназепамом, ламотриджином или примидоном, поскольку такое подавление приводит к еще более агрессивным судорогам (Absin., Caust., Mill.).

Общий

- Большинство жалоб облегчаются под воздействием **моря** (Среднее, Ванна).
- Пот окрашивает одежду **в зеленый цвет** (Купр.).
- **Подергивание** одной или группы мышц (Цинк.).
- Чувствительность к холодному воздуху (Cale., Kali-c., Psor.).
- Хуже от ходьбы на свежем воздухе, лучше от тепла постели.

АГАТИС ЮЖНЫЙ

(Ель каури - Агат-а.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ В центре внимания этого средства – психические симптомы. У ребёнка развивается множество физических проблем из-за чувства стыда или смущения. Стыд или смущение возникают из-за болезненного чувства, что он больше не нравится окружающим, из-за неподобающего поведения родителей или учителей, или когда ребёнок сталкивается с чем-то постыдным или неловким. В результате способность ребёнка концентрироваться во время учёбы серьёзно ухудшается, его уверенность в себе падает, а мысли путаются. Ребёнок становится всё более подавленным, замкнутым и унылым. Он становится вялым и безразличным к людям (семье и друзьям), теряет интерес к играм с другими детьми или к учёбе.
- ▶ Чувство беспомощности, сопровождающееся серьёзными трудностями при обучении речи: ошибки в произношении, неправильное расположение слов, искажение их смысла, использование не тех слов. Ошибки при письме: написание не тех букв, неправильных цифр или перестановка слов.
- ▶ Плач по мелочам.
- ▶ Похожие ситуации случаются и во сне. Сны о тонущих лодках, о том, что их ударили, об опасности, о надвигающейся опасности, о пожаре или о других ужасных вещах.
- ▶ Это депрессивное состояние может привести к булимии с компульсивным перееданием. Чтобы вернуть утраченную любовь или престиж, ребёнок иногда ведёт себя совершенно противоположным образом. Он может быть очень весёлым, очень добрым, очень шумным, очень ласковым или очень милым. Такие дети никогда не могут простить людей, которые причинили им настоящую боль, или оправдать своё поведение. Ненависть и горе надолго остаются в их памяти.
- ▶ Иногда они прибегают к пению или танцам, чтобы на время забыть о своих душевных ранах. Странные гримасы и кривляния могут быть важными подсказками к скрытому горю.
- ▶ Чрезвычайно склонен к головным болям. Давящая боль, как от повязки. Чувствительность к свету во время головных болей.
- ▶ Морщинистое лицо.
- ▶ Аллергия на пыльцу или домашнюю пыль с частым чиханием. Постоянное чихание и водянистые выделения из носа.
- ▶ Сильное желание хлеба, шоколада и фруктов.

- ▶ Дискомфорт в животе, урчание, бульканье или метеоризм, диарея с мягким, кашицеобразным стулом.
- ▶ Нарушения сна из-за мыслей и сновидений.
- ▶ Сильное потоотделение.

Источник

- Семейство Араукариевые. Существует два теста: один Миши Норланда (Англия, 1993) и один Аластэра Грея (Австралия, 1995).

АГРАФИС ПОНИКАЮЩИЙ

(Звездный гиацинт - Агра.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Заложенность носа из-за полипов.
- ▶ Полипы с увеличенными миндалинами, особенно во время прорезывания зубов. Рот всегда открыт. Потеря слуха из-за увеличенных миндалин, как у Мере и Кали-би.
- ▶ Синусит, сопровождающийся очень стойкими носовыми полипами.
- ▶ Чрезвычайно чувствителен к холодному воздуху, сквознякам и холодным напиткам.
- ▶ Диарея после холодных напитков.

Источник

- Также называется колокольчиком и принадлежит к семейству лилейных (Liliaceae).

АЙЛАНТ ЖЕЛЕЗИСТЫЙ

(Китайское небесное дерево - Аил.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Во время делирия ребенок бормочет что-то себе под нос, беспокоен и не замечает никого вокруг.
- ▶ Темно-красное лицо.
- ▶ Глаза наполнились слезами.
- ▶ Кровянистые, раздражающие, жидкие, водянистые выделения из носа, образующие обильные корки.
- ▶ Боль в горле, вызванная ветряной оспой, корью, свинкой или другими вирусными или бактериальными инфекциями, такими как стрептококк или вирус Эпштейна-Барр.
- ▶ Фарингит с высокой температурой, ступорозным бредом и тёмной, милиарной сыпью. Горло опухшее, воспалённое, тёмно-багровое и красное. Миндалины увеличены, тёмные, с мелкими язвочками. Язык обложен коричневым налётом, сухой, потрескавшийся и запекшийся. Неприятный запах изо рта и носа, напоминающий трупный.
- ▶ При глотании сильная боль в горле, отдающая в уши.
- ▶ **Сопутствующее истощение** — ключевой симптом этого препарата. В этом отношении Ail. очень похож на Carb-ac. и Merc-su.
- ▶ Постоянное недомогание и ослабление после лихорадочной кожной сыпи, стрептококковой инфекции или мононуклеоза.

Источник

- Происходит из Китая и также называется небесным деревом (семейство Simarou baceae).

АЛКОГОЛЮС

(Винный спирт - Алко.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Этиловый спирт очень эффективен в случаях

- ▶ **Трудности в обучении:** неспособность сосредоточиться; допускает ошибки при письме; испытывает трудности с запоминанием изученного.
- ▶ **Расстройства речи:** нарушение речи и говорения, характеризующееся спутанной, поспешной и бессвязной речью.
- ▶ **СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности):** характеризуется чрезмерной активностью; попытками побега; желанием поджечь предметы; безрассудством; вскакиванием; неумеренным смехом; беспокойством; криками и пением.
- ▶ **антиобщественное поведение** с оскорблениями, жестокостью, руганью, ложью, злобой, гневом и насилием.
- ▶ **неврологические нарушения** у детей, характеризующиеся неуклюжестью нижних конечностей, спотыканием при ходьбе;
- ▶ Желание употреблять в пищу чрезмерное количество горчицы и перца.

АЛОЭ СОКОТРИНА

(Алоэ обыкновенное - Алоэ.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Поведенческие проблемы, а также диарея**, являются важным направлением действия этого средства.
- ▶ Характерным для таких детей является чрезмерная умственная активность, например, в играх, рукоделии, математике и т. д., которая сменяется безразличием, усталостью и умственным истощением. Ребёнок колеблется, словно маятник, между удовлетворенностью и резким недовольством. Иногда у него могут внезапно возникнуть недовольство и раздражительность. Часто это приводит к ссорам. Это состояние вызвано эмоциональным возбуждением ребёнка.
- ▶ Раздражает, злит, раздражает и падает в обморок даже при малейшей боли или дискомфорте, например, при запоре.
- ▶ Психическая неуверенность. Например, страх одиночества; страх толпы; страх врача; страх смерти; страх неудачи; тревога по пустякам; страх будущего.
- ▶ Также наблюдается неуверенность на уровне прямой кишки; **диарея** усиливается от кислого и фруктов, после перегревания, гнева и устриц.
- ▶ Воспалительный колит у подростков в период полового созревания. Основным симптомом является ощущение **непроизвольной дефекации с метеоризмом**.
- ▶ Сильная жажда освежающих напитков, особенно фруктовых соков.

Источник

Также называется Алоэ ферокс и принадлежит к семейству лилейных (Liliaceae).

АЛЮМЕН

(Выпускник - Выпускник.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Лень [заголовки: отвращение ко всему; желание остаться в постели; скука].
- ▶ Постоянно издевается над близкими людьми, такими как родители, друзья и соседи.
- ▶ Хронические полипы носа, особенно слева.
- ▶ Увеличенные и твердые миндалины из-за рецидивирующего тонзиллита, приводящие к увеличению и чувствительности шейных лимфатических узлов.
- ▶ Очень холодный и склонный к рецидивирующим инфекциям среднего уха с синуситом. Провоцируется свежим или холодным воздухом.
- ▶ Необычно твердый и затрудненный стул, почти как камни. Стул выходит с длительными интервалами, например, один-два раза в неделю. Болезненная, чувствительная прямая кишка, причём анус продолжает болеть ещё долго после выхода этих твердых комков. У Sep. и Plb. наблюдается схожий тип запора.
- ▶ Желание холодной воды, фруктов и трудноперевариваемой пищи. Теплая или горячая пища обычно облегчает многие физические недомогания.
- ▶ **Болезнь Гиршпрунга или кретинизм.**
- ▶ Семейный анамнез рака и диабета.

АМБРА ГРИЗЕА

(Выделения из кишечника кашалота - Амбр.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Не может участвовать в мероприятиях, требующих демонстрации в присутствии других** (например, играть во дворе, заниматься групповыми видами спорта); предпочел бы остаться дома и играть в компьютерные игры, карты, шахматы или читать книги.
- ▶ Крайне **неуклюжий** (Apis, Caps., Nux-v.) в движениях и внешнем виде; постоянно роняет вещи из рук или сталкивается с людьми или мебелью во время ходьбы, сидения или выполнения других действий.
- ▶ Физические и эмоциональные проблемы, вызванные **шоком или горем** в связи со смертью родителей или бабушек и дедушек.
- ▶ **Чувствителен к музыке**, особенно к классической и инструментальной, которая обременяет его эмоционально, вызывая меланхолию и плач.
- ▶ Когда детей наказывают в школе или дома, у них развиваются сложные эмоциональные и физические расстройства.
- ▶ Неуверен в себе, считает себя никчемным; застенчив, труслив и легко смущается.
- ▶ Замедленность чтения или письма, особенно когда внимание сосредоточено на таких предметах, как естественные науки, физика, математика и т. д.
- ▶ Маленькие дети легко краснеют, когда о них говорят или хвалят.
- ▶ Легко смущается по самым незначительным поводам. Старается не привлекать к себе внимания и чувствует себя неловко в своих действиях и поведении. Поэтому избегает публичных мероприятий и выступлений на сцене, не высказывается на уроках.
- ▶ Школьники постоянно беспокоятся о том, что о них думают другие (родители, друзья, учителя и родственники). Эта озабоченность приводит к контролируемому поведению, при котором каждое слово и действие тщательно обдумываются, чтобы предотвратить возникновение негативного мнения. Мнение других всегда имеет первостепенное значение.
- ▶ Слишком робки и застенчивы, чтобы постоять за себя, даже в ситуациях сексуального насилия. Застенчивость и робость приводят к трусливому поведению.

Тело

- ▶ Аллергическая астма и другие аллергии верхних дыхательных путей, вызванные такими поведенческими моделями, как застенчивость, неуклюжесть и смущение.
- ▶ Худые, истощенные дети, которые легко простужаются.
- ▶ Ребёнок не любит ходить в туалет в присутствии незнакомых людей, родственников, друзей, а иногда и членов семьи. Он дожидается, пока не останется один, прежде чем сходить в туалет. Он испытывает застенчивость и смущение, когда его замечают идущим в туалет.

Другие важные симптомы

Дух

- **Грызть ногти.**
- **с умственной отсталостью** (с проблемами с математическим анализом, детским церебральным параличом и угнетением), не имеющие органического поражения мозга, страдают от этого. Эта отсталость обусловлена, прежде всего, поведенческими и личностными - расстройствами, в частности, плохой концентрацией внимания, особенно при абстрактном мышлении (например, в геометрии), и слабыми языковыми навыками. Им приходится многократно перечитывать один и тот же текст, чтобы понять информацию.
- Легко возбудим и нервозен в присутствии незнакомых людей, что проявляется множеством физических симптомов, таких как кашель, неуклюжесть и т. д.
- Легко пугается.
- Любовь к животным.
- Чрезмерно чувствительные дети, легко поддающиеся чужому влиянию.
- Терпеть не может людей с улыбающимися лицами и легкомысленным поведением; постоянно чувствует, что над ним смеются и издеваются.

Голова

- Раннее поседение волос, начинающееся в период полового созревания.
- Результат теста:
 - Себорейный дерматит на волосистой части головы (Dulc., Нер.).

Глаза

- Результат теста:
 - Расширенные сосуды склеры.

Нос

- **Ночью заложен нос** (Am-c., Лус.); приходится дышать ртом.
- Постоянное желание высморкаться (Borx., Kali-bi.).
- Носовое кровотечение по утрам при умывании (Ars., Calc-s.).
- Результаты теста:
 - Сухость ноздрей.
 - Сероватые выделения из носа.

Лицо

- **Потливость одной стороны лица** (Bar-c., Nux-v., Puls.).
- Результаты теста:
 - Сжатые челюсти (Bell., Oena., Stram.) или **тризм у новорожденных**.
 - **Левая щека красная** (Phos.).
 - Ангулярный хейлит.
 - Смущенный взгляд.
 - Подергивание мышц лица, особенно губ и жевательных мышц.

РОТ

- Кислый привкус во рту после употребления молока.
- Результаты теста:
 - **Ранула** (Calc.).
 - Кровоточивость десен.
 - Кариес.
 - Постоянное стискивание зубов (Hyos., Lys.).
 - Неприятный запах изо рта.

ШЕЯ

- Ощущение удушья при прочищении горла (Arg-n., Nux-v.).
- Постоянное желание прочистить горло.

ЖЕЛУДОК

- После кормления грудью или приема пищи ребенок кашляет и давится (явный признак пищеводно-трахеального свища).
- Отрыжка во время или после сильного судорожного кашля.
- Отсутствие жажды.
- Теплое молоко вызывает расстройство желудка (Aeth., Mag-m.), кислый привкус и отрыжку.
- Желание: соль.

ЖИВОТ

- Вздутие живота после каждого укуса или глотка.
- Результаты теста:
 - Вздутый, тимпанический живот.
 - Печень увеличена и болезненна при пальпации.
 - Пот на животе (Cic., Phos.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запоры у детей (Calc., Op.), особенно когда они не находятся дома.
- Частые, бесплодные позывы к дефекации, которые вызывают у ребенка беспокойство и смущение.
- Зуд в анусе, облегчающийся при растирании ануса.
- Результат теста:
 - Острицы и сегменты ленточных червей в стуле.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- **Может мочиться только находясь в комнате один** (Hep., Lyc., Nat-m.).
- Частое мочеиспускание ночью и утром **после** пробуждения (Phos.).
- **Моча имеет кислый запах** (Calc., Sep.).
- Склонность к развитию нефротического синдрома.
- Чаще мочится, чем тонет (Bell., Coloc., Nux-v.).
- Результаты теста:
 - Коричневый или красный осадок, похожий на кофейную гущу, в подгузнике — симптом алкаптонурии.
 - Камни в мочевом пузыре.
 - Моча: Альбумин ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Невыносимый зуд половых органов.
- Склонность к мастурбации.
- Результаты теста:
 - Простой хронический лишай кожи мошонки .
 - Паховый дерматомикоз.

ДЫХАНИЕ

- Астматическое дыхание после **эмоций** (гели, игн.) или волнения.
- Результат теста:
 - Хрипы, свист или затрудненное дыхание.

КАШЕЛЬ

- Кашель в обществе других людей, при прослушивании **музыки** (Kali-c.) и при **чтении вслух** (Dros., Phos.).
- **Кашель только ночью** (Caust., Petr.).
- **Отрыжка вызывает кашель** (Lob., Staph.).
- Синевато-белая, солоноватая мокрота.
- Кашель вызывает одышку у детей.
- Кашель с истощением.

КОНЕЧНОСТИ

- **Неуклюжесть** (Bov., Ipec.); **спотыкается при ходьбе** (Agar., Caust., Ipec.).
- **Тремор конечностей при разговоре.**
- Ночные подергивания конечностей (Кали-и).
- Результаты теста:
 - **Ледяные руки** (Nux-m., Verat.), особенно левая.
 - Ломкие ногти.
 - Сокращение мышц и сухожилий.
 - Болезненность между бедрами.
 - Мышечная дистрофия.
 - Пот на внутренней поверхности бедер.

СПАТЬ

- Тревожные и гневные сны.
- Спит, согнув локти и колени.
- Разговаривает во сне.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Кашель повышает температуру.
- Повышение температуры, особенно к вечеру.

Общий

- диабет .
- В помещении, полном людей, все симптомы ухудшаются.
- Спазмы и подергивания мышц.
- Теплое молоко ухудшает состояние, холодная еда и напитки — улучшают.
- Слабый, плаксивый, умственно недоразвитый, худой и истощенный - ребенок; он похож на маленького, обезвоженного старичка.

БРОМИСТЫЙ АММОНИЙ

(Бромистый аммоний - Am-br.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Нервозный и застенчивый; неуверенный в себе и испытывающий отвращение к присутствию незнакомцев.
- ▶ **Острый ларингит или коклюш.** Ощущение удушья при кашле, вызывающее сильное беспокойство в начале приступов кашля.
- ▶ Глубокий, влажный, короткий и внезапный кашель, усиливающийся по утрам, при вставании и в постели. Усиливается при любом голосовом напряжении. Большинство симптомов кашля и боли в горле усиливаются между 2 и 4 часами утра.
- ▶ **Эпилепсия.**
- ▶ Привычка грызть ногти из-за постоянного раздражения кожи под ногтями.

АМФИСБЕНА ЧЕРВЕОБРАЗНАЯ

(Двуххотый - Амф.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Угревая сыпь, если одновременно присутствуют запор, паховая или пупочная грыжа.
- ▶ Склонность к рецидивирующим тонзиллитам, при которых невозможно глотать слюну.
- ▶ Зубы крепко сжаты из-за постоянного напряжения.

Источник

- Доктор Бенуа Мюр из Бразилии ввёл в гомеопатию ящерицу (род ящериц), хвост которой напоминает вторую голову. Потенцированные змеи используются для укрепления их челюстей.

ANANTHERUM MURICATUM

(Трава кускуса - Анан.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Эгоистичные и высокомерные, дети хотят произвести впечатление своим гротескным стилем одежды и таким образом привлечь к себе внимание.
- ▶ Очень сильное желание путешествовать.
- ▶ Чрезмерная **мастурбация**, мастурбация из-за крайней ревности.
- ▶ Ослабление жизненных сил из-за чрезмерной мастурбации, что может привести к эпилепсии, герпесу, прыщам, крапивнице, экземе и рецидивирующим абсцессам на конечностях.
- ▶ Постоянная тенденция стискивать зубы.
- ▶ Чрезмерный аппетит (булимия) из-за ревности.
- ▶ Неутолимая жажда ароматных напитков, холодной воды и кислых напитков.
- ▶ Склонность к грибковым поражениям ногтей, приводящим к деформации ногтей.
 - ▶ Зловонный пот на ногах.

Источник

- Семейство злаковых (Gramineae). Родом из Ост-Индии.

ЭНДРОКТОНУС Амурреукси Гебраеус (Скорпион - Андрок.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Биполярное расстройство, пограничное расстройство личности или другие социальные расстройства личности, расстройства адаптации и расстройства настроения.
- ▶ Семейные ситуации (родители-одиночки; ребенок живет в обстановке страха дома; любой вид физического, эмоционального или сексуального насилия) вызывают у детей гнев.
- ▶ Личность становится очень агрессивной, разрушительной, презрительной, диктаторской и гневливой. Даже прерывание может быстро спровоцировать гнев. В гневе ребёнок может бросать предметы или вести себя крайне агрессивно.
- ▶ Дети очень критичны и всегда чувствуют, что люди — учителя, общество или родители — существуют только для того, чтобы их мучить. Более того, они живут с мыслью о том, что они — жертвы.
- ▶ У этих детей слабая эмоциональная связь со сверстниками. Они постоянно спорят, очень импульсивны и нетерпеливы по своей природе. Если ситуация выходит из-под контроля, они могут стать крайне агрессивными и даже нанести физический вред своим сверстникам.
- ▶ Очень важное средство при **синдроме Аспергера**. Ребёнок очень беспокоен, неуклюж и испытывает трудности с концентрацией внимания, особенно при чтении и письме. Разум постоянно находится в состоянии спутанности.
- ▶ Друзья очень важны для этих детей, поскольку они зависят от них. Часто они действуют только из страха потерять их. Тем не менее, их социальное взаимодействие крайне ограничено. Часто всё заканчивается ссорами, и поэтому они не пользуются особой популярностью у друзей.
- ▶ Эти дети очень увлечены спортом. Они обожают водить машины. Даже в 12 лет они хотят водить и наслаждаться захватывающими гонками.
- ▶ Они очень хороши в танцах.
- ▶ **Мигрени**, особенно когда голова болит во время сна или после пребывания на солнце. Лучше на свежем воздухе.
- ▶ Заикание при разговоре.
- ▶ Маленькие дети, которые не могут переваривать яйца, испытывают тошноту и рвоту всякий раз, когда едят яйца.
- ▶ Желание съесть апельсиновый сок, съесть хлеб и шоколад.
- ▶ Очень хочется пить.
- ▶ Морозостойкий, очень быстро замерзает, но в то же время любит ветер.

АНИСУМ ЗВЕЗДЧАТЫЙ

(Бадьян - анис.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Сухие губы.
- ▶ Очень склонен к **образованию язв во рту.**
- ▶ **Метеоризм и вызванные им колики.** Колики, вызванные амёбными инфекциями, глистами или энтеровирусными инфекциями. Сильные спазматические боли в животе с метеоризмом. Эта боль, вызванная вздутием живота, носит периодический характер. Она повторяется в одно и то же время каждый день.
- ▶ Желание съесть хлеб, особенно ржаной.

Источник

- Это небольшое средство относится к семейству бадьяновых (Schisandra - spp.). Оно было испытано доктором Бенуа Мюром в 1845 году.

ANTHEMIS NOBILIS

(Римская ромашка - Anth.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Аллергический вазомоторный ринит.**
- ▶ Очень прозрачные, водянистые и обильные выделения из носа, преимущественно из левого носа, с чиханием и слезотечением. Насморк усиливается в тёплых помещениях.
- ▶ **Амёбные инфекции или глистные инвазии**, особенно аскаридами, сопровождаются сильными коликами и спазмами в животе. Увеличенная и чувствительная печень, а в случае глистных инвазий или других инфекций, как правило, сопровождается диареей.
- ▶ Сильный зуд в анусе. Темный, кашицеобразный, белый, желтый и бледный стул.

Источник

- Относится к семейству астровых (Asteraceae/Compositae) и был введён в гомеопатию доктором Берриджем . Из цветков заваривают чай.

АНТИМОНИУМ КРУДУМ

(Сульфид сурьмы - Ant-c.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Отвращение к любому прикосновению, сопровождающееся сильным страхом** (Arn., Bell., Cham.). Это состояние обычно передаётся от матери к ребёнку, если она испытала разочарование во время беременности.
- ▶ Выраженное отвращение к купанию (Sulph.).
- ▶ **Ворчливый, без агрессии** (в отличие от Cina, Cham., Cur., Stram., Tub.).
- ▶ Гнев и раздражительность в ответ на каждый дружеский жест.
- ▶ Булимия вследствие разочарования или горя (Ign., Nat-m.).
- ▶ Дети настолько заняты, что забывают сходить в туалет, потому что слишком поглощены своим занятием; с другой стороны, им просто лень вставать.
- ▶ Дети скучны и не проявляют интереса к учебе; вместо этого они предпочитают читать книги, романы или комиксы.
- ▶ У детей может развиться синдром Аспергера. Рассмотрим следующие категории:
- ▶ Гнев на каждый маленький жест.
- ▶ Страх прикосновения.
- ▶ Не просите ничего.
- ▶ Отвращение к ласкам.
- ▶ Отвращение к обществу.
- ▶ Отвращение ко всему.
- ▶ Недоволен всем.
- ▶ Не хочет, чтобы его беспокоили.
- ▶ Страх приближения других.
- ▶ Страх прикосновения.
- ▶ Раздражительность из-за того, что на него смотрят.
- ▶ Раздражительность из-за того, что с ним разговаривают.
- ▶ Раздражение от прикосновений.
- ▶ Мизантропичный.
- ▶ Отвратительная атмосфера.
- ▶ Кричит при прикосновении.
- ▶ Сердитый.
- ▶ Неуклюжие и неловкие дети (Agar., Merc., Nat-m., Apis).
- ▶ Склонен к слезам, плачет по малейшему поводу (Пульс.).
- ▶ Сильное воображение; предпочитает жить в иллюзорном идеальном

мире;

тоскует по вещам, по которым скучает или которые у него отняли.

- ▶ Их живое воображение делает их увлечёнными поэзией. Они могут писать стихи спонтанно (китайский).

- ▶ Нарушения социальных контактов и общения.
- ▶ Крайне сварливые дети; они говорят всем не трогать, не целовать, не обнимать и не беспокоить их; на самом деле, они ненавидят любой контакт или ласку; всегда в настроении «не трогай меня».
- ▶ Раздражительный, ни с кем не здоровается в доме, прячется где-нибудь в доме или запирается в своей комнате.
- ▶ Дети препубертатного возраста, которые предпочитают жить в собственном воображаемом мире преувеличенных романтических чувств, в котором они испытывают сильные эмоции и представляют себе романтические сцены из фильмов и романов, придумывают истории и интенсивно проживают эти фантазии (Nat-m., Staph.).
- ▶ Нежные, чувствительные дети; легко расстраиваются эмоционально, начинают плакать, если их эмоционально задеть.
- ▶ Гиперчувствительные дети (стафилококк); родителям очень трудно их воспитывать и жить с ними.

Тело

- ▶ У детей отсутствует нормальный чистый, яркий, мелодичный голос; их голос довольно резкий и хриплый, звучит неприятно от рождения.
- ▶ Дети, страдающие метеоризмом и постоянно выпускающие газы (Chin., Lys., Myric.).
 - ▶ Чувствительность к любому холодовому воздействию (напитки, сквозняки, еда, погода).
 - ▶ Дети, как правило, имеют избыточный вес и становятся толстыми в период полового созревания (Кейл).
 - ▶ Дети с семейной предрасположенностью к ревматизму, артриту и подагре (Lith-c., Med.).
 - ▶ Дрожит, но все еще не переносит жару от солнца или огня и не любит находиться в плохо проветриваемых помещениях.
 - ▶ Врожденная склонность к расстройствам пищеварения после употребления хлеба (Bry., Puls.) и пирожных (Lys., Phos.).
 - ▶ Расстройство пищеварения и проблемы с желудком как следствие недостатка любви и ласки.
 - ▶ Рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей вследствие чрезмерного купания, плавания и т. д. (Am-c., Calc-s.).
 - ▶ Сильное желание кислой пищи, например, солений и маринованных овощей (Her., Verat.).
 - ▶ Утолщения кожи, такие как мозоли, натоптыши и т. п. (Cale., Lys., Sep., Sil.), особенно на ладонях и подошвах ног.
 - ▶ Триада признаков муравьиного склероза лица: потрескавшиеся губы, бледное лицо и красные щеки.

Дифференциация АНТ-С. и СНАМ.

Ant-c. и Cham. схожи и поэтому должны быть четко дифференцированы.

Общие симптомы :

- Гнев или раздражительность при прикосновении.
- Едкие ответы.

- Отвращение к купанию.
- Купание ухудшает ситуацию.
- Не могу выносить, когда на меня смотрят.
- Не терпит противоречий.
- Желание съесть кислую пищу.
- Страх купания.
- Красное лицо.
- Страх прикосновения.
- Страх приближения других.
- Желудочная лихорадка.
- Раздражает, когда на него смотрят.
- Молоко ухудшает ситуацию.
- Упрямые дети.
- Трещины на коже.
- Сладости ухудшают ситуацию.
- Белый налет на языке.

Чам в основном показан при следующих симптомах:

- Никаких фантазий и мечтаний.
- Оскорбительный, нетерпеливый (Ант-с более ленивый) и грубый (Ант-с более сентиментальный).
- Желание съесть хлеб (Ант-с предпочитает соленые огурцы).
- Хмурится.
- Сильный страх перед ветром.
- Лицо краснеет от гнева.

Дифференциация ANT-C. и SULPH.

Поскольку в состав Ant-с. входит сера, между этими двумя препаратами есть много общего.

Распространенные **симптомы** :

- Грызть ногти.
- Не могу выносить, когда на меня смотрят.
- Хочет, чтобы его несли.
- Недоволен всем.
- Отвращение к прикосновениям; очень боится щекотки.
- Не желает, чтобы с ним разговаривали.
- Экстази.
- Страх прикосновения.
- Не хочет, чтобы за ним следили.
- Страх замкнутого пространства.
- Жесты, топание ног.
- Вялый, беспечный и ленивый.
- Легко ранен.
- Сентиментальный.

Другие важные симптомы

Дух

- Ребенок выглядит **рассеянным и находится в сонном состоянии**.
- **Ленивые дети** (Graph., Sulph.), которые все откладывают на потом и не хотят никакой деятельности.
- Задержка развития у детей (Cale., Vac., Op.).
- Привычка грызть ногти из-за страха и эмоциональной неуверенности (мед.).
- Дети полностью отказываются от еды; это следует интерпретировать как признак отказа от пищи из-за глубокого эмоционального потрясения.
- Грубые, избалованные дети, которые в гневе реагируют резко, дергают за волосы, пинаются и бросают вещи (Chin., Rheum., Staph.).
- Вздрагивает и вскрикивает от малейшего шума, особенно от звона колоколов (Kali-c., Nat-c., Sil.) и во время сна.
- Плачет по пустякам (Caust.).

Голова

- **Желудочная головная боль** после употребления сладостей, citrusовых (Bell.), холодных напитков, особенно колы, таких как Coca-Cola и Pepsi (Bry., Kali-c.), или жирной пищи, такой как пирожные, сыр фета, запеканки (Carbo-veg., Ipec., Puls.), а также после фруктов, особенно кислых.
- Головная боль после подавления простуды (применением антигистаминного сиропа, назальных капель или назальных спреев) (Dulc., Nux-v.), а также после **мытья головы** или принятия ванны (особенно холодной) (Nux-m., Rhus-t., Sep.); лучше от выхода на свежий воздух (Phos.).
- Мигрень со склонностью к выпадению волос (Nit-ac., Sep., Sil.), носовые кровотечения, тошнота и рвота.
- Результаты теста:
 - **Сыпь на коже в виде корок и струпов** (Clem., Graph.).
 - Открытые роднички (Cale., Ipec., Sil.).

Глаза

- Липкие веки.
- Результаты теста:
 - Блефарит +.
 - Конъюнктивит +.
 - Слезы в уголках глаз (Lyc., Nat-m.).
 - Воспаление слезного мешка.
 - Запавшие глаза (Кина).

Уши

- Результат теста:
 - Мокнущие высыпания за ушами (график).

Нос

- Хроническое насморк (с заложенностью носа) (Lyc., Nux-v.); **насморк усиливается от** любого вида **тепла**, особенно в жарком, душном помещении (All-c., Puls., Sulph.).

- Носовое кровотечение при сморкании.
- Боль в носовой полости из-за постоянного сморкания.
- Результаты теста:
 - Холодность кончика носа (Apis).
 - Ноздри воспалены (Mere), сухие и покрыты коркой (Kali-bi., Lac-c.).

Лицо

- Угри из-за желудочных заболеваний (Carbo-veg., Nux-v., Puls.) с сильным зудом.
- Результаты теста:
 - Трещины в уголках рта и губ.
 - Импетиго (этот симптом наблюдается чаще всего) (Crot-t., Viol-t.), характеризующееся желтоватыми, корковыми, шелушащимися, экзематозными поражениями кожи, напоминающими засохший мед.
 - Впалое лицо (предательство).

Рот

- Затрудненное прорезывание зубов.
- Во время лихорадки пища кажется горькой (китайск.).
- Чувствительные зубы; крики, вопли и визги во время чистки зубов, удаления зубов или хирургических операций (Ign., Mag-c., Staph.).
- Результаты теста:
 - Афтозные язвы.
 - Язык с картой (Tarax.) или толстый, молочно-белый или желтый налет (Bry) на задней трети языка, боковые стороны чистые.
 - Обильная, вонючая слюна.
 - Губчатые десны, которые легко отделяются от зубов и сильно кровоточат.

Шея

- Ощущение комка или инородного тела в горле, не проходящее после глотания.
- Результаты теста:
 - Отек и затвердение поверхностных и глубоких шейных желез.
 - Густые, желтые выделения из ретроназальной области.

Желудок

- **обычно чувствует любое эмоциональное возбуждение** (ужас, горе, боль) в желудке (Cale., Cham., Coloc., Nux-v., Phos.); например, колики, запор, понос, метеоризм, расстройство желудка и тошноту.
- **Тошнота, которая легко развивается и сохраняется** с рождения у детей со слабым пищеварением и склонностью к гепатиту А; тошноту вызывают запах и мысли о пище; тошнота возникает после употребления хлеба (Zinc.), молока, выпечки, тяжелой жирной пищи (Ipec., Puls.), а также от пугающих событий, например, просмотра фильма ужасов (Bry., Nux-v.).
- Расстройство пищеварения после молока (Chin., Mag-m.) и кислой пищи (Nux-v.), а также у детей, склонных к перееданию (Iod.).
- Громкая, зловонная отрыжка с отхождением зловонных газов.

- Боль в желудке с тошнотой и вздутием живота от употребления хлеба (Bry., Caust.), молока (Ambr.), тяжелой и кислой пищи (Asaf.) или citrusовых.
- Болезненное вздутие эпигастрия после возбуждения (Cham., Coloc.); хуже от надавливания и прикосновения.
- Утренняя тяга к еде.
- Замедленное, нарушенное пищеварение с отвращением к пище в теплую погоду.
- Отсутствие жажды во время лихорадки, но жажда после потоотделения и во время озноба.
- Рвота: Возникает сразу после кормления грудью (Nat-c., Sil.) или после употребления молока; рвота непосредственно после еды (обеда и ужина) (Ars., Ferr., Kali-bi.); у детей во время прорезывания зубов и во время кори; рвота имеет консистенцию створоженного молока (Aeth., Cale., Sil.).
- Обострение: хлеб, масло, вишня, холодные напитки, мучная и жирная пища, грудное молоко, выпечка, соленья, свинина, тяжелая пища, кислые продукты и фрукты, клубника, сладости и уксус.
- Отвращение: хлеб, пахта, огурцы, яйца, фрукты и кислая пища.
- Пристрастия: citrusовые, холодные напитки, огурцы, жареная пища, трудноперевариваемая пища, маринованное мясо, соленья, сырые овощи, кислая пища, специи, сладости и уксус.
- Результат теста:
 - Гастроскопия: гастрит, инфекция *Helicobacter pylori*.

ЖИВОТ

- Ужасно вонючие газы (Arn., Carbo-veg., Sulph.).
- Громкое урчание и бульканье в животе с скоплением газов.
- Боль в животе с тимпаническим вздутием от гнева (Cham., Sulph.) или негодования (Nux-v., Puls., Staph.) и сразу после кормления грудью.
- Результаты теста:
 - Твердая, опухшая, болезненная печень (Chin., Lyc.).
 - Уплотненные припухлости паховых желез.
 - Стволовое ожирение (Am-m., Cale., CheL).
 - Пупок чувствителен к прикосновению (Rhus-t.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Зуд, вызванный заражением глистами.**
- Запор после злоупотребления слабительными (Bry., Nux-v., Op.), через день.
- Обезвоживание после диареи (Ars., Chin., Cupr., Verat.).
- Понос у ребенка после кормления грудью (Crot-t.); от эмоциональных возбудителей, таких как гнев, страх (Gels., Sep.) или возбуждение (Arg-n., Op.); после малейшей неосторожности в еде, особенно хлеба, холодной пищи (Dulc., Nat-s.), холодных напитков (Ars., Bry.), жирной пищи (Carbo-veg., Puls.), лимонада, свинины, кислых продуктов (Aloe, Ph-ac.) и в теплую погоду.
- Диарея сопровождается тошнотой и повышенным слюноотделением.
- Выделение влажных, вонючих газов после еды.

- Стул: обильный, крепкий, непереваженный и комковатый.
- Результаты теста:
 - Болезненность ануса.
 - Пропалс.
 - Анализ кала: *Oxyuris vermicularis*.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Частое мочеиспускание ночью.
- Частое, обильное мочеиспускание во время лихорадки.
- Непроизвольное мочеиспускание при кашле или чихании.
- Красный крупнозернистый осадок в моче.
- Результаты теста:
 - Моча: мутная, альбумин +, эпителиальные цилиндры ++, лейкоциты +++, эритроциты ++.
 - Ультразвуковое изображение: кальциноз надпочечников: болезнь Аддисона.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Зуд на кончике полового члена и по бокам мошонки.
- Результат теста:
 - Экзема мошонки.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Обильные, едкие, жидкие бели, стекающие по ногам.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Ребенок страдает от чувства удушья из-за повышенной секреции в носоглотке.
- Безболезненная охриплость голоса после перегревания в теплом помещении или на солнце, или после холодной ванны; облегчается при использовании голоса.
- Результаты теста:
 - Ларингит +.
 - Стридор +.

ДЫХАНИЕ

- Астматическое дыхание после еды, **вследствие подавления кожных - высыпаний** (особенно бородавок, мозолей, импетиго), в положении лежа и в теплом помещении.
- Асфиксия новорожденных.
- Результаты теста:
 - Дыхание вздохов.
 - Спастическое и хриплое дыхание.

КАШЕЛЬ

- Кашель после ветрянки или кори (Hyos., Puls., Sulph.).
- Кашель, по-видимому, исходит из живота (Bru, Sep.).
- Сухой, раздражающий кашель, возникающий приступами, особенно рано утром (5 часов утра), причем сначала наступает сильнейший приступ, а затем — более слабый.

- Короткий, сухой, щекочущий, спазматический кашель от гнева, холодных напитков, лихорадки, промокания под дождем, входа с свежего воздуха в теплое помещение, а также от употребления молока или кислой пищи (особенно уксуса); лучше на свежем воздухе.

Грудь

- Боль в груди при кашле.

КОНЕЧНОСТИ

- Острая ревматическая боль, усиливающаяся после ванны, кислой пищи или умывания холодной водой; облегчающаяся от теплых компрессов.
- Слабость в руках при письме.
- Результаты теста:
 - **Мозоли** под ногтями (график), на пальцах ног и ступнях.
 - **Ногти:** ломкие, деформированные, слоящиеся, отпадающие, **мозолистые, секущиеся, толстые;** медленно растущие.
 - Холодный пот на руках.
 - Трещины на коже кончиков пальцев, особенно вокруг ногтей.
 - Ледяные ступни по ночам (Elaps, Phos).
 - Болезненные, чувствительные, мозолистые, с воспаленными мозолями и бородавками на подошвах ног.
 - Утолщение кожи подошв ног (Cep).

Спать

- Частые ночные пробуждения из-за голода (Ign., Lys., Ph-ac.).
- Скрежетание зубами во время сна.
- Сонливость при лихорадке, жаркой погоде и после еды.
- Спит на спине (Bry., Puls.).

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Жалобы, вызванные чрезмерным употреблением охлажденных газированных - напитков (Геп) или **купанием в холодной воде в летние месяцы** или под воздействием солнечного тепла.
- Мороз:
 - Озноб, особенно в полдень, с **отсутствием жажды** (Apis, Chin., Puls.), рвота желчью, скрежет зубов, ледяные ступни, пот и сонливость.
 - Холод настолько сильный и глубокий, что даже укрытие ребенка или обогрев помещения не помогают.
- Лихорадочная жара:
 - При лихорадке: сухой кашель, боли в животе с потерей аппетита, тошнота и рвота, диарея, **отхождение громких зловонных газов**, дизурия с обильным частым мочеиспусканием, **отсутствие жажды**, обложенный молочно-белым налетом язык, плаксивость и сонливость.

- Сильное желание кислой пищи, солений и маринадов во время лихорадки.
- Хуже ночью.
- Пот:
 - Потоотделение наступает почти одновременно с горячей фазой, или за горячей фазой следует холодный пот (обильно выделяющийся ночью, с отвратительным запахом) и жажда.
- Ant-c. всегда полезен в тех случаях лихорадки, когда пульс и ипекакуана не помогли, хотя они и показаны.
- Это также полезное лекарство от желудочных и сыпных лихорадок (корь, ветряная оспа).
- Ухудшение: пребывание в теплом помещении или сидение у теплой печи.
- Улучшение: свежий воздух.

КОЖА

- Нейродермит, связанный с проблемами желудка, с густыми, похожими на мед выделениями, образующими твердые, роговые чешуйки.
- Узловая крапивница с интенсивным зудом ночью, когда постель становится теплее; приходится расчесывать кожу до тех пор, пока она не станет болезненной.
- Результаты теста:
 - Ветряная оспа.
 - Веснушки.
 - Твердые, роговые бородавки.
 - Импетиго.
 - Корь.
 - Чесотка.
 - Толстая, жесткая кожа (Rhus-t., Sep.).

Общий

- Дискомфорт, вызванный мастурбацией и подавленными кожными высыпаниями (ветрянка, корь, чесотка и т. д.).
- Отвращение к купанию, которое усиливает симптомы (как холодные, так и теплые ванны).
- Желание находиться на свежем воздухе, так как это улучшает симптомы (Alum., Nat-s.).
- Выделения из слизистых оболочек резкие, липкие, вязкие, желтоватого цвета.
- Кожа вокруг отверстий тела сухая и потрескавшаяся.
- Слабость от пота (Арн., Самб.).

- Короткий, сухой, щекочущий, спазматический кашель от гнева, холодных напитков, лихорадки, промокания под дождем, входа с свежего воздуха в теплое помещение, а также от употребления молока или кислой пищи (особенно уксуса); лучше на свежем воздухе.

Грудь

- Боль в груди при кашле.

КОНЕЧНОСТИ

- Острая ревматическая боль, усиливающаяся после ванны, кислой пищи или умывания холодной водой; облегчающаяся от теплых компрессов.
- Слабость в руках при письме.
- Результаты теста:
 - **Мозоли** под ногтями (график), на пальцах ног и ступнях.
 - **Ногти:** ломкие, деформированные, слоющиеся, отпадающие, **мозолистые, секущиеся, толстые;** медленно растущие.
 - Холодный пот на руках.
 - Трещины на коже кончиков пальцев, особенно вокруг ногтей.
 - Ледяные ступни по ночам (Elaps, Phos).
 - Болезненные, чувствительные, мозолистые, с воспаленными мозолями и бородавками на подошвах ног.
 - Утолщение кожи подошв ног (Sep).

Спать

- Частые ночные пробуждения из-за голода (Ign., Lyc., Ph-ac.).
- Скрежетание зубами во время сна.
- Сонливость при лихорадке, жаркой погоде и после еды.
- Спит на спине (Bry., Puls.).

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Жалобы, вызванные чрезмерным употреблением охлажденных газированных напитков (Геп) или **купанием в холодной воде в летние месяцы или** под воздействием солнечного тепла.
- Мороз:
 - Озноб, особенно в полдень, с **отсутствием жажды** (Apis, Chin., Puls.), рвота желчью, скрежет зубов, ледяные ступни, пот и сонливость.
 - Холод настолько сильный и глубокий, что даже укрытие ребенка или обогрев помещения не помогают.
- Лихорадочная жара:
 - При лихорадке: сухой кашель, боли в животе с потерей аппетита, тошнота и рвота, диарея, **отхождение громких зловонных газов**, дизурия с обильным частым мочеиспусканием, **отсутствие жажды**, обложенный молочно-белым налетом язык, плаксивость и сонливость.

- Сильное желание кислой пищи, солений и маринадов во время лихорадки.
- Хуже ночью.
- Пот:
 - Потоотделение наступает почти одновременно с горячей фазой, или за горячей фазой следует холодный пот (обильно выделяющийся ночью, с отвратительным запахом) и жажда.
- Ant-c. всегда полезен в тех случаях лихорадки, когда пульс и ипекакуана не помогли, хотя они и показаны.
- Это также полезное лекарство от желудочных и сыпных лихорадок (корь, ветряная оспа).
- Ухудшение: пребывание в теплом помещении или сидение у теплой печи.
- Улучшение: свежий воздух.

КОЖА

- Нейродермит, связанный с проблемами желудка, с густыми, похожими на мед выделениями, образующими твердые, роговые чешуйки.
- Узловая крапивница с интенсивным зудом ночью, когда постель становится теплее; приходится расчесывать кожу до тех пор, пока она не станет болезненной.
- Результаты теста:
 - Ветряная оспа.
 - Веснушки.
 - Твердые, роговые бородавки.
 - Импетиго.
 - Корь.
 - Чесотка.
 - Толстая, жесткая кожа (Rhus-t., Sep.).

Общий

- Дискомфорт, вызванный мастурбацией и подавленными кожными высыпаниями (ветрянка, корь, чесотка и т. д.).
- Отвращение к купанию, которое усугубляет симптомы (как холодные, так и теплые ванны).
- Желание находиться на свежем воздухе, так как это улучшает симптомы (Alum., Nat-s.).
- Выделения из слизистых оболочек резкие, липкие, вязкие, желтоватого цвета.
- Кожа вокруг отверстий тела сухая и потрескавшаяся.
- Слабость от пота (Арн., Самб.).

АНТИМОНИУМ ТАРТАРИКУМ

(рвотный камень, антимонилтартрат калия - Ant-t.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Отвращение к прикосновениям и взглядам** (Ant-c., Sanic.), с раздражительностью.
- ▶ Сильное **хватательное движение**; даже находясь без сознания, ребенок хватается за руку, палец или одежду сиделки, медсестры или врача (Kali-c., Puls., Stram.).
- ▶ Не хочет, чтобы его беспокоили в его текущих делах (Bry., Nux-v.).
- ▶ Легко впадает в уныние и всегда недоволен (Хам., Китай).
- ▶ Очень неуверенные в себе дети, которым нужна компания (Bism., Puls.,

Sil.).

- ▶ Ребенок, напуганный мелочами, боится оставаться один.
- ▶ Сильный страх медицинского обследования (Страм.) из-за сильного страха прикосновения.
- ▶ Если ребенок раздражителен, у него может развиваться астма, он склонен к частым бронхопневмониям и бронхитам.

Тело

- ▶ **Непреодолимое влечение ко сну** (Nux-m., Op.).
- ▶ **Отсутствие жажды** при многочисленных жалобах или прием небольших порций жидкости, но частое употребление жидкости (Chin., Ipec., Sep.).
- ▶ Триада: сонливость, потливость и слабость.
- ▶ Отвращение к пище, молоку и всем видам пищи (Кали-м.).
- ▶ Значительное облегчение после отрыжки (Carbo-veg., Lys.).
- ▶ Большинство жалоб сопровождаются частой зевотой (Lys.).
- ▶ Легочная и сердечная декомпенсация с дыхательной недостаточностью и цианозом, приводящими к шоку (Ant-ar.).
- ▶ Пульсирующие кровеносные сосуды (Bell., Glon.).
- ▶ Пульс: медленный, едва ощутимый (Камф.), прерывистый или тахикардия.
- ▶ Физическая чувствительность к любому прикосновению (Kali-c., Med.).

Другие важные симптомы

Дух

- **Жалобы, вызванные гневом у младенцев** (Cham.).
- **На вопросы отвечает правильно, но после ответа быстро возвращается ступор** (Арн.).

- **Грызть ногти** (Кали-бр.).
- Афазия: не может говорить, если не может дышать.
- Ребенок все время цепляется за мать или спутницу жизни, особенно когда болеет.
- Легко пугается мелочей.
- Страх удушья из-за одышки по ночам.
- Ленивый и сонливый в течение дня.
- Бормотание при бреде во время лихорадки (Bell., Hyos., Op., Stram.).
- Упрямые дети, имеющие тенденцию всегда противоречить и делать все наоборот тому, что их просят (Туб.).
- Плаксивые, нытые и хнычущие дети.
- Беспокойные, плачущие дети, успокоить которых можно, только постояннонося их на руках (Ars., Cina., Puls.), особенно в вертикальном положении (это можно объяснить их одышкой).
- Топают ногами от гнева (Страм.).
- Ступор или потеря сознания с поражением мозговых оболочек.
- Плачет или кричит от гнева, когда на него смотрят или трогают, или когда кто-то приближается; хочет, чтобы его оставили в покое и не разговаривали с ним.
- Раздражительное хныканье новорожденных при пробуждении утром (Kali-c., Lys., Tub.).

Голова

- Головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой; лучше от холодных компрессов и в положении сидя в постели (Cic., Gels.).
- Тяжелая голова, невозможно держать её вертикально, она постоянно падает назад.
- Результаты теста:
 - Фурункулы (Narc-ps.).
 - Холодный пот на лбу, особенно при кашле или лихорадке.
 - Корковые, шелушащиеся, экзематозные высыпания на коже головы.
 - Колыбельная.
 - Placa polonica (Borx., Lys., Tub.).
 - Встряхивание или дрожание головы во время приступа кашля.

Глаза

- **Ребенок имеет тенденцию все время держать глаза закрытыми.**
- Конъюнктивит, возникающий вследствие катаральных инфекций верхних дыхательных путей или при пневмонии.
- Светобоязнь.
- Результаты теста:
 - Конъюнктивит красная и налитая кровью.
 - Темные круги вокруг глаз.
 - Унылый вид.
 - Полуоткрытые глаза.
 - Глаза направлены вверх.
 - Близорукость.
 - Опущение верхнего века.
 - Суженные зрачки (миоз).
 - Пристальные глаза.
 - Прищуриться.

- Зерна ячменя.
- Запавшие глаза.

Нос

- Насморк с потерей вкуса и обоняния.
- Чихание с насморком.
- Результаты теста:
 - **Раздувание крыльев носа**, особенно у новорожденных с пневмонией (Лус., Phos., Sulph.).
 - Ярко-красные носовые кровотечения при простуде.
 - Вдавленный нос (втянутый и запавший).
 - Ноздри цвета сажи.
 - Впалый нос.

Лицо

- Результаты теста:
 - **Холодный пот на лице** (предательство).
 - **Заметная носогубная складка**.
 - Постоянное подергивание лица и нижней челюсти (часто наблюдается при коллапсе).
 - Цианотичное лицо с очерченными синюшно-красными пятнами и синюшными губами.
 - Отёчность лица с сухими, потрескавшимися и сморщенными губами, кожа которых легко шелушится.
 - Лицо Гиппократов бледное и осунувшееся, с выражением боли и страдания.
 - Дрожание нижней губы.
 - Морщинистое лицо.

РОТ

- Затрудненное прорезывание зубов.
- Потеря вкуса во время еды, при простуде.
- Склонность стучать зубами.
- Результаты теста:
 - Сухой, потрескавшийся, пересохший язык с коричневато-красным или беловатым налетом в центре и красными, выступающими сосочками («клубничный язык»). **Кончик и боковые стороны чистые, влажные и красные.**
 - Географический язык со следами зубов.
 - Обильная, липкая и густая слюна.
 - Губчатые, покрасневшие десны.
 - Дрозд.
 - Верхняя губа приподнята.
 - Повышенная морщинистость нёба.

ШЕЯ

- Ребенок склонен к удушью.
- Тонзиллит с затрудненным и болезненным глотанием.

- Результат теста:
 - Шейные железы пальпируются, но нечувствительны к прикосновению.

ЖЕЛУДОК

- **Либо он совершенно не испытывает жажды, либо пьет мало, но часто.**
- **Сильная икота у новорожденного.**
- Изжога и отрыжка **после молока** в любом виде.
- Сначала у ребенка рвота слизью, но затем из-за сильного напряжения возникает рвота желчью.
- Отрыжка с неприятным запахом после употребления молока, ночью и после еды.
- Рвота для ребенка — это пытка, так же как невыносимы рвотные позывы и тошнота.
- Тошнота с сильным отвращением к пище.
- Желание поесть после прогулки на свежем воздухе.
- Мысль о еде усиливает одышку, тошноту, отвращение к еде и общие страдания.
- Рвота: Рвота всем, что попадает в желудок; конечности дрожат ; затем наступают усталость, упадок сил и сонливость; это может перерасти в шок с ледяными руками и ногами (Verat.); рвота пенистая, зеленая и водянистая ИЛИ липкая, слизистая, вязкая и густая, с большим количеством белой слизи.
- Обострение: яблоки, хлеб, масло, мучное, жирное, кислое, клубника и уксус.
- Улучшение: Холодные напитки и холодная еда.
- Отвращения: яблоки, огурцы, жир, грудное молоко, кислая пища и уксус.
- Пристрастия: **яблоки**, пахта, холодные напитки, **огурцы** (Phos., Verat.), фрукты (кислые и сочные), сочные продукты, соленья, **освежающие продукты** и кислая пища.

ЖИВОТ

- **Спазматические, щемящие боли в области пупка из-за метеоризма .**
- Колики у грудных детей, сопровождающиеся сильным беспокойством.
- Вздутие живота после еды или питья; облегчается отхождением газов.
- Гастроэнтерит (холерный, кишечная палочка, ротавирусный, шигеллёзный), характеризующийся:
 - Холодный пот на лбу.
 - Глубокое, ацидотическое дыхание.
 - Втянутые роднички.
 - Сухость во рту.
 - Быстрый, поверхностный пульс.
 - Ладьевидное брюшко (лодкообразное углубление живота , например, при туберкулезном менингите , холере или отравлении свинцом, прим. переводчика).
 - Запавшие глаза.
 - Усиление кишечных шумов.

- Урчание в животе с режущими, щемящими болями, за которыми следует диарея.
- Результаты теста:
 - **Тимпаническое вздутие живота.**
 - Асцит.
 - Увеличенная печень.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Быстрое обезвоживание из-за обильного водянистого стула в сочетании с ледяными руками и ногами.**
- Диарея: коричневатая-желтая, зловонная и обильная; с тошнотой, рвотой и сильным беспокойством; ухудшается от употребления фруктов, холодной пищи и напитков летом; обезвоживание (2 степени) с низким уровнем калия.
- Жесткие стулья чередуются с мягкими.
- Инфекционная диарея у детей, находящихся на искусственном вскармливании (кишечная палочка, клебсиелла, протей, синегнойная палочка, золотистый стафилококк).
- Непроизвольные дефекации.
- Зловонные газы.
- Стул при детской холере напоминает рисовый отвар, с беловатым налетом на языке и холодным потом на лице.
- Результаты теста:
 - Посев кала: *Vibrio cholerae*, *E. coli*, *Shigella*.
 - Анализ кала: *Entamoeba vermicularis*.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Обильное, произвольное мочеиспускание ночью.
- Моча молочного или темно-красного цвета или с очень резким запахом.
- Результат теста:
 - Моча: Альбумин +, Эпителиальные клетки ++, Глюкоза и Эритроциты ++.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Хриплый или слабый голос.
- Боль в горле при кашле, заставляющая ребенка хвататься за шею.
- Щекотание в горле и трахее, приводящее к частому откашливанию и кашлю.
- Результат теста:
 - **Хриплая мокрота** в горле и трахее.

ДЫХАНИЕ

- Одышка с кашлем **после полуночи** (особенно после 3 часов ночи); не может лечь, даже если очень хочет; чувствует себя **лучше, если его обмахивают веером**, когда он может откашлять мокроту, когда лежит на правом боку или сидит прямо.
- Одышка при кашле.
- Одышка, заставляющая ребенка использовать мышцы живота и другие вспомогательные мышцы для дыхания.
- Одновременный кашель и хрипы.
- Задыхаясь во время вдоха, следует медленный, громкий, продолжительный выдох.

- Стонистое дыхание.
- Асфиксия новорожденного с цианотичным цветом лица.
- Хрипы или затрудненное дыхание после кашля и в положении лежа; дыхание кажется холодным; холодные нижние конечности.
- Бронхи заполняются мокротой, но у ребенка нет сил ее откашлять.
- Внезапные ночные приступы астмы из-за холодной, сырой погоды, подавленный кашель и отхаркивание; улучшение наступает, когда удается откашлять мокроту.
- Результаты теста:
 - Гипервентиляция, вызванная ЦНС.
 - Хрипы или неровное, прерывистое дыхание во время сна.
 - Свистящее или хриплое дыхание.

АСТМА

- **Сильное хриплое дыхание, но очень скудное отхождение мокроты** (Kalis.: Чрезмерное хриплое дыхание, но без истощения и сонливости).
- Задыхающийся ртом воздух в начале каждого приступа кашля.
- Отсутствие жажды при астме.
- Голос очень слабый и неслышный.
- Модальности:
 - Облегчение наступает, когда **человека носят в вертикальном положении**, он садится и дышит свежим воздухом, снимает закрытую или **свободную одежду вокруг груди и шеи**.
 - Ухудшение: в 22:00, **после полуночи, в 3-4 часа утра** (Кали-би., Кали-ч.).
- Результаты теста:
 - **Холодный пот на лбу.**
 - **Носовое дыхание.**
 - **Ледяные руки и ноги.**
 - Анализ газового состава крови: парциальное давление O_2 снижено ; парциальное давление CO_2 повышено ; респираторный ацидоз.
 - Бледные щеки.
 - Лицо: бледное и синюшное с красными или синими губами.
 - Открытый рот.
 - Узкий заостренный нос с увеличенными ноздрями.
 - Сухой язык.
 - Пульс: частый, слабый, малый.
 - Дыхание: хрипы, треск, пиление, свист.
 - Судя по всему, ребенок отравлен.

Асфиксия новорожденных

- Жалобы, обусловленные: эклампсией, гестационной гипертензией, гестационным диабетом, преждевременными родами (частая проблема), неправильным положением или несоответствием между размером головки плода и шириной таза, предлежанием плаценты , приемом петидина за несколько часов до родов.
- Асфиксия вследствие дыхательной недостаточности (РДС — респираторный дистресс-синдром).

- При рождении ребенок бледный (как в Chin.; если ребенок синий: Laug. и Op.; если он красный: Acon.) и бездыханный, даже если пуповина еще пульсирует.
- Коматозное или сонливое состояние.
- Обильное количество слизи во рту, горле и трахее.
- Модальность: Хуже от холодного купания.
- Результаты теста:
 - Оценка по шкале Апгар от 4 до 7.
 - Апноэ +.
 - Анализ газового состава крови: парциальное давление O₂ снижено ; парциальное давление CO₂ повышено ; респираторный ацидоз.
 - Цианоз ++, центральный и периферический.
 - Лицо: бледное или темно-красное с синими губами.
 - Хрипы.
 - Хрипы от мокроты в легких и горле.
 - Тахикардия, сменяющаяся брадикардией.
 - Нитевидный пульс.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

(Исключите Ars., Hydr.-ac. и Laug., которые выглядят очень похожими.)

- Полное отсутствие жажды.
- Причиной обычно является пневмония или врожденный цианотический - порок сердца с обратным шунтом.
- Модальности:
 - Усиливается во влажную или жаркую погоду.
 - Детям необходима слегка прохладная комнатная температура, но воздух должен быть стоячим и не циркулировать (в отличие от Carbo-veg.).
- Результаты теста:
 - Рентгенограмма грудной клетки: отек легких.
 - Цианоз ++: центральный и периферический.
 - Диффузные хрипы в нижних отделах легких.
 - ЭКГ: нарушения сердечного ритма.
 - Эхокардиография: Низкая фракция выброса желудочков.
 - Отек ног.
 - Электролиты: Низкое содержание кальция, высокое содержание калия.
 - Носовое дыхание.
 - Открытый рот.
 - Узкий, заостренный нос с увеличенными ноздрями.
 - Поверхностное дыхание.
 - Судя по всему, ребенок отравлен.
 - Густой белый налет на языке, который сухой и сухой.

ПНЕВМОНИЯ

- Постоянные стоны.
- Особенно показано на поздних стадиях заболевания.
- Дети старшего возраста могут жаловаться на тошноту.
- Пневмония, которая может привести к сердечной недостаточности.

- Хриплый кашель со скудной мокротой.
- Тяжелобольные дети.
- Сильное отвращение к еде; любое принудительное кормление, даже грудное, приводит к рвоте.
- Ребенок не хочет, чтобы его беспокоили, с ним разговаривали или на него смотрели.
- Ребенок отказывается от любого укрытия, включая простыни и одеяла, на груди и шее.
- Несмотря на сухость губ и языка, жажды не испытываю.
- Модальности:
 - Хуже в душном, жарком помещении из-за сильного желания свежего воздуха.
 - Ребенок предпочитает сидеть в постели, опираясь на подушки, так как в положении лежа одышка и кашель усиливаются.
- Результаты теста:
 - Использование вспомогательных дыхательных мышц.
 - Слышен треск.
 - Рентгенограмма грудной клетки: право- или левосторонняя долевая пневмония или бронхопневмония.
 - Страдальческое выражение лица.
 - Лицо бледное и узкое.
 - Кончики пальцев и ногти синюшные.
 - Носовое дыхание.
 - Нерегулярный пульс.
 - Сухие губы.
 - Открытый рот.
 - Нос: Заостренный, узкий, носовое дыхание.
 - Хрипы.
 - Сухой язык.
 - Кожа: легкая синюшность с холодным потом.
 - Судя по всему, ребенок отравлен.
 - Толстый налет на языке.

ЛЕГОЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ

Пневмония и бронхит при бронхолегочных пороках развития, аспирации мекония и синдроме Вильсона-Микити.

- Часто встречающиеся возбудители: кишечная палочка, энтеробактер, синегнойная палочка, стафилококки и стрептококки группы В.
- Кашель **стихает**, но **у ребёнка не откашливается мокрота**. В результате ребёнок становится сонливым и обильно потеет. **По мере нарастания сонливости кашель стихает, развивается цианоз**. Пульс становится слабым и неразличимым, дыхание – поверхностным.
- Сосущий новорожденный внезапно отпускает сосок и громко плачет, как будто задыхается; он чувствует себя лучше, только когда его держат вертикально и носят на руках.
- Результаты теста:
 - Апноэ.
 - Рентгенограмма грудной клетки: крупные очаговые уплотнения.

- Цианоз.
- Экспираторный стридор.
- Мелкие крепитации (хруст плевры).
- Хриплое дыхание.
- Подреберные ретракции.
- Тахипноэ.

КАШЕЛЬ

- Астматический кашель днем и ночью **с сонливостью**.
- Кашель от гнева, до (22-23 часов) и после полуночи (2-3 или 4 часа утра), ветряной оспы, плача, во время прорезывания зубов, от питья молока, от голода, зимой и во время разговора; лучше от отрыжки, отхаркивания, в положении сидя, переворачиваясь на правый бок.
- Кашель, по-видимому, исходит из желудка.
- Кашель с чиханием и зеванием.
- Прием пищи всегда вызывает кашель, который переходит в рвоту слизью и пищей, с потоотделением на лбу.
- Прикосновение к горлу во время кашля.
- Приступы короткого, удушающего кашля, которые быстро следуют один за другим; пациент должен сидеть прямо, когда начинается очередной приступ кашля.

Сравнение Ant-t. и Ipс. при аллергических и инфекционных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей	
Антимоний Тартарийский	ИПЕКАКУАНА
Жалобы: • Гнев у детей. • Корь. • прививки.	Жалобы: • Подавление нейродермита с помощью местного применения мазей.
Дух: • Равнодушие. • Желание, чтобы его носили в вертикальном положении. • Плаксивый, нытик, не хочет, чтобы на него смотрели или трогали. • Хочет, чтобы его оставили в покое.	Дух: • Капризный. • Трудно удовлетворить.
• Дискомфорт в холодную погоду.	• Дискомфорт в теплую влажную погоду.
Кашель: • Сильная тошнота, рвота при кашле, вызывающая рвоту. • Пароксизмальный кашель, состоящий из коротких приступов.	Кашель: • Сильная тошнота, рвота при кашле, но рвота невозможна. • Продолжительные приступы кашля. • Удушье, непрекращающийся кашель, тело ребенка становится напряженным, тело синее или краснеет.

Дыхание: • Брюшное дыхание. • Асфиксия новорожденного с холодным дыханием и цианозом лица. • Прерывистый, нерегулярный, нерегулярный. • Громкий, долгий, стонущий.	Дыхание: • Медленно, продолжительно выдох • Вздох • Задыхаясь
Антимоний Тартарийский	ИПЕКАКУАНА
Модальности: Худший • 2 - 4 утра • Лягте на левый бок. • Питьевое молоко. • Теплая комната. Лучше: • Отрыжка и отхаркивание мокроты. • Повернитесь на правый бок. • Хочет, чтобы его обдували веером или он находился в кондиционированном помещении (под прямым потоком воздуха).	Модальности: Худший • Вечером. • Лечь. • Употребление фруктов. • Теплая комната. Лучше: • После ужина. • Свежий воздух. • Сидите прямо. • Хочет, чтобы двери и окна были открыты (даже хочет, чтобы в комнате был сквозняк).
Побочные эффекты: • Холодное дыхание и холодные конечности. • Подергивание лица. • Носовое дыхание. • Испытывающий жажду. • Язык: толстый, с белым налетом.	Побочные эффекты: • Отсутствие жажды. • Язык: чистый, красный, заостренный, слюнотечущий.

Грудь

- Острая пневмония или бронхит у младенцев с сухим коричневым языком.
- Боль в груди при кашле с затрудненным дыханием.
- Пневмония, приводящая к дыхательной недостаточности (Кэмп, Лор, Оп.).
- Ревматическое заболевание сердца с воспалением сердца.
- Результаты теста:
 - Цианоз.
 - Рентгенограмма: Коллапс легкого (ателектаз), расширение сердца, гепатизация легких и отек легких.

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (ХСН)

- Жалобы, вызванные: Ревматическим заболеванием сердца.
- Крайняя степень непереносимости пищевых продуктов: прием пищи вызывает кашель, который заканчивается рвотой и рвотой.
- Слабость, одышка, усиливающаяся в теплом помещении, облегчающаяся на свежем воздухе.

• Результаты теста:

- Синие губы и ногти.
- Цианоз.
- Отёк голеней и лодыжек.
- Хриплое дыхание.

Назад

• Результат теста:

- Потливость в области шеи.

КОНЕЧНОСТИ

• Судороги икроножных мышц во время сна и у детей, страдающих диареей (гипокалиемией).

• Результаты теста:

- Ледяные руки, особенно кончики пальцев.
- Холодный пот на ладонях.
- Цианоз с синюшным оттенком кистей рук.
- Большие пальцы прижаты к телу.

Спать

- Сонливость и сильное истощение при большинстве состояний (например, во время и после кашля, во время дефекации или рвоты, при диарее, лихорадке, боли в животе или пневмонии).
- Во время сна: судороги в ногах, скрежет зубами, нерегулярное дыхание или удушье, стоны, бормотание и визг.
- Беспокойство, сопровождающееся ворочанием в постели.
- Пробуждение от сна, словно от ужаса приснившегося кошмара или от ощущения удушья.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

• Симптомы вызваны: сырой погодой, вирусной или бактериальной инфекцией, обычно зимой или ранней весной.

• Мороз:

- **Мурашки по коже и ледяной холод.**
- Во время озноба: сонливость, одышка, бледность лица, отсутствие жажды, слабость в конечностях.
- Хуже при физической нагрузке, на свежем воздухе (Ars.) и во второй половине дня (после 15:00).

• Нагревать:

- Эмоциональные симптомы: ребенок крепко **держится** за окружающих, **требует, чтобы его носили на руках**, плачет без причины и не подпускает к себе врача или медсестру.
- Физические симптомы: Холодный пот на лбу, сильное желание кислого и фруктовых соков, головная боль, бормотание в бреду, беспокойство, нарушение сна, тахикардия и **отсутствие жажды, несмотря на сухой язык с красными краями.**
- Усиливается при кашле (кашель повышает температуру), физическом напряжении, движении и сне (сухое тепло заставляет вставать с постели).

- Пот:

- **Изнурительное потоотделение.**
- Обильный, холодный, липкий или липкий пот.

КОЖА

- Жалобы, вызванные **подавленными поражениями** при нейродермите и чесотке.
- Полезно при ветряной оспе и кори, если **нет сыпи** .
- Результаты теста:
 - Веснушки.
 - Гусиная плоть.
 - Ледяная, синюшная кожа.
 - Импетиго.
 - натирание.
 - Папиллома.
 - Витилиго.

Судороги

- Жалобы: менингит, подавленная экзема.
- Во время судорог: цианоз, визг, подтягивание больших пальцев рук к себе , плач.
- Эпилептиформные судороги с потерей сознания.

Общий

- **Усталость, слабый пульс и дрожательная слабость** при наиболее острых жалобах (при кашле, лихорадке, диарее, тошноте, боли, рвоте).
- Жалобы, связанные с: изменением погоды, холодной, сырой погодой, корью и прививками .
- Анемия.
- Ангиомы.
- Коллапс и цианоз у младенцев.
- Желание стимулировать, что улучшает симптомы.
- Периферические отеки вследствие заболевания почек.
- Гидрогеноидная конституция; инфекции верхних и нижних дыхательных путей возникают при воздействии холодной, влажной погоды.
- Гипотермия с недостатком жизненно важного тепла, но при нагревании состояние ухудшается.
- Пульс: нерегулярный, малый, мягкий, нитевидный, дрожащий, слабый, почти незаметный .
- Полезно при септицемии и анафилактическом шоке.
- При лечении таких заболеваний, как корь, ветряная оспа, импетиго и гнойных заболеваний кожи, местными мазями и системными антибиотиками у ребенка в дальнейшем развиваются респираторные аллергии, эпилепсия, хорея и заторможенность с нарушением способности к обучению.
- Хуже от любой формы холода.

АНТИПИРИН

(Феназон - Антип.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Производное углерода, также известное как феназон.
- ▶ Аллергии, поражающие преимущественно кожу или верхние дыхательные пути. Часто путают с белладонной или хлоралумом.
- ▶ **Крапивница или отек Квинке**, которые появляются и исчезают внезапно и сопровождаются сильным зудом.
- ▶ **Внутреннее замораживание.**
- ▶ Редкие случаи сепсиса с симптомами шока. Очень низкая температура тела, замедленное дыхание, ослабленное кровообращение и обильное потоотделение могут сопровождаться скудным выделением мочи и общей задержкой жидкости в организме. Лицо может быть красным, отечным, отечным и опухшим. Если картина напоминает синдром Белла или Аписа, следует также рассмотреть возможность проведения антисептической терапии.
- ▶ Аллергический вазомоторный ринит или сенная лихорадка с постоянным, сильным чиханием (20–40 последовательных эпизодов), сопровождающимся водянистыми выделениями из носа и слезотечением. Иногда с поражением придаточных пазух носа.

Источник

- Феназон — препарат с анальгетическими (обезболивающими) и антипиретическими (жаропонижающими) свойствами.

APIS MELLIFICA

(Яд медоносной пчелы - Апис)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Неуклюжесть из-за спешки**; часто роняет предметы, а затем нервно смеется, потому что ему неловко.
- ▶ Очень **активные** дети, которым **нравится** быть занятыми; это заходит так далеко, что они даже занимаются бессмысленными делами (Лод., Мерс., Тарент.).
- ▶ Страх прикосновений, птиц, **шприцев и игл**.
- ▶ Постоянное желание компании; страх остаться в одиночестве.
- ▶ Соревновательные, амбициозные дети с сильным эго (Лус.).
- ▶ Ревнивый и собственнический; не хочет делиться игрушками или не хочет, чтобы другие дети прикасались к матери.
- ▶ Комплекс полового созревания, при котором подросток хотел бы иметь все свободы, присущие животным в человеческом обществе.

Тело

- ▶ **Отёчный выпот** при заболеваниях сердца или почек. Отёки развиваются быстро и преимущественно поражают верхнюю часть тела и лицо. Водянка с олигурией у новорожденных и младенцев.
- ▶ Характерными признаками этого лекарства являются **покраснение, жжение и отек**.
- ▶ Чрезвычайно чувствителен к теплу и прикосновению.
- ▶ Ледяной холод ступней при жаре в лице и руках.
- ▶ Нефротический синдром и другие иммунологические нарушения, особенно вызванные подавлением нейродермита, псориаза и т.д. после мазевого лечения.
- ▶ Правосторонние симптомы.
- ▶ Симптомы возникают внезапно и быстро распространяются.
- ▶ Отсутствие жажды.

Другие важные симптомы

Дух

- В школе: рассеян, подшучивает над другими детьми, рвет бумагу, плохая концентрация внимания, глупое поведение, небрежное отношение к домашним заданиям, непостоянство в увлечениях, ленивый, хочет все отложить на следующий день.
- Укусы внезапные и произвольные.
- Разрушительный; ломает вещи.

- Вялость у девочек в период полового созревания.
- Страх уколов, а следовательно, и страх посещения врача.
- Смех с глупым выражением лица.
- В гневе бьется головой о стену.
- Делаю много дел, но ничего не довожу до конца.

Голова

- Хроническая головная боль с головокружением, тошнотой и рвотой, заставляющая ребенка держать голову.
- Заложенность и чувство распираания в голове, особенно в теплом помещении.
- У детей в возрасте 6–10 месяцев роднички вновь открываются, они очень беспокойны; ребенок постоянно прикладывает руки к голове.
- Головные боли от кашля, перегрева или пребывания в теплом помещении; лучше от прогулки на свежем воздухе.
- Туберкулезный или базиллярный менингит после прививок.
- Результаты теста:
 - Зарывает голову в подушку и кричит, когда у него менингит.
 - Отек кожи головы.
 - Роднички большие и изрезанные, особенно передний.
 - В случае поражения мозговых оболочек голову запрокидывают на шею.
 - Горячая голова, особенно затылочная область.
 - Знак Кернига +.
 - Ударяется головой о предметы, о кровать или о стену.
 - Большая голова с большими, выпуклыми глазами.
 - Вши.
 - МРТ: Расширенные желудочки мозга; отек мозга; нечеткие изображения передних и задних рогов боковых желудочков мозга; глиомы мозга (общий термин для злокачественных опухолей мозга); киста мозга; абсцесс мозга.
 - Горячий пот с затхлым запахом, выделяющийся с кожи головы.
 - При гидроцефалии голова вертится из стороны в сторону.

Глаза

- **Катаральное воспаление глаз, вызванное холодом;** облегчается холодными компрессами.
- Глаза кажутся закрытыми; их трудно открыть из-за **отечности век**.
- Ночное склеивание век.
- Жгучие слезы с головной болью или лихорадкой.
- Частое желание тереть и надавливать на глаза.
- Непроизвольное слезотечение.
- Боль в глазах от чтения, в теплом помещении, от взгляда на снег или огонь.
- Светобоязнь, до сих пор не может держать глаза закрытыми.
- Полезно при химических ожогах глаз.
- Результаты теста:
 - Острое воспаление глаз у младенцев.

- Яркие глаза с расширенными зрачками.
- Деформированная и воспаленная радужка.
- Веки вывернуты наружу (эктропион), особенно нижнее веко.
- Выпадение ресниц.
- Гипертрофия конъюнктивы.
- Воспаление глаз с изъязвлением в уголках глаз.
- Свищ слезного протока.
- Веки опухшие, красные, горячие и вывернуты наружу, как масса красной плоти.
- Паралич правого верхнего века.
- Красные глаза, полные выпяченных конъюнктивальных кровеносных

сосудов.

- Близорукость.
- Прищуриться.
- Зерна ячменя.
- Трахома.
- Изъязвление или рубцевание роговицы.

уши

- При инфекции среднего уха ребенок каждый раз, когда плачет, прикладывает руку к задней части уха.
- Потеря слуха во время или после брюшного тифа.
- Боль в ухе при глотании, с болью в горле.
- Результаты теста:
 - Лимфатические узлы спереди и сзади ушных раковин увеличены и чувствительны к надавливанию.
 - Опухший, красный и горячий.

Нос

- Хронический катар с корками и струпьями в ноздрях.
- Холодность кончика носа (предшествует боли в горле).
- Результаты теста:
 - Постоянно ковыряет пальцем в носу.
 - Полипы, особенно в левой ноздре.
 - Опухший, красный, горячий нос.

РОТ

- **Острое воспаление языка** с внезапным, быстрым и пугающе сильным отеком языка; **отек Квинке**.
- Затрудненное прорезывание зубов, сопровождающееся диареей.
- Потеря вкуса.
- Результаты теста:
 - Не может легко высунуть язык, так как он дрожит и цепляется за зубы.
 - Чистый язык при остром нефрите.
 - Язык сухой, особенно в середине, с влажными краями.
 - Небольшая кровоточивость и отек десен, водянистый вид.
 - Герпес на губах.

- Язык огненно-красный или светло-желтый, потрескавшийся, с пузырьками по бокам.
- Пенистая слюна.
- Скрежетание зубами.
- Невнятная речь.
- Высовывание языка при заболеваниях головного мозга.

Лицо

- Дети любят умываться холодной водой.
- Результаты теста:
 - Ангионевротический отек.
 - Синюшность лица, особенно губ, при кашле или вследствие врожденного порока сердца.
 - Гнойные язвы на кончике носа.
 - Трещины в уголках рта и сухие потрескавшиеся губы.
 - Деформированное лицо.
 - Отвислая нижняя челюсть.
 - Отёчность, блестящая припухлость лица, особенно вокруг глаз и губ.
 - Роста на лице и волосистой части головы, часто начинающаяся справа и распространяющаяся налево или распространяющаяся с шеи на туловище.
 - Выражение лица: радостное или застывшее от страха.
 - Правосторонний паралич Белла.

Шея

- **Не переносит тугого покрытия шеи.**
- **Сухость в горле; желания пить воду по-прежнему нет.**
- Боль в горле **уменьшается от холодных напитков** и усиливается от теплых вещей и когда он не глотает.
- Затрудненное глотание твердой пищи.
- Глотание невозможно из-за паралича или ощущения опухания горла.
- Результаты теста:
 - **Ярко-красное окрашивание** горла, миндалин и язычка, **более выраженное справа**, распространяющееся наружу.
 - Ангионевротический отек.
 - Паралич глотательных мышц вследствие поражения IX пары черепных нервов (языкоглоточного), X пары блуждающего нерва и XI пары добавочного нерва.
 - Нагноение миндалин и глубокие язвы в горле.
 - Язычок удлиннен и вздут, как мешок с водой.

Желудок

- **Отсутствие жажды** при большинстве состояний, особенно во время лихорадки и в случаях асцита или анасарки (Acet-ac. также является полезным средством при асците и анасарке, но у ребенка, принимающего Acet-ac., сильная жажда и воскообразное лицо).
- Пенистая рвота после любой еды.
- Удушье при кашле или после рвоты.
- Рвота при опухолях головного мозга.

- Не любит: воду.
- Пристрастия: Холодное молоко, мороженое и кислые продукты.

ЖИВОТ

- Результаты теста:
 - **Асцит.**
 - **Распространение язв на пупке у новорожденных.**
 - Аппендицит.
 - Паховая грыжа с удлинённой припухлостью в правой паховой области.
 - Выделение крови и влаги из пупка.
 - Перитонит, при котором малейшее прикосновение невыносимо.
 - Втягивание живота.
 - Увеличение паховых желез, особенно с правой стороны.
 - Высокая чувствительность поперечной и нисходящей ободочной кишки.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея со слизистым стулом, напоминающим **томатный кетчуп** ИЛИ вонючим, зеленоватым или желтоватым стулом; стул безболезненный и наполнен гноем.
- У ослабленных детей и детей с гидроцефалией диарея, усиливающаяся по утрам.
- Диарея у младенцев и детская холера с отсутствием жажды, сухим языком и сухой, горячей кожей.
- Непроизвольная дефекация с широко открытым анусом; стул не удается удержать даже во время мочеиспускания.
- Результаты теста:
 - Диарея, сопровождающаяся белым налетом на языке.
 - Болезненность прямой кишки после дефекации.
 - Кровотечение из ануса.
 - Выпадение прямой кишки.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- **Острый паренхиматозный нефрит; ребенок плачет перед - мочеиспусканием и во время него.**
- **Задержка мочи у новорожденных и младенцев.**
- Скудная, зловонная и **молочная моча** у детей с гидроцефалией, потерей сознания или делирием.
- Частые бесплодные позывы к мочеиспусканию, особенно во время лихорадки.
- Непроизвольное мочеиспускание при кашле.
- Нефротический синдром.
- Ночное недержание мочи.
- Результаты теста:
 - Красный осадок, похожий на кофейную гущу, в подгузнике.
 - Сужение уретры.
 - Моча: Альбумин +++, зернистые цилиндры ++, эритроциты +.
 - Моча пахнет фиалками.

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Ранняя склонность к мастурбации.
- Результат теста:
 - Гидроцеле.

ГОРТАНЬ

- Результат теста:
 - Отек надгортанника и гортани.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

- **Астматическое дыхание после подавления кожных высыпаний.**
- Дышится лучше на свежем воздухе. Хочет, чтобы окна и двери были открыты или чтобы его проветривали; хрипит при перегреве или в теплом помещении.
- Не может лежать из-за кашля и одышки.
- Результаты теста:
 - Хрипы.
 - Хриплое, свистящее дыхание; с притуплением и криками, как от острой боли.

КАШЕЛЬ

- Сухой кашель с лихорадкой; усиливается в положении лежа; будит пациента.

ГРУДЬ

- Результаты теста:
 - Абсцесс в подмышечной впадине.
 - Эмпиема.
 - Отек легких.
 - Болезненность в правом четвертом межреберье.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Воспаление сердца при воспалении почек.
- Предрасположенность к развитию сердечной недостаточности вследствие сепсиса, вызванного грамотрицательными возбудителями.
- Результаты теста:
 - Эксцентрическая гипертрофия сердца.
 - Недостаточность митрального клапана.
 - Шум в сердце.
 - Перикардит с выпотом.
 - Пульс мягкий, слабый, нитевидный.

НАЗАД

- Цереброспинальный менингит.
- Шея напряжена и слаба.
- Результаты теста:
 - Рожа на плечах.
 - Символ Кернига ++.

- Опиостотонус.
- Покалывающее тепло или крапивница на спине.
- Болезненность правого третьего шейного нерва вдоль позвоночника.
- Спазматические тянущие ощущения в шейном или спинном отделе.
- Опухание шейных желез.

КОНЕЧНОСТИ

- Полиомиелит или детский церебральный паралич вследствие сильного эмоционального стресса, разочарования или ужаса, пережитых матерью во время беременности.
- Болезненный синовит.
- Результаты теста:
 - **Отёчность суставов и конечностей, особенно стоп и лодыжек.**
 - Истощение нижних конечностей.
 - Рожевидное воспаление с красноватыми и синюшными полосами.
 - Пальцы спастически растопырены при попытке удержать предметы.
 - Горячие ладони.
 - Ледяные ступни при горячем лице и руках.
 - Красные руки и бледные ноги.
 - Знак Ромберга +.
 - Подергивание или щелканье конечностей на одной стороне тела, при этом другая сторона парализована.
 - Панариций.

СПАТЬ

- Во время сна веки полуоткрыты.
- Сонливость у детей при кори.
- Спит, уткнувшись головой в подушку.
- Храп при лихорадке.
- Часто просыпается в ужасе от сна.
- Потрясающий сон или абсолютная бессонница с лихорадкой.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Озноб начинается в животе или груди.
 - В стадии обморожения: одышка и скрежет зубов.
 - Хуже в 3–4 часа утра и от любого тепла; лучше только на свежем воздухе и под укрытием.
- Нагревать:
 - Ребенок очень сонлив и совсем не чувствует жажды.
- Пот:
 - При перемежающейся лихорадке стадия потоотделения практически отсутствует; если она возникает, то сопровождается мускусным запахом.
 - Полезно при лихорадочных состояниях с сыпью (например, при кори или скарлатине), хронических случаях малярии и септической лихорадке.

КОЖА

- **Чрезвычайно чувствителен к теплу и прикосновению.**
- Сильное жжение и зуд, которые **облегчаются холодными ваннами** или прикладыванием пакетов со льдом.
- **Крапивница при астматических расстройствах** или после укусов насекомых; красные и белые пятна, которые сильно чешутся; ухудшаются при малейшем изменении погоды и ночью.
- Результаты теста:
 - Синеватые или красноватые экхимозы (пятнистые).
 - Отёчная, бледная припухлость кожи; она настолько натянута, что кажется, будто она вот-вот порвётся.
 - Сухая кожа, практически без пота.
 - Экзема, которая на пике своего развития переходит в целлюлит.
 - Красный плоский лишай.

Общий

- **Дети-аллергики** , конституционально предрасположенные к развитию атопического дерматита и экзогенной астмы.
- **Повышенная чувствительность и непереносимость тепла в любой форме, а также давления или прикосновения.**
- Ухудшение во второй половине дня.
- Ангионевротический отек.
- Отвращение к горячим ваннам.
- Отек розоватого оттенка с колющей, жгучей болью или отек беловатого, восковидного, прозрачного вида с отсутствием жажды и скудным выделением мочи.
- Истощение и сильное истощение.
- Воспаление желез с уплотнением клетчатки; пораженную часть можно вдавить.
- Аденит, лимфангит и периостит.
- Одна половина тела дергается, другая парализована.
- Боль жгучая, ноющая и тянущая; она внезапно перемещается из одной части тела в другую.
- Ребенок застывает при прикосновении.
- Поверхностные или незначительные ожоги с большими волдырями и сильной болью, покраснением и отеком (Canth. эффективен при небольших волдырях).
- Хуже в теплом замкнутом пространстве и от тепла в любой форме.

APIUM GRAVEOLENS

(Сельдерей - Ап-г.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Боли роста** у детей, похожие на боли у раковины (перламутра).
- ▶ Сильное желание яблок.

Источник

- Принадлежит к семейству Зонтичных/Зонтичных.

АРАНЕЯ ДИАДЕМА

(Паук-крестовик - Аран.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Также называется садовым пауком.
- ▶ Малярия и лихорадка денге — распространённые тропические заболевания в Индии. Дети, перенёвшие малярию и так и не оправившиеся полностью от последнего приступа, страдают от связанной с малярией дискразии (нарушения состава крови).
- ▶ Наиболее важными симптомами дискразии являются: утомляемость, слабость, болезненность желудка, увеличение печени, постоянный озноб и непереносимость сырой погоды.
- ▶ В солнечные дни чувствую себя хорошо и бодро, но заболеваю, как только погода становится сырой. В период ухудшения возникает озноб, словно кости ледяные, или сильная боль в костях, сопровождающаяся небольшим повышением температуры. Это сочетание озноба, боли в костях и восприимчивости к сырой погоде обычно возникает в одно и то же время каждый день, каждую неделю или через определённые регулярные промежутки времени.
- ▶ Злоупотребление хинином у детей.
- ▶ Желание выпить молока также уменьшается.

АРАНЕЯ ИКСОБОЛА

(Черный крестовик-паук - Аран-икс.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Сильное беспокойство с постоянным желанием двигаться.
- ▶ Любит раздражать других детей в классе или братьев и сестер дома.
- ▶ **Остроумно** и язвительно.
- ▶ Рассеянные дети.
- ▶ Коварно.
- ▶ Отсутствие концентрации во время учебы.
- ▶ Импульсивный и любопытный.
- ▶ Очень чувствительны к шуму и запахам.
- ▶ СДВ (синдром дефицита внимания) и беспокойство у детей. Наиболее важным показанием к применению этого средства является то, что дети становятся очень остроумными и остроумными во время разговора.
- ▶ Любит подшучивать над другими детьми или членами семьи.
- ▶ Экстравертные личности. Они хотят привлекать внимание, и при ближайшем рассмотрении вы обнаружите, что этих детей недостаточно любят.
- ▶ Диктаторский по отношению к одноклассникам и сверстникам.
- ▶ Завидую.
- ▶ Делайте все быстро.
- ▶ Очень активный ум. Частые кошмары, часто со сценами насилия.
- ▶ Наглый и невежливый.

Тело

- ▶ Отвращение и ухудшение состояния от жирной и тяжелой пищи.
- ▶ Судороги, тремор и клонические спазмы.
- ▶ Гиперчувствительность.
- ▶ Дети с избыточным весом.
- ▶ Спастическая контрактура поперечно-полосатых и гладких мышц.
- ▶ Тонические припадки при эпилепсии.

Другие важные симптомы

ГОЛОВА

- Результаты теста:
 - Прыщи вдоль линии роста волос на лбу.
 - Псориаз волосистой части головы.

РОТ

- Кровоточающий гингивит.
- Результаты теста:
 - Афтозные язвы.
 - Потрескавшиеся губы.
 - Липкий белый налет на языке.

Нос

- Чувствителен к малейшему запаху.

ШЕЯ

- Постоянный зуд в горле с серо-белой мокротой.
- Токсическая аденома щитовидной железы, подострый тиреоидит с зобом и тиреоидит Хашимото.
- Результат теста:
 - Увеличенная щитовидная железа.

ЖЕЛУДОК

- Отвращение к жирной и тяжёлой пище, а также ухудшение состояния после неё. Жир не переваривается.
- Пристрастия: сыр, сладкая пища (которая хорошо переносится), а также сильная тяга к **табаку** у детей.

ЖИВОТ

- Ребенку становится лучше, когда он надавливает кулаком на живот.
- Результат теста:
 - КТ: Муковисцидоз поджелудочной железы (при муковисцидозе).

ПРЯМАЯ КИШКА

- Бледно-желтоватый понос с отвратительным запахом.
- Испражнения становятся резкими и оставляют ощущение, что кишечник не полностью опорожнен.
- Результат теста:
 - Стул с высоким содержанием жира: стеаторея.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Хронический трахеит.
- Сухость трахеи с сильной жаждой холодных напитков.

КАШЕЛЬ

- Хронический астматический кашель.
- Постоянный, сухой, раздражающий кашель.

СЕРДЦЕ

- Заболевания аортального клапана.
- Пульс прощупывается на сонной артерии и брюшной аорте, особенно в положении лежа.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Полиурия.

СПИНА И КОНЕЧНОСТИ

- Ревматические боли во всех суставах, особенно в правой руке, ногах и плечах.

КОЖА

- Зуд кожи, усиливающийся при расчесывании или надавливании.
- Результаты теста:
 - Трещины в пальцах.
 - Эритема, напоминающая укусы блох.
 - Красная волчанка.
 - Розовый лишай, характеризующийся появлением прыщей с волоском в центре.

СПАТЬ

- Бессонница из-за беспокойства или позднего засыпания с навязчивыми мыслями и внутренним беспокойством.

ОБЩИЙ

- Озноб, но лучше на свежем воздухе; озноб особенно в ступнях, которые всегда холодные.
- Употребление кофе обычно приводит к улучшению.
- Беспокойство с постоянным желанием двигаться.
- Гипопаратиреоз и тетания.

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО МЕНЗИСА

(Pacific Strawberry Tree - Arb-m.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Тупые, ленивые, апатичные дети.** Сильное отвращение к учёбе, школе и домашним делам.
- ▶ Очень подавленный и тихий.
- ▶ Истощение даже после простого умственного напряжения.
- ▶ Слишком ленивы, чтобы заниматься домашними делами, злы и раздражительны, когда родители оказывают на них давление.
- ▶ Низкая уверенность в себе.
- ▶ Проблемы с математикой из-за трудностей со счётом.
- ▶ Медлительный, застенчивый и очень неряшливый.
- ▶ Единственное, что они любят делать, — это ходить к морю и плавать. Это очень полезно для них, делает их счастливыми и весёлыми.

- ▶ Сильное отвращение к мясу и овощам.

Источник

- Это вечнозеленое дерево с западного побережья Северной Америки принадлежит к семейству вересковых (Ericaceae) и было введено в гомеопатию Стивеном Олсеном из Северной Америки.

ARGEMONE MEXICANA

(Колючий мак - Арге.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ из самых эффективных средств Фаррингтона от **глистов**.
- ▶ Как и большинство маков, очень полезен при **коликах**.
Спазмы и колики кишечника.
- ▶ Снижение аппетита.
- ▶ Тошнота после еды или питья.
- ▶ Уменьшение жажды.
- ▶ Спазмы в животе, особенно при пробуждении.
- ▶ Зуд в прямой кишке.
- ▶ Метеоризм с диареей.
- ▶ Жгучая боль в прямой кишке.
- ▶ Мутный, непереваренный стул содержит много слизи.

Источник

- Также называется мексиканским маком, происходит из семейства маковых (Papaveraceae).

АЛЬБОМ МЫШЬЯКА

(Мышьяковистая кислота; белый оксид мышьяка - Ars.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Страх всего и всех.** Легко пугаются и пугаются; всё незнакомое их пугает. Эти страхи обычно возникают из-за живого воображения.
- ▶ **Беспокойные и нервные дети** , которых невозможно ни к чему подтолкнуть или заставить; у них возникают мигрени, астма или мышечные судороги.
- ▶ **Педантично аккуратные дети:** они всегда содержат в идеальном порядке свою писчую бумагу, игрушки и книги.
- ▶ Тревога и физический дискомфорт прямо пропорционально связаны.
- ▶ Паника по ночам.
- ▶ Дети, страдающие от мышьяка, никогда не тратят время попусту.
- ▶ Отягощает себя тревожными предчувствиями.
- ▶ Эти дети очень активны в течение нескольких часов: читают книги, рисуют, играют и бегают, но затем внезапно они полностью истощаются, становятся бледными и уставшими и хотят сидеть на коленях у матери.
- ▶ Привлекательное поведение, легко располагает к себе сверстников, старших и друзей.
- ▶ Очень тщательно следит за своей внешностью и одеждой.
- ▶ Даже в младенчестве или в раннем детстве они расстраиваются, когда проливают еду или напитки и устраивают беспорядок. Они хотят, чтобы всё было немедленно убрано и прибрано. Зачастую их смущение несоразмерно причине.
- ▶ Психически беспокойный и физически слабый.
- ▶ Нервные и беспокойные дети, которые хотят уйти от матери к отцу, а затем к няне, только чтобы в конце концов вернуться в объятия матери.
- ▶ Чрезмерная тревога по любому поводу.
- ▶ Быстрые движения, быстро ползают, очень подвижные дети.
- ▶ Малыши начинают нервничать при малейшем испуге; они чувствуют, что вот-вот заболеют, и хотят, чтобы мама или папа были рядом.

Тело

- ▶ **Едкие, зловонные (Merc., Nit-ac.), скудные и жидкие выделения.**
- ▶ Ощущение жжения, облегчающееся от горячих напитков и горячих компрессов.
- ▶ Полностью измотан.

- ▶ Нежные на вид дети.
- ▶ Ест редко, но большими порциями.
- ▶ Сильная жажда, но пить не хочется, потому что желудок её не принимает; жидкость (особенно холодная вода) застревает в желудке, как камень, или сильная жажда холодной воды и холодных напитков; пьёт часто, но маленькими глотками. Иногда наблюдается полное отсутствие жажды.
- ▶ Заболевает после употребления замороженной или охлажденной пищи в жаркую погоду.
- ▶ Большинство острых заболеваний, требующих мышьяка, начинаются после полуночи и до 2 часов ночи или после ужина. Типичные состояния включают гастроэнтерит, астму и кардиореспираторные заболевания.
- ▶ Многие симптомы проявляются у ребенка в состоянии покоя и уменьшаются в положении стоя или при движении.
- ▶ Быстрое снижение работы жизненно важных органов.
- ▶ Ребенок никогда не чувствует себя измотанным или ослабленным, пока лежит неподвижно, но он удивительно быстро слабеет, как только начинает двигаться.
- ▶ Худые, бледные и тощие дети.

Другие важные симптомы

Дух

- **Беспокойный и встревоженный по пустякам, с холодным потом на лбу;** обеспокоенный здоровьем членов семьи; боится, что с ними случится что-то ужасное и они умрут; беспокойный, злой и агрессивный, когда испытывает боль.
- **Ребёнка можно успокоить только быстрым перемещением из комнаты в комнату.** Держать или переносить ребёнка могут только близкие члены семьи.
- **Полон страхов:** страх одиночества, смерти (при рвоте, лихорадке или одышке), особенно чернокожих людей, зла и призраков по ночам, неудачи на экзаменах, инъекций, насекомых (даже представляет, что видит насекомых в комнате), ножей или любых острых предметов, замкнутых пространств, чего-либо и червей.
- Недомогания от: гнева с негодованием, дурных предчувствий, смерти близких и разногласий между друзьями или родителями.
- Отвращение к темным и мрачным цветам.
- Кусает ложку во время еды или чашку во время питья.
- Грызть ногти.
- Унылость.
- Ребенок не выносит, когда на него смотрят или к нему приближаются; он кричит и закатывает истерики от гнева.
- Дети со злым нравом, очень неблагодарные и жестокосердные.

- Цепляние с желанием зависеть от других.
- Бред с лихорадкой и болью, с бормотанием; беспокойство, внезапное вскакивание с постели.
- Грязные дети с грязной кожей.
- Добросовестный.
- Именно (Lyc., Sil.).
- Становится раздражительным по мелочам, с одышкой, особенно при пробуждении утром и когда его заставляют есть.
- Жадный.
- Любит копить и собирать много вещей (Stram., Sulph.), независимо от того, насколько они бесполезны, и не хочет их отдавать.
- Хочет чем-то заняться, даже если занятие бесполезное.
- Любит строить множество планов и любит все планировать заранее (например, он всегда раскладывает учебники на следующий день перед сном, раскладывает свою одежду в шкафу в соответствии с тем, что он будет носить через неделю, и точно знает, какая вещь где хранится в шкафу).
- Насмешки со злыми шутками.
- Ворчливые дети, которые никогда не улыбаются и не смеются.
- Обсессивно-компульсивное расстройство: постоянно проверяет вещи и имеет навязчивую идею уборки; постоянно моет руки.
- Быстрая речь.
- Раскрывает тайны во сне.
- Самоповреждение: бьется головой о предметы, калечит свое тело (Лил-т., Лисс.) и катается по полу от гнева.
- Чрезмерно чувствителен к мнению окружающих и выговорам.
- Крики от боли.
- Конкуренция между братьями и сестрами (Hyos.) и ревность (Apis, Puls.).
- Страх сцены (Arg-p., Gels.).
- Очень склонен к хвастовству.
- Отсутствие моральных чувств; воровство.
- Трудности в обучении; ему трудно сосредоточиться; плохо пишет.

Голова

- Головная боль с непереносимостью шума, света или любых помех, облегчающаяся от холодных компрессов и усиливающаяся от сквозняков от вентилятора или кондиционера.
- Чувствительная кожа головы, невозможно расчесать волосы.
- Результаты теста:
 - **Импетиго.**
 - Сухие волосы, которые легко спутываются и ломаются при расчесывании.
 - Гидроцефалия.
 - Ледяной лоб с жаром в лице и головной болью.
 - Мокнувшие экзематозные высыпания на коже, по всей видимости, зарастающие волосами.
 - МРТ: кровоизлияние в мозг.
 - Не может держать голову прямо; голова падает набок.

ГЛАЗА

- Едкие, жгучие слезы.
- Ребенок весь день трёт глаза, из-за чего они краснеют.
- Затуманенное зрение при чтении.
- Слезотечение глаз по ночам и при простуде.
- Близорукость.
- Светобоязнь при взгляде на солнечный свет и снег.
- Пустулезный конъюнктивит после катара у младенцев с желтоватыми гнойными выделениями, вызывающими склеивание век, особенно по утрам.
- Результаты теста:
 - **Конъюнктивит красная и полна темных сосудов.**
 - Блестящие глаза.
 - Помутнение или изъязвление роговицы.
 - Сухость, покраснение и шелушение век у основания ресниц (блефарит).
 - Отёчность под веками.
 - Экзофтальм.
 - Липкие веки, особенно у внешних уголков глаз.
 - Выпадение волос на ресницах.
 - Желтуха.
 - Полуоткрытые веки во время сна.
 - Флегмона глазниц.
 - Маятникообразные движения глазных яблок из стороны в сторону.
 - Поле зрения: Горизонтальная гемиплегия.
 - Птериgium.
 - Птоз, особенно левого верхнего века.
 - Зрачки попеременно сужаются и расширяются независимо от изменения условий освещения.
 - Прищуриться.
 - Зерна ячменя.
 - Запавшие глаза.
 - Трахома.

УШИ

- Катар евстахиевой трубы.
- Боль в ушах на холодном воздухе; уши очень чувствительны к малейшему ветерку.
- Потеря слуха после простуды или брюшного тифа.
- Ощущение заложенности ушей при глотании.
- Результаты теста:
 - Волдыри или экзематозные высыпания вокруг ушей.
 - Желтоватая и очень зловонная оторрея из правого уха.

Нос

- Синдром простуды: **начинается с острой простуды с водянистыми, болезненными выделениями, сильным чиханием и быстро прогрессирующим бронхитом**, который может привести к астме. Если ребенок охрип и начинает плакать,

Начинается насморк, это верный ранний признак того, что насморк распространился на грудную клетку (явный признак бронхита). У некоторых детей вместо хриплого плача возникает внезапное затруднение дыхания, которое впоследствии перерастает в полноценный приступ тяжелой бронхиальной астмы.

- Катар в холодную погоду, распространяющийся на лобные пазухи.
- Сильные приступы насморка, разъедания и боли в носу при пробуждении, на свежем воздухе, от переохлаждения, перегревания или лихорадки.
- Результаты теста:
 - Обостренное обоняние при приготовлении пищи.
 - Холодность кончика носа.
 - Корки и струпья внутри носа, которые трудно удалить; эта область становится болезненной и кровоточит; после удаления корки быстро появляются снова.
 - Носовое дыхание.
 - Частое, сильное, приступообразное чихание на открытом воздухе или при малейшем изменении погоды, а также при пробуждении по утрам.
 - Сенная лихорадка с астматическим дыханием.
 - Заложенность носа и насморк у младенцев, особенно ночью во время сна.
 - Озена.
 - Острый красный нос.

Лицо

- Ребенок постоянно ковыряет и царапает губы.
- Воспаление и нагноение околоушной железы, склонное к образованию абсцессов, которые затем метастазируют в яички.
- Подергивание губ при засыпании.
- Результаты теста:
 - угри .
 - Холодный пот на лице.
 - Корки, струпья, шелушащиеся высыпания на лице, особенно на лбу.
 - Цианоз: лицо пепельного цвета с синюшным оттенком вокруг рта и глаз.
 - Сухие, потрескавшиеся губы.
 - При головной боли или лихорадке лицо бледнеет.
 - Лицо Гиппократов, морщинистое, старческое, с выражением беспокойства, как будто страдает или находится в сильной агонии.
 - Импетиго.
 - Челюсти сжаты или отвисли.
 - Одутловатое лицо.
 - Восковое или жирное лицо.
 - Желтый, болезненный цвет лица.

РОТ

- Ребенок не пьет, а только прикусывает стакан во время кормления.
- Из-за тяжести языка ребенку трудно выражать свои мысли и говорить, а также высовывать язык для осмотра.

- Ребенок скрипит зубами во сне, во время лихорадки и когда он сильно сердится.
- Затрудненное прорезывание зубов.
- Сильное кровотечение с выделением черной крови из десен после удаления зуба.
- Густая слюна с тошнотой и кашлем.
- Результаты теста:
 - Язык: Следы от зубов; чистый или географический язык с толстым белым налетом у основания, **красные боковые стороны и кончик**; выступающие сосочки; красная полоса, идущая посередине языка, болезненный кончик.
 - Афтозные язвы во рту с потрескавшимся, холодным как лед языком у детей.
 - Неприятный запах изо рта.
 - Быстрое и преждевременное разрушение зубов.
 - Цинга с губчатыми, быстро кровоточащими деснами.
 - Дрозд.

ШЕЯ

- Боль в горле при глотании после холодных напитков; при кашле, с затруднением глотания; лучше от теплых напитков.
- Результаты теста:
 - Во время питья из горла доносятся булькающие звуки.
 - Красноватые, воспаленные язычок и миндалины.
 - Нагноение миндалин.

ЖЕЛУДОК

- **Нет желания есть, но неутолимая жажда воды.**
- Смертельная тошнота и рвота во время автомобильных поездок; от вида, запаха или мыслей о еде; от лихорадки.
- Расстройство пищеварения после гнева; после еды вне дома или употребления воды; после холодных напитков, жирного, фруктов, мороженого, молока, тяжелой пищи, супа; лучше от употребления теплых напитков или подслащенного молока.
- Сильные, безрезультатные позывы на рвоту при кашле и после рвоты.
- Рвота пищей, сопровождающаяся черновато-зеленой желчью сразу после еды или питья даже самого небольшого количества пищи.
- Рвота во время диареи.
- Обострение: яблоки, фасоль, масло, капуста, холодная пища и напитки, приготовленная пища, огурцы, жирная, газообразующая пища, фрукты, мороженое, дыни, выпечка, горох, перец, соленья, сырая пища, тяжелая пища, салат, вид или запах готовящейся пищи, кислая пища, испорченная пища (старый сыр, мясо, рыба или колбасы), клубника, сладости, чай, овощи, уксус.
- Облегчение: молоко, теплая или горячая пища.
- Не любит: фасоль, мясной бульон, масло, крупы, вареную пищу, мучное, жир, муку, фрукты, мясо, дыни, молоко, выпечку, горох, кашу, пудинг, сосиски, вид и запах еды, суп, сахар и сладости.
- Пристрастия: бекон, шоколад, кофе, холодная еда и напитки, мороженое, **сочные продукты**, лимонад, лимоны, горчица, оливковое масло, соленые огурцы.

Острая, освежающая, соленая, кислая пища и фрукты, специи, сладости, овощи, уксус, **теплая или горячая пища и напитки** (теплое молоко).

ЖИВОТ

- Боль в животе после еды или питья, особенно **холодных напитков и мороженого**; облегчается от свернуться калачиком, теплых компрессов и употребления подслащенного теплого молока.
- Острый гастроэнтерит и колит.
- Холод в желудке с болью после холодных напитков.
- Урчание в животе с коликами при пробуждении утром, после еды и перед дефекацией.
- Результаты теста:
 - Асцит.
 - Увеличенные и уплотненные брыжеечные лимфатические узлы.
 - Дряблый живот со слабостью мышц живота.
 - Увеличенная селезенка.
 - Гепатит с увеличенной, уплотненной и болезненной печенью.
 - Заворот кишок.
 - Кишечная непроходимость.
 - Перитонит.
 - Втянутый пупок.
 - Ущемленная или воспаленная паховая грыжа у детей, сопровождающаяся сильной рвотой и крайней болезненностью этой части тела.
 - *Tabes mesenterica*.
 - Живот болезненный, тимпанический, со скоплением газов.

ГАСТРОЭНТЕРИТ

- Жалобы, вызванные: **холодным, сухим воздухом**; чрезмерным употреблением **водянистых или сочных фруктов, таких как арбузы, клубника, ананасы, апельсины, сладкие лимоны, или замороженных продуктов**, таких как мороженое (фруктовый салат с мороженым - наиболее опасен для детей с АР).
- **Все выделения чрезвычайно зловонные.**
- **ранняя дегидратация** (при остром гастроэнтерите низкие потенции Арс малоэффективны, поэтому обычно рекомендуются потенции выше 10 М).
- При коликах ребёнок отмечает, что наиболее чувствительными зонами являются подложечная область и область вокруг пупка. Боль облегчается тёплым питьём или тёплыми компрессами.
- Повышенная жажда от холодных напитков, но они усиливают диарею, рвоту и колики.
- Рвота и диарея обычно приводят к быстрому истощению после каждого стула или рвоты.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

- Колики перед дефекацией и во время нее.
- Крах.

- Потрескавшиеся губы.
- Сухие губы.
- Болезненность ануса.
- Сильное истощение.
- Сильная жажда.
- Обильное потоотделение после каждого опорожнения кишечника.
- Беспокойный.
- Стул зловонный, водянистый, разного цвета, но редкий.
- Очень холодно, нужно хорошо укрыть.
- Рвота после еды или питья.
- Морщинистое лицо.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Детская холера с стулом в виде рисового отвара.
- Диарея у детей, больных брюшным тифом или сепсисом.
- Непроизвольное мочеиспускание с диареей.
- Зуд вокруг ануса.
- Безболезненный понос после гнева или беспокойства, после малейшей неосторожности в еде (особенно после фруктов, мороженого и овощей), питья воды или молока, в период прорезывания зубов, в теплую или влажную погоду, от холодной пищи или питья; лучше от местного тепла.
- Выделяет обильный, едкий, темный или черноватый, жидкий, непереваренный стул с гнилостным, неприятным запахом.
- Результаты теста:
 - Язвы промежности из-за едкого стула.
 - Влага вокруг ануса.
 - Выпадение прямой кишки.
 - Анализ кала: выделение остриц, круглых червей и члеников ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Частое, обильное, пенистое или очень скудное мочеиспускание при безуспешной физической нагрузке или при лихорадке.
- Непроизвольное, капающее мочеиспускание днем и ночью.
- Непроизвольное мочеиспускание во время рвоты или после дефекации.
- Низкий приток крови к почкам приводит к низкому выделению мочи, как при низком артериальном давлении, шоке и обезвоживании.
- Отсутствие позывов к мочеиспусканию, несмотря на переполненный мочевой пузырь.
- Гломерулонефрит после стрептококковой инфекции.
- Задержка мочи у новорожденных.
- Результаты теста:
 - Моча содержит красный песок, который оседает в подгузнике.
 - Моча: Альбумин ++, желчные соли и желчные пигменты ++, эпителиальные клетки ++, эритроциты ++ и почечные цилиндры ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результат теста:
 - Гидроцеле у детей.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Хриплый, неровный голос при простуде; громкий голос чередуется со слабым.
- Гортань чувствительна к холодному воздуху и давлению одежды.
- Першение и жжение в гортани из-за кашля.
- Результаты теста:
 - Отек голосовой щели.
 - Стридор гортани.

ДЫХАНИЕ

- Одышка после унижения или гнева, после употребления холодных напитков, из-за метеоризма или боли в животе, из-за пыли, а также в холодную, сырую или штормовую погоду.
- Одышка усиливается после полуночи (особенно после 2 часов ночи); усиливается при кашле, смехе, лёжа или в поворотах в постели, при малейшем усилии, разговоре и воздействии свежего или холодного воздуха. Ребёнок может дышать лучше только сидя в постели, как стоя, так и наклонившись вперёд.
- Результаты теста:
 - Горячее дыхание.
 - Нерегулярное, хриплое, шумное или прерывистое, стонущее дыхание.
 - Свистящий выдох.

АСТМАТИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС

- **Астма, чередующаяся с кожными заболеваниями, особенно экземой.**
- У детей припадки, как правило, случаются рано **днем**, примерно с 13:00 до 15:00, или рано утром, то есть в любое время **после полуночи**.
- Астматическое дыхание сопровождается чувством стеснения и боли в груди, жаждой.
- Первичное обследование легких не выявляет посторонних звуков из-за очень слабой вентиляции, но по мере стихания приступа легкие заполняются слизью.
- Приступ сопровождается сильным ужасом и страхом, пока не утихнет.
- Внезапные приступы спастической астмы после воздействия холодной погоды, от гнева или раздражения, от перемены погоды, от употребления холодных напитков летом, от сена, от подавления кожных высыпаний; вынужден сидеть прямо в постели.

КАШЕЛЬ

- Астматический кашель, чередующийся с кожными проявлениями.
- Откашливает пенистую, кровянистую, гнойную, очень зловонную мокроту; только в течение дня.
- Ребенок начинает спастически кашлять в присутствии посторонних.

- Удушающий кашель после полуночи (2–3 часа ночи), который изматывает ребенка, он вынужден сидеть в постели или поворачиваться на правый бок.
- Сильный, сухой, щекоцущий кашель по утрам при пробуждении, от гнева, холодных напитков, плача, пыли, умственного напряжения, во время еды, ходьбы на свежем воздухе, переворачивания в постели; облегчается, если садится в постели и пьет теплое питье.

Грудь

- Бронхит у младенцев.
- Застойная болезнь сердца с сильной слабостью.
- Пневмония после тифа.
- Ревматическое заболевание сердца с гломерулонефритом.
- Спазмы в груди при кашле.
- Полезно в случаях запущенной пневмонии.
- Результаты теста:
 - Абсцесс в подмышечной области.
 - Кровяные волдыри.
 - Синюшное изменение цвета кожи в области ключиц.
 - Холодный.
 - Эмпиема.
 - Отек легких.
 - Ревматический эндокардит или перикардит.

ПНЕВМОНИЯ

В своей практике я редко встречал показания к применению арсенида ацетилсалициловой кислоты в начальной или острой фазе пневмонии. Обычно я использовал его для лечения осложнений заболевания, особенно пневмонии с коллапсом, при которых наблюдалось следующее:

- Обычно ребенок выглядит **бледным или цианотичным**, с очень **синими губами**.
- Крайняя степень **тревожности**. Ребёнок цепляется за спутницу жизни или мать и требует постоянного внимания. Он боится оставаться один.
- Частые приступы удушающего кашля, заставляющие ребенка садиться.
- При аускультации сердечно-сосудистой системы часто выявляются такие нарушения, как аритмия, мерцательная аритмия, ритм галопа и экстрасистолы.
- Поначалу заметно физическое беспокойство, но по мере того, как ребенок слабеет, беспокойство исчезает.
- Кожа холодная, липкая и потная; возникает желание укрыться потеплее.
- Сердечные или респираторные осложнения пневмонии обычно возникают рано утром — между 1 и 3 часами ночи.
- Ребенок постоянно жалуется родителям, что не может дышать.
- У ребенка нет сил кашлять, кашель слабый, без мокроты.
- Ребенок начинает дрожать от малейшего холодного сквозняка.

- Во рту пересохло и сухо, постоянно хочется пить маленькими глотками ледяную воду (несмотря на холод, хочется, чтобы вода была как можно холоднее).
- Язык сухой и красный.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Характеризуется:

- Беспокойство или тревога.
- Холодные конечности.
- Заложенность легких.
- Увеличенная, болезненная печень.
- Учащенный пульс на яремной вене.
- Бледные, синюшные губы.
- Хочет быть хорошо укрытым.
- Низкое кровяное давление.
- Физическое беспокойство.
- Узкий, заостренный нос.
- Слабый пульс.
- Внезапная сердечная недостаточность вследствие подострого бактериального эндокардита.
- Ребенок чувствует, что ему не хватает воздуха, и очень боится задохнуться.
- Ребенок чувствует себя лучше, когда сидит, наклонив верхнюю часть тела вперед и положив руки на колени.
- Жажда маленьких глотков ледяной воды.

НАЗАД

- Боль в области шеи при подъеме головы по утрам.
- Спинальный менингит.
- Результаты теста:
 - Знак Кернига +.
 - Потливость области шеи ночью в постели.
 - Расщелина позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

- **Беспокойство в ногах ночью перед сном.**
- Холодный пот на руках и ногах.
- Отёчность нижних конечностей у детей, страдающих нефритом.
- Сухость рук и ног.
- Ледяные руки, ноги и колени, состояние не улучшается от укутывания или локального тепла.
- Подергивание ног во время сна.
- Спонтанный вывих суставов.
- Спотыкание при ходьбе из-за неуклюжести нижних конечностей.
- Результаты теста:
 - Сжатие большого пальца и остальных пальцев вместе.

- Трещины на пятках и вокруг ногтей, а также трещины на ногтях рук и ног.
- Истощение нижних конечностей.
- Ногти: ломкие, поперечно-волнистые, синюшные с синюшным оттенком, деформированные, твердые, шершавые и деформированные.
- Спастическое сокращение икроножных мышц.
- Чувствительные к давлению, затвердевшие мозоли или натоптыши на подошвах ног.
- Раны на пальцах рук, которые легко становятся гнойными.

СПАТЬ

- Не могу спать на левом боку.
- Коматозный сон у детей, страдающих урегией.
- Во время сна: подергивание мышц, произвольные движения рук и головы, стоны, бормотание, беспокойное ворочение, вздохи, подергивание губ, хныканье.
- Частое, спастическое зевание при потягивании, во время всех фаз лихорадки.
- Бессонница или очень беспокойный сон у детей, от сновидений или малейшего умственного напряжения; от тревожного беспокойства после полуночи (после 3 часов ночи); и во время потливости при лихорадке.
- Просыпается в ужасе от кошмаров: черные тени или призраки, мутная черная вода или мертвецы.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Жалобы, вызванные: промоканием под дождем, прогулкой на свежем воздухе.
 - При обморожении: заложенность головы; потребность в теплом питье; диарея; ледяной холод тела; повышенный аппетит при меньшей жажде (жажда усиливается после фазы обморожения); выраженный цианоз с посинением ногтей на руках и ногах; тошнота и рвота желчью; боли в конечностях.
 - Ухудшение: во второй половине дня, после полуночи (1 часа ночи), перед дефекацией, от питья (может пить только теплые или горячие напитки), на свежем воздухе.
 - Улучшение: после еды, от внешнего тепла и в теплом помещении.
- Нагревать:
 - Дискомфорт, вызванный: прогулкой на свежем воздухе, летом, после полуночи (особенно с 2 до 3 часов ночи).
 - Во время жара: беспокойство, бред; желание раскрыться; сухой кашель и затрудненное дыхание, икота, холодное тело, тошнота и рвота желчью, сильное сердцебиение, беспокойство или ступор, дрожь, сильные приступы насморка, неутолимая жажда, желание пить воду маленькими глотками, зевание и потягивание.
 - Хуже: кашель, который усиливает жар.

- Пот:
 - Все симптомы усиливаются при потоотделении, которое возникает после фазы жара или не возникает вовсе.
 - Во время потоотделения: обильный, холодный, липкий, изнуряющий, кислый или зловонный пот, оставляющий на одежде коричневато-желтые пятна.
 - Хуже при засыпании, лучше при пробуждении.
- Катаральная лихорадка.
- Частое, спазматическое зевание с потягиванием на всех стадиях лихорадки.
- Желудочная лихорадка.
- Фаза тепла чередуется с морозом; потоотделение отсутствует.
- Септическая лихорадка.
- Брюшной тиф с носовыми кровотечениями; зловонный, неприятный запах стула; коричневый или черный, потрескавшийся, кожистый, дрожащий язык; и сильная прострация.

КОЖА

- **Зловонные, едкие выделения при кожных заболеваниях, разрушающих волосы.**
- Острое воспаление кожи.
- Жалобы, связанные с подавлением чесотки, экземы, аллергии, крапивницы и контактного дерматита.
- Ожоги и ошпаривания, характеризующиеся или возникающие при:
 - Диарея.
 - Сильное беспокойство.
 - Истощение.
 - Сильная боль.
 - Склонность раны к гангрене.
 - Склонность к септицемии, при которой волдыри чернеют.
- Сильный жгучий зуд кожи, особенно ночью; пациент расчесывает пораженный участок до тех пор, пока он не станет саднить и не начнет кровоточить.
- Регулярно рецидивирующие гнойные язвы.
- Сыпь после употребления рыбы.
- Результаты теста:
 - Ледяная кожа.
 - натирание.
 - Корь.
 - Стригущий лишай .
 - Кожа производит впечатление старой из-за своего воскового, сморщенного и морщинистого вида.

Судороги

- Жалобы на: лихорадку или боль, сепсис, подавленную сыпь или сыпь, которая не появляется, уремию, гнев (у младенцев) или заражение глистами.
- Во время судорог: беспокойство, кашель, пена у рта, опистотонус, бледность - лица, гнев, потеря сознания с неподвижным, широко раскрытым взглядом (часто просыпается, но ненадолго), скованность конечностей, тетаническая ригидность, тонические судороги.

- После судорог: бессвязная речь, ступор и рвота.
- Ухудшение: от движения, холодного сквозняка, вечером (после 20:00).

ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ

Это состояние особенно часто встречается у детей, у матерей которых во время родов поднялась температура или у которых плодные оболочки разорвались в течение длительного времени:

- Вздутие живота.
- Необычно тихий младенец.
- Апноэ.
- Холодные, пятнистые конечности.
- Снижение активности и вялость.
- Сильная сонливость.
- Чрезмерные крики.
- Высокая температура.
- Нестабильность.
- Гипотермия.
- Раздражительность.
- Желтуха.
- Метаболический ацидоз.
- Постоянная рвота.
- Петехии.
- Плохое питание.
- Низкое выделение мочи.
- Недоношенные дети из-за незрелой иммунной системы.
- Повышенный уровень СРБ (С-реактивного белка).
- Респираторные симптомы: апноэ или легкое тахипноэ.
- Склерома (уплотнение подкожной клетчатки).
- Приступы.
- Септицемия при инфицировании гемолитическими стрептококками группы В, золотистым стафилококком, кишечной палочкой, гемофильной палочкой и др.
- Температурная нестабильность.
- Терминальная недостаточность различных систем органов.
- Рвота.
- Количество лейкоцитов в крови ниже 5000 или выше 20 000.
- Полиморфы менее 2000 или более 10 000.
- Увеличение количества форм полос.
- Наличие токсичных гранулоцитов.

МЕНИНГИТ (ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК)

- Измененное чувственное восприятие.
- Апноэ.
- Уплотнение в области переднего родничка.
- Поражение черепных нервов.
- Внешняя жесткость.
- Раздражительность.
- Скованность мышц шеи.
- Приступы.

Общий

- **Аллергия** на пыль (даже в минимальных количествах) и на кошек.
- **Жгучая боль** возникает очень часто и **лучше облегчается местным - применением тепла** или теплым укутыванием.
- **Повышенная чувствительность** ко всему: расчесыванию волос, волнению (приводит к кошмарам), шуму (делает вас нервным, беспокойным), запахам (вызывает тошноту и рвоту) и прикосновениям.
- **Очень холодно , состояние ухудшается от любого вида холода:** в холодном помещении, на пронизывающем холодном воздухе, от холодных напитков, на берегу моря и т. д.
- Жалобы, вызванные неправильным применением аллопатических лекарств или злоупотреблением препаратами железа.
- Цианоз у младенцев с видимой смертью.
- Несмотря на холод, хочется оказаться на свежем воздухе.
- Склонность к обморокам с сонливостью и тошнотой; до и после рвоты или дефекации; при заболеваниях сердца (эндокардит); из-за астмы; потери жидкости; при кашле, боли или лихорадке.
- Истощенное тело с опухшими железами.
- Внешний отек из-за заболевания почек или сердца, скрытая кожная сыпь или лихорадка; язык ярко-красный.
- Гипотермия.
- Ювенильный диабет.
- Поздно научился ходить.
- Лейкемия.
- Лимфангит.
- Неприятный запах тела.
- Болезненное, гангренозное воспаление и целлюлит, облегчающиеся при помощи теплых компрессов.
- Пульс: неровный и почти незаметный.
- Дети, быстро теряющие вес и имеющие волчий аппетит.
- Внезапный обморок в результате обезвоживания из-за обильной диареи и рвоты.
- Склонность к простудам, синуситам.
- Склонность к образованию морщин, например, на губах, коже и слизистых оболочках.
- Туберкулез.
- Полезно при дискомфорте в период выздоровления после применения антибиотиков.
- Полезно при укусах ядовитых животных или насекомых (бешеных собак, змей и т. д.).
- Ухудшение: перемена погоды (особенно с теплой на холодную); холод в любой форме (холодный воздух или ветер, холодные напитки, холодные компрессы, сырая погода, зима и т. д.); промокание или переход через воду; лежание ; сидение сгорбившись.
- Улучшение: сидя прямо или подтянув колени (голова и руки лежат на коленях); стоя; быстрые и энергичные движения.

Сравнение Ars. и Acon. при страхе, ужасе и беспокойстве	
МЫШЬЯК	АКОНИТУМ
Беспокойство: беспокоится, когда от него чего-либо ожидают. Хуже вечером и ночью, от шума, рвота в одиночестве. Лучше в компании.	Тревога: тревога с покраснением лица. Хуже после дефекации, перед мочеиспусканием и во время него, при кашле, в середине утра, в обществе или толпе, а также при гнев. Лучше пить холодные напитки.
Пациент дрожит. Скрупулезный и избирательный +++.	Горячий пациент. Менее требовательный.
Страх: от одиночества, особенно когда Ложиться спать; что-нибудь черное; друзья; высокие места; насекомые; хищники, змеи.	Страх: перед переходом улицы, в местах массового скопления людей, при прослушивании музыки, при проезде через туннели или по узким мостам.

ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ

(Полынь обыкновенная - вид-гл.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Эпилепсия, судороги, хорее** и другие двигательные нарушения.
- ▶ **Забывчивость** — ключевой симптом этого препарата. Дети забывают всё, что читали. В основном из-за повторяющихся эпилептических припадков ребёнок не может сосредоточиться.
- ▶ Во время беременности мать пережила сильный шок, внезапное плохое известие или горе, которое впоследствии, по мере взросления ребенка, проявляется вновь в виде эпилепсии.
- ▶ Одно из лучших гомеопатических средств при **хорее Сиденгама (малой хорее)**.
- ▶ Односторонние судороги, преимущественно с правой стороны. Судороги с одной стороны и паралич с другой. Приступы в любое время дня и ночи, но чаще всего после раздражения. Судороги усиливаются при любой нагрузке, во время прорезывания зубов или после употребления алкоголя. Эпилептические припадки, вызванные гневом, волнением, горем, испугом, травмами головы или мастурбацией. Нервозность и раздражительность перед припадком.
- ▶ Крики во время судорог, которые возникают очень внезапно и сопровождаются сильной скованностью. Непроизвольное мочеиспускание во время судорог.
- ▶ Судороги как сопутствующий симптом туберкулезного или лихорадочного менингита.
- ▶ Заражение глистами очень часто является основной причиной эпилепсии или судорог.
- ▶ Одно из лучших **средств от глистов**.
- ▶ Выделения с запахом чеснока, особенно пот, моча и стул.

Источник

- Относится к семейству астровых (Asteraceae/ Compositae).
- Очень похоже на Bell, Cupr. и Hyos.

АСА ФЬЮТИДА

(Вонючая аццарелла - Асаф.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Сильное отвращение к письму. Они не хотят писать, предпочитая читать. Однако, если заставлять таких детей писать, у них возникают эмоциональные проблемы.
- ▶ Придирчивый, капризный и недовольный.
- ▶ Дети-истерики, которые ищут сочувствия и преувеличивают свои симптомы, приходя в клинику. Незначительные вещи раздуваются до невероятных размеров, а иногда они падают в обморок, чтобы привлечь к себе внимание.
- ▶ Болезненная, чувствительная и истеричная.
- ▶ Толстые и шатающиеся дети.
- ▶ Непрерывные жевательные движения, как у жвачных коров.
- ▶ Полон газов, сильное вздутие живота и обильная отрыжка.
- ▶ Очень сильное давление вниз из-за вздутия живота, как будто живот может однажды лопнуть.
- ▶ Триада желудочных жалоб: громкое урчание, бурная отрыжка и затрудненный стул.
- ▶ Богер очень хорошо описывает это средство, говоря, что у таких детей после еды в животе скапливается огромное количество воздуха.
- ▶ Вздутие живота смещает диафрагму вверх, к горлу. Это может привести к хрипам, искривлению лицевых мышц и даже к обморокам.
- ▶ Доктор Фаррингтон прекрасно описывает диарею у ребёнка, принимающего асафетиду. Стул жирный, зелёный, обильный, кашицеобразный и мягкий. Малейшее нарушение диеты вызывает диарею. Наблюдается обильное газообразование, сопровождающееся дефекацией.
- ▶ Хроническая диарея, вызванная нарушением всасывания.
- ▶ Боли роста и остеомиелит (воспаление костей). Воспаление длинных трубчатых костей, особенно надкостницы. Боль в костях, словно их царапают острым ножом, усиливается ночью, при прикосновении и уменьшается при надавливании.

Источник

- Эту смолу получают путем царапания корня живого растения, также называемого «дьявольским пометом» и принадлежащего к семейству зонтичных.

КОПЫТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ

(Лещина обыкновенная - Асар.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Дети родителей-алкоголиков.
- ▶ Частые необоснованные выговоры со стороны родителей вызывают у ребенка повышенную физическую и эмоциональную чувствительность.
- ▶ Амбициозный, но нервный и беспокойный.
- ▶ Тревожный и нервный даже от малейшего шума. Крайне раздражительный, если кто-то рядом издаёт звуки, например, шуршит бумагой или жуёт яблоко .
- ▶ Отвращение к прикосновениям или проявлениям ласки любого рода. Например , им не нравится, когда кто-то их целует или прикасается к ним. Они немедленно отталкивают этого человека.
- ▶ Сдержанные и серьезные, они не сразу общаются с другими детьми, но как только это происходит, они по-настоящему наслаждаются обществом.
- ▶ Умный и рано развившийся.
- ▶ Трудности с концентрацией внимания; мысли блуждают во время разговора, письма, чтения или любой другой умственной деятельности. Плохая память; за исключением имён собственных, которые пациент легко запоминает.
- ▶ Чувство пустоты во время чтения или изучения делает практически невозможным что-либо запомнить.
- ▶ Доктор Джордж Витулкас описывает этих детей как очень конкурентоспособных, одаренных и умных, но в то же время хрупких, как хрустальное стекло, которое может разбиться.
- ▶ Мигрень, вызванная напряжением глаз, облегчается промыванием холодной водой. Этот симптом неоднократно подтверждался в моей практике.
- ▶ Даже в самую жаркую летнюю жару холодные руки, ноги, колени и живот.
 - ▶ Скручивание рук — важный жест, который часто можно увидеть среди детей племени Асарум.
 - ▶ Вид холодного озноба по всему телу при эмоциональных расстройствах.
 - ▶ Пациенты с синдромом замерзания, не реагирующие ни на тепло, ни на теплую одежду.
 - ▶ Сильное желание орехов, уксуса и фруктов.

Источник

- Принадлежит к семейству кирказонных.

ATRAX ROBUSTUS

(Сиднейский воронковый паук - Atra-r.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Многие общие симптомы паучьих препаратов, такие как прыжки, беспокойство, танцы и живость. Наиболее характерный и доминирующий психический симптом этого препарата — сообразительность. Дети Atrax robustus очень хитрые, умные и проницательные, как Bufo, Lachesis, Tarentula и Musk.
- ▶ Дети очень подвижны, они фанатично прыгают, всегда раздражительны и беспокойны.
- ▶ Они испытывают большие трудности в обучении в школе, поскольку испытывают некоторую дезориентацию и не умеют писать. Ребёнку Atrax robustus очень трудно писать, поскольку письмо сразу же вызывает беспокойство, тревогу и волнение.
- ▶ **Инфекция среднего уха с левой стороны.**
- ▶ Синусит, при котором выделения из носа густые, жёлтые и липкие. Характерная головная боль в области лба, прямо над левым глазом.
- ▶ Постоянные или произвольные движения губ или подергивание губ являются очень полезными диагностическими признаками этого лекарства.
- ▶ Частое срыгивание из-за чрезмерного слюнотечения.
- ▶ **Боль в горле, особенно слева**, как у Lach., Naja и Sul-ac. Боль в горле усиливается после полуночи, от холодных напитков и глотания натошак. Сильная боль в горле иногда делает глотание практически невозможным.
- ▶ **Глистная инвазия.** Типичные колики в животе, особенно в области пупка, усиливающиеся по утрам, при движении, наклоне назад, в положении лёжа и после завтрака; уменьшающиеся в положении сидя и наклоняясь.
- ▶ Лихорадочные судороги с подергиванием различных частей тела. При лихорадке конечности, особенно кисти и стопы, холодные.
- ▶ Очень холодно и хочется выпить много горячего кофе, чтобы успокоиться.
- ▶ Вечером я всегда очень оживлена и деятельна, но утром просыпаюсь усталой и слабой.

АТРОПИNUM СУЛЬФУРИКУМ

(Атропина сульфат - Atro-s.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Atro-s. очень похож на Cod.
- ▶ Беспокойство и раздражительность из-за боли.
- ▶ **Нарушение функции поджелудочной железы или желчного пузыря** , вызывающее колики в животе.
- ▶ Колики часто возникают после еды, особенно после употребления молока.
- ▶ На ранних стадиях кишечной непроходимости и инвагинации Атро-с. помогает в очень низких потенциях.

AURUM METALLICUM

(Золото - Авр.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Депрессивные расстройства у детей**, особенно в связи с такими тяжелыми заболеваниями, как рак, почечная недостаточность или врожденные пороки сердца, когда ребенок осознал безнадежность своей болезни (Псор.).
- ▶ **Чувство безжизненности и тоски с полной потерей инициативы**; своего рода неспособность сосредоточиться, обычно возникающая из-за горя по поводу утраты дружбы или внезапной утраты родителей; это состояние возникает особенно тогда, когда на них возлагается внезапная ответственность, например, необходимость заботиться о младших братьях и сестрах, или когда ставится под сомнение честность ребенка.
- ▶ Боится сидеть на колесе обозрения или высокой карусели, где нужно смотреть очень далеко вниз.
- ▶ Дети, чрезвычайно чувствительные к боли (Cham., Нер., Лус.).
- ▶ Дети, чья мать испытала разочарование в своей любви во время беременности (Ign., Nat-m., Ph-ac.).
- ▶ Послушные и ответственные дети (Cale., Kali-c., Nat-s.).
- ▶ Самодовольные дети (Cale., Lach., Лус., Med., Nux-v.) с большой гордостью; высокая самооценка (чувствительны к любой критике); любое противоречие раздражает их и порождает гнев и ярость.
- ▶ Ужасно чувствителен к любому разочарованию (Nat-m., Staph.); целыми днями горюет из-за разочарований.
- ▶ Сильная забота о семье (Caust., Cocc., Rhus-t.), особенно о родителях; делает все возможное, чтобы не разочаровать их и быть их достойным.
- ▶ Дети, которые постоянно хотят слушать музыку и находятся от нее в состоянии опьянения; младенцы успокаиваются, как только звучит музыка; дети любят слушать музыку, делая уроки или занимаясь другими делами; у них всегда с собой портативное радио или плеер Walkman, чтобы они могли слушать музыку в дороге; перед тем, как ребенок ляжет спать, мать должна включить ему музыку или спеть песенку (Bufo, Croc., Lac-leo., Nat-m., Tarent., Tub.).
- ▶ Живые, экстравертные дети, похожие на Phos.; но они также могут быть сдержанными и интровертными, как Ign.
- ▶ Не привередлив в еде, она не должна быть чем-то экстраординарным; главное, чтобы еда была хорошо приготовлена; любит домашнюю еду; также принимает простую пищу, например, хлеб и молоко; не возражает, если еда уже остыла.
- ▶ Организованные, пунктуальные дети (Ars., Carc., Nux-v.).

- ▶ Вежлив со всеми.
- ▶ Преждевременно развивающиеся дети (Calc., Lach., Med., Merc., Verat.).
- ▶ Серьёзен, но невольно улыбается во время разговора.
- ▶ Рыдает во сне, не просыпаясь.
- ▶ Хочет быть лучшим; сильное желание сделать себе имя в обществе.

Тело

- ▶ Кости **почти всегда** вовлекаются в патологический процесс (calc., merc., rh-ac., puls., sil.), **например**, задержка роста, задержка заживления родничков, периостит, боли роста, рецидивирующий периостит, ювенильный ревматоидный артрит или опухоли **костей**, такие как экзостозы, остеокластомы и саркомы. Характерны следующие деформации костей: синдактилия, полидактилия, клинодактилия, кифоз и сколиоз.
- ▶ **Кости болезненно чувствительны к холоду** (Merc., Mez., Sil.).
- ▶ **Дисморфизм**: Наиболее часто наблюдаемые дисморфические синдромы:
 - Синдром Карпентера.
 - Синдром кошачьего крика.
 - Синдром Дауна (трисомия 21).
 - Синдром Эдвардса (трисомия 18).
 - Синдром Холта-Орама.
- ▶ **Врожденный порок сердца** (открытый артериальный проток и аортальный стеноз) и врожденный цианотический порок сердца (дефект межжелудочковой перегородки с обратным шунтом, гипоплазия правого желудочка и стеноз клапана легочной артерии).
- ▶ **Инфильтрация и метастазы в костный мозг** (Bar-c., Bar-i., Beryl., Calc-f., Hecla., Merc-ki., Syph.) и в кортикальный слой кости, вплоть до некроза.
- ▶ **Слабые мальчики, без энергии и силы.**
- ▶ **Индивидуальный вкус** (жажда деликатесов); хочет, чтобы пища была приготовлена только очень определенным образом; например, фрикадельки должны быть хорошо прожарены, мясо не должно быть слишком жестким, яйцо должно быть подходящего размера, не слишком мягким и не слишком твердым (Chin., Ipec., Lys., Tub.).
- ▶ Задержка развития, особенно у мальчиков, у которых поражены также яички.
- ▶ Лимфатические и ретикулоэндотелиальные заболевания, первичные или вторичные по отношению к заболеваниям лимфатических узлов, гепатоспленомегалии и т. д.
- ▶ Рецидивирующий тонзиллит с гипертрофией миндалин.
- ▶ Дети-сангвиники, со свежим румяным цветом лица, черными волосами и черными глазами.
- ▶ Aur. очень похож на Mere и его следует сравнивать с ним.

Другие важные симптомы

Дух

- **быстро и часто** задают вопросы учителю .
- Привлекает и завораживает красный цвет , особенно младенцы и дети до 6 лет; предпочитает красные мелки, коробки, обложки книг, наклейки, этикетки, ластики и т. д. (Ign., Phos., Tarent.).
- Избегает **мест массового скопления людей**, испытывает сильное чувство удушья и страха в общественных местах, на вокзалах, ярмарках и т. д.
- Дети становятся **религиозными в очень раннем возрасте** и начинают ежедневно молиться (Ars., Cale., Stram., Sulph.).
- Чувствует себя **покинутым** и боится **быть отвергнутым членами семьи и друзьями** (Нат.-м.).
- Умные дети с **сильной тягой к знаниям** (Верат.).
- **Самокритичный** (Nux-v., Thuj.), развивает чувство вины по незначительным поводам (Brom., Carc., Kali-br., Staph.); богобоязненные дети с **очень строгими моральными принципами**.
- **Сентиментальный**: часто плачет при просмотре фильмов, в которых показаны семейные драмы и сильные эмоции.
- Постоянно заламывает руки (Kali-p., Phos., Stram.).
- Застенчивый.
- Гиперактивный, беспокойный, всегда хочет быть занятым, но не может сделать все достаточно быстро, что приводит к неуклюжести.
- Вздохи во сне (Кали-п.).

Голова

- Обнажение головы усиливает большинство жалоб (Bell., Нер., Nux-v.) .
- Мигрень, усиливающаяся от умственной нагрузки (чтения, учебы), резких запахов; облегчающаяся от горячих компрессов или укутывания головы.
- Результаты теста:
 - **Экзостозы** (Calc., Merc.).
 - **МРТ: Врожденная ягодичная аневризма** в круге кровообращения мозговой артерии (Бар-к., сифилис), цереброваскулярная травма, гидроцефалия.
 - алопеция (Calc., Morg-p., Tub.).
 - Движения головы вперед и назад (Cham., Cina).
 - Выступающий большой родничок.
 - Экзема кожи головы.
 - Горячая голова (с холодными конечностями) и красное лицо с лихорадкой.
 - Макроцефалия.

ГЛАЗА

- Катаральное воспаление глаз вследствие инфекции верхних дыхательных путей .
- Результаты теста:
 - **Гемианопсия**: вертикальная (Lyc., Mur-ac.) и горизонтальная (Ars., Lith-c.).
 - **Феномен заката +** (Ад., Цинк.).

- **Выпученные, пристальные глаза** (Гуайх.).
- Синие склеры (Ars., Plb., Stram.).
- Врожденное помутнение роговицы.
- Корки, шелушащиеся высыпания на краях век.
- Синдром Кеннеди.
- Выпадение ресниц (Rhus-t., Sei.).
- Гипертелоризм.
- Неправильной формы (Hyos., Merc.) или суженные зрачки (Op., Thu.).
- Паралич VI черепного нерва (Caust., Gels.).
- Выпячивание глазного яблока (натр.-м.).
- Ретинобластома (сифилис).
- Синдром Робертса.
- Склерит, эписклерит (Kalm., Thu.).
- Зерна ячменя.
- Трахома.

УШИ

- Хроническая инфекция среднего уха с желтыми, гнойными, **зловонными** выделениями.
- **Потеря слуха** из-за увеличенных и **гипертрофированных миндалин** (Agra., Bar-c., Calc-p.).
- Боль с **покраснением** и припухлостью за ухом, облегчающаяся от **холодных компрессов** (Merc., Puls.) и на **свежем воздухе** (Acon., Puls.).
- Неврологические расстройства, такие как эпилепсия и мигрени, вызванные чрезмерным использованием антибиотиков и противовоспалительных ушных капель при инфекциях среднего уха.
- Результаты теста:
 - **Сосцевидный отросток чувствителен к прикосновению** (Cham.).
 - **Перфорация** барабанной перепонки (гидр., кали-би., туб.).
 - Абсцесс за ухом (Merc.) с выделениями, имеющими неприятный запах.
 - Мокнувшая сыпь за ушами.
 - Красноватое окрашивание (Agar., Chin.).
 - Рентгенологическое исследование: Разрушение губчатых клеток сосцевидного отростка (Caps., Hep., Phos., Sil.).

Нос

- **Насморк** (хроническая простуда у младенцев) у грудных детей с заложенным носом, что затрудняет им грудное вскармливание (Kali-bi., Lyc., Nux-v., Samb.).
- Насморк, лучше на открытом воздухе (All-c., Calc-s.).
- Носовые кровотечения при сморкании (Lach., Phos.).
- При попытке глотания из носа выделяется жидкость (паралич IX (языкоглоточного нерва) и X (блуждающего нерва) черепных нервов (Carbn-s., Crot-h.).
- Приступы чихания на солнце (Agar., Merc.).
- Результаты теста:
 - **Запавшая верхняя часть переносицы** (Ant-t., Hep.) при синдроме Дауна, множественном дизостозе или этническом заболевании.
 - **Красный, пуговчатый кончик носа** (Кейл.).
 - Спайки ноздрей (Bar-c., Merc.).

- Постоянное ковыряние пальцами в носу (Arum-t., Cina).
- Неприятный запах.
- Носовые полипы (форм.).
- Ретроназальный катар, особенно по утрам.
- Желтоватый, густой, зловонный, гнойный катар, который высыхает и образует сухие, твердые корки (Kali-bi., Lac-c., Nit-ac.).

Лицо

- Воспаление околоушной **железы** , приводящее к орхиту (Puls., Rhus-t.).
- угри , особенно после неправильного использования мазей с витамином А, таких как ретинол.
- Результаты теста:
 - **Холодный пот** на лице (Ars., Carbo-veg.).
 - **Лицо пылающее, красное** (Bell., Cina.), особенно с головной болью.
 - **Блестящее, жирное** (Thu.j.), сверкающее лицо.
 - Одутловатое лицо (Ars.).
 - Потрескавшиеся губы.
 - Цианоз (Nat-m.).
 - Околоушные железы +.
 - Отёчное лицо.
 - Верхнечелюстные железы увеличены и болезненны при надавливании.

Рот

- **Обильное слюнотечение во время сна** (Lyc., Puls., Rhus-t.).
- Неприятный запах изо рта.
- Результаты теста:
 - Трещиноватый язык, покрытый желтым налетом, с красным кончиком.
 - Темно-красные десны, которые легко кровоточат; гингивит.

Шея

- Жгучая боль в горле при глотании.
- Результаты теста:
 - **Удлиненный язычок** (Bar-m., Hyos.).
 - **Пульсация сонных артерий** (Bell., Glon.).
 - Зоб с экзофтальмом.
 - При лихорадке наружная часть горла становится горячей.
 - Зоб (под., губ.).
 - Миндалины увеличены и воспалены.

Желудок

- **Булимия с грустью** (Игн.).
- **Повышенный аппетит во время лихорадки** (Phos.).
- Жгучая, сильная жажда (Acet-ac., Tarent.).
- Боль в желудке, уменьшающаяся после еды (Graph., Chel.).
- Медленное пищеварение.
- Не любит: **рыбу** (Graph., Nat-m., Phos.) и мясо.
- Пристрастия: кофе, деликатесы (Ipec., Lyc., Tub.), **сухой и черствый хлеб**, макароны, неперевариваемые продукты, молоко, выпечка, специи, сладости.

ЖИВОТ

- Атрезия желчных протоков.
- Желтуха после гнева (Cham., Nux-v.).
- Ночные колики у младенцев, вызывающие газообразование.
- Результаты теста:
 - **Печень плотная, увеличенная, особенно при застойной сердечной недостаточности** (диг., маг.).
 - Увеличение паховых лимфатических узлов (Merc.).
 - Индийский детский цирроз печени (Nat-s., Hydr.).
 - Болезненная, ущемленная паховая грыжа у детей (Nux-v., Verat.), особенно с правой стороны.
 - На ультразвуковом изображении видны увеличенные брыжеечные лимфатические узлы (Бар-к.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Ночная диарея** (китайск.).
- Зловонный метеоризм.
- Результаты теста:
 - Пот в области ануса и промежности.
 - Выпадение прямой кишки (Рута).

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Пенистая, сильно пахнущая, молочная моча.
- Печеночная и почечная недостаточность в терминальной стадии цирроза печени (Ars., Op., Zinc.).
- Непроизвольное мочеиспускание после дефекации.
- Результаты теста:
 - Красный песок в подгузнике.
 - Моча: Альбумин ++ (из-за слабости сердечной мышцы).

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результаты теста:
 - **Крипторхизм** (Iod, Sil), яички расположены либо в брюшной полости, либо в препубиальной области (Thyr.).
 - Хронический орхит.
 - Гидроцеле (сокращенно).
 - Пот на мошонке (Sulph., Thuj.).
 - Неопущение яичек (Plb., Zinc.).

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Задержка менархе (пульса).

ДЫХАНИЕ

- **Астма в сезон дождей** (Chin., Dulc., Nat-s.).
- Астматическое дыхание вследствие **левожелудочковой сердечной недостаточности** (Ant-ar.) или вследствие ревматического заболевания сердца (правожелудочковая сердечная недостаточность) (Stry-ar.).
- Одышка не позволяет пациенту лежать; хуже на **холодном свежем воздухе** (Nux-v., Psor.); лучше от отхаркивания и в положении сидя, наклонив верхнюю часть тела вперед (Ars., Kali-c.).

КАШЕЛЬ

- Кашель настолько сильный, что **сотрясает грудь** (Lact-v., Phos.).
- Сухой, спастический кашель, регулярный, каждую ночь, начинающийся вечером и продолжающийся утром, с затрудненным дыханием.

Грудь

- **Врожденный цианотический порок сердца** (Dig.) и врожденный аортальный стеноз (Syph.).
- **Ревматическая болезнь сердца** (Калм.) в сочетании с затруднением дыхания .
- Полезно при запущенной пневмонии (Лус.).
- Результаты теста:
 - ЭКГ: мерцательная аритмия, экстрасистолы.
 - Гипертрофия левого желудочка вследствие тяжелой сердечной нагрузки (Ars-i.).
 - Шумы в сердце.
 - Перикардит и перикардальный выпот.
 - Ревматический эндокардит.
 - Гипертрофия правых отделов сердца вследствие сильной сердечной нагрузки (Naja).
 - Подострый бактериальный эндокардит.
 - Дефекты сердечных клапанов, такие как врожденный аортальный стеноз (очень распространен) или дефекты аортального клапана в результате ревматизма.
 - Рентгенологическое исследование: пневмония, выступающая аортальная ручка.

НАЗАД

- Скованность и напряжение в области шеи.
- Результаты теста:
 - Рентгенологическое исследование: **искривление позвоночника** (Merc-s., Sulph.); кифоз (Calc-f.).
 - Холодный нарыв на спине (Sil.).

КОНЕЧНОСТИ

- **Боли роста** по ночам (Conch., Ferr-act., Guaj.).
- **Периостит** (сифилис), который поражает преимущественно кости нижних конечностей.
- Блуждающие, ревматические боли в суставах, особенно по ночам, **которые заставляют пациента вставать с постели** (Cham., Merc., Verat.), лучше от движения.
- Острый ревматизм, чередующийся с сердечными жалобами (Калм.).
- Заболевание тазобедренного сустава.
- Результаты теста:
 - **Цианоз** с синюшными ногтями.
 - **Ледяные руки** и ноги (Carbo-veg., Elaps., Sil.), ночью в постели, во время озноба при лихорадке.
 - Артритические узелки.
 - Костные опухоли большеберцовой кости (Calc-f.).
 - Потрескавшиеся руки.
 - Болезненность между бедрами, вызванная ношением подгузников (Бар-к.).

СПАТЬ

- **Засыпание во время чтения** (нац.).
- Невозможно спать на **правом боку** (Borx., Acet-ac.).
- **Бессонница** из-за **болей в костях** по ночам (Kalm., Merc., Plb.).
- Стоны и рыдания во сне (Хам.).
- Сонливость после обеда (Carbo-veg., Kali-bi., Laur.).
- Сонливость у детей сразу после кормления (Agar., Nux-v.).

КОЖА

- **Рецидив бородавок** после прижигания жидким азотом (Nit-ac.).
- Результаты теста:
 - Врожденный ихтиоз (Ars-i., Syph.).
 - Сухая, потрескавшаяся кожа.
 - Мурашки по коже (Nux-v.).

СУДОРОГИ

- Судороги после гнева у младенцев (Cham., Cupr., Nux-v.).

ОБЩИЙ

- Атрофия и **затвердение желез** (Cale., Calc-i., iod.).
- **Отеки вследствие заболеваний сердца и почек** (Colch., Sal-ac., Solid.).
- **Отсутствие жизненного тепла.**
- **Предрасположенность к врожденным аневризмам** (Bar-c., Carbo-veg., Thuja.).
- У ребенка имеется значительный семейный анамнез заболеваний аорты, цереброваскулярных травм, гипертонии и ишемической болезни сердца.
- Симптомы усиливаются ночью (особенно после 3–4 часов утра).
- Нежные, чувствительные, истощенные, слабые, болезненные младенцы.
- Выпадение волос после любого острого заболевания (Carbo-veg.).
- Любит мыться в холодной воде, что улучшает симптомы (Apis., Calc-s.).
- Пульс: нерегулярный (Chin., Lach.), слабый, частый, малый (Ars., Laur.).
- Дети с искривленными плечами (Cale., Phos., Sulph.).
- Склонность к абсцессам в костях (Lyc., Merc.) и железах (Calc-s., Sil.).
- Слабость и утомление от чтения или учёбы, даже через короткое время (Pic-ac., Sumb.).

БАЦИЛЛИНА БЕРНЕТТА

(Нозод туберкулеза: мацерация туберкулезной легочной ткани - Бактерии)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Ребенок *Bacillinum* отказывается принимать ответ «нет»; он реагирует истериками, бьется головой о стену и т. д.
- ▶ Желание путешествовать.
- ▶ Деструктивные наклонности: небрежно относится к игрушкам, книгам, письменным принадлежностям, одежде и т. д.
- ▶ Боязнь собак и кошек.
- ▶ Беспокойные дети, которым нужна постоянная активность днем и ночью.
- ▶ Молчаливый, сварливый, раздражительный, угрюмый, болезненный; хнычет и жалуется.

Тело

- ▶ Симптомы непостоянны, особенно при острых инфекциях.
- ▶ Дети, которым холодно и не хватает тепла, избегают сквозняков от вентиляторов и кондиционеров.
- ▶ Хроническая диарея или постоянный запор у детей.
- ▶ Потеря веса из-за тяги к еде.
- ▶ Подвержены простудам и болям в горле, которыми легко заражаются, но медленно выздоравливают.
- ▶ Симптомы также быстро и интенсивно проявляются и исчезают.
- ▶ Увеличение и воспаление желез, особенно полипов носа, паховых и брыжеечных желез.

Другие важные симптомы

Дух

- **Кретинизм.**
- **Умственно развит рано, но физически слаб.** Отвечает отрывисто или - неохотно.
- **Задержка физического и умственного развития ребенка после острых инфекций центральной нервной системы, таких как менингит, энцефалит и т. д.**
- **Сильный страх и беспокойство в темноте.**

Голова

- **Головная боль у детей школьного возраста;** усиливается от учебы или малейшего умственного напряжения; очки не улучшают состояние.

- **Туберкулезный энцефалит.**
- Острый церебральный или базальный менингит с угрозой выпота.
- Невыносимая боль; ребенок кричит, рвет на себе волосы, бьет себя кулаком по голове, пытается разбить ее о стену или пол .
- Результаты теста:
 - Облысение или очаговое выпадение волос у мальчиков.
 - Герпесная тонзура (трихофития) на волосистой части головы.
 - Гидроцефалия.
 - Непроизвольное покачивание головы.
 - Вши.
 - Placa polonica.
 - Лишай на коже головы.

ГЛАЗА

- Склонность к развитию близорукости в раннем возрасте.
- Результаты теста:
 - Блефарит.
 - Воспалительный дерматит век.
 - Изъязвление роговицы.

УШИ

- Отит после ангины.

Нос

- **Скопления небольших болезненных язв, выделяющих зеленый, зловонный гной.**
- **Пот на носу.**
- Постоянная подверженность простудам.
- Результаты теста:
 - **Увеличенные носовые полипы.**
 - Атрофия слизистой оболочки носа с неприятным запахом.

РОТ

- **Задержка прорезывания зубов.**
- **Чрезмерное количество зубного камня на зубах.**
- Зубы чувствительны к сквознякам.
- Результаты теста:
 - Потрескавшиеся губы.
 - Зубы недоразвитые, неровные, не до конца развитые.
 - Зеленовато-желтое изменение цвета зубов.
 - Язык карты.
 - Ранний кариозный зуб у детей младшего возраста.
 - Гнойные выделения.
 - Налет на зубах.
 - Язык клубничный, с торчащими сосочками.

Лицо

- **Безболезненные, воспаленные прыщи на левой щеке, которые время от времени появляются и сохраняются в течение многих недель.**
- Боль под правым глазом.
- Результаты теста:
 - Внешний вид «крыльев летучей мыши» (тип крыловидной ткани) в месте соединения носа и щеки.
 - Коричневые пятна или пятна на лице.
 - Экзематозные высыпания на лице, сопровождающиеся импетиго.

Шея

- Результаты теста:
 - Шейные лимфатические узлы увеличены и болезненны при надавливании.
 - Увеличение миндалин.

Желудок

- **Отвращение и ухудшение состояния при употреблении куриного мяса.**
- **Жажда большого количества воды.**
- **Рвота из-за кашля.**
- Спазматические позывы к рвоте и рвота до тех пор, пока желудок не опустеет.
- Склонность к развитию ротавирусной и хеликобактерной инфекций.
- Отвращение к еде, несмотря на голод.
- Пристрастия: холодное молоко, деликатесы, яйца, жир, ветчина, мороженое, горчица, **соленые** огурцы, свинина, **соль**, копчености, сладости и **уксус**.
- Результат теста:
 - Гастроскопия: уплотнение привратника.

Живот

- Вздутие и выпячивание живота, в основном из-за слабости мышц живота.
- Туберкулезное заболевание брыжеечных желез.
- Результаты теста:
 - Барабанная перепонка, в которой выпячивается область селезенки.
 - В паху много мелких, заметных, затвердевших желез.
 - Сонография брюшной полости показывает туберкулезную кальцификацию брыжеечных желез.

Прямая кишка

- **Хроническая диарея у детей, страдающих непереносимостью лактозы или синдромом мальабсорбции.**
- **Утренняя диарея, которая выделяется внезапно и с большой силой.**
- **Постоянные запоры с бездеятельностью прямой кишки и выделением зловонных газов у младенцев.**
- Детская холера.
- Периодические кровотечения из заднего прохода.
- Выпадение геморроидальных узлов с болью при кашле.
- Результаты теста:

- Колоноскопия: геморрой, полипы прямой кишки и язвенный колит.
- Экзематозные высыпания вокруг ануса.
- Покраснение анальной области.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Болезнь Аддисона.
- Ночное недержание мочи.
- Непроизвольное мочеиспускание при кашле.
- Результаты теста:
 - Снижение уровня кортизола в сыворотке.
 - Урография: **Туберкулезный кальциноз надпочечников.**

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Афония.

ДЫХАНИЕ

- Приступы удушья по ночам с трудно поддающимся лечению кашлем.
- Влажная астма.
- Результат теста:
 - Брюшное дыхание, ускоренное и затрудненное.

КАШЕЛЬ

- **Ребенка трясет от кашля по ночам, но он все равно не просыпается.**
- Ребенок **все реже и реже откашливает** мокроту; создается впечатление, что он в конце концов ею подавится.
- Сухой, прерывистый кашель с обильным потоотделением и потерей веса.
- Удушающий кашель в помещении, лучше на открытом воздухе.

Грудь

- **Катаральная или бронхопневмония.**
- Бронхоэктатическая болезнь.
- Хронический бронхит, при котором кашель сохраняется, несмотря на лечение.
- Результаты теста:
 - Бронхиальное дыхание в области верхушки левого легкого.
 - Рентгенограмма грудной клетки: уплотнение, увеличенные лимфатические узлы ворот легких, сотовая структура легкого, инфильтрация верхушки левого легкого, плевральный выпот.
 - Плоская, узкая или впалая грудная клетка с выступающими ребрами и ключицами, плечи сдвинуты вперед.
 - Слизисто-гнойная мокрота.
 - Отек легких.
 - Дребезжащие звуки.

НАЗАД

- Туберкулез позвоночника.
- Результаты теста:
 - Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника показывает деструкцию костной ткани поясничных и грудных позвонков.

- Знак Кернига +.
- Кифосколиоз.
- Магнитно-резонансная томография шейных и поясничных позвонков показывает холодный абсцесс.
- Остит или кариес позвонков.
- Расщелина позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

- Склонность к развитию остеомиелита.
- Результаты теста:
 - Руки синие.
 - Пожатие рук.

СПАТЬ

- **Скрежетание зубами во время сна.**
- Разговаривает или кричит во сне.

КОЖА

- **Сильное потоотделение по ночам.**
- **Склонность к развитию рецидивирующих гнойных язв.**
- Экзематозные высыпания на коже с интенсивным зудом ночью при раздевании.
- Результаты теста:
 - герпес .
 - Импетиго.
 - лишай .
 - Лишайники.

Общий

- **Непоследовательность симптомов.** Симптомы сначала поражают один орган, затем другой (лёгкие, мозг, почки, печень, желудок, нервную систему и т. д.).
- **Зябкий и чувствительный к холодным сквознякам.**
- Карликовость и **задержка развития с истощением** и маразмом, несмотря на **волчий голод**, вследствие расстройств ассимиляции.
- **Склонен к аллергиям**, особенно тем, которые поражают дыхательные пути
- Частое возникновение **всех форм туберкулеза** в семье или в анамнезе.
- Подходит для детей со светлой кожей, узкой грудью и голубыми глазами, которые быстро растут и активны, но быстро теряют вес.
- Подверженность простудам и ангинам, которыми они легко заболевают, но от которых долго не выздоравливают.
- Склонность к сильному кровотечению при малейшей травме.

БАДЯГА

(Речная губка .)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Скрофулезный диатез** или скрофулезная конституция, т. е. склонность к увеличению, воспалению и уплотнению как эндокринных, так и экзокринных желез, например, шейных лимфатических узлов, миндалин, щитовидной или поджелудочной железы.
- ▶ Детское ожирение.
- ▶ Мигрени, сопровождающиеся воспалением глаз. Головные боли уменьшаются ночью, но резко возобновляются после сна.
- ▶ Геринг назначал это средство детям с перхотью и легким зудом, а также с болью в горле и тонзиллитом после употребления сладостей, таких как конфеты или леденцы, болезненным глотанием и частым кашлем с липкой мокротой.
- ▶ Кашель влажный, приступообразный и спазматический. Кашель усиливается от любых сладостей (конфет, кондитерских изделий), облегчается от тёплых компрессов.
- ▶ Плач, когда кашель становится мучительным и хроническим, как при гепатите.
- ▶ Очень хочется пить.

Источник

- Бадяга, пресноводная губка, также называется *Spongilla lacustris*.
Бадиага - это Кейл, очень похоже.

БАПТИЗИЯ КРАСИЛЬНАЯ

(Дикий Индиго - Крещение)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Боль в горле (обычная стрептококковая ангина) и тонзиллит. Токсичный внешний вид, опухшее лицо, горячая, влажная кожа и сильный неприятный запах изо рта. Язык грязный или коричневатого-желтого, обложенный, может быть совершенно сухим. Миндалины, как правило, очень быстро нагнаиваются. Густая, липкая и клейкая слюна во рту. Липкие выделения из горла. Увеличенные и болезненные шейные лимфатические узлы. Темно-красное горло. Любая попытка проглотить пищу или жидкость невозможна. Горло болезненно на ощупь.
- ▶ Воспаленный рот, полный язв. Потрескавшиеся губы.
- ▶ Отличить крещенскую лихорадку от лихорадки Геля сложно. Принципиальное отличие заключается в том, что у пациентов с крещенской лихорадкой интоксикация всегда сильнее, чем у пациентов с лихорадкой Геля.
- ▶ Лихорадка обычно вызывает делирий, которому предшествует выраженная летаргия. У детей возникает спутанность сознания, и им очень трудно сосредоточиться на том, что они делают. В терминальной стадии ребенок может фактически не понимать, где он находится, с кем разговаривает и что с ним происходит.
- ▶ При повышении температуры тела очень быстро развивается сильное потоотделение.
- ▶ **Лихорадка вследствие инфекций**, воспалительных заболеваний и сыпи.
 - ▶ На улице мороз, а ребенок не любит сквозняков.
 - ▶ Инфекции, сопровождающиеся сыпью, такие как **свинка, корь, ветряная оспа и тиф**.
 - ▶ Хорошее средство от температуры после прививок.
 - ▶ Лихорадка крестителя обычно поражает мозг очень быстро, поэтому сонливость, вялость, безразличие, спутанность сознания и бред развиваются гораздо быстрее, чем при приеме других средств.

Источник

- Относится к семейству бобовых (Leguminosae).

БАРИЙ КАРБОНИКУМ

(Карбонат бария - Bar-c.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Всегда **невнимателен** на уроках, не может сосредоточиться на доске или учителе. Поэтому ребёнок сегодня что-то усвоил, а завтра забыл.
- ▶ Постоянная потребность в **эмоциональной** и физической **поддержке**.
- ▶ есть что-то **от гнома**, как умственно, так и физически.
- ▶ слишком **застенчив** : **прячется** за мать или мебель или держится за мать, закрывает лицо руками и смотрит сквозь пальцы.
- ▶ **Тугодум, неспособный усвоить что-либо новое**; например, мать может научить ребёнка простому стихотворению, например, «Eia Poreia», и повторить его дюжину раз, а через полчаса, когда её просят повторить стихотворение, ребёнок смотрит на неё пустым взглядом; ребёнок всё забыл. **Проблемы с учёбой** в школе (например, чтение, математика) гораздо ниже уровня, соответствующего его возрасту. В конечном итоге это деморализует ребёнка и приводит к низкой самооценке.
- ▶ **Инфантилизм** со слабой памятью. Ребёнок выглядит невнимательным и тупым. Он не может нормально играть и ходить и постепенно приближается к грани умственной отсталости.
- ▶ Зависимые дети: Они становятся нервными и могут паниковать, когда их просят сделать что-то самостоятельно; они испытывают страх (а иногда и кошмары) от того, что им придется делать что-то без поддержки.
- ▶ Малыши не могут удерживать внимание; например, они не задерживаются с игрушкой дольше нескольких секунд или минут. Они тут же бросают её и ищут что-то другое или пытаются привлечь к себе внимание.

Ребенка Bar-c отличают следующие социальные черты:

- ▶ **Нервничает в присутствии незнакомцев**: прячется в соседней комнате или за матерью, а если нет других вариантов, то под одеялом.
- ▶ Постоянно **грызет** или **грызет ногти** , чтобы скрыть свою застенчивость.
- ▶ Предпочитает сидеть **один**. Садится **в углу** возле двери или в самом конце класса.

- ▶ **Нежелание участвовать в играх**, спортивных, культурных или общественных мероприятиях .

- ▶ Молодые девушки с **мужеподобной** внешностью (нац.-ср., плат.).

Тело

- ▶ Конституция по барию: **преждевременно состарившийся, худой, морщинистый**, карликовый , с большой лысой головой. У врача складывается впечатление, что это истощенный или умственно отсталый ребенок, склонный к ожирению, с маленькими половыми органами и дисфункцией желез.
- ▶ **дезинтегративное расстройство (ДДР)** — это расстройство умственной отсталости, связанное с синдромом Аспергера, которое характеризуется нарушениями невербального поведения, неспособностью развивать отношения со сверстниками, отсутствием эмоциональной взаимности и ограниченными, повторяющимися стереотипными моделями поведения.
- ▶ Дети с **частыми тонзиллитами** и рецидивирующими паратонзиллярными абсцессами.
- ▶ **Слюнотечение** — распространённая проблема у многих детей, которым требуется бар-коррекция. У таких детей часто наблюдается лёгкая или умеренная умственная отсталость.
- ▶ **карлики** , которые не растут (дети, которые растут слишком быстро: Calc., Phos., Sulph., Tub.).
- ▶ **Поздно развивающиеся** (Агар., Кальциф., Фосф.): они поздно учатся говорить и ходить, у них поздно прорезываются зубы, они поздно набирают вес или задерживается только одна из этих стадий развития (т. е. все этапы развития нормальны, за исключением одного).
- ▶ **Нарушения двигательных навыков**, неуклюжесть, задержка двигательного развития, например, обучения ходьбе, ползанию, сидению, составлению пазлов, построению моделей.
- ▶ **Рецидивирующие** инфекции горла после чрезмерного использования антиперспирантных порошков (Psor., Sil.).
- ▶ Генерализованное увеличение лимфатических узлов (**«скрофулезный диатез»**) с увеличением шейных, паховых, брыжеечных, корневых лимфоузлов, миндалин и т. д., иногда с гноем.
- ▶ Очень зябкие дети с повышенной чувствительностью к холоду (Calc., Kali-c., Psor., Sil.).
- ▶ Легко устают и истощаются: любое продолжительное напряжение (например, по дороге в школу, во время чтения в библиотеке, игры) делает их злыми и раздражительными, что является для них косвенным способом выражения усталости.
- ▶ Малейшее воздействие холодного воздуха, холодной погоды или небольшого количества холодных напитков и холодной пищи может привести к инфекции верхних дыхательных путей, бронхиту, астме, синуситу и т. д.
- ▶ Дети с толстым животом, у которых твердый, вздутый живот.

Другие важные симптомы

Дух

- **Беспокойство о здоровье близких и любимых людей** (Carc., Coss.); **страх их потери** (потери поддержки).
- **Неуклюжий из-за застенчивости** (Амбр.); роняет вещи из-за нервозности (застенчивый).
- **Добросовестный в мелочах** (Carc., Kali-c.).
- **Доверчивый** (Bell., Puls.).
- **Страх оживленных и шумных улиц**, пересечения мостов, **узких и замкнутых пространств** (самолеты, поезда, автобусы и т. д.), людей, чужого мнения, открытых пространств, **незнакомцев и чего-либо нового**.
- Рассеянные школьники, особенно при чтении и когда с ними разговаривают.
- Беспокойство и тревога ночью в постели (Ars., Rhus-t.).
- Жадность.
- Отвращение к чтению (Nat-c., Nux-v.).
- Беспричинный и чрезмерный смех, иногда также и в ответ на критику (Граф.).
- Детское поведение и привязанность к людям или мебели (Ars., Stram.).
- Трусливые дети, не имеющие смелости высказать собственное мнение.
- Желание путешествовать (Туб.).
- Желание пожевать.
- Желание угодить другим (Carc., Staph., Thuj.).
- Задержка развития у детей.
- Не участвует ни в каких школьных мероприятиях (например, в занятиях по публичным выступлениям, театральном кружке, спортивных секциях); в конечном итоге вообще ничего не делает.
- Притупление сознания из-за умственного напряжения.
- Легко пугается (Кейл.) мелочей.
- Чувствует себя брошенным и одиноким.
- Считает, что она выглядит уродливо (низкая самооценка: Лак-к.).
- Зацикленность на поддержке матери.
- Безрассудный.
- Представляет, что за ней наблюдают, над ней смеются или издеваются, когда она находится в компании или в доме.
- Невнятная речь.
- Нерешителен в мелочах (Граф., Лайк.).
- Любовь к животным.
- Любит играть с куклами и в воде.
- Умственная отсталость вследствие органических поражений мозга, например, инфаркта мозга, кровоизлияния в мозг, дегенерации мозга, энцефалита, менингита, подострого склерозирующего панэнцефалита.
- Нытье по мелочам и во сне во время лихорадки.
- Упрямство из-за застенчивости и страха попробовать что-то новое.
- Замкнутый (не хочет показывать свою слабость).
- Чувствителен к критике, легко раним.
- Чувствителен к малейшему шуму.

- По своей натуре очень осторожен и осторожен.
- Неуверенность в себе.
- Дети со слабой силой воли.

Голова

- Не переношу ни малейшего холодного сквозняка от вентилятора или кондиционера . Чувствую себя комфортно и уютно, когда голова покрыта.
- Односторонняя головная боль у детей школьного возраста, возникающая вследствие воздействия солнца, шума (особенно разговоров людей) или намокания.
- Результаты теста:
 - весы.
 - Раннее поседение волос.
 - Экзематозные высыпания на коже с сухими корками и зудом.
 - Голова наклонена набок.
 - Горячая голова, холодные конечности.
 - Гидроцефалия.
 - Импетиго.
 - Открытые роднички.
 - Placa polonica.
 - Кисты, задерживающие салоотделение.
 - Увеличение затылочных желез.

ГЛАЗА

- Конъюнктивит со светобоязнью.
- Слезы текут на свежем воздухе.
- Опухшие веки по утрам.
- Результаты теста:
 - Блефарит.
 - Помутнение роговицы.
 - Изъязвление роговицы.
 - Птоз левого верхнего века.
 - Ячмень на левом верхнем веке.

УШИ

- **Нарушение слуха вследствие гипертрофии небных миндалин.**
- Нарушение слуха вследствие паралича слухового нерва.
- Ощущение, будто ухо заложено.
- Результаты теста:
 - Корки и шелушения за ушами.
 - Инфекция среднего уха с кровянистыми гнойными выделениями из ушей.
 - Увеличенные лимфатические узлы перед ушами.

Нос

- **Болезненная сухость** в носу, заставляющая ребенка **постоянно сморкаться.**
- Насморк с отеком верхней губы и носа.
- Носовое кровотечение при сморкании по утрам.
- Частое сильное чихание.

- Густые, желтые, зловонные выделения из носа, образующие корки или струпья, которые простираются в носовые ходы.
- Результаты теста:
 - Полипы носа.
 - Ретроназальный катар.
 - Изъязвление носовой перегородки.

Лицо

- Односторонний пот.
- Результаты теста:
 - **Верхняя губа опухла** (Bufo, Cale.).
 - Темно-красные губы.
 - При кашле лицо становится темно-красным.
 - Жирное, морщинистое, старческое лицо с болезненным выражением.
 - Уплотнение или нагноение с болезненностью околоушных и подчелюстных желез, особенно правой.

РОТ

- **Невнятная речь.**
- Повышенное слюноотечение, особенно во время сна.
- Зубная боль при употреблении холодной или горячей пищи или питье.
- Результаты теста:
 - **Рецидивирующий абсцесс десен**, который легко кровоточит и имеет тенденцию к образованию свищей.
 - Неприятный запах изо рта.
 - Быстрое разрушение зубов.

ШЕЯ

- **Рецидивирующий тонзиллит с каждым наступлением холодов** или употреблением холодной пищи и напитков.
- Першение в горле из-за простуды, особенно при глотании.
- При глотании возникает ощущение комка в горле, как будто пища застряла внутри.
- Результаты теста:
 - **Увеличение и нагноение миндалин**, особенно правой.
 - Ретроназальный катар.
 - Уплотнение миндалин.
 - Подчелюстные и подбородочные лимфатические узлы увеличены и уплотнены.

ЖЕЛУДОК

- Несмотря на чувство голода, после нескольких укусов возникает отвращение к еде.
- Сильная, неутолимая жажда.
- Частая рвота после употребления молока.
- Расстройство пищеварения у маленьких детей, которые чрезмерно мастурбируют.
- Тяга была, но все равно похудела.
- Внезапная тошнота во время еды с отвращением к пище.
- Ухудшение: хлеб, китайская еда, теплая или горячая пища и теплые напитки.

- Улучшение: Холодная еда и холодные напитки.
- Отвращения: фрукты (особенно бананы и сливы), сладости.
- Пристрастия: яйца, сладкое.

живот

- Вздутие живота газами с позывами на дефекацию; сворачивается от боли; лучше от теплых компрессов.
- Бурчание в желудке.
- Болезненное вздутие живота у детей, больных маразмом, сопровождающееся исхуданием ног.
- Результаты теста:
 - Твердый, плотный, вздутый, болезненный живот с втянутым пупком и исхуданием тела.
 - Затвердевшие, опухшие паховые железы.
 - Паховая грыжа.
 - Ультразвуковое изображение показывает увеличенные брыжеечные

лимфатические узлы.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запор у младенцев при безуспешных попытках потужиться и натужиться; стул плохо сформирован, комковатый или похожий на овечий.
- Зуд в заднем проходе из-за глистов.
- Безболезненная диарея у детей после эмоционального возбуждения или употребления холодных напитков.
- Отхождение обильных, зловонных газов.
- Результат теста:
 - Кал: острицы и аскариды.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Задержка мочи.
- Результат теста:
 - Моча: лимфоциты +, эритроциты +.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Крипторхизм.
- Ранняя склонность к мастурбации.
- Болезненный пот между мошонкой и бедрами.
- Результат теста:
 - Затверждение яичек.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Обильные молочные бели у маленьких девочек.
- Задержка первой менструации.
- Ранняя склонность к мастурбации.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Охриплость и грубый голос при простуде или в сырую погоду.
- Болезненное першение и саднение в гортани из-за постоянного сухого кашля.
- Хриплая мокрота в дыхательных путях.

ДЫХАНИЕ

- Астма в сырую погоду и от малейшего холодного сквозняка.
- Ребенку трудно дышать ночью, когда он лежит, из-за увеличенных миндалин и носовых полипов.
- Одышка с кашлем на свежем воздухе.
- Результат теста:
 - Хриплое дыхание, как будто грудная клетка заполнена слизью.

КАШЕЛЬ

- **Мучительный, сухой, щекочущий кашель** от раздражения дыхательных путей, особенно усиливающийся ночью, от напряжения, на холодном или свежем воздухе, в **присутствии посторонних**, в сырую погоду, от холодных напитков или горячей пищи, от разговора, от одной **мысли об этом** и от открывания лица; лучше после завтрака и в положении лежа на животе.
- Хронический кашель у золотушных детей.
- Кашель сопровождается повышенным слюноотделением.
- Кашель, по-видимому, исходит из желудка (Bry., Sep.).
- Хриплый кашель, как будто в груди скопилось много мокроты.
- Результаты теста:
 - Пневмония с красными щеками.
 - Шумы сердечных клапанов.

НАЗАД

- Результаты теста:
 - Искривление позвоночника в дорсальном отделе.
 - Расщелина позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

- **Неприятный запах и болезненность пота между пальцами ног.**
- Ночные боли в нижних конечностях (боли роста), облегчающиеся от теплых компрессов.
- Паралич сгибателей стопы, сопровождающийся клонусом голеностопного сустава (детский церебральный паралич).
- Спотыкание при ходьбе из-за неуклюжести нижних конечностей.
- Результаты теста:
 - Холодные руки.
 - Трещины на кончиках пальцев.
 - Истощенные нижние конечности.
 - Зловонный пот ног.
 - Чувствительные к давлению мозоли или натоптыши на подошвах ног.
 - Трещины на кончиках пальцев.
 - Бородавки на руках.

СПАТЬ

- Сны: **О приключениях** (компенсаторные, в то время как в реальности он - инвалид и умственно отсталый), о пожаре (подавленные чувства, умственно отсталый) и о неудачах (что соответствует действительности из-за его инвалидности).

- Во время сна: физическое беспокойство и хныканье.
- Чрезмерная зевота во время головной боли и после дневного сна.
- Спит на левом боку.
- Просыпается от ужасных кошмаров.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Дискомфорт, вызванный: малейшим холодным сквозняком, намоканием или переходом со свежего воздуха в теплое помещение.
 - Односторонняя дрожь с мурашками (волосы встают дыбом).
 - Хуже: вечером и при малейшем раскрытии.
 - Лучше: в теплом помещении или вдали от источников тепла.
- Нагревать:
 - Внешний жар с холодом всего тела; потеря аппетита; беспокойство и неугомонность, несмотря на сильное истощение.
 - Желание немедленно раскрыться вызывает дрожь. Озноб заставляет снова укрыться.
 - Хуже: во время сна.
- Пот:
 - Обильный, зловонный, односторонний пот.

КОЖА

- Зуд сопровождается жжением и не облегчается расчесыванием; кожа расчесывается до крови; усиливается во время сна.
- Кожа кажется холодной, несмотря на внутреннее ощущение тепла.
- Результаты теста:
 - Нейродермит.
 - Сухие, корковые, экзематозные высыпания.
 - Гусиная плоть.
 - Опрелость.
 - Кисты, задерживающие салоотделение.
 - Бородавки.

Общий

- **Зябкость** из-за отсутствия жизненного тепла. **Не переносит ни малейшего воздействия** на любую часть тела .
- **Склонность легко простужаться.**
- Хуже от **холода в любой форме** (холодный воздух, холодная ванна, холодные напитки, холодная погода, холодные влажные компрессы, сквозняки и т. д.), полнолуния, лежания на больной стороне, **присутствия посторонних** или помещения, полного людей, давления, сырой погоды.
- Желание чувствовать себя лучше на теплом воздухе или в теплой одежде.
- Низкорослость с задержкой развития.
- Потеря веса, несмотря на волчий голод у младенцев, с болезненным уплотнением желез .
- Семейный анамнез злоупотребления аллопатическими препаратами, аневризмы , проблемы с аортой, инсульт, повторные вакцинации.

- В анамнезе рецидивирующий тонзиллит.
- Повышенные рефлексy.
- Отсутствие реакции и вялость тела.
- После вакцинации я больше никогда не буду здорова.
- Односторонние симптомы: сначала поражается правая сторона, затем левая.
- Рахит.
- Обморок в переполненном помещении.
- Раны имеют тенденцию нагнаиваться и заживать медленно.

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ

За последние 23 года своей практики я выявил следующие общие факторы, которые могут привести к умственной отсталости:

- Аутизм (3%).
- Отсутствие речевой стимуляции (2%).
- Отсутствие материнской любви и ласки (30%).
- Синдром Дауна (15%).
- Гипоксия плода (10%).
- Недоедание плода (4%).
- Преждевременное развитие плода (20%).
- Травма плода (5%).
- Наследственное (1%).
- Материнские инфекции (10%).

Симптомы интеллектуальной недостаточности у пациентов с БАР-С, как они проявляются на практике:

- Рассеянный.
- Погруженный в мысли.
- Долго и напряженно думает, прежде чем ответить.
- Отвращение к удовольствию.
- Не любит играть или любит играть в куклы.
- Неуклюжий.
- Грызть ногти.
- Детское поведение.
- Прильни к матери.
- Доверчивый.
- Заблуждение, что он забывчив.
- Заблуждение, что над ним будут смеяться или издеваться.
- Заблуждение, что за ним следят.
- Трудности с концентрацией внимания во время учебы.
- Вялость, особенно по утрам.
- Страх толпы, пересечения улиц, незнакомцев.
- Немного испуган.
- Шкуры.
- Не могу решить, что делать.
- Чрезмерный смех.
- Потеря доверия.
- Стоны во сне.

- Бормотание во сне.
- Беспокойство после еды.
- Грустить из-за мелочей.
- Чувствительность к шуму.
- Предпочтение сидеть неподвижно.
- Вздрагивает во сне.
- Вздрыгнул от шума.
- Разговаривает во сне.
- Застенчивость.

БАРИЙ МУРИАТИКУМ

(Хлорид бария - Бар-м.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Дети застенчивы и поэтому не очень любят играть, они предпочитают сидеть в углу и наблюдать за другими.
- ▶ Крайне чувствителен к грубости.
- ▶ Трусость и уступчивость, они предпочитают уступить.
- ▶ Постоянно чувствую себя вялым, апатичным и испытываю трудности с концентрацией внимания во время учебы.
- ▶ Очень ценно при **полипах в носоглотке, тонзиллите и аллергическом кашле.**
- ▶ Частые кашель и простуды в анамнезе и у родственников.
- ▶ Свинка с правой стороны (бром при свинке с левой стороны).
- ▶ Рецидивирующая инфекция среднего уха, особенно с правой стороны, при которой выделения обильные, зловонные и пахнут старым сыром.
- ▶ Боль в ухе усиливается при сморкании и глотании пищи.
- ▶ Инфекция среднего уха с болью в горле.
- ▶ При сквозняке в первую очередь страдает нос.
- ▶ Простуда начинается с частого чихания, особенно во сне, затем появляются обильные, густые, жёлтые, гнойные выделения из носа и придаточных пазух носа. Через несколько часов после начала простуды повышается температура. Губы становятся сухими. По мере прогрессирования простуды инфекция распространяется на горло, где увеличиваются и воспаляются шейные и подчелюстные лимфатические узлы, слюнные железы и передние шейные лимфатические узлы.
- ▶ Белый налет на языке, постоянно открытый рот и выделения из носа вызывают резкий неприятный запах изо рта.
- ▶ Горло тёмное и воспалённое, сильнее справа. Сильная боль в горле при каждой попытке глотать, облегчающаяся от холодных напитков.
- ▶ Увеличенные и уплотнённые миндалины. **Расширение и застой крови в венах заднего глоточного кольца, покрытых слизью.**
- ▶ Боль в горле обычно начинается вечером и усиливается в течение ночи. Утром, когда температура снова падает, пациенты чувствуют себя значительно лучше.
- ▶ Боль в горле может распространиться на легкие и вызвать астматический бронхит.
- ▶ Ужасный кашель, усиливающийся незадолго до полуночи.
- ▶ Астма усиливается в положении лежа и ослабевает в положении сидя.
- ▶ Очень замерзшие дети.

БАРИЙ ФОСФОРИКУМ

(Фосфат бария - Бар-п.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Очень чувствителен к авторитарному или снисходительному поведению, особенно по отношению к другу-инвалиду.
- ▶ Зависят от родителей, учителей или опекунов, нуждаются в постоянной поддержке и поощрении.
- ▶ Чувствовать себя осмеянным и высмеянным в школе.
- ▶ Чувствовать себя нелюбимым и брошенным со стороны родителей или опекунов.
- ▶ Невозможно сосредоточиться во время чтения или учебы.
- ▶ Очень чувствителен к тому, как люди взаимодействуют друг с другом.

Тело

- ▶ Очень зябкий, хуже от малейшего воздействия холода.

Другие важные симптомы

Дух

- Низкая самооценка.
- Патологическое желание бежать.
- Наивно.
- Дислексия.
- Легко запугать.
- Тоска по дому.
- Впечатляющий.
- Задержка развития.
- Застенчивость.
- Сострадательный.
- Податливая натура.

Шея

- В анамнезе рецидивирующий тонзиллит.
- Результат теста:
 - Миндалины опухли и воспалены.

Желудок

- Жажда холодных и газированных напитков.
- Пристрастие: к сладкому.

Грудь

- Бронхит.
- Результат теста:
 - Дребезжащие шумы ++.

Общий

- **Зябкость; ухудшается от любой формы холода.**
- Задержка развития.
- Детский лейкоз (Бен.).
- Карликовость.
- Увеличение желез.
- Ожирение.
- Правосторонние жалобы.

БАРИЙ СЕРНИСТЫЙ

(Сульфат бария - Бар-с.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Трусость.
- ▶ Зависимый от других.
- ▶ Легко впадает в смущение из-за малейшего эмоционального конфликта, особенно с друзьями или семьей.
- ▶ Легко пугается.
- ▶ Покорная натура.
- ▶ Они думают, что выглядят нелепо, и поэтому чувствуют, что другие над ними смеются и издеваются.
- ▶ Застенчив, когда появляется на публике.

Тело

- ▶ Горячая голова, холодные конечности.
- ▶ Затвердение или нагноение шейных лимфатических узлов.
- ▶ Хуже на холоде, но лучше на свежем воздухе.

Другие важные симптомы

Дух

- Всегда тороплюсь.
- Отвращение к любой форме физического или умственного напряжения.
- Нежелание находиться в обществе и когда с ним разговаривают.
- Капризный.
- Очень критично.
- Спутанность сознания, которая улучшается на свежем воздухе.
- Желание иметь много вещей, иногда больше, чем ей необходимо.
- Страх разговора или беседы с кем-то.
- Страх толпы.
- Ревность.
- Неуверенность в себе.
- Стон.
- Подозрительный.
- Разговоры во сне.
- Склонен забывать слова во время разговора.

Голова

- Зуд кожи головы.
- Пот на волосатой голове.

- Результаты теста:
 - Корки или шелушение.
 - Горячая голова, холодные конечности.

ГЛАЗА

- Веки склеиваются по утрам.
- Паралич зрительного нерва.
- Светобоязнь.
- Результаты теста:
 - Воспаление век, конъюнктивит.
 - Помутнение роговицы.
 - Выпуклые глаза.
 - Красные глаза.

УШИ

- Зуд в ушном канале.
- Боль в правом ухе.
- Результаты теста:
 - Кровянистые выделения из ушей.
 - Сыпь за ушами.

НОС

- **Постоянно сморкается.**
- Кровянистые выделения или носовые кровотечения при сморкании.
- Внутри сухо.
- Насморк с кашлем.
- Результаты теста:
 - Сухие, твердые корки или чешуйки в ноздрях.
 - Всклипывание.
 - Отек носа.

ЛИЦО

- Лицо краснеет при волнении.
- Результаты теста:
 - Болезненность и уплотнение подчелюстных лимфатических узлов.
 - Угри и болезненные фурункулы на лице, особенно на носу.
 - Сухие и потрескавшиеся губы.
 - Герпес или экзематозные высыпания на лице.
 - Увеличение околоушных желез.
 - Подергивание мышц лица.

РОТ

- Трудности с речью.
- Результаты теста:
 - Кровоточащие десны, которые отслаиваются, опухают и отделяются от зубов.

- Обильное слюнотечение.
- Трещиноватый язык с белым налетом.
- Неприятный запах изо рта.

ШЕЯ

- Хроническая боль в горле.
- Сухость со склонностью к частому покашливанию.
- При глотании напитков вытекает из носа.
- Твердую пищу трудно глотать.
- Спазмы пищевода затрудняют глотание.
- Результаты теста:
 - Уплотнение шейных лимфатических узлов.
 - Миндалины красные и воспаленные, склонны к образованию гноя.

ЖЕЛУДОК

- Не переносит голода.
- Изменчивый аппетит.
- Отрыжка после употребления воды.
- Иккинг.
- Неутолимая жажда.
- Не нравится: еда.
- Пристрастия: **Шоколад** и сладости.

ЖИВОТ

- Результаты теста:
 - Увеличенные брыжеечные железы.
 - При пальпации: опухшая, напряженная и твердая.
 - Ультразвуковая картина: кальцификация брыжеечных лимфатических узлов.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запор с бесполезным натуживанием; стул твердый и комковатый.
- Диарея после простуды (Dulc.).
- Зловонный метеоризм.
- Результаты теста:
 - Постоянная влажность в анусе.
 - Затвердение мозолей, которое часто бывает очень болезненным.
 - Наружный геморрой.
 - Кровотечение из ануса.
 - Выводит остриц с калом.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Внезапные позывы к мочеиспусканию, необходимо торопиться, иначе моча польется струей.
- Чрезмерное мочеиспускание ночью.
- Ночное недержание мочи.
- Задержка мочи.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результат теста:
 - Потливость мошонки.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Охриплость.
- Слизь в трахее.

ДЫХАНИЕ

- Астматик.
- Ночью трудно.
- Результат теста:
 - Хриплое дыхание.

КАШЕЛЬ

- **Мучают приступы кашля.**
- Кашель из-за раздражения или першения в гортани и трахее.
- Кашель при разговоре.
- Кашель на холодном воздухе или при пробуждении утром.
- Скудная, липкая, желтая мокрота, отхаркивающаяся с трудом.
- Спазматический и удушающий кашель.
- Коклюш.

ГРУДЬ

- Бронхит.
- Результат теста:
 - Увеличение подмышечных желез.

НАЗАД

- Результаты теста:
 - КТ шейного отдела позвоночника показывает холодный абсцесс.
 - Скованность и напряжение мышц шеи и поясницы.
 - Увеличение и уплотнение шейных лимфатических узлов.

КОНЕЧНОСТИ

- Подергивание ног во время сна.
- Результаты теста:
 - Зловонный пот ног.
 - Холодность рук и ног.
 - Потрескавшаяся и сухая кожа на руках и пальцах.
 - Болезненные мозоли.

СПАТЬ

- Беспокойный сон.
- Бессонница ночью, сонливость днем.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Температура воздуха особенно повышается к вечеру.

КОЖА

- Сильный зуд, который не проходит несмотря на расчесывание.
- Зуд при согревании в постели.
- Результаты теста:
 - Ощущение холода.
 - Герпетические высыпания.
 - Небольшие бородавки.
 - Гнойные высыпания.
 - Крапивница.
 - Сыпь в виде волдырей после расчесывания.

Общий

- **Желание и лучшее на свежем воздухе.**
- Воспаление желез.
- Остановка развития.
- Холодная и сырая погода ухудшается.
- Карликовость.
- Заболевания желез: рак, отек, воспаление и т. д.
- Усталость с постоянным желанием прилечь.
- Склонность к простудам.
- Раны, как правило, заживают медленно.

БЕЛЛАДОННА

(Смертоносный паслен - Белл.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Синдром дефицита внимания у детей, чьи матери во время беременности подвергались гневу, ругательствам, презрению или несправедливому обращению со стороны мужа или его родственников. СДВГ и дислексия у детей характеризуются следующими симптомами: - Невнимательность.
- Мятежный, упрямый.
- Кусает предметы и кусает людей.
- Хаотичный.
- Разрушительный.
- Глупая ухмылка.
- Ошибки в устной речи, на работе.
- Сбежать, попытаться убежать.
- Счастье, глупышка.
- Бесстрашный.
- Плохая память на факты и прочитанное.
- Умственное напряжение ухудшает состояние.
- Импульс совершать абсурдные поступки.
- Клептомания.
- Взбираться.
- Слизняк.
- Безрассудный.
- Математика, арифметика, неспособность.
- Мономания.
- Имитация.
- Бегаю повсюду, натыкаюсь на вещи.
- Он беспокойный, суетливый, переезжает с места на место, ему приходится постоянно переезжать.
- Бьет себя и других.
- Разговор с самим собой.
- Петь.
- Прыгай.
- Танцуй.
- Шаг.
- Непокорный.
- Нетерпение.
- Игривый.
- Ломает вещи.
- Разрывает всё на части.
- Гнев с красным лицом.

- ▶ у детей **после родовой травмы** (Глон., Нац., Оп.).
- ▶ **Заносчивые** дети, гордящиеся своим знатным происхождением; любящие носить лучшую одежду и владеть дорогими вещами, которых нет ни у кого другого.
- ▶ **Преждевременно развивающиеся** дети (Cale., Lach., Med., Verat.).
- ▶ Поспешная речь.
- ▶ Спешка во время питья, еды и движения.
- ▶ Младенцы, которые плачут день и ночь без причины (Сиф.).
- ▶ Когда здоров — живой, дружелюбный и весёлый. Когда болен — агрессивный и бредящий.

Тело

- ▶ **Выделения** горячие и **скудные** (слезотечение, насморк, моча).
- ▶ **Горячая голова, холодные** руки и **ноги** и налитые кровью глаза.
- ▶ Боль вызывает **покраснение** лица и глаз.
- ▶ Пот на носу.
- ▶ **Правосторонние** жалобы.
- ▶ Белл обозначает тяжесть и внезапность приступа (головная боль, лихорадка, колики и т. д.).
- ▶ Пейте небольшими глотками.
- ▶ Сухость во рту с отвращением к воде является наиболее важным показанием к применению этого средства, которое я наблюдал в своей практике.
- ▶ Светлые волосы, голубые глаза, большая голова и нежная внешность с мягкой кожей.
- ▶ Местное жжение, покраснение, отек и болезненность в области воспаления.
- ▶ Повышенная чувствительность всех органов чувств; очень острый слух.
- ▶ Боль преимущественно в области головы (в частности, в области сердца и груди).
- ▶ Приступы боли (Supr.).
- ▶ Красная, горячая кожа; покрасневшее лицо, блестящие глаза.
- ▶ Чувствительность к сквознякам, особенно когда голова, лицо и шея открыты (Acon., Hep., Sil.).

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ BELL., NYOS. И STRAM.

Nyos. и Stram. всегда следует отличать от Bell, поскольку у них много схожих симптомов. Некоторые из них включают:

- Отвращение к воде.
- Отвращение к питью.
- Кусать.
- Делирий с лихорадкой.
- Делирий из-за боли.
- Бред, болтливость.
- Разрушительность.
- Жажда в стадии жара.
- Поспешность в движении.
- Фебрильные судороги.

- Боязнь собак.
- Боязнь воды.
- Пот на лице.
- Жесты, произвольные движения руками.
- Поспешные и глупые разговоры.
- Сильные головные боли.
- Судороги во время сна.
- Громкий смех.
- Менингит.
- Хочет быть голой.
- Светобоязнь.
- Зрачки расширены.
- Болтливость.
- Обильное слюнотечение.
- Бегают вокруг.
- Вращательные движения глазных яблок.
- Красное лицо.
- Покраснение глаз.
- Ругань.
- Ударять.
- Шок, просыпается, как будто через дыру в стене.
- Поражён зрительный нерв.
- Петь.
- Разговоры во сне.
- Танцуй.
- Подавление выделения мочи при лихорадке.
- Скрежетание зубами во время сна.
- Сжатые челюсти.

Другие важные симптомы

Дух

- **Ругается и ругается.**
- Гнев приводит к **разрушению и насилию. Ярость с увеличением физической силы** (Agar., Nyos.). Гнев и агрессия характеризуются:
 - Кусать.
 - Разбивание предметов.
 - Жестокость: Любит заставлять животных и людей страдать.
 - Бьет и пинает себя и других.
 - Дергает за волосы себя и других.

- Красное лицо.
- Крики.
- Плевать.
- Рвать.
- Желание бродить по дому **полуголым** ; отказывается носить практичную одежду (Hyos., Phos., Verat.).
- Желание воровать: **клептомания** (Puls.).
- Дети пугливые, которых **легко напугать** (повышенная чувствительность).
 - Страх животных (в том числе домашних), **особенно собак (в основном страх, что собака укусит и что собака подойдет ближе, так как ребенок не любит, когда кто-то подходит близко)**.
 - Страх толпы (опять же страх приближения кого-то).
 - Страх темноты настолько силен, что они не чувствуют себя в безопасности, пока каждая дверь, место под кроватью, окна и каждый угол дома не будут проверены на предмет грабителей или привидений.
 - Страх высоких мест (например, каруселей на ярмарке).
 - Боязнь шумов (высокая степень чувствительности).
 - Страх прикосновения или того, что кто-то подойдет к ним слишком близко (Ant-c.).
 - **Боятся воды** (поэтому не может научиться плавать, как Стрэм).
- **Громкий характер**, порывистый и смелый в речи, громко смеется в своей группе; может быть также лживым и хитрым (предательство).
- **Озорные** дети (китайцы, китайки), которые любят дергать за волосы окружающих или дергать за свои собственные волосы, когда злятся.
- **развиваются рано** , но медленно учатся говорить.
- Очень **чувствительные дети**, чья чувствительность связана с эмоциональными факторами, такими как выговоры (даже если они сделаны доброжелательно) или отказ в чем-либо.
- Переменчивое настроение: иногда они играют роль дьявола, иногда — ангела.
- С одной стороны, они могут быть довольно сердечными, с очень острыми чувствами, быстро обучающимися, хотя слабыми в математике и арифметике; с другой стороны, они могут быть очень вспыльчивыми, грубыми и жестокими во время приступов ярости.
- Желание спрятаться; также прятать вещи (Staph., Tarent.), такие как брелоки, кошельки и игрушки.
- Эмоциональные и психические жалобы, возникающие в результате травм или несчастных случаев (Camph., Cic.).
- Тоска по дому (невозможность участвовать в длительных школьных поездках).
- Для детей, которые постоянно плачут во время еды (часто притворяются).
- Торопиться; делать ошибки в речи (натур.).
- Ленивый, всегда опаздывает (Hyos., Puls., Stram.).
- Бунтующие и упрямые, они не терпят порицаний. Делают всё, что хотят, вплоть до полного безрассудства.
- Беспокойный, склонный к блужданию, трогает все вокруг.

ГОЛОВА

- **Вдавливание головы** в подушку при головных болях, вызванных повышенным внутричерепным давлением, а также при объемных процессах или нарушениях мозгового кровообращения.
- Не переносит пребывания **раскрытым**, крайне чувствителен к сквознякам (Psor., Sil.).
- Лоб чрезвычайно чувствителен; при головной боли закрывает глаза.
- Мигрень после стрижки (Сен.) и от мытья волос (Ам., Кейл.).
 - Чаще всего боли возникают в височной области, сопровождаются тошнотой.
 - Рвота и боль в шее.
 - Хуже: сквозняки, холодная ванна, сморкание.
 - Улучшение: закрывание глаз (Sil.), холодные компрессы (Aloe).
 - Насморк (Lach., Stict.).
- Невозможность поднять голову (детский церебральный паралич).
- Результаты теста:
 - Кровоизлияние в мозг.
 - КТ: гематома головного мозга.
 - Энцефалит.
 - Волосы ломкие.
 - Голова оттянута назад.
 - Жар головы с холодностью конечностей (Arn., Fern, Sulph.).
 - Жар в голове с поносом (Apis., Bry.).
 - Символ Кернига ++.
 - Менингит.
 - МРТ: гидроцефалия.
 - Скованность шеи.
 - Дергает себя за волосы (Тарент.).

ГЛАЗА

- **Слезотечение с кашлем** (Euphr, Nat-m.), **лихорадкой** (Puls.) и **головной болью** (Ign., Plat.).
- Экхимозы вследствие кашля (Арн.).
- Неврит зрительного нерва.
- Результаты теста:
 - Глаза **красные, инъецированные**, постоянное слезотечение.
 - Глаза обращены **кнутри** (рута) (паралич VI черепного нерва - отводящего нерва; при обращении кнаружи: паралич III черепного нерва - глазодвигательного нерва).
 - Блефарит.
 - Синие склеры.
 - Хемоз.
 - Конъюнктивит.
 - Непрерывные маятникообразные движения глазного яблока (агар, гель).
 - Глаза открыты во время сна.
 - Пристальный взгляд при пробуждении или при головной боли.
 - Стекланный вид глаз при лихорадке (Bry., Glon., Op.).
 - Веки гранулированные.
 - Иридоциклит.

- Кератит.
- Веки слиплись.
- Помутнение роговицы.
- Паралич век (паралич глазодвигательного и лицевого нервов).
- Выпуклые глазные яблоки (Nat-m., Stram.).
- Суженные зрачки при головной боли, расширенные при лихорадке.
- Кровоизлияния в сетчатку.
- Трахома.

УШИ

- **Ребенок просыпается с криком от сильной боли в ухе** (Cham., Ferr-p.).
- Снижение слуха при простуде (Nux-v., Puls.).
- Боль в ухе распространяется на лицо и зубы.
- Боль в правом ухе, усиливающаяся ночью и при жевании.
- Результаты теста:
 - Ухо **красное** (Apis., Puls.) и **горячее** (Acon.).
 - Выделения: Кровянистые и гнойные.
 - Гематома.
 - отит .

Нос

- Носовые кровотечения **ярко-красные** (Hyos., Phos.), **горячие** (Acon.), с лихорадкой (Op.), с головной болью (Acon., Agar.).
- Острое обоняние.
- Насморк с кашлем.
- Насморк с лихорадкой.
- Результаты теста:
 - **Ковыряет** пальцами **в носу** (Кина, Сил.).
 - Нос кажется **красным с ярким кончиком** (Phos.).
 - Постоянное потирание носа.
 - Выделения: Водянистые или густые, белые.
 - Полипы носа.

Лицо

- **Темно-красный** (10% случаев, в остальном в основном у детей Sulph.), синюшно-красный, часто меняющий цвет, очень бледный в положении лежа (в отличие от Acon.). Краснота лица при сидении.
- Воспаление околоушных желез метастазирует в мозг.
- Результаты теста:
 - **Жевательные движения** (Hell., Stram., Verat-v.).
 - Выражение: **Как пьяный** (Бапт., Гелес.), испуганный, **изможденный** (Бри., Кали-ч.), глупый и пустой.
 - **Алый цвет лица** с кашлем, судорогами, возбуждением, лихорадкой и болью. (Примерно у 90% моих пациентов Белла лицо алое, а у 10% — тёмно-красное.)
 - Стиснутые челюсти.
 - Потрескавшаяся верхняя губа.

- Искаженное лицо с выражением боли и страдания.
- Морщинистое лицо.
- Облизывание губ (Agar., Lys., Stram.).
- Красные, вывернутые наружу губы (Apis).
- Подчелюстные и околоушные железы увеличены.
- Дрожание или подергивание губ.

РОТ

- Прикусывает язык.
- Затрудненное прорезывание зубов.
- Результаты теста:
 - **Ярко-красный** язык, красные полосы посередине.
 - **Желание постоянно стискивать зубы** (Hyos., Lys.).
 - **Клубничный язык** (Ant-t., Lach., Tub.).
 - Кусает стекло во время еды (Cina, Cupr.).
 - Кровоточивость десен.
 - Язык с трещинами.
 - Пена изо рта, особенно во время судорог.
 - Скрежет зубами во время судорог и во сне.
 - Открытый рот.
 - Паралич левой половины языка (паралич подъязычного нерва слева: Plb).
 - Высовывание языка при кашле.
 - Причмокивание языком (Lys.).
 - Заикание.
 - Ребристый язык (натур.).

ШЕЯ

- **Ощущение удушья** при ношении тесной одежды (Apis, Lach.) или при отходе ко сну (Lach., Nux-v.).
- **Боль в горле**, обычно с правой стороны, **отдающая в ухо** (Nep., Lac-s., Lach.).
- Рецидивирующий тонзиллит у детей при воздействии холодного сквозняка.
- Результаты теста:
 - **Пульсация сонных артерий** (Cact, Gels., Op.).
 - Увеличены шейные железы.
 - Блестящий внешний вид.
 - Пот на шее.
 - Ретроназальный катар.
 - Воспаление миндалин.
 - Шея темно-красная.
 - Миндалины выглядят угрожающе: темные, красные, воспаленные и опухшие (Gins.).
 - Удлиненный язычок.

ЖЕЛУДОК

- **Острый гастрит** у детей после применения обезболивающего и жаропонижающего сиропа.

- **Удушье** (Cina) из-за кашля (Dros.).
- **Отсутствие жажды** при **лихорадке** (Apis, Gels., Sep.).
- **Рвота вследствие повышенного внутричерепного давления** (Apis, Cocc., Hell., Zinc.), с поносом, с кашлем, с лихорадкой, после молока.
- Жгучая **жажда**, сильная, экстремальная, неутолимая, особенно **после сна** (Borx., Ther.), с желанием пить много и часто (Bry., Nat-m.) или мало и часто (Ars., Chin.).
- Капризный аппетит; голоден, но не знает, зачем, или отвергает предложенное ему (Bry., Cina., Puls.).
- Ребенок просит воды, но отказывается, когда ему ее дают.
- Боль в желудке, вызванная кашлем или шоком во время вождения.
- Рвота фонтаном (Verat.).
- Рвота, сопровождающаяся потоотделением.
- Обострение: яблоко, масло, молоко (даже просто по запаху), свинина, испорченная колбаса и сахар.
- Улучшение: Холодная пища и **лимоны**.
- Отвращение: яйца, жиры, рыба и фрукты.
- Пристрастия: **хлеб** (Ars., Cina., Puls.), хлеб с маслом (Ferr., Ign.), холодные напитки, холодная пища, **лимоны** (Merc., Verat.), сладости и горячая пища.
- Результат теста:
 - Пот в эпигастрии (сек.).

живот

- При запоре или после употребления молока ребенок вынужден сворачиваться калачиком из-за колик и **подтягивает ноги к животу** (Coloc., Sep.).
- Живот вздут и болезнен на ощупь.
- Результаты теста:
 - **Болезненность** в правом и левом подреберье и в **точке Мак-Берни**.
 - Урчание в животе.
 - КТ: брыжеечные железы увеличены.
 - Паховая грыжа.
 - Печень увеличена и тверда.
 - Селезенка увеличена.
 - Посев кала: *Vibrio cholerae*.
 - Ущемленная паховая грыжа с перитонитом (Lach., Tab., Verat.).
 - Тимпанит +.
 - Пупок вздут (Coloc.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- Постоянно зловонные газы с **кислым** запахом (Mag-c.).
- Понос по утрам, заставляющий ребенка вставать с постели; после холодного питья; во время прорезывания зубов; при **гидроцефалии** (Ад., Цинк.).
- Непроизвольный стул **обычного** или твердого вида ночью в постели (Aloe) или произвольный стул, который достаточно оформлен (Hyos.), вследствие открытого ануса или после операции по поводу менингомиелоцеле или других вмешательств на позвоночнике.
- Стул: Зеленый, узкий, **длинный** или творожистый (Cale., Valer.).

- Результаты теста:
 - Выпадение прямой кишки.
 - Круглые черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Подавление выделения мочи при сепсисе.
- Постоянные позывы к мочеиспусканию.
- Задержка мочи после шока у детей (хирургического вмешательства) или новорожденных.
- Результат теста:
 - Моча: Альбумин (особенно после инфекционных заболеваний).

ГЕНИТАЛИИ

- Ребенок постоянно трогает половые органы (Merc., Stram., Zinc.).
- Склонность к мастурбации.
- Результат теста:
 - Неопущение яичек (Puls., Zinc.).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Результаты теста:
 - Стридор (Лак., соч., Самб.).
 - Отек голосовой щели (бромный, фосфорный, губчатый).
 - Хрипы в гортани и трахее (Нер., Ipec.).
 - Голос хриплый и звучит очень грубо.

ДЫХАНИЕ

- Астма в **теплую, влажную** (душную) погоду (Carbo-veg., Syph.), как только ребенок засыпает или находится в теплой комнате; чувствует себя лучше, запрокинув голову назад (Spong., Verat.) и на улице, на холодном, свежем воздухе.
- Неонатальная асфиксия (Camph., Hydr-ac.).
- При кашле дыхание затруднено.
- Результаты теста:
 - Ребенок прикасается к горлу во время кашля (Акон.).
 - Дыхание: стоны, затрудненное дыхание, хрипы и хрипы.
 - Рентгенограмма: уплотнение в правом легком.

КАШЕЛЬ

- **Лающий кашель** ночью около 23:00.
- Сухой кашель с лихорадкой, от **испуга** (Cina), движения (Iod.) или **давления на трахею** (Lach.); лучше от пустого глотания (Verat.).
- Кровянистая мокрота по утрам и после еды.
- Кашель сопровождается повышенным слюноотделением и носовыми кровотечениями и заканчивается чиханием.
- Прерывистые приступы кашля, состоящие из 2–3 коротких кашлевых толчков.
- Спастический кашель после полуночи (Hyos., Kali-c.).

Назад

- Спинальный менингит.
- Результаты теста:
 - Эмппростотонус (Canth., Ipec.).
 - Оπισотонус.
 - Spina bifida (Cale., Sil.).

КОНЕЧНОСТИ

- Беспокойные ноги ночью в постели (Rhus-t., Tarent.) и во время лихорадки (Cale., Rhus-t.).
- Неуклюжесть: роняет вещи или спотыкается при ходьбе (Agar., Caust.).
- Врожденный вывих бедра.
- Результаты теста:
 - Хорея.
 - Холодный пот.
 - Холодные ноги при лихорадке, головной боли или во время сна.
 - Ледяные руки и ноги.
 - Болезнь Пертеса (некроз головки бедренной кости).
 - Большой палец повернут вовнутрь (Купр., См.).

Спать

- **Анестезирующий сон при лихорадке** (Бапт.).
- Стойкое вегетативное состояние.
- Беспокойный сон, прерываемый ужасными образами.
- Спит на животе, положив руки на живот или под голову, или имеет тенденцию прятать голову в подушку.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Жгучий жар с неутолимой жаждой и бредом.
- Гиперпирексия с анестезией (Nat-m., Op.), при которой максимальная температура ($> 41,5^{\circ}\text{C}$) достигается ночью во время сна.
- Сильный жар головы и лица, тогда как остальное тело холодное (Ferr-p.).
- Потливость при закрывании глаз (Bru., Con.).
- Нежелание обнажаться во время лихорадки.
- Мороз вследствие шока (Гели).
- При лихорадке потоотделение обычно отсутствует.

КОЖА

- Кипит каждую весну (Crot-h., Lach.).
- Сухая, жгучая кожа с отсутствием потоотделения.
- Потливость после мочеиспускания, от кашля, при поносе, после еды, от испуга, во время сна; окрашивает постельное белье в желтый цвет.
- Результаты теста:
 - Пурпура.
 - Покраснение кожи после расчесывания.
 - Tinea cruris (Canth.).
 - Бородавки.

Судороги

- Жалобы, вызванные: прорезыванием зубов, лихорадкой, испугом, болью (Coloc., Lyc.), гневом и наказанием (Ign.).
- Во время судорог: бледное или красное лицо с **расширенными зрачками** (Cina, Verat-v.), холодные ноги.
- Судороги у новорожденных вследствие **повышения внутричерепного давления**.

Общий

- Отличное средство при **ухудшении** симптомов **во второй половине дня и вечером**.
- Склонность к кровотечениям, при которой **кровь** ярко-красная и **горячая на ощупь** (Acon., Sabin.).
- Жалобы, вызванные травмами: сотрясениями мозга, вывихами и - растяжениями.
- Сквозняки усиливаются.
- Истощение у детей (Acet-ac., Arum-t.).
- Склонность к образованию абсцессов; способствует либо расплавлению абсцесса, либо ускорению нагноения.
- Полезно в случаях злоупотребления йодом, который может содержаться, например , в сиропе от кашля.

Источник

- Синоним: Atropa belladonna из семейства пасленовых (Solanaceae)

BELLIS PERENNIS

(Дейзи - Белл-п.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Ушибы и травмы.**
- ▶ Мышечные боли и хромота после травмы; ребенок отказывается ходить даже спустя недели или месяцы после травмы.
- ▶ Никогда больше не был по-настоящему здоров после механической травмы глубоких тканей.
- ▶ Насморк, носовое кровотечение, боль в горле и лихорадка при употреблении холодных напитков или охлажденной воды или ледяных напитков в горячем состоянии.
- ▶ Акне и атопический дерматит на лице.
- ▶ В основном сплю на животе.
- ▶ Склонность к **мастурбации** (Staph., Med.).

Источник

- Также называется маргариткой и принадлежит к семейству астровых (Asteraceae/ Compositae).
- *Bellis perennis* можно узнать от доктора Бернетта, который очень часто назначал это средство.

БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА

(Бензойная кислота - Benz-ac.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ В школе делают много ошибок: при письме пропускают буквы и слова, при говорении — тоже слова.
- ▶ Раздражительный и поэтому часто громко кричит.
- ▶ Дети хотят, чтобы их держали на руках, а не в кроватках или кроватях. Даже дети постарше не хотят ложиться, им хочется, чтобы их носили.
- ▶ Ребенок дрожит, вздрагивает или сильно пугается, когда видит людей с ограниченными возможностями.
- ▶ Кистозные опухоли на веках, такие как халазион .
- ▶ Прикусывает нижнюю губу.
- ▶ Чихание при воздействии пыли.
- ▶ Трещина на языке.
- ▶ **недержание мочи** в первую половину ночи; привычка к непрерывному мочеиспусканию и постоянные позывы к мочеиспусканию. Моча имеет резкий запах, коричневатая или тёмно-коричневая; моча имеет неприятный запах, сильный запах аммиака из-за присутствия в ней мочевой кислоты. Очень редко наблюдается осадок в моче.
- ▶ Диарея при прорезывании зубов. Пенистый, обильный, ферментированный стул, похожий на мыльную воду или прозрачную пенистую воду; резкий запах падали.
- ▶ Ревматизм у детей с отягощённым семейным анамнезом сикоза, подагры, остеоартрита и гонореи. Чаще всего поражаются лодыжки, пальцы рук и кисти.
- ▶ Потеть во время еды.
- ▶ Еще больше пота на лбу.

ВИСМУТ СУБНИТРИКУМ

(Висмут - Bism.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Ребенок-бисм. — это наименее любимый ребенок.
- ▶ Ребенок очень навязчив, потому что он постоянно чувствует себя брошенным родителями или другими людьми.
- ▶ Дети хватают одежду окружающих (матери, няни, братьев и сестёр). Их привязанность настолько выражена, что они не хотят оставаться одни даже на несколько секунд. В качестве альтернативы, они могут сильно привязаться к определённому объекту, например, к собаке, кошке или любимой игрушке.
- ▶ Крайне тревожны и нервны в одиночестве. Если их заставить остаться в одиночестве, они становятся очень вялыми, недовольными и в конечном итоге апатичными.
- ▶ Психологическая незащищенность усиливается в темное время суток, вечером и ночью.
- ▶ Инфекции, вызванные энтеровирусами или *Helicobacter pylori*, сопровождаются сильной и громкой отрыжкой, сильной болью в желудке, которая облегчается холодным питьем и массажем спины, усиливается после еды и при надавливании. Боль в желудке сопровождается тошнотой, усиливается после еды или питья и облегчается холодным питьем. Тошнота с желанием отрыгнуть всё съеденное.
- ▶ Сильная жажда с желанием выпить большое количество воды. Иногда рвота после употребления всего съеденного, даже самого малого количества воды. Рвота возникает сразу после того, как вода нагреется в желудке.
- ▶ Болезненное вздутие живота из-за метеоризма.
- ▶ Склонность к безболезненной диарее. Диарея похожа на холеру, сопровождается рвотой и непроизвольным стулом. Жидкий, водянистый стул.
- ▶ Большинство проблем с желудочно-кишечным трактом у детей возникает в период прорезывания зубов.
- ▶ Желание холодных напитков и холодной пищи.

BORAX VENETA

(Борат натрия - Borx.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Непостоянный**, капризный и неуравновешенный.
- ▶ Малыш плачет и внезапно **хватается за** коляску или колыбель без всякой видимой причины (Apis, Cina, Stram.).
- ▶ Нервная возбудимость и **повышенная чувствительность**, как у натрий.
- ▶ Новорожденные **крайне боязливо реагируют** на резкие звуки, такие как: кашель, чихание, плач другого ребенка, петарды, покашливание, шелест одежды, дребезжание связки ключей, хлопанье двери.
- ▶ Ребенок **плачет и цепляется** за мать, когда его качают или укачивают, усаживают в кресло-качалку или на лошадку, несут вниз по лестнице или катают на ярмарочных аттракционах, таких как качели, карусели и американские горки (Lac-c., Sanic.).
- ▶ Малыш **громко плачет через регулярные промежутки времени**. Характерной особенностью является то, что плач прекращается через несколько минут, и ребёнок снова становится весёлым и игривым (не путать с цинизмом!).
- ▶ Тревожный, беспокойный, нервный и возбудимый (Кент).
- ▶ Сильный испуг от внезапных громких звуков (Bell., Kali-c.).
- ▶ Новорожденные и грудные дети боятся движений вниз, например, когда их кладут в кроватку или в коляску (Cale., Gels.).
- ▶ Отвращение к груди (возможно, потому, что молоко неприятно на вкус, а вовсе не из-за физических проблем у ребенка).
- ▶ Нервное возбуждение, крики и плач обычно продолжаются до 23 часов; только после этого ребенок постепенно утомляется и симптомы исчезают.

Тело

- ▶ **Plica polonica**: Волосы спутываются на концах и их невозможно расчесать гладко (Fl-ac., Lyc., Psor., Tub., Vine.).
- ▶ **Афтозный стоматит** у новорожденных и детей младшего возраста. У детей старшего возраста соленая или кислая пища часто провоцирует стоматит.
- ▶ **Страх движения вниз** (кальций, гели, цинк) почти при всех жалобах.
- ▶ Волосы очень быстро **спутываются и выглядят неухоженными**.
- ▶ **нос красный, блестящий**, ноздри покрыты корками.
- ▶ **Крики** перед мочеиспусканием (Lyc., Sanic., Sars.).
- ▶ Нервы на пределе (Кент).

- ▶ Ребенок отказывается от груди из-за сильных язв.
- ▶ Прозрачные, густые, горячие, едкие выделения из всех отверстий тела.
- ▶ Грязный цвет кожи.
- ▶ Младенцы, имеющие цианотичный цвет лица с рождения из-за недостаточного поступления кислорода (Лаур.).
- ▶ Зуд, покраснение и раздражение вульвы и нижней части влагалища (вульвовагинит) у маленьких девочек (Canth.).
- ▶ Истощенные, истощенные, слабые и вялые дети.
- ▶ Морщинистая кожа или слизистые оболочки.
- ▶ Нездоровая кожа, которая легко нагнаивается.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ VAR-C. и BORX.

Var-c. можно легко спутать с Borx., поскольку у них много общих симптомов:

- Потеря веса у детей.
- Отвращение к купанию.
- Беспокоюсь из-за каждой мелочи.
- Цепляние.
- Вздрагивание от звуков.
- Чувствителен к малейшему шуму.
- Безделье.
- Страх дефекации (связанный со временем).
- Страх шума.
- Умственное усилие: отвращение, усиленное, невозможное.
- Умственная инертность.
- Обостренные чувства.
- Грануляции на веках.
- Сильный гнев.
- Холодная пища улучшает состояние.
- Голова чувствительна к холодным сквознякам.
- Head, Plica polonica.
- Головная боль от шума.
- Голова, пот.
- Корковые выделения из носа.
- Немного обиделся.
- Немного испуган.
- Склонность постоянно сморкаться.
- Мучительный кашель.
- Обильное слюнотечение.
- Красный нос.
- Овечий навоз.
- Положение для сна на левом боку.
- Положение для сна сидя.
- Безболезненная диарея у детей после еды.
- Легко вздрагивает.
- Застенчивость.

- Потеть во время еды.
- Потоотделение во время сна.
- Ощущение паутины на лице.
- Разговорный, учится говорить медленно.
- Неудовлетворен.
- Желание свежего воздуха.
- Отказывается от еды.
- Нежный.
- Пожимает плечами в шоке.
- Подергивания во сне.

Другие важные симптомы

Дух

- **Ребенок боится ездить верхом (боится упасть).**
- **Кричит по мелочам** (Кали-ч.).
- Отвращение к купанию.
- Ребенок плачет, кричит и устраивает истерики во время кормления; достаточно просто смочить его рот, чтобы утолить голод.
- Ребенок боится пользоваться эскалаторами, ездить на самолете, машине или поезде.
- Ребенок имеет тенденцию брыкаться, когда злится (Cham., Cina).
- Карликовость с задержкой развития у детей.
- Чрезмерный страх у детей, сопровождающийся сонливостью.
- Страх грозы.
- Угрюмый и раздражительный перед стулом (Cale.).
- Ненавидит шутки (люб.).
- Нервозный и пугливый.
- Начинает много дел, но бросает их на полпути.
- Не вызывает лихорадки (Gels., Ph-ac.).

Голова

- Головная боль от **чтения** или чрезмерного просмотра **телевизора** (Nat-m.), лучше после дефекации (Zinc.).
- Энцефалит с глубокой комой.
- Чувствителен к сквознякам над головой.
- Результаты теста:
 - **Plica polonica** (Lyc., Vine.).
 - Не может держать голову; кажется, что падает назад.
 - Голова горячая.

Глаза

- **Сонные** глаза (Гел.).
- Конъюнктивит у новорожденных, рожденных путем кесарева сечения.

- Завернутые внутрь веки с вросшими ресницами, которые , по-видимому, раздражают глаза.
- Результаты теста:
 - Блефарит.
 - Постоянное трение глаз (Puls., Sulph.).
 - Трещины в уголках глаз.
 - Экзема на веках (Граф., CheL).
 - Выпадение бровей.
 - Утолщение век.

УШИ

- **Чувствительный слух** у младенцев, малейший шум, даже шорох бумаги, вызывает беспокойство (Asar., Ferr., Nat-s., Nat-s.); громкие звуки, по-видимому, беспокоят меньше .
- Хроническое воспаление наружного уха (Sulph.).
- Боль в ухе, особенно в левом, заставляет ребенка постоянно ковырять уши пальцами (скопление ушной серы).
- Боль усиливается из-за давления за ушами (Bell.).
- Боль усиливается от холодных компрессов (Hep., Sil.).
- Результаты теста:
 - Исследование слуха: слуховые вызванные потенциалы отсутствуют (Сиф.).
 - отит .
 - Гнойная оторрея.
 - Сенсорное онемение, больше слева, чем справа.

Нос

- Выделения: **Корки и струпья** немедленно образуются снова после удаления (Ars., Kali-bi., Psor.); раздражающие, зеленовато-желтые, густые, сухие и твердые.
- Ковыряние пальцами в носу (Cina, Sil.).
- Склонность постоянно сморкаться (строгий, дорогостоящий) до тех пор, пока не пойдет кровь.
- Носовое кровотечение при сморкании.
- Заложенность носа со слезотечением.
- Результаты теста:
 - Ребенок постоянно **трет** нос или ковыряет **в** нем пальцами.
 - **Сухие, покрытые** корками ноздри с образованием **твердых зеленых корочек , которые** восстанавливаются после удаления.
 - **Красный** светящийся кончик носа (Phos., Sulph.).
 - В корках наблюдается активный рост клебсиелл в культуре.
 - Чувствительные пазухи (Кали-би.).

Лицо

- Результаты теста:
 - **Атопическая экзема** (граф.).
 - Тревожное выражение, особенно при движении вниз.
 - Потрескавшаяся нижняя губа.
 - Красноватые пятна вокруг глаз при плаче.

РОТ

- стоматит после химиотерапии (Nit-ac.).
- Затрудненное прорезывание зубов.
- Повышенное слюноотделение во время прорезывания зубов.
- Скрежетание зубами.
- Зубная боль с повышенным слюноотделением.
- Результаты теста:
 - **Боль во рту** мешает младенцу пить (Mur-ac., Sul-ac., Sulph.).
 - Язык: **потрескавшийся**, с **трещинами**; **географический язык** (Tarax.).
 - Ранний кариес зубов.
 - Язвы во рту и на языке образуются быстро и легко кровоточат.

ШЕЯ

- **Приступ удушья** заставляет ребенка сглатывать (слабый кашлевой рефлекс при неврологических расстройствах: вспомните о смехе!).
- Результаты теста:
 - Опухание и болезненность шейных желез.
 - Язвы в горле.

ЖЕЛУДОК

- **Сильная жажда** при отсутствии аппетита.
- **Жажда сна** (Bell., Then).
- **Рвота после завтрака** (углеводы, папоротник).
- Икота у новорожденных и детей без причины (Ign., Nicc., Rat.).
- Тошнота и рвота во время путешествия на автомобиле или корабле.
- Удушье при кашле (Ipec.).
- Рвота из кислого содержимого утром натощак (у детей, которые обычно ходят в школу без завтрака).
- «Кашель в желудке»: ребенок задыхается и кашляет, если в желудке язвы.
- Обострение: шоколад и фрукты.
- Отвращение: мясо и **грудное молоко** (Ant-c., Ant-t., Lach., Merc.).
- Пристрастия: Кислая пища.

ЖИВОТ

- После кормления грудью у ребенка вздутие живота.
- Младенческие колики: ребенок сворачивается калачиком.
- Задержанный метеоризм.
- Результаты теста:
 - Истощение живота ++ (Cale., Plb., Sulph.).
 - Ультразвуковое изображение: брыжеечные железы увеличены.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Безболезненный понос** после шоколада (Lith-c.), сразу после завтрака, во время прорезывания зубов или употребления фруктов, в теплую погоду, от резких шумов (Bell.).
- Стул **зеленый** (Merc., Nat-s.), пенистый, непереваренный, с белой слизью и гнойным запахом; как **вареный крахмал** (Arg-n.).

- Частый, мягкий, желтый, слизистый стул выделяется днем и ночью , сопровождаясь жалобным плачем и постоянным исхуданием (Cale., Rheum.).
- Зуд вокруг ануса.
- Результаты теста:
 - Колоноскопия: воспалительная стриктура вследствие утолщения слизистой оболочки приводит к образованию жидкого, похожего на карандаш, стула.
 - Стул: Круглые черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Малыши кричат и визжат перед мочеиспусканием из-за афт на слизистых оболочках мочевыводящих путей (Lyc., Sanic., Sars.).
- Болезненные позывы у нервных детей: потребность бежать или мочиться.
- Очень сильно пахнущая, зловонная моча с запахом аммиака (кал., йод.).
- Частое мочеиспускание ночью, редкое днем.
- Болезненная задержка мочи у младенцев (Acon., Camph.).
- Инфекции мочевыводящих путей, сопровождающиеся частым, жгучим мочеиспусканием у маленьких девочек, заставляют их кричать и плакать еще до начала мочеиспускания .
- Моча оставляет небольшие красные частицы на подгузнике (Сентябрь).
- Результаты теста:
 - В подгузнике обнаружен красный песчаный осадок.
 - Моча: Цилиндры ++.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Постоянные, обильные, молочные, теплые бели (Hydr.) у молодых девушек, вызывающие болезненность пораженных участков (Cub., Iod.).

ДЫХАНИЕ

- **Асфиксия новорождённого** вследствие врождённого порока сердца с цианозом. Синюшность лица, носа, глаз, кончиков пальцев рук и ног; ребёнок задыхается и страдает от протрации (Lach., Laur.).
- Прерывистое дыхание у младенцев, когда их берут на руки или кладут в кроватку.
- Желание глубоко дышать при лихорадке (Bru.).
- Одышка после бега, разговора, физической нагрузки, спуска по лестнице (из-за гипердинамического кровообращения, сердечной декомпенсации).
- Сухой кашель после пробуждения утром (Кок-к.).
- Результат теста:
 - Цианоз.

КАШЕЛЬ

- Сильный, сухой, отрывистый кашель, **облегчающийся от холодного питья** (Caust., Cupr., Soc-c.).
- Результаты теста:
 - Ребенок держится за грудь обеими руками при кашле (Dros., Phos.).

Грудь

- Ребенок жалуется на боли в боковых отделах грудной клетки при глубоком дыхании, разговоре, кашле или чихании; лучше при надавливании.
- Результат теста:
 - Пустулы в левой подмышечной впадине.

КОНЕЧНОСТИ

- Вытягивание или беспокойство ног во время лихорадки (Cale., Rhus-t.).
- Результаты теста:
 - Ладони горячие.
 - Мозоли на руках.
 - Цианоз с похолоданием, синюшностью стоп, кончиков рук и пальцев ног.
 - Экзематозные высыпания на пальцах рук и ног, сопровождающиеся потерей ногтей.
 - При лихорадке конечности становятся горячими, особенно пальцы ног и плечи.
 - Выпадение или расслоение ногтей.
 - Пот на бедрах (Ambr., Thuja.).
 - Дискомфорт (боль, отек) ног и стоп у детей, танцующих на дискотеках.
 - Нагноение и изъязвление пяток из-за постоянного трения обуви (Raeon.).

Спать

- Сонливость с лихорадкой (Бапт.).
- Ребенку нельзя лежать на правом боку.
- Частые пробуждения у новорожденных после 3 часов ночи.
- Кошмары, которые часто будят ребенка.
- Длительный сон у детей.
- Бессонница у детей после перегревания или затрудненного дыхания.
- Бессонница с затрудненным дыханием.
- Частые пробуждения у новорожденных.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Желание холодных напитков и холодной пищи при лихорадке.
- Желание раскрыться во время лихорадки на стадии жара, но желание быть укрытым на стадии мороза.
- Молчание при лихорадке (жел., пульс.).

КОЖА

- Зуд облегчается при расчесывании.
- Результат теста:
 - Опрелость.

ОБЩИЙ

- **Движение вниз ухудшается** (Gels., Sep., Sulph.).
- Потеет во время письма (Kali-c., Sep.).
- Аллергическая конституция.
- Дети с анемией.
- Перемена погоды ухудшает состояние (Dulc., Rhus-t.).
- Потеря веса у детей со склонностью к диарее.
- Потоотделение во время и после кормления.
- Правосторонние жалобы.
- Летние заболевания у маленьких детей (Ipec., Typh.).
- Дрожь от малейшего усилия, от страха или лихорадки.

BOVISTA LYCOPERDON

(Гигантский дождевик - Бов.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Трудности в обучении, дислексия, трудности с концентрацией внимания или их отсутствие. Рассеянность и невнимательность на уроках.
- ▶ Плохая память на то, что они только что сделали. Они допускают ошибки в говорении, неправильно расставляют слова или используют их неправильно. На письме они просто пропускают слоги или пишут слова с орфографическими ошибками. У них плохая ориентация в пространстве, и они, как правило, очень невнимательны.
- ▶ Речь также нарушается: предложения становятся неясными, речь отрывистой или заикается.
- ▶ Неуклюжий. Часто всё выпадает из рук.
- ▶ Внезапная крапивница после купания, волнения, жары, спортивных упражнений и утром после пробуждения.
- ▶ Дермографизм, то есть появление полос на коже при царапании ее тупым предметом, например, ножницами.
- ▶ Атопическая экзема вокруг ушей и за ними, на тыльной стороне кистей рук, а также на верхних и нижних конечностях. Зуд усиливается ночью в постели или при перегреве. Расчесывание кожи до крови и появления раздражения.
- ▶ Густые, прыщавые выделения, образующие корки.
- ▶ Угревая сыпь у молодых девушек, особенно летом и после использования косметики.
- ▶ У детей, которым необходим Bov., чувствительная кожа, и любой тип присыпки, мази, лака для ногтей, макияжа, масла для волос или шампуня может вызвать серьезную аллергическую реакцию.
- ▶ Инфекция среднего уха после кори, выделения болезненные, вонючие, зловонные или гнойные.

Источник

- Гриб семейства плауниковых.

БРОМ

(Бром - Бром.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Бром — препарат, который назначают нечасто. Он очень похож на кейл.
- ▶ Дети упитанные, весёлые, дружелюбные и счастливые. Однако есть и другой тип детей-бромов, которые могут быть злыми и легко раздражительными.
- ▶ Очень нервный и тревожный; всегда грызет ногти, когда волнуется.
- ▶ Сильный страх темноты и привидений. Тревога и страх, особенно вечером (пульс).
- ▶ Насморк распространяется в лобные пазухи и вызывает сильные катаральные головные боли.
- ▶ Склонность к хроническому катару верхних дыхательных путей. Обильный, водянистый, гнойный, белый насморк с образованием многочисленных корок в носу. Насморк сильнее справа. Сильный зуд в носу; сначала заложена правая сторона, затем левая.
- ▶ Вазомоторный аллергический ринит с частым чиханием, особенно в пыльном или загрязненном воздухе.
- ▶ Простуда, как правило, поражает горло и нижние дыхательные пути. Воспаление и уплотнение миндалин. Левые миндалины поражаются сильнее, чем правые. Горло саднит и болит, боль отдаёт в уши. Увеличенные и болезненные шейные лимфатические узлы.
- ▶ Горло и гортань чрезвычайно чувствительны к прикосновениям.
- ▶ Сильный, почти удушающий кашель, напоминающий круп, облегчающийся от холодного питья или свежего воздуха. Кашель усиливается вечером, временно облегчается от питья. Хриплый, глухой и отрывистый кашель.
- ▶ Аллергическая астма у детей или астма после кори; состояние улучшается или ухудшается у моря. Пыль, дым от химических предприятий, выхлопные газы автомобилей и тёплые помещения ухудшают состояние, свежий воздух улучшает.
- ▶ **фурункулов или угрей** на лице и плечах, особенно в период полового созревания .
- ▶ Чувствительность к теплу, дискомфорт на солнце или в теплых помещениях, улучшение на свежем воздухе (пульс).
- ▶ Тяга к кислой пище, шоколаду и устрицам, но устрицы вызывают диарею.

БРИОНИЯ БЕЛАЯ

(Белая Бриония - Bry.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети не **хотят, чтобы их носили на руках или клали на плечо**, когда они здоровы (Bell., Borx., Cham., Coff., Cupr., Sanic.), но когда у них лихорадка или колики, они хотят, чтобы их носили на руках (Ars., Cham., Chel., Cina, Kali-c., Lyc., Verat.).
- ▶ Дети **столь же эмоциональны, как и их слизистые оболочки**. У ребёнка отсутствуют такие эмоции, как сострадание, а также воображение и творческие наклонности. Эти дети **меньше озабочены эмоциональной безопасностью и вместо этого жаждут материальной безопасности и подарков**, например, хотят иметь деньги в копилке или на сберегательном счёте, коллекционируют игрушки, обувь, одежду и книги.
- ▶ Материалистичные дети: с раннего возраста они играют **в дельцов** или ведут дела с другими детьми. Они полны желаний, вплоть до жадности [желания, смутного (Puls., Ther.), большего, чем им нужно (Ars.), недостижимого (Op.)].
- ▶ **Методичные** (Sil.) и **аккуратные** (Nux-v.) дети.
- ▶ Ребенок отчаянно требует чего-то, но тут же отвергает, когда ему это предлагают.
- ▶ Дети, у которых никогда не возникнет соблазна купить книгу, прочитать роман или написать стихотворение.
- ▶ При лихорадочном бреде ребенок постоянно хочет встать с постели и пойти домой (Hyos.).
- ▶ Они полностью преданы своему делу и производят впечатление взрослых трудолюбивых (мечтающих о тяжелой работе).
- ▶ Очень трезвые и надёжные дети.

Тело

- ▶ У ребенка немедленно возникает боль в горле, тонзиллит или инфекция верхних дыхательных путей, если он **выпьет что-то ледяное в жаркую погоду** или замерзнет после физической нагрузки.
- ▶ Слизистые оболочки от губ до ануса настолько сухие, что **Bryonia** часто называют **«Dryonia»** (в переводе с английского «сухой»).
- ▶ **Сильная жажда с требованием большого количества воды** (Ars., Nat-m., Phos., Sulph.) через длинные (Sulph, Verat) или короткие (Acon., Bell., Nat-m., Tarent.) интервалы.
- ▶ Невралгия и колики усиливаются ночью, при движении, при вдохе, при кашле; **уменьшаются в состоянии полного покоя и в положении лежа на больной стороне**.

- ▶ С рождения склонен к желчным коликам.
- ▶ Колики и запоры у новорожденных во время грудного вскармливания, когда мать сердится или сильно унижается (Coloc., Staph.).
- ▶ Запор: бездеятельность прямой кишки; иногда позывов к дефекации нет в течение нескольких дней; стул обильный, темный и сухой, как будто обожженный (Plat, Sulph).
- ▶ Темный тип, черные волосы, темная кожа; крепкое и мускулистое телосложение.
- ▶ У детей с теплой кровью состояние ухудшается летом, улучшается на

Другие важные симптомы

Дух

- Жалобы на **унижение** или **несправедливое обращение** в классе или среди друзей (Coloc., Staph.).
- **Капризные** и требовательные дети, которые постоянно просят или требуют то, чего в данный момент либо нет, либо невозможно получить. Когда ребёнок дома, он хочет выйти на улицу, а когда он на улице, он хочет вернуться домой.
- Делирий с высокой температурой и во время сна; постоянно бормочет, что хочет домой; **дергает нос и губы**.
- **Не любит, когда его трогают** (Cham., Kali-c., Tarent.) или **глядят** друзья, родственники или незнакомцы, и не любит ходить в новые места.
- **Страх движения**, даже разговора, так как это вызывает продолжительный, мучительный приступ кашля.
- **Не любят**, когда их **отвлекают от занятий или учебы** (Cocc., Nux-v., Sep.).
- Неисправимо **грязные** (Hyos., Sep.) и негигиеничные дети, моча и испражняющиеся где попало.
- **Эгоистичные и собственнические** дети, которые не хотят делиться своими вещами с другими детьми.
- **Молчание** (Gels., Ph-ac., Puls.) и **вздохи при лихорадке** (Arn., Cham.).
- **Сильный гнев с покраснением лица** у маленьких детей, **когда им в чем-то отказывают** (Cham., Cina, Kreos.).
- Дети, ориентированные на школу, обеспокоенные своей успеваемостью и склонные к постоянному беспокойству о будущем (страх бедности).
- Тревожность при лихорадке.
- Не может слышать «нет» (эгоцентризм).
- Ребенок жестикулирует во время разговора (Nux-v.).
- Не любит грудное вскармливание (низкая потребность в ласке); ему достаточно смочить рот молоком.
- Страх боли любого рода (Aur., Cale.), поэтому безутешен в случае физических травм.
- Страх грозы (Nat-c.).

- Испытывает гнев и расстройство, если его успеваемость или положение в классе среди сверстников хоть немного ухудшаются (сильная неуверенность в себе).
- Разговорчивые дети, которые постоянно быстро переключаются с одной темы на другую (Phos., Podo., Tub.).
- Стоны во сне.
- Не по годам развитые дети с большой проницательностью в логическом и рациональном мышлении.
- Беспокойные дети ворочаются в постели.
- Клаустрофобия, чувствует себя лучше на свежем воздухе (Ars., Cale., Puls.).
- Замедлен в действиях и речи.

Голова

- Головные боли после подавления **унижения или гнева**, связанные с тошнотой и рвотой или другими **расстройствами желудка** (употреблением нездоровой пищи).
- Усугубляется:
 - **Питье холодной воды летом** (Кали-ч.).
 - Малейший **толчок** (звонок, головка, светодиод) **или движение**.
 - Изменение погоды.
 - Холодная, сырая погода.
 - Когда вы встаете утром.
 - Вождение/езда на машине при холодном ветре (Геп., Рус-т.).
 - Натуживание при дефекации (Con., Sulph.).
 - Солнце.
- Лучше за счет:
 - **Сильное давление** (Alum., Chin., Mag-p.).
 - Лягте и **закройте глаза**.
 - **Кислотный пот** во время сна (Cham., Merc.).
 - Заворачивать.
 - Малыши не переносят головные уборы.
 - Укутывание головы (Нер., Rhus-t.).
- Энцефалит со скудным мочеиспусканием.
- Волосы болезненны на ощупь (Apis).
- Голова чувствительна к расчесыванию волос.
- Результаты теста:
 - **При кашле держит голову руками** (Nux-v.).
 - **Гидроцефалия**: голова упирается в подушку (Apis).
 - КТ и МРТ: кровоизлияние в мозг.
 - весы.
 - Жирные волосы.
 - У детей с лихорадкой горячая голова, красное лицо и холодные конечности.
 - Символ Кернига ++.
 - Менингит с произвольными вращательными движениями головы.
 - Открытые роднички (Calc., Sep., Zinc.).

ГЛАЗА

- При простуде глаза воспаляются и краснеют.
- Разрывание при простуде, кашле и воздействии солнца (Sang., Staph.).
- Боль при движении глаз или чтении, облегчающаяся от холодных компрессов (Puls., Phos.).
- Ревматический ирит (Kalm., Thuj.) или конъюнктивит.
- Результаты теста:
 - **Хемоз** (Acon., Apis).
 - Липкие веки.
 - Расширенные зрачки.
 - Стекловидный вид при лихорадке (Bell., Glon., Op.).
 - Ирит и иридоциклит.
 - Веки полуоткрыты во время сна (Coss., Lys.).
 - Зерна ячменя.

УШИ

- Результаты теста:
 - Абсцесс.
 - Нарывы спереди (Кейл.) и за ушами (Кон.).

НОС

- **Хронические носовые кровотечения:** при сморкании, при гемолитической анемии, при пробуждении утром, во время сна (Merc., Nit-ac.), при **умывании лица** (Arn., Calc-s., Kali-c.) и при головной боли.
- **Простуда распространяется на лобные пазухи и грудную клетку;** желтовато-зеленые выделения; насморк, который начинается с сильного, частого чихания и быстро приводит к осиплости голоса.
- Хроническая заложенность носа из-за частого использования назальных спреев.
- Сильные и частые приступы чихания после кашля.
- Результат теста:
 - Ретроназальный катар.

ЛИЦО

- Результаты теста:
 - **Жевательные движения** во время сна (Cale.), при менингите (Hell.), энцефалите (Hell.) и фебрильных судорогах (Hell.).
 - **Трещина нижней губы** (Puls., Phos., Sep.).
 - Лицо становится **темно-красным** при кашле, лихорадке, головной боли (Nat-m.), при **гневе** (Staph.) или при **возбуждении** (Ferr., Gels.).
 - **Жирное лицо.**
 - Постоянное оттягивание губ (Arum-t, Nux-v.).
 - Цианоз при астме (Op., Stram.).
 - Вывернутые наружу губы (Apis, Bell.).
 - Веснушки.
 - Морщинистый лоб (черт.).

РОТ

- Затрудненное прорезывание зубов.
- Отсутствие жажды или сильная жажда с сухостью во рту.
- Результаты теста:
 - **Афтозные язвы** и молочница у новорожденных и младенцев.
 - Сухой, потрескавшийся язык с толстым, грязно-желтым или коричневатым налетом в центре.
 - Цингит и губчатые камеди (Kreos., Merc.).
 - Дрожание языка при его высывании.

ШЕЯ

- При кашле боль в горле распространяется на уши.
- Боль в миндалинах по утрам.
- Результаты теста:
 - Фарингит и тонзиллит.
 - Пульсация сонных артерий (Bell., Gels.).

ЖЕЛУДОК

- Дети, у которых наблюдается расстройство желудка после употребления **хлеба** (Caust., Merc., Sep.), фруктов (Ars., Chin.), **устриц** (Lyc.) и **квашеной капусты** (часто встречается у моих пациентов-детей из стран Восточной Европы) (Petr.).
- **Гастрит после холодных напитков** (ротавирусная инфекция).
- **Пищевые пристрастия** у детей до начала заболевания (Phos).
- **Жажда большого количества воды** на всех стадиях лихорадки (очень редко отсутствие жажды во время лихорадки), с сухим языком, с диареей, после еды; также **жажда небольшого количества воды** и неутолимая жажда перед дефекацией.
- Рвота желчью сразу после еды или употребления даже самого малого количества воды, при головной боли, во время прорезывания зубов и при лихорадке.
- Коликообразные боли в желудке после гнева или от малейшей неосторожности в диете, облегчающиеся от отрыжки, теплых компрессов и теплого питья.
- Икота, чередующаяся с отрыжкой.
- Безуспешные позывы к рвоте при кашле.
- Колики у младенцев, вызванные запорами, облегчаются после отхождения газов (Carbo-veg., Lyc.).
- Рвота во время прорезывания зубов; рвота обычно возникает легко.
- Ухудшение: бобы, хлеб, капуста, курица, шоколад; холодные напитки, если их употреблять летом; продукты, вызывающие метеоризм, замороженные продукты (Ars., Ires., Puls.), фрукты, горячее молоко, мороженое, масла (Canth, Puls.), устрицы (Aloe., Lyc.), выпечка (Ant-c., Puls.), горох, картофель, рис (Ign.), жирная пища, квашеная капуста.
- Лучше: теплые напитки.
- Не любит: **капусту**, яйца, жир.
- Пристрастия: **Холодные напитки и холодная еда**, горячие напитки, устрицы, кислая пища, **крепкий кофе**, сладости, теплое молоко.

ЖИВОТ

- Боль в животе от запора, после молока (Bell., Cupr.); сворачивается калачиком от боли (Puls., Rheum.).
- Боль в правом подреберье от кашля (Nux-v.); улучшение от надавливания и в положении лежа на больной стороне (Sep.).
- Болезненное вздутие живота сразу после еды (Carbo-veg., Chin.).
- Перитонит с мучительной болью, затрудняющей дыхание.
- Результаты теста:
 - **Асцит.**
 - **Паралитическая непроходимость кишечника** (Op., Rhus-t., Thuja.) обычно является вторичным заболеванием при перитоните.
 - Острый аппендицит (Echi., Lach.) с угрозой разрыва.
 - Паховая грыжа.
 - Инвагинация (Plb., Verat.).
 - Печень увеличена, плотная и болезненная при пальпации.
 - Тимпанит ++.
 - Чувствительная область пупка (Kali-n, Sacch-I).

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запор у детей с мягким стулом; после злоупотребления слабительными , после **гнева** (Staph.), на море (Mag-m.); из-за **сухости** прямой кишки. Стул долго остаётся в прямой кишке без позывов (Graph., Sil., Tarent.); его приходится **удалять механически** (Nux-m., Sep.) , он твёрдый, словно обжёгся (Plat., Sulph.).
- Понос у младенцев после принятия **горячей ванны**; у детей, находящихся на грудном вскармливании (Nux-v., Sulph.); после эмоций (таких как гнев или унижение); после употребления **фруктов** (Chin., Coloc., Verat.), мороженого (Ars., Puls.), молока (Mag-m., Nat-c.) или овощей (особенно капусты); при лихорадке; во время сна (Sulph., Tub.); **летом** (Crot-t., Gamb.) и при первых движениях после пробуждения утром (Nat-s.).
- Стул обильный, льющийся, с большим количеством газов, с неприятным запахом старого сыра и непереваренных частиц пищи, похожих на клочья слизистой оболочки.
- Непроизвольный стул во время сна (Podo., Psor.).
- Зуд вокруг ануса.
- Если в комнате кто-то находится, дефекация невозможна.
- Результат теста:
 - Выпадение прямой кишки (Cale., Ign.).

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Частые и внезапные позывы к мочеиспусканию, особенно при лихорадке, - требующие немедленного реагирования; в противном случае — произвольное выделение мочи.
- Результаты теста:
 - Розовый осадок или красный песок в подгузниках младенца.
 - Пиелонефрит.
 - Моча: Альбумин ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результат теста:
 - Гидроцеле.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Хриплый голос при простуде (Carbo-veg., Caust.), на открытом воздухе (Mang) или после кори (Dros.).
- Результат теста:
 - Носовой голос (Кали-би.).

ДЫХАНИЕ

- Астма после **холодной пищи** (Puls.) и **холодных напитков** (Ars.).
- Астматическое дыхание, в теплом помещении или от малейшей физической нагрузки, лучше **на свежем воздухе** (Ars., Psor.).
- Одышка при движении и смехе, лучше в **положении лежа на спине** (Cast, Kalm) или на **холоде** (Carbo-veg., Merc.) **или на открытом воздухе**.
- **Хрипы перед приступом кашля** (Бром.).
- Результат теста:
 - Стоны и вздохи.

КАШЕЛЬ

- Кашель после **холодного питья, при перегревании**, особенно летом (Carbo-veg., Kali-c., Puls., Sil.).
- Кашель, начинающийся после **гнева** (Cham., Staph.) или при смехе у младенцев (Chin.).
- Приступы удушающего кашля, начинающиеся сразу после еды (Kali-bi., Nux-v.) или **питья** (Ars., Dros.); **улучшение наступает только от теплого питья** (Ars., Lyc., Rhus-t.) или свежего воздуха.
- **Вынужден сесть**, как только начинается кашель (Con., Phos.).
- **Мучительный кашель** заставляет ребенка **придерживаться головы и груди во время кашля** (Arn., Dros., Nat-s., Phos.).
- Кашель заканчивается чиханием.
- Кашель, начавшийся после кори или гриппа.
- Сухой кашель с лихорадкой (Ipec., Kali-c.).
- Приступы кашля возникают при выходе из теплого помещения на холодный воздух и наоборот.
- Сильный, сухой, мучительный кашель, который, по-видимому, исходит из желудка (Sep.).
- Приступ кашля настолько сильный, что все тело дрожит (Cupr., Phos.).

ПНЕВМОНИЯ

За последние два десятилетия я был свидетелем того, как Вгу. излечил бесчисленное количество случаев пневмонии. Были отмечены и неоднократно подтверждены следующие симптомы :

- Ребенку становится **жарко**, он сильно потеет; кожа горячая и влажная.

- **Лобные головные боли**, локализующиеся непосредственно над глазами, усиливающиеся при любом **движении или нагрузке**.
- Тяжелый, **густой, белый налет** на сухом языке; во рту ощущается сухость, ребенок испытывает сильную **жажду и хочет пить холодные напитки** через длительные промежутки времени (хотя употребление большого количества воды иногда ухудшает состояние ребенка); горький привкус во рту.
- Губы становятся **сухими и трескаются**.
- Виден прилив крови к лицу; ребенок выглядит **сонным и пьяным от сна**.
- Они **не могут сидеть**, потому что чувствуют **головокружение** и могут потерять сознание (Acon., Phyt.).
- Вам **нужна комната с вентилятором или кондиционером**, но вы чувствуете себя крайне некомфортно в теплой или жаркой комнате.
- Ребенок **держится за грудь** во время кашля.
- Я никогда не полагаюсь на правосторонние или левосторонние симптомы при пневмонии, поскольку и те, и другие успешно лечатся этим средством.
- Ребенок вообще не любит, когда его беспокоят, и категорически отказывается, например, от холодных компрессов, измерения температуры, переодевания, купания или медицинского осмотра.
- Лицо темное.
- Дыхание обычно короткое и хриплое, горло красное и опухшее.
- Пневмония обычно появляется весной и летом.
- Дети не любят, когда с ними разговаривают (Hell., Op., Ph-ac.), и реагируют раздражительно и злобно. Всякий раз, когда они раздражаются и злятся, это усугубляет их физические проблемы. (Я неоднократно находил подтверждение этому в своей практике, даже в случаях малярии и тифа, когда температура поднимается на один-два градуса, когда родственник - или член семьи пытается потревожить ребёнка.)

Грудь

- Быстро прогрессирующий бронхит с началом простуды.
- Результат теста:
 - Рентгенограмма грудной клетки: размытое изображение и облитерация правого реберно-диафрагмального угла; лимфатические узлы ворот легких +.

Назад

- Болезненная скованность шейного отдела.
- Результат теста:
 - Рентген: Spina bifida (Cale., Sil.).

КОНЕЧНОСТИ

- Ювенильный ревматоидный артрит, особенно у детей, которые любят есть много мяса; хуже в холодную и сырую погоду; лучше от надавливания (формы) и теплых компрессов.
- Склонность к вывихам стоп и тазобедренных суставов.
- Боль в суставах, чередующаяся с конъюнктивитом.

- Колени ударяются друг о друга во время бега.
- Скованность конечностей после шока.
- Полезно при растяжениях и травмах связок и сухожилий, особенно после игры в теннис.
- Результаты теста:
 - Отёчность суставов (особенно стоп, коленей и локтей) с повышением температуры и покраснением.
 - Синовит.
 - Чувствительные мозоли (Ant-c.).

СПАТЬ

- Спит, свернувшись калачиком, как собака (Ars., Psor.).
- Ребенок просыпается от ужасных кошмаров.
- Спать на правом боку невозможно (Borx.).
- Нарушение сна из-за болей в животе (Rhus-t.).
- Бессонница с лихорадкой.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Сухой, отрывистый кашель (Phos., Rhus-t.) с красным, горячим лицом (Cham., Fern), красными, горячими щеками.
 - Сильная жажда, требует большого количества холодной воды, что приносит облегчение (Ign., Nat-m.).
 - Сильное желание прилечь во время заморозков.
 - Хуже при движении и в теплом помещении.
- Нагревать:
 - Сухой, отрывистый кашель; головная боль; сухость во рту и на губах, толстый желтый налет на языке.
 - Хочет покоя (Bart., Op., Ph-ac.) и чтобы его не беспокоили на любой стадии лихорадки.
 - Ночью с 9 вечера до полуночи стоит палящая жара.
 - Жажда усиливается, но меньше по сравнению со стадией заморозков.
 - Хуже в теплых помещениях.
 - Лучше на открытом воздухе.
- Пот:
 - Обильное потоотделение по всему телу, особенно на той стороне, на которой лежит ребенок.
- Особенно показано при катаральной лихорадке при кори, тифе, желудочно-кишечных заболеваниях, заболеваниях желчного пузыря и лихорадке при пневмонии.

КОЖА

- Потливость после еды (Phos., Sep.), особенно теплой пищи.
- Обильный, изнуряющий пот с кислым запахом, особенно во время сна или от малейшей физической нагрузки, окрашивает простыни в желтый цвет (Merc., Graph.).
- Медленное развитие сыпи при инфекционных заболеваниях, таких как корь или ветряная оспа.

• Результаты теста:

- Веснушки.
- Molluscum contagiosum (Vab.).
- Чесотка.
- Крапивница.

Судороги

- Жалобы на: подавленную сыпь или сыпь, которая не проявляется должным образом (при инфекционных заболеваниях).
- После судорог: пот (Sil.).

Общий

- Жалобы, вызванные **неправильным применением** аллопатических средств, таких как молоко **магнезии**, сосудосуживающие средства для носа, местные мази или подавлением сыпи (например, в случаях кори, когда принимались ненужные антибиотики).
- Дискомфорт, вызванный **холодным ветром**, промоканием, холодной и сухой погодой, а также переменной погоды с холодной на теплую.
- Ухудшение от малейшего прикосновения (Arn., Bell., Rhus-t.) или движения.
- Жалобы после отлучения от груди (Bell.).
- Отвращение к купанию.
- Ребенок отбрасывает одеяло ногой (Хам., Лод.).
- Зябкость, хотя в тепле становится хуже.
- Желание свежего воздуха, но хуже от сквозняков.
- Отсутствие реакции.
- Склонность к простудам.

Источник

Семейство тыквенных

BUFO RANA

(Кожный секрет серой жабы - Bufo)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Для **детей со слабым интеллектом**, но хорошо развитым телосложением («физически высокие, умственно маленькие»), с **сильным желанием мастурбировать** и абстиненцией.
- ▶ Дети с умственной отсталостью, обладающие высоким талантом в определённой области, например, в компьютерных играх, игре с Lego, разборке и изучении игрушек и электронных устройств, а также в освоении определённого предмета или музыкального инструмента. В этих областях память и способность к обучению превосходны (**частичный интеллект**).
- ▶ Дети интеллектуальных родителей, которые посвятили себя карьере и живут своей собственной жизнью.
- ▶ Для **детей с генетически обусловленными нарушениями**

интеллекта

- (например, галактоземия, синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром ломкой X-хромосомы, синдром Клайнфельтера, синдром Леша-Найхана, гаргулизм или туберозный склероз). Напротив: умственная отсталость, вызванная инфекциями матери во время беременности, такими как краснуха, токсоплазмоз или цитомегаловирус (Zinc-m., Merc-sol. и Cic.).
- ▶ Дети матери, которая во время беременности испытала сильный страх, конфликт или разочарование в любви.
 - ▶ Младенцы и дети, которые медленно учатся и взрослеют, а также чья социальная адаптация недостаточна.
 - ▶ Перепады настроения и слабый интеллект.
 - ▶ В этом поведении есть две стороны: нежность и любовь, но при этом укусы и атаки; желание компании и в то же время желание побыть одному; желание побыть одному и в то же время страх остаться одному и умереть покинутым; попеременные вопли и плач.
 - ▶ Ребенку трудно выразить себя, он часто погружается в свой собственный мир или легко впадает в раннюю зависимость.
 - ▶ **Гнев в одиночестве**, гнев с укусами (Bell., Camph., Cupr., Lyss., Stram.); гневается, когда говорит что-то, а затем чувствует себя непонятым (Laug., Nicc-met.); гнев, особенно перед спазмами; гнев с желанием ударить (Anan., Hyos., Nux-v.) и разрушить, оскорбительный, оскорбительный, разрушительный и злобный с желанием ударить (Hyos.).
 - ▶ Дерзкий, лживый и злобный, обманчивый (Agar., Bell., Med., Op., Plb.) и хитрый.

- ▶ Но также: пассивные и миролюбивые дети.
- ▶ Смех без причины (Aether., Carbn-s., Sal-ac., Stram., Syph., Tab.), хихиканье (Cann-i., Stry.), жестикуляция.
- ▶ Грызть ногти и пощипывать близлежащие предметы.
- ▶ Вялость при крайней сексуальной энергии (Бар-м.).
- ▶ Постоянная тенденция играть с гениталиями (Hyos., Zinc.) и мастурбировать (Ust.; Анап. похож в неконтролируемом побуждении мастурбировать).
- ▶ Бесстыдный (Hyos., Phos., Stram.), говорит непристойности (Aur., Bell., Lil-t.).
- ▶ Чрезвычайный интерес к порнографическим материалам (возможно, пациентов с синдромом Буфо стало больше, чем раньше, поскольку порнография теперь легко доступна в Интернете).
- ▶ Глупая, простая и детская натура; наследственная предрасположенность к психическим расстройствам, приводящая к появлению поколений ограниченных и слабоумных детей.
- ▶ Любовь к животным, которая возникает главным образом из-за того, что дети умственно отсталые и часто не принимаются своими семьями и обществом; но в то же время существует и сильный страх перед животными, птицами и особенно собаками.
- ▶ Умственная отсталость в сочетании с чрезмерной сексуальной энергией.
- ▶ У детей не развиваются высокие социальные навыки (Кокаин., Лавр., Морф.).
- ▶ Плачет по пустякам (Caust., Kali-br., Op.).
- ▶ Желание компании, но страх людей (Ars., Clem., Con., Tarentum); застенчивый.
- ▶ Ребенок легко пугается насекомого, бабочки или птицы и вздрагивает, даже если видит их пролетающими рядом с собой.
- ▶ Легко пугается страха (Hyos., Nat-m., Nat-s., Nit-ac.) или шума (Borx., Kali-c., Sil.).
- ▶ Крайняя раздражительность у детей, особенно при пробуждении (Bell., Cina, Merc-ir., Lys., Tub.).
- ▶ На вопросы отвечает очень поспешно (Carc., Dendr-pol., Lach., Lys., Rhus-t.).
- ▶ Делает ошибки в речи, часто произнося только половину слова, неправильно строя слова или используя не те слова (Am-c., Both., China, Lys., Nux-m.).
- ▶ Страх перед животными, птицами и насекомыми.
- ▶ Страх быть брошенным родителями и семьей.
- ▶ Страх зеркал (Canth., Carc., Lyss., Stram.); они не любят смотреть на свое уродливое отражение.
- ▶ Страх незнакомых людей (Carbo-veg., Cupr., Thuj.).
- ▶ Крики, похожие на вой животных (Acon., Cham., Verat-v.).
- ▶ Младенцы чувствуют сонливость и опьянение после кормления грудью.
- ▶ У младенцев могут возникнуть спазмы и напрягаться все тело при смене подгузников.

- ▶ детей старшего возраста наблюдается головокружение (Bapt., Gels., Lach., Nux-m.), глупое выражение лица (Bar-c., Phos.), толстые губы (Bar-c., Cale., Graph., Med.), щетинистые волосы (Laur., Mur-ac., Ran-b., Zinc.) и ковыряние в носу пальцами (Arum-t, Cina, Nat-m, Santin, Zinc.).
- ▶ Постоянное заламывание рук (Ars., Phos., Psor.) как симптом хореи.
- ▶ Мучительный страх во время менингита (Apc.).
- ▶ Беспокойство перед эпилептическими припадками (Ana., Arg-n., Caust., Hyos., Plb.).
- ▶ Беззащитный идиот, над которым все смеются.

Тело

- ▶ **Сродство к нервной системе, половым органам и коже.**
- ▶ Подавляемые кожные высыпания вызывают симптомы со стороны центральной и периферической нервной системы, чаще всего в виде **судорог и эпилепсии.**
- ▶ Эпилепсия как следствие мастурбации у молодых людей.
- ▶ Большие трудности при грудном вскармливании новорожденных из-за толстых губ, высовывания и втягивания языка или облизывающих движений языка.
- ▶ Очень холодно.
- ▶ Острые заболевания обычно не протекают в тяжелой форме.
- ▶ Повреждения пальцев (гипертония), например, после сдавливания или защемления.
- ▶ Лимфангит септического происхождения.
- ▶ Склонность к затвердению желез.
- ▶ Красные или фиолетовые полосы на шее и спине при менингите.
- ▶ Опухоли и свищи костей.
- ▶ **Физические характеристики Буфо:**
 - Склонность к ожирению.
 - Внешне напоминает жабу: короткая шея, коренастый.
 - Рот постоянно открыт (Ang., Op., Sulph.).
 - Губы толстые, обычно полуоткрытые. Через полуоткрытый рот виден язык.
 - Лижучие движения языка (Lyc.).
 - Заикающаяся речь.
 - Ковыряет пальцами в носу (Arum-t., Cina, Nat-m., Santin., Zinc.).
 - Дети, у которых наблюдается выделение густой, пузырящейся слюны изо рта (Merc., Stram., Graph. — выделяет пузырьки во время плача).
 - Уши посажены низко на голове.
 - Выражение лица: оцепеневшее (Asaf., Bapt., Nux-m.), тупое (Absin., Acon., Arg-n., Kali-br., Lyc., Nux-m.), слабоумное.
 - Веки опухшие.
 - Жирное лицо (Aur-m., Kali-c., Plb., Vine.).
 - Истощение со вздутием живота (Abrot., Bar-c., Cale., Iod., Nat-m., Sanic., Sil., Sulph.).
 - Истощенные, пожилые дети (Ambr., Cupr., Lach., Sei., Vip.). - Сколиоз.

Другие важные симптомы

Голова

- Холодный пот кожи головы, особенно на лбу (Carbo-veg., Op., Verat.).
- Обильный маслянистый пот (Bry., Hera., Merc.).
- Перхоть, облысение, выпадение волос.
- Чрезвычайно чувствительная кожа головы.
- Волосы меняют цвет и останавливаются в росте.
- Запах волос отталкивающий (Lyc., Staph., Sulph., Vine., Viol-t), кислый.
- Головная боль после завтрака (Bad., Carbn-s., Iris, Lyc.), хуже от света, шума, лучше от носового кровотечения (Mag-s., Meli., Psor., Rhus-t.).
- Подушка вызывает боль в затылке.
- Дрожание головы (Ant-t., Cic., Op., Plb., Zinc.).
- Результаты теста:
 - Перед эпилептическим припадком голова откинута набок (Caust., Lyc.).
 - Обильное потоотделение.
- Менингит.

МЕНИНГИТ

При менингите у Буфо наблюдаются следующие симптомы:

- Мучительный страх при менингите с красными или фиолетовыми полосами на шее или спине.
- Кровянистая слюна (Crot-s., Mag-s., Nit-ac., Phos.).
- Жгучий жар во время лихорадки (ухудшение ночью).
- Холодный пот кожи головы, особенно на лбу (Hell., Op.).
- Холодность ног при лихорадке (Iris, Lach., Sulph., Zinc.).
- Дискомфорт глубоко в мозгу.
- Постоянное желание стискивать зубы (Hyos., Lyc., Podo.).
- Судорожные (Agar., Kali-br., Zinc.) и вращательные движения глаз (Cic., Gels., Hyos., Zinc.).
- Язык с расщелинами и трещинами (Fl-ac., Rhus-t., Spig.).
- Делирий во время лихорадки.
- Расширение зрачков при лихорадке (Apis, Atro., Bell., Cina., Hell., Hyos., Merc.).
- Опускание челюсти.
- Возбуждение во время мороза (Acon., Cham., Cocc., Coff., Teuer.).
- Выражение лица, как будто он ошеломлен и опьянен.
- Синюшный оттенок лица, бледность, черные губы.
- Жирное лицо.
- Головная боль, сопровождающаяся болью в шее.
- Жар, сопровождающийся ознобом.
- Жар в голове с холодом тела и конечностей.
- Равнодушие к окружающему (Merc., Mez., Phos., Sei.), после комы, во время лихорадки, с холодными ногами, с горячей головой.
- Воспаление мозговых оболочек.
- Инъецированные глаза.
- подергивание головы.

- Совершает непроизвольные движения руками, особенно заламывает руки (Асар., Кали-п., Тер.).
- Стоны во сне (Aur., Bry., Stram.).
- Хрипы (Phos., Verat-v.).
- Паралич глазных мышц.
- Пот на спине.
- Светобоязнь.
- Высунутый язык (Crot-h., Lach., Phyt.).
- Выпячивание глаз.
- Озноб.
- **Кричал до потери сознания.**
- Храпящее дыхание с пыхтящим выдохом (Chin., Chlol., Op.).
- Косоглазие.
- Ступор с невозможностью говорить (Phos.).
- Запавшие глаза.
- Жгучая, сильная жажда во время лихорадки.
- Потеря сознания с автоматическими моделями поведения; частые приступы потери сознания.
- Рвота коричневой кровью с прожилками.

ГЛАЗА

- Не переносит вида блестящих предметов (Bell., Canth., Lyss., Stram.).
- Воспаление уголков глаз (Arg-n., Borx., Euphr.); глаза инъецированы (Arn., Gern., Glon., Merc.).
- Сыпь оставляет корки (Arg-n., Aur., Graph., Psor., Sulph.).
- Крайняя плаксивость.
- Глаза воспаленные, красные, опухшие, зудящие.
- Глаза большие, красные, запавшие, с кольцами под ними.
- Глаза широко открыты.
- Глаза закатываются вверх и влево в результате судорог.
- Выпадение ресниц.
- Миопия, пресбиопия.
- Предметы кажутся искривленными (Белл.).
- Взгляд тревожный, прищуренный; глаза кажутся налитыми кровью.
- Паралич зрительного нерва (Con., Kali-i., Nat-m., See.) и верхнего века (Caust., Gels., Nit-ac., Spig.).
- Светобоязнь.
- Зрачки нечувствительны к свету (Arn., Bell., Cupr., Hyos., Op.).
- Закатывание глаз вверх (Camph., Cupr., Hell., Op.).
- Результаты теста:
 - Постоянное моргание (Bell., Mez., Nux-v.).
 - Чешуйки над бровями (Sulph.).
 - Левое веко парализовано (Caust., Gels.).
 - На глазах образуются небольшие волдыри.
 - Выпячивание глазных яблок (Corn., Ferr-i., Guaj., Nat-m.).
 - Зрачки расширены (Bell., Cale., Gels., Mang., See.).

- Запавшие глаза.
- Подергивание век.
- Изъязвление роговицы (Apis, Cund., Sin-n.).

УШИ

- Шелушение, изъязвление и нагноение ушной раковины.
- Средний отит с гнойными и кровянистыми выделениями.
- Боль усиливается от умывания холодной водой (Borh., Cham., Dulc., Hep., Sil.).
- Симптомы со стороны уха часто совпадают с симптомами со стороны глаз и головы.
- Очень чувствительный слух (Acon., Coff., Nat-c., Op.); малейший шум действует на него, малейший шум расстраивает его; музыка не переносится (Ambr., Nat-c., Nux-v.).
- Результаты теста:
 - Абсцесс слухового прохода (Calc-s., Crot-h., Hep.).
 - Хронический гнойный средний отит, гнойная оторея с изъязвлением и кровотечением из наружного уха.
 - Трещины за ушами (Chel., Graph., Hydr., Petr.).
 - Гнойная оторея.
 - Отоскопия: гной в среднем ухе; разрыв барабанной перепонки.
 - Опухшие и шелушащиеся.
 - Изъязвления (Anac., Puls., Ruta) и кровотечения из наружного уха.
 - Язвы в ухе.
 - Бородавкообразные наросты на ушах.

НОС

- Утренняя простуда (Bar-c., Carbo-veg., Squil.); выделения зеленоватые, зловонные, гнойные, желтые, желто-зеленые; сопровождаются сильной сухостью носа.
- Носовые кровотечения с покраснением лица и болью во лбу; облегчает головную боль (Brom., Bry., Meli., Psor.).
- **Частое чихание вечером перед сном.**
- Результаты теста:
 - Корочки.
 - Язвы в ноздрях.
 - Ретроназальный катар.
 - Опухшие, красные и покрытые пустулами.

РОТ

- Холодные жидкости ухудшают все симптомы в полости рта.
- **Судороги после удаления зуба.**
- Обильное слюнотечение, очень пенная слюна (Apis, Bry., Nux-m.).
- Желание стиснуть зубы.
- Желание пить и смачивать язык, даже если он покрыт слюной.
- Частое прикусывание языка (Bell., Ign., Ol-an.).
- Потеря зубов.
- Рот полон густой слизи.

- Заикание речи (Caust., Merc., Stram.), затрудненная речь (Gels., Op., Stann.); нарушенная и невнятная речь (Hyos., Ph-ac., See.).
- Зубы легко гниют и ломаются.
- Ребенок слышит сказанное, но не может ответить или пошевелиться.
- Результаты теста:
 - Абсцесс десен (Hecla, Hep., Sil.).
 - Прикусывает щеки при жевании или разговоре (Caust., Ign., Nit-ac.).
 - Прикусывает язык во время судорог (Art-v., Cic., Oena., See.).
 - Черный язык (Carbo-veg., Chin., Merc.).
 - Кровоточивость десен, кровоточивость языка.
 - Кровавая слюна.
 - Пузыристая слюна.
 - Скрежет зубов во время судорог (Coff., Hyos., Sulph., Tarent.).
 - Неприятный запах изо рта (Arn., Carb-ac., Kali-p., Tub.).
 - Лижущие движения языка (Lyc.).
 - Рот открыт.
 - Паралич языка.
 - Заикание — злится, если его бессвязную речь не понимают (хорея).
 - Стоматит, гингивит.
 - Язык: расщелины, трещины, сине-черный, толстый, твердый, покрытый мелкими жгучими прыщиками.
 - Подергивание вокруг рта.
 - Язвы на деснах.

Лицо

- Облитый потом (Cact, Cina, Spong.).
- Ребёнок очень раздражён, когда ему моют лицо водой. Он даже не выносит мокрую тряпку на лицо.
- Увеличение околоушной слюнной железы (Bar-c., Brom., Rhus-t.).
- Губы поджаты, сухие, кровавые, потрескавшиеся, очень болезненные.
- Бледный, красный.
- Прыщи на верхней губе (Bell., Carb-c., Thuj., Zinc.) с насморком.
- Одутловатое лицо с низко посаженными ушами.
- Опухшие, толстые, обвислые губы.
- Худое, костлявое лицо.
- Результаты теста:
 - Акне.
 - Обливается потом во время спазмов (Coss.).
 - Раздутый и деформированный.
 - Изменение цвета на синеватый, бледный.
 - Опушение челюсти (Lach., Lyc., Mur-ac.).
 - Выражение лица: Глупый (Absin., Bar-c., Nux-m.), ошеломленный (Bapt., Cann-i., Ser.), старческий вид.
 - Затонувший.
 - Жирный.
 - Большая нижняя челюсть.

- Губы черные (Ars., Hyos., Merc-c.).
- Деформация нижней челюсти.
- Выступающая верхняя челюсть, прогнатизм.
- Увеличение подчелюстных и околоушных желез.
- Толстые губы (Mez., Op., Plat., Syph., Zinc.).

ШЕЯ

- Постоянная тенденция прочищать горло (Caust., Wye.).
- Боль усиливается при глотании слюны или пищи.
- Результаты теста:
 - Струма (Calc-i., Nat-m., Thyр.).
 - Воспаление.
 - Фарингит (Apis., Lac-c., Merc., Wye.).
 - Ретроназальные выделения, густая слизь (Arg-met., Kali-bi., Phyt.).
 - Миндалины увеличены, воспалены.

ЖЕЛУДОК

- Отвращение к еде.
- Пристрастия: деликатесы (Acon-l., Chin., Ipec., Tub.), молоко, пирожные, подслащенная вода (Arg-n., Cur., Sulph.), сладости, кондитерские изделия, кислые фрукты.
- Отвращение к соленой (Cor-r., Graph.) и острой пище (Chin., Merc-c.).
- Свежий хлеб или свежее испеченный пирог вызывают отрыжку.
- Сильная жажда холодной подслащенной воды.
- Чрезмерная, неконтролируемая отрыжка утром и вечером.
- Чрезмерный, сильный голод, даже после еды.
- Крайне придирчив к своим привычкам в еде.
- Частые перебои в работе.
- Молоко вызывает отрыжку (Cale., Mag-c., Zinc.).
- Волчий аппетит во время лихорадки (Ars., Caps., Chin., Phos.).
- Удушье при кашле (Carbo-veg., Nit-ac., Puls.).
- Жажда во время еды (Am-c., Cocc., Nat-c.), во время лихорадки (Ars., Merc., Tub.).
- Сильная рвота сразу после еды, сопровождающаяся позывами к дефекации. Рвота после питья холодной воды; при кашле. Рвота кровью и желчью.
- Результаты теста:
 - Рак желудка у детей младшего возраста.
 - Повышенная чувствительность эпигастрия (Camph., Nux-v., Sulph.).

ЖИВОТ

- Дискомфорт в животе облегчается теплым молоком (Crot-t, Op.).
- Колики после молока (Cupr., Lac-d., Raph.).
- Обильное газообразование по утрам после урчания в животе.
- Сильная чувствительность живота, даже малейшее давление простыни - вызывает сильный дискомфорт (Apis., Bell., Nux-v.).
- Боль в животе во время еды, после употребления молока и во время дефекации.
- Пульсирующая боль в правом подреберье, сопровождающаяся рвотой.

• Результаты теста:

- Живот вздут.
- Увеличенный и твердый живот.
- Абсцесс печени (Fl-ac., Hep.).
- Гепатомегалия.
- Увеличение паховых желез (Dulc., Merc-s., Nit-ac.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запор с холодом тела и жаром головы.
- Геморрой с выделениями ярко-красной крови.
- Непроизвольное испражнение во время судорог (Anan., Lach., Oena., Stry., Tarent.).
- Результаты теста:
 - Аскариды (Chen-a., Cina, Ferr-s., Spig.).
 - Зловонные газы (Carbn-s., Sulph., Zinc.).
 - Анальный пролапс (Ign., Mur-ac., Podo., Sep.).
 - Стул творожистый (Rheum., Stann., Valer.), мягкий, жидкий, желтый, белый.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Частое выделение бледной мочи.
- Непроизвольное мочеиспускание во время эпилептического припадка (Caust., Hyos., Plb., Zinc.).
- Гломерулопатия, нефрит.
- Боль в почке с одышкой и обмороками.
- Задержка мочи (Meny., Op., Pareir., Ter.).
- Обструкция мочевыводящих путей (Canth., Laur., See., Stram.).
- Результаты теста:
 - Кровавая моча.
 - Скудное выделение мочи.
 - Моча коричневого цвета, с неприятным запахом.

ГЕНИТАЛИИ

- Постоянно играет со своими гениталиями (Hyos.).
- Ранняя и чрезмерная мастурбация.
- Ищет уединения, чтобы мастурбировать.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Постоянная охриплость (Arum-t., Stann.).
- Результаты теста:
 - Избыточное скопление слизи в бронхах и гортани.
 - Ларингит.
 - Ларингоскопия: язвы гортани .

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

- Астма, хуже ночью, после полуночи, в 3 часа ночи (Am-c., Ant-t., Cupr., Kali-c., Nat-m., Samb.), лучше при наклоне вперед (Aral., Ars., Lach., Spong.), в положении сидя; ребенок не может дышать и корчится, как собака, после малейшего усилия.
- Дыхание затруднено, сопровождается тревогой, вдохи становятся все более короткими, повышается температура.

- Затрудненное дыхание, вынужден сидеть или наклоняться.
- Одышка; тяжелое дыхание, как у собаки.
- Результаты теста:
 - Грудь: Двусторонние хрипы и хрипы; уменьшение притока воздуха.
 - Хрипы.
 - Первичный комплекс.

КАШЕЛЬ

- Ночной кашель после полуночи, около 3 или 4 часов (Am-c., Kali-c., Op., Rumx.).
- Кашель усиливается **перед едой**, после еды (Kali-bi., Nux-v.), от эмоционального возбуждения (Lach., Nux-v.), днем (Euphr., Phos.), в помещении (Brom., Coc-c., Spong.); лучше **ночью**, от поноса (Sang.).
- Сухой, щекочущий кашель или глубокий, глухой кашель.
- Удушающий кашель.
- Сильный кашель, вызывающий рвоту.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Учащенное сердцебиение при гипертиреозе.
- Результат теста:
 - Пульс медленный, прерывистый, нерегулярный.

Грудь

- Результаты теста:
 - Волдыри на груди.
 - Из сосков сочится кровь (Ham., Lyc., Merc., Merc-c., Sep., Sulph.).

Назад

- Подергивание шеи из-за спазмов.
- Опухоли костей размером с кулак.
- Скованность шеи.
- Результаты теста:
 - Кариес грудных позвонков.
 - Искривление грудного отдела позвоночника (Cale., Lyc., Puls., Syph.).
 - Пот на крестце (Coc-c., Hyos., Plan.).

КОНЕЧНОСТИ

- Судороги в ногах будят ребенка.
- Сильная слабость в ногах.
- Результаты теста:
 - Абсцесс пальцев рук и ног.
 - Артритический отек.
 - Неуклюжесть нижних конечностей, спотыкание при ходьбе.
 - Волдыри на ладонях рук (Canth., Kreos., Ran-b.) и подошвах ног (Ars., Bell., Gaert), волдыри на подошвах ног, выделяющие желтую жидкость.
 - Холодные ноги при лихорадке (Cocc., Stram., Sulph.), при головной боли (Gels., Sep.).

- Трещины и ссадины на руках.
- Увеличенные паховые железы.
- Рожа на руках (Lach., Rhus-t.).
- Натирание между ягодицами (Graph., Nit-ac., Sep.) и бедрами (Нер., Kali-c., Kreos., Merc.), вызванное подгузниками.
- Травмы пальцев; боль распространяется полосами вверх по рукам. После лёгкого ушиба мизинца (мизинца) тянущая боль с покраснением распространяется по всей руке, следуя по ходу лимфатических сосудов в подмышечную впадину, вызывая болезненное увеличение лимфатических узлов (v. Lippe).
- Нижние конечности опухшие.
- Зловонный пот ног (Lyc., Teil., Thuj.).
- Болезненные мозоли (Calc., Lyc., Rhus-t., Sep.).
- Панариций (Dios., iod., Myris.), сине-черная припухлость вокруг ногтя (большого пальца), за которой следует нагноение.
- Пузырчатка (Lyc., Sep.).
- Потливость задней части колена (Carb-an., Sulph.).
- Спотыкающаяся походка (Kali-br., Plb., Zinc.).
- **Вытягивание ног перед эпилептическим припадком.**
- Шатающаяся походка (Con., Pic-ac., Plb.).
- Дрожание конечностей.
- Бородавки на руках (Dulc., Nit-ac., Thuj.), на пальцах (Lac-c., Sep.).

СПАТЬ

- Сильная сонливость у детей сразу после кормления грудью; непреодолимое желание спать после еды (Agar., Cale., Nux-v.).
- Положение для сна на левом боку (Mag-m., Phos., Thuj.).
- Разговоры (Bell., Kali-c., Lach.), стоны (Aur., Bry., Calad.) или плач (Castm., Cham., Samb.) во время сна.
- Результаты теста:
 - Коматозное состояние после судорог (Atro., Cic., Plb.).
 - Просыпается слишком рано, как будто из-за страха.

Мечты

- Страшно.
- Чего-то большого.
- Кошмары.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Холодные ноги при лихорадке (Kreos., Ruta, Sabin.).
- Жар с апатией (Con., Op., Ph-ac.) или делирием (Bapt., Puls., Rhus-t.).
- Горячая голова и теплое тело.
- Маслянистый пот (Bry., Chin., Mag-c., Merc., Stram., Thuj.).

КОЖА

- Абсцесс с четкими границами и синим ореолом.
- Восходящий лимфангит с красными полосами, распространяющимися вверх по руке.
- Грязная (Ars., Caps., Psor., Sanic., Sulph.), жирная кожа (Bry., Chin., Thuj.).

- Волосы дыбом, мурашки по коже (Ад., Пар., Верат.).
- Зуд и жжение.
- Пустулы, нагноение при каждой незначительной травме; небольшие раны обильно нагнаиваются.
- Маленькие и большие волдыри, которые лопаются, оставляя обнаженную поверхность, из которой сочится едкая жидкость.
- Результаты теста:
 - шишки.
 - Ознобления (Agar., Nit-ac., Petr.).
 - Ощущение, будто куски кожи свободно свисают (Kreos., Phos., Sabad.).
 - Панариций с болью, распространяющейся вверх по руке.
 - Пузырчатка: желтые волдыри вскрываются, обнажая воспаленную поверхность, из которой сочится желтоватая едкая жидкость.
 - Красные полосы под кожей (Apis, Euph., Ph-ac., Sulph.).
 - Покраснение кожи.
 - Чесотка.
 - Кожа быстро становится болезненной.
 - Кожа влажная или сухая и реагирует на любые изменения температуры.
 - Тромбофлебит.
 - Нездоровая кожа (Hep., Petr., Rhus-t.).
 - Желтушность кожи.

Общий

- **Потеря веса тела, но вздутие живота;** значительная потеря веса при хорошем аппетите.
- Детское ожирение.
- Быстро потеет при малейшей нагрузке (Агар., Калий-п., Цинк.).
- Большое желание заниматься спортом среди маленьких детей.

АУТИЗМ

При аутизме у Буфо проявляются следующие симптомы:

- Отвращение к обществу.
- Трудности с концентрацией внимания.
- Эпилептические припадки.
- Постоянное хихиканье (Cann-i., Nat-m., Stry.).
- с ребенком крайне сложно установить контакт.
- Задержка умственного и физического развития.
- Ярость.
- Беспокойство.
- Чувствительность к шуму.

СИНДРОМ ДАУНА

При синдроме Дауна у Буфо проявляются следующие симптомы:

- Рассеянный.
- Поведенческие проблемы.
- Отвращение к обществу, желание побыть в одиночестве.

- Мышечные жалобы, особенно гипотония и мышечное напряжение.
- Врожденные пороки сердца, особенно пороки клапанов.
- Постоянное стискивание зубов (Lyc., Phyt., Podo.).
- Чрезмерная радость.
- Глупое выражение лица.
- Пенистая слюна (Apis, Bry., Ipec., Nux-m.), слюна с пузырями (Ign, Merc.).
- Грызть ногти.
- Игра с гениталиями (Bell., Hyos., Stram., Ust.).
- Чувствительность слуха к шуму.
- Крики, вой.
- Болтливость.
- Предпочтение компьютерам.
- Делает различные жесты.
- Умственная и физическая отсталость.
- Мономания (Aloe, Ign., Sil.).
- Заметные движения головы.
- Игривый.
- Высунутый язык.
- Чувствителен к музыке.
- Чувствительность к шуму, но музыка улучшает состояние.
- Крики.
- Речь затруднена, невнятна, медленна и непонятна.
- Немного ошеломляет.
- Застенчивость.
- Легко плачет.

СИНДРОМ АСПЕРГЕРА

При синдроме Аспергера у Буфо проявляются следующие симптомы:

- Отвержение к обществу.
- Делает различные жесты.
- Умственная отсталость.
- Беспокойство.

ЭПИЛЕПСИЯ

ПЕРЕД АТАКОЙ

- Аура: В животе, **неразборчивая речь**, в матке (Cimic.) и оттуда распространяющаяся на желудок, в желудке (Cic., Hyos., Nux-v., Plb.), от солнечного сплетения до гениталий, расширенные зрачки, рот широко открыт, глаза обращены вверх и влево, расширенные зрачки, не реагирующие на свет (Arg-n.), исходящая из половых органов, беспокойство, онемение мозга, подергивание в шее.
- Глупый, бессмысленный и непонятный язык.
- Голова оттянута в сторону (Caust., Lyc., Stram.).
- Раздражительность и гнев.
- Подергивание шейных мышц (Bry.).
- подергивание головы.

- Лижучие движения языка.
- Смех (Aether., Camph., Cupr., Plat.).
- **Рот широко открыт.**
- Беспокойство (Arg-n.) и крики; бегают по дому с криками, пока не потеряют сознание.
- **Беспокойство в конечностях.**
- Крики.
- Вздох.
- Скованность конечностей, особенно верхних, большие пальцы повернуты внутрь.
- **Растяжка ног.**
- Подергивания во всем теле быстро усиливаются, пока вся мышечная - система не придет в крайнее расстройство.

ВО ВРЕМЯ АТАКИ

- Прикус языка (Absin., Art-v., Cupr., Op.).
- Кусательный (Cupr., Tarent.).
- Недурно.
- Постоянные спазматические движения глазных яблок.
- Судороги начинаются в животе (Aran., Cale.) или в лице (Hyos., Lach.).
- Судороги при падении.
- Судороги в бессознательном состоянии (Calc., Plb., Vise.).
- Спазматические вращательные движения глаз.
- Склонность к мастурбации во время эпилептических припадков (Cale., Lach., Plat., Stram.).
- Судороги, похожие на эпилепсию.
- Лицо покрыто потом (Кокк.).
- Лицо краснеет (Cic., Glon., Op.).
- Падает без сознания на землю, кричит, у него возникают судороги в конечностях и деформируются мышцы лица.
- Скрежетание зубами (Hyos., Sulph., Tarent.) и прикусывание языка (Art-v., Cupr., Op.), кровавая пена изо рта.
- Непроизвольное мочеиспускание (Hyos., Zinc.).
- Непроизвольные дефекации во время судорог (Oena., Stry., Tarent.).
- Смех.
- Хрипы.
- Потливость во время судорог, особенно на спине и лице.
- Пульс становится все более частым и нитевидным по мере того, как спазмы становятся более частыми.
- Щелочное размягчение (Caust.).
- Храпящее дыхание с пыхтящим выдохом.
- Внезапные сильные судороги.
- Конечности холодеют, а голова и лицо становятся горячее, поскольку судороги случаются чаще.
- Тонические судороги.
- Головокружение (Cale., Hyos.).

- Смех.
- Громкий храп во сне.
- Анестезия между (Aug., Cic., Hell., Hyos., Oena., Op.) судорогами.
- Потеря сознания.

Модальности

- Судороги усиливаются ночью, особенно около полуночи (Cina, Zinc.), усиливаются после сна (Cupr., Lach., Op., Sil.), после гнева (Cale., Cham., Cupr., Nux-v., Op.), во время еды, от полового возбуждения, от сексуальных излишеств, во время потоотделения, перед менструацией и во время нее, от подавления менструаций, от страха (Cale., Hyos., Kali-br., Stram.), **от страха перед матерью, особенно когда она еще кормит ребенка грудью** (Cham., Nux-v., Op.), периодически, каждую неделю, в новолуние (Cupr., Kali-br., Sil.), от мастурбации (Cale., Lach., Plat.), после травм, от волнения, в теплом помещении, от прикосновения, **после удаления зуба**, при нагноении.

БУФО И HYOSCYAMUS ПРИ ЭПИЛЕПСИИ И СУДОРОГАХ

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ

- Ощущение ауры в желудке.
- Судороги усиливаются от волнения, страха, перед менструацией и во время нее, во время сна.
- Начинаются судороги в лице.
- Глубокий сон после судорог.
- Пена изо рта во время эпилептических припадков.
- Скрежет зубами во время эпилептического припадка.
- Непроизвольное мочеиспускание во время судорог.
- Petit mal: Частые приступы потери сознания.
- Беспокойство перед судорогами.
- Крики от судорог.
- Головокружение между судорогами.
- Головокружение во время эпилептических припадков.

ГИОСЦИАМУС

- Аура: проблемы со слухом, синюшное лицо, звон в ушах, проблемы со зрением, тяга к еде, искры перед глазами, головокружение.
- Судороги усиливаются в начале менструации.
- Судороги после бессонницы.
- Судороги после головокружения.
- Судороги глистов.
- Судороги с похолоданием тела.
- Судороги с параличом.
- Судороги с криками.

БУФО И КАЛЬЦИУМ КАРБОНИКУМ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ И СУДОРОГАХ

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ

- Аура из солнечного сплетения.
- Судороги усиливаются во время сна.

- Судороги усиливаются от страха.
- Судороги после гнева.
- В животе начинаются судороги.
- Судороги при падении.
- Эпилепсия из-за страха.

Кальций карбоникум

- Аура: дискомфорт при слухе, жевательные движения, учащенное сердцебиение, головные боли , тяга к еде, визуальный дискомфорт.
- Аура: Ощущение, будто по руке или ноге бежит мышь.
- Судороги после гнева.
- В руке начинаются судороги.
- Судороги во время прорезывания зубов.
- Судороги вследствие инсульта.
- Судороги при гидроцефалии.
- Головные боли после эпилептических припадков.
- Приступы тяги после эпилептических судорог.
- Растяжение конечностей перед судорогами.
- Головокружение после эпилептических припадков.
- Рвота после эпилептических припадков.

УКСУСНЫЙ КАЛЬЦИЙ

(Уксуснокислый известняк - Calc-acet.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Желудочно-кишечные и легочные жалобы.
- ▶ Бронхит с влажным, хриплым кашлем. Мокрота фибринозная и пленчатая. Затруднённое дыхание облегчается, если отвести плечи назад.
- ▶ Диарея во время прорезывания зубов. Часто обильная зелёная слизь из прямой кишки. Стул с кислым запахом и сильным зудом вокруг ануса.
- ▶ Основным симптомом является **диарея без слабости**.

БРОМИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ

(Бромистый кальций - Calc-br.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Толстый, блондин, раздражительный, беспокойный и тучный.
- ▶ Застенчивость.
- ▶ Увеличенные лимфатические узлы.
- ▶ Склонен к катару евстахиевой трубы.
- ▶ Потеря слуха вследствие катара евстахиевой трубы.
- ▶ Бессонница у детей, особенно в период прорезывания зубов.

КАЛЬЦИЙ КАРБОНИКУМ

(*Calcareo carbonica*, карбонат кальция из средней части раковины устрицы - *Cale.*)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети **не терпят насилия в какой-либо форме**; прячутся, когда другие дети дерутся; избегают грубых игр, таких как регби, футбол и хоккей; вместо этого они чувствуют себя комфортно, играя дома в такие игры, как карты, шахматы, Lego, Scrabble, Uno и т. д.; испытывают крайнее **отвращение к фильмам ужасов или военным фильмам**.
- ▶ Они **легко вздрагивают** от малейшего шума.
- ▶ **Ночные кошмары**: Ребенок просыпается ночью и видит в темноте **ужасные лица**.
- ▶ Плохо, когда над ними **издеваются** или **смеются**; тогда они часто отказываются от какой-либо деятельности, чтобы не давать другим возможности посмеяться над ними.
- ▶ **Боятся** темноты, не хочет спать один в комнате; позже ему достаточно небольшого света в спальне.
- ▶ **Медлительна** в учебе, **медлительна** в подвижных играх, **неуклюжа** в действиях.
- ▶ **Вялое** поведение; чувствую себя счастливым даже при запоре.
- ▶ Сильный страх перед стоматологом или педиатром, осмотрами и прививками.
- ▶ Внезапные плохие новости во время беременности благоприятствуют рождению ребенка с синдромом Calc.
- ▶ Очень расстраиваются, когда слышат о болезни других людей или известии о смерти и т. п.; могут также кричать или плакать без причины.
- ▶ Не по годам развитые, умные и трудолюбивые дети.
- ▶ Медленно говорит, часто долго думает, прежде чем ответить.
- ▶ Малыши почти всегда держат пальцы во рту; дети помладше любят играть с пальцами (ломать палочки, считать деньги).

Тело

- ▶ **Нехватка воздуха**, потребность в свежем воздухе, особенно в закрытых и плохо проветриваемых помещениях (пульс).
- ▶ **Холод** в различных частях тела, например, в животе, ступнях, голове, ногах.
- ▶ **Обильная потливость головы** во время сна (*Sanic.*, *Sil.*), а также стоп.
- ▶ **Скрофулезный диатез** (склонность к генерализованному увеличению лимфатических узлов, особенно шейных и брыжеечных).
- ▶ **Мягкие кости**, увеличенные эпифизы, открытые роднички, предрасположенность к рахиту.

- ▶ Светлые волосы, голубые глаза, светлая кожа, светлый тип, особенно у девочек, часто они растут слишком быстро.
- ▶ Ребенок не хочет ходить, постоянно требует, чтобы его носили родители или другие члены семьи, и может даже устраивать истерики, если ему в этом отказывают.
- ▶ Характерные признаки включают краниотабес, выпячивание лобной части черепа, макроцефалию у детей с рахитом, гидроцефалией, несовершенным остеогенезом или синдромом Элерса-Данлоса.
- ▶ Затрудненное и позднее прорезывание зубов.
- ▶ Дети, которые очень мерзнут, хотя им быстро становится жарко при малейшей физической нагрузке, например, беге, стоянии или игре.
- ▶ Быстрое головокружение; кинетоз и морская болезнь.
- ▶ Большая голова и большой живот.
- ▶ Новорожденный отказывается от молока. Ребёнок голоден и плачет, но отказывается сосать.
- ▶ Они часто выглядят подтянутыми и здоровыми, однако у них мало умственной и физической энергии.
- ▶ Чувствителен к сквознякам, особенно холодному и влажному воздуху.
- ▶ Склонность к ожирению с полным или коренастым телом, но при этом крайне слабый. При физикальном осмотре выявляется преобладание мягкого жира над мышечной массой. Слабые мышцы и сухожилия, легко подворачиваются лодыжки.
- ▶ Руки ребенка Calc. мягкие, гибкие (слабое сцепление) и слегка прохладные; но они не обязательно должны быть холодными и липкими.
- ▶ Триада ребенка типа Calc.: повышенная потливость, склонность к простудам, озноб.
- ▶ Триада признаков у младенца: красное лицо, дряблые мышцы, повышенная потливость.

Различие между CALC. и SIL.

Calc. и Sil. очень похожи, хотя более детальные исследования выявляют нижеследующие **различия**, которые четко отличают эти два препарата.

	СИЛИЦЕЯ	КАЛЬЦИЙ
Источник	Минеральное царство.	Животный и минеральный мир.
Миазматика	Более псорический.	Больше сифилитического.
конституция	Голова и брюшко непропорционально большие (как у Calc.), но тело маленькое и тощее (никогда не толстое и неуклюжее).	Большая голова, несоразмерная остальному телу, с общим ожирением ИЛИ абсолютным истощением с обвисшей кожей в складках, но с ненормально большим животом.

	СИЛИЦЕЯ	КАЛЬЦИЙ
холодный	Обычно мерзнут и легко промерзают; не могут согреться, несмотря на внешнее тепло и одеяла. Иногда бывают приливы, но даже тогда ребёнок не переносит даже малейшего раскрытия. Его необходимо тепло укутать, особенно голову и ноги.	Холод ощущается либо во всем теле, либо в отдельных его частях; обычно это внутренний холод или ощущение, как будто человек надел влажные чулки. Выраженные приливы с приливом крови к голове и груди и жжением в ступнях, из-за чего ребенок сбрасывает одеяло ночью (Sulph.).
запор	Не улучшается.	Ребенок чувствует себя лучше, когда страдает запором.
Судороги	Жалобы, связанные с подавленной потливостью ног и вакцинацией. Эпилептические припадки усиливаются во время новолуния.	Дискомфорт, вызванный испугом и подавленной экземой. Хотя состояние ребёнка обычно ухудшается в период новолуния, в случае эпилептических судорог это не так заметно.
нервная система	Повышенная возбудимость и повышенная чувствительность с беспокойством, несмотря на истощение и депрессию. Сил противопоставлен при вялости и нервных расстройствах.	Неуклюжесть, тупость и инертность становятся более заметными.
пот	Вся голова, включая волосистую часть головы, шею и лицо, покрыта зловонным потом. Болезненные и открытые раны на подошвах и пальцах ног из-за интенсивного потоотделения. Пот от ног имеет невыносимый, кислый, пахнущий запах.	Потоотделение ограничивается волосистой частью головы. На ногах нет ран и открытых участков кожи. Зловонный, кислый пот, но менее заметный, чем при применении Сила.
полипы	Не так уж и поразительно.	Склонность к образованию полипов (носовых, ушных,
нагноение	Стимулирует и ускоряет образование гноя. Инородные тела выводятся из организма посредством образования гноя.	Способствует рассасыванию гноя и, следовательно, также способствует образованию камней в различных органах.

Другие важные симптомы

Дух

- Дискомфорт из-за напряжения ожидания, **плохих новостей, смерти близких**, неудачи на экзаменах, испуга, грубости окружающих.
- **Страх за здоровье близких** (неуверенность из-за потери защиты).
- **Неуклюж** из-за **застенчивости**, особенно в присутствии других; роняет и ломает вещи.
- По своей природе **любопытен** и любознателен.
- **Увлечён кошками**.
- Легко пугается мелочей ; боится животных (особенно собак, крыс и насекомых), насмешек, темноты, зла, призраков, походов к стоматологу или врачу, высоких мест, ночи, дождя, теней и сумерек.
- **Упрямые** и злобные дети, которых нужно дисциплинировать; они устраивают истерики, катаются по полу, кричат и плюют в лица другим, когда злятся.
- **Не по годам развитые** дети.
- **Очень послушные** или абсолютно ленивые и безответственные дети, которые склонны откладывать все на следующий день.
- **Слабые знания геометрии** и простой **арифметики**.
- Нежный.
- Грызть ногти.
- Не могу выносить, когда на меня смотрят.
- Не могу слышать и видеть ничего ужасного или жестокого, даже по телевизору.
- Медленно учится говорить.
- Жажда компании, усиливается в одиночестве.
- Желание что-нибудь перекусить в течение дня.
- Бессмысленные действия.
- Хорошие навыки логического мышления.
- Считает, что видит призраков или пугающие лица в темноте или ночью в постели, что вызывает бессонницу из-за страха.
- Воображает, что другие все время наблюдают за ними и видят их замешательство.
- Нерешительные дети.
- Постоянно играет со своими руками и пальцами или часто кладет их или другие предметы в рот.
- Клептомания.
- Любит играть с Лего или в воде (Сульф.); не любит играть с мягкими плюшевыми мишками или пушистыми, пернатыми игрушками.
- Любовь к животным.
- Делает много ошибок при чтении, письме или разговоре; использует неправильные слова, искажает их или пишет с ошибками.
- Улучшается взвешивание.
- Чувствителен к критике и несправедливости.

- Чувствителен к малейшему замечанию или грубости окружающих.
- Воет и кричит от страха перед врачом или стоматологом.

Голова

- Обильное кислое потоотделение головы, особенно затылочной области и лба, **во время еды** и ночью **во время сна**.
- **Чувствителен к сквознякам.**
- Катаральные головные боли из-за заложенности носа.
- Периодические правосторонние головные боли у детей школьного возраста, при которых боль начинается в затылочной области и распространяется вверх; усиливается от перемены погоды, сквозняков, испуга, холодной сырой погоды, шока, света, умственной или физической нагрузки, мытья головы; облегчается от укутывания головы и холодных компрессов.
- Результаты теста:
 - Экзема у маленьких детей с влажными, толстыми чешуйками на коже головы.
 - Экзостозы на коже головы.
 - Импетиго.
 - Знак Кернига +.
 - Большая голова; гидроцефалия.
 - Менингит.
 - Седой дерматит у новорожденных.
 - Открытые и запавшие роднички.
 - Кисты скопления кожного сала на коже головы.

Глаза

- **Дальнозоркость.**
- Воспаление и болезненность глаз после травмы (Symph.).
- Слезы текут при выходе на ветер или свежий воздух.
- Утреннее склеивание век.
- Пустулезный кератоконъюнктивит у младенцев в холодную, сырую погоду, с желтоватыми, гнойными выделениями из глаз.
- Результаты теста:
 - Аккомодационная астенопия.
 - Блефарит с красными, затвердевшими ячменями по краям век.
 - Сходящееся косоглазие.
 - Свищ слезной железы.
 - Нагноение и образование стриктуры слезного протока.

Уши

- **Хронический средний отит с потерей слуха.**
- Катар евстахиевой трубы.
- Снижение слуха с рождения или после приема хинина.
- Ощущение ветра, выходящего из уха.
- Результаты теста:
 - Холестеатома.
 - Экзематозные высыпания с влажными выделениями за ушами.
 - Отверстие в передней части уха, образованное врожденной открытой пазухой (Merg.).

- Повышенное количество ушной серы.
- Перфорация барабанной перепонки (Tub.).
- Мягкие, слегка кровоточащие полипы в ухе.
- Средний отит с гнойным, густо-желтым и очень зловонным отделяемым.
- Увеличение лимфатических узлов перед ушами и за ними.
- Угрожающий кариес сосцевидного отростка.

Нос

- Хроническая заложенность носа из-за носовых полипов (Phos., Teuer.) или синусита; **заложенность носа ночью** (Lyc.) на той стороне, на которой лежит, или при пробуждении утром.
- Катар распространяется на лобные пазухи (Кали-и) и вызывает тяжесть в голове.
- Склонность постоянно сморкаться.
- Носовые кровотечения у маленьких детей темно-красной кровью, особенно из правой ноздри; носовые кровотечения по утрам (Agar., Ambr., Bry.).
- Зловонные выделения из носа.
- Отсутствие обоняния.
- Сонная простуда со скудными выделениями из носа (Stict.).
- Сильное, приступообразное чихание без насморка.
- Результаты теста:
 - Аденоиды.
 - Носовые полипы, которые имеют тенденцию легко кровоточить.
 - Ретроназальный катар.
 - Кончик носа красный, блестящий и бугристый.

Лицо

- **Потливость лица во время еды и сна.**
- Результаты теста:
 - Розовые угри.
 - Испуганное выражение лица ребенка, которого вынимают из колыбели.
 - Трещина посередине нижней губы.
 - Зеленовато-желтые, корковые, шелушащиеся высыпания на лице.
 - Твердое и болезненное уплотнение околоушных желез (особенно справа), подъязычных и подчелюстных желез (Arum-t., Aur., Bar-c., Sil.).
 - Импетиго (Ant-c., Graph., Lyc.).
 - Повышенный рост волос на лице (у молодых девушек).
 - Бледное, болезненное, восковое лицо с синюшными кругами вокруг глаз (Подбородок, Kali-i., See.) и потрескавшимися губами.
 - Отек верхней губы по утрам (Apis, Bell.).

Рот

- Когда вы простудились, еда кажется вам безвкусной.
- Молоко кислое на вкус.
- Рецидивирующее нагноение и образование абсцессов на деснах.

- Зубы болезненно чувствительны к сквознякам, а также к любому холоду или теплу, особенно к холодной воде.
- Зубная боль после употребления спиртного, особенно колы (Ant-c., Staph.); зубная боль распространяется на уши, глаза, челюсть, нос или виски; с опуханием щеки с той же стороны; с повышенным слюноотделением.
- Результаты теста:
 - Ребенок постоянно стискивает зубы.
 - Ребенок постоянно тянет пальцы в рот.
 - Пена у рта.
 - Десны опухли и отслоились от зубов; легко кровоточат.
 - Неприятный запах изо рта.
 - Географический язык с отпечатками зубов, с белым налетом (Ant-c., Bry., Merc.).
 - Спит с открытым ртом.
 - Воспаление полости рта затрудняет сосание у младенца.

ШЕЯ

- **Боль из левой миндалины отдает в уши** (Bell., Nep., Kali-bi.).
- **Боль в горле от малейшего изменения погоды**, особенно от воздействия холода или сырости.
- Хронический фарингит.
- Слизь вытягивается из задней части носовой полости.
- Результаты теста:
 - Шейные лимфатические узлы увеличены и болезненны.
 - Удлиненный язычок.
 - Миндалины увеличены, особенно слева.

ЖЕЛУДОК

- **Наслаждайтесь завтраком**; пропуск завтрака может вызвать приступ мигрени в течение нескольких часов.
- **Рвота с кислым, зловонным запахом** непереваренной пищей или свернувшимся молоком после кормления грудью, еды или питья; хуже ночью, во время прорезывания зубов и при кашле.
- **Общее отвращение к мясу.**
- **Слабое пищеварение**; желудок легко расстраивается от **молока или хлеба**.
- Повышенный голод или тяга к еде перед началом болезни или перед болью (Phos., Psor.), например, перед эпилепсией, перед головной болью, во время лихорадки и т. д.
- Сильная, жгучая, неутолимая жажда с желанием пить небольшое количество воды, особенно ночью.
- Кинетоз: тошнота и рвота во время путешествия на самолете, корабле, автобусе или автомобиле.
- Тошнота по утрам (Nux-v., Puls.) и при виде пищи, но аппетит постепенно усиливается после нескольких укусов или возникает волчий голод вскоре после еды из-за ощущения пустоты в желудке.
- Рвота глистами.

- Отвращение: **кофе**, слизистая пища (натуральная пища), горячая пища.
- Пристрастия: **яйца (вкрутую или всмятку)**, мучное, мороженое, **трудноперевариваемые продукты**, молоко, оливки, выпечка, **сырой картофель**, сахар и сладости.

ЖИВОТ

- **Непереносимость лактозы:** слышимое бульканье и урчание в животе с метеоризмом и коликами в области пупка, особенно после употребления молока.
- Область живота чувствительна к давлению, даже со стороны одежды, из-за чрезмерного скопления газов.
- Спазмы в животе ниже пупка у младенцев и маленьких детей после кормления; ребенок корчится от боли.
- Вздутие живота, сопровождающееся тимпанитом, облегчающееся после отхождения газов.
- Результаты теста:
 - Вялый, вздутый живот при истощенном теле и конечностях, как при маразме.
 - Живот похож на перевернутую тарелку.
 - Увеличенные печень и селезенка.
 - Выделение кровянистой жидкости из пупка (Abrot., Calc-p.).
 - Ультразвуковая картина: увеличенные брыжеечные лимфатические узлы.
 - Пупочная грыжа.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Безболезненная диарея после употребления искусственных детских смесей (у детей, находящихся на грудном вскармливании), холодных напитков, фруктов, молока, сладостей или сахара; **во время прорезывания зубов** (особенно **сразу после кормления**); в летние месяцы.
- Запор: стул остается в прямой кишке в течение длительного времени без позывов; для удаления стула требуется механическое вмешательство (sei, sep, sil).
- У метеоризма очень кислый запах.
- Гастрознтерит у детей с зеленоватым, водянистым стулом.
- Кровотечение из заднего прохода во время дефекации (полипы прямой кишки).
- Непроизвольный пенистый стул при выделении газов или мочи.
- Сначала стул твердый, затем кашицеобразный и, наконец, нормальный стул.
- Стул: светло-желтый, молочно-белый, похожий на глину или мел, с кислым запахом.
- Жалобы на гельминтозы, сопровождающиеся зудом в области ануса у детей, больных маразмом.
- Результаты теста:
 - Зловонный пот в области ануса и промежности с болезненностью кожи.
 - Выпадение прямой кишки с жидким стулом.
 - Анализ кала: аскариды, острицы и членики ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Частое мочеиспускание при простуде.
- Частые позывы к мочеиспусканию.
- Учащенное мочеиспускание; за один раз выделяется всего несколько капель.
- Нефротический синдром.
- Резко пахнущая, очень кислая, аммиачная моча у маленьких детей.
- Результаты теста:
 - М. Эддисон.
 - Ювенильный диабет.

- Моча: Альбумин +, эритроциты ++, повышен удельный вес, сахар.
- Белый или темно-красный песчаный осадок в подгузнике.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Ранняя и чрезмерная склонность к мастурбации.
- Гидроцеле.
- Воспаление крайней плоти.
- Результаты теста:
 - Пот на мошонке.
 - Фимоз.
 - Препубический крипторхизм.
 - Неопущение яичка, особенно левого.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Обильные, обильные, молочные бели у слабых и анемичных маленьких девочек, с невыносимым зудом, особенно ночью в постели.
- Склонность к мастурбации.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Постоянное прочищение горла.
- Круп с хрипами в гортани в положении лежа.
- Безболезненная охриплость голоса по утрам, усиливающаяся от разговора.

ДЫХАНИЕ

- Астма при вождении с открытыми окнами и против ветра; лучше отвести плечи назад.
- Астматическое дыхание вследствие подавленной атопической экземы или крапивницы ИЛИ астмы, чередующейся с экземой.
- Частые глубокие вдохи.
- Свистящее дыхание в положении лёжа.
- Результаты теста:
 - Горячее дыхание.
 - Хриплое дыхание из-за скопления слизи в груди при выдохе, особенно в положении лежа.

КАШЕЛЬ

- Жалобы, вызванные: холодным воздухом, холодными напитками, прорезыванием зубов, приемом пищи и ветряной оспой.
- Кашель: короткий, но всегда несколько кашлевых приступов подряд; лучше с отхождением мокроты.
- Мокрота: обильная по утрам; гнойная, зеленоватая, кровянистая; с неприятным запахом; с солёным или кислым привкусом.
- Сильные, короткие и частые приступы кашля.

ГРУДЬ

- **Поздняя пневмония** у младенцев с грязным языком.
- Результаты теста:
 - **Пальпируемые, уплотненные подмышечные лимфатические узлы после вакцинации БЦЖ.**

- **Рикетотические четки** (выпячивания реберных хрящей).
- Шумы в сердце.
- Рентгенограмма грудной клетки: Первичный комплекс +.
- Цианоз.
- Гипертрофия сердца вследствие врожденного порока сердца.

Назад

- Результат теста:
 - Кифоз, особенно в области спины.

КОНЕЧНОСТИ

- Хроническое воспаление суставов с отеком; ухудшается в сырую погоду.
- Пальцы легко устают во время письма.
- Склонность к растяжениям.
- Результаты теста:
 - Genu valgum.
 - Genu varum.
 - Ломкие ногти.
 - Холодные, влажные ноги.
 - Coxa vara.
 - Потливость рук.
 - Бородавки.

Спать

- Во время сна: скрежет зубов, стоны, открытый рот, потливость головы, крики, разговоры, обнажение ног, плач.
- Просыпается в 3 часа ночи.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Дискомфорт, вызванный: игрой в холодной воде.
- Мороз:
 - Холодность отдельных частей тела.
 - Расширенные зрачки, сонливость, вялость, раздражительность, потливость лба, беспокойство, плач, жажда.
 - Хуже вечером.
- Нагревать:
 - Локальное покраснение лица, слезотечение, потливость, отсутствие жажды, белый налет на языке и горький привкус во рту.
 - Жар ощущается особенно в голове, конечности холодные.
 - Склонность обнажать тело в жару, особенно ноги.
- Пот:
 - Горячий пот.
 - Никакой жажды.

КОЖА

- самые незначительные повреждения кожи или царапины могут вызвать нагноение, например, из-за ношения слишком тесной обуви или падения на колено во время игры.
- Кожа на бедрах становится слегка болезненной.
- Образование толстых корок при нейродермите в результате засохшего секрета.

Судороги

- Судороги, вызванные эмоциональными причинами, такими как страх, **испуг**, унижение, гнев и ярость; **при гидроцефалии**; при прорезывании зубов; при **инфекциях центральной нервной системы**, таких как менингит и энцефалит; при кашле; **усиливаются в определенные фазы Луны**.
- Постиктальная (сразу после припадка) потеря памяти.
- Крики перед судорогами и во время них.

Общий

- **Задержка развития:** костная ткань развивается очень медленно, но кости остаются хрупкими. Деформация костей — распространённое явление.
- **Резкая потеря веса** при большом животе и хорошем аппетите.
- Общая **повышенная кислотность:** кислый запах выделений, таких как пот, диарея, рвота; кислый привкус во рту.
- Даже при сидении в жарком помещении кожа кажется влажной, но нижние конечности холодные.
- Бледный, слабый и легко утомляемый.

КАЛЬЦИЙ ЕДКИЙ

(Известковое молоко - Calc-caust.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Апатичные, вялые и тучные дети.
- ▶ Туберкулез в семейном или личном анамнезе.
- ▶ Катар евстахиевой трубы и потеря слуха вследствие хронического среднего отита.
- ▶ Охриплость голоса при простуде.
- ▶ Высокая восприимчивость к **заражению глистами**; ненасытный аппетит, желание есть огромными порциями каждые несколько часов.

КАЛЬЦИЙ ГИПОФОСФОРИКУМ

(Фосфат кальция - Calc-hp.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Поспешная речь.
- ▶ Очень быстро приходит в ярость.
- ▶ Худые, истощенные и рахитичные дети.
- ▶ Важный **противотуберкулезный препарат** из группы кальция.
- ▶ Первичный комплекс абдоминального туберкулеза у детей.
- ▶ Множество случаев туберкулеза в анамнезе.
- ▶ Хронический средний отит с персистирующим катаром евстахиевой трубы, приводящим к потере слуха.
- ▶ Требует молока и обычно чувствует себя лучше от него.
- ▶ Постоянный голод с ненасытным аппетитом.
- ▶ Склонность к рецидивирующим фурункулам и абсцессам на любом участке тела, но особенно вблизи суставов.
- ▶ Кожа нарывает при малейшем повреждении.

МОЛОЧНЫЙ КАЛЬЦИЙ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Скрофулезный диатез.
- ▶ Туберкулез в семейном анамнезе или в анамнезе самого пациента.
- ▶ Кальц. конституция с катаром евстахиевой трубы.
- ▶ Анемия у счастливых детей с избыточным весом и кальциевой конституцией.
- ▶ Сильное отвращение к молоку.
- ▶ Положение сна преимущественно на животе.

КАЛЬЦИЙ МУРИАТИКУМ

(Хлорид кальция - Calc-m.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Во многих случаях, когда назначается Calc, на самом деле требуется Calc-m. (А. Пулфорд).
- ▶ Чувствителен к критике.
- ▶ Застенчивый и раздражительный.
- ▶ Зависимость от мнения других.
- ▶ В своей практике я часто находил подтверждение идеи Яна Шолтена относительно этого средства: «Страх, что другие могут заметить, что им требуется много заботы и внимания».

Тело

- ▶ Преобладающий туберкулезный миазм.
- ▶ Обильное холодное потоотделение.
- ▶ Левосторонние жалобы.
- ▶ Толстые дети.
- ▶ Склонность к рецидивирующим гнойным абсцессам и фурункулам на различных участках тела.
- ▶ Хронический средний отит с катаром евстахиевой трубы.
- ▶ Импетиго (Ant-c.).
- ▶ Спите на животе.

Другие важные симптомы

Дух

- Зависимость от родителей во взрослом возрасте.
- Грусть в пасмурную погоду.
- Тревога разлуки, особенно при входе в новое помещение, например, школу или спортивный клуб.
- Застенчивость, смущение.

Голова

- Головная боль при простуде.
- Результаты теста:
 - **Опоясывающий лишай головы.**
 - Пустулы на голове.

Глаза

- Результат теста:
 - Абсцесс роговицы.

Нос

- Водянистые выделения из носа.

Лицо

- Результаты теста:
 - Воспаление или хроническое увеличение околоушных и подчелюстных желез.
 - Чувствительность придаточных пазух носа.

Шея

- Результат теста:
 - Хроническое увеличение шейных лимфатических узлов.

Желудок

- Тошнота при поездке на поезде или автомобиле.
- Постоянная рвота любой пищей и питьем.
- Рвота без приема пищи.
- Пристрастия: Шоколад и сладости.

Живот

- Желтуха.
- Результат теста:
 - Печень увеличена и болезненна.

Мочевыводящих путей

- Результат теста:
 - Ацетонурия.

Грудь

- Результаты теста:
 - Плеврит с выпотом.
 - Чувствительность области сердца.

Спать

- Спит на животе или правом боку.

Кожа

- Диабетические фурункулы.
- Облегчает боль и отек при фурункулах.
- Результаты теста:
 - Экзема у маленьких детей.
 - Свищи с язвами кожи.

Общий

- **Опухшие железы:** это средство снимает отеки и уплотнения, а затем они исчезают.
- **Повышенное выделение слизи, пота и мочи.**
- Ребенок чувствует себя хуже в теплую, влажную погоду, предпочитает свежий воздух.

КАЛЬЦИЙ ФОСФОРИКУМ

(Фосфат кальция - Кальций-п.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети, чьи родители незрелые, безответственные или асоциальные, злоупотребляют психоактивными веществами, страдают от финансовых трудностей или семейных проблем, отвергают своих детей или демонстрируют низкую стрессоустойчивость. Родители-одиночки также, безусловно, могут способствовать развитию синдрома Calc-p.
- ▶ Умственная нагрузка в течение длительного времени для них затруднена из-за ухудшения памяти.
- ▶ Ассимиляция и расстройства пищевого поведения из-за недостатка материнской любви.
- ▶ Непроизвольные вздохи у детей указывают на то, что родитель находится в большом горе (Игн.).
- ▶ Не по годам развитые дети.
- ▶ Сильное желание путешествовать и ходить в походы. Ребёнок всегда готов к поездке на машине, даже в полночь.
- ▶ Сосание пальца, обычно от скуки.

Тело

- ▶ Анемичный; темная кожа, темные волосы, темные глаза; хрупкий, долговязый, худой; впалый, дряблый живот; длинный и тонкий, как китайская лапша.
- ▶ Хронический амебиаз, болезнь Крона, фиброзно-кистозные заболевания, муковисцидоз, язвенный колит; дети, мать которых пережила разочарование в любви (Aug., Ph-ac.), другое горе (Ign.) или подвергалась избиениям или сексуальному насилию во время беременности.
- ▶ Нарушения роста при синдромах дефицита, таких как квашиоркор, маразм и дефицит белка, алиментарная карликовость.
- ▶ Проблемы с прорезыванием зубов.
- ▶ Потеря веса из-за физических заболеваний, таких как диарея, инфекции, первичный туберкулезный комплекс, мальабсорбция, глистные инвазии, лямблиоз, амебиаз.
- ▶ Пациенты с чрезвычайно низкой температурой.
- ▶ Предрасположенность к состояниям мальабсорбции, таким как целиакия, непереносимость глютена или глютенная энтеропатия, особенно в раннем детстве.
- ▶ Наследственные и приобретенные заболевания мышц; ребенок вялый и выглядит «вялым младенцем», например, в случаях доброкачественной врожденной мышечной дистрофии (ДВМД), болезни Верднига-Гоффмана, детской спинальной прогрессирующей мышечной атрофии, миастении гравис, детского церебрального паралича и синдрома Дауна.

- ▶ Кишечные паразиты из-за плохой гигиены или загрязненной воды, пищи или окружающей среды.
- ▶ Дискомфорт в левой части груди; ребенок также предпочитает пить из левой груди (Лус.: правая грудь).
- ▶ Из пупка младенца сочится кровянистая жидкость (Abrot., Lyc., Nux-m. - подтекание мочи через открытый мочевого проток: Hyos.)
- ▶ Скрофулёзный и туберкулёзный диатез.
- ▶ Сильное желание мороженого и холодных напитков, которые обычно плохо переносятся.
- ▶ Предрасположенность к хрупкости, мягкости, тонкости и слабости костей; боли роста, рахит, позднее заживление швов, медленное заживление костей после переломов, неполное окостенение, кифоз и сколиоз — все это явные признаки Calc-p.

сравнивайте **Calc.** и **Ph-ac.** с этим средством, поскольку симптомы схожи. **Calc-p.** получают путём добавления разбавленной фосфорной кислоты в известковую воду.

Другие важные симптомы

Дух

- Жалобы на **сексуальное или физическое насилие**.
- Становится тревожным и нервным, испытывает **необоснованное чувство вины**, когда на другого ребенка в классе кричат или делают ему выговор (Nat-m., Staph.).
- Постоянно **грызет ногти** или кладет пальцы в рот.
- **Желание, чтобы его постоянно носили на себе** (Cina, Cham.).
- Задержка развития.
- Очень бдительные младенцы и дети, которые внимательно следят за каждым движением врача (Carc., Phos.).
- Лень и спутанность сознания, вызванные чрезмерным обучением, чтением или умственным напряжением.
- Дети с дислексией.
- Крайне боится щекотки (Кали-ч.).
- Страх кур, темноты и грозы.
- Непроизвольный вздох (Игн.).
- Любит животных.
- Любит играть в воде, с куклами или в «Скрэббл».
- Любит носить розовую или фиолетовую одежду.
- Делает много ошибок в письменной и устной речи, например, использует неправильные слова или повторяет слова.
- Чувствует себя более комфортно и ближе с незнакомыми людьми, чем с членами семьи (Лас-с.).
- Застенчивые и неуверенные в себе школьники.
- Чувствителен к критике и мнению окружающих.
- Резкий и оскорбительный.

- Страх сцены.
- Плачет, когда его ругают.

Голова

- Голова **чувствительна к сквознякам.**
- Головные боли у школьников или мигрень в пубертатном периоде; от **просмотра телевизора** ; особенно в области затылочного бугра, над глазами, **вдоль швов**; хуже от перемены погоды, холодной погоды, **еды**, умственной или физической нагрузки, с запором; лучше от холодных компрессов ; сопровождается **метеоризмом и диспепсией.**
- Результаты теста:
 - **Гидроцефалия.**
 - Очаговая алопеция волосистой части головы.
 - Ребенок не может держать голову прямо.
 - Роднички, которые остаются открытыми или попеременно закрываются и открываются снова.
 - Импетиго и экзематозные высыпания на волосистой части головы.
 - Большая голова.
 - Потеет голова (но не так сильно, как при применении Calc. или Sil.).
 - Тонкие и хрупкие кости черепа.

Глаза

- Светобоязнь с болью в глазах при чтении при искусственном освещении.
- Результаты теста:
 - Выпуклые глаза.
 - Длинные, тонкие ресницы.
 - Косоглазие.
 - Пот на веках и бровях.

Уши

- Боль в ухе усиливается **ночью**, на холодном воздухе, в холодную или сырую погоду , а также от **попадания воды в ухо во время плавания.**
- Снижение слуха из-за увеличенных миндалин.
- Результаты теста:
 - Катар, захватывающий евстахиеву трубу.
 - Воспаление каменистой части височной кости.
 - Полипы уха.
 - Чувствительность к прикосновению в ушах.

Нос

- Насморк с водянистыми выделениями и повышенным слюноотделением, хуже в **холодном, кондиционированном помещении** или на холодном воздухе; лучше в **теплом помещении.**
- **Любая простуда оседает в миндалинах.**
- Простуда распространяется на лобные пазухи.
- Носовые кровотечения при сморкании, особенно во второй половине дня.
- Заложенность носа в теплом помещении.
- Края ноздрей болят из-за постоянного сморкания.

- Результаты теста:

- Увеличенные аденоиды.
- Кончик носа ледяной.
- Полипы, которые легко кровоточат.

Лицо

- Холодный пот на лице во время сна, особенно вокруг глаз.
- Боль в челюстных костях и гайморовых пазухах; усиливается от холода и сквозняков; облегчается от тепла.
- Результаты теста:
 - **Отек верхней губы.**
 - Лицо землистого, грязного цвета, с синюшными кругами вокруг глаз и болезненным выражением.
 - Опухание и нагноение околоушных и подчелюстных желез.
 - Восковое лицо.
 - Морщинистый лоб.

РОТ

- Хлеб и вода имеют горький вкус.
- Жжение и жар на кончике языка, особенно при лихорадке.
- Неприятный привкус во рту при пробуждении утром.
- Повышенное слюноотделение при простуде.
- Медленное и затрудненное прорезывание зубов.
- Зубы легко крошатся.
- Результаты теста:
 - Дети постоянно тянут пальцы в рот.
 - Белый налет и трещины на языке.
 - Ранний и быстро распространяющийся кариес.

ШЕЯ

- Частое покашливание и прочищение горла во время разговора.
- Сухость в горле из-за кашля.
- Болезненные и грубые ощущения в горле при глотании.
- Боль в горле с насморком и болью, отдающей в уши, при пробуждении утром.
- Результаты теста:
 - Увеличенный и красный язычок.
 - Увеличенные лимфатические фолликулы (Bar-c., Bar-i., Calc., Calc-i., Sulph.).

ЖЕЛУДОК

- Гипертрофия небных миндалин.
- Опухание и затвердение шейных желез.
- Видимая пульсация сонных артерий.

ЖЕЛУДОК

- Дискомфорт в желудке у детей школьного возраста, проявляющийся болью, отрыжкой и легкой рвотой после употребления холодных напитков, фруктов, **мороженого** или молока.
- **Легкая и постоянная рвота грудным молоком у новорожденных и младенцев.**

- **Младенец постоянно хочет, чтобы его кормили.**
- **Пристрастия к еде во второй половине дня**, особенно около 16:00, когда ребенок приходит из школы.
- Изжога и кислотный рефлюкс после еды.
- Детское несварение желудка.
- Громкая отрыжка облегчает колики у малышей.
- Кинетоз с невыносимой тошнотой при вождении в автомобилях и автобусах.
- Плохое пищеварение; каждый кусочек причиняет боль желудку.
- Обострение: пахта, кофе, холодные напитки, замороженные продукты, фрукты, мороженое и сливки.
- Не любит: рыбу, **грудное молоко**, грибы и сладкое.
- Пристрастия: **Бекон** (особенно жир на беконе), тосты, бургеры, сыр, курица, китайская еда, кофе, холодные напитки, **хрустящая или жареная пища**, яйца, выпечка, жир с ветчины, рыба, топленое масло (вид масла, изготавливаемый из молока буйволицы), хот-доги, мороженое, неперевариваемые продукты (известь, сланец, земля, мел, глина и т. д.), **мясо** (соленое или **копченое**), **макароны, пицца**, свинина, **картофель** (чипсы, картофель фри, вафли), сырая пища, освежающие продукты, салатами, соль, сосиски, моллюски, копчености, специи, шпинат, сладости, сладкие вафли.

живот

- Спазматические, щемящие боли у детей школьного возраста после употребления **холодных напитков**, фруктов, **мороженого** или молока, с позывами на дефекацию; лучше после отхождения газов или стула.
- Метеоризм с тимпаническим вздутием живота.
- Результаты теста:
 - Жар в животе с лихорадкой.
 - Выделение кровянистой жидкости из пупка у новорожденных.
 - Дряблый живот (у Кальк. живот увеличен).
 - Втянутый пупок.
 - Увеличение паховых и брыжеечных желез.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея: Горячий, водянистый, прерывистый, непереваренный, слизистый стул с очень неприятным запахом; у истощенных, ослабленных детей; после малейшей неосторожности во время еды, особенно после холодных напитков, фруктов или мороженого; после любого **эмоционального возбуждения** (гнев, страх, горе и т. д.) или во время прорезывания зубов.
- **Выпадение прямой кишки** во время дефекации.
- Детская холера с зеленым водянистым стулом.
- Диарея, чередующаяся с кожной сыпью.
- Кровотечение из заднего прохода во время и после дефекации.
- Выделение большого количества зловонных газов во время дефекации, особенно во время диареи.
- Тенезмы в прямой кишке во время стула, особенно в холодную погоду; лучше после стула.
- Результат теста:
 - Из прямой кишки просачивается влага.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- М. Эддисон.
- Обильное выделение мочи в сочетании с сильным истощением.
- Моча темного цвета с очень резким запахом.
- Частое мочеиспускание в холодную или сырую погоду.
- Брызги струи.
- Результат теста:
 - Моча: гной ++, эритроциты +, осадок (фосфаты), повышенный удельный вес, сахар ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Повышенное половое влечение у детей со склонностью к мастурбации, с частыми эрекциями.
- Результат теста:
 - Препубический крипторхизм.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Обильные белковые или кремообразные, умеренные, зловонные бели у молодых девушек.
- Задержка развития вторичных половых признаков.
- Задержка первой менструации у девочек низкого роста.
- Повышенное сексуальное влечение с частой тенденцией к мастурбации у молодых девушек.

ДЫХАНИЕ

- **Одышка у младенцев, когда их берут на руки или вынимают из кроватки (Вогх.).**
- Астма, сопровождающаяся анемией.
- Необходимо часто делать глубокие вдохи.
- Периодическая одышка с кашлем при вставании по утрам, лучше в положении лежа.
- Результаты теста:
 - Горячее дыхание.
 - Гипервентиляция.
 - Хриплое дыхание.
 - Дыхание вздохов.

КАШЕЛЬ

- Кашель уменьшается в положении лежа, усиливается в холодную погоду.
- Кашель с лихорадкой после холодных напитков.
- Сухой, отрывистый кашель днем и ночью, но усиливается по утрам (в 6–7 часов утра) и в сырую погоду.
- Кашель со щекотанием по вечерам.
- Желтоватая мокрота по утрам.

ГРУДЬ

- Результаты теста:
 - Тощая грудь.
 - Рикетотические четки.

Назад

- Спазмы в спине.
- Скованность шейного отдела из-за сквозняков.
- Результаты теста:
 - Искривление позвоночника.
 - Туберкулез позвоночника.
 - Расщелина позвоночника.

Конечности

- Блуждающая ревматическая боль в плечевых, коленных и пальцевых суставах; усиливается от воздействия холода или перемены погоды; уменьшается от теплых компрессов.
- Сокращение сухожилий и мышц задней части колена и подколенного сухожилия при беге; устраняется при продолжительной ходьбе.
- Дрожание рук при головной боли и рвоте.
- Верхние конечности чувствительны к холоду.
- Слабость и судороги в лодыжках и икрах при беге.
- Результаты теста:
 - Холодные руки, особенно пальцы.
 - Врожденный вывих бедра.
 - Искалеченные конечности после полиомиелита.
 - Искривленные и согнутые конечности.
 - Экзостоз большеберцовой кости.
 - Переломы.
 - Беспокойные ноги.

Кости и суставы

- Врожденная соха vara.
- Дисплазия тазобедренного сустава.
- Экзостоз.
- Боли роста (Conch., Mag-met.).
- Ювенильный ревматоидный артрит (обычно хорошо помогает Рута).
- Кифоз и кифосколиоз.
- Большая голова из-за задержки закрытия родничка, как при гидроцефалии (цинк часто является компонентом) или инфантильной церебромакулярной дегенерации (синдром Тея-Сакса).
- Болезнь Пертеса-Кальве-Легга.
- Боль по ходу швов и симфизов.
- Боль в голени.
- Ревматоидный артрит.
- Медленное или замедленное сращение переломов (симф. следует хорошо) и родничков.
- Мягкие, тонкие кости.
- Гнойный артрит, вызванный *H. influenzae*, стрептококком и пневмококком.
- Травматический артрит.
- Травматический подвывих головки лучевой кости (из-за натяжения на локтевом суставе).
- Туберкулезный артрит.
- Дефицит витамина D при рахите (следует отметить как Sil.).

СПАТЬ

- Ребенка трудно разбудить утром.
- Во время сна: потливость головы (волосатая голова); беспокойное ворочание.
- Положение для сна: на коленях или на животе, уткнувшись лицом в подушку.

КОЖА

- Атопическая экзема; состояние ухудшается в холодную, влажную погоду и улучшается в тёплую, сухую погоду. Горячая ванна облегчает зуд и раздражение кожи.
- Зуд и жжение кожи, напоминающие крапивницу, усиливающиеся после еды.
- Крапивница после холодного купания.
- Результаты теста:
 - Экзема.
 - Импетиго.
 - Восковой вид кожи.

СУДОРОГИ

- Жалобы: После еды, **во время прорезывания зубов**.
- Во время судорог: цианоз, падение вперед, тетаническая ригидность, слабость, потеря сознания.
- Судороги сильнее на левой стороне тела.

ОБЩИЙ

- Хуже на холодном воздухе или ветру, в холодную погоду, на сквозняках, на свежем воздухе, во время таяния снега, в сырую погоду и т. д. Лучше летом.
- **Хрупкие, слабые, болезненные** дети или малыши с проблемами костей и значительной потерей веса, несмотря на сильный голод.
- Жалобы в период выздоровления.
- Жалобы, вызванные изменением погоды или температуры, в период полового созревания, из-за мастурбации, потери жидкости, после приема препаратов железа.
- Анемия вследствие нарушений питания, характеризующаяся холодными конечностями и слабым пищеварением.
- Хрупкие кости,
- Кретинизм.
- Карликовость с задержкой или остановкой развития, особенно костей.
- Увеличенные железы на истощенном теле.
- В анамнезе тонзиллит или желудочно-кишечные расстройства.
- Юношеский диабет, сопровождающийся тягой к еде.
- Усталость после еды.
- Поздно учится ходить, наблюдается задержка развития костей.
- Мышечная дистрофия.
- Склонность к простудам.
- Склонность к рецидивирующему абсцессу и образованию свищей, особенно в области суставов.

КАЛЬЦИЙ ПИКРИКУМ

(Пикрат кальция - Calc-pic.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Туберкулезный агент.
- ▶ Склонность к рецидивирующим фурункулам. Они образуются там, где кожа плотно прилегает к кости, например , на наружном ухе.
- ▶ Угри с пустулами.

СИЛИКАТ КАЛЬЦИЯ

(Силикат кальция - Calc-sil.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Отношения с сильной потребностью в **защите и безопасности**; чувство неуверенности провоцирует депрессию.
- ▶ **Зависимость** от других людей, родителей, друзей, братьев и сестер; отсутствие смелости быть независимым; **трусость**.
- ▶ **Эндогенная депрессия** у подростков.
- ▶ слишком **послушны** и слишком **мягки**, которым трудно постоять за себя в семье и обществе.
- ▶ Ленивый и **пассивный**.
- ▶ Несмотря на свой **интеллект**, он не способен рационально расходовать энергию при выполнении серьезных задач.

Тело

- ▶ Симптомы проявляются после **отлучения от груди**: ребенок отказывается от молочной смеси и не усваивает ее.
- ▶ **Потеря веса** у детей, которым не помог Сил.
- ▶ Все усугубляется **перегревом**, например, при использовании слишком большого количества одеял, ношении слишком теплой одежды, сне в плохо проветриваемых помещениях и т. д.
- ▶ **Повышенная чувствительность** к боли, переменам погоды, эмоциям.
- ▶ **Слабый, худой и зябкий**. Очень чувствителен к холоду, но хуже при перегреве.
- ▶ Гидрогеноидная конституция; ухудшение в сырую, холодную погоду (Nat-s).
- ▶ Усталость от малейшего усилия.
- ▶ Отвращение к свежему воздуху.
- ▶ Туберкулезный диатез; часто туберкулез в семье и в анамнезе.

Другие важные симптомы

Дух

- **Застенчивые дети**.
- **Сильное чувство семьи**, даже чрезмерная обеспокоенность здоровьем членов семьи.
- **Сильное чувство долга и морали**; очень сознательный ребенок.
- Жалобы посредством шока и увещевания.

- Напряжение ожидания.
- Ребенок требует многого, но быстро устает и истощается.
- Ребенку нравятся игры на составление слов, например, «Скрэббл», но он не любит играть на открытом воздухе.
- Спутанность сознания при пробуждении утром и от умственного напряжения.
- Космополит, как и Таб; любит путешествовать.
- Опыт дежавю и ясновидение.
- Дислексик.
- Страх провалить экзамены, высоты, ночи.
- Чувствует себя виноватым без причины.
- Легко пугается мелочей.
- Ненавидит любые виды умственной или физической нагрузки, поскольку, по его мнению, они ухудшают симптомы.
- Непроизвольный плач или бормотание при пробуждении от сна.
- Низкая самооценка.
- Делает много ошибок при письме и разговоре.

Голова

- **Ночная потливость затылка.**
- Головные боли при простуде.
- Периодические, сильные головные боли от холода в целом (холодный воздух, холодная, сырая погода, от переохлаждения, употребления холодных напитков и т. д.), шума, наклона; лучше в положении стоя или лежа.
- Результаты теста:
 - **Макушка головы холодная.**
 - Гидроцефалия.
 - Пустулезные или шелушащиеся экзематозные высыпания на коже головы.

Глаза

- Разрывание при простуде или воздействии холодного воздуха.
- Результаты теста:
 - Помутнение роговицы.
 - Гиперметропия (дальнозоркость).
 - Покраснение внутренних уголков глаз.
 - Желтовато-зеленые, густые выделения из глаз, приводящие к образованию спаек.

Уши

- Результаты теста:
 - Повышенное количество ушной серы.
 - Желтовато-зеленая, густая, гнойная, с примесью крови, зловонная оторрея.

Нос

- **Любая простуда приводит к синуситу.**
- Ярко-красное кровотечение из носа при сморкании.
- Сенная лихорадка с водянистым насморком на открытом воздухе и при пробуждении по утрам.

- Результаты теста:
 - **Ретроназальный катар.**
 - Полипы носа.
 - Желтовато-зеленые, гнойные, зловонные выделения из носа, которые при высыхании образуют твердые корки и чешуйки.

Лицо

- **Склонность к образованию прыщей на участках кожи с небольшим количеством жировой ткани, таких как подбородок, нос или лоб.**
- Розацеа, которая ухудшается из-за запоров.
- Локальное покраснение лица с головной болью.
- Результаты теста:
 - Трещины на нижней губе.
 - Выраженная потливость лица.
 - Старческое выражение лица.
 - Увеличение околоушных и подчелюстных желез.

РОТ

- Обильное слюнотечение.
- Зубная боль в пораженных кариесом зубах, усиливающаяся при жевании и употреблении холодной пищи; облегчающаяся от теплых напитков или пищи, а также от местного наружного применения тепла.
- Результаты теста:
 - Неприятный запах изо рта.
 - Отек и кровоточивость десен.

ШЕЯ

- Хронический фарингит.
- Боль, словно от занозы в горле, при глотании или кашле.
- Густая слизь в горле.
- Результаты теста:
 - Зоб.
 - Опухшие, затвердевшие шейные железы.
 - Горло красное, язычок опухший, миндалины воспалены.

ЖЕЛУДОК

- **Сильная, неутолимая жажда.**
- Тошнота с кислой отрыжкой или отрыжка во время или после еды.
- Боль в желудке после холодных напитков, при кашле, после прогулки на свежем воздухе.
- Медленное пищеварение.
- Обострение: жареная пища, брокколи, **холодные напитки, холодная пища и холодное молоко**, жир.
- Отвращения: **брокколи**, цветная капуста, сыр, мясо, грудное молоко, соленая пища, сладости.
- Пристрастия: к жареной или запеченной в духовке пище, пахте, яйцам, фруктам, молоку, **пицце**, соли, кислым продуктам, сладостям, **овощам, острой пище.**

ЖИВОТ

- Тимпаническое вздутие живота («барабанный живот») после кормления грудью.
- Боль и болезненность в правой верхней части живота.
- Результат теста:
 - Печень увеличена и плотная при пальпации.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запор с безуспешными позывами, даже усиленные потуги не помогают.
- В стуле содержатся непереваренные частицы пищи.
- Безболезненный понос с неприятным запахом.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ночное недержание мочи.
- Результат теста:
 - Моча: Лейкоциты +, Эритроциты +, Сахар +.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Зловонный пот в области мошонки.
- Результат теста:
 - Эмпиоцеле и гидроцеле.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Из гортани откашливается обильная зеленоватая слизь.
- Раздражение и першение в гортани и трахее.
- Безболезненная охриплость голоса.

ДЫХАНИЕ

- **Хроническая аллергия**, вызванная **домашней пылью и пылевыми клещами**.
- Склонность к **рецидивирующему астматическому бронхиту**.
- Астма усиливается на холодном воздухе.
- Одышка с кашлем в положении лежа.
- Результаты теста:
 - Хриплое дыхание.
 - Дыхание вздохов.

КАШЕЛЬ

- **Сухой спазматический кашель, усиливающийся утром при пробуждении, от холодных напитков, холодного воздуха, в положении лежа и при разговоре.**
- Гнойная, вонючая, густая, желтая мокрота.

ГРУДЬ

- Результаты теста:
 - Пустулы в подмышечной впадине.
 - Пот на груди.
 - Рентген: пневмония.

Назад

- Скованность шейного отдела, усиливающаяся в холодную погоду.
- Результат теста:
 - Холодный пот, особенно на шее.

Конечности

- Холодные конечности, крайне чувствительные к малейшему сквозняку.
- Холодный пот на ладонях, с холодными кончиками пальцев.
- Слабость тазобедренного сустава.
- Холодный, вонючий пот ног.
- Болезненные мозоли.
- Результаты теста:
 - Большие бородавки на руках и больших пальцах.
 - Трещины на руках и пальцах.
 - Паронихия.
 - Твердые или ломкие ногти.

Спать

- Спать может только на животе.
- Сонливость после еды.
- Легко вздрагивает во сне.
- Ночные кошмары, сны о больных или умерших людях, видит трупы или смерть близких родственников.
- Беспокойство в постели; постоянная смена положения.
- Крики во сне.

Кожа

- Склонность к стафилококковым инфекциям кожи.
- Глубокие, болезненные язвы с жидкими, зеленовато-желтыми, зловонными выделениями.
- Горячий, кислый и вонючий пот.
- Зуд кожи без сыпи; приходится расчесывать до появления ссадин, что ухудшает состояние; лучше от местного применения тепла.
- Результаты теста:
 - Гусиная плоть.
 - Опрелость.
 - Желтушность кожи.
 - Псориаз.
 - Кисты, задерживающие салоотделение.
 - Витилиго.
 - Бородавки.

Общий

- Характерное **ухудшение состояния вечером и ночью**.
- Жалобы, связанные с изменением погоды, полнолунием, подавленным потоотделением, зимой, вакцинацией.

- Отвращение к купанию.
- Выделения из слизистых оболочек, сыпей, нарывов, язв густые, желтоватые, гнойные.
- Затвердение желез.
- Рецидивирующее образование абсцессов с выделением желтовато-зеленого гноя.
- Высокие, худые, слабые, истощенные дети с хрупким телосложением и - склонностью к анемии; ухудшение состояния от малейшей умственной или физической нагрузки.
- Очень зябкий; легко простужается; состояние ухудшается от малейшего воздействия холода, ветра или сквозняка, а также от перемены погоды.

КАПСИКУМ

(Кайенский перец - Капсулы.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Дискомфорт, вызванный переездом, сменой школы или эмиграцией;** изменениями в распорядке дня, в первые дни в школе, усыновлением и т. д.; ребенок склонен к **тоске по дому**.
- ▶ **Чрезвычайно чувствительные и деликатные дети,** легко обижаются, обладают чувством юмора, не переносят критики.
- ▶ **Тоска по дому приводит к булимии** (оральной фиксации), диарее, лихорадке, расстройству желудка, перепадам настроения и бессоннице.
- ▶ **Неуклюжий,** очень удобный и **ленивый** (Витулкас), ненавидит уроки физкультуры и любые виды физических упражнений.
- ▶ Страх критики.
- ▶ Любит все откладывать.
- ▶ Дети, которые чувствуют себя нелюбимыми и обделенными вниманием из-за постоянного покровительства или чрезмерной строгости родителей.
- ▶ Неуверенные в себе дети, родители которых могут быть алкоголиками или наркоманами.
- ▶ Они крайне неохотно выходят на улицу и развлекаются с детьми своего возраста. Они предпочитают всё время оставаться дома. Такая домоседская позиция отчасти проистекает из их лени, а отчасти — из их уязвимости, когда кто-то шутит или смеётся над ними.
- ▶ Сильно ностальгирует, любит жить прошлым; например, школьник - часто становится внезапно капризным и навязчиво занят приятными или неприятными мыслями о прошлом.
- ▶ Крайняя забывчивость. Ребёнок идёт за покупками и оставляет покупки в магазине. Нарушение памяти, особенно словесной. Невнимательность. Очень часто ребёнок возвращается из магазина, не взяв с собой то, что должен был купить.
- ▶ Вялый и медлительный в учебе в школе.
- ▶ Ребёнок отвергает любые изменения привычного распорядка и любит регулярный режим. Переход из одной кровати в другую, смена мебели или одежды, а также смена воспитателей могут иметь серьезные последствия.

Тело

- ▶ Грязные, неряшливые дети.
- ▶ Пухлые и питанные дети, не обладающие выносливостью.
- ▶ Чувствителен к сквознякам.
- ▶ Склонность к избыточному весу.

Другие важные симптомы

Дух

- Амбициозный ребенок, строит много планов, но слишком ленив, чтобы их осуществить.
- Капризный ребенок; отвергает любимые игрушки и игры.
- Неуклюжий и неловкий, лишенный элегантности.
- Легко чувствует себя заброшенным и нелюбимым.
- Спонтанное желание целовать всех.
- Легко пугается, особенно при лихорадке и во время сна.
- Хотя обычно они ленивы и бездеятельны, они могут быть безрассудными, как сорвиголова (Дидье Гранджордж).

Голова

- Чувствителен к сквознякам.

Глаза

- Зуд в глазах при простуде.
- Разрывающая боль при кашле.
- Результат теста:
 - Сужение зрачков при потоотделении.

Уши

- **Склонность к образованию абсцессов за ухом, под ухом и на сосцевидном отростке.**
- Боль в ухе при кашле или на холодном воздухе.
- Капы являются методом выбора, если ребенок просыпается ночью из-за боли в ухе, кричит от боли и испытывает повышенную чувствительность в области сосцевидного отростка.
- Снижение слуха.
- Выделения из уха агрессивные, гнойные, густые, желтоватого цвета.
- Сильная боль в ухе, особенно в правом. Холодные сквозняки усиливают боль, а всякий раз, когда я кашляю, мне кажется, что ухо вот-вот лопнет.
- Результаты теста:
 - **Сосцевидный отросток и наружное ухо чувствительны к прикосновению.**
 - отит .
 - Перфорация барабанной перепонки.
 - **Полость среднего уха заполнена густым желтым гноем.**
 - Рентгенограмма сосцевидного отростка: гипоцеллюлярная эрозия кости, плохая вентиляция воздухоносных ячеек сосцевидного отростка, признаки склероза с участками просветления и образованием полостей.

Нос

- Хронический ринит с густыми, липкими выделениями.
- Насморк – обильный, слизистый, липкий и густой. Сильный зуд в носу, частое, сильное чихание.
- После кашля приходится чихать.

- Результаты теста:
 - Холодный нос с горячим кончиком.
 - Ретроназальный катар +.
 - Покраснение.

Лицо

- **Ярко-красный** цвет лица возникает при астме, простуде, кашле, лихорадке, тоске по дому, боли, во время еды и дефекации.
- Результаты теста:
 - Акне.
 - Холодный на ощупь.
 - Выражение лица: изможденное и страдающее.
 - Красные щеки.

РОТ

- **Плохая гигиена полости рта.**
- Слюна липкая и зловонная.
- Результаты теста:
 - Афтозные язвы.
 - Зеленоватая окраска языка.
 - Гингивит.
 - Десны отделяются от зубов.
 - Вонючее дыхание.
 - Губчатые, цинготные десны.

ШЕЯ

- Боль и раздражение в горле **усиливаются, когда ребенок не глотает.**
- Боль в горле с очень высокой температурой, покраснением лица и жаждой холодных напитков.
- Результаты теста:
 - Удлиненный язычок.
 - Увеличенные шейные железы.
 - Покраснение глотки с воспалением миндалин.

ЖЕЛУДОК

- Расстройство желудка после употребления жирной или кислой пищи.
- Жажда небольшого количества воды, особенно после дефекации.
- Обострение: кофе, соль и овощи.
- Пристрастия: к кофе, холодным напиткам, ледяной воде, жидкостям, перцу, горячей и острой пище.

ЖИВОТ

- Колики после овощей.
- Результаты теста:
 - Дряблый живот (Calc., Kali-bi.).
 - Паховая грыжа.
 - Селезенка болезненна при пальпации.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Амебная и бактериальная дизентерия.
- Понос **после холодного питья** (Ars.) и от **сквозняков** (Acon., Nux-v., Sil.), особенно в животе.
- Частый, скудный стул с кровью и слизью.
- Стул жирный, зеленый и горячий при дефекации.
- Хуже после дефекации.
- Результат теста:
 - Стул: Жирный ++.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ночное недержание мочи.
- Моча молочного цвета.
- Результат теста:
 - Нефрит +.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результат теста:
 - Холодность мошонки.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Охриплость голоса из-за чрезмерного использования.

ДЫХАНИЕ

- Астма облегчается в положении сидя, усиливается после еды.
- Хроническая астма.
- Результаты теста:
 - Дребезжащие шумы ++.
 - Дыхание: вздохи, храп и хрипы.

КАШЕЛЬ

- Лающий и взрывной кашель; хуже от гнева и вечером.
- Кашель начинается, как только голова касается подушки.
- Сильный кашель; неприятный запах изо рта при каждом приступе кашля.
- Результат теста:
 - Холодность кончиков пальцев.

СПАТЬ

- Чрезмерная сонливость после каждого приема пищи (Agar., Кальк.).
- Положение во время сна: сидя.
- Бессонница из-за тоски по дому и кашля.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - В холодную погоду ребенок становится раздражительным, хочет, чтобы его оставили в покое, проявляет непереносимость шума.

- Повышенное слюноотделение с чрезмерным скоплением слизи во рту и горле.
- Ребенок знает, что приближается заморозок, потому что его мучает жажда; с каждым глотком озноб усиливается.
- Сильный мороз сзади.
- Нагревать:
 - Холодность кончиков пальцев.
 - Никакой жажды.
- Пот:
 - Зрачки имеют тенденцию сужаться во время стадии потоотделения при лихорадке.

Общий

- Склонность к простудам; **ухудшение от холодного воздуха** и употребления холодной пищи.
- Чрезвычайно чувствительны к звуку и прикосновению.
- Склонность к образованию гангрены, некроза или изъязвления пораженных частей.

Сравните **Calc.** и **Graph** с Caps.

Источник

- Capsicum annuum из семейства пасленовых (Solanaceae)

КАРЦИНОЗИНУМ

(Раковый нозод - Carc.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **ответственности**, может развиваться карцинома (Aug.), что может затормозить его обучение.
- ▶ **Эмоционально подавленные** дети, родители которых ведут себя по отношению к ним как Гитлер или Сталин.
- ▶ **Увлечён чтением книг**, мало интересуется спортом и играми.
- ▶ **Чрезмерная опека и гиперопека** родителей или опекунов может **подавлять развитие личности ребёнка** и тем самым провоцировать канцерогенное состояние. **Чрезмерно строгие и амбициозные** родители также могут провоцировать канцерогенное состояние.
- ▶ **Увлечённые и амбициозные** дети, которые хотят добиться многого в жизни.
- ▶ **Не по годам развитые** дети; они разговаривают и ведут себя как взрослые; очень хорошие наблюдатели, очень заинтересованные и любопытные.
- ▶ **Любит всех животных**; относится к ним как к членам семьи: гладит их, обнимает и разговаривает с ними (очень похоже на Аэту).

Тело

- ▶ Моргание или **странные тики**, такие как постукивание пальцами по голове, покусывание ногтей и кожи вокруг них.
- ▶ Клинически полезен в качестве паллиативного средства при многих врожденных **пороках развития**, таких как синдром кошачьего крика, синдром Дауна (трисомия 21), синдром Эдвардса (трисомия 18), синдром Халлермана-Штрайфа, синдром Патау (трисомия 13), синдром Сильвера-Рассела и синдром Тернера.
- ▶ В анамнезе **рецидивирующие инфекции**, такие как бронхит, гастроэнтерит, малярия, корь, мононуклеоз, свинка, пневмония, синусит и тонзиллит.
- ▶ Конституция: голубые склеры, кожа цвета «кофе с молоком», темные круги вокруг глаз, землистый оттенок лица; часто обе брови срastaются посередине; круглые и другие родинки и невусы.
- ▶ Это средство часто оказывается полезным, когда явно показанные средства, такие как Calc-p., Dys-co., Лус., Med., Nat-m., Sep., Sulph., Syph. или Tub., не обеспечивают длительного облегчения.
- ▶ Мальабсорбция или непереносимость глютена.

Другие важные симптомы

Дух

- Недуги от оскорблений, **унижений, наказаний, выговоров , упреков или презрения** ; смерти близких; **страха доминирования родителей**; тоски по дому; от физического или сексуального насилия или длительного, неразрешенного и молчаливого горя (неспособность плакать).
- **Тестовая тревожность** (предвкушение); страх сцены.
- **Застенчивые и робкие** дети, даже по отношению к другим детям в классе.
- **Ясновидящий.**
- **Добросовестные** дети с развитым чувством ответственности.
- **Педантичные дети, одержимые чистотой.**
- **Обсессивно-компульсивное расстройство:** каждая вещь должна иметь свое место, постоянное мытье рук, постоянная проверка мелких деталей и т. д.
- **Сильная привязанность к членам семьи и друзьям;** страх, если кто-то в семье заболеет.
- Дети, любящие приключения.
- Сострадательные дети (Phos.), которым нравится проявлять и получать ласку в форме объятий, ласки и покачивания.
- Гнев, шок и негодование после жестокого оскорбления; от гнева у него возникает одышка.
- Замедленное развитие.
- Булимия или нервная анорексия у подростков.
- Не могу слышать или видеть проявления насилия или жестокости, даже по телевизору, особенно по отношению к животным.
- Веселый и счастливый, когда гремит гром и сверкает молния, или когда он находится на свежем воздухе или на берегу моря.
- Ребёнок не любит мягкие, пушистые игрушки и плюшевых мишек.
- Ребенок постоянно все трогает в поликлинике.
- Общительные дети, стремящиеся к общению, которое улучшает их жизнь.
- Непослушные дети, которые устраивают истерики (бунт против власти), ведут себя очень грубо и оскорбительно по отношению к семье, портят игрушки и другие предметы и не терпят противоречий.
- Дети с дислексией и низкой уверенностью в себе; чувствуют, что они не успевают в школе; не могут сосредоточиться.
- Страх животных (кошек, собак, насекомых, мышей, змей, пауков и т. д.), порицаний или наказания, людных или открытых мест, темноты и зла (особенно ночью), провала на экзамене; страх высоты.
- Чувствует себя заброшенным и покинутым; считает себя неполноценным (физически и умственно); чувствует, что с ним несправедливо обошлись.
- Прилагает много усилий, чтобы угодить другим, чтобы они имели о нем хорошее мнение.
- Гиперактивные, беспокойные дети с чрезмерной энергией.
- Нерешителен в мелочах; очень растерян, даже при принятии простых решений.

- Любит слушать музыку и хорошо танцует, обладает хорошим чувством ритма, что улучшает большинство психических симптомов.
- Внешняя кротость скрывает внутреннюю жестокость.
- Соперничество между братьями и сестрами.
- Малейшее замечание ухудшает ситуацию, даже если оно высказано мягко и доброжелательно.
- Большая любовь к природе, танцам, музыке, путешествиям и морскому воздуху.

Голова

- Односторонняя головная боль; сильнее всего с правой стороны, вследствие сотрясения мозга или травмы головы при рождении; лучше от рвоты.
- Результаты теста:
 - весы.
 - Преждевременное поседение волос.

Глаза

- Затуманенное зрение с головными болями.
- Результаты теста:
 - **Голубые склеры**, особенно у детей, страдающих фенилкетонурией или поздним несовершенным остеогенезом.
 - **Длинные ресницы.**
 - **Подергивание** левого верхнего века.
 - Ячмень на верхнем веке.

Уши

- Результат теста:
 - Пустулы за ушами, которые постоянно меняют сторону.

Нос

- Хронические и постоянные носовые кровотечения.
- Насморк на сухом, холодном воздухе.
- Частые приступы сенной лихорадки с астматическим дыханием.
- Заложенность носа по утрам после пробуждения и при входе с холода в теплое помещение.
- Боль в корне носа с головной болью.
- Периодическое чихание, особенно вечером.
- Результат теста:
 - Аденоиды.

Лицо

- Результаты теста:
 - Синеватые губы с трещинами посередине верхней губы.
 - Коричневые, землистые пятна на лице.
 - Веснушки.
 - Жирное или сальное лицо с прыщами на подбородке и лбу.

РОТ

- Гингивит с отеком и кровотечением из-за малейшего давления или при чистке десен и зубов.
- Результаты теста:
 - **Заикание.**
 - Афтозные язвы и болячки, особенно по краям языка.
 - Неприятный запах изо рта.
 - Сосочки на кончике языка отсутствуют.
 - Ранний кариес у детей младшего возраста.

ШЕЯ

- Боль в горле от любого вида тепла, облегчающаяся от холодных напитков или пищи.
- Боль в горле по утрам.
- Результаты теста:
 - Хронически увеличенные миндалины.
 - Затвердевшие железы.

ЖЕЛУДОК

- Рвота желчью и зеленым цветом, вызванная головной болью и такими эмоциями, как грусть или гнев.
- Аппетит капризный и изменчивый.
- Расстройство желудка с изжогой и вздутием живота после еды, лучше после отрыжки.
- Кинетоз с постоянной тошнотой при поездке в автомобиле или автобусе.
- Боль в желудке при кашле или употреблении теплых напитков.
- Жажда большого количества воды, особенно в дождливую погоду.
- Обострение: Холодное молоко, яйца, жирная пища, фрукты, мороженое, мясо, лук, обильная пища, сладости.
- Улучшение: Теплые напитки.
- Отвращения: хлеб с маслом, яйца, жирное мясо, мороженое, картофель, соль, суп, сладости, овощи.
- Пристрастия: бекон, **хлеб с маслом**, сыр, **шоколад**, кола, холодная еда и напитки, холодное молоко, сливки, сладости, яйца, жирная пища или тесто, рыба, картофель фри, фрукты, чеснок, ветчина, мороженое, газировка, выпечка, перец, соленые огурцы, **картофель** (даже сырой), **сырой лук**, соль, копченое или жареное мясо, суп, специи, сахар, сладости, кетчуп, уксус, горячие напитки и йогурт.

ЖИВОТ

- Спазматические и щемящие боли в животе, особенно в области пупка, с запором; лучше в положении сидя, наклонившись вперед, и от питья теплых жидкостей.
- Результаты теста:
 - Увеличенная печень.
 - Паховая грыжа.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запор с тщетными позывами и усилиями.
- Диарея у маленьких детей с коричневато-зеленым стулом.
- Результаты теста:
 - Выпадение прямой кишки.
 - Стул: Черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ночной энурез.
- Рефрактерный нефротический синдром, не поддающийся лечению стероидами.
- Результат теста:
 - Моча: Альбумин +, Зернистые цилиндры ++, Эритроциты +, Сахар +.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Охриплость голоса.
- Щекотание в дыхательных путях, усиливающееся в теплом помещении.

ДЫХАНИЕ

- Астма, чередующаяся с сыпью.
- Астма от шока или волнения, после вакцинации, в сырую погоду; лучше на море и в положении лежа на коленях под грудью.
- Одышка во время бега.
- Результат теста:
 - Вздохообразное дыхание.

КАШЕЛЬ

- Короткий кашель от першения в горле; **после вакцинации** или перемены погоды, усиливается ночью или при пробуждении утром, на холодном воздухе, во время еды, разговора или смеха, а также от раскрывания.
- Кровянистая мокрота.

ГРУДЬ

- Давление в груди с желанием глубоко дышать.
- Пневмония или бронхит у детей с ослабленным иммунитетом.
- Обильный, вонючий пот под мышками.
- Результат теста:
 - Прыщи или бородавки на груди.

КОНЕЧНОСТИ

- Обильный, холодный, вонючий пот на ступнях и ладонях.
- Результаты теста:
 - Аномальный рост волос на верхних конечностях.
 - Экзематозные или псориатические высыпания на суставах.
 - Ледяные пальцы рук и ног; не выносит даже малейшего дуновения воздуха.
 - Ногти: деформированные и чахлые, с заусенцами.
 - Бородавки на ладонях и ступнях.

СПАТЬ

- Необъяснимая бессонница у младенцев, которых необходимо постоянно укачивать.
- Бессонница у умных детей, бодрствование которых нарушается чрезмерной умственной деятельностью (Сирг.).
- Спит в коленно-грудном положении или на животе, руки над головой.
- Во время сна: скрежет зубов; брыкание; обильное потоотделение; крики во время кошмаров с потоотделением; разговоры.
- Бессонница из-за волнения или предвкушения.

КОЖА

- Сладострастный зуд кожи без сыпи; усиливается при раздевании или обнажении пораженных частей тела.
- Результаты теста:
 - Атопическая экзема с выделениями, имеющими неприятный запах.
 - Чрезмерный рост волос на конечностях и лице.
 - Темные родинки.
 - Веснушки.
 - Келоиды.
 - Контагиозный моллюск.
 - Небольшие, мягкие, мясистые бородавки.
 - Паучьи невусы.

ОБЩИЙ

- **Раковые заболевания с кахектическим истощением.**
- У ребенка имеется **явный семейный анамнез** алкоголизма, анемии, рака, диабета, лейкемии, самоубийств или туберкулеза.
- Пернициозная анемия.
- Жалобы в период выздоровления после гриппа или коклюша.
- Угнетение костного мозга.
- Хрупкие кости.
- Зябкость; склонность к простудам; хуже от холодных сквозняков, но лучше на свежем воздухе.
- Коллагеновые заболевания.
- Судороги после вакцинации.
- Карликовость с задержкой развития.
- Эозинофилия.
- Ювенильный диабет с туберкулезом.
- Повторяющиеся острые симптомы.
- Хуже от купания в море, но лучше от пребывания на морском воздухе (сред.).

БОБРОВАЯ СТРУЯ КАНАДСКАЯ

(Канадский кастореум - Cast.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Легко раздражается и нервничает; начинает грызть ногти.
- ▶ Боится несчастных случаев и чрезвычайно чувствителен к внешним впечатлениям.
- ▶ Расстройства центральной нервной системы или жалобы на желудочно-кишечный тракт.
- ▶ Колики с сильными спазматическими болями в животе, облегчающиеся от теплых компрессов и скручиваний.
- ▶ Живот сильно вздут из-за выраженного метеоризма.
- ▶ Летняя диарея у детей с частым, зеленоватым, слизистым и водянистым стулом.
- ▶ Сон прерывался ужасными сновидениями.
- ▶ Хорея после каждого эмоционального возбуждения.
- ▶ Эпилепсия, вызванная сильными эмоциями.

Источник

- Выделения из железистых мешочков бобра.

КАУСТИКУМ

(Tinctura acris sine Kali - Caust Ганемана.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Очень рано у ребенка формируется идеалистическое представление о лучшем мире, и он хочет бороться за благое дело, например, за охрану природы или защиту животных, помощь пострадавшим от землетрясений и т. д.
- ▶ Неуклюжие дети, особенно неуклюжие во время подвижных игр.
- ▶ Крайне педантичные и аккуратные дети; похожи на Ars. и Carc.
- ▶ Эти дети могут казаться лидерами или даже диктаторами, но внешность обманчива; их поведение проистекает из крайней уязвимости и глубоких страхов. Они ведут себя властно или диктаторски, чтобы контролировать свои иррациональные страхи, например :
 - Страх мелочей.
 - Страх перед другими.
 - Тревожный страх.
 - Бред, видит призраков.
 - Страх говорить с другими.
 - Страх темноты.
 - Страх надвигающейся опасности.
 - Страх неудачи.
 - Страх незнакомцев.
 - Страх, что что-то случится.
 - Страх, ужас.
- ▶ Медленно прогрессирующий паралич эмоциональных и умственных способностей вследствие горя и депрессии у детей, которые долгое время страдали от горя и с которыми несправедливо обращались семья или религиозные власти.
- ▶ Очень чувствительны к любым эмоциональным потрясениям. Эти дети часто плачут, когда думают, что их матери или другому ребёнку причиняют боль. Они испытывают психологическую и эмоциональную боль сильнее, чем физическое насилие.
- ▶ Чувствительные к власти, они не терпят несправедливости.
- ▶ Они — прирождённые лидеры, которые легко мотивируют других детей своего возраста. Они часто доминируют над своими братьями и сёстрами, ведя себя так, будто точно знают, что лучше для их младшего брата или сестры.
- ▶ После жестокого обращения (избиений или сексуального насилия) или после смерти родителя или другого горя у них может развиваться хорея или непроизвольные мышечные спазмы.
- ▶ Ребенок-кауст часто хорошо переносит собственную боль, но не может видеть, как другие дети плачут или страдают.

- ▶ Они склонны испытывать сильное чувство вины, как будто совершили тяжкое преступление (сильное чувство морали).

Тело

- ▶ Атрофия вследствие недоедания, мальабсорбции или хронических инфекций (цитомегаловирус, краснуха, ВИЧ, кишечная палочка, золотистый стафилококк).
- ▶ У детей часто появляются многочисленные бородавки по всему телу.
- ▶ Врожденное укорочение сухожилий и мышц, особенно *подколенных сухожилий, вследствие чего ребенку трудно сидеть, скрестив ноги* .
- ▶ Темные волосы, темные глаза; бледно-желтоватый цвет кожи; нежная и чувствительная.
- ▶ Задержка прорезывания зубов из-за дефицита белка, рахита или гипотиреоза.
- ▶ Ревматизм, ревматоидный артрит или боли роста, особенно в шее, лодыжках, стопах и голени.

Другие важные симптомы

Дух

- **С любовью.**
- **Неуклюжий**, роняет вещи.
- Не могу выносить сцены **насилия** или что-то пугающее или ужасное по телевизору.
- **Не терпит несправедливости**; очень сильные **моральные принципы** и врожденное чувство правильного и неправильного.
- **Дислексия**; допускает много ошибок при письме и разговоре; использует неправильные слова, произносит неправильно или искажает слова, путает буквы и т. д.
- Повышенная **чувствительность к прикосновениям** из-за сильной **щекотки**.
- **Страх собак**,
- **Ревность** к неодушевленным предметам (таким как игрушки, одежда и т. д.).
- Любит **путешествовать**.
- **Бунтующие дети** , дерзкие, грубые и очень непослушные; не терпят противоречий.
- Жалобы, вызванные ожиданием, общим физическим или сексуальным - насилием, смертью близких (родителей или близких друзей), эмоциональным возбуждением, шоком и горем.
- Мужество и отвага, любит принимать вызовы.
- Капризный.
- Необъяснимый плач у младенцев, особенно ночью.
- Добросовестный.
- Тупость при ответе; приходится повторять вопрос.
- Легко смеется или плачет по мелочам.

- Чрезмерно сострадателен ко всем окружающим его людям [Nit-ac., Phos. (в то время как Nit-ac. и Caust. иногда имеют корыстные мотивы или сострадательны условно, Phos. очень искренен, и его сострадание не имеет скрытых мотивов)].
- Критически настроенные дети, которых нелегко удовлетворить.
- Страх, что семью постигнет несчастье или кто-то заболеет.
- Впечатляющий.
- Клептомания.
- Люблю кого-то воспитывать.
- Любит танцевать, что улучшает ситуацию.
- Любовь к животным.
- Жалобы по мелочам.
- Нервозность и беспокойство приводят к диарее.
- Не особо увлекается музыкой, но не возражает, если другие люди играют музыку.
- Покраснение лица при испуге.
- Бессонница и беспокойство всю ночь из-за страха темноты.
- Медленно учится ходить, писать или говорить.
- Подозрительные дети неохотно доверяют своим друзьям и окружающим.
- Склонность грызть ногти.
- Застенчивые, тревожные и стыдливые дети, тихие по своей натуре.
- Слабость в математике, алгебре, геометрии, арифметике.

Голова

- Головная боль в сухую, холодную погоду, с тошнотой и рвотой; усиливается ночью, на холодном воздухе или от напряжения глаз; **облегчается от местного тепла.**
- Выпадение волос после горя.
- Результаты теста:
 - Судорожные **подергивания или вращения** головы.
 - **Повышенная потливость** кожи головы.
 - Корковая, шелушащаяся экзема или импетиго на затылке.
 - Жирные волосы.
 - Гидроцефалия.
 - Стригущий лишай на голове .
 - Опухолевидная припухлость на коже головы.

Глаза

- Ребенку трудно держать глаза открытыми, **он судорожно зажмуривает их.**
- Аккомодационная астиопия.
- Болезненные разрывы.
- Жжение в глазах, словно от песка или инородного тела.
- Невозможно держать верхние веки поднятыми, они почти парализованы.
- Постоянное желание тереть глаза.
- Ухудшение зрения после кори.
- Вырываемся наружу.
- Подергивание левого верхнего века.

- Слабость зрения, усиливающаяся при напряжении глаз (подготовке к экзамену, игре в видео- или компьютерные игры).
- Результаты теста:
 - Птоз.
 - Врожденная катаракта.
 - Расширенные зрачки.
 - Дальнозоркость.
 - Непроизвольное моргание глаз.
 - Паралич наружных мышц глаза.
 - Вращательные движения глазами.
 - Косоглазие.
 - Ячмень над левым верхним веком.
 - Отек хряща века
 - Мерцание из-за светочувствительности.
 - Желтоватые, гнойные выделения из глаз, склеивание век по утрам.

уши

- Уши очень чувствительны к **сквознякам**.
- Хронический гнойный средний отит с неприятно пахнущей желтоватой отореей.
- Боль в ухе при сморкании, особенно в правом ухе.
- Звон в ушах во время прорезывания зубов.
- Результаты теста:
 - Евстахиев катар.
 - Полипы в ушах.
 - Волдыри или прыщи за ушами, из которых сочатся водянистые выделения.
 - Ушная сера ++.

Нос

- Ребенок **постоянно ковыряет или трёт** нос.
- Насморк при ларингите.
- Носовое кровотечение при сморкании по утрам.
- При глотании жидкость вытекает из носа (паралич небного нёба).
- Ночная заложенность носа в положении лежа.
- Приступы чихания по утрам при вставании.
- Желтовато-зеленые, болезненные, зловонные выделения из носа.
- Результаты теста:
 - Образование корок в задних носовых полостях.
 - полипы.
 - Ретроназальный катар.
 - Красный, воспаленный кончик носа.
 - Бородавки на кончике носа.

Лицо

- Склонность к вывиху височно-нижнечелюстного сустава.

- Правосторонний паралич лицевого нерва , вызванный воздействием холода (например, занятия спортом или плавание в море), ездой на ветру, воздействием сырости или подавлением сыпи на лице; улучшение при растирании пораженной части тела.
- Результаты теста:
 - **Бородавки на губах.**
 - Розовые угри на лбу и носу.
 - Жевательные движения челюстей.
 - Корки или шелушащаяся сыпь на кончике носа.
 - Искажение лица при разговоре.

РОТ

- **Прикусывание внутренней части щек** во время разговора или жевания.
- **Заикание речи** из-за **волнения** или гнева.
- Абсолютная сухость рта и языка, но жажды нет.
- Затрудненное прорезывание зубов.
- Результаты теста:
 - **Посередине** языка проходит красная полоса, а по краям — белый налет.
 - Выступающие сосочки на языке с болезненными пузырьками на кончике и по бокам языка.
 - Паралич некоторых мышц языка, из-за чего его трудно высовывать.
 - Пораженные цингой десны легко кровоточат и отделяются от зубов. - Молочница.

ШЕЯ

- Постоянные бесплодные позывы **к кашлю**.
- Проглоченные жидкости вдавливаются в нос.
- Першение, саднение и боль в горле из-за кашля.
- Липкую, густую, белую слизь из горла приходится глотать.
- Результаты теста:
 - **Кривошея**; голова повернута в правую сторону.
 - Пустулы на наружной поверхности шеи.
 - Темно-красный суппозиторий.

ЖЕЛУДОК

- Быстро поражаемый желудок, как будто желудок все отторгает (Hahne mann).
- Частые перебои в работе.
- Сильная жажда холодной воды после каждого приема пищи.
- Повышенный аппетит с тошнотой сразу после кормления.
- Расстройство пищеварения с отрыжкой, жжением в сердце, тошнотой, кислой рвотой, болью; хуже после хлеба, мучной пищи, жира, сахара; лучше от холодных напитков.
- Ухудшение: кофе, мучное, жирное и обильное, фрукты, мясо, свинина, телятина, горячая пища и напитки.

- Улучшение: Холодная еда и напитки.
- Отвращения: кофе, деликатесы, фрукты, горячие напитки, бамя, **сладости**, овощи, уксус.
- Пристрастия: **бекон**, сыр, холодные напитки, яйца, рыба, свинина, горячая и острая пища, прохладительные напитки, соль, **копчености** (курица, баранина), йогурт.

ЖИВОТ

- **Сжимающие боли в животе и спазмы у детей младшего возраста и младенцев; вынуждены наклоняться вперед, усиливаются по утрам, уменьшаются от местного тепла и отхождения газов.**
- Колики у детей младшего возраста, напоминающие колики; облегчаются при наклоне вперед.
- Болезненное вздутие живота со скоплением газов и твердым стулом, усиливающееся после еды.
- Урчание и дискомфорт в животе после еды, уменьшающиеся после отхождения газов.
- Результаты теста:
 - Асцит.
 - Кишечный паралич, при котором каловые массы задерживаются в кишечнике.
 - Увеличение паховых желез.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея **после воздействия холода** (холодный воздух, холодные напитки).
- Запор у детей с лихорадкой.
- Многочисленные, громкие, вонючие метеоризмы.
- Частые позывы к дефекации при лихорадке и шоке.
- Непроизвольное дефекация с метеоризмом.
- Болезненные спазмы в прямой кишке сопровождаются позывами к дефекации.
- Частичное выпадение прямой кишки при кашле с выпячиванием больших наружных геморроидальных узлов, которые очень чувствительны к прикосновению.
- Незаметное и произвольное выделение небольших, твердых каловых шариков (алоз).
- При натуживании в туалете у ребенка появляется сильный жар, покраснение и потливость лица.
- Результаты теста:
 - Жирный, твердый, комковатый стул, покрытый слизью и имеющий **жирный блеск**.
 - Anus patulus [патентуемый анус] (паралич S1 и S2).
 - Болезненность промежности, особенно между ягодицами, из-за подгузников.
 - Пеленочный дерматит у младенцев.
 - В кале: круглые черви, сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- **Врожденная слабость сфинктера мочевого пузыря.**
- **Задержка мочеиспускания;** в положении стоя выделяется лишь несколько капель мочи, но произвольное мочеиспускание происходит при кашле, смехе, сидении, чихании или ходьбе.

- **Спастический ночной энурез** (enuresis nocturna) в первой стадии сна (сравните Bell., Rhus-t., Sulph.; сон у Bell. и Sulph. гораздо глубже), когда ребенка трудно разбудить.
- Отсутствие позывов к мочеиспусканию, несмотря на переполненный мочевой пузырь.
- Зловонная, темно-коричневая или мутная моча.
- Болезненная задержка мочи после хирургических операций или у новорожденных после воздействия холодного воздуха.
- Ребенок мочится толчками при кашле.
- Слабость сфинктера мочевого пузыря, вызывающая непроизвольное мочеиспускание, особенно в положении сидя.
- Результаты теста:
 - М. Эддисон.
 - Моча: ацетон +, оксалат кальция ++, лейкоциты ++ и эритроциты ++.
 - Дрожжеподобный или красный песчаный осадок в подгузнике.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- **У ребенка наблюдается склонность к мастурбации.**
- Результаты теста:
 - Корки, экзематозные высыпания в области гениталий.
 - Крипторхизм.
 - Потоотделение в области яичек вызывает зуд и натирание.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Обильные, резкие, прозрачные, тягучие, липкие и вязкие выделения, только ночью, с сильным зудом.
- Задержка менархе.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Постоянное **першение в гортани** и трахее заставляет ребенка постоянно прочищать горло.
- **Потеря голоса при любой инфекции нижних дыхательных путей**; после излечения инфекции для полного выздоровления требуется не менее 2–3 недель.
- **Безболезненная охриплость**, грубость или носовой призывок голоса при простуде или от воздействия холода, хуже от пения или разговора, временно лучше от употребления холодных напитков.
- Раздражение гортани холодным воздухом, разговором и в постели по утрам.
- Скопление слизи в горле, которую невозможно откашлять.

ДЫХАНИЕ

- **Астма, чередующаяся с кожной сыпью.**
- Хрипы в груди с одышкой при кашле, разговоре или быстрой ходьбе; становится лучше, если ослабить одежду.
- Спастическая астма вследствие малейшего физического напряжения или подавленных эмоций.
- Результат теста:
 - **Вздохи** или хрипы при дыхании.

КАШЕЛЬ

- Кашель усиливается от **холодного воздуха**, в **сухую** и ветреную погоду, при наклоне вперед; облегчается от холодных напитков.
- Сухой, сильный, мучительный и раздражающий кашель по утрам после пробуждения, который становится более влажным к вечеру, когда ложится, хотя **откашливается лишь небольшое количество мокроты**; - приходится сглатывать отстоявшуюся мокроту.
- Ребенок кашляет так сильно, что сотрясает всю грудь (Тайлер).
- Ребенок трёт лицо и глаза кулаком во время кашля.
- Кашель из-за пищеводно-трахеального свища.
- Лицо синеет от кашля.
- Мокрота с жирным привкусом (пульс).

НАЗАД

- Болезненная скованность шейного отдела из-за сквозняков или сухого холодного ветра.
- Результат теста:
 - Искривление позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

- **Неуклюжесть** нижних конечностей, спотыкание при ходьбе.
- **Ювенильный ревматоидный артрит**, при котором ребёнок становится беспокойным ночью из-за боли (Rhus-t. беспокоен и днём, и ночью). Боль усиливается в холодную, сухую погоду (у Rhus-t. наблюдается ухудшение в сырую погоду; сравните также Acon., Bry., Nux-v.). Боль вынуждает двигаться, что не приносит облегчения (у Rhus-t. движение облегчает боль). Хуже на свежем воздухе; лучше в постели или тёплой комнате (Guernsey) или в тёплую, сырую погоду (Hep., Nux-v.).
- **Паралич дельтовидной мышцы** вследствие наложения щипцов или родовой травмы.
- Холодный, едкий пот на ступнях.
- Болезненные, жгучие мозоли.
- Болезненные судороги в ногах, подошвах стоп и пальцах ног ночью в постели.
- Спонтанный вывих тазобедренного сустава.
- Пожимание рук при письме.
- Неустойчивая походка и частые падения у маленьких детей.
- Результаты теста:
 - Укорочение мышц-сгибателей и сухожилий кистей (особенно пальцев) и бедер.
 - Трещины в суставах.
 - Свищевые отверстия в области тазобедренного сустава.
 - Роговые бородавки на руках, особенно около кончиков пальцев.
 - Левое бедро чувствительно к прикосновению.
 - Ногти: ломкие, деформированные, замедленного роста, толстые, с вросшими ногтями.
 - Болезненная паронихия у основания ногтя.
 - Скованность суставов.
 - Синовит, выпот в суставное пространство.

СПАТЬ

- Постоянные **подергивания** рук и ног во время сна.
- Во время сна: **судорожные движения** конечностей, скрежет зубов, смех, **стоны**, открытый рот, беспокойство, крики, вздрагивание, как от испуга, разговоры, хныканье.
- Бессонница из-за кашля.
- Зевание с дискомфортом в животе.

КОЖА

- Зуд кожи, усиливающийся ночью от **тепла постели** или расчесывания, со жгучей и острой болью.
- Кожа, склонная к **опрелости** во время прорезывания зубов.
- **Кислый запах** пота.
- Узловая крапивница на холодном воздухе, усиливается после расчесывания.
- Полезно в случаях сухой чесотки, подавляемой стероидами и бензилбензоатом.
- Результаты теста:
 - Пролезни.
 - Желтуха.
 - Келоиды.
 - Нездоровая кожа.
 - Бородавки: крупные, твердые, роговые или плоские, на ножке, воспаленные, кровоточащие и очень чувствительные к прикосновению.

СУДОРОГИ

- Недомогания, вызванные: гневом (у младенцев), простудой или после употребления холодных напитков, чувством холода, **глубоким сном**, прорезыванием зубов, лихорадкой, испугом (Bell., Ign., Hyos., Op., Stram), новолунием или **полнолунием, наказанием**, подавленной экземой или подавленной чесоткой (Ars., Calc., Cupr., Sulph.) и вакцинацией.
- Аура перед судорогами: рассеянность, вялость или забывчивость; аура ощущается в желудке; **горячая голова**; смех; потливость кожи головы; беспокойство и беготня по кругу; дрожь; головокружение с головной болью и тошнотой.
- Во время судорог: кусает других, прикусывает язык, поджимает большие пальцы рук к ладоням, похолодание тела, эпилептиформные судороги в сознании, носовое кровотечение, поворот головы вправо, непроизвольное мочеиспускание, смех, односторонние судороги (хуже с правой стороны), бледное или красное лицо, чрезмерное пенистое слюнотечение изо рта.
- После судорог: озноб, глубокий сон, головная боль, смех, односторонний паралич, обильное мочеиспускание, шум в ушах (жужжащие или шипящие звуки), плач.

ХОРЕЯ

- Жалобы, вызванные: испугом, **горем** (Ph-ac., Ign., Nat-m.) и подавленным нейродермитом.
- Поражает мышцы правой **стороны**, особенно мышцы глазного яблока и лица, у нервных детей (у девочек чаще, чем у мальчиков).

- Хуже в сухую погоду и при воспоминании.

Общий

- Жалобы в период выздоровления, после ожогов или после применения кортизоновых мазей.
- Заболевания, вызванные сухой, холодной погодой, полнолунием или новолунием, промоканием, мастурбацией, корью и сидением на мокрой земле.
- Задержка развития.
- Поздно научился ходить.
- Пациент зябкий, ребенка невозможно тепло укутать, но тепло не улучшает состояние.
- Зябкие, хрупкие, тщедушные, анемичные и болезненные дети с плотным телосложением и темным цветом лица, с аллергической конституцией и склонностью к легким простудам.
- Конституциональные последствия ожогов (эмоциональные и физические).
- Хочется быть на свежем воздухе, но сквозняки его усугубляют.
- Истощенный ребенок, несмотря на пристрастия к еде.
- Непереносимость давления одежды; потребность ослабить одежду.
- Юношеский диабет, сопровождающийся тягой к еде и преждевременным помутнением роговицы.
- Обильное потоотделение во время еды и дефекации.
- Полиомиелит.
- Прогрессирующий паралич после дифтерии или вследствие подавления кожных высыпаний.
- Рахит.

РОМАШКА

(Ромашка немецкая - Cham.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Младенцы и малыши не выносят никого рядом с собой; дети постарше не хотят, чтобы с ними разговаривали; если их заставляют отвечать, они становятся **раздражительными** и **вспыльчивыми**, даже **колючими**.
- ▶ Вспышки сильного гнева и другие нарушения поведения у детей, матери которых употребляли наркотики, такие как каннабис, кокаин или морфин, или которые пьют слишком много зеленого чая или кофе; а также после злоупотребления табаком.
- ▶ В припадках отвратительной раздражительности ребенок кричит и воет беспрестанно; **успокоить** и утешить его можно, только понося на руки.
- ▶ Жалобные вопли и плач длятся часами и днями, когда родители не выполняют желания ребенка.
- ▶ Малыши и новорожденные чрезвычайно беспокойны (ср. Ars.); они переходят от одного человека к другому; они никогда не бывают удовлетворены; никогда не бывают полностью спокойны; ребёнок переходит от одного человека к другому, всё больше раздражаясь и, возможно, даже ударяя их, когда их передают. Они постоянно хотят, чтобы их носили на руках и обнимали.
- ▶ Жгучий гнев, когда им в чем-то отказывают, или **яростное отвержение того, что им предлагают** (Bry., Cina, Kreos.).
- ▶ Ребенку совсем не нравится музыка, и он быстро от нее отворачивается.
- ▶ Триада Хам.: угрюмость, повышенная чувствительность и яростный гнев.
- ▶ Непослушные, грубые, неконтролируемые и неуправляемые дети, которые задерживают дыхание во время истерик; в гневе у них могут возникнуть спазмы, судороги, колики, диарея и лихорадка; иногда они даже бьются головой о стену.

Тело

- ▶ Гнев может вызывать многочисленные физические симптомы, такие как рвота с желчью, озноб, колики, судороги, лихорадка, мигрень и т. д.
- ▶ Одна щека красная и горячая, другая бледная и холодная.
- ▶ Очень чувствителен к боли; боль кажется невыносимой и доводит до отчаяния; ребёнок сходит с ума от боли, тем самым сводя с ума и впадая в панику других; требует немедленного облегчения и не терпит никаких отлагательств; от боли ребёнок даже становится агрессивным, мечется, кричит от отчаяния и может перебудить всю округу. Боль усиливается от жары, с вечера до полуночи и в тёплом помещении

и при местном применении тепла; сопровождается обмороками; болезненная область в конечном итоге немеет.

- ▶ Дети очень восприимчивы к болям в ушах, головным болям и зубным болям и требуют немедленного облегчения.
- ▶ Выделения горячие: горячий-холодный, горячий пот и горячий стул.
- ▶ Очень полезен для детей, матери которых во время родов получали морфин.
- ▶ Малыши чувствительны, раздражительны, испытывают жажду, жар и головокружение.
- ▶ Дж. Х. Аллен называет чамов сикотической болезнью из-за капризной раздражительности; повышенной чувствительности к взглядам и разговорам; непереносимости боли; зелёного, склизкого стула; и облегчения, которое возникает, когда носят на руках или качают. В своей практике я наблюдал, что у детей чамов часто встречается семейный анамнез ревматизма, артрита или астмы.
- ▶ Новорожденный постоянно гримасничает и зарывается головой в подушку.
- ▶ Повышенная чувствительность к свежему воздуху; сильное отвращение к ветру, особенно в области ушей.

Другие важные симптомы

Дух

- Расстройства поведения у детей: капризность, раздражительность, - склонность к истерикам; агрессивность, оскорбительность, дерзость; щипание и бросание вещей. **Дети вне себя от гнева, с красным лицом и одышкой**, особенно по утрам после пробуждения, из-за боли или когда их что-то беспокоит.
- **Капризный** ребенок; отказывается от вещей, о которых просил, когда им их предлагают.
- Жалобы, когда их оскорбляют, унижают или презирают.
- Не может выносить ни малейшей боли во время прорезывания зубов: плачет, жалуется или становится очень сердитым, беспокойным и жестоким, кричит и бьется; хуже от утешения, может успокоиться, только когда его носят на руках.
- Склонность постоянно хмуриться.
- Безутешные дети.
- Кладет пальцы в рот.
- Ребенок настаивает на том, чтобы его везде носили на руках, и категорически отказывается ходить; если его заставляют идти, у него возникают спазмы, колики или истерика.
- Отвратительные, надоедливые и грубые дети, которые очень сварливы и злятся по любому поводу.

Голова

- Головная боль **от гнева**, прорезывания зубов, простуды, подавленного потоотделения, вызванная слишком большим количеством масла для волос или слишком частым мытьем головы шампунем, а также в ветреную погоду; хуже утром в постели.
- Результаты теста:
 - Обильный, липкий, кислый пот на голове во время кормления.
 - Непроизвольное покачивание головой вперед и назад.
 - Менингит и энцефалит.
 - Мокнувшие высыпания на голове.
 - Невозможность держать голову прямо, она наклонена в сторону.

Глаза

- Катаральное воспаление глаз у маленьких детей вследствие простуды.
- Разрывание при простуде или лихорадке.
- Результаты теста:
 - Блефарит.
 - Веки полуоткрыты.
 - Желтуха.
 - Воспаление мейбомиевых желез.
 - Зрачки имеют тенденцию попеременно сужаться и расширяться.
 - Вращение глазных яблок.
 - Смотри.
 - Желтоватые, гнойные выделения из глаз, особенно по утрам, от которых глаза склеиваются.

Уши

- **Уши чувствительны к внешнему миру и шуму.**
- Боль в ушах с болью в горле, хуже от холодного воздуха и ночью от тепла постели; лучше от закрывания ушей; уши очень чувствительны к малейшему прикосновению, но лучше от сильного надавливания.
- Нарушение слуха из-за простуды с болью в ушах.
- Результаты теста:
 - Красные мочки ушей.
 - Жидкая ушная сера.
 - Катар евстахиевой трубы.
 - Средний отит с жидкими гнойными выделениями.

Нос

- Не переношу резких запахов.
- Обильный, водянистый, горячий, раздражающий насморк с закупоркой носовых ходов.
- Носовые кровотечения темной, черной кровью со сгустками, особенно с правой стороны, по утрам при вставании и с головной болью.
- Чихание с невозможностью спать
- Результат теста:
 - Заложенность ноздрей (Nux-v., Samb., Stict.).

Лицо

- **Горячий пот** на лице, особенно после еды, питья и при лихорадке.
- Результаты теста:
 - **Одна щека холодная и бледная, другая горячая и красная.**
 - Жевательные движения челюсти.
 - Трещина посередине нижней губы.
 - Свинка.
 - Запавшее лицо.
 - Опухание и уплотнение околоушных и подчелюстных желез.
 - Дрожание губ при плаче.
 - Морщинистый лоб.

РОТ

- Ребенок **постоянно хочет положить пальцы в рот.**
- Зубная боль, распространяющаяся на голову и уши, усиливается от жевания, теплой пищи или питья (Bism., Bry., Coff.); **лучше от холодной воды во рту.**
- Во время еды кусает стекло.
- Чрезмерное пенистое слюнотечение при зубной боли.
- Медленное и затрудненное прорезывание зубов.
- Результаты теста:
 - Абсцесс десен (Merc., Sil.).
 - Неприятный запах изо рта.
 - Географический язык или грязно-желтый или белый налет, с красной полосой, идущей вниз посередине, и красными боками.
 - Ранула.
 - Заикание.

Шея

- Может глотать только жидкости; малейшая твердая пища вызывает рвоту (слабость гортанно-трахеальных мышц).
- Рецидивирующий тонзиллит после малейшего воздействия холода.
- Боль в горле от холода, облегчающаяся от теплого питья.
- Результаты теста:
 - Темно-красное горло с увеличенными и воспаленными миндалинами.
 - Потливость наружной поверхности шеи.
 - Отек шейных и подчелюстных желез.

ЖЕЛУДОК

- **Изменчивый аппетит.**
- **Сильная жажда** часто сопровождается такие жалобы, как диарея, лихорадка или боль.
- Расстройство желудка и боли в эпигастрии после любого эмоционального возбуждения (гнев и испуг) или перед приступом кашля; лучше при сгорбивании.
- Иккинг.

- Тошнота с сильной рвотой и незначительной желчной рвотой после гнева, раздражения, лихорадки, после кашля, после молока или аллопатических лекарств.
- Кислая отрыжка после еды с запахом тухлых яиц.
- Обострение: молоко, сладости, горячая пища и напитки.
- Улучшение: кофе, холодная еда и напитки.
- Отвращение: кофе, суп, горячая еда и напитки.
- Пристрастия: хлеб, холодная еда и напитки, квашеная капуста (очень распространена в России), кислые продукты, овощи.

ЖИВОТ

- **Спазматические и щемящие боли у младенцев и маленьких детей от гнева, возбуждения или раздражения;** усиливаются от кофе, кашля, - прикосновения и попыток помочиться; **уменьшаются от сворачивания калачиком,** отхождения газов, **теплых компрессов;** сопровождаются обильным отхождением газов.
- Гепатит после гнева.
- Застойные газы с болезненным вздутием живота, сопровождающимся тимпанитом, усиливающимся после еды.
- Результаты теста:
 - Печень твердая при пальпации.
 - Болезненная и ущемленная паховая грыжа (Nux-v., Op., Verat.).
 - Паралитическая непроходимость кишечника.
 - Ректороманоскопия: язвенный колит.
 - Пупок чувствителен к прикосновению.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Безболезненный понос у младенцев;** с желчным, горячим, едким, слизистым, зеленым, водянистым стулом, **похожим на мелко нарезанные яйца со шпинатом,** с запахом тухлых яиц; от холодной погоды, прорезывания зубов, движения вниз (Borx., Sanic.), **возбуждения** (гнев, испуг, злость), воздействия холодного ветра и от холода.
- Смена стульев.
- Детская холера с частым, водянистым, зеленым стулом.
- Запор с узловатым, комковатым стулом, скрепленным слизистыми нитями (Graph., Nux-v., Sei.).
- Зуд в области ануса, особенно вечером.
- Зловонный стул и горячий, кислый или пахнущий тухлыми яйцами метеоризм.
- Результаты теста:
 - Болезненность и покраснение вокруг ануса.
 - Круглые черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ночное недержание мочи
- Результаты теста:
 - Красный осадок в подгузнике.
 - Моча: гной +, эритроциты +.

ГОРТАНЬ И ПИЩЕВОД

- Охриплость при простуде (Carbo-veg., Caust., Merc., Phos.).
- Результат теста:
 - Стридор.

ДЫХАНИЕ

- **Ребенок затаил дыхание от гнева.**
- **Внезапная остановка дыхания у детей после приступа плача.**
- Внезапные приступы астмы или одышки от холодной, сухой погоды, эмоций (особенно гнева), метеоризма, подавленной кори, от кофе или горячей пищи; улучшение от питья холодной воды или выхода на холодный воздух в положении сидя.
- Результаты теста:
 - Горячее дыхание.
 - Нерегулярное, прерывистое, хриплое дыхание.
 - Громкий вдох с форсированным выдохом.
 - Дыхание вздохов.

КАШЕЛЬ

- **Хронический, сухой кашель после кори** (мокрота, пульс).
- Постоянный, сухой, сильный, спастический и спазматический кашель во время сна; усиливается после полуночи, но, по-видимому, не беспокоит и не будит пациента (Aral., Arn., Lach.); становится более влажным в течение дня.
- Сухой, щекочущий кашель, который, по-видимому, исходит из желудка (Вгу., Сер.); ухудшается от холодного ветра, прорезывания зубов, эмоций (гнев, плач, раздражение), прослушивания музыки, игры на пианино и зимой.
- Плач из-за кашля (Bell., Cina, Нер.).

ГРУДЬ

- Результаты теста:
 - Бронхит.
 - Твердая, узловатая припухлость молочных желез у новорожденных.

КОНЕЧНОСТИ

- Ребенок всегда лежит с расставленными конечностями.
- Судороги в пальцах ног.
- Чрезмерная потливость ног.
- Скованность рук при хватании.
- Результаты теста:
 - Большие пальцы сведены судорогой и повернуты внутрь.
 - Холодный пот на ладонях.
 - Сухие ладони с очень холодными пальцами.
 - Болезненность между бедрами.

СПАТЬ

- Новорожденные, которые спят очень чутко и вскакивают от малейшего шума.

- Бессонница после стресса, во время прорезывания зубов или при боли; ребенка приходится носить на руках.
- Ребенок постоянно зевает, ворочается и потягивается всю ночь, сон у него беспокойный.
- Во время сна: Горячий пот на голове; подергивание, судороги или дрожь в ногах; сбрасывание одеяла; шумное дыхание; открытый рот со слюноотделением ; стоны, крики, храп; вздрагивание, как от испуга; лунатизм; разговор, плач, хныканье; закрывание ног.
- Уложить детей чамов спать практически невозможно, поскольку примерно с 9 вечера до полуночи они чрезвычайно беспокойны. После полуночи их повышенная возбудимость спадает, и ребёнок постепенно засыпает.
- Положение во время сна: лёжа с расставленными конечностями.
- Хочется спать, но не могу заснуть.
- Беспокойный сон.
- Подергивание мышц рук и лица во время сна.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Заболевания, вызванные: гневом или яростью; прорезыванием зубов, корью или гепатитом; с 11:00 до 16:00; ранней весной (т. е. с марта по апрель).
- Мороз:
 - Холодные конечности со жгучим жаром в лице, с ощущением, будто жар исходит от глаз.
 - Без жажды.
 - Ухудшение при раскрытии, раздевании, на холодном воздухе.
- Нагревать:
 - **Крайняя раздражительность и стоны** во время лихорадки (Bry.).
 - Чем сильнее жара, тем сильнее жажда.
- Пот:
 - Горячий пот, особенно на лице и голове.
- Язык: Желтый или белый по бокам и красный посередине (ant. от Ant-t.).

КОЖА

- Сухость кожи с нарушением потоотделения.
- Зуд потливых частей тела, усиливающийся при расчесывании.
- Результаты теста:
 - Рожа.
 - Опрелость.
 - Нездоровая кожа.

СУДОРОГИ

- Жалобы, вызванные: прорезыванием зубов, эмоциональным возбуждением (гневом, унижением или наказанием), лихорадкой, нарушением сна, глистной инвазией.
- Во время судорог: боли в животе, поджатые большие пальцы рук, приступы кашля, падения, пена у рта, скованность и сокращение мышц и сухожилий конечностей (особенно мышц-сгибателей предплечья и пальцев), тетаническая ригидность, плач.

Общий

- Жалобы, вызванные частым применением аллопатических лекарств (- препаратов хинина), корью и подавлением потоотделения (особенно - потоотделения ног).
- Отвращение к купанию.
- Ребенок дрожит, одна сторона тела холодная, другая горячая; отвращение к свежему воздуху; ухудшение при перемене погоды, воздействии холода или любого ветра.
- Хорея с ритмичными движениями тела.
- Желание и совершенствование посредством упражнений.
- Светловолосые, светлокожие, истощенные дети с дряблыми тканями и - склонностью к простудам.
- Нездоровые, гноящиеся раны, которые медленно заживают.
- Блуждающие, невыносимые боли, усиливающиеся после гнева.

ЧАМ: Новорожденные и дети ясельного возраста

- Плач (пронзительный, громкий от гнева).
- Размахивая руками.
- Имеет тенденцию запрокидывать голову и напрягаться от гнева.
- Руки сжаты.
- Беспокойный.
- Вытягивает тело и конечности в гневе.
- Дрожь по всему телу при плаче, особенно вокруг рта.

Источник

Семейство Астровые/Сложноцветные

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM

(Американская полынь - Чен-а.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Скрофулезный диатез.
- ▶ Потеря слуха может быть наследственной, вызванной параличом слухового нерва, недостаточной костной проводимостью или повторяющимися инфекциями среднего уха.
- ▶ Потеря слуха из-за заражения глистами.
- ▶ Воспалённые и опухшие миндалины, творожистый налёт на них. Горло сильно болит при глотании.
- ▶ В восточных странах, таких как Сингапур и Суматра, это средство используется для уничтожения всех видов **глистов : аскарид, остриц, власоглавов и анкилостом.**
- ▶ Сильное желание чая и хлеба.

Источник

- Также называется маревой лебедой и принадлежит к семейству маревых - (Chenopodiaceae).

CHINA OFFICINALIS

(Кора хинного дерева - Китай.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

РАЗУМ И КОНСТИТУЦИЯ

- ▶ Чувство **преследования** (Cench., Dros., Kali-br.) и **мучений** (Aq-mar., Lyss.) можно обнаружить у детей в следующих случаях: - Рисунки: часто использует такие цвета, как черный, рисует за границами линий, неспособен правильно выразить свою тему.
 - Рисунки: Используйте очень твердый карандаш, нарисуйте фигуры, выражающие жестокость, разрушение и жестокое обращение с людьми и животными.
 - Язык: Используйте слова и фразы, которые создают у вас ощущение, что ребенок каким-то образом страдает от преследования или блокировки.
 - Семейное положение: Чаще всего ребенок подвергается преследованиям со стороны отца, который является алкоголиком или жестоко с ним обращается.
 - Школа: Ребенок подвергался чрезмерным наказаниям или унижениям со стороны учителей или одноклассников.
 - Социально-экономические ситуации, такие как крайняя нищета и социальная депривация, например, просители убежища, получатели социальной помощи, дети, которые подверглись преследованию, презрению или унижению со стороны своего социального окружения.
- ▶ Ощущение собственной **неполноценности компенсируется чрезмерным воображением и фантазией, что, в свою очередь, приводит к исключительной креативности.**
- ▶ Любое **эмоциональное возбуждение влияет на голову и желудок.**
- ▶ У детей с самого раннего возраста развито ярко выраженное чувство прекрасного в сочетании с сильной силой воображения, благодаря чему впоследствии они часто выбирают такие профессии, как поэты (Ant-c., Coff., Nat-m.), писатели, кинорежиссеры и т. п.
- ▶ Дети, которые любят читать сказки и которых впечатляют такие истории, как «Золушка» и т. д.
- ▶ **Презрительный** (Ars., Cic., Ipec., Pall.) по отношению к другим, в основном из-за разочарования в своих собственных начинаниях или отсутствия возможностей, опять же в результате того, что они были заблокированы.
- ▶ **Творческие, мечтательные и одаренные воображением дети;** сильная склонность к творческой деятельности, которой они могут заниматься день и ночь.
- ▶ Лучше всего это выражается в искусстве (живопись) (Carc., Med., Phos., Staph.) или в написании стихов и поэмы (Agar., Ant-c., Thea.).

- ▶ **Чрезвычайно чувствительны к шуму** (Asar., Borx., Coff., Ther., Zinc.); чувствительность повышается от малейшего резкого звука, например, исходящего от дрели, автомобильного двигателя, телевизора или скороварки.
- ▶ **Очень чувствительные и деликатные дети**; малейшее замечание их сильно ранит (Bell., Ign., Med., Stann.).
- ▶ Чрезвычайно чувствительны эмоционально, эстетически и интеллектуально; эта чувствительность не сразу видна в первых разговорах, но позже становится понятно, насколько чувствителен ребенок к насилию и жестокости, насколько сильно он сочувствует своим друзьям, своим домашним животным и т. д., или насколько обширны его познания в духовных вопросах уже в этом раннем возрасте.
- ▶ **Подлое, жестокое** (Anac., Hep., Nux-v., Stram.), **антисоциальное поведение** (Aur., Cic., Syph.), которое проявляется в раздражении других детей и взрослых и может быть связано с аналогичным опытом в собственной жизни.
- ▶ Если гомеопату или терапевту не удастся завоевать доверие ребёнка, он не раскроет ни одного своего настоящего чувства, ничего о своей истинной сущности. Он будет вести себя поверхностно, а иногда даже грубо и вспыльчиво. С китайскими детьми гомеопату придётся очень интенсивно работать, прежде чем завоевать их доверие.

Тело

- ▶ **Запавшие глаза** (Ant-t., Cina, See., Spig.) с синими кругами, тупым выражением и болезненным видом; лицо может быть одутловатым, с небольшим увеличением селезенки и ощутимо увеличенной печенью, а также выраженным **тимпаническим вздутием живота** (Ars., Carbo-veg., Lach., Ter.).

ДД: Его легко спутать с Нат-м., так как ребенок сдержан и не выражает своих чувств, по крайней мере, в первых разговорах.

Другие важные симптомы

Дух

- Рассеянный (Apis., Cann-i., Hell.), погруженный в мысли (Hell., Nux-m., Mez.).
- Отвращение к прикосновениям и ласкам (Ant-c., Cham., Cina, Cupr.); не выносит, когда на него смотрят (Brom., iod., Mag-c., Sanic.).
- Капризный и жадный.
- Крайне тревожные, робкие дети, полные страха; страх перед животными (Alum., Bell., Elaps., Puls., Tub.) настолько силен, что ребенок боится не только собак (Bell., Hyos, Stram) и кошек (Bac., Sil., Syph., Tub.), но и

даже домашних животных, таких как куры (Calc-p., Ign.), козы и овцы. Большинство страхов китайцев усиливаются ночью. С приближением ночи ребёнок становится крайне тревожным и воображает, что его окружают призраки и фантомы. Когда он пытается заснуть и закрывает глаза, в его воображении могут возникать странные фигуры (Arg-n., Calc., Lach., Stram.).

- Дети с выраженным отвращением к спорту (Чел., Нац., Пал.) и физическим упражнениям.
- Зависть к способностям других (Ars., Calc., Sulph.).
- **Чувство обделённости** (Bry., Cub., Graph., Verat.) **или невезения возникает из-за глубокой печали, поскольку ребёнок не может иметь то, что есть у других.**
- Всегда хочет самого лучшего в жизни (Arc.), например, лучшую одежду, особенно дизайнерскую, лучшие игрушки, лучшие игры; обычные вещи кажутся совершенно непривлекательными.
- Дети полны идей и планов; их одноклассники и учителя ценят, когда они вносят свои знания и умения в проекты, конкурсы и другие творческие направления.

Голова

- Мигрень в детстве.
- **Крайняя чувствительность головы; ребенок отказывается от любого головного убора** (Bry., Nit-ac., Sil.), **даже не хочет, чтобы его расчесывали, потому что это очень болезненно** (Carbo-veg., Carbn-s., Kreos.).
- Волосы выпадают, болят, особенно у корней, хуже при расчесывании или прикосновении.
- **Головные боли** при хронических заболеваниях печени (Chel., Jug-c., Lept., Nux-v., Ptel.), сопровождающиеся запором, тошнотой и рвотой, после гнева, во время простуды или подавленной простуды (Acon., Calc., Dulc., Lach., Sil.), при кашле, после эмоционального возбуждения (Aur., Quinin-ar, Ph-ac., Verat.), после умственного напряжения, **от чая** (Guar., Nux-v., Sei., Thu.); **от холодного во рту**; желудочные головные боли, **усиливающиеся от расчесывания волос**, ходьбы на свежем воздухе; уменьшающиеся в темноте; сводящие с ума боли, нервная головная боль; сильная боль; периодическая; **боль вынуждает ребенка ходить или стоять.**
- Результаты теста:
 - Корки и струпьи на коже головы.
 - Темные волосы.
 - Голова оттянута назад (Cic., Tax.), вбок (Bar-c., Caust., Lachn., Lys.).
 - Энцефалит.
 - Голова запрокидывается назад, хуже в положении сидя (Dig., Oena.,

Ор.).

- Жар головы с холодностью конечностей (Bell., Cact., Ferr., Sulph., Verat.).
- Гидроцефалия (Apis.-, Calc., Lys., Sil.).
- Потливость кожи головы ночью, пот на затылке; холодный пот на лбу (Carbo-veg., Op., Verat.).

ЗАМЕДЛЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ В МОЗГЕ

- Такое явление встречается у детей, перенесших экстремальную кровопотерю, например, при гемофилии, талассемии, лейкемии, тромбоцитопении, опухолях головного мозга.
- Это состояние характеризуется головными болями, особенно по утрам, звоном в ушах, бледностью и холодным лицом, холодностью конечностей, сильной слабостью, покалыванием, дрожью и подергиванием мышц, - чувством обморока, которое улучшается в положении лежа.

ГЛАЗА

- Цилиарная невралгия после операции на глазах; лучше в темноте.
- Мерцание зрения при головной боли (Cycl., Nat-m.).
- Сближение букв при чтении.
- **Жжение в глазах, словно песок.**
- **Выраженное выпячивание глаз.**
- **Слабые глаза из-за плохого питания; глаза устают и болят, когда ребенок пытается читать или писать.**
- **Плохое ночное зрение из-за слабости сетчатки; ухудшается при фокусировке.**
- Результаты теста:
 - Тусклый вид (All-c., Ant-t., Nux-v.).
 - Конъюнктивит.
 - Помутнение роговицы.
 - Язвы роговицы.
 - уголках глаз (Agar., Am-c., Ant-c., Sulph.).
 - Дальнозоркость.
 - Ирит.
 - Близорукость.
 - Один глаз полуоткрыт, другой закрыт во время сна (Игн.).
 - Паралич зрительного нерва (Gels., Sil., Sulph.).
 - Светобоязнь.
 - Появляться.
 - Зрачки расширены, реакция на свет слабая.
 - Запавшие глаза.
 - **Желтые склеры.**

УШИ

- **Чрезвычайно чувствительные уши, не переносят шума** (Bell., Op., Ther.).
- **Потеря слуха после пломбирования зубов ртутьсодержащими препаратами при кариесе** (Asaf., Carb-c., Staph.), вызванная катаром евстахиевой трубы.
- Результаты теста:
 - Кариес сосцевидного отростка (Aug, Caps., Ferr-p., Sil.).
 - Хронический средний отит.
 - Кровянистые, зловонные, гнойные выделения.
 - Воспаление барабанной перепонки.
 - **Покраснение ушных раковин** (Caj., Caps., Cham., Merc., Puls.).
 - **Красные, горячие уши.**

Нос

- Насморк, сопровождающийся диареей (Merc., Puls., Sang.), носовым кровотечением (Acon., Elaps, Ipec., Mosch.), лихорадкой (Lach., Lyc., Spig.).
- Выделения желеобразные, капающие, зловонные, гнойные.
- **Привычные носовые кровотечения у маленьких детей** (Croc., Ferr., Puls., Ter.), **особенно по утрам при вставании**; носовые кровотечения сопровождаются бледностью лица; во время лихорадки — головной болью.
- **Обоняние чрезмерно обострено** (Coff., Ign., Op.).
- **Подавляемая простуда, приводящая к головной боли.**
- Сильное чихание.
- Результаты теста:
 - **Холодный пот вокруг носа (Rheum.).**
 - Острый нос (Camph., Verat.).
 - **Горячий и красный нос.**
 - **Кончик носа холодный.**

Лицо

- Результаты теста:
 - Раздутый (Ars., Op.).
 - Потрескавшиеся губы (Alum., Arum-t., Nat-m.).
 - Холодный пот на лице, вокруг рта (Rheum.).
 - **Потрескавшиеся губы, средняя часть губы** (Mez., Nat-m., Hep.), **нижняя губа** (Nat-c., Nit-ac., Puls., Sep.).
 - Изменение цвета кожи: бледность, особенно во время кашля (Ars., Cina, Ferr., Mez., Sulph.) и пота (Cina, Puls., Sei., Verat.); покраснение во время лихорадки (Bell., Hep., Kreos.); покраснение щек во время лихорадки (Acon., Hyos., Ferr., Rhus-t.).
 - **Выражение лица болезненное** (Ars., Ars-h., Cina, Lach., Lyc.), **бледное, узкое** (Aeth., Cupr., Tab., Verat.).
 - **Запавшие глаза, окруженные синими кругами.**
 - **Жирный** (Nat-m., Rhus-t., Tub.).
 - Гиппократовое зрение (Aeth., Carbo-veg., Tab., Verat.).
 - Опухшие губы (Apis, Arum-t., Nat-m., Sep.).

Рот

- **Обильные кровотечения из десен после удаления зубов** (Arn., Lach., Phos.).
- Результаты теста:
 - Афтозные язвы.
 - **Десны опухшие и рыхлые.**
 - Неприятный запах.
 - Обильное слюноотделение во время потоотделения (Bell., Dros., Dulc., Merc., Nit-ac., Rhus-t., Spig.), во время сна (Lyc., Merc., Puls., Rhus-t.); слюна кровавистая (Bufo, Crot-c., Mag-c., Plb.) и зловонная.
 - Кариес.
 - Язык коричневый, обложен толстым слоем налета, грязно-белый; белый при лихорадке; грязно-желтый; чистый.

ШЕЯ

- Боль в горле при кашле (Arg-met., Caps., Merc.).
- Результаты теста:
 - Кровь идет из горла.
 - Увеличение шейных лимфатических узлов вследствие туберкулезной лимфаденопатии. - Зоб.
 - Пульсирующие сонные артерии (Bell., Calc., Hep., Glon., Op., Tarent.).

ЖЕЛУДОК

- **Отвращение к маслу** (Cycl., Merc., Ptel., Sang.), **жирной пище**, ягодам (Mag-m., Ox-ac., Prot., Sulph.).
- **Жгучая жажда с желанием пить большое или малое количество воды, особенно при диарее** (Acet-ac., Ars., Bry., Cham., Dulc., Rheum., Sul-ac.), **лихорадке**; однако жажда может меняться и иногда отсутствовать во время лихорадки.
- **Желание кислого** (Acon., Cor-r., Hep., Verat.).
- **Расстройство желудка от фруктов** (Ars., Bry., Calc-p., Lyc.) **и молока** (Calc-ar., Iris, Nat-c., Sep., Sulph., Zinc.).
- Вздутие живота сразу после кормления грудью.
- Диспепсия у детей младшего возраста после употребления фасоли, чечевицы, гороха и молока.
- Отрыжка у детей, находящихся на грудном вскармливании, особенно после кормления грудью.
- **Вздутие живота и кишечника с сильным брожением и урчанием** (Anac., Jat-r-c., Gamb.).
- Частая рвота непереваренным молоком у младенцев и новорожденных (Mag-c.).
- Повышенный аппетит с **быстрым насыщением** (Lyc., Plat.); повышенный аппетит ночью (Quinin-s., Cina, Lyc., Phos., Psor.); волчий голод во время лихорадки (Ars., Bry., Caps., Cham., Cina, Phos.).
- Потливость с потоотделением (Calc., Caps., Sil., Verat.).
- Ребенок рождается с множеством **аллергий**, которые постоянно нарушают работу желудочно-кишечного тракта. Ребенок не может переварить даже самое маленькое количество следующих продуктов: **яблоки** (Ant-t., Borx., Fago., Lyc., Rumx.), **бобы** (Bry., Coloc., Lyc., Petr.), **хлеб** (Bry., Puls., Sep.), **масло** (Carbo-veg., Cycl., Fern, Puls.), **вишня** (Mag-m., Merc-c., Nat-m.), **кофе** (Canth., Cham., Caust., Ign., Nux-v.), **кукуруза** (Calc-ar., Kali-c., Puls., Sulph.), **мучная пища** (Bry., Carb-an., Iris, Nat-s.), **жир** (Ferr., Graph., Tarax., Tarent.), **фрукты** (Ars., Bry., Coloc., Nat-s., Puls., Verat.), **виноград** (Ox-ac., Ruta, Verat.), **молоко** (Aeth., Con., Lac-d., Staph., Tub.), **баранина** (Ars., Colch., Ferr., Puls.), **масло** (Bry., Canth., Graph., Rob., Tarax.), **горох** (Bry., Coloc., Lyc., Petr.), **перец** (Ars., Cina, Nat-c., Sil.), **квашеная капуста**. (Bry., Lyc., Petr.), **кислые вещи** (Acon., Ant-c., Hep., Old.).
- Ненасытный аппетит, но слабое пищеварение; все, что он ест, превращается в газы.
- **Отсутствие аппетита у детей, особенно в туманную погоду.**

- Вздутие живота, не облегчающееся отхождением газов (Arg-n., Phos.).
- Сильные спазматические боли перед дефекацией.
- Результаты теста:
 - Атрофия печени (Aur., Calc., Phos.).
 - Асцит.
 - Печень увеличена, плотная на ощупь (Ars., Dig., iod., Rat.).
 - Селезенка кажется твердой (Agn., Ferr., Mez., Psor., Sul-ac.).
 - Подреберье всегда чувствительно к прикосновению (Bry., Colch., Mag-m., Verat.).

ПЕЧЕНЬ

- Все жалобы на заболевания печени сопровождаются **сильным истощением**.
- Медленное пищеварение.
- Печень увеличена, болезненна.
- Родители обычно сообщают о следующих медицинских данных: низкая масса тела при рождении, преждевременные роды, слабость, частая диарея, обильная ночная потливость, рецидивирующая малярия.
- Селезенка также часто увеличена.
- Симптомы ухудшаются через день.
- **Язык обложен белым или желтым налетом.**
- Сильный **голод**, особенно ночью (Lyc., Phos., Psor.) с желанием кислой пищи.
- В основном понос, метеоризм и **стул цвета глины** (Card-m., Chel., Nat-s.).
- Средство в первую очередь воздействует на печень, вызывая застойные явления, воспаление и желтуху.

ГИПЕРЕМИЯ СЕЛЕЗЕНКИ

- Гиперемия и застой крови в селезенке обусловлены портальной гипертензией (воротной гипертензией), малярией, хроническим миелоидным лейкозом (Cean., Nat-s.).
- Эта гиперемия в конечном итоге приводит к увеличению селезенки.
- Ребенок жалуется на сильное истощение, сильно потеет во время сна или когда укрывается, кожа желтая, появляется желтуха, нет желания есть и пить; **живот вздут**; сильное брожение после еды; **непереваренный стул**.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Обильное газообразование.
- Детская холера.
- Запор после злоупотребления слабительными средствами (Aloe, Hydr., Nux-v., Sulph.).
- Зуд в заднем проходе, вызванный острицами и круглыми червями.
- Открытый анус после непроизвольного стула (Apis., Phos.).
- **Черви в полнолуние** (Calc., Cina, Ferr., Sulph.).
- Результаты теста:
 - Черви.
 - Овечий навоз.
 - Влага.

ДИАРЕЯ

- После холодных напитков, при прорезывании зубов, от эмоционального возбуждения, при лихорадке, после употребления рыбы, **фруктов** (Ars., Coloc., Nat-s., Puls., Verat.), **особенно после манго**, после кори, молока, после отлучения от груди (Arg-n.).

- После дефекации: **ощущение сильной слабости.**
- Перед дефекацией: **сильные колики.**
- **Хроническая диарея.**
- Вызванный туберкулезом (Bapt., Coto., Supr-ar.), первичный комплекс.
- Во время дефекации: безразличие, бледное, землистого цвета и одутловатое лицо, сухие и потрескавшиеся губы, слюнотечение, горький привкус во рту, желание пить частыми, но маленькими глотками (Ars., Coloc., Nat-ar.), резкое отсутствие аппетита, вздутие живота, **тимпанит, метеоризм**, темная моча.
- **Утренний понос** заставляет ребенка вставать с постели (Aloe, Psor., Rumx., Sulph.).
- **Безболезненно** (Bapt., Bism., Squil., Tub.).
- Стул чаще ночью и после еды.
- Стул желтый, водянистый, непереваренной пищей, пенистый (Ambro., Crot-t., Olnd., Psor.).

Мочевыводящие пути и надпочечники

- Болезнь Аддисона (Calc., Iod., Nat-m., Phos., Sil.).
- Хроническое воспаление почек.
- **Хронический гнойный пиелит** (Baros., Chim., Cop., Uva.) **вследствие стриктуры в месте соединения почечной лоханки и мочеточника или вследствие пузырно-мочеточникового рефлюкса.**
- Непроизвольное мочеиспускание ночью у худых и ослабленных детей.
- Нефротический синдром (Apis, Calc-ar., Lyc., Merc-c., Phos., Sulph., Tub.).
- Задержка мочи.
- Камни в почках у детей (Benz-ac., Calc., Lith-c., Pareir., Sars.).
- Мочеиспускание редко возникает при лихорадке.
- Результаты теста:
 - Моча: Белковая, кровавая, мутная после отстаивания, пенистая (Chel., Lach., Sei., Seneg.), молочная, кирпично-красная, огненно-красная, темная, зеленая, желтая.
 - Сильный, неприятный запах.
 - Жидкая струя мочи.
 - Сахар в моче у маленьких детей (Ars., Colch., Hyos., Op., Puls., Stram.).

Мужские гениталии

- Склонность к мастурбации.
- Результаты теста:
 - Орхит.
 - Вялая мошонка.
 - Неопущение яичка.

Гортань и трахея

- Крупп.
- Охриплость после кашля.
- Хрипы в гортани и трахее.
- Слабый голос (Ant-t., Canth., Hep., Stann., Verat.), беззвучный (Calad., Dros., Stram.).
- Результаты теста:
 - Отек голосовой щели.
 - Ларингит.

ДЫХАНИЕ

- **Асфиксия у детей и новорожденных, особенно у матерей, у которых развилось послеродовое кровотечение.**
- **Астма от метеоризма** (Carbo-veg., Cham., Chel., Lys., Mag-p., Nux-v., Op., Phos., Sulph., Zinc.), **в сырую погоду** (Aur., Dulc., Ipec., Lem-m., Nat-s., Syph.); **в основном вечером и ночью** около полуночи; **хочет, чтобы его обмахивали; хуже, когда голова опущена** (Apis, Cact., Hep., Kali-c., Spig., Spong.) или **когда невозможно лежать** (Ars., Crot-t, Puls., Seneg., Tub.).
- Хрипы при кашле.
- **Паралич легких вследствие катара** (Ant-t., Ars., Camph., Ipec., Sulph., Verat), **вследствие застоя** (Acon., Ipec., Phos., Samb., Verat-v.).
- Хриплое дыхание у детей при кашле.
- Дыхание храпящее; хриплое во время сна.
- Хрипы, усиливающиеся при вдохе.

КАШЕЛЬ

- Постоянный кашель, усиливающийся в холодную погоду; крупозный кашель, **усиливающийся во время еды**; усиливающийся при лихорадке, смехе, в положении лежа вниз головой (Bry., Carbo-veg., Hyos., Rumx., Sang., Spong.); кашель усиливается утром при вставании (Arn., Ferr., Lach., Par., Thuj.); кашель **уменьшается при приподнятой голове** (Aral., Carbo-veg., Rumx., Sep.).
- Мокрота гнойная.

ГРУДЬ

- Первичный сложный туберкулез легких у детей раннего возраста.
- Результаты теста:
 - Кровавые шишки на груди (Arn., Граф.).
 - Жар в груди с лихорадкой.

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжесть: ребенок спотыкается при ходьбе (Agar., Caust., Ipec.).
- Спазмы при схватывании предмета.
- Результаты теста:
 - Хроническое воспаление суставов.
 - Холодность рук и ног.
 - Мозоли (Calc., Rhus-t., Sep., Sil.).
 - Отёк лодыжек.
 - Истощение нижних конечностей (Abrot., Arg-n., Ign., Plb., Sanic.).
 - Плоскостопие (Abrot., Calc., Guaj., Ph-ac., Stront-c.).
 - Одна рука холодная, другая теплая (Ant-c., Canth., Chel., Cocc., Dig., Ipec., Lys., Mosch., Puls., Tab.).

РЕВМАТИЗМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

- Страх пребывания на открытом воздухе — даже кратковременное пребывание там вызывает сильную боль.
- Боль в конечностях и суставах, словно при растяжении; хуже от самого легкого прикосновения, лучше от сильного давления, от тепла.

- **Ревматизм у детей после интоксикации ртутью, содержащейся в зубных пломбах** (Guaj., Hep., Phyt., Sars.).
- Результаты теста:
 - Горячие, опухшие колени (Bell., Calc., Ferr-p., iod., Puls., Verat-v.), болезненные при прикосновении.
 - Суставы опухшие, болезненные.
 - Опухшие ноги.

Назад

- Результаты теста:
 - Потливость в шейной области.
 - Скованность шеи.

Спать

- Дети не хотят рано ложиться спать.
- **Страх после снов** (Am-m., Cocc., Con., Lyc.).
- Стоны во сне (Aur., Bry., Cham., Op., Sulph.).
- Сон нарушается малейшим шумом.
- Бессонница из-за головных болей или беспокойного сна из-за сновидений.
- **Бессонница от кашля** (Caps., Caust., Kali-bi., Ol-j., Tub.), **от беспокойства** (Acon., Ign., Laur.), **от головной боли** (Aur., Coff., Puls., Spig., Sulph.).
- Ребенок спит, положив **руки выше головы** (Nux-v., Puls., Sulph.) или **ниже головы** (Acon., Bell., Meny., Sanic.), нижние конечности либо подтянуты вверх (Carbo-veg., Lac-c., Merc-c.), либо вытянуты (Cham., Dulc., Puls., Stann.).
- **Сон ребенка прерывается голодом** (Abies-n., Ign., Lyc., Ph-ac., Phos., Teuer.), **страшными сновидениями и страхом** (Ars., Merc., Nat-m., Sep., Sil.).
- Плач во сне (Cham., Merc., Op., Puls., Sep., Sil.).

Высокая температура

- **Лихорадка перемежающаяся, трижды в день, ежедневно.**
- Приступы случаются каждые 7 или 14 дней.
- Продромальная стадия: **сильная жажда**, голод, **тошнота**, беспокойство, головная боль, слабость; чихание на холодном воздухе; колики, беспокойный сон в ночь перед приступом лихорадки.
- Озноб: **жажды нет** (Ars., Caust., Hell., Mosch., Mur-ac., Phos., Sabad., Spig., Thuj.); жажда прекращается, как только начинается озноб; озноб начинается в нижних конечностях ниже колен, а затем распространяется на все тело; усиливается от питья; озноб с **мурашками** после каждого глотка (Eu-p. Питье вызывает рвоту); хочет находиться рядом с печкой, что усиливает озноб (Ipec. облегчается от тепла печи); ледяной холод рук и ног; холод рук и ног даже в теплой комнате; кожа холодная и синяя.
- Жар: **лицо бледное, с гиппократовским выражением**; запавшие глаза, окруженные темными кругами; жар, особенно в области лица; хуже при движении и ходьбе (Caps.: жар, лучше при ходьбе); жажда наступает через час после исчезновения жара; общий жар с расширенными венами, - головной болью; **желание укрыться; волчий голод** (Bry., Caps., Cina, Phos.) или отвращение к пище; боль в печени, спине и груди.

Сухость во рту; сухие, жгучие губы, покраснение лица, сухой спазматический кашель; боли в подреберьях; щеки красные и горячие; **язык белый или желтый, обложен толстым или грязным налетом;** горький привкус во рту; учащенный пульс.

- Пот: **Жажда** (Arn., Cham., Nat-m., Stram., Verat.); обильный и усиливающийся при укрытии (Acon., Bell., Puls., Staph., Thuj., Verat.).
- Афебрильный: ребенок сильно потеет; **сильная слабость;** изнуряющий ночной пот; желтушный цвет кожи.
- Лихорадка обычно **усиливается утром** (Apis, Bism.) **и после полудня** (Bell., Ign., Gels., Nat-m., Phos.).

ПОТ

- **Холодный, липкий пот со всевозможными кровоизлияниями.**
- Потливость во время сна (Agar., Borx., Podo.).
- Обильный, изнуряющий пот, особенно во время лихорадки.
- Потеют преимущественно закрытые части тела (Acon., Bell., Cham., Ferr., Nit-ac., Sanic., Sil., Thuj.).
- Результат осмотра: Жирный пот (Mag-c., Sei., Thuj.).

КОЖА

- Склонность к образованию вмятин.
- Результаты теста:
 - Экхимозы (Arn., Led., Ph-ac., Phos., See., Sulph-ac.).
 - Гусиная плоть.
 - Жирный.
 - Корь.
 - Псориаз.

Общий

- Обострение всех чувств (звон, кофеин, угнетение, мокрота) с гиперестезией на самое легкое прикосновение, свет и т. д.
- Слабость из-за потери жидкости организмом, например, кровотечение, диарея, потливость и т. д.
- **Тяжелые последствия кровотечения** у маленьких детей: обмороки, звон в ушах и судороги.
- **Склонность к пассивным кровотечениям из любых отверстий тела** (надпочечников, яичников, промежности, манифестации кровотечений), **часто сопровождающаяся воспалительными или застойными явлениями.**
- Крайнее физическое истощение с прогрессирующей анемией (Calc-p., Fern, Nat-m., Ph-ac.).
- Показан при упадке сил у детей, которые ранее имели крепкое телосложение, но стали слабыми и истощенными после перенесенных острых изнуряющих заболеваний или истощающих болезней, таких как пневмония, тиф и т. д.
- Боль возникает и обостряется снова при малейшем прикосновении.
- Периодичность симптомов, которые повторяются через день (Alum., Ipec., Rhod.), ежегодно (Ars., Lach.) или осенью (Kali-bi., Lach., Rhus-t.).
- Ревматические, невралгические боли, боли в костях; усиливаются от легкого прикосновения, уменьшаются от сильного давления (Arn., Coloc., Lach.).

CHIRONEX FLECKERI

(Морская оса - Хри-ф.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Нарушения поведения у детей.
- ▶ Упрямый, дерзкий, недовольный и тревожный.
- ▶ Несимпатичный, сварливый, может даже прибегнуть к физическому насилию.
- ▶ Основная причина такого необычного поведения — недостаток любви со стороны родителей.
- ▶ спутать с ванной.
- ▶ Склонность к увеличению, уплотнению и опуханию шейных лимфатических узлов.
- ▶ Потеря веса, несмотря на ненасытный аппетит.

Источник

- Также называется кубомедузой. В гомеопатию ее ввел Аластер Грей (Австралия) .

ХЛОРАЛУМ ГИДРАТУМ

(Хоральный гидрат - Хлол.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Ужасные, кошмарные сны; ребенок громко плачет, сидит в постели и не может успокоиться.
- ▶ Лунатизм: ребенок просыпается ночью, прячется и после пробуждения не может вспомнить, где он был.
- ▶ Расстройства обучения вследствие длительного лечения противозипептическими препаратами.
Эти дети испытывают трудности с ответами на вопросы или дают несвязные ответы и отвечают на вопросы неправильно; им трудно сосредоточиться во время обучения.
- ▶ Поспешная и бессвязная речь.
- ▶ Ужасные и пугающие образы во сне, из-за чего часто просыпается и не может снова заснуть.
- ▶ Судороги во время прорезывания зубов.
- ▶ **Ночные ужасы во время прорезывания зубов.**
- ▶ Ночное недержание мочи у детей происходит в ранние утренние часы; после недержания мочи ребенка трудно разбудить.
- ▶ Крапивница, которая возникает днем и повторяется ночью.

Источник

- Хлоралгидрат был первым синтетическим снотворным. Он действует как седативное, снотворное и противосудорожное средство.

ХЛОРПРОМАЗИН

(Аллопатическая медицина - Хлорпре.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Шизоидная личность.
- ▶ Приступы рассеянности и потери концентрации.
- ▶ Плохая успеваемость.

Другие важные симптомы

Дух

- Меня ничего не интересует.

Нос

- Засорен.

Лицо

- Результат осмотра: - Акне.

РОТ

- Результаты теста:
 - Кровоточивость десен.
 - Кандида.
 - Сухие губы.
 - Трещина на языке.
 - Неприятный запах изо рта.

ЖЕЛУДОК

- Циклическая рвота.

живот

- Результат осмотра: - Дряблый живот.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Упорные запоры.

МОЧА

Энурез.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Бели.

КОНЕЧНОСТИ

- Детский церебральный паралич.
- Хорея.
- Холодные ноги.

СПАТЬ

- Кошмары.
- Утренняя сонливость.

КОЖА

- Чувствительность к солнечному свету.
- Результат теста:
 - Витилиго.

Общий

- **Склонность к ожирению.**
- Апластическая анемия.
- Хроническая эпилепсия.
- Семейный анамнез сахарного диабета, гипертонии или туберкулеза.
- Отсутствие жизненного тепла.
- Устойчивость к противоэпилептическому лечению.
- Склонность легко простужаться.
- Тромбоцитопения.

Источник

- Хлорпромазин был первым препаратом из группы нейролептиков и тем самым заложил основу современной психофармацевтической терапии.

ХЛОРУМ

(Хлорированная вода - Хлор.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Изготовлено из газообразного хлора.
- ▶ Особенно эффективно воздействует на **слизистые оболочки органов дыхания**, гортани, кожи и желез.
- ▶ Аллергический вазомоторный ринит, который начинается с обильного, раздражающего выделения слизи. Болезненность и заложенность носа, особенно левой стороны. Сильное чихание и грязные, обложенные ноздри.
- ▶ Запавшее лицо.
- ▶ Проблемы у детей возникают во время прорезывания зубов или из-за кори.
- ▶ Болезненные язвы во рту; рот очень сухой и пересохший.
- ▶ Спастическое сужение гортани, усиливающееся при кашле; кашель обусловлен стойким воспалением гортани. Голос хриплый; дыхание затруднено, как вдох, так и выдох.
- ▶ Спазм голосовой щели у детей и младенцев, особенно при сосании груди или во время сна.
- ▶ Во время острого приступа астмы дыхание может быть нерегулярным, шумным, прерывистым и хриплым. Ребёнку необходим сквозняк, который приносит облегчение; состояние ухудшается в тёплых помещениях и во время сна. Лицо Гиппократовое во время приступа астмы или при проблемах с дыханием.
- ▶ Круп или коклюш. Мокрота пенистая, густая и белая.
- ▶ Сильное желание гвоздики.
- ▶ Лихорадка с крапивницей.
- ▶ Очень жаркие дети и улучшение на свежем воздухе, как и со всеми галогенными газами.

CICUTA VIROSA

(Водяной болиголов - Cíc.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Девиантное поведение: поет, кричит и танцует с гротескными движениями (очень похоже на детей Hyos. и Stram.).
- ▶ Дети, которые не хотят «взрослеть». Они живут с ощущением, что они всё ещё очень маленькие, и хотят играть в игрушки, которые им намного меньше по возрасту.
- ▶ Психологические симптомы и задержка развития ребенка после несчастного случая или черепно-мозговой травмы.
- ▶ Отвращение к присутствию незнакомцев.
- ▶ Расстройства поведения при хронической эпилепсии и глистной инвазии.
- ▶ Несчастливые дети, неспособные ничем удовлетвориться.
- ▶ Расстройства личности с умственной отсталостью.
- ▶ Внезапное насилие у детей с задержкой развития, характеризующееся плачем, рыданиями и агрессией.

Тело

- ▶ Хронические жалобы из-за травм.
- ▶ Судорожные состояния: икота, столбняк и судороги.
- ▶ Подергивание различных частей тела, особенно рук и пальцев.

Cíc. относится к семейству зонтичных (Ariaceae). Его очень легко спутать с Con., поскольку эти два растения очень похожи. Некоторые общие характеристики описаны в конце изображения этого препарата.

Другие важные симптомы

Дух

- **Не любит компанию, избегает встреч с людьми.**
- **Снисходительно.**
- **Подозрительный.**
- Отвечает резко.
- Реагирует на обращение, но никого не узнает.
- Ребенку нельзя слушать или видеть по телевизору ужасные или жестокие сцены.
- Спутанность сознания; путает настоящее с прошлым; также имеет тенденцию путать время и место.
- Впечатляющий.

- Импульсивный.
- Легко пугается и вздрагивает.

Голова

- **Заболевания мозга, вызванные подавленными извержениями.**
- Менингоэнцефалит.
- Сотрясение мозга, сопровождающееся прикусыванием языка.
- Потливость головы, особенно во время сна.
- Результаты теста:
 - **Сокращение мышц шеи, запрокидывание головы назад, с напряженным позвоночником.**
 - Утыкается затылком в подушку.
 - Голова повернута и наклонена в сторону.
 - Горячая голова и холодные конечности.
 - Знак Кернига +.
 - Вращение головой.
 - Толстые желтые чешуйки на голове около линии роста волос (Nat-m.).

Глаза

- **Сходящееся косоглазие после удара, судорог или шока.**
- Результаты теста:
 - При поднятии век глаза смотрят вверх.
 - Зрачки расширены и не реагируют.
 - **Закатывание глаз.**
 - **Пристальный** взгляд, который также является первым признаком эпилептического припадка.
 - Подергивание век.
 - Корнеальный рефлекс отсутствует.
 - Если вы без сознания, держите глаза открытыми.

Уши

- Результаты теста:
 - Уши попеременно горячие и холодные.
 - Гнойные, жгучие **высыпания** вокруг ушей, особенно **за ушами**.
 - При переломе основания черепа: положительный симптом Бэттла (геморрагии за ухом).

Нос

- **Носовое кровотечение от малейшего прикосновения.**
- Результаты теста:
 - Изъязвленные ноздри с желтыми гнойными выделениями.
 - Желтые корки в ноздрях.

Лицо

- Результаты теста:
 - **Лицо пепельного или сине-красного цвета, ужасно искаженное во время судорог .**

- Жевательные движения челюсти.
- Экзема с толстыми желтыми чешуйками.
- Эпителиома губ (Кон.).
- Герпес вокруг рта.
- Импетиго.
- Спазм жевательных мышц (тризм, сопровождающийся скрежетом зубов или их плотным стискиванием).
- Подергивание мышц лица.

РОТ

- **Прикусывание щеки или языка** во время судорог, а также при жевании или разговоре.
- Результаты теста:
 - Пена во рту и вокруг него.
 - Кровоточивость и отступление десен.
 - Заикание или проглатывание слов.

ШЕЯ

- **Затрудненное глотание жидкости.**
- **Спазмы и сужение пищевода вызывают рвоту при глотании.**
- Результат теста:
 - Слабый рвотный рефлекс.

ЖЕЛУДОК

- **Сильная жажда, особенно во время судорог, с невозможностью глотать.**
- **Спазмы диафрагмы вызывают сильную икоту**, особенно во время эпилептического припадка или инсульта.
- Неутолимая тяга к еде, даже после сытного приема пищи.
- Сильная рвота с судорогами.
- Хуже от молока в любом виде.
- Пристрастия: к капусте, мелу, углю, грязи, неперевариваемым вещам, извести, горчице, сырому картофелю и крахмалу.

ЖИВОТ

- **Болезненное вздутие живота во время судорог.**
- Колики в животе с судорогами и рвотой.
- Потливость живота.
- Результат теста:
 - Паховая грыжа.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Желание мочиться каждый раз после дефекации.
- Стул жидкий и водянистый, выделяется струей.
- Результаты теста:
 - Выделение круглых червей с калом.
 - Пролапс.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Выделение мочи в больших количествах или полная задержка мочи.
- Результат теста:
 - Спастическое сужение уретры.

ДЫХАНИЕ

- Результаты теста:
 - Остановка дыхания во время судорог.
 - Хрипы.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Слабая сердечная деятельность, с ощущением, будто сердце вот-вот остановится.
- Результат теста:
 - Пульс: дрожащий, слабый, медленный, почти незаметный.

НАЗАД

- Ударная травма позвоночника.
- Спинальный менингит и миелит.
- Результаты теста:
 - Спина выгнута назад.
 - Знак Кернига +.
 - Судороги в мышцах шеи.

КОНЕЧНОСТИ

- Как удары током в конечностях, с подергиванием.
- Общая слабость конечностей после резких подергиваний.
- Результаты теста:
 - Сведенные судорогой пальцы.
 - Холодные конечности во время судорог.
 - Выворачивание конечностей во время судорог.
 - Во время эпилептических припадков конечности попеременно вытягиваются и сгибаются.
 - Узелковый артрит.
 - Синие ногти.
 - Вены на руках расширены.

КОЖА

- Заболевания головного мозга, вызванные подавленными кожными высыпаниями.
- Результаты теста:
 - Хроническое импетиго.
 - Мокнущая экзема с твердыми корками лимонного цвета.

СПАТЬ

- Прикусывает язык и скрипит зубами во время сна.
- Чрезмерное ночное потоотделение приводит к бессоннице.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Церебральный и брюшной тиф.
- Лихорадка у детей с жалобами на гельминтозы, колики и судороги.
- Сильный жар с судорогами.

Судороги

- Жалобы, вызванные: **коликами, прорезыванием зубов**, сквозняками, лихорадкой, ознобом, **травмами головы**, кишечными паразитами (**глистами**), шумами, пролежнями и **прикосновением**.
- Аура: начинается в **желудке** или вокруг головы и шеи и распространяется вниз (в отличие от Купр., где аура распространяется вверх)
- Перед судорогами: пронзительный крик.
- Во время судорог:
 - Вздутие живота и боли в животе.
 - Лицо пепельного или сине-красного цвета с ужасными искажениями.
 - Прикус щеки или языка.
 - Холодные конечности, попеременно вытянутые и согнутые.
 - Спазм челюстей, зубы либо стиснуты, либо стиснуты.
 - Потеря сознания.
 - **Опистотонус** с переразогнутым телом и конечностями, жесткими, неподвижными и твердыми как дерево ИЛИ без какого-либо тонуса и вялыми.
 - Пронзительные крики.
 - Спазмы диафрагмы вызывают сильную икоту.
 - Кровавая пена изо рта.
 - Синие губы.
 - Возбуждение.
 - Жалобы, вопли, нытье и плач.
 - Тризм.
- **Судороги распространяются от центра к периферии.**
- **Столбнячные судороги, вызванные древесными щепками.**
- Спазм снова провоцируется прикосновением или шумом.
- Спазм тянет вниз со страшной силой, затем происходит внезапный рывок по всему телу или голове, за которым следует оцепенение или крик, после чего наступает длительная потеря сознания с полным изнеможением, как будто человек безжизненный.
- Онемение между судорогами.

Общий

- **Оцепенение быстро возвращается после правильного ответа на вопросы.**
- **Полезно при ушибах, растяжениях и осколочных травмах.**
- Дрожа от тоски по теплу.
- Неврологические жалобы, связанные с подавленными кожными высыпаниями.
- Рахит.

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ Cic. и Con.

- Отвращение к обществу, особенно к незнакомцам.
- Кровянистые выделения из ушей.
- Ребёнок любит танцевать.
- Цианоз с посинением лица и ногтей.

- Желание есть капусту и неперевариваемые вещи, такие как мел, уголь, глина, земля, известь, грифель и т. д.
- Желание сочувствия.
- Страх перед людьми.
- Глупое поведение.
- Пена у рта.
- Легко пугается.
- Быстро впадает в гнев, склонен к насилию.
- Увеличение желез.
- Скрежетание зубами.
- Впечатляющий.
- Молоко портится.
- Боль и скованность в области шеи.
- Пульс: Неощутимый, медленный, малый и слабый.
- Зрачки попеременно сужаются и расширяются в условиях постоянной освещенности.
- Закатывание глаз.
- Грустно и мрачно после травмы головы.
- Кровоточивость и отступление десен.
- Чувствительность к шуму.
- Рыдания во время плача.
- Спазмы пищевода с затруднением глотания жидкости.
- Спазм мышц лица со спазмом челюсти или сардонической улыбкой .
- Выпученные, пристальные глаза.
- Легко вскакивает: от шума или во сне, как будто от испуга.
- Косоглазие.
- Головокружение после травмы головы.
- Подозрительный.
- Тонико-клонические судороги с тетанической ригидностью.
- Потеря памяти с проблемами концентрации.

Источник

Семейство Зонтичные (Apiaceae/Umbelliferae).

CINA MARITIMA

(Червивое семя - Китай)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Китай находится в состоянии постоянного разочарования: что бы они ни получали, они никогда не бывают удовлетворены.
- ▶ Злой, раздражительный, вспыльчивый, не любит, когда к нему прикасаются, не терпит никакого приближения.
- ▶ Требуем многого, но отвергает это сразу же, как только ему это предлагают (Ant-t., Bry., Cham., Staph.).
- ▶ Истерики и другие виды деструктивного поведения, требующие внимания в то самое время, когда родители больше всего заняты своими делами.
- ▶ Стервозный и чувствительный (Staph.), отталкивающий, раздражительный, упрямый и недовольный.
- ▶ Геринг описывает детей цина как хнычущих, жалующихся и беспокойных, даже во сне; они не просыпаются и пяти минут, как начинают плакать. Ребёнка приходится постоянно укачивать, носить на руках или качать на коленях, днём и ночью; они не хотят, чтобы их трогали; они требуют многого, но отвергают всё, как только им предлагают; они никогда ничем не довольны и недовольны, всегда неохотно соглашаются и капризничают.
- ▶ Злонамеренный, злонамеренный.

Тело

- ▶ Темные волосы; бледная кожа; темные круги вокруг глаз; пухленький; румяный.
- ▶ Эксперты по копанию и сверлению: Он постоянно копает и сверлит раздраженный нос или анус (любит тереться носом или анусом о кровать, подушку или плечо медсестры).
- ▶ Болезненно-белое или синюшное окрашивание кожи вокруг рта и темные круги под глазами или одна щека красная, а другая бледная (Cham.).
- ▶ Дети, зараженные глистами, испытывают жалобный плач, скрежет зубов, волчий голод и тягу к сладкому.
- ▶ Чем сильнее голод, тем значительнее потеря веса.
- ▶ Несмотря на слабость и истощение, ребенок обладает удивительной силой и яростно бьет любого, кто приближается к нему.

Cina похожа на Ant-c., Bry., Cham и Staph.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕЖДУ ЧАМАМИ И КИТАЙЦАМИ

РОМАШКА	КИТАЙ
Жесткий.	—
Оскорбительный.	—
С любовью.	—
Жалобы, основанные на неуважении.	Жалобы через обвинения.
Гнев: С красным лицом; при пробуждении; от боли.	Гнев: От ласк; от кашля.
—	Грызть ногти.
—	Зябкий; чувствителен к любому сквозняку.
—	Скобки ++.
Желание: кофе.	Пристрастия: манго и сладости; отвращение к молоку и ухудшение от него.
Диктаторский.	—
Боязнь шума, ветра.	Страх, когда к нему кто-то приближается.
Легко пугается.	—
—	Крайне чувствителен, вообще не выносит никаких развлечений.
Жесты: Вытирает лицо.	Жесты: Прикасается к носу и губам.
Полный ненависти и мыслей о мести.	—
—	Голова чувствительна к малейшему удару.
—	Чувство голода после рвоты или даже после обильного приема пищи.
Нетерпеливый.	—
Безутешно.	—
—	Постоянная зевота.
Неравномерное покраснение одной щеки и бледность другой.	Очерченное красное пятно на щеке или бледность вокруг рта и носа.
Раздражительность по утрам, после вставания или при пробуждении.	Раздражительность при кашле; лучше от быстрого покачивания.
Ревность.	—

РОМАШКА	КИТАЙ
Шаг.	—
стоны в жару; непроизвольный; из-за боли.	Стоны во время кашля.
—	Упрямый как мул.
Гнев через боль.	—
Не приемлет вмешательства по эмоциональным причинам.	Не приемлет вмешательства по физическим причинам.
Беспокойство из-за боли.	Беспокойство после пробуждения.
Грусть через музыку.	—
Чувствительность к ветру и после употребления кофе.	Чувствителен к выговорам.
Плач при коликах или боли (особенно в ушах); при лихорадке.	Крики при прикосновении или при пробуждении.
Стул: Зеленый.	Стул: белый.
Плач: Без причины; в жаркую погоду; с кашлем; постоянный; жалкий; с сонливостью.	Плач: Непроизвольный; после кашля; по пустякам.

Другие важные симптомы

Дух

- Отвращение к тому, когда его **глядят** ; это его злит и он плачет.
- **Грызть ногти.**
- Ребенок хочет **потрогать все, что находится на столе** (Bell., Merc., Tarent., Thu.).
- **Привязывается** к близким, особенно к матери или любимой игрушке.
- Большинство психологических симптомов **усиливаются после пробуждения**: тревога, раздражительность, нытье, стоны, крики, беспокойство, плач.
- Жалобы, вызванные гневом, шоком и обвинениями.
- Отвращение к присутствию незнакомцев.
- Расстройства поведения у детей, которые ведут себя непослушно, упрямо, дерзко, злобно, грубо, непослушно и неуправляемо; они прыгают, щипаются, дерутся , топают ногами, бросают предметы и устраивают истерики.
- Ребенок жалобно плачет и кричит, когда кто-то смотрит на него, приближается к нему или трогает его; он спокоен только тогда, когда его носят на руках или качают.
- Раздражительность и гнев по пустякам у детей, у которых режутся зубы или которые страдают от глистов; они становятся спокойными только тогда, когда их несут на плече или энергично качают.
- Много гримасничает и жестикулирует руками.

- Преждевременно развивающиеся дети (Lach., Med., Verat.).
- Чувствителен к выговорам, легко раним.

Голова

- , когда **им расчесывают волосы** (Арн.).
- **Сильные истерики, когда приходится стричь волосы** (Bell., Tub.).
- Холодный, липкий пот на лбу.
- Сильная головная боль из-за заражения глистами, усиливающаяся от напряжения глаз, солнечного света, давления.
- Результаты теста:
 - Ребенок постоянно опускает голову, как будто не может держать ее вертикально.
 - Энцефалит.
 - Гидроцефалия.
 - Непроизвольные подергивания, вращения или запрокидывания головы при менингите или энцефалите.

Глаза

- Астенопия вследствие недостатка аккомодации (Art-v.).
- Желание постоянно тереть глаза.
- Светобоязнь.
- Нарушение зрения после мастурбации (Ph-ac.).
- Результаты теста:
 - **Темные круги** вокруг глаз.
 - **Запавшие глаза** (Chin., Puls.) с болезненным видом вокруг глаз.
 - Амблиопия.
 - Астенопия.
 - Сходящееся косоглазие.
 - Закатывающиеся или устремленные вверх глаза.
 - Расширенные зрачки.

Уши

- **Постоянно сверлит уши пальцами** (Сил.).
- отит .

Нос

- Постоянное **желание ковырять в носу** до крови (Arum-t., Nat-m., Sil.), особенно у детей с поражением мозга.
- Постоянное потирание и чесание носа.
- Насморк с заложенностью носа, особенно вечером.
- Приступы сильного чихания (Nat-m.).
- Результаты теста:
 - **Пот на носу** (Nat-m., Ruta, Tub.).
 - Втянутые ноздри (Carbo-veg.).
 - Заостренный, узкий нос (Camph., Verat.).

Лицо

- При пробуждении лицо пылает краснотой.
- Результаты теста:
 - **Жевательные движения челюстей** (Bell., Hell., Merc., Stram.).
 - **Постоянно дергает губы** (Arum-t., Bry., Stram.).
 - **Осунувшееся лицо** (Ant-t., Carbo-veg., Dig., Op.) с болезненным выражением.
 - Синюшный оттенок кожи вокруг рта (Acon., Cupr., Verat.).
 - Холодный пот на лице (Camph., Carbo-veg., Merc-s., Verat.).
 - Linea nasalis (выраженная бледность между носом и верхней губой) (Ant-t., Ipec., Stram., Tarent.).
 - Одна сторона красная, другая бледная (Acon., Cham., Ipec., Mosch.).

РОТ

- Затрудненное **прорезывание зубов** (Borx., Calc., Sil.).
- Ребенок хочет откусить кусочек стекла во время еды.
- Зубы чувствительны к холодному воздуху и холодной воде.
- Результаты теста:
 - **Чистый язык** (Ars., Ipec., Rhus-t.).
 - Спастическое высывание языка.

ШЕЯ

- Он не может глотать ничего, кроме жидкости (Bapt., Crot-c., Crot-h.).
- Ощущение удушья с постоянным желанием сглотнуть.

ЖЕЛУДОК

- Изменчивый или **капризный аппетит**, чувство голода, возникающее вскоре после еды или в необычное время.
- Дискомфорт в желудке из-за **эмоционального возбуждения** (из-за гнева или выговора).
- **Булькающие звуки в желудке во время питья.**
- **Повышенная тяга к еде после еды**; младенцы постоянно хотят есть грудь.
- Очень **хочется пить.**
- Спастические боли в желудке после еды.
- Пустой желудок, не испытывающий облегчения после еды.
- Тошнота и сильная рвота с чистым языком.
- Рвота и диарея сразу после еды и питья.
- Ухудшение: хлеб, грудное молоко (Sil.), перец и сладости (Arg-n., Ign., Sulph.).
- Отвращение: пахта, пища (после небольшого приема пищи) и грудное - молоко (Borx.).
- Пристрастия: хлеб, **холодные напитки**, холодная пища, **манго** (Chin., Mag-m., Puls.) и **сладости.**

ЖИВОТ

- Спастическая, щемящая боль у младенцев и маленьких детей, усиливающаяся перед дефекацией; **уменьшающаяся от надавливания и в положении лежа на животе.**

- Результаты теста:

- Вздутый, твердый живот (Carbo-veg., Cic., Sil.).
- Паховая грыжа у детей (Aug., Nit-ac., Nux-v.).
- *Tabes mesenterica* (набухание мезентериальных лимфатических узлов при туберкулезе: Bar-c., Calc., Iod., Tub.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея, усиливающаяся в течение дня, во время **прорезывания зубов, в теплую погоду** и сразу после еды или питья.
 - Перед дефекацией: колики.
 - При дефекации: выделение **круглых червей**.
 - Сопутствующие симптомы диареи: склонность много плакать, злиться и раздражительна.
- **Зеленоватый**, слизистый, желчный стул или белый, как мелкие кусочки **попкорна**, с красноватой слизью.
- **Зуд вокруг ануса**.
- Периодические жалобы на заражение глистами у истощенных детей; - ухудшается с каждым полнолунием.
- Результат теста:
 - Кал: острицы (Bar-c., Nat-m., Sabad.), **круглые черви** (Gran., Spig., Sulph.) и членики ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Спастический энурез с непроизвольным ночным мочеиспусканием, особенно в первой фазе сна (Caust., Kreos., Ph-ac., Sep.), чаще встречается во время полнолуния.
- Моча мутная, мутная, молочная (Apis, Aug., Lys.) и похожа на сыворотку.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Склонность к мастурбации.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Черви мигрируют через промежность и проникают во влагалище, вызывая возбуждение и чрезмерную мастурбацию (Calad.).
- Менструации начинаются слишком рано; менархе наступает раньше нормального возраста (т.е. до наступления половой зрелости).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Раздражение и щекотание в гортани, как от пыли.

ДЫХАНИЕ

- **Задыхающийся воздух при кашле.**
- Нерегулярное, прерывистое, учащенное дыхание с прерывистым вдохом.
- Громкий, свистящий вдох.
- Хриплое дыхание при ходьбе на свежем воздухе.
- Результат теста:
 - Хрипы.

КАШЕЛЬ

- Жалобы, вызванные: **гневом** (Ant-t., Cham., Staph.), прорезыванием зубов, пылью, испугом, **раздражением** (Cham., Ign., Staph.) и **глистной инвазией** (Ter.).
- При кашле: синюшный цвет лица, носовое кровотечение, **рвотные позывы** (Arg-n., Lach., Nux-v.), раздражительность, слезотечение, **стоны** (Bell.), **рвотные позывы со рвотой** (Carbo-veg., Dros., Puls.), чихание, скованность конечностей, потеря сознания и плач.
- После кашля: **хватание ртом воздуха** (корр.); ребёнок бледнеет и боится говорить или двигаться, опасаясь спровоцировать приступ кашля. После кашля из желудка в горло поднимается булькающий звук.
- Бронхит после **кори** (шлак, пульс).
- Кашель влажный вечером и сухой утром.
- Удушающий кашель при вставании утром.

КОНЕЧНОСТИ

- Холодный пот ладоней (Ant-t., Cham., Ipec., Tub.).
- Судороги мышц-разгибателей.
- Нижние конечности согнуты или подтянуты к животу (Supr., Hyos., Plb.).
- Спастические сокращения мышц и сухожилий кистей и пальцев.
- Дергает руку из стороны в сторону; левая нога находится в постоянном, - судорожном движении.

СПАТЬ

- Дети, которые могут спать только если их качать всю ночь (Carc, Stict).
- Ночное недержание мочи во время первого сна (сент.).
- Во время сна: жевательные движения (Bry., Calc., Zinc.), за которыми следует глотание; скрежетание зубами (Bell., Tub.), икота, подергивание и судороги конечностей (Supr., Zinc.), брыканье (Bell., Sulph., Tub.), беспокойство и метание, разговоры.
- Бессонница из-за голода (Chin., Lyc., Phos.) или дискомфорта в животе.
- Ребенок внезапно просыпается, словно от кошмара.
- Спит в коленно-локтевой позе, уткнувшись лицом в подушку.
- Результат теста:
 - Вращение глазами яблоками во время сна.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Жалобы, вызванные: гневом, прорезыванием зубов, летом, глистной инвазией (Acon., Merc.).
- Перед лихорадкой: повышенный аппетит, тошнота.
- Мороз:
 - Поднимающийся холод, начинающийся в груди (Apis, Sep.); сопровождающийся холодным, влажным потом на лбу, поносом (Ipec., Phos.), вздутием живота, дрожью и тряской конечностей с мурашками и желанием тепла, которое не приносит облегчения.
- Нагревать:
 - Сухой, жгучий жар, хуже ночью во время сна, наиболее интенсивный в лице (Merc., Sulph.), голове, руках и

Стопы - могут быть односторонними, как с левой стороны, так и с передней части тела или с верхней половины тела; сопровождаются болью в животе, беспокойством (Phos., Spong.), рвотой с желчью, чистым языком, холодным, бледным лицом с теплыми руками и синюшным оттенком вокруг глаз, кашлем, бредом, диареей, расширением зрачков, одышкой, сильной жаждой или полным отсутствием жажды, головной болью, повышенным аппетитом (Ars., Вгу.), раздражительностью, бессонницей, чиханием и потребностью вытягивать конечности.

- Пот:
 - Холодный, кислый пот, особенно на лбу или верхней части тела, лице и кистях рук, усиливающийся во время сна. Пот сопровождается рвотой и волчьим голодом.
- После лихорадки: повышенный аппетит (Chin.).

КОЖА

- Зуд сухой кожи, облегчающийся при расчесывании (Анас.).
- Результаты теста:
 - Желтуха.
 - Бородавки.

Судороги

- Недомогания от: гнева, **наказания или выговора** (Аgar., Cham., Cupr., Ign.); прорезывания зубов, лихорадки; испуга; кровотечения; прикосновения; **заражения глистами** (Indg., Santin.).
- Перед судорогами: холодные ноги, кашель, головная боль, крик.
- При судорогах: затрудненное дыхание (Cic., Stry.), кашель, расширенные зрачки (Bell.), **пена у рта** (Art-v., Hyos.), остекленевшие глаза, булькающие звуки в горле, крики и скованность конечностей.
- После судорог: головная боль (Bufo, Caust.).

Общий

- **Периодичность** жалоб.
- Жалобы вследствие мастурбации (Con., Staph.) или после кори (Carbo-veg.).
- Хорея, вызванная мастурбацией (Calc.) или глистной инвазией (Spig.).
- Большинство жалоб усиливаются ночью, особенно с 2 до 5 часов утра (Aloe, Kali-c.), летом (Nat-c.), в начале физических упражнений, в новолуние (Nux-v.) или полнолуние (Alum., Puls.); лучше на теплом воздухе и при продолжении физических упражнений.

Источник

- Синоним: *Artemisia maritima*, цитрусовый цветок. Семейство *Asteraceae/Compositae*.

КИНОВАРЕЙ

(Киноварь - Cinnb.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Многие симптомы схожи с симптомами Мерс.
- ▶ Рецидивирующий катар носа и околоносовых пазух.
- ▶ Выделения из носа кровянистые, темные, болезненные, гнойные, густые и желтые.
- ▶ Густые выделения из пазух, стекающие в горло.
- ▶ Рецидивирующий синусит, особенно лобных пазух, с болью в корне носа.
- ▶ Белый язык; пенная, густая слюна с неприятным привкусом во рту.
- ▶ Ценное средство при **хронической фолликулярной ангине** у детей, когда из околоносовых пазух выделяется густая слизь.
- ▶ Стрептококковая инфекция горла, боль усиливается ночью и при глотании.
- ▶ Хорошее средство для изгнания **глистов**.
- ▶ Фимоз с затруднением мочеиспускания.

Источник

- Киноварь — красный сульфид ртути.

Коккус Кактус (Кошениль - Сос-с.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Сильное раздражение и заложенность слизистых оболочек глотки, зева, гортани, бронхов.
- ▶ Густой, белый или желтый насморк с зудом и заложенностью носа, а также постоянным чиханием.
- ▶ Сухой кашель можно облегчить, почистив зубы или прополоскав рот.
- ▶ Постоянное ощущение зуда из-за удлинённого язычка.
- ▶ Горло чрезвычайно чувствительно к контакту с жидкостями или твердой пищей.
- ▶ Вирусный кашель, аллергический кашель или коклюшный кашель; в общем, любой вид кашля.
- ▶ Спазматический, хриплый, удушающий кашель сразу после пробуждения утром. Спазматический кашель ночью, особенно до и после полуночи, или кашель во сне. Кашель усиливается в прокуренных помещениях. Кашель обычно заканчивается рвотой прозрачной, густой слизью. Облегчение наступает от холодной воды или завтрака.
- ▶ В задымленном воздухе ребенок начинает кашлять.
- ▶ Капризный аппетит.
- ▶ Важное средство от эпидемического паротита.

Источник

- *Coccus cacti* получают из щитовки *Dactylopius coccus cacti*, которая - произрастает на растениях рода *Opuntia* в Южной Америке.

COFFEA CRUDA

(Кофе - Кофф.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Добросовестные дети; они чувствуют сильную вину, когда что-то идет не так.
- ▶ Они полны идей и быстры в действиях, но не умеют расслабляться и плохо спят.
- ▶ Высокая активность ума и тела с острым интеллектом, что делает их весьма творческими людьми (Chin., Med., Phos., Sulph., Tub.). Родители часто описывают детей как беспокойных и неутомимых (Lach., Med.).
- ▶ Природа детей мягка, пассивна и утонченна; их легко подавить (Staph.).
- ▶ Поспешная еда и питье (Геп.).
- ▶ Неуверенные в себе дети со слабой силой воли.
- ▶ Феноменальная память, может декламировать длинные стихотворения и быстро запоминать таблицы, логарифмы, химические и физические формулы.

Тело

- ▶ Гиперчувствительность ко всем раздражителям, подобна Cham и Op.
- ▶ Боль ощущается очень сильно; она кажется почти невыносимой и доводит ребенка до отчаяния; он становится настолько беспокойным, что выглядит измученным (также вспомните Чама).
- ▶ Высокие, худые дети с плохой осанкой и темным цветом лица.

При изучении Coffea всегда следует помнить об Acon и Cham. Coffea принадлежит к семейству Rubiaceae, как Chin и Ipсes, и его следует сравнивать с ними.

Другие важные симптомы

Дух

- **Счастлив и бодр, даже несмотря на лихорадку.**
- **Дети любят находиться в темноте.**
- **скобки.**
- **Память активна до полуночи.**
- **Стоны и крики** от боли, во время лихорадки или во время сна.
- Капризный.
- Раздражайтесь от жалости.
- Либо очень разговорчивый, либо односложный.

- Чрезмерный плач и фактическое отсутствие сна у новорожденных.
- Чрезмерный плач и крики по мелочам.
- Необычайно старательные и творческие дети, которые очень много работают ради своего успеха, чтобы их приняли в группу.
- Страх боли.
- Легко поддается впечатлениям.
- Он говорит, что с ним все в порядке, хотя на самом деле он очень болен.
- Склонность к обморокам из-за внезапных эмоций.
- В гневе бросает предметы.
- Плачет от боли или радости.
- Забавный.

Голова

- **Головные боли**, усиливающиеся при умственном напряжении, **переедании, малейшем шуме**, даже звуке шагов, а также при размышлениях или разговоре.
- **Мигрень у гиперактивных и умных детей.**
- Результат теста:
 - Кровоизлияния в мозг.

Глаза

- Результаты теста:
 - **Расширенные зрачки.**
 - Яркие и сияющие глаза.

Уши

- **Отвращение к шумам; они причиняют ему боль.**
- Очень острый слух.

Нос

- Очень острое обоняние.

Лицо

- Результаты теста:
 - **Одна щека горячая и красная, особенно при лихорадке, боли или любом возбуждении.**
 - **Ярко-красное лицо с высокой температурой** (также следует рассмотреть возможность хирургического вмешательства).
 - Синюшное изменение цвета вследствие спазма голосовой щели.
 - Пот на верхней губе.

Рот

- **Затрудненное прорезывание зубов.**
- **Скрежетание зубами.**
- Зубная боль **усиливается от теплой пищи и питья и облегчается от ледяной воды во рту.**
- Очень тонкое чувство вкуса.
- Сжимание зубов облегчает симптомы.
- Ночная сухость во рту с отсутствием жажды.

- Результаты теста:
 - Раннее разрушение и кариес зубов.
 - Поспешная речь.

ШЕЯ

- Компульсивное глотание из-за комка в горле.
- Больное горло.
- Результат теста:
 - Удлиненный, красный, воспаленный язычок.

ЖЕЛУДОК

- **Постоянная тошнота с головной болью.**
- **Сильный голод**, особенно перед едой.
- **Повышенная жажда, особенно ночью или при лихорадке.**
- **Расстройства пищеварения у детей раннего возраста.**
- Рвота желчью.
- Иккинг.
- Сильная, кислая и спазматическая отрыжка.
- Не любит: кофе.

ЖИВОТ

- **Повышенная чувствительность к прикосновениям, даже через одежду, особенно во время колик.**
- Ребенок сворачивается калачиком и плачет от колик.
- Задержанный метеоризм.
- Результаты теста:
 - Вздутие живота.
 - Ущемленная грыжа.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Водянистый и безболезненный понос, возникающий вследствие таких эмоций, как гнев, шок и радость.**
- Диарея при прорезывании зубов.
- Ночной зуд в заднем проходе.
- Устранение зловонных газов.
- Результаты теста:
 - Болезненность вокруг ануса.
 - Спастические сокращения сфинктера.
 - В кале: сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Задержка мочи.
- Результат теста:
 - Моча: пониженный удельный вес и глюкоза +.

ГЕНИТАЛИИ

- Крайняя гиперчувствительность половых органов.

- Склонность к мастурбации.
- Сладострастный зуд гениталий.

ГОРТАНЬ

- Laryngismus stridulus (спазм голосовой щели).
- Грубый или хриплый голос при пробуждении утром.
- Вирусный ларингит.

ДЫХАНИЕ

- Аллергическая бронхиальная астма.
- Астма после эмоций у нервных детей.
- При кашле дыхание становится учащенным.

КАШЕЛЬ

- **Постоянный, сухой, отрывистый и спазматический кашель короткими приступами после кори**, при вдыхании и на открытом воздухе.
- **При кашле приходится сворачиваться калачиком.**
- Истощение от кашля.

Грудь

- Результат теста:
 - Рентген: Пневмонический инфильтрат.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Результат теста:
 - Быстрый, полный, учащенный пульс.

НАЗАД

- Ночная потливость спины.

КОНЕЧНОСТИ

- Холодный, влажный пот на руках во время письма.
- Подергивания и хореические движения конечностей, особенно рук.
- Результаты теста:
 - Холодность конечностей.
 - Судороги или сокращения сухожилий пальцев.
 - Болезненность между бедрами и на ступнях из-за пота.
 - Склонность сводить колени вместе при ходьбе.
 - Дрожание рук при потягивании или письме.

СПАТЬ

- Беспокойный сон или абсолютная бессонница у новорожденных.
- Сон нарушается малейшим шумом.
- Бессонница после волнения.
- Бессонница после кори.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Лихорадка с ознобом, особенно на открытом воздухе.
- Внутренний холод при внешнем жаре на одной стороне лица и одной стороне тела.
- Повышенная жажда, стоны, крики и вздохи с горячим и ярко-красным цветом лица по мере повышения температуры.
- Лихорадка после травмы.

КОЖА

- Очень чувствителен к прикосновению и давлению одежды.
- Сильный зуд; расчесывание пораженных участков до тех пор, пока они не станут болезненными и не начнут кровоточить.
- Результаты теста:
 - Ветряная оспа.
 - Корь.
 - Пурпура милиарис.
 - Краснуха.
 - Сыпь при скарлатине.

Судороги

- Дискомфорт из-за: прорезывания зубов, волнения и чрезмерной игры или смеха.
- Судороги и спазмы, усиливающиеся при любом движении.

Общий

- Отвращение и ухудшение состояния при нахождении на открытом воздухе.
- Гиповолемический шок после травмы.
- Неврит.
- Повышенная чувствительность к антибиотикам, противосудорожным препаратам или риталину или побочные эффекты от их применения.
- Дрожь по всему телу от радости или шока.

Источник

- Синоним: *Coffea arabica*, кофейное дерево. Семейство Rubiaceae.

КОЛИБАЦИЛЛИН

(Бактерии *E. coli* - Коли.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ *Escherichia coli* (сокращенно *E. coli*) эффективна при лечении детей с рецидивирующими инфекциями почек и мочевого пузыря.
- ▶ В большинстве случаев причиной частого и хронического цистита являются нарушения работы мышц сфинктера или врожденные пороки развития мочевыделительной системы.
- ▶ Моча мутная, едкая и содержит слишком много бактерий.
- ▶ Глистная инвазия, сопровождающаяся воспалением мочевыводящих путей.
- ▶ Плохой аппетит.
- ▶ Тяга к молочным продуктам и яйцам.
- ▶ Ребенок склонен к рецидивирующей диарее.
- ▶ Множество случаев туберкулеза в личном и семейном анамнезе.

КОПАЙВА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

(Копайский бальзам - Сор.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Областью воздействия являются слизистые оболочки мочевыделительной системы и органов дыхания.
 - ▶ Постоянно ковыряться в носу.
 - ▶ Ребёнок очень восприимчив к инфекциям мочевыводящих путей, как правило, из-за ослабленного иммунитета. Рецидивирующий острый или хронический цистит.
 - ▶ Болезненная задержка мочи из-за простуды, холодной пищи или питья, а также холодной погоды.
 - ▶ Частое мочеиспускание в холодную и сырую погоду.
 - ▶ Сильное желание холодной воды и лука.
-
- ▶ Крапивница, сопровождающаяся лихорадкой, запором или расстройством желудка, усиливающаяся ночью.

Источник

- Это дерево из Южной Америки относится к семейству бобовых (Legumino - sae).

КОРАЛЛИЙ КРАСНЫЙ

(Драгоценный коралл - Кор-р.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Сухой насморк, ощущение заложенности носа, сухой нос со скоплением слизи, в основном в пазухах.
- ▶ Потрескавшиеся губы.
- ▶ Также очень хорошее средство от **спазмов голосовой щели**.
- ▶ Доктор Гернси говорит, что кашель напоминает выстрел, длящийся одну минуту.
- ▶ Кашель настолько сильный, что у ребенка перехватывает дыхание, а лицо становится багровым, темным и черным.
- ▶ Кашель начинается с хрипов, затем переходит в многократные, хриплые вдохи, пока ребёнок полностью не истощается. Затем появляется обильное выделение вязкой, липкой и густой мокроты. В редких случаях из-за постоянного кашля возникают носовые кровотечения.
- ▶ Кашель ночью или утром. Лающий крупозный кашель, приступы возникают очень быстро и длятся очень недолго.
- ▶ Спазматический кашель и коклюш.
- ▶ Кашель при любой перемене погоды.
- ▶ Ни одно гомеопатическое средство не может вызвать такие **сильные приступы кашля**, за исключением Cupr. и Pert.
- ▶ Желание съесть кислую и соленую пищу.
- ▶ Большинство симптомов усиливаются после ужина, ночью и на свежем воздухе; укутывание улучшает состояние.
- ▶ Ребенок покрывает голову во время сна ночью.

Источник

- Также часто называется «красный коралл».

КРОТАЛУС КАСКАВЕЛЛА

(Бразильская гремучая змея - Crot-c.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Жалобы, связанные с подавленным гневом и истериками
- ▶ **Носовые кровотечения во время сна, ярко-красные и водянистые**
(Ail., Cros., Ferr-ars., Kali-i., Nit-ac., Psor.)
- ▶ Амбициозный
- ▶ Послушный, но эгоистичный и высокомерный
- ▶ Бодрствующий, внимательный и любопытный
- ▶ Жалобы **после вакцинации**
- ▶ Не переносит тесную одежду (змеи вообще, Calc., Nux-v. и Spong.)
- ▶ Огромный аппетит, но пропадает при виде еды. (Сил)

CUPRUM METALLICUM

(Медь - Cupr.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Амбициозный (Nux-v., Verat.); хочет быть лучшим.
- ▶ Испытывает трудности с проявлением чувств (Nat-m., Sep.), слишком **напряжен** и скован.
- ▶ Осторожный (Игн.) и чрезмерно точный во всем.
- ▶ Диктаторское отношение; любит контролировать других (смех, милосердие), например, друзей, одноклассников, братьев и сестер.
- ▶ Легко пугается (Arg-n., Nat-c.), когда кто-то приближается, когда в доме внезапно гаснет свет, когда лает собака.
- ▶ Плаксивые дети (чам., китайцы), которые не знают, чего хотят; их желания и требования постоянно меняются; никогда не бывают удовлетворены.
- ▶ Зануды, которые добиваются своего; у них много дел, но они хорошо организованы.
- ▶ Самостоятельные дети (Nux-v.), которые не любят просить о помощи (эгоистичные).
 - ▶ Любит брать на себя инициативу (Caust., Lyc.) и ответственность.
 - ▶ Настойчивый (Ferr., Sil.); очень решительный; никогда не сдаётся.
 - ▶ Противоположное поведение: тонкое и озорное или тихое и застенчивое; уступчивое или упрямое; это приводит к эмоциональной нестабильности.
 - ▶ Замкнутые, серьезные на вид дети, которые часто замыкаются в себе из-за своей хрупкости и уязвленных чувств.
 - ▶ Ответственные и сознательные дети, которые ожидают того же от других детей.
 - ▶ Заикание после шока.
 - ▶ Сдержанный и скрытный до секретности (Bar-c., Lyc., Ign.), может быть неумолимым и упрямым.

Тело

- ▶ Универсальное средство от холеры (доктор Клэптон писал, что рабочие медеплавильных заводов всегда были защищены от холеры, хотя все соседи были серьезно больны); также полезно при ротавирусных инфекциях у новорожденных и маленьких детей; не менее важно при сепсисе, вызванном кишечной палочкой или другими грамотрицательными бактериями.
- ▶ Ледяной холод (Camph., Carbo-veg., Laur., Phos., See., Verat.), холодный пот, холодное дыхание и коллапс (упадок жизненных сил) (Ars., Carbo-veg., Hydr-ac., Laur., Op., See., Verat.).
- ▶ Склонность к спазмам и мышечным судорогам в пальцах (сжатые кулаки) и конечностях, в горле (блокировка речи и глотания), а также при поджатых больших пальцах (положение «море»).
- ▶ вызванные шоком (Carc., Op., Stram.) или сексуальным насилием (Ph-ac., Staph.) .

- ▶ Физические жалобы, такие как судороги и нарушения поведения, возникающие вследствие подавления кожных высыпаний (Bry., Zinc.) и подавления потоотделения, особенно потливости ног (Bar-c., Zinc.).
- ▶ Чувствительные дети (Ign., Phos., Puls.), которые эмоционально и физически чувствительны, например, с чувствительной кожей, чувствительным пищеварением; чувствительные натуры. Чрезмерная реакция на всё; например, даже самая маленькая, самая умеренная и простая доза лекарства слишком большая и всё ухудшает. У таких детей Cupr. может снизить чувствительность, а затем правильно подобранные лекарства могут оказывать целебный эффект в течение длительного времени (Кент).
- ▶ Неврологические жалобы или нарушения поведения возникают эпизодически (периодичность).
- ▶ Многие симптомы обычно выражены тяжело: рвота, тошнота, диарея, судороги, судороги и т. д.
- ▶ При кормлении грудью или питье в горле можно услышать булькающий звук, который перемещается в пищевод (Ars., Cina, Hell., Hydr-ac., Laur.).
- ▶ Дети Купр. нервничают до крайности.
- ▶ Очень холодно, но хочется пить холодную воду (Phos.).
- ▶ Все пять чувств обострены и очень чувствительны (Cham., Chin., Coff.).
- ▶ Лижет, как змея (Lach.).

Другие важные симптомы

Дух

- Дискомфорт из-за эмоционального возбуждения или **шока**.
- **Тревожное и угнетенное состояние после испуга** (Carc., Verat.) с покраснением лица, особенно ночью.
- **Афазия вследствие шока** (Hyos.).
- **Отвращение к прикосновениям или ласкам**.
- **При переноске** напрягается и лягается.
- Страх **прикосновения**, темноты, **собак**, движения вниз, хищников, пауков, **незнакомцев**, грозы и воды.
- Боится неудач и поэтому испытывает огромное **волнение** перед экзаменами; нуждается в постоянных заверениях в том, что справится хорошо.
- **Глупое поведение**; проказничает (Белл.), делает **нелепые жесты** и странные гримасы, которые старается скрыть рукой.
- По своей природе **он любит провоцировать** (Гиос.) и особенно любит раздражать животных.
- **Постоянно бегаёт** (Stram., Verat.); совершенно не может усидеть на одном месте, даже когда пора спать; его очень трудно удержать в постели; беспокойно ворочается.
- Склонность **шутить и раздражать других**.
- **Подражание** (Страм.) учителям и другим детям в классе.
- Задержка развития у детей.

- На другом конце спектра мы видим застенчивых, слабых, робких детей, которые не могут выступать перед классом или ходить на вечеринки.
- Лживые (Лаж.), хитрые и злобные (Канн-и.) дети.
- Грязные дети; испражняются на пол (сентябрь).
- Импульсивный.
- Малыш обычно выплевывает соску или кусает ее, когда злится.
- Любит растения.
- Музыка упрощает жизнь.
- Судорожный, чрезмерный смех.
- Любит цепляться за мать, когда ее носят на руках, потому что боится упасть (Ворх.).
- Плачет при малейшей эмоции.

ИСТЕРИКИ

- Отвращение к прикосновению.
- Кусать.
- Хочет, чтобы его несли.
- Прижимание: ребенок крепко держится за мать.
- Шкуры.
- Вой.
- Безутешно.
- Нахальный.
- Упрямый, упрямый.
- Дергает за волосы (свои или других).
- Ярость с насилием.
- Крик.
- Плевки в лицо другим людям.
- Удары по воображаемым предметам.
- Бьет с яростью.
- Разрывает всё на части.
- Дикость.

ГОЛОВА

- **Зарывает** голову в подушку (Apis, Bell., Hell., Stram., Tarent., Tub.).
- **Подавление кожных высыпаний** (атопическая экзема, контактная аллергия, импетиго, контагиозный моллюск [molluscum contagiosum], чесотка) **приводит к воспалительным заболеваниям головного мозга** (энцефалит) **и мозговых оболочек** (менингит) (Cupr-act., Zinc.).
- Сильная головная боль, особенно между глазами, над корнем носа; сопровождается тошнотой и рвотой; усиливается от испуга, кашля или надавливания; облегчается от теплого укутывания (Mag-p.).
- Результаты теста:
 - Острая гидроцефалия с менингитом.
 - Не может держать голову вертикально.
 - Холодный пот на лбу.
 - Судорожные движения головы, вращение или запрокидывание головы.

- Голова откинута назад (Cic., Hyos., Stram.).
- Символ Кернига ++.
- МРТ [магнитно-резонансная томография]: кровоизлияние в мозг, гидроцефалия.
- Дергает за волосы.

Глаза

- **Слезотечение с кашлем** (натур., пульс.).
- Результаты теста:
 - **Постоянное движение глазных яблок**, даже при закрытых веках.
 - Паралич **верхней косой мышцы глаза** (Арн., Сенег.).
 - Воспаление слезного мешка.
 - Расширенные зрачки, нечувствительные к свету.
 - Глаза закатились вверх (Bufo., Laur.).
 - Нистагм с произвольными маятникообразными движениями глазного яблока из стороны в сторону.
 - Зрачки не реагируют на свет.
 - Пристальный, блестящий, сверкающий или остекленевший взгляд.
 - Ячмень.
 - Запавшие глаза.
 - Подергивание век.

Нос

- Катар распространяется на лобные пазухи (Лус., Мерс.).
- Носовые кровотечения с выделением темной, черной крови, особенно из правой ноздри, при сморкании.
- Частое чихание с обильным, зловонным, водянистым насморком.
- Насморк и заложенность носа с водянистыми выделениями.
- Результаты теста:
 - Веерообразные движения ноздрей (Chel., Spong.).
 - Острый нос (предательство).

Лицо

- Результаты теста:
 - **Цианотичное** лицо с синюшным оттенком вокруг рта (Carbo-veg., Lach., Verat.).
 - **Лицо Гиппократ** (Aeth., See.) с тревожным, мучительным, испуганным, заостренным, болезненным выражением и синеватым оттенком вокруг глаз.
 - Жевательные движения (лай, тяжелое дыхание).
 - Стиснутые челюсти (Glon., Op.).
 - Потрескавшиеся губы.
 - Темное или синевато-красное лицо при гнев, кашле или судорогах.
 - Искривление мышц лица.
 - Ярко-красное лицо (Phos., Sulph.).
 - Бледное, осунувшееся лицо.
 - Блестящее лицо покрыто ледяным потом.

РОТ

- **Затрудненное прорезывание зубов.**
- Во время еды откусывает кусочек стекла.
- Испытывает трудности с речью из-за хореи или спазмов в горле или языке.
- Результаты теста:
 - Постоянное **скрежетание зубами** (Apis, Ars., Bell., Cina) или стискивание зубов.
 - **Двигает** высунутым **языком вперед и назад** или щелкает им, как змея (Lach., Merc., Vip.).
 - Сухой, потрескавшийся язык с увеличенными, выступающими сосочками, белым налетом в центре и красными краями.
 - Пена у рта.
 - Десны красные, чувствительные и отступают.
 - Заикание.

ШЕЯ

- **Спазмы пищевода вызывают у ребенка рвоту при глотании жидкости**, вытекающей из носа.
- Левосторонние жалобы на боль в горле и миндалинах, облегчающиеся от теплого питья (Ars., Lys., Hep.).
- Рецидивирующий тонзиллит со склонностью к затвердению и нагноению.
- Результаты теста:
 - **булькающие звуки** в горле, особенно при **глотании жидкостей**.
 - Красный суппозиторий.
 - Кривошея с поворотом головы вправо.

ЖЕЛУДОК

- **Частая жажда с желанием пить небольшое количество холодной воды.**
- Внезапная тошнота, **рвота** с икотой и позывами на рвоту, вследствие ротавирусной инфекции, сразу после еды, с одновременными позывами на дефекацию; **улучшение от питья холодной воды** (Bry., Phos., Puls.).
- Жадный в еде и питье (Гиос.).
- Рвота желчью, похожая на рисовый отвар или зеленая, с неприятным запахом.
- Медленное пищеварение.
- Сильные спазматические и режущие боли в эпигастрии, отдающие в спину, с ощущением тяжести под грудиной и тошнотой; хуже от прикосновения или после молока; лучше от тугой повязки на животе.
- Обострение: бобы, хлеб, капуста, холодная пища, жир, пища, вызывающая метеоризм, **молоко**, горох.
- Не любит: картофель (особенно вареный).
- Пристрастия: Холодные напитки, холодная еда, холодная вода, деликатесы, теплые и дымящиеся горячие напитки, **теплая и дымящаяся горячая еда**.

ЖИВОТ

- **Колики у младенцев** от любого испуга, гнева или волнения; усиливаются от холодной воды; уменьшаются от давления.

- Периодические сильные, спазматические боли в животе у младенцев и детей младшего возраста после кормления грудью или употребления овощей, до и после дефекации или рвоты, при движении (при ходьбе) или при прикосновении к животу; **лучше в положении лежа** (особенно на животе), **при прикладывании местного тепла** или накладывании повязки, или при свертывании калачиком.
- Результаты теста:
 - Чрезмерно горячий и чувствительный к прикосновению.
 - Инвагинация (заворот кишечника) (Op., Plb., Verat.).
 - Тимпаническое вздутие живота.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея после употребления овощей, **во время прорезывания зубов**, в теплую погоду, сопровождающаяся тошнотой, рвотой и спазмами.
- Диарея, чередующаяся с запорами.
- Стул, похожий на рисовый отвар, с хлопьями, часто, но **никогда не очень обильный**, или зеленовато-черный водянистый стул при холере, с сильными спазмами и икотой.

ХОЛЕРА И ГАСТРОЭНТЕРИТ

- **Чрезмерная жажда.**
- **Обильные выделения** из желудка (рвота) и кишечника (диарея).
- Ребенок очень **замерзает**, поэтому ему требуется много одеял и одежды, чтобы согреться (в отличие от Camph.).
- Постоянный дискомфорт.
- Желание теплой еды и питья.
- Употребление холодной воды облегчает рвоту.
- Беспокойное ворочение.
- Слабые мышечные подергивания.
- Холодный кончик языка.
- Сильные спазмы в животе и икроножных мышцах вследствие гипонатриемии.
- Сильная рвота желчью и водой с сильными коликами в желудке и животе.
- Результаты теста:
 - Сильное истощение.
 - Посинение вокруг ногтей.
 - Обезвоживание от I до III степени.
 - Низкое кровяное давление.
 - Гиповолемический шок.
 - Сильное похолодание тела с холодным потом.
 - Пятнистая, мраморная и темная кожа.
 - Влажная кожа.
 - Спастическая деформация лица.
 - Кал: гной +, эритроциты +, острицы и членики ленточных червей.
 - Запавшие, глубоко посаженные глаза.
 - Тахикардия.
 - Тахипноэ.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

CUPRUM METALLICUM	КАМФОРА ЛЕКАРСТВЕННАЯ	АЛЬБОМ VERATRUM
—	Потливость вокруг ануса.	Обильное потоотделение.
—	Асцит.	—
Заболевания желчного	—	Заболевания желчного пузыря.
—	Холодные конечности.	Холодные конечности.
—	Холодный лоб.	Холодная корона.
Холодный пот на лбу.	—	Холодный пот на лбу.
Судороги ++.	Небольшие судороги.	Небольшие судороги.
Смертельная тошнота.	Смертельная тошнота.	—
Вздутие живота.	—	Вздутие живота.
—	Легко возникает шок.	—
—	Ранняя задержка мочи.	—
Твердый живот.	—	Твердый живот.
Иккинг.	—	Иккинг.
—	—	Непроизвольный стул при вздутии живота.
Небольшая жажда.	Сильная жажда.	Сильная жажда, требующая больших объемов пищи через
Острицы.	—	Круглые черви.
—	—	Понос с пристрастиями к еде.
Удушье из-за диареи.	—	—
Беспокоит желудок и одежда.	—	—
Стул: - Темный - Слоеный - С давлением - Зеленый - Вонючий.	—	Стул: - Темный - Слоеный - С давлением - Зеленый - Вонючий.
Рвота: - кофейная гуща - Фекальный - Жестокий - Пенистый и зеленоватый - Вонючий - Похож на рисовый отвар.	—	Рвота: - Фекальный - Жестокий - Пенистый и зеленоватый - Зловонный - Похож на рисовый отвар.
Рвота во время диареи.	—	Рвота во время диареи.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Задержка мочи вследствие гиповолемического шока (camp., op., see., verat.) или вследствие врожденных аномалий или врожденного стеноза тазового отдела мочеточника вследствие врожденной обструкции почечного соединения.
- Острая почечная недостаточность.
- Обильная мутная или темно-красная, зловонная моча при большинстве состояний (головная боль, рвота, эпилепсия).
- Непроизвольное, частое, ночное мочеиспускание.
- Болезненная задержка мочи при холере.
- Полезно для детей со значительным анамнезом или семейным анамнезом почечнокаменной болезни.
- Результаты теста:
 - Моча: Альбумин ++, Эритроциты ++, Сахар ++.
 - Моча оставляет на подгузнике неприятно пахнущий красноватый осадок, который трудно вымыть.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Задержка яичек (Aug.).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Хриплый, грубый, надтреснутый голос при плаче, чтении вслух или громком пении, а также из-за сухого, холодного воздуха; мешает говорить.
- Сужение гортани при кашле.
- Ларингоспазм, усиливающийся при попытке глотать.
- Спазмы голоса (бром, хлорид).

ДЫХАНИЕ

- Одышка после **внезапных эмоций** (гнев, волнение, испуг, раздражение), от смеха, в сырую погоду, от ходьбы против ветра или бега; хуже после полуночи и **лучше от наклона назад или глубокого вдоха**; во время приступа не может держать платок перед лицом.
- **Одышка при кашле или плаче.**
- Внезапные приступы спастической астмы после эмоционального возбуждения, холодного воздуха или ветра, подавленные кожные высыпания; **ухудшение после полуночи (3–4 часа утра)** с синюшным цветом лица.
- Астма, чередующаяся с кожными высыпаниями (особенно экземой).
- Синдром гипервентиляции вследствие повреждения головного мозга.
- Частая необходимость делать глубокие вдохи.
- Результаты теста:
 - Спастическое, нерегулярное, прерывистое дыхание, **хватание ртом воздуха при кашле.**
 - **Хрипы** при медленном вдохе.
 - Дыхание Чейна-Стокса.
 - Холодное дыхание.
 - Гипервентиляция.
 - Хриплое, хриплое дыхание.
 - Дыхание вздохов.
 - Затрудненное дыхание.

КАШЕЛЬ

- Жалобы, вызванные: холодом, сухим ветром (особенно на море), прорезыванием зубов, входом в теплое помещение со свежего воздуха, **корью**.
- Перед кашлем: тревожное выражение лица.
- Во время кашля: **ребенок становится очень напряженным**, лицо приобретает темно-синюшный оттенок, появляются **рвотные позывы** (Agar., Cina), тошнота, **дрожание конечностей** (Bell., Phos.) или подергивание пальцев рук и ног.
- После кашля: рвота.
- Постоянный кашель, сопровождающийся пенистым слюноотделением и носовыми кровотечениями, приводящий к **потере сознания** (Cina, Kali-c.).
- Кашель усиливается от глубокого дыхания, твердой пищи, смеха, разговора (не может говорить без кашля); **уменьшается от холодного питья** (Am-caust., Caust., Coc-c., Iod., Kali-c., Op., Sulph., Verat.).
- **Продолжительный приступ кашля** (с отрыжкой, рвотным корнем), напоминающий круп.
- Внезапный, сухой, изнуряющий, постоянный, хриплый или спастический, удушающий, сильный кашель ночью, в виде непрерывных приступов, из-за раздражения или щекотания в гортани, мешает спать.

Грудь

- Болезненное сжатие грудной клетки после еды или питья, от гнева, от кашля или перед рвотой; хуже от прикосновения.
- Спазмы в груди при кашле.
- Результаты теста:
 - Посинение в области ключиц.
 - Рентгенограмма грудной клетки: затемнение легких.

НАЗАД

- Результат теста:
 - Опиостотонус.

КОНЕЧНОСТИ

- Пальцы сжаты вместе (особенно большой палец подтянут внутрь) (cis, mere, stann), их трудно выпрямить.
- Ледяные руки и ноги.
- Попеременное сгибание и разгибание конечностей.
- Холодный пот на руках и ногах, особенно между пальцами.
- Судороги в конечностях, особенно в икрах, пальцах ног и рук.
- Нижние конечности судорожно подтянуты вверх, лежит с подтянутыми бедрами.
- Ногти: ломкие, синие и бледные.
- Подергивание пальцев рук и ног при кашле и во время сна.

СПАТЬ

- Во время сна: подергивание нижних конечностей, веки полуоткрыты, рот и глаза искажены, лепет, стоны, обильное пенистое слюнотечение, беспокойство и метание, урчание в животе, храп, подергивание пальцев рук и ног.

- Малыши не спят до 2 часов ночи и часто зевают.
- Спит на животе, в спазмах подбрасывает таз вверх.

КОЖА

- При кори, когда сыпь еще не появилась, наблюдается сильный зуд, не облегчающийся расчесыванием.
- Результаты теста:
 - Обморок с синюшно-цианотичной кожей, холодной как лед.
 - Желтуха.
 - Геморрагическая пурпура [кожное кровотечение].
 - Чувствительный к прикосновениям.

Судороги

- Недуги: **После наказания**, из-за сотрясения мозга или черепно-мозговой травмы, во время колик, **прорезывания зубов**, лихорадки, эмоций (гнев, страх, раздражение и т. д.), из-за почечной недостаточности, подавленной секреции или кожной сыпи и **глистов**.
- Перед судорогами: лай, беспокойство, икота, смех, тошнота, учащенное сердцебиение, рвота, крик, временная потеря зрения, тимпаническое вздутие живота и рвота.
- Во время судорог: тревожное выражение лица, астматическое дыхание, **укусы себя и других**, укусы языка, сведенные и втянутые внутрь большие пальцы рук, **холодные руки и ноги**, холодный пот, кашель, падение вперед, пенное слюноотечение (Art-v., Bufo, Cina, Hyos.), икота, **непроизвольное мочеиспускание** или полная задержка мочи, смех, лежание с расставленными конечностями, лежание на животе со спастическим подергиванием таза вверх, бледное или темно-синевато-красное лицо, **крики ярости** (Apis, Bell., Hyos., Plb., Stram.), бессонница, спазмы и попеременное сгибание и разгибание конечностей (особенно начинается с пальцев рук и ног), тетаническая ригидность, потеря сознания с фиксированным взглядом и плачем.
- После судорог: **холодный пот**, обильное мочеиспускание, сонливость, головная боль, смех, односторонний паралич, бессонница, побои, рвота и **слабость**.
- Периодические судороги каждые 2–3 недели.
- Хуже ночью, во время сна, во время дефекации или рвоты, от холодных напитков.

Дифференциальная диагностика препаратов CUPR., PLV. и ZINC при судорогах:

CUPRUM METALLICUM	PLUMBUM METALLICUM	ЦИНК МЕТАЛЛИКУМ
Жалобы, вызванные:		
Гнев, особенно у новорожденных.	—	—
После кашля.	—	—
После наказания.	—	—
После неприятностей.	—	—
Во время прорезывания зубов.	—	Во время прорезывания зубов.
—	Во время еды.	—

CUPRUM METALLICUM	PLUMBUM METALLICUM	ЦИНК МЕТАЛЛИКУМ
Жалобы, вызванные:		
Во сне.	—	—
Во время дефекации.	—	—
Возбуждение.	—	Возбуждение.
Страх.	—	—
Шок.	—	Шок.
Рана.	—	—
—	Мастурбация.	—
Подавление кожных высыпаний.	—	Подавление кожных - высыпаний.
Черви.	—	—
Во время эпилепсии:		
Прикус языка.	—	—
Сжатые пальцы, особенно большие.	—	—
клонический.	клонические или тонические.	—
Судороги: попеременное сгибание и разгибание.	—	—
Судороги с укусами.	—	—
Судороги с цианозом.	—	—
Синюшное лицо.	Синюшное лицо.	—
Бледное лицо.	Бледное лицо.	Бледное лицо.
Красное лицо.	—	—
Пена у рта.	Пена у рта.	—
Непроизвольное мочеиспускание.	Непроизвольное	Непроизвольное
Левая сторона тела.	Левая сторона тела.	—
—	Зрачки расширены.	—
Крик.	—	—
—	—	С гидроцефалией.
—	—	При менингите.
Ухудшается от холодных напитков.	—	—
Ухудшение в новолуние.	—	—
После эпилепсии:		
Обильное выделение мочи.	—	—
Головная боль.	—	—
Беспокойство.	—	—
Рвота.	—	—

ХОРЕЯ

- Жалобы, связанные с **испугом**, подражанием, подавленными кожными высыпаниями.
- Хуже на холодном воздухе, ночью, **во время новолуния; лучше лежать на спине** или во сне.
- Односторонняя периодическая хорея (особенно слева) с коричневатой окраской языка, который дрожит при высовывании.

Общий

- **Остановка развития.**
- Жалобы из-за частого приема железа, потери жидкости, недостатка сна, подавленной потливости ног, подавленных кожных высыпаний и после вакцинации.
- Анемичные, зябкие дети, которые вообще не переносят холодный воздух.
- Хрупкие кости.
- Холодные ванны улучшают состояние (Apis, Calc-s.).
- Асцит вследствие заболевания печени.
- Потеря веса, несмотря на тягу к еде, у детей с ювенильным диабетом.
- Пульс: частый, прерывистый, малый, мягкий, слабый и едва ощутимый.

CYPRIPIEDIUM PUBESCENS

(Венерин башмачок - Кипр.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Симптомы очень похожи на симптомы Валера.
- ▶ Нервные и беспокойные дети, которые очень подвержены расстройствам желудка и пищеварения.
- ▶ Нервное возбуждение, характеризующееся тревогой ожидания, сильным страхом по ночам, смехом во сне, непреодолимым желанием бодрствовать и играть ночью, беспокойством, бессонницей, хореей, судорогами, подергиваниями и слабостью. Эта чувствительность может быть вызвана прорезыванием зубов или пережитым горем.
- ▶ Нервная слабость после любой вирусной инфекции, особенно после гриппа.
- ▶ Склонность к судорогам во время прорезывания зубов или после лишения сна.
- ▶ Чрезмерное употребление матерью во время беременности стимуляторов, таких как чай или кофе, может вызвать у новорожденного ребенка кипрское состояние.
- ▶ перевозбуждение мозга во время прорезывания зубов приводит к состоянию повышенной эмоциональной возбудимости, при котором ребёнок становится крайне беспокойным, капризным и раздражительным. Он ломает вещи и начинает деструктивно себя вести.

Источник

- Относится к семейству орхидных (Orchidaceae).

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА

(Дезоксирибонуклеиновая кислота - Des-ac.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Основное средство в гомеопатии для детей с задержкой умственного развития, особенно после родовых травм или вследствие ишемических энцефалопатий, а также после послеродовых инфекций.
- ▶ Расстройства развития вследствие эмоционального насилия.
- ▶ Синдром Дауна, синдром ломкой X-хромосомы (синдром Мартина-Белла) и другие наследственные дегенеративные заболевания центральной нервной системы.
- ▶ Задержка и замедление развития.
- ▶ Лицо ребенка бесстрастно, он очень неуверен в себе.
- ▶ Множество ошибок в устной и письменной речи; упрямство; преждевременное половое развитие с задержкой умственного развития.
- ▶ Желание побыть в одиночестве. Несмотря на неуверенность в себе, он очень независим и не нуждается в помощи.
- ▶ Многие аллергии, например, респираторные аллергии; астма, усиливающаяся в положении лежа или после полуночи.
- ▶ Сильная тяга к газированным напиткам, коле, картофелю и сладостям.
- ▶ Тошнота во время вождения.
- ▶ Травмы костей не заживают очень долго.
- ▶ Храп во сне из-за катара околоносовых пазух.

Источник

- Познакомился с гомеопатией благодаря доктору Отону-Андре Жюльену из Франции.

ДИФТЕРИЙ

(Нозод дифтерии - Diph.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Скрофулезный диатез со склонностью к катару органов дыхания.
- ▶ Хочет, чтобы его держали на руках.
- ▶ Густые жёлтые выделения из носа. Язык влажный, кончик красный.
- ▶ Обильное выделение слизи из носа и рта. Веерообразные движения ноздрей.
- ▶ Покрасневшее лицо.
- ▶ Рецидивирующая боль в горле с увеличением и уплотнением шейных лимфатических узлов. Глотание становится крайне затруднённым. Горло тёмно-красное; миндалины покрыты толстым творожистым налётом; изо рта исходит резкий неприятный запах. Боль в горле сопровождается выраженной притуплённостью и ступором. Ранними признаками этого заболевания являются потливость и слабость. Боль на удивление незначительна по сравнению с воспалением и интоксикацией.
- ▶ Большинство **упорных случаев тонзиллита** поддаются лечению этим средством.
- ▶ В анамнезе рецидивирующий бронхит.
- ▶ Сильное желание холодных напитков.
- ▶ Кожа сухая, ладони горячие.
- ▶ Разговоры во сне.
- ▶ Выраженное потоотделение.
- ▶ Тяжёлые последствия прививок.

Источник

- Этот нозод получают путем потенцирования дифтерийной палочки или мембраны больного пациента палочки Клебса-Левина.

ДИФТЕРОТОКСИН

(Дифтерийный токсин - Diphthox.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Медлительные и глупые дети.
- ▶ Насморк с толстыми, зловонными корками в носу.
- ▶ Повторяющиеся боли в горле или тонзиллит.
- ▶ Боль в горле; глотание затруднено.
- ▶ Сильная боль в горле, усиливающаяся от холодного воздуха и уменьшающаяся от холодных напитков.
- ▶ Склонность к рецидивирующему бронхиту с влажным, спазматическим кашлем и затрудненным отхождением мокроты.
- ▶ Одышка при кашле.
- ▶ Тяжёлые последствия вакцинации против дифтерии.

ELAPS CORALLINUS

(коралловая змея - Elaps),

осмотренная доктором Муре из Бразилии с двумя экспертами

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети матерей, которых бросил партнер во время беременности, что приводит к чувству одиночества и покинутости (Cycl., Kali-br., Plat.)
- ▶ Такие дети часто реагируют чрезмерной злостью.
- ▶ Гнев может вспыхнуть быстро и сильно в ответ на попытки родителей или одноклассников установить границы, подразнить или даже мягко покриковать ребенка.
- ▶ «Наплыв ярости»: бурные вспышки гнева, характеризующиеся внезапной реакцией ребёнка на воспринимаемое оскорбление или отвержение. Отвержение может казаться родителям или окружающим незначительным. Например, если родители запрещают ребёнку что-то делать, это может привести к тому, что ребёнок будет долго кричать, а иногда и бить, пинать или кусаться. Эти вспышки часто происходят во время игры с друзьями. Они могут быть связаны с правилами или результатами игры. (Нер., Мерс., Tarent.)
Эту проблему называют «наплывом ярости», поскольку эти вспышки гнева более сильны, чем временная агрессивная реакция, длящаяся всего несколько минут. Во время наплыва ярости ребёнок полностью погружается в свои агрессивные мысли и чувства. Он не может перестать кричать, а в некоторых случаях и физически выплескивать свой гнев, даже когда родители пытаются отвлечь ребёнка или установить границы и наказать его. (Анас., Мед., Syph.)
Следующие разделы наглядно демонстрируют это:
 - Гнев: на себя; когда с ним говорят; кусает себя
 - сварливый
 - Крики, крики
 - Ударять
- ▶ Матери, испытывающие сильное горе по любой причине. Если это продолжается во время беременности, это может привести к заболеваниям у ребёнка, таким как синдром дефицита внимания и гиперактивности, биполярное расстройство или расстройства поведения.
- ▶ Дети, которые предпочли бы жить в сельской местности, чем быть запертыми в городской квартире
- ▶ красивые, подвижные дети, требующие постоянного внимания
- ▶ Страх остаться в одиночестве из-за страха, что может случиться что-то плохое

- ▶ Страхи , связанные с беременностью, когда мать подвергалась насилию и эмоциональной травме со стороны родственников, мужа или на работе. Это приводит к сильной тревожности у младенцев и детей младшего возраста, проявляющейся в стуке зубов и дрожании.
- ▶ живые и разговорчивые дети

Тело

- ▶ Elaps оказался особенно полезным при заболеваниях ЛОР-органов.
- ▶ хронический и персистирующий синусит в детском возрасте (Hydr., Kali-i.)
- ▶ Черные выделения: ушная сера, носовые кровотечения, слизь из горла, стул, мокрота, ректальное кровотечение и т. д. (Vip.)
- ▶ Почернение различных частей тела, таких как язык или кожа
- ▶ Адинамический сепсис у младенцев с недостаточной массой тела или недоношенных детей (Crot-h., Echi.)
- ▶ У пациентов, которых я лечил, сепсис чаще всего вызывали следующие бактерии : кишечная палочка, золотистый стафилококк, стрептококки группы В , пневмококки и синегнойная палочка.
- ▶ Склонность к подергиванию, судорогам и возможному параличу век , пищевода и конечностей.
- ▶ общий холодный пот

АДИНАМИЧЕСКИЙ СЕПСИС БОТРОПСОВ

- черный язык
- горячее дыхание
- жгучая жажда, холодная вода улучшает
- Стойкое вегетативное состояние
- Делирий, чередующийся с сознательными интервалами
- Диарея сразу после еды, стул хлопьевидный, темный, часто с кровью, с сильной слабостью после дефекации
- сухие губы
- пепельное лицо
- сильное цереброспинальное истощение
- выраженная слабость соматической нервной системы
- сильная слабость и истощение
- Склонность к кровотечениям, например, носовые кровотечения, кровоточивость десен, кишечные кровотечения
- Голова холодная на ощупь
- Непроизвольные испражнения. Часто из широко раскрытого, парализованного ануса выделяется чистая кровь или кровавая слизь.

- Печень болезненна на ощупь и часто увеличена
- небольшая лихорадка
- многочисленные розеолы, экхимозы и сыпь размером с просо на верхней части тела
- открытый рот
- обильное потоотделение, не приносящее облегчения
- дополнительная заложенность или воспаление легких
- сонливость днем, беспокойство ночью
- Сопор
- Селезенка как печень
- Склонность к размягчению и деградации тканей
- надвигающийся церебральный или легочный паралич
- Язык покрыт густой, тягучей слизью, которую трудно откашливать.
- горячая верхняя часть тела
- вздутие живота
- Моча мутная и имеет резкий запах аммиака.

Другие важные симптомы

Дух

- рассеянный
- злится на себя, не хочет, чтобы с ним разговаривали
- Предчувствие смертельной болезни (Kali-c., Nit-ac.)
- Депрессия, стремление к одиночеству
- Страх остаться одному, как будто может случиться что-то плохое

Голова

- Мозжечковое расстройство у детей (Heio, Helo-s., Sulfon.) У детей с синдромом Элапс часто проявляются «легкие» неврологические симптомы, влияние которых на обучение, повседневную деятельность (самообслуживание, контроль настроения, аппетит), сенсомоторную и сенсориальную координацию, а также социальное взаимодействие может быть огромным.
- Мозжечок частично чувствителен к пре- или перинатальному стрессу, поэтому многие матери, пережившие стресс в этот период, рожают преждевременно и у них рождаются дети с аномалией Киари, дислексией, СДВ/СДВГ и аутистическими расстройствами.
- очень полезен при остром церебеллите (Alum., Con.)
- Мигрень у школьников, усугубляемая холодными напитками, голоданием и мороженым
- Результаты теста
 - Выпадение волос
 - Пот на лбу

ГЛАЗА

- Затуманенное зрение, ухудшающееся при головных болях и чтении
- сухость глаз при пробуждении утром
- Разрывающая боль, усиливающаяся при чтении (Carb-s., Croc.)
- Амблиопия (Ph-ac., Ruta)
- Нистагм
- Боль в глазах, как будто в них попал песок
- Результаты теста
 - черные круги под глазами
 - Красная окраска
 - стекловидный вид (Hell., Op., Plat.)
 - Нистагм
 - Атрофия зрительного нерва
 - Паралич верхнего века
 - Светобоязнь
 - Ячмень на левом глазу (Phos., Rhus-t.)
 - Ячмень на нижнем веке

УШИ

- Шум в ушах и акустические иллюзии
- черная и чрезмерно твердая ушная сера (под., Наджа)
- Треск в ушах при глотании
- зеленоватые, желтовато-зеленые, жидкие, водянистые, кровянистые, болезненные выделения, сопровождающиеся нарушением слуха
- Нарушение слуха после простуды и отита (Led., Merc., Puls.)
- невыносимый зуд в ушах
- Боль в ухе при глотании
- правосторонние жалобы
- Приступы ночной глухоты с ревом
- Результаты теста
 - Ухо чувствительно к прикосновению (Чам., Кали-и.)
 - клейкое ухо
 - Нарушение слуха
 - Средний отит
 - Средний отит с выпотом
 - Перфорация евстахиевой мембраны (гидр., калий би., сил.)
 - Отит при купании (график, пульс)

Нос

- Аносмия
- хронический катар носа, водянистые, белые, желтовато-зеленые выделения с резким запахом рыбного рассола, усиливающиеся от сквозняков
- хронический ринит без выделений
- Жалобы на нос, распространяющиеся на ухо (Лем-м.)
- Врожденное увеличение носа вследствие назальных дермоидов, глиом, тератомы носоглотки или энцефалоцеле (Ars-i., Aur.)
- Насморк, усиливающийся от сквозняков

- Сыпь в области носа
- много крупных зеленоватых корочек
- Заложенность ноздрей, особенно хоан и корня носа, особенно во влажную погоду
- Боль в корне носа (Нер., Merc-if.)
- Боль от носа до ушей при глотании
- рецидивирующие носовые кровотечения с темной, черной или светлой кровью, усиливающиеся при сморкании
- хронический ринит у новорожденных (Лус., Samb.)
- Результаты теста
 - акне
 - Атрофический ринит
 - синусит
 - Отек носовой перегородки

Лицо

- Результаты теста
 - акне
 - раздутый
 - холодный пот
 - темный цвет лица
 - Герпес (Ars., Rhus-t.)
 - увеличенные околоушные железы

РОТ

- открыть во сне
- Речь невнятная и неясная
- Результаты теста
 - Афтозные язвы
 - чистый язык
 - неприятный запах изо рта
 - высунутый язык, высовывается и втягивается, как змея (Cupr., Vip.)

Зубы

- Зубы стучат от страха

ШЕЯ

- Одышка из-за одежды на шее
- Одышка при глотании
- боль в шее слева
- густая, сухая и зловонная слизь в горле
- Жалобы на заболевания носоглотки (гидр., сиг.)
- неприятный запах
- Затрудненное глотание, особенно жидкости застревают (Hyos., Nat-m.), например
 - Ахалазия
 - Детский церебральный паралич
 - расщелина губы или неба

- Рефлюкс-эзофагит
- менингит
- Мышечная дистрофия
- дивертикул Ценкера
- Постполиомиелитный синдром
- Результаты теста
 - черный синобронхиальный синдром
 - слабый рвотный рефлекс
 - зеленовато-желтый струп на задней стенке глотки

ЖЕЛУДОК

- Повышенный аппетит при головных болях
- Отвращение к бананам, соленой и кислой пище
- Холодный, хуже от холодных напитков
- Колики после основного приема пищи, лучше в положении лежа на животе.
- Желание есть бекон, говядину, пахту, замороженный йогурт, салат и мороженое
- Обмороки из-за проблем с желудком, таких как рвота
- Чувство сытости после еды
- Расстройство желудка после холодных напитков
- Тошнота при кашле и после еды
- Жажда после еды
- Рвота водой по утрам, когда пора идти в школу

ЖИВОТ

- Гастроэнтерит, сопровождающийся черноватым, пенистым, желтоватым, водянистым поносом со слизью и урчанием в животе, ухудшающимся от фруктов (Chin., Ferr.)
- Хроническая диарея у детей с туберкулезом в семейном анамнезе или в анамнезе
- Колики, как будто кишечник перекручен, облегчаются в положении лежа на животе.
- Результаты теста
 - увеличенная печень
 - Геморрой
 - Анальный пролапс
 - Черви в стуле

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- частое мочеиспускание ночью
- Результаты теста
 - Моча мутная, красный песок, сахар

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Крайняя плоть утолщена и воспалена.
- Результаты теста
 - Яички опухли и увеличились

ДЫХАНИЕ

- постоянный кашель с болью в легких
- Затрудненное дыхание в положении лежа на левом боку (Spig., Tarent.)
- сухой кашель, который заканчивается выделением черной крови
- Результаты теста
 - одышка
 - Дыхание ртом

Грудь

- Холод в груди после употребления алкоголя
- Рентгенограмма грудной клетки показывает левосторонний верхушечный туберкулез.
- Результаты теста
 - правая сторона чувствительна

Назад

- Ощущение холода в спине (Cact., Nat-s.)
- Результаты теста
 - Пот

КОНЕЧНОСТИ

- Руки и кисти синюшно-опухшие
- Сыпь на кончиках пальцев (Cist., Nat-c.), шелушение на ладонях
- Результаты теста
 - опухшие ноги
 - синие руки (Nux-v., Lach.)
 - ледяные ноги
 - Опрелость
 - Шелушение ладоней и кончиков пальцев
 - Нагноение подмышечных лимфатических узлов (Nit-ac., Rhus-t.)

Спать

- кусает руки и ноги во время сна
- Ребёнок просыпается от страха, ему снится, что он падает.
- Засыпание во время и после дефекации (Aeth., Sulph.)
- Бессонница из-за резких головных болей
- спит на боку, не может спать на левом боку

Общий

- значительные ЛОР-симптомы
- Потеря веса при повышенном аппетите
- Эпилепсия, вызванная мастурбацией (тип V).
- Приступы обморока в переполненных помещениях (Nux-m., Nux-v.)
- общее ухудшение из-за гроз и дождливой погоды
- рецидивирующие абсцессы
- рецидивирующий средний отит у маленьких детей

Сравнительная фармакология Элапс

ДИАРЕЯ

ELAPS CORALLINUS	Альбом Arsenicum
Элапс и мышьяк Оба препарата показаны при диарее у пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как туберкулез, пневмония, различные септические состояния и т. д.	
Стул желчный, черный, кровавый, пенистый, дегтеобразный, непереваренный, водянистый, желтый.	Стул скудный, зловонный, темный, грубый, обильный, слизистый, слизиобразный, с выраженной протрацией.
Рвота зелёной желчью, сопровождающаяся диареей. Повышенная кислотность желудка с тошнотой и обмороками, кислой отрыжкой.	Сильная диарея с частыми испражнениями, тошнотой, рвотой, жаждой, сильной слабостью, коликами и тенезмами.
Диарея, сопровождающаяся ледяным ощущением в желудке, усиливающаяся после холодных напитков и фруктов.	Диарея, сопровождающаяся позывами к мочеиспусканию, которые возникают снова после еды и питья.
Ощущение, будто кишечник перекручен. Стриктура анального сфинктера после стула с кровью.	Выпадение прямой кишки с сильной болью в прямой кишке.
Диарея, усиливающаяся в течение дня.	Диарея, усиливающаяся во второй половине дня и ночью, особенно после полуночи.

ПРОБЛЕМЫ С УШАМИ

Прострел луговой	ELAPS CORALLINUS
Элапс и Пульсатилла Оба препарата показаны при хроническом болезненном среднем отите, сопровождающемся отореей. Они также показаны при шуме в ушах и наличии чёрной, твёрдой ушной серы.	
Густые, желтые, гнойные, безвкусные выделения; очень зловонные, иногда кровянистые.	Выделения серозной или зеленовато- желтой жидкости, особенно из левого уха.
Тиннитус: пульсирующий шум в ушах, звон, рев, жужжание.	Звон в ушах: шум в правом ухе, треск при глотании.
Отorea с пульсирующим шумом в ушах.	Зловонная отorea с сыпью.
Потеря слуха, как будто уши заложены (особенно из-за простуды, после стрижки волос или после перенесенной кори).	внезапное онемение ночью с постоянным ревом и треском
Воспаление и отек наружного уха; ухо рожистое и багровое; струп на козелке.	Коростная сыпь на ушах и щеках.

ПРОБЛЕМЫ С УШАМИ

ELAPS CORALLINUS	ЛАХЕСИС МУТУС

Элапс и *Лакхезис* Оба препарата страдают от проблем с ушами, вызванных накоплением ушной серы. Они также настоятельно показаны при хроническом среднем отите с шумом в ушах, болью в ухе и слуховыми галлюцинациями.

Ушная сера черная и затвердевшая	Ушная сера редкая, слишком твердая и бледная или похожа на кашу и белую, что приводит к снижению слуха
Выделение серозной или зеленовато-желтой жидкости из уха, усиливающееся по утрам; зловонная оторрея с кожной сыпью; Выделение крови из уха	кровянистые, коричневатые, обильные и зловонные выделения из ушей
Шумы в ушах, такие как жужжание, треск, рев, гром, свист; усиливаются при глотании	Шумы в ушах, такие как шипение, барабанный стук, трепетание, эхо, жужжание, пульсация, стук, жужжание, как от насекомых в ухе
Разрывающая боль в ухе, усиливающаяся во второй половине дня и при глотании	Боль в ухе, усиливающаяся утром при пробуждении, вечером, с головной болью, при простуде, облегчающаяся в положении лежа на ухе; сопровождается болью в горле

СТРАХ

Страмониум	ELAPS CORALLINUS
<i>Страмониум</i> и <i>Элапс</i> оба очень робки и боятся многих вещей и явлений.	
Страх остаться в одиночестве, особенно в темноте	Страх остаться в одиночестве, особенно во время менструации
Страх больших чёрных собак и пауков. Страх быть съеденным животными.	Страх животных, особенно кошек и змей
Страх смерти во время аборта	Страх смерти
Страх гроз, быстрого течения и глубокой воды	Страх дождя
Страх быть отравленным, убитым или подвергнуться нападению, страх перед надвигающимися болезнями	Страх, что случится что-то плохое
Страх перемещения, нахождения в замкнутых пространствах (хранилищах, подвалах), на открытых пространствах	Страх в толпе
—	Страх инсульта
Страх перед черными предметами, разговоры о черных людях, черных облаках	—

ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДКОМ

Альбом <i>Arsenicum</i>	ELAPS CORALLINUS
<i>Элапс</i> и <i>Арсеникум</i> Оба препарата показаны при тяжелом гастрите, сопровождающемся сильной рвотой и болью.	
Рвота пищей и питьем или слюзью, желчью или серозным веществом желтоватого, зеленоватого, коричневатого или черноватого цвета; Рвота кровавой массой	Рвота зеленой желчью с последующей диареей
Рвота всем, что попало в желудок. Даже чайная ложка воды вызывает сильное раздражение желудка. Небольшое количество горячей воды иногда успокаивает на минуту, но вскоре рвота прекращается. Холодные жидкости вызывают немедленную рвоту.	сильная жажда; ощущение холода в груди после питья
Очень сильная боль в эпигастрии и желудке, особенно при прикосновении. Ощущение спазмов, схваткообразная, тянущая, колющая и грызущая боль в желудке.	внезапная боль в животе, как будто она вот-вот упадет в обморок; хуже в положении сидя, лучше при ходьбе
частая, очень сильная тошнота со склонностью к рвоте, вынуждающая лежать; частая отрыжка, особенно после питья или еды	Повышенная кислотность желудка с тошнотой и обмороками; кислотный рефлюкс

ELAPS ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ *LACHESIS*.

ELAPS CORALLINUS	ЛАХЕСИС МУТУС
Обычные симптомы: черные выделения; хуже от ветра, сырой погоды, дождя, грозы; септицемия; лучше в положении лежа на животе; желание молока, сладкого, говядины; холодный пот; склонность к апоплексии; удушье в горле, хуже от одежды.	
Дифференциальная диагностика:	
Фрукты вызывают обострение.	Фрукты улучшают
правая сторона	левосторонний
чувствительный к холоду	чувствительны к теплу
почти нет желтухи	Желтуха более выражена
почти нет нагноения	Нагноения более выражены
Влажная погода ухудшается	Влажная погода улучшается
Ветреная, штормовая погода ухудшается	Ветреная, штормовая погода улучшается
—	Ухудшение до, во время и после сна

ЭЛАТЕРИУМ

(Брызгающий огурец - Элат.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Важное средство в гомеопатии при **воспалениях желудочно-кишечного тракта.**
- ▶ Сильная тошнота со рвотой, похожей на рисовый отвар.
- ▶ Рвота зеленоватой водянистой массой с режущей болью в животе; обильный, жидкий, пенистый стул, часто оливково-зеленого цвета.
- ▶ **Абсцессы, которые заживают очень медленно.**

Источник

- Огурец-брызгун или ослиный огурец принадлежит к семейству тыквенных (Cucur bitaceae).

EQUISETUM HYEMALE

(Зимний хвощ - Equis-h.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Лучшее средство от **ночного недержания мочи и цистита** .
- ▶ Постоянные позывы в мочевом пузыре, как будто он полностью переполнен мочой, но мочеиспускание не приводит к полному облегчению.
- ▶ Часто применяется, когда Кант терпит неудачу.
- ▶ Вся область мочевого пузыря чувствительна к давлению.
- ▶ Несмотря на сильный позыв к мочеиспусканию, выделяется лишь небольшое количество мочи.
- ▶ Сны о мочеиспускании и непроизвольном мочеиспускании у маленьких детей.
- ▶ Постоянное ночное недержание мочи.

Источник

- Хвощ зимний — ботанический родственник хвоща полевого (также называемого хвощом), относится к классу хвощей (Equisetaceae).

ЭВКАЛИПТ ШАРОВИДНЫЙ

(Голубое эвкалиптовое дерево - Эвкалипт.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Насморк распространяется на лобные и решетчатые пазухи.
- ▶ Гладкий язык.
- ▶ Катар слизистых оболочек бронхов или носа, характеризующийся острым и хроническим катаром с раздражающими, острыми, клейкими, гнойными и желтовато-зелеными выделениями из носа.
- ▶ Воспаление горла и миндалин, постоянная склонность к саднящему, влажному кашлю с обильным количеством пенистой, гнойной мокроты.
- ▶ Повышенный аппетит с мучительной жаждой.
- ▶ Острая диарея с желтоватым водянистым стулом, особенно по утрам.
- ▶ Черви.

Источник

- Относится к семейству миртовых (Myrtaceae).

ФЕРРУМ УКСУСНЫЙ

(Ацетат железа - Ферр-акт.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Туберкулез в семье.
- ▶ Худые, слабые и бледные младенцы и дети. Они быстро растут и постоянно истощаются.
- ▶ Угрюмый и сварливый.
- ▶ Склонность к рецидивирующим носовым кровотечениям, особенно слева.
- ▶ Боли роста при скрофулезном диатезе.

ФЕРРУМ МЕТАЛЛИКУМ

(Железо - Ферр.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети, ориентированные на семью, с самого раннего возраста охраняют репутацию своей семьи в обществе, словно сторожевой пес.
- ▶ Раздражительность при малейшем шуме: шуршание бумаги, грохот посуды, шум пылесоса, стиральной машины и тому подобные шумы доводят ребенка до отчаяния (Асар.).
- ▶ Злые (Апас.), сварливые (Nux-v., Sulph.), легко возбудимые и сварливые дети.
- ▶ Дети часто думают, что кто-то идет за ними, когда они идут в темноте (Санич.).
- ▶ Уверенные в себе и эгоистичные дети, но трезвые и уравновешенные.
- ▶ Надменное (измена), самодовольное выражение.
- ▶ В рассказе рассказывается о раненом, уязвленном и хрупком эго ребенка: ребенок всегда прав и расстраивается из-за малейшего противоречия.

Тело

- ▶ Анемичные, хрупкие и слабые дети с огненно-красными лицами.
- ▶ Совершенно здоровы и чувствуют себя хорошо, пока находятся в помещении, но как только они выходят на улицу, чтобы поиграть или побегать, они истощаются.
- ▶ Хроническая диарея (фос, тиреоидит) без инфекционной причины, особенно при синдроме мальабсорбции; ребенок вынужден бегать в туалет во время еды.
- ▶ Легко утомляется (Chin.) и устает; начинает задыхаться, чувствует себя полностью истощенным, часто теряет сознание и испытывает головокружение, особенно во время занятий спортом, физических упражнений, игр, слишком долгих разговоров, малейшего перенапряжения и т. д.
- ▶ Чрезмерно мерзнущие дети; малыши сильно переносят холод, у них холодные конечности и неприятные судороги в ступнях.
- ▶ Геморрагический диатез; ярко-красная кровь, которая быстро сворачивается (Ipec., Phos.).
- ▶ Бледность лица, губ и слизистых оболочек; краснеет при малейшей эмоции или нагрузке.
- ▶ Чувствителен к боли от малейшей травмы; не переносит инъекций, прививок и лечения зубов.
- ▶ Обмороки в толпе, например, на вокзалах, в аэропортах, театрах, ярмарках и т. д.
- ▶ Рвота возникает сразу после кормления грудью или кормления, или сразу после еды; рвота сильная и интенсивная, извергает все съеденное.

- ▶ Легко краснеет (Aml-n.s., Coca.).
- ▶ Обильное отрыгивание молока и пищи (квасцов), без тошноты.
- ▶ Летняя диарея у младенцев, сразу после кормления.
- ▶ Показан при гематологических заболеваниях, особенно у новорожденных и детей младшего возраста: талассемия, наследственный сфероцитоз (сфероцитоз), серповидноклеточная анемия, железодефицитная анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, гемофилия и острый лимфолейкоз.

Другие важные симптомы

Дух

- Дискомфорт, вызванный **эмоциональным возбуждением** (гневом, радостью или приятными сюрпризами).
- Страх **открытых** (Calc.) или **узких пространств** (Arg-n., Stram.), отсюда страх перед поездкой на поезде или пересечением моста.
- Тревожен и **чувствителен к малейшему шуму**; вздрагивает даже от **шороха бумаги** (Asar., Coff., Ther.).
- **непокорные, упрямые** (Cham., Tarentum.), грубые и резкие; легко краснеют и раздражаются при малейшем противоречии.
- **Застенчивые**, смущенные дети.
- Очень **конкурентоспособные** дети со страхом неудачи (Lyc.).
- Чередующиеся состояния: сильная сила воли чередуется с быстрым и чрезмерным плачем; жизнерадостность чередуется с грустью; психические симптомы чередуются с физическими симптомами.
- Ужасный страх, когда у ребенка нет стула.
- Ощущение вялости утром при пробуждении (Chin., Mag-m.).
- Они быстро чувствуют вину, если не слушаются родителей или нарушают свой долг.
- Люблю быть всегда занятым и занятым.
- Чувствителен к мнению окружающих и критике.

Голова

- Прилив крови к голове и жар в ней от **возбуждения** (Phos.), гнева, кашля, смеха и т. д., с бледностью лица.
- **Горячий пот** на затылке (Calc., Ph-ac., Sulph.).
- Сильная пульсирующая или пульсирующая головная боль с носовыми кровотечениями, потерей аппетита и **покраснением лица** (Bell., Glon.); хуже от холода, кашля, эмоционального возбуждения, тряски и наклонов; лучше от **холодных компрессов** (Bell., Bry., Glon., Spig.), внешнего давления, в положении лежа или **на свежем воздухе** (Lyc., Puls., Zinc.).
- Мигрень, возникающая почти каждые 2 недели, длится 2–3 дня.
- Результаты теста:
 - Не может держать голову прямо; голова наклонена в правую сторону.

- Гидроцефалия.
- Кожа головы чувствительна к прикосновению (Chin., Mez.).

ГЛАЗА

- **Слезотечение** при письме (Calc., Staph.) или **при боли** в любой части тела (Sabad.).
- Результаты теста:
 - **Ячмень** на верхнем веке (Ph-ac., Puls.).
 - Астигматизм.
 - Кровоизлияние в конъюнктиву.
 - Суженные зрачки, нечувствительные к свету.
 - Отёчность верхних и нижних век.
 - Желтуха.

УШИ

- **Чувствительность слуха к малейшему шуму** (Asar., Borx.); ребенок просыпается даже от легкого шороха бумаги.
- Результаты теста:
 - Катар евстахиевой трубы.
 - Выделения из левого уха (график, пульс).

НОС

- **Хронические носовые кровотечения** (ХНК) при врожденных или приобретенных геморрагических заболеваниях. Также у детей младшего возраста, страдающих анемией, с кровью, свернувшейся или ярко-красной, ежедневно по утрам, усиливающейся при сморкании.
- Катар распространяется на лобные пазухи.
- Гнойные выделения из носа, усиливающиеся ночью, образующие сухие **корки и струпы** по утрам (Kali-bi., Stict.).
- Результаты теста:
 - **Веерное движение** ноздрей.
 - Расширение ноздрей при выдохе.
 - Ретроназальный катар.

ЛИЦО

- **Осунувшееся** (Ant-t., Ars.), **бледное, лицо Гиппократата**, быстро краснеет от малейшего волнения, при боли или лихорадке.
- Результаты теста:
 - Расширенные вены на висках (Bell., Chin., Sang.).
 - Одна сторона красная, другая бледная.

РОТ

- **Постоянное скрежетание зубами.**
- Медленное и затрудненное прорезывание зубов.
- Зубная боль облегчается, если выпить несколько глотков ледяной воды.
- Результаты теста:
 - Неприятный запах изо рта.
 - Бледные, белые десны из-за анемии.
 - Язык дрожит, когда его высовывают (Гел., Ад.).
 - Беловатый или грязно-желтоватый налет на языке.

ШЕЯ

- Рецидивирующий тонзиллит.
- Ком в горле и рвотные позывы заставляют ребенка постоянно сглатывать, что не приносит облегчения.
- Результат осмотра: припухлость шейных лимфатических узлов.

ЖЕЛУДОК

- **Аппетит капризный**, иногда чрезмерный, иногда отсутствует, но всегда - сопровождается повышенной жаждой.
- **Дети отказываются жевать пищу; они требуют, чтобы их пища была измельчена или превращена в пюре** (Lys., Merc., Staph.) (Дидье Гранджорж).
- Расстройство пищеварения со спазматическими болями в желудке, усиливающимися после холодных напитков, **яиц** (Colch.), **мяса** (Ptel.) или молока.
- Внезапная и сильная тошнота и рвота полным ртом кислой, непереваренной пищи **до полного опорожнения желудка**; хуже после полуночи ; после каждого кашля; от холодной воды, яиц, мяса или сладостей ; **во время еды**; во время поездки на машине или автобусе.
- Вся дневная пища извергается наружу, особенно около полуночи.
- Зловонная, горькая или кислая отрыжка, а также водянистая отрыжка после употребления жирной или обильной пищи.
- Медленное пищеварение.
- Рвота пищей, лицо ярко-красное.
- Ухудшение: масло, холодная пища или напитки, сухая пища, **яйца**, жир, фрукты (особенно кислые), мясо, молоко, обильная пища, кислая пища, сладости, **чай** (Chin., Nux-v., Sep.), помидоры, уксус, горячая пища и напитки.
- Отвращение: сыр, **яйца** (Puls., Sulph.), **жир** (Chin., Nit-ac.), фрукты (особенно зеленые и кислые), сельдь, **мясо**, молоко, орехи, твердая пища, **кислая пища** (Bell., Cocc.), помидоры, горячая пища или напитки.
- Пристрастия: хлеб, **хлеб с маслом** (Bar-m., Merc.), масло, деликатесы, кислые фрукты (Ars.) и неперевариваемые вещи (мел, глина, земля, известь или карандаш), **жидкая пища (теплый суп)**, мясо, пицца (Nat-m.), сырые помидоры (Ign.), кислая пища, сладости, **горячая пища или напитки** (Bry., Ph-ac.).

ЖИВОТ

- Бурчание в животе из-за метеоризма перед дефекацией.
- Результаты теста:
 - Асцит.
 - Твердые, пальпируемые печень и селезенка.
 - Тимпаническое вздутие живота.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Хроническая, постоянная, внезапная, обильная, безболезненная, изнурительная диарея с коричневым или черным водянистым стулом, со слизью, **непереваренными частицами пищи** и зловонными газами, **усиливающаяся ночью** (Ars., Chin., Merc.), после питья, во время прорезывания зубов, от нервозности, в теплую погоду, при физической нагрузке, **во время кормления грудью или еды** (Crot-t, Kali-p.) или при употреблении мяса или фруктов.

- Детская холера с стулом в виде рисового отвара.
- Ночной зуд в заднем проходе.
- Выпадение прямой кишки во время дефекации (Ign., Sep.).
- Результаты теста:
 - **Выделение** зловонной жидкости из ануса.
 - Болезненность ануса.
 - Кал: аскариды (круглые черви), острицы.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- **Непроизвольное мочеиспускание** из-за резких движений.
- Ночной энурез.
- Моча выделяется по каплям в течение всего дня; выделение мочи прекращается, когда ребенок лежит совершенно неподвижно.
- Моча оставляет желтоватый осадок в подгузнике.
- Результат теста:
 - Моча: Альбумин ++, повышенный удельный вес, лейкоциты ++, эритроциты ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Склонность к мастурбации.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Едкие, молочные бели у анемичных детей с невыносимым зудом и жжением в области гениталий.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Першение и щекотание в гортани, вызывающие кашель.
- Слабость или охриплость голоса при разговоре.

ДЫХАНИЕ

- **Одышка** и астматическое дыхание усиливаются после полуночи, утром (10–11 часов утра) и при кашле; **облегчаются при обмахивании**, разговоре, в положении сидя, при движении или медленной ходьбе.
- **Сильное стеснение в груди**; ребенок чувствует, будто что-то тяжелое давит ему на грудь; хуже в полночь; вынужден сидеть или, что еще лучше, ходить.
- Астма после подавленной экземы или чесотки (Ars., Cupr.).
- Остановка дыхания при кашле (Ant-t, Cupr.).
- Результаты теста:
 - **Горячее дыхание** (Sulph.).
 - Брюшное дыхание.
 - Ребенку трудно глубоко дышать.
 - Хриплое дыхание.
 - Хрипы, свистящее дыхание.

КАШЕЛЬ

- Во время кашля: **удушье**, необходимость сесть, боль в животе, потливость, удушье с отхаркиванием и рвотой.

- Спастические приступы кашля с **рвотой** (Ipec.) и носовыми кровотечениями; любая еда или питье вызывают у ребенка рвоту, которая все съела; хуже от плача или разговора, с вечера до полуночи, от холодного воздуха, утром при вставании; лучше от ходьбы или **медленного ношения на руках**.
- Кашель, по-видимому, исходит из желудка (Bry., Sep.).
- Сухой кашель вечером, который проходит только утром.

Грудь

- Результаты теста:
 - Эмпиема.
 - Пневмония с гепатизацией и кровотечением из легких.
 - Систолические шумы.

Назад

- **Пот в области шеи** (Кальк.).
- Опухание шейных желез на шее.

КОНЕЧНОСТИ

- Ночные судороги в икрах и пальцах ног в постели.
- Слабые суставы.
- Результаты теста:
 - Холодный пот на ладонях и между пальцами ног.
 - Ледяной холод дистальных фаланг, особенно пальцев ног.
 - Беспокойные ноги (Мед., Цинк.).
 - Сокращение мышц и сухожилий пальцев.
 - Бородавки на руках и пальцах.

Спать

- Может спать только на спине (Rhus-t., Sulph.).
- Легко засыпает, когда пытается сосредоточиться на учебе (Гел.).
- Спит с полуоткрытыми глазами (Лус.).
- Бессонница у детей, страдающих глистными инвазиями; бессонница всю ночь, затем глубокий сон утром.
- Сонливость после еды или кормления грудью.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Дискомфорт, вызванный сквозняками или дождем.
 - Во время озноба: сухой кашель, жар и покраснение лица, ледяные ступни и повышенная жажда.
 - Приступы озноба возникают часто, непродолжительны, интенсивны (больше слева), начинаются в руках и ногах и повторяются через регулярные и определенные промежутки времени (больше после 3 часов ночи).
- Нагревать:
 - Во время жары: горечь во рту, холодные ноги, кашель, желание раскрыться, расширенные кровеносные сосуды, одышка, головная боль, невыносимая одежда, раздражительность, бледность кожи, красное, горячее лицо

- с ледяными конечностями (особенно руками и ногами), беспокойством, отсутствием жажды или неутолимой жаждой, рвотой.
- Локализованное тепло на животе, спине, щеках, глазах, внешней части шеи и голове.
- Сухой, жгучий жар, возникающий вечером и во время сна.
- Пот:
 - Холодный, влажный и обильный пот, от которого желтеет одежда, возникает желание обнажиться.
 - Все симптомы усиливаются при потоотделении (в отличие от Nat-m., при котором все симптомы улучшаются при потоотделении).

КОЖА

- Кожа кажется горячей (Белл.), но внутри у ребенка холод.
- Результаты теста:
 - Экхимозы (небольшие кровоизлияния на коже).
 - Желтуха.
 - Небольшие бородавки.
 - Восковая кожа.
 - Морщинистая или обвисшая кожа.

Общий

- **Анемичные, слабые дети** с выраженной бледностью и обмороком; вследствие расстройства питания, после изнуряющих болезней или кровотечений; лицо быстро краснеет при малейшем волнении; лучше от обмахивания .
- Пухлые дети, которые легко простужаются; **легко простужаются**; состояние ухудшается от малейшего холода или на открытом воздухе, в холодную или сырую погоду.
- **Сильное истощение** (Ars., Calc., Chin., Nat-m., Tub.).
- **Склонность к кровотечениям**; обильные, ярко-красные выделения с темными сгустками из отверстий тела или небольших ран.
- Жалобы, связанные с изменением погоды (с холодной на теплую), холодной или сырой погодой, в период выздоровления, из-за потери крови (носовые кровотечения, бактериальная дизентерия, анкилостомы) или потери жидкости (гастроэнтерит, хроническая диарея).
- Приливы, вызванные малейшей нервозностью или напряжением.
- Поздно начинает ходить (Кальк., Кальк-п.).
- Быстрая потеря веса, несмотря на тягу к еде, у детей с ювенильным диабетом.
- Рахит; размягчение костей; переломы костей заживают медленно.

FILIX MAS

(Папоротник обыкновенный мужской - Fil.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Частые случаи туберкулеза легких и туберкулезные миазмы в семье.
- ▶ Ворчливые, раздражительные и бледные дети с синими кругами под глазами и белым налетом на языке.
- ▶ Хорошее гомеопатическое средство от **ленточных червей**.
- ▶ Глистная инвазия с запором.
- ▶ Очень склонен к коликам, вызываемым глистами, с зудом в носу и бледным лицом.

Источник

- Синоним: *Dryopteris filix*. Относится к семейству щитовидных (*Aspidiaceae*).

ФЛАВУС

(Flavus bacillus - Flav.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Склонность к **рецидивирующему воспалению**
Придаточные пазухи носа с зеленоватыми и гнойными выделениями и сильной заложенностью носа.
- ▶ Нос заложен с одной стороны, облегчается при чихании.
- ▶ Верхнечелюстной синусит.
- ▶ Рецидивирующие инфекции среднего уха.
- ▶ Боль в горле, обильные выделения из носа, ощущение комка в горле, затрудненное глотание.
- ▶ Сухой кашель с одышкой, особенно после полуночи.
- ▶ Склонность к простудам.
- ▶ Теплые пациенты.

Источник

- Флавус — препарат, изготовленный из бактерий рода *Flavus*, обитающих в носоглотке. Однако его точная таксономическая классификация неизвестна.

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

(Stoneflower - Flor-p.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Дети, больные туберкулезом, часто имеющие туберкулез в семейном анамнезе.
- ▶ Отсутствие концентрации во время учебы.
- ▶ Рецидивирующее воспаление слизистой оболочки полости рта.
- ▶ Диарея с сероватым или бледно-желтым стулом.

Источник

- Синоним: *Lophophytum leandri*. Растёт в тропических лесах Аргентины и Парагвая и относится к семейству баланофоровых.

ФОЛЛИКУЛИНУМ

(Эстрон, яйцеклетка, фолликул - фольга.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Отсутствие чувства идентичности из-за чрезмерного контроля со стороны родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер и т. д. (Anac., Mag-c., Staph.)
- ▶ Отсутствие отношений с самим собой приводит к слабости воли.
- ▶ Дети, которые страдают от давления со стороны сверстников и родителей
- ▶ дети, подвергшиеся физическому, психическому или сексуальному насилию и жестокому обращению
- ▶ Расстройства пищевого поведения у детей, такие как анорексия, булимия, компульсивное переедание
- ▶ Послеродовые проблемы у новорожденных и детей младшего возраста с трудностями в установлении связи с матерью, например, отсутствие реакции на поцелуи или ласку ребенка, слабый зрительный контакт, ребенок не может следить глазами за движущимися объектами
- ▶ Дети с преждевременным половым созреванием (Алоэ, Бар-с.)
- ▶ Дети, склонные к обсессивно-компульсивному расстройству, такие как Anacardium, Hyoscyamus или Medorrhinum, характеризуются:
 - Трудности с концентрацией внимания, которые могут по-разному влиять на школьную жизнь. Концентрация внимания может быть нарушена навязчивыми, повторяющимися мыслями, которые остаются незамеченными окружающими.
 - Часто бывает сложно завершить работу в разумные сроки.
 - социальная изоляция или отказ от общения со сверстниками.
 - низкая самооценка в социальной и школьной деятельности
 - Расстройства поведения, такие как драки или споры, возникающие из-за недопонимания между ребенком и одноклассниками или учителями.
 - Ребенок постоянно старается избегать любого контакта с предметами, опасаясь заражения, или моет руки по несколько часов каждый день.
 - Когда кто-то прерывает ритуал, возникает сильный стресс. Ребёнок может закатить серьёзную истерику, если родители настаивают на переходе к следующему заданию.

Тело

- ▶ Дети матерей, которые долгое время принимали противозачаточные таблетки
- ▶ Дети матерей, которые злоупотребляли диэтилstilбестролом для регуляции менструального цикла
- ▶ Дети матерей, делавших много аборт (Галлия, Плб.)
- ▶ Матери, страдавшие гипертонией, диабетом, инфекциями мочевыводящих путей или раком молочной железы во время беременности и родов
- ▶ много случаев рака в семейном анамнезе, особенно рака молочной железы (Phos., сентябрь)

- ▶ Дети с врожденными пороками развития, особенно половых органов, например, отсутствием шейки матки, поперечной перегородкой, отсутствием или неразвитой маткой, атрезией девственной плевы, агенезией влагалища, синдромом Кюстера-Хаузера или нарушением опускания яичек
- ▶ Дети, которые медленно выздоравливают после острых вирусных заболеваний, например, инфекционного мононуклеоза, гриппа, респираторно-синцитиальных вирусов и т. д. (Carbo-veg., Chin.)
- ▶ неправильно назначали кортизон местно, перорально или ингаляционно при любых детских заболеваниях (Nux-v., Sulph., Zinc.) .

Другие важные симптомы

Дух

- Глубоко укоренившиеся страхи у детей, подвергшихся психологическому насилию (Aeth., Bufo, Hyos.)
- Бред нахождения под сильным влиянием другого человека, например, родителей, одноклассников или братьев и сестер. (Hyos., Lach., Stram.)
- Чувство беспомощности перед лицом давления обстоятельств, - находящихся вне нашего контроля
- сильное чувство справедливости, как у Causticum и Staphisagria
- высокий уровень шума и чувствительность к прикосновениям
- эмоциональная чувствительность, особенно к критике
- легко впадает в панику по мелочам (Кали-к., Нат-к.)
- сострадательные дети, такие как Carcinosinum

Лицо

- Акне до и во время полового созревания

Желудок

- сильная тяга к сладкому, сахару и углеводам (Arg-n., Chin., Sacch.)

Живот

- Вздутие живота после употребления продуктов из пшеницы или сахара, особенно рафинированного сахара (Игн., Сульф., Цинк.)

Мочевыводящих путей

- Инфекция *Candida albicans* у маленьких девочек; желтые, грязные, зловонные бели
- зудящие гениталии
- легко возбудимые половые органы (Phos., Plat., Staph.)

Грудь

- Рентгенограмма грудной клетки показывает изменения в первичном комплексе.

КОНЕЧНОСТИ

- Кончики пальцев всегда холодные на ощупь, тогда как остальная часть руки теплая.
- холодные руки или ноги с головной болью
- опухшие лодыжки

СПАТЬ

- сонливость в течение дня и во время занятий

КОЖА

- Пятна цвета «кофе с молоком» по всему телу (Am-m., Carc.)

Общий

- Склонность к обморокам или обморокам при анемии
- сильное мочеиспускание с болью во всем теле
- Укачивание
- всегда мерзнет, нужно много одежды, чтобы согреться
- общее ухудшение всех симптомов по утрам
- очень вялый, нет желания напрягаться (Ars., Camph., Kali-p.)
- Недостаток сна вызывает вялость и физическое истощение.
- повышенное потоотделение ночью

P.S. Большое сходство с *Natrium muriaticum*. Здесь мы находим «угнетенное состояние с плачем», «частое желание большого количества жидкости», «периодические головные боли, которые возникают и исчезают с наступлением солнца» и «постоянный запор с болезненными трещинами».

Сравнительная Materia Medica

Folliculinum обнаруживает большое сходство с ***Natrium muriaticum*** и ***Carcinosinum***.

Следующие симптомы являются общими для ВСЕХ ТРЕХ СРЕДСТВ:

- Жалобы после физического, психологического или сексуального насилия
- Жалобы через притеснения
- Обсессивно-компульсивное расстройство
- сильное возмущение
- не может терпеть несправедливость
- Чувство беспомощности
- легко обижается (= обижается на всё)
- чувствительны к шуму
- чувствительны к критике
- сострадательный
- уступая
- Акне на лице
- Ночное недержание мочи
- Тяга к выпечке

- Тяга к сахару
- Тяга к сладкому

СИМПТОМЫ	КАРЦИНОЗИНУМ	ФОЛЛИКУЛИН	SODIUM MURIATICUM
Иллюзия нахождения под сильным влиянием		+	
Жалобы, вызванные гневом и шоком	+		
Жалобы, вызванные насилием	+		
беспочвенный гнев	+		
Гнев с бледным лицом			+
Заблуждение, что она выглядит несчастной			+
пожизненный страх	+		
Страх мелочей			++
Печаль, не могу плакать.	+		+++
Чувство унижения после сексуального насилия	+		
Одержимость чистотой	+		+
Желание музыки	+		
Грусть после оскорбления	+		
отдалённое чувство		+	
Думать о неприятных вещах			+
Желание путешествовать	+		
синие склеры	++		
Головные боли из-за напряжения глаз			+
Зерна ячменя на внутренних углах глаз			+
Пот на носу			+
Зоб			+

СИМПТОМЫ	КАРЦИНОЗИНУМ	ФОЛЛИКУЛИН	SODIUM MURIATICUM
Диарея после мучной пищи			+
кафе с молоком	++	+	
холодные кончики пальцев		+	
частое, болезненное мочеиспускание		+	
Ночные поты		++	++++
опухшие лодыжки		+	+
спит в коленно-грудном положении	+		
Потеря веса у детей и младенцев			++
Тяга к яйцам	+		
Тяга к ветчинному жиру	+		
Злоупотребление противозачаточными таблетками		+	

ГАМБОДЖИЯ

(Резиновая смола из каучукового дерева - Гамб.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Диарея, вызванная кишечной палочкой, холерой, шигеллами, сальмонеллами, лямблиозом или *E. histolytica*.
- ▶ Стул меняется с желтоватого, зеленого, водянистого на частично сформированный с сильным урчанием в животе.
- ▶ Внезапные позывы к дефекации. Опорожнение кишечника требует значительных усилий, но затем приносит облегчение.
- ▶ Жидкий стул со жжением в анусе и последующим облегчением.
- ▶ Частый метеоризм, усиливающийся вечером и ночью.
- ▶ Стул водянистый, слизистый, без запаха, обильный, желтый, как свернувшееся молоко, содержит непереваренные части.
- ▶ Перед дефекацией ощущаются позывы и резкие спазмы по всему животу, во время дефекации отходит большое количество газов.
- ▶ Большое облегчение для пациента благодаря дефекации.
- ▶ Сладости и сахар усугубляют ситуацию.

Источник

- Синоним: *Garcinia morella*. Относится к семейству клузиевых.

ГРАФИТЫ

(Графит, грифель для черчения - Граф.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Тревожное ожидание, как правило, очень тревожное.
- ▶ Требовательный, скрупулезный, избирательный (Апас., Ars., Сarc., Nux-v.).
- ▶ Нерешительность и неуверенность в себе. Ребёнок, словно маятник, колеблется и колеблется при принятии каждого решения.
- ▶ Отрицательное значение по умолчанию (Бар-с., Расч.).
- ▶ Вялые и ленивые дети; отвращение к труду.
- ▶ Застенчивые дети, которым не хватает уверенности в себе; им нужна постоянная поддержка.
- ▶ Все чувства (тревога, страх, беспокойство, грусть и т. д.) облегчаются плачем.
- ▶ Утром ребенок медлителен и вял, но к вечеру становится необычайно веселым и активным.
- ▶ Добросовестный в мелочах.
- ▶ Страх чего-то нового (например, новой игры, похода в новую школу, встречи с новыми друзьями).
- ▶ Нервничать.
- ▶ Девочки, которые любят играть в мальчишеские игры, носят мальчишескую одежду и обувь и предпочитают проводить время с мальчиками (Плат.) и т. д.

Тело

- ▶ Дети очень мерзнут, сильно потеют, хотят тепла.
- ▶ Большинство симптомов усиливаются при физической нагрузке и улучшаются после еды.
- ▶ Тучные, страдающие запорами и вялые дети с жировыми отложениями на туловище, но тонкими конечностями.
- ▶ Раны заживают медленно.

Другие важные симптомы

Дух

- Жалобы на **неуверенность, стресс и страх** у детей из-за **постоянных ссор и споров между родителями** (Mag.m.).
- У ребёнка сильный **страх грозы** (Borx., Phos.), а также страхи перед несчастными случаями, темнотой, злом, неудачами, падениями, ночью и незнакомцами. Все эти страхи **снимаются плачем** (Dig., Phos.) и приёмом пищи; это может привести к ожирению у маленьких детей.

- Ребенок ненавидит учиться; все симптомы **усиливаются при любой форме умственной или физической нагрузки** (Calc., Nat-c., Pic-ac.).
- Ребенок беспокоится перед сном из-за частых кошмаров.
- Легко заставить вас смеяться или плакать.
- Меланхоличное настроение после прослушивания музыки.
- У этого средства есть два аспекта: ребенок крайне тревожен и застенчив, или он или она очень груб, чрезмерно критичен, враждебен и склонен к спорам.
- Полезное лекарство от булимии у вялых, ленивых и неактивных детей, которые любят все время сидеть на одном месте.

ГОЛОВА

- Голову всегда нужно тепло укутывать, **она очень чувствительна к холодному воздуху.**
- **Влажные, корковые, зловонные высыпания**, распространяющиеся за счет эрозии краев; расчесывание вызывает шелушение кожи и дальнейшее выделение влаги, которая высыхает в виде корок; чаще встречаются на макушке.
- **Псориазические и экзематозные поражения с чрезмерным шелушением и зудом, усиливающимся ночью (Mez.)** и от холода; **улучшающимся от тепла (Апас.)** и мытья головы.
- Катаральные и менингеальные головные боли; усиливаются после сна и при пробуждении утром.
- Чрезмерная потливость головы, все равно приходится носить покрытую голову.
- Преждевременное выпадение волос у маленьких детей, особенно на макушке, из-за беспокойства, унижения и грусти.
- Результаты теста:
 - Обильная, **белая, шелушащаяся перхоть** по всей коже головы.
 - Упрямые вши в волосах.
 - Placa polonica (спутанные волосы).
 - Киста, задерживающая кожное сало.

ГЛАЗА

- **Хронический блефарит** (воспаление краев век) (Ant-c.).
- **Веки полностью слипаются по утрам** (Lyc., Phos.).
- Воспаленные, красные, опухшие веки с повышенной чувствительностью к свету.
- Результаты теста:
 - Липкие выделения, которые высыхают и прилипают к векам.
 - Близорукость.

УШИ

- Хронический средний отит.
- Результаты теста:
 - **Сыпь и язвы за ухом** (Петр.).
 - **Перфорация барабанной перепонки** (Tub.).
 - Экзема наружного уха.
 - Желтые, болезненные выделения.

НОС

- **Насморк при простуде** (Merc.).
- Заложенность носа в дневное время.

- Постоянные гнойные выделения из носа.
- Результаты теста:
 - Черные поры (черные точки) на носу (Sulph).
 - Зловонные, вонючие выделения.

Лицо

- Результаты теста:
 - Рожа (Ant-c.).
 - Твердые, увеличенные подчелюстные лимфатические узлы.
 - Стойкие угри на лице (Arg-i.).
 - Бледно-желтое лицо.

РОТ

- Десны опухают и легко кровоточат (креозот).

ШЕЯ

- Результаты теста:
 - Хриплый голос.
 - Гипертрофия небных миндалин (Бар-м.).

ДЫХАНИЕ

- **Кашель, вызванный глубоким дыханием** (Bry., Kali-c.)

ЖЕЛУДОК

- **Сильное расстройство желудка**, усиливающееся от холодной пищи. (Ф-ак.)
- Несмотря на ожирение (Caps., Phyt.), наблюдается выраженное отвращение к сладкому (Caust.).
- Всегда голоден (Iod., Lyc.), с большим аппетитом (Sulph.).
- Частое грызущее чувство голода в течение нескольких часов после еды.
- Сильная жажда рано утром (Nit-ac.).
- Большинство проблем с пищеварением (расстройство желудка, запоры, колики) возникают, когда ребенок подвергается чрезмерному умственному напряжению.
- Ухудшение: холодная пища, холодная вода, **жирная** пища (Puls., Tarentum).
- Улучшение: Молоко, особенно горячее.
- Отвращение: вареная пища, **рыба** (Phos., Zinc.), мясо и сладости.
- Пристрастия: пресная пища, курица, соки, **мясо** (особенно на ужин), сладости.

ЖИВОТ

- **Колики облегчаются** только **горячим молоком** (Crot-t.).
- Вздутие живота после еды.
- Чрезмерное вздутие живота с отхождением зловонных газов (Асаф.).
- Не переносит ничего сдавливающего в области желудка (Arg-n., Lach., Nux-v.).
- Результаты теста:
 - Вздутие живота у младенцев с коликами.
 - Печень увеличена и уплотнена.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Большое количество стула (Bry.) с примесью относительно большого количества вязкой белой слизи (Borx., Kali-chl.).
- Стул твердый и слишком большой ИЛИ мягкий и маленький.

ПУЗЫРЬ

- Кислый запах мочи (Nat-c., Sep.).

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результат теста:
 - Отёчность крайней плоти и мошонки (Apis, Ars., Rhus-t.).

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Болезненность вульвы.

КОНЕЧНОСТИ

- Результаты теста:
 - Болезненность между пальцами и в нижних конечностях.
 - Толстые, деформированные ногти на ногах (См.).
 - Толстые, деформированные ногти (Ant-c., Sil.).

КОЖА

- Склонность к аллергической экземе (Anthraco., Mez.) в складках кожи (Ars., Psor.), на задней поверхности ушных раковин (Лyc., OInd.), в уголках глаз, паховой области, на сгибе локтя, вокруг запястья и вокруг ануса.
- Грубая, сухая кожа, склонная к растрескиванию, особенно из-за воздействия холода.
- Нездоровая кожа.
- Результаты теста:
 - Трещины на коже (кальций, петрий) с тенденцией к кровотечению; из них выделяется густое, желтоватое, липкое отделяемое, которое быстро высыхает и образует толстые корки. Корки нарастают по мере продвижения выделений под поверхностью кожи. Затем корки отпадают, обнажая под ними такое же липкое желтоватое отделяемое, часто с примесью крови.

Общий

- очень **зябкие**; хуже от малейшего сквозняка (Kali-c., Puls.) или холодного воздуха (Bar-c., Ner.).
- **Тучные, тяжелые дети с увеличенным животом** (Кальк.).
- Склонность к **болезненности, трещинам и изъяснам** в углах рта (Arum-t, Nit-ac., Sil.), в местах соединения со слизистой оболочкой глаз, рта, ануса (Cham., Mur-ac., Nit-ac.) и носа.
- **Стремление к свежему воздуху** (основное свойство всех углеродных - соединений).
- Дети, склонные к стойким и рецидивирующим заболеваниям кожи (у Carbo-veg. — стойкая экзема волосистой части головы).
- Истощение пораженных частей тела (Led., Puls., See.).

- Светлая кожа с бледностью, но легко краснеющая даже при небольшом стрессе, беспокойстве или волнении.
- Общая худоба, мышечная слабость с быстрым истощением, несмотря на коренастый вид; ребенок не переносит путешествий и физических нагрузок.
- Непереносимость духоты и недостатка воздуха.
- Бугристые, утолщенные или твердые: кожа, железы, ногти, стул, шрамы или корки .
- Большинство симптомов исчезают при физических упражнениях на свежем воздухе (Cann-i.).
- Скучные, зловонные, жидкие, липкие, едкие выделения.
- Явная семейная предрасположенность к ревматоидному артриту и кожным заболеваниям.
- Ясный личный анамнез постоянных запоров.
- Склонность к рожистому воспалению (Apis., Bell., Euph., Lach.).
- Склонность легко простужаться.

ГЕКЛА ЛАВА

(Пепел вулкана Гекла в Исландии - Hekla)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Важное средство против сифилиса.
- ▶ Помогает при затрудненном **прорезывании зубов**, кариесе , особенно молочных зубов, сильной зубной боли после лечения зубов или при удалении зуба.
- ▶ Уплотненные, опухшие, болезненные лимфатические узлы шеи.
- ▶ Склонна к образованию абсцессов на корнях зубов.
- ▶ Рак костей у детей, особенно остеосаркомы.
- ▶ Воспаление костей , которое может привести к остеомиелиту.

Источник

- Это необычное лекарство изготовлено из мелкодисперсного вулканического пепла вулкана Гекла в Исландии и содержит фторид. Во время крупных извержений вулкана фермерам пришлось покинуть свои фермы, поскольку пепел уничтожил луга, а газы отравили стада.

HEDERA HELIX

(Плющ обыкновенный - Хед.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Три важных признака:
 - Размягчение костей у детей (рахит).
 - Истечение спинномозговой жидкости из носа вследствие перелома ячеек решетчатой кости, вызванного травмой головы.
 - Гидроцефалия — хроническая гидроцефалия , вызванная либо лихорадочным воспалением, либо туберкулезным менингитом.
- ▶ Ребенку всегда следует подождать несколько секунд, прежде чем сможет мочиться.

Источник

- Принадлежит к семейству аралиевых.

HELODERMA SUSPECTUM

(Ядозуб-гила - Helo-s.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Дерзкий и экстравертный; чувствующий себя нелюбимым.
- ▶ Множество орфографических и грамматических ошибок, пропусков слов или орфографических ошибок.
- ▶ **Неврологические заболевания** у детей, такие как опухоли мозжечка и воспаления мозжечка.
- ▶ **Облегчение при запущенных случаях опухолей головного мозга** у детей, таких как медуллобластома, глиома ствола мозга или эпендимомы четвертого желудочка.
- ▶ Нарушения равновесия. Резкие движения нижних конечностей. Тремор во всем теле при попытке ходьбы. Шатающаяся походка. Поднимание ног выше необходимого и ощущение ходьбы по шерсти.
- ▶ Выраженная слабость и нарушение равновесия при ходьбе вследствие дегенерации спиноталамического **тракта**, онемение подошв стоп и кистей рук, ледяной холод стоп и кистей рук.

Источник

- Тодд Роу из США испытал это прекрасное средство на основе ящерицы и таким образом подарил гомеопатическому миру замечательное лекарство.

ГИППОМАН

(Лошадиный жар - Хипп.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Очень эффективно при **болях роста**, особенно когда дети растут очень быстро за короткий период времени, а затем жалуются на сильную слабость в кистях и пальцах. Чаще всего страдает запястье .
- ▶ Сильная боль в запястье, сопровождающаяся выраженной слабостью в кистях и пальцах.
- ▶ Ювенильный ревматоидный артрит, преимущественно в запястье.
- ▶ Тяга к кислой пище и отвращение к сладкому.

Источник
эмбрионального мочевого мешка лошади .

HYOSCYAMUS NIGER

(Белена черная - Hyos.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Постоянно играет пальцами (Кали-бр., Мерс., Тарент.).
- ▶ Хитрый, скрывает информацию о себе.
- ▶ Быстро впадает в делирий (Ars., Bap., Bell., Crot-c., Op.) из-за системных инфекций, гипоксии, гиперкапнии, гипогликемии, нарушения водно-электролитного баланса, энцефалопатии, черепно-мозговых травм и т. д.
- ▶ Завистливые и ревнивые дети с постоянным ощущением того, что другим отдают предпочтение или что родители и учителя принимают сторону других (Lach., Lyss., Nux-v.).
- ▶ Эксгибиционизм: Дети намеренно демонстрируют свои гениталии незнакомцам и могут мастурбировать таким образом, что другие могут это видеть (Bell., Phos., Stram., Verat.).
- ▶ Завоевывают популярность среди сверстников во время экскурсий и пикников, распевая непристойные песни и ведя себя непристойно.
- ▶ Бурлящий (Cann-i., Lach., Op.) в чувствах и привязанностях.
- ▶ Притворные жалобы (Bell., Lach., Op., Tarent.); физические или психологические симптомы могут быть намеренно вызваны или симулированы, чтобы войти в роль больного человека (Bell., Tarent., Verat.).
- ▶ Соперничество среди детей возникает из-за того, что они очень ревностно относятся к своим друзьям и товарищам.
- ▶ Расстройство гендерной идентичности, поведение противоположного пола, предпочтение трансвестизма у мальчиков, девочки настаивают на ношении мужской одежды.
- ▶ Болтливые дети (Dulc., Lach., Stram.), не могут молчать ни секунды; их прозвали «болтуном».
- ▶ Нахальные и нахальные дети (мн. ч.) (аналогично: «Деннис, Истории одного негодяя ¹ »).
- ▶ Говорит грязные и вульгарные вещи практически в каждом предложении.
- ▶ Специфическое лечение синдрома Аспергера (легкая форма аутизма).
- ▶ Любит хвастаться своими храбрыми поступками, смелыми действиями и сексуальным опытом с другими детьми.
- ▶ Сильные вспышки гнева (Bell, Hep., Nux-v., Stram.), доходящие до ярости и физического насилия, например, укусы всех, кто попадает на пути.
- ▶ Дети, которые любят говорить о сексе, смотреть запрещенные фильмы или искать порнографические сайты в Интернете (Lach., Phos., Plat., Staph.).

Тело

- ▶ Зябкий: чувствительный к холодному воздуху, холодному ветру и холодной погоде.
- ▶ Психические и физические симптомы ухудшаются во время новолуния и полнолуния (Alum., Calc., Lyc.).

- ▶ Часто падает в обморок, особенно после травм головы.
- ▶ Подергивание мышц (Agar., Merc.) с головы до ног.
- ▶ Беспокойное чувство слабости во время и после дефекации, а также при разговоре.
- ▶ Склонность к кровотечениям с ярко-красной кровью (Acon., Ipec., Mill.).

Другие важные симптомы

Дух

- Жалобы на физическое, сексуальное или словесное **насилие** (Acon, Carc., Ign., Nat-m., Op.); одиночество или эмоциональное возбуждение (гнев, испуг, горе, ревность, раздражение).
- **Неуклюжие дети; спотыкаются о предметы при ходьбе** (Agar.).
- **Поведенческие проблемы и расстройства:** ругань и оскорбления пожилых людей; антисоциальное поведение; **кусание** прохожих, членов семьи, ногтей (грызение ногтей), предметов (Bell.); ругань (Anac., Nit-ac.); разрушительные действия, такие как поломка предметов, разрывание одежды (Stram.); пинки; упрямство; сварливость с желанием ударить других (Nux-v.); крики в состоянии неистовой ярости при пробуждении или ночью, или при прикосновении (Piat., Verat.); истерики.
- **Лживые** (Lach., Nux-v.) и хитрые дети.
- **Грязные дети** (Am-c., Caps., Graph., Merc., Sulph.); мочатся и испражняются где попало, затем играют с мочой и фекалиями, иногда слизывая или глотая их, или играют с грязью, илами или фекалиями животных.
- **Дислексии** (Бар-к., Мед., Фосф.); делают много ошибок при чтении, говорении или письме; путают слова или используют их неправильно.
- Страх **животных** (укуса, ранения или отравления), одиночества, темноты, собак, призраков, высоты, открытых пространств, крыс и воды.
- **Бессмысленный, преувеличенный, громкий и глупый смех** (Cann-i.).
- **Жадные** дети, которые хватают все, что им предлагают.
- **Гиперактивные и беспокойные дети;** хотят бегать по комнате или залезть везде (на шкафы, деревья, на балкон и т. д.); не остаются в постели, а снова и снова выпрыгивают.
- **Потеря речи** после пугающих событий (Op., Stram.), например, если они стали свидетелями родительской ссоры или жестокого обращения одного из родителей с другим, или если они стали свидетелями несчастного случая.
- Любит **подстрекать других к дракам и ссорам** (Кол., Пл.).
- **Озорной;** долго помнит обиды и ждет случая отомстить.
- **Истерики** или вспышки гнева с покраснением лица (Bry., Staph.), кусаниями, криками, топаньем ногами, ударами головы о стену (Bell., Mill., Tub.), ударами окружающих (Cur., Stram.) и бессвязной речью. Это состояние особенно заметно в случаях, когда ребёнок испытывает сильную ревность к новорождённому брату или сестре и хочет нанести ему травму, чтобы вернуть утраченное внимание родителей.

- Склонность к **сплетням** (предательству, сплетничеству) у маленьких детей; любовь к распространению слухов.
- Хочет все **трогать** из любопытства и беспокойства (Bell., Verat.).
- Любящий (Bell., Puls.).
- Отвечает резко или грубо (Cic., Nux-v., Ph-ac.).
- Булимия, чередующаяся с полным отказом от еды (Ign., Nat-m.).
- Беспочинные стоны и плач у младенцев, успокоить их можно только покачивая вперед и назад (Cham., Cina).
- Счастье в танцах, смехе и пении.
- Ясновидение (Anh., Crot-c., Phos.).
- Постоянные жалобы на то или это.
- Любопытный и любознательный; задает много вопросов.
- Танцуй.
- Вздрагивает при пробуждении (Calc., Nat-m.).
- Чувствует себя брошенным, как будто у него нет настоящего друга в мире (причина этого кроется в его собственной подозрительности и ревности).
- Высокомерный; считает себя важной персоной (Cann-i., Verat.).
- Клептомания (соч.).
- Отсутствие художественного таланта.
- Корчит смешные рожицы и жестикулирует, постоянно играет пальцами или кладет их в рот.
- Отказывается от любых лекарств.

Голова

- Сильные головные боли: могут быть вызваны прорезыванием зубов, воздействием холода, шума или солнца, испугом, травмой головы (Nat-s., Glon.) и **корью** (Puls.); ребенок чувствует себя лучше, гуляя **на свежем воздухе** и укутав голову.
- Голова всегда должна быть покрыта (Her., Sil.).
- Результаты теста:
 - **Ребенок постоянно трет голову рукой** (Тарент., Верат.).
 - Не может держать голову прямо; голова падает набок; вынужден поддерживать голову руками.
 - Гидроцефалия.
 - Символ Кернига ++.
 - МРТ: кровоизлияние в мозг.
 - Вращение или произвольное подергивание головы или удары головой о предметы.

Патология ЦНС

Hyos является важным лекарственным средством при следующих неврологических заболеваниях:

- Дегенеративные заболевания головного мозга (липогранулематоз, аденолейкодистрофия = синдром Шильдера, атаксия Фридрейха, синдром Ретта, синдром Менкеса, метакроматическая лейкодистрофия).
- Энцефалит (арбовирусы: японский энцефалит В, восточный и западный энцефалит лошадей (EEE и WEE), вирус Гоксаки, краснуха).
- Внутрочерепные объемные процессы (туберкулема, субдуральная гематома, глиома).

- Прогрессирующие энцефалопатии, вызывающие умственную отсталость (- фенилкетонурия, синдром Гурлер, синдром Тея-Сакса, туберосклероз, подострый склерозирующий панэнцефалит).
- Различные формы гнойных или бактериальных инфекций ЦНС (*H. influenzae*, пневмококки, менингококки, стафилококки, стрептококки , кишечная палочка) или небактериальных состояний (туберкулезных, вирусных и т. д.).

Общие клинические симптомы, подтверждающие вышеуказанные патологии ЦНС

Дух

- Жалобы, вызванные: У матери во время беременности развились сильные эмоции, такие как **ревность** (*Nux-v.*, *Puls.*), разочарование, шок или она перенесла какой-либо психологический шок.
- Отвечает неправильно, бессвязно или односложно; **ступор быстро возвращается после ответа** (*Arn.*, *Bapt.*, *Op.*).
- Делирий: Смех; **разговорчивость** (*Lach.*, *Stram.*, *Verat.*); бормотание (*Stram.*, *Zinc.*); **ковыряние в носу или губах** (*Bry.*, *Carbo-veg.*; *Ph-ac.*); **никого не узнает** (*Agar.*, *Op.*, *Stram.*), раскачивается взад и вперед, хочет раздеться (*Merc.*, *Phos.*).
- Жесты: **Щипание пальцами** (*Кон.*, *Кали-бр.*), **игра пальцами** (*Асар.*, *Тарент.*).
- **Стоны во сне** (*Aur.*, *Bry.*, *Calad.*).
- Стягивание **постельного белья** (*Hell.*, *Op.*, *Stram.*, *Zinc.*).
- **Игровые выходки** (*Androc.*, *Lach.*).
- **Ударяется головой** (*Белл.*).
- Не проси ничего (*Aur-m.*, *Bry.*, *Op.*).
- Пытается убежать (*Agar.*, *Белл.*).
- Нежелание отвечать (*Glon.*, *Манс.*, *Ph-ac.*).
- Стойкое вегетативное состояние (*Lach.*, *Op.*).
- Спутанность сознания, как при опьянении (*Bapt.*, *Carbn-s.*).
- Заблуждение, что он находится вне дома (*Bry.*, *Op.*); что за ним следят (*Ars.*).
- Желание остаться в постели.
- Страх воображаемых вещей (*Ад.*, *Мед.*).
- Жадно хватающиеся за вещи.
- Равнодушие; не жалуется (*Op.*, *Stram.*).
- Непроизвольные движения рук.
- Раздражается, когда с ним разговаривают (*Cham.*, *Nit-ac.*).
- Чрезмерный, произвольный и громкий смех (*Agar.*, *Белл.*).
- Отказывается принимать лекарства (*Arn.*, *Лак.*, *Страм.*).
- Крики: Во время сна (*Tub.*, *Zinc.*), при прикосновении (*Merc.*).
- Речь: спутанная (*Gels.*, *Лус.*); бессвязная (*Lach.*, *Stram.*); громкая (*Bell.*, *Op.*) и банальная (*Merc.*).

Глаза

- **Маятниковые движения** глаза из стороны в сторону (*Agar.*, *Белл.*, *Гели.*).
- **Зрачки расширены** (*Гелес.*).
- Как будто сделан из стекла (*Ад.*, *Страм.*).

- Стекловидный (Cupr.).
- Зрачки сузились.
- Зрачки расширяются при жаре (Apis, Bell.).
- Косоглазие.
- Дикий Взгляд (Lyss., Stram.).

Нос

- **При глотании жидкости она вытекает из носа** (Lac-c., Kali-perm., Merc-sy.).

Лицо

- **Стиснутые челюсти** (Op., Stram.).
- Покраснение **кожи при лихорадке** (Bell., Op., Stram.).
- Выражение лица: изможденное (Ars., Kali-c.), **пьяное** (Gels., Lach.) или **пустое** (Anac., Hell.).
- Потрескавшиеся губы.
- Челюсть отвисает.

РОТ

- **Желание стиснуть зубы** (Lyc., Phyt.).
- **Скрежетание зубами во сне** (Ars., Vac.).
- Чистый язык.
- Паралич языка (Both., Caust.).
- Язык трудный, непонятный.

ШЕЯ

- **Поперхивание** при питье и глотании (Lyc.).
- Поглощенная жидкость выдавливается через нос.
- Глотание: нарушено; невозможно.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Диарея с одновременным непроизвольным мочеиспусканием** (Ars., Carbo-veg., Stram.); во время сна.
- **Незаметные** испражнения (алоэ).
- Непроизвольный стул, который может быть хорошо оформленным; возникает особенно во время сна или мочеиспускания.

ПУЗЫРЬ

- **Подавление мочевыделения при лихорадке** (op., plb., stram.) (гиповолемический шок).
- Задержка мочи (Canth., Ter.).

ДЫХАНИЕ

- **Отек легких** (Ant-ar., Ant-t.).
- Хрипы (Phos., Verat-v.).
- Погремушка (Am-c., Spong.).

НАЗАД

- Опиистотонус.

КОНЕЧНОСТИ

- **Озноб начинается в спине** (Caps., Dulc., Lach.).
- Постоянная лихорадка (continua): со **ступором** (Mur-ac., Ph-ac.).
- Постоянная лихорадка (continua): с полной **потерей сознания** (Hell., Op.).
- **Судороги со скрежетом зубов** (Bufo).
- **Судороги с произвольным мочеиспусканием** (Bufo, Cupr.).
- Сон, **вегетативное состояние** (Acon.).
- Стойкая лихорадка (continua): Церебральная (Lach., Lys.).
- Судороги с похолоданием тела (Hell., Verat.).
- Судороги с параличом (Caust., Plb.).
- Судороги с потерей сознания.
- Подергивание.
- Паралич, гемиплегия.
- Пульс частый и слабый.
- Спит в положении лежа на спине (Bry., Nux-v., Puls.).

ГЛАЗА

- Результаты теста:
 - Расходящееся **косоглазие** (Jab., Nat-m.).
 - Зрачки **нечувствительны к свету** (Cupr., Op.) или попеременно сужены и расширены при одних и тех же условиях освещения.
 - Дальнозоркость.
 - Паралич наружных глазных мышц.
 - Поле зрения: Гемиянопия (гемиопия).
 - Красные и опухшие веки.
 - Вращательные или маятникообразные движения глазных яблок из стороны в сторону.
 - Спастическое закрывание глаз (Coloc., Merc.); ребенку трудно держать глаза открытыми.
 - Дикий (Camph., Carbo-veg.), блестящий или стекловидный на вид.

УШИ

- Нарушение слуха вследствие паралича слухового нерва.
- Зловонные выделения из уха.

Нос

- Насморк усиливается на сухом холодном воздухе.
- Чихание без насморка.
- Результаты теста:
 - При попытке глотать **из носа вытекает жидкость**.
 - Сухие, черные, как сажа, ноздри (Ant-t., Hell., Lys.).
 - Носовые кровотечения с ярко-красной кровью.

Лицо

- Пот.
- Результаты теста:
 - Стиснутые челюсти (Bell., Oena.).
 - Темно-красный (Bapt., Op.).

- Челюсть отвисает.
- Губы сухие (Nux-m.), потрескавшиеся (Sulph.) и кровоточащие.
- Блестящий (Apis., Aur.).
- Затонувший (ар., кит.).

РОТ

- **Скрежет зубов от гнева** (Кали-ч.).
- Язык кажется тяжелым и жестким; **дрожит, когда высовывается** (Lach., Thuј.), и, высунувшись, его трудно убрать, не застряв между зубами.
- Прикусывает щеку при разговоре (Игн.) или жевании.
- Затрудненное прорезывание зубов.
- Результаты теста:
 - Постоянное желание крепко **стиснуть зубы** (Фит.).
 - вперед и **назад** во рту (Bufo).
 - Кровоточивость десен.
 - Сухой, потрескавшийся язык.
 - Обильное, пенистое слюнотечение.
 - Заикание с громким и затрудненным произношением каждого слова.

ШЕЯ

- **Поглощенная жидкость выводится через нос** (Lac-c.).
- Затрудненное глотание, особенно жидкостей (Lach., Lyss.), из-за спазмов - или ощущения удушья.
- Результаты теста:
 - Удлиненный язычок.
 - Воспаленное и красное горло.
 - Выступающие и пульсирующие сонные артерии (Bell., Glon., Op.).

ЖЕЛУДОК

- **Неутолимая жажда** (Eur-per., Phos.); но может принимать пищу только часто и небольшими порциями из-за удушья и невозможности глотать.
- **Сильная икота** усиливается после кормления грудью (Alum., Bry.) или приема пищи (очень частое дополнение ко многим неврологическим расстройствам).
- Неэффективная отрыжка и рвота во время колик.
- Тошнота со спазматическими болями в животе, за которыми следует черная рвота.
- Медленное пищеварение.
- Ухудшение: Холодная еда и напитки.
- Отвращения: **фрукты**, сладости, помидоры, вода.
- Пристрастия: **к сыру** (Chel., Cist.) и **неперевариваемым вещам** (мелу, глине, извести, земле, карандашу и т. д.).

ЖИВОТ

- Колики с запором и скоплением газов; хуже ночью (Sulph.).
- Урчание и бульканье в животе с жидким стулом.
- Результаты теста:
 - Паралитическая непроходимость кишечника (Op., Plb.).
 - Напряжение, болезненность и тимпаническое вздутие живота.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Диарея при тифе** (Ars., Bapt., Phos.).
- **Непроизвольный стул** во время сна (Podo.), от любой формы эмоционального возбуждения (Syc-co.) или во время мочеиспускания (Mur-ac.).
- **Безболезненный, желтый, липкий, жидкий или водянистый стул**, очень зловонный или **почти без запаха** (Verat.) при диарее, которая усиливается ночью, во время сна или от эмоционального возбуждения (особенно гнева).
- Симптомы диареи: тихий бормочущий бред; чистый, сухой, пересохший язык; сильная жажда и скудное количество мочи.
- Выводит остриц и круглых червей с калом.
- Результат теста:
 - Стул: Гной +.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Дизурия (Apis) с непроизвольным выделением мочи у детей.
- Спастическое ночное недержание мочи (Гели).
- Задержка или подавление мочеиспускания, как при острой почечной недостаточности или уремии, особенно у новорожденных (Acon., Apis., Ars.).
- Беловато-серые или красноватые песчаные отложения в моче (сеп.).

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Выраженная склонность мастурбировать при любой возможности (Bufo, Med.), иногда даже на публике.
- Повышенное сексуальное влечение с частыми эрекциями и прикосновениями к гениталиям, даже в общественных местах.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Очень раннее менархе.
- Сильное сексуальное желание со склонностью мастурбировать при любой возможности, иногда даже на публике.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Раздражение и щекотание в гортани при лежании в постели (Spong.).
- Потеря голоса вследствие шока (Гельс., соч.).
- Хриплая мокрота в трахее.

ДЫХАНИЕ

- Одышка, облегчающаяся в положении сидя.
- Заглатывает воздух при кашле (Cina, Dros.).
- Полезно при астме у новорожденных и при асфиксии новорожденных (Ant-t., Camph.).
- Результаты теста:
 - Дыхание медленное, нерегулярное, с шумным вдохом.
 - Затрудненное дыхание после сотрясения мозга или травмы головы.

КАШЕЛЬ

- **Постоянный сухой кашель каждую ночь после кори** (мокрота, пульс).
- Сухой, сильный, отрывистый, щекочущий, спазматический, сильный и удушающий кашель, в виде длительных, изнуряющих приступов, сопровождающихся носовым кровотечением; хуже **после полуночи** (Dros.), от еды или питья, на холодном воздухе, **в положении лежа** (особенно с опущенной головой) (Ars., Chin.), от пения или разговора; лучше в положении сидя в постели.
- Во время кашля: **непроизвольное мочеиспускание** (Caust.), **покраснение лица** (Sang.) и **рвотные позывы** (Carbo-veg.).
- Сухой кашель ночью, с мокротой утром (Puls., Sulph.).

Грудь

- Зловонный пот под мышками.
- Результаты теста:
 - **Сильное сотрясение грудной клетки при кашле** (Lact, Phos.).
 - Ателектаз (Ant-t., Sulph.).
 - Бронхит.
 - Отек легких.
 - Ревматический эндокардит (Aur., Kalm.).
 - Спазмы в груди заставляют ребенка наклоняться вперед (Ph-ac.).

Назад

- **Потливость шеи** во время сна (Calc., Phos., Sanic.).
- Спинальный менингит (Apis, Gels.).
- Результат теста:
 - Скованность в шейном отделе, голова запрокинута назад (Bell., Cimic., Op.).

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжесть конечностей; роняет предметы (Apis, Bov., Stram.), натывается на предметы и спотыкается при ходьбе.
- Потливость нижних конечностей (Phos., Zinc.).
- Судороги и контрактуры в бедрах, икрах, пальцах рук и ног и т. д.
- Подергивание рук и ног.
- Результаты теста:
 - Большой палец согнут (Bell., Bufo, Glon.).
 - Согнутые нижние конечности; либо голень подтянута к бедру (Plb.), либо бедро подтянуто к животу (Curg., Merc-c.).
 - Беспокойство в руках, особенно пальцах (Kali-br., Zinc.).
 - Кулаки крепко сжаты, пальцы трудно разогнуть (миотония).

Спать

- Во время сна: спазмы в пальцах рук, судорожные движения, обильное - потоотделение на шее (Calc., Sanic.), скрежет зубов (Cina), смех или улыбка, стоны, бормотание, открытые глаза, крики, храп, рыдания во время плача, вздрагивание, как от испуга, разговоры и громкие признания, подергивания (особенно в ногах) и хныканье.

- Усталость и сонливость от малейшего умственного напряжения.
- Раздражительность и беспокойство, бессонница; ребенок постоянно хочет переходить из одной кровати в другую.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Восходящий холод (Sabad., Sulph.), начинается в ступнях или спине и поднимается вверх.
 - Озноб сопровождается отвращением к разговору (Cina, Sil.), холодными руками, желанием встать с постели, раздражительностью, покраснением лица (Bell.), задержкой мочи, чувствительностью к шуму (Caps., Gels.) и фиксированным взглядом.
 - Мороз без жажды.
 - Хуже ночью в постели.
 - Лучше при внешнем тепле.
- Нагревать:
 - Жар с внутренним жжением (особенно ощущается в голове), но снаружи тело кажется холодным на ощупь. Максимальный жар ощущается в области наружного уха, лица, шеи и лба.
 - Стадия жара сопровождается отвращением к обществу, болью в спине, клонико-тоническими судорогами, спутанностью сознания, стойким вегетативным состоянием, бредом (диким и бурным с желанием раздеться или абсолютной тишины), сухим кашлем (усугубляющим лихорадку), сухим белым или коричневым языком, попеременно красным и бледным лицом, вялым и сонливым, частыми позывами к дефекации, головной болью, повышенным аппетитом, невнятной и нечленораздельной речью, произвольными движениями рук (поглаживание лица, хватание или дергание за постельное белье, поиски в темноте, потирание рук друг о друга, прядение и ткачество), игрой с гениталиями, неприятным привкусом во рту, онемением во сне, ступором, задержкой мочи с тщетными позывами к мочеиспусканию, дрожью и подергиваниями, сильной жаждой с нежеланием пить воду и поэтому делает лишь очень маленькие глотки. Кожа кажется сухой и горячей.
 - Жар начинается вечером и продолжается всю ночь с бессонницей (Apis, Rhus-t.) и очень высокой температурой.
 - Желание раскрыть себя.
- Пот (если присутствует):
 - Обильный, холодный, изнуряющий, кислый пот.
 - Потливость, особенно на спине (подбородок).
 - Хуже ночью во время сна.
- Диарея с пневмонией при сыпном тифе.
- Полезное средство от лихорадки денге, сыпи или брюшного тифа.

КОЖА

- Жалобы на подавленные высыпания на коже (Bry., Psor.).
- Красная сыпь с зудом, не проходящая при расчесывании (Puls., Spong.).

- Результат теста:
 - Геморрагическая пурпура.

Судороги

- Жалобы на: прорезывание зубов (Kali-br.), лихорадку, эмоциональное возбуждение (Cic.), гнев, **испуг**, горе, подавление кожных высыпаний и **глистов** (Stram.).
- Перед судорогами: волчий голод, беспокойство, **крики** (Cupr.), расстройства зрения.
- Во время судорог: спазмы челюстей, пальцев и больших пальцев; сопровождающиеся синюшно-красным или очень **бледным лицом** (Verat.), холодной кожей, кашлем, бредом, двоением в глазах, скованными и спазматически подтянутыми конечностями, **пенной у рта** (Art-v.), **скрежетом зубов** (Bufo), **прикосновением к гениталиям**, **икотой** (Ran-b.), сильной лихорадкой, **непроизвольным мочеиспусканием** (Caust., Zinc.) **или полной задержкой мочи**, потерей сознания, опистотонусом, криком, тетанической ригидностью, рвотой и плачем.
- После судорог: лихорадка, глубокий сон (Op.), односторонний паралич (Caust., Cic.), волчий голод (Coc-c.).
- Ступор при гидроцефалии (Апоц.), при котором ребенок правильно отвечает на вопросы, но тут же снова впадает в ступор.
- Хуже ночью, после еды (Arg-n.) или питья.

Хорея

- **Хорея усиливается от еды** (Ign.).
- Ребенок склонен вести себя **глупо и безрассудно**, часто смеясь.
- Постоянная хорея с мышечными спазмами, подергиваниями или судорогами после чрезмерных танцев (лая, натуживания); пациент просто не может оставаться на месте.
- Подергивания в основном затрагивают лицо, веки и верхние конечности.

Общий

- Жалобы на: намокание головы (пульс); **травмы** (сотрясение головы, укус бешеной собаки); мастурбацию (Chin., Ph-ac.); подавленное потоотделение.
- **Кома с отсутствием движений «кукольных глаз» после черепно-мозговой травмы.**
- Изнурительная слабость при любой острой постоянной лихорадке; ребенок не может сидеть в постели, **сползает** в полулежачее, полусидячее положение.
- Зябкие дети, склонные к легкой простуде; состояние ухудшается от малейшего воздействия холода или ветра; состояние улучшается у моря (срединное).
- Коллапс с цианозом.
- Быстро и часто теряет сознание.
- Пульс: частый, полный, твердый, большой и сильный.

Источник

Семейство пасленовых (Solanaceae).

ICTODES FOETIDA
(Скунсовая капуста - Иктод.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Астма и проблемы с дыханием у младенцев и детей, вызванные вдыханием пыли. Облегчение после дефекации.
- ▶ Болезни роста, которые постоянно меняют свое местоположение.

Источник

- Синоним: *Pothos foetidus*. Принадлежит к семейству ароидных.

I GNATIA AMARA

(Ignatius bean - Ign.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Не переносит ни малейшего выговора; как только ребенка ругают, у него сразу появляются такие симптомы, как недержание мочи, кашель, лихорадка, судороги и т. д. (Carc., Staph.).
- ▶ Дети, которых заставляют учиться ещё больше, чаще проявляют симптомы невежества. Поскольку они умны, сообразительны, развиты не по годам и успешны, от них требуют всё больше и больше. Они часто происходят из бедных семей и вынуждены жить на стипендии; когда у них что-то не получается, они винят себя и впадают в глубокую депрессию или меланхолию.
- ▶ Замкнутые, отчужденные дети; им трудно выражать свои чувства; они часто глупо смеются или навязчиво жизнерадостны.
- ▶ Эмоциональная неустойчивость (Nat-m.): эмоции быстро меняются, радость переходит в печаль, смех переходит в слезы (Coff., Cros., Nux-m.).
- ▶ Сильное горе после утраты близких или вещей, например, смерть родителей, члена семьи, домашнего животного или потеря любимой игрушки.
- ▶ Часто замыкаются в себе и заикливаются на проблемах, гнев и эмоциональных травмах, которые им пришлось пережить.
- ▶ Высокие цели, большие амбиции и высокие идеалы; с жгучим честолюбием и внимательным, добросовестным, скрупулезным и безупречным поведением они стремятся к их достижению.
- ▶ Нежные и чувствительные дети, которые быстро схватывают и быстро применяют полученные знания на практике (сравните Puls.: также нежные и чувствительные, но медлительные и нерешительные).
- ▶ На практике это средство часто назначают детям, чьи матери во время беременности были расстроены и унижены или подвергались насилию со стороны мужа.
- ▶ Изысканные и нежные дети.
- ▶ Романтичные дети, которые могут стать очень сентиментальными, любят слушать душевные песни, любят сентиментальные фильмы и любовные романы.
- ▶ Головные боли, которые обычно возникают к концу дня и усиливаются перед экзаменами.
- ▶ Легко поддается эмоциональному возбуждению; если ребенку в этом состоянии возражать, он или расплачется от гнева или впадет в безутешную грусть.
- ▶ Однако ребенок не может постоянно поддерживать такой высокий темп работы, и постепенно его нервы начинают сдавать: появляется тревога перед экзаменами, провалы в памяти.

- ▶ Лицо приобретает странное выражение, могут появиться гримасы, а со временем могут развиваться нарушения речи, такие как заикание и запинание.
- ▶ Почерк ухудшается и становится неровным, начинает страдать мелкая моторика.
- ▶ Сильная нервозность.

Тело

- ▶ Замерзшие дети, которые не хотят выходить на свежий воздух.
- ▶ Прикусывает щеку во время разговора или жевания.
- ▶ Потливость лица во время еды (Nat-m., Sulph.).
- ▶ Локализованная боль (Kali-bi., Ox-ac.).
- ▶ Выпадение прямой кишки вследствие напряжения во время дефекации или диареи.
- ▶ Подергивание мышц при засыпании.
- ▶ В целом полезное средство при противоречивых симптомах: например, чувствительность к шуму уменьшается при прослушивании музыки; боль в горле уменьшается при глотании; ощущение пустоты в желудке не уменьшается при приеме пищи; кашель усиливается по мере кашля; спазматический смех при горе; жажда при ознобе и отсутствие жажды при лихорадке; цвет лица меняется в состоянии покоя, а не при вставании.

Другие важные симптомы

Дух

- Недуги, вызванные оскорблениями, наказаниями или выговорами; сексуальное насилие ; **смерть** близких и любимых людей (бабушек и дедушек, родителей или друзей); противоречие; **преданная дружба** (Nat-m., Ph-ac.); **разочарование** (Aug., Merc., Puls.); такие чувства, как шок, негодование, ревность или обида; неудача.
- **Чередующиеся симптомы** (естественное настроение, пульс, туя); изменчивое настроение , чередование противоположных психических симптомов или психических симптомов с физическими симптомами и т. д.
- **Неуклюжесть** (Apis, Nux-v.); постоянно роняет вещи.
- Не может выносить **утешения** (Calc-p., Sil.), комфорт ухудшается.
- **Мечтательна** и рассеянна; с трудом сосредотачивается на уроках.
- Хочет, чтобы его носили, но **ненавидит, когда его ласкают** (Кина).
- Страх **птиц** (Bufo), кур, **врачей** (Stram., Thuj.), нахождения на сцене , узких пространств, грабителей и пауков.
- **Страх отвержения** (заглавный, естественный); **чувство покинутости**.
- **Непроизвольные вздохи** (Calc-p.) с грустным выражением лица.
- **Ревность** с разочарованием (Hyos., Lach.) после рождения нового брата или сестры, которому уделяется большая часть внимания семьи.
- **Сдержанное недовольство** (Ipec., Staph.) по отношению к тем, кто его обидел.
- **Сентиментальный** (Cupr., Psor.).

- **Безмолвное горе** с невозможностью плакать (Cycl., Mur-ac., Puls.).
- Очень **добросовестный**, с сильным **чувством долга**.
- Мужество.
- Капризный и полный желаний, но отвергающий то, о чем просил, когда ему это предлагают.
- Ребенок испытывает выраженное отвращение к приглушенным и темным цветам, таким как черный, серый, темно-коричневый и темно-оранжевый; любит всю одежду и игрушки таких цветов, как лимонно-желтый, светло-зеленый, светло-голубой или розовый.
- Трудные дети, которые внезапно начинают злиться по мелочам, особенно - когда им противоречат, но в остальном очень жизнерадостны.
- Разрушительность (особенно начинает рвать одежду) из-за подавленных чувств, таких как гнев или разочарование.
- Дети, страдающие дислексией, делают много ошибок в устной и письменной речи, особенно из-за спешки.
- Симулирует болезнь.
- Тоска по дому.
- Чрезмерный смех, не соответствующий ситуации.
- Любит путешествовать.
- Не по годам развитые, беспокойные и гиперактивные дети; им всегда нужно чем-то заниматься и постоянно двигаться.
- Таинственный, сдержанный.
- Самодеградация.
- Чувствителен к музыке, запахам, мнению окружающих, боли, обвинениям и малейшему шуму.
- Застенчивые, смущенные и нежные дети, которые очень быстро начинают смущаться.
- Маленькие дети легко начинают плакать и громко рыдать, когда им делают выговор или когда им в чем-то отказывают.

Голова

- Мигрень, сопровождающаяся неестественным голодом (ощущением пустоты в желудке). Головные боли временно облегчаются **во время еды** (Sep.), но возвращаются с большей интенсивностью вскоре после еды. Ребёнок указывает на **лоб** как на наиболее болезненную часть (Bry).
- Периодические головные боли, особенно в затылке и правой **лобной области**, с затуманиванием зрения и слезотечением; хуже при прорезывании зубов, **возбуждении**, воздействии холодного воздуха или ветра, от **испуга, горя**, при пробуждении утром, при наклоне, от резких запахов, солнца, прикосновения, **гнева** (Mez.); лучше от плотного укутывания головы, **закрывания глаз** (Bry., Sil.) и **полного покоя**, обильного мочеиспускания, теплых укутывания и теплых компрессов.
- Выпадение волос после горя (Ph-ac.).
- Головная боль после плача из-за сильного разочарования.
- Результаты теста:
 - Не может держать голову прямо.
 - Гидроцефалия.
 - Непроизвольные покачивание или движения головой; подергивание из стороны в сторону.

- Знак Кернига +.
- Менингит.

ГЛАЗА

- Затуманенное зрение со слезотечением при чтении.
- Воспаление глаз у маленьких детей.
- Слезотечение при зевании (Nux-v., Sabad.).
- Светобоязнь со слезоточивостью на солнце.
- Результаты теста:
 - **Маятникообразные движения глазных яблок из стороны в сторону.**
 - Помутнение роговицы.
 - Глаза полуоткрыты.
 - Непроизвольное моргание.
 - Зрачки попеременно сужаются и расширяются при одних и тех же условиях освещения.
 - Запавшие или выпученные глаза.
 - Дрожание век при их закрывании (Merc.).

УШИ

- **Уши выглядят красными и горячими внутри, но на ощупь они холодные.**
- Катар евстахиевой трубы.
- Нарушение слуха после унижения.
- Инфекция среднего уха у детей.
- Результат осмотра: Одно ухо холодное, другое горячее.

НОС

- **Холодный нос** (Camph., Carbo-veg.), чувствительный к вдыхаемому воздуху.
- Чувствительность к резким запахам.
- Катар распространяется на лобные пазухи.
- Гнойные выделения, вызывающие раны.
- При попытке глотать из носа вытекает жидкость.
- Односторонняя заложенность носа.
- Результат теста:
 - Носовые кровотечения с темной, запекшейся кровью.

ЛИЦО

- **Холодный пот, особенно на верхней губе (сред.), во время еды.**
- **Подергивание уголков рта** (Bry., Op.).
- Вывих челюсти происходит легко.
- Результаты теста:
 - **Повышенный рост волос на лице у маленьких девочек** (Сен., Туй.).
 - **Осунувшееся** лицо с синюшными кругами под глазами.
 - Сухие, потрескавшиеся губы с шелушащейся сыпью в уголках рта.
 - Лицо искажается при разговоре.
 - Уплотнение и припухлость околоушной слюнной железы и подчелюстных лимфатических узлов, особенно справа.
 - Одна щека горячая и красная, другая бледная.
 - Покраснение вокруг рта.

РОТ

- Склонность **прикусывать язык** во время жевания или разговора.
- Затрудненное прорезывание зубов с ранним кариесом и почернением зубов.
- Слюноотделение при головной боли (Merc.).
- Зубная боль после простуды; усиливается сразу после того, как ложится, утром при пробуждении, зимой и при жевании; облегчается в положении лежа на больной стороне.
- Очень чувствительные зубы (Mag-c., Sil.); ребенок не переносит стоматологического лечения; плачет и воет еще до посещения стоматологической клиники.
- Результаты теста:
 - На чистом сухом языке торчащие красные сосочки со следами зубов, язык дрожит при высывании.
 - Неприятный запах изо рта.

ШЕЯ

- **Проблемы с глотанием, при которых ребенку труднее и болезненнее глотать жидкости, чем твердую пищу.**
- Ощущение сдавливания или удушья из-за инородного тела или **комка в горле** (Nat-m., Psor.); хуже к вечеру, вынужден постоянно сглатывать, что улучшается.
- Не переносит ношения одежды на шее из-за ощущения удушья (Apis, Lach., Spong.).
- Поглощенная жидкость выводится через нос.
- Боль в горле, отдающая в ухо при глотании.
- Результаты теста:
 - Фолликулярная ангина с нагноением.
 - Болезненные шейные лимфоузлы.
 - Красное горло.
 - Кривошея.

ЖЕЛУДОК

- **Булимия, когда человек испытывает грусть или нервную анорексию из-за горя** (Aur.).
- Расстройство пищеварения с бульканьем, безрезультатной рвотой и спазматическими болями в животе; **хуже от эмоций** (гнев, испуг, горе, раздражение), теплой пищи или малейшего прикосновения к животу; лучше после еды, после кислой отрыжки или в положении лежа на спине.
- Тошнота и рвота после еды, во время прорезывания зубов или из-за **эмоциональных состояний** (гнев, шок, горе, раздражение).
- **Приступообразная икота** у младенцев после еды или питья или после эмоциональных реакций, таких как гнев или испуг.
- Изменчивый аппетит: повышенный аппетит в неурочное время (в 11 часов утра или ночью) и сниженный аппетит во время еды.
- Медленное пищеварение.
- Проблемы с желудком усиливаются в 11 часов утра: повышается аппетит, появляется тошнота и т. д.
- Ухудшение: холодная пища и напитки, **кофе** (Caust., Cham.), **огурцы** (Sul-ac.), сухая пища, яйца, фрукты, горячие или теплые напитки, молоко, **лук** (Lyc., Puls.), **рис** (Bry., Sulph.), специи, **сладости** (Arg-n., Nat-p.).

- Улучшение: Горячая пища, сырая пища, уксус.
- Отвращение: хлеб, сыр, вареная пища, **фрукты** (Chin., Phos.), **мясо** (Calc., Graph.), **молоко** (Nat-c.), кислая и горячая пища.
- Пристрастия: хлеб, хлеб с маслом, масло, кофе (Br.), холодная еда и напитки, жирное, неперевариваемые вещи (мел, уголь, глина, земля, известь, уголь, карандаш), соленья, сырая пища, **ржаной хлеб**, кислая пища, кислые фрукты, **острый сыр**, сладости, **помидоры** (приготовленные или сырые).

СИНДРОМ НЕСВАРЕНИЯ ЖЕЛУДКА И КОЛИК

- Сочетание чувства **пустоты и вздутия живота**, которое ребёнок не может точно объяснить. Ощущение может смениться лёгким чувством скопления газов с частыми вздохами или перейти в колики, которые облегчаются после еды (Graph., Nat-c.).
- Колики у грудных детей, чьи **матери страдают от горя**.
- Постоянное желание что-нибудь **погрызть** (китайский).
- симптомами являются **повышенное слюноотечение** и кислый привкус во рту
- Симптомы расстройства желудка часто облегчаются употреблением кислых напитков, **соков цитрусовых** или кислой пищи (например, солений).
- После еды наблюдается внезапное отрывание пищи, сопровождающееся отрыжкой.
- Пищевые пристрастия и отвращения очень изменчивы: в течение нескольких дней может быть тяга к чему-либо, затем тяга полностью исчезает на следующие несколько дней и, наконец, превращается в отвращение.
- Ненасытная жажда хлеба.
- Нервные расстройства пищеварения, характеризующиеся абсолютным отвращением к еде или чрезмерным ее приемом.
- В начале еды ребенок очень голоден, но в середине приема пищи желание есть внезапно пропадает.
- Неконтролируемые, постоянные приступы икоты (ик.), которые временно облегчаются приемом пищи.

ЖИВОТ

- Спазматические и щемящие боли в животе у грудных детей и детей младшего возраста; усиливаются после волнения, после употребления сахара (Ox-ac.), ночью, во время стула; уменьшаются от надавливания или **в положении сидя в слегка согнутом** положении; с отхождением обильных **зловонных газов**.
- Синдром раздраженного кишечника или язвенный колит после пережитого горя.
- Желтуха после гнева (Nat-s).
- Болезненное вздутие живота из-за скопления газов, с урчанием после еды.
- Результаты теста:
 - **Паховая грыжа** (Nux-v.).
 - Увеличенные, твердые и пальпируемые печень и селезенка.
 - Булькающие звуки из живота.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запор **во время путешествий** (Alum., Op.) с тщетными позывами и натуживанием даже при **мягком стуле**.
- **Безболезненный**, внезапный, обильный понос из-за прорезывания зубов или **эмоционального стресса** (гнев, испуг, горе, нервозность) (Gels., Coloc.); хуже в положении стоя (Aloe).
- **Выпадение прямой кишки** во время и после дефекации.
- Постоянные или частые позывы к дефекации сразу после дефекации.
- Непроизвольный стул при отхождении газов (Ph-ac., Verat.).
- Зуд в области ануса, усиливающийся ночью, когда ребенок согревается в постели.
- Трещины прямой кишки с кровотечением после дефекации.
- Результаты теста:
 - Экзема вокруг ануса (Nit-ac.).
 - Болезненность промежности.
 - Открытый анус с небольшим отеком и влажностью вокруг него.
 - Спазмы прямой кишки (Crot-t.).
 - В кале: острицы, аскариды и сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Частое и обильное мочеиспускание с головной болью.
- Непроизвольное мочеиспускание при кашле.
- Спазматическое ночное недержание мочи.
- Задержка мочи вследствие шока (op.).
- Результаты теста:
 - Моча: Сахар +.
 - Моча оставляет беловатый или глинистый осадок в подгузнике.

МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Чрезмерное потоотделение в области гениталий.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Раздражение и щекотание в гортани, словно от пыли; усиливается при кашле, так что ребенок пытается подавить позывы к кашлю.
- Истерическая афония.
- Результаты теста:
 - Отек голосовой щели (Crot-h.).
 - Laryngismus stridulus.
 - Тихий, слабый, дрожащий голос.
 - Хрипы от мокроты в трахее.

ДЫХАНИЕ

- Дыхание останавливается, и ребенок начинает задыхаться при кашле или плаче (Cina).
- Одышка или астма от эмоционального возбуждения (особенно гнева, горя или унижения); хуже вечером около 17:00, при кашле или в положении лежа на боку; лучше в положении лежа на спине (Псориаз).

• Результаты теста:

- Дыхание Чейна-Стокса.
- Нерегулярное, прерывистое и хриплое дыхание; с громким вдохом и форсированным, медленным выдохом; иногда медленным, иногда быстрым.
- Стоны, хрипы и вздохи.

КАШЕЛЬ

- Сухой, отрывистый, глухой, удушающий и сильный кашель, короткими и частыми приступами, которые, по-видимому, случаются **днем и ночью**, с тошнотой и удушьем; хуже после кори или от **эмоций** (таких как гнев, испуг, унижение или раздражение); лучше от перемены положения младенца или ребенка в постели.
- Кашель, по-видимому, вызван раздражающим, щекочущим ощущением в гортани, как от пыли, которое усиливается по мере кашля и, таким образом, ухудшает приступы кашля.

Грудь

- Сердцебиение от горя или гнева, хуже после еды, с болью, утром в постели; лучше в положении лежа на левом боку.
- Результат теста:
 - Рентгенограмма грудной клетки: пневмонические уплотнения.

НАЗАД

- Полезно при болях в спине из-за спортивных травм (симптоматических); лучше в положении лежа на спине.

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжесть со склонностью спотыкаться и падать при ходьбе.
- Хорея вследствие испуга (Caust., Kali-br.).
- Истерический паралич вследствие горя или гнева.
- Подергивание и судороги конечностей после гнева.
- Болезненные обморожения на ногах.
- Болезненные, жгучие мозоли.
- Блуждающие ревматические боли с жаром в суставах (Kali-s., Lac-c.).
- Результаты теста:
 - Фурункулы на бедрах (Геп.).
 - Сведенные большие пальцы.
 - Мурашки по коже предплечий и бедер.
 - Горячие колени (Бар-м.).
 - Спазматическое, непроизвольное подтягивание конечностей вверх.
 - Потливость рук.
 - Дрожание рук при вытягивании руки вперед или письме.
 - Желтые ногти.

СПАТЬ

- Во время сна: жевательные движения (кальцификация); холодное лицо и холодные руки; скрежетание зубами; кряхтение; икота; повышенное слюноотделение; подергивание конечностей; покраснение

Блаженство; (Ambr.); стоны; открытый рот; потливость; короткое, прерывистое и хриплое дыхание; крики (Hyos.); храп; топание ногами (Kali-s.); внезапное вздрагивание; разговор; подергивание рук; хныканье (Cham.).

- Бессонница из-за постоянного слюнотечения.
- Младенцы с острым слухом просыпаются от малейшего шума.
- Могут спать только лёжа на спине, положив руки под голову (Nux-v.).
- Постоянная, спазматическая зевота, даже после хорошего ночного сна.
- Засыпает при малейшем умственном усилии (Arc.) (например, при попытке сосредоточиться на учебе или выполнении заданий или при чтении).
- Бессонница из-за шока, горя, унижения, беспокойства и т. д.
- Беспокойный, неудовлетворительный сон из-за постоянных сновидений, даже во время дневного сна.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Жалобы, вызванные: эмоциональным возбуждением (гнев, шок, горе, унижение, раздражение и т. д.), корью, болью, глистами.
- В случае заморозков:
 - Озноб сопровождается стуком зубов (Caps., Sulph.), холодными ногами и руками, расширением зрачков, гусиной кожей, головной болью (односторонней), безразличием (Phos., Sep.), тошнотой, болью в конечностях, покраснением лица со спазмами, грустью (Ars., Puls.), жадой большого количества холодной воды (Bry., Caps., Carbo-veg., Eur-per), рвотой и плачем (Bell.).
 - Общая холодность тела, особенно шеи, спины и ягодиц; улучшение при нахождении в теплой комнате или от укрывания.
 - Руки и ноги холодные (Carc., Cupr.).
 - Сильный, сотрясающий озноб, начинающийся в животе (Apis, Bell., Camph.) или в руках (Bell., Hell.).
 - Хуже вечером, на открытом воздухе и осенью.
 - Лучше при внешнем тепле.
- В жаркую погоду:
 - Стадия жара сопровождается страхом и нервозностью, отвращением к пище, желчной рвотой, изменчивостью настроения (притупление сознания чередуется с возбуждением), чистым языком, постоянным сухим кашлем (Ires.), делирием (Bapt.), одышкой, отрыжкой, сыпью на губах, обмороком, головной болью, онемением или болью в нижних конечностях, нетерпением, слезотечением, стонами (Mug-as.), болью в животе, пальпируемой и чувствительной селезенкой, красными ушами (Caps.) и лицом (Stram.), беспокойством и метанием в постели, грустным и молчаливым настроением, слюнотечением, вздохами (Cham.), храпом (Op.), потливостью лица, отсутствием жажды с отвращением к жидкости, слабостью, плачем и одурманивающим сном.
 - Сухой жар передней части тела, холодные руки и ноги.
 - Внутренний жар с наружным ознобом и покраснением кожи.
 - Неравномерное распределение тепла по телу: либо в одном ухе, либо в одной щеке, либо в одной стороне лица.

- Хуже от кашля, внешнего тепла (пульса), после полудня и от укрывания теплым одеялом.
- Лучше раскрыть.
- Для пота:
 - Холодный пот на определенных частях тела, особенно на верхней половине, усиливающийся при раскрытии; обильная бледная моча; тошнота; отсутствие жажды.
 - Все симптомы усиливаются при потоотделении.
- Голод после лихорадки.
- Полезно при лихорадке после злоупотребления хинином, когда приступы частые и нерегулярные.
- Лихорадка обычно начинается поздно днем или вечером и продолжается всю ночь.
- Ребенка необходимо раскрыть сразу же, как только начнется лихорадка (Асон., См.).

КОЖА

- Витилиго после горя.
- Зуд кожи от тепла или жары, лучше от расчесывания.
- Результаты теста:
 - Пролежни у маленьких детей.
 - Гусиная плоть.
 - Желтуха.
 - Опрелость.
 - Кожа холодная на ощупь, хотя ребенок жалуется на внутренние приливы.

Судороги

- Недуги, вызванные: гневом, приступами кашля, лекарствами, прорезыванием зубов, волнением, лихорадкой, испугом, горем, кровотечением, шумом, болью, **наказанием, выговором, гневом, глистами.**
- Во время судорог: кровавая пена у рта, сжатые большие пальцы рук, падение назад, запрокидывание головы, смех, стоны, крики, пристальный взгляд, плач.
- После судорог: глубокий сон, лихорадка, повышенная жажда, смех и потливость.
- **Прерывистые судороги** с периодическими повторениями.

ХОРЕЯ

- Заболевания, вызванные: эмоциональным возбуждением, **испугом, горем или наказанием.**
- Хуже после еды, от света или шума; лучше в положении лежа на спине.

Общий

- **Кислотные**, обильные, **едкие**, зловонные, гнойные или водянистые выделения из слизистых оболочек.
- **Зябкий ребенок** со склонностью к простудам и частым синуситам; ухудшение от холодного воздуха, холодных ванн, сквозняков, сухой холодной погоды или осенью, на открытом воздухе; улучшение от тепла, пребывания в помещении, теплого воздуха, тепла от печи.

- **Наблюдается постоянная изменчивость или изменчивость симптомов**
- .
- Отвращение к движению.
- Дети гиперчувствительны к аллопатическим препаратам.
- Непереносимость одежды или одеял, особенно в области внешней части шеи и живота.
- Большинство симптомов усиливаются от света, шума и в положении лежа на боку; уменьшаются во время еды и в положении лежа на спине.
- Безболезненное опухание и затвердение желез.
- Правосторонние жалобы.
- Болевая чувствительность.

Источник

- Семейство *nux vomica* (Loganiaceae).

ИНДИГО КРАСИЛЬНАЯ

(Дикий Индиго - Инд.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Рефлекторные нарушения, вызванные глистной инвазией**, в основном эпилепсия и расстройства настроения.
- ▶ Судороги, вызванные пережитой тревогой или горем. Они возникают периодически и сопровождаются типичной эпилептической аурой в области живота или солнечного сплетения. Перед эпилептическими припадками пациент испытывает гнев, возбуждение и нервозность, а после окончания припадков становится спокойнее.
- ▶ Непроизвольные движения, такие как тремор, хорей, миоклонические спазмы.
- ▶ Постоянные позывы к мочеиспусканию.
- ▶ Зуд в заднем проходе из-за заражения глистами, особенно после еды или ночью, а также из-за запоров.
- ▶ Очень частое зевание.

Источник

- Относится к семейству бобовых (Leguminosae).

ЙОДОФОРМИЙ

(Трийодметан - йодметан)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Туберкулез в анамнезе и миазматический анамнез туберкулеза в семье.
- ▶ **ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ.**
- ▶ Показаниями к применению этого средства при туберкулезном менингите являются: гидроцефалия, мучительные головные боли, пробуждение ото сна, внезапный крик, осмотр глазного дна, выявляющий воспаление зрительного нерва, постоянное шмыгание носом без выделений, сухость губ, горький привкус во рту, крайне беспокойный сон, отечность и ступорозность с суженными зрачками, учащенный пульс и подергивание мышц по всему телу.
- ▶ Хроническая диарея у детей с туберкулезной миазмой.
- ▶ Стул зеленый, непереваренный и водянистый, отмечается выраженное истощение с диареей.

ДЖАБОРАНДИ

(Трава руты - Яб.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Задержка жидкости из-за заболеваний легких, сердца или почек.
- ▶ **Профилактические меры во время эпидемий** или вспышек эпидемического паротита. Метастазы паротита в молочные железы, яичники или яички.
- ▶ Преждевременная седина у детей.
- ▶ Заболевания глаз, нарушения зрения вследствие ослабления внутренней прямой мышцы глаза или нарушения рефлекса аккомодации.
- ▶ Боль в глазах, усиливающаяся при напряжении глаз, например, при чтении, шитье или вязании.
- ▶ Косоглазие после операции.
- ▶ Затуманенное зрение; затуманенное зрение или пятна перед глазами при чтении.
- ▶ Близорукость, дальновзоркость, хориоидит, помутнение хрусталика у детей (катаракта), ухудшение зрения, далекие предметы кажутся размытыми.
- ▶ Быстрая утомляемость глаз.
- ▶ Нарушение аккомодации, характеризующееся напряжением глаз и белыми пятнами перед глазами.
- ▶ Постоянные внезапные изменения зрения, более или менее размытые каждые несколько минут (Аллен).
- ▶ Разрывание во время простуды и головная боль.
- ▶ **Основными симптомами болезни Джаборанди являются чрезмерное слюнотечение, слезотечение и жидкие выделения из носа с обильной водянистой диареей.**
- ▶ Тошнота при взгляде на движущиеся объекты.
- ▶ Заражение глистами.
- ▶ При хронической почечной недостаточности в моче обнаруживается все больше крови.
- ▶ Обильное потоотделение, которое начинается на лбу и лице, а затем распространяется по всему телу.
- ▶ Крайне холодные дети, склонные к простудам.
- ▶ Сильная жажда.

Источник

- Также известен как *Pilocarpus jaborandi*, принадлежит к семейству рутовых (Rutaceae).

ХАЛАПА

(Луковица халапеньо - Джал.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Ребенок кричит и визжит непрерывно и, кажется, без всякой причины.
- ▶ Потливость головы.
- ▶ Язык гладкий, глазированный и сухой.
- ▶ Диарея во время прорезывания зубов, стул грубый, внезапно обильный и кашицеобразный, с кислым запахом.
- ▶ Отвращение к грудному молоку.
- ▶ Тяга к соли, уксусу и шоколаду.
- ▶ Расстройства пищеварения у младенцев.
- ▶ **Диарея у детей с болями и спазмами в кишечнике, метеоризмом.**
- ▶ Стул водянистый, имеет кислый запах, иногда с примесью крови.
- ▶ Колики перед дефекацией и во время неё. Большинство симптомов диареи усиливаются ночью. Жидкий и кашицеобразный стул.
- ▶ Вздутие живота и боль в анусе.
- ▶ Днем ребенок чувствует себя хорошо, но ночью он плачет и ворочается.
- ▶ Склонность к простудам.

Источник

- Также известно как *Exogonium purga*. Принадлежит к семейству выюнковых (Convolvulaceae).

J ATROPH A CURCAS (purge nut tree - Jatr-c.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Тревога, душевные страдания, истощение и легкие судороги делают Jatrc. прекрасным средством от холеры.
- ▶ Неутолимая жажда.
- ▶ Очень хочется лимонада.
- ▶ Диарея с внезапными позывами к дефекации, постоянным урчанием и бульканьем, ощущением, будто живот полон жидкости, особенно слева. Тошнота с ознобом и холодным потом.
- ▶ Стул обильный, безболезненный, бродящий, без запаха, с желеобразной слизью.
- ▶ Понос из ануса, стул выливается как цунами.
- ▶ Внезапный мягкий стул, выделение различных глистов и остриц.

Источник

- Также известно как *Atropha curcas* и принадлежит к семейству молочайных (Euphorbiaceae).

КАЛИУМ БРОМИСТЫЙ

(Бромистый калий - Kali-br.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Быстро возникающее чувство вины** по таким вопросам, как мораль, секс и неисполнение долга.
- ▶ **Нервное беспокойство**; не может усидеть на месте, вынужден бродить или быть занятым.
- ▶ Множество психосексуальных проблем в период полового созревания возникают у детей, чьи семьи считают секс табу.
- ▶ Ночная паника у детей, которые видят страшные сны, просыпаются с криком и затем никого не узнают.
- ▶ Ребенок думает, что навлек на себя гнев Божий.
- ▶ Часто показано детям со строгой религиозной средой, воспитание которых характеризуется строгими представлениями о морали, преступности и вине.

Тело

- ▶ Беспокойные руки (Тарент) и ноги.
- ▶ Толстый, светлокожий, апатичный, с тяжелым кровоизлиянием и вялый.
- ▶ Несмотря на всю вялость, в отдельных частях тела ощущается некое беспокойство.

DD: Дети Kali-br. похожи на лекарственные картины Ambr., Hyos., Mygal., Stram. и Tarent.

Другие важные симптомы

Дух

- **Отвечает односложно** (Ph-ac., Verat.) или **на все вопросы отвечает «Нет».**
- **Страх по ночам**, особенно во время прорезывания зубов.
- **Умственное истощение**; потеря памяти.
- **Дети, которые плохо учатся в школе**, ленивы и, по-видимому, им не хватает интеллекта.
- **Депрессивные расстройства, вызванные смертью близких.**
- **Преждевременная мастурбация** с сильным **чувством вины** (стафилококк).
- **Суетливость** (Iod., Merc.); постоянная игра пальцами, теребление своей обуви или одежды, перебирание пальцами, заламывание рук (Stram.) и т. д.
- **Забывает или искажает слова при разговоре и письме.**
- **Отсутствие чувства морали** (Bell., Hyos.); склонность лгать, воровать и обманывать.

- **Почерк плохой и неясный** (Кали-п., Мерс.).
- Дети, которые всегда начинают плакать по малейшему поводу.
- Лень и медлительность; отвечает медленно, приходится повторять вопрос.
- Изобилие (Hyos.).
- Бессмысленное занятие (предательство).
- Ненавидит уроки музыки, особенно уроки игры на фортепиано.
- Мелкие эмоциональные конфликты могут легко вызвать чувство отверженности Богом и друзьями, что свидетельствует об очень сильной эмоциональной неуверенности.
- Беспокойство по ночам.
- Страх сцены.
- Подозрительный.
- Полезно в случаях дислексии, умственной отсталости или задержки развития.

ГОЛОВА

- **Сильные головные боли из-за сотрясения мозга.**
- Мигрень с покраснением лица, пульсацией в висках и красными глазами.
- Результаты теста:
 - **Горячая голова, холодные конечности.**
 - Не может держать голову прямо (застывает).
 - весы.
 - Начальный базилярный менингит.
 - Символ Кернига ++.
 - МРТ показывает цереброваскулярную травму, в частности, из-за разрыва врожденной ягодичной аневризмы.
 - Вращает головой (Bell., Sulph.).

ГЛАЗА

- Результаты теста:
 - **Покраснение глаз, особенно при головных болях** (Spig.).
 - Пристальный взгляд.
 - Зрачки расширены и нечувствительны к свету.
 - Косоглазие после ночных кошмаров (pavor nocturnus).
 - Запавшие глаза.

НОС

- **Нисходящий ринит, поражающий горло и нижние дыхательные пути .**
- Результаты теста:
 - Красный Нос (выпускник).
 - Толстые желтые корки в ноздрах.

ЛИЦО

- Результаты теста:
 - Ярко-красное лицо из-за головной боли, возбуждения или потери сознания.
 - **Пустое выражение** (Фос.).

- Синевато-красные прыщи.
- Сыпь на носу.
- Тризм.
- Постоянно дергает за губы (Брай.).
- Увеличение правых подчелюстных лимфатических узлов.

РОТ

- **Сухость во рту с повышенной жаждой.**
- **Скрежетание зубами из-за страха или во время сна.**
- Афазия вследствие эмболии средней мозговой артерии.
- Затрудненное прорезывание зубов: рвота и диарея.
- Повышенное выделение слюны с неприятным запахом.
- Результаты теста:
 - Высовывание языка при хорее.
 - **Заикающаяся речь** (Страм.).
 - Афтозные язвы.
 - Неприятный запах изо рта.
 - Красный, чувствительный язык и губчатые десны.
 - Дрозд.

ШЕЯ

- **Затрудненное глотание, особенно жидкостей (смех), может глотать только твердую пищу.**
- Результаты теста:
 - Темно-красное или пурпурное окрашивание миндалин и язычка.
 - Пульсация сонных артерий.
 - Увеличение щитовидной железы.

ЖЕЛУДОК

- **Сильная жажда** является сопутствующим симптомом большинства жалоб.
- **Постоянная икота.**
- **Рвота во время прорезывания зубов** (Вру., Ирес.)
- **Рвота меконием у младенцев, больных коклюшем.**
- Отвращение к еде.
- Рвота пищей и слизью после каждого приема пищи.
- Не любит: фрукты, молоко, лук.
- Пристрастия: шоколад, холодные напитки.

ЖИВОТ

- **Спазматические, щемящие колики у младенцев и детей младшего возраста, вызванные метеоризмом.**
- Результаты теста:
 - Асцит.
 - Увеличение печени и селезенки.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Детская холера:** стул зеленый, водянистый, с быстро прогрессирующим коллапсом.

- **Постоянные запоры у новорожденных с очень твердым стулом** (Nux-v., Op.).
- Понос при прорезывании зубов с сильной жаждой; также выделяется кровь.
- Результаты теста:
 - **Задержка мекония.**
 - Полипы прямой кишки.
 - Спастическое сужение прямой кишки.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Подавление выделения мочи при холере.
- Обильное мочеиспускание с повышенной жаждой.
- Выделение мочи со стулом (Caust.).
- Ночной энурез.
- Результат теста:
 - Моча: Альбумин +, повышенный удельный вес, осадок; фосфаты ++, сахар ++.

ГЕНИТАЛИИ

- Склонность к мастурбации.
- Сладострастный зуд гениталий.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Болезненная охриплость.
- Результат теста:
 - Ларингизмус стридулус.

КАШЕЛЬ

- **Спазматический или отрывистый кашель у слабых, нервных детей, заставляющий их просыпаться в панике.**
- Сухой, жесткий, непрерывный.
- Приступы ночного кашля, за которыми следует рвота.
- Плач из-за кашля.

ГРУДЬ

- Капиллярный бронхит у детей с выраженной одышкой и судорогами.
- Пневмония у детей раннего возраста.
- Результат теста:
 - Рентген грудной клетки: уплотнения в легких.

НАЗАД

- Результат теста:
 - Опиостотонус.

КОНЕЧНОСТИ

- Хорея, вызванная страхом.
- Склонен спотыкаться и ронять вещи из-за слабости суставов.
- Результаты теста:
 - Мозжечковый знак ++.

- Беспокойные, суетливые руки и пальцы постоянно двигаются.
- Ноги, ступни и запястья ледяные и синие; при надавливании пальцами остаются белые следы.
- Парализующая слабость разгибательных мышц ног и стоп.
- Тремор рук при любом произвольном движении.
- Подергивание пальцев.
- Неустойчивая походка.

СПАТЬ

- Кошмары.
- После эпилептического припадка погружается в глубокий сон.
- Беспокойный сон с частыми стонами.
- Лунатизм.

КОЖА

- На лице и туловище появляются небольшие гнойные прыщи, расположенные группами (Арн.), сопровождающиеся сильным зудом.
- Результаты теста:
 - Затвердение или рубцевание, сохраняющееся еще долгое время после исчезновения сыпи (Vario.).
 - Болезненные пустулезные высыпания.
 - Холодный на ощупь.
 - Псориаз.
 - Киста сальной железы.

Судороги

- Жалобы, вызванные: **гневом, испугом** (Hyos., Indg.) или другими эмоциональными причинами; **во время прорезывания зубов** (Supr.); во время новолуния; при мастурбации; органическими травмами, опухолями головного мозга (Sil.); **коклюшем** или острой или хронической почечной недостаточностью.
- Во время судорог: **пристальный взгляд, застывший взгляд** (Ign.); мышечные подергивания, обычно начинающиеся с лица.
- После судорог: головная боль и потеря аппетита.
- **Периодические приступы:** каждую неделю, каждые 2 недели или каждые 10 дней.
- Дневные судороги.
- Большая эпилепсия.

Общий

- **Хорея вследствие испуга** (Caust.); не может ходить, вынужден бегать или прыгать.
- **Периодичность жалоб.**
- Кистозные опухоли.
- Ему очень неудобно стоять.
- Дети с избыточным весом и ожирением.
- Отсутствие реакции.
- Большинство симптомов улучшаются, когда ребенок занят умственно и физически.

КАЛИУМ КАРБОНИКУМ

(Карбонат калия - Kali-c.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

► Слишком дотошный, жесткий и догматичный; **зацикленный на чем-то тип личности.**

- **Легко раздражаются от шума** (Ars., Borx., Ferr., Iod.); любой внезапный шум их пугает (гудение автомобилей, шум радио или телевизора, хлопанье дверей).
- **Собственнический, цепляется за всё.** Так, ребёнок постоянно цепляется за мать (Ant-t., Lys., Phos., Puls.); он постоянно нуждается в её поддержке и не желает расставаться с ней ни на час. Это цепляние ещё сильнее, чем у Puls или Stram.
- **Сильное чувство долга** (Aur., Calc., Thuj.); очень ответственный.
- Дети всегда хотят все планировать заранее и придерживаться своих планов; нет ничего хуже, чем изменения в их расписании (Bry., Camph., Merc.).
- Эти дети обычно аккуратны, точны и выглядят уверенными в себе (Ferr., Sulph.).
- Синдром спутанности сознания: ребёнок просыпается утром, думая о многочисленных ежедневных делах. Затем он приступает к ним и тут же обнаруживает, что есть дела поважнее. С этой мыслью он бросает первое дело и спешит ко второму. Но как только он приступает ко второму, сразу же переключается на третье. В итоге ребёнок совершенно растерян и не может ничего закончить.
- Большая спешка там, где это не нужно (Arg-n., Merc., Nat-m., Tarent.); в результате ребенок делает ошибки в речи, путает слова, останавливается на полуслове и т. д.
- Упрямые дети; нелегко идут на компромисс.
- Ребенок не любит оставаться один и играть один; ему нужна компания, но не жалость.
- Трезвые, лишённые воображения дети, которые больше руководствуются разумом, чем чувствами (Lys., Nit-ac., Plb.).
- Маленькие дети сразу же раздражаются, когда их привычный распорядок дня меняется, потому что они хотят, чтобы он был неизменным:
 - обычные друзья.
 - обычная еда.
 - фиксированное время подъёма и отхода ко сну.

Тело

- Темные волосы, склонность к ожирению (Am-c., Graph.) и плоскостопие.

- ▶ Маленькие дети не любят, когда к ним прикасаются; они вздрагивают от малейшего прикосновения (кокк, кали-п, сил), особенно когда трогают их ноги; тогда ребенок касается области сердца или желудка.
- ▶ Небольшая потливость при малейшей нагрузке (Calc., Chin., Ferr., Iod., Lyc., Psor., Sulph.).
- ▶ Чувствительность к сквознякам (Calc-p., Rhus-t., Sil.), улучшение в теплом помещении, но теплое питье ухудшает состояние (хотя ребенок согревается теплым питьем, он тут же снова замерзает; следовательно, ухудшение вызвано скорее охлаждением, чем теплым питьем).
- ▶ Сильная склонность к простудам, особенно после перегревания (Bry., Carbo-veg., Puls., Sep.).
- ▶ Анемичные, бледные и дрожащие дети.
- ▶ Дети, которые могут выдержать лишь минимальные умственные и физические нагрузки.
 - ▶ Малыши и даже новорожденные капризны, они чувствуют себя некомфортно и раздражительны после каждого приема пищи.
 - ▶ Дети, которые никогда не чувствуют себя хорошо и у которых нет сил, когда приходит время встать.
 - ▶ Носовое кровотечение при умывании лица по утрам (Am-c., Arn.).
 - ▶ Бледные, нежные, вялые дети, быстро истощающиеся от малейшей нагрузки (Calc.).
 - ▶ Восприимчивость к влажной погоде (Nat-s.); у ребенка наблюдаются аллергические симптомы верхних дыхательных путей во влажную погоду.

Другие важные симптомы

Дух

- Жалобы, вызванные: **ожиданием**, одиночеством, эмоциональным возбуждением (плохие новости, шок, горе и т. д.) и умственным напряжением.
- **Прижимается к матери и постоянно держит ее за руку** (Ant-t., Bism., Lyc., Phos., Puls.).
- Хочет, чтобы **его носили** (Cina) и **качали** (Puls., Merc-c.).
- **Раздражительность из-за голода.**
- **Чрезвычайно чувствителен к щекотке** (кальций р., лактат, натрий м., фосфат, цинк) и прикосновениям и шуму; внезапно вскакивает, как будто от испуга.
- Страх одиночества, **птиц** (Apis, Nat-m.), толпы, темноты, неудач и **отвержения** (Calc., Ign., Nat-m.).
- **Легко пугается пустяков** (Ars., Lyc., Nat-c.), даже приближения или прикосновения кого-либо, боится, что его ударят или побьют; не выносит, когда кто-то даже смотрит на него.
- **Внезапные крики по пустякам** (Plb., Stram.).
- **Слишком правильный, воспитанный** (нац., ср.).

- **Слабо развита математика** (высш., мерк., ест.-х., фарм.-акад., реф.-техн.); любые математические вычисления воспринимаются как особенно трудные.
- Альтернативные состояния:
 - Капризность, сменяющаяся отвращением к любым изменениям в привычном укладе жизни.
 - Изменение настроения.
 - Желание компании, сменяющееся отвращением к компании.
 - Раздражительность, сменяющаяся жизнерадостностью.
 - Бурные вспышки гнева по пустякам, сменяющиеся кротостью и спокойствием.
- Амбициозные дети; хотят стать богатыми предпринимателями и иметь огромное богатство .
- Младенцы и дети раздражительны после еды и при пробуждении по утрам.
- Булимия.
- Терпеть не могу музыку, особенно попсу.
- Не могут смотреть жестокие или пугающие фильмы или телепередачи, а также читать на темы, которые их глубоко волнуют.
- Младенцы плачут всю ночь без причины.
- Дети вялы весь день и становятся очень беспокойными ночью; успокоить их можно, только если носить на руках или укачивать.
- Добросовестный в деталях, с развитыми моральными принципами и чувством ответственности; ребенок вовремя выполняет домашнее задание, держит все на своих местах и т. д.
- Постоянные стоны, нытье и жалобы.
- Творческая личность.
- Ему нужна компания только потому, что он боится остаться один.
- Легко начинает плакать, рыдает от боли или от мягкого упрека или наставления ; хуже от утешения.
- Испытывает трудности с выражением своих мыслей в письменной форме, поэтому плохо пишет эссе, тесты на понимание и т. д.
- Трудности с концентрацией внимания во время учёбы. Делает ошибки при письме и говорении; меняет слова или использует неправильные.
- Жадные дети (Гиос.).
- Лидерские качества (Nux-v., Sulph., Verat.) в очень молодом возрасте.

Голова

- Хронические головные боли; со слезотечением, чувствительностью к свету, тошнотой и рвотой; хуже от холодной погоды, кашля, напряжения глаз, воздействия холода, намокания головы, сотрясения мозга, **подавления простуды** (применение противоотечных средств) (Acon., Calc., Dulc., Nux-v.), при пробуждении утром; лучше в положении лежа, от **теплых компрессов** (Kali-ar., Mag-p.) и **теплого укутывания головы** (Нер., Nux-v., Sil.).
- Голова чувствительна к **сквознякам** (Нер., Nux-v., Sil.) или холодному воздуху, особенно в области макушки.

• Результаты теста:

- Ребенок не может держать голову прямо, падает назад.
- весы.
- Шелушащаяся, сухая, покрытая коркой или чешуйками, шелушащаяся сыпь, расположенная на участках волосистой части головы.
- Горячая голова.
- Непроизвольные подергивания головы из стороны в сторону или вперед и назад.
- Опухшая и отечная глabella [безволосая область между бровями],

ГЛАЗА

- **Отёчность вокруг глаз** (Apis, Fern, Phos., Rhus-t.), особенно мешковидная припухлость **между верхним веком и бровями** (Лyc.); хуже утром при пробуждении, из-за чего ребенку трудно открыть глаза.
- **Выпадение ресниц** (Apis, Ars., Merc., Rhus-t., Staph.).
- **Слабое зрение, затуманенное зрение после кори** (Caust., Euphr, Puls.).
- Аллергический и катаральный конъюнктивит с жаром в глазах, после простуды.
- Слезотечение при простуде, кашле или головной боли.
- Боль в глазах при чтении или при лихорадке (Лyc.) или подавленной простуде.
- Результаты теста:
 - Воспаление век.
 - Инъецированная конъюнктива.
 - Помутнение роговицы.
 - Язвы роговицы.
 - Маятникообразные движения глазных яблок из стороны в сторону.
 - Выпуклые глаза.
 - Смотри.
 - Запавшие глаза.

УШИ

- Боль в ухе, особенно в **правом ухе** (Bar-c., Bell., Nit-ac.), около **полночи**.
- Результаты теста:
 - **Правое ухо красное и горячее** (Bry., Cham., Sep.), левое бледное и холодное.
 - Обильные, вонючие, желтоватые, жидкие, кровянистые выделения.
 - Влажные, шелушащиеся высыпания за ушами.
 - Инфекция среднего уха.
 - Лимфатические узлы спереди и сзади ушей увеличены и болезненны.
 - Из ушей постоянно сочится желтоватая, жидкая ушная сера.

Нос

- **Катар распространяется на лобные пазухи** (Лyc., Merc., Sil.) **и вниз в горло** (Kali-bi., Kali-i., Merc.), развиваясь либо в тонзиллит, либо в перитонзиллярный абсцесс.

- Насморк: от **перегревания** (Bry., Carbo-veg., Puls., Sep.) или от пребывания в жарком помещении с последующим охлаждением на улице; раздражающие, зловонные, гнойные, густые, желтовато-зеленые выделения, которые **высыхают и образуют корки и чешуйки** (Bov., Kali-bi., Lac-c., Stict.), которые кровоточат при удалении (Nit-ac.).
- Носовые кровотечения у детей со сниженным количеством тромбоцитов; усиливаются после еды, **сморкания** (Arn., Lach., Phos.), утром и при **умывании лица** (Arn., Calc-s., Dros.).
- Заложенность носа в теплом помещении; **лучше на открытом воздухе** (Phos., Puls., Rhus-t., Sulph.).
- носовые **жалобы** (Bry., Kali-bi., Merc., Sulph.): катар, насморк, носовые кровотечения и заложенность.
- Хроническое насморк (кальций, лизис).
- Сильное, частое чихание при пробуждении утром, без выделений.
- Результаты теста:
 - **Холодный кончик носа** (Apis, Ars., Calc-p., Lach.).
 - **Заостренный нос** (Camph., Kali-bi., Lyc.).
 - Ретроназальный катар.

Лицо

- Результаты теста:
 - Сухие, потрескавшиеся, **опухшие** губы (Arum-t., Nat-m., Sep.) с шелушением кожи и небольшой кровоточивостью.
 - Выражение лица: **Страдающее** (Ars., Lyss.), **запавшее** (Ant-t., Camph., Op., Verat.) и **грязное** (Arg-n., Lyc., Psor., Sulph.), с синими кругами вокруг глаз.
 - **Сероватый оттенок** языка (Arg-g., Chel., Cupr., Merc-cy.).
 - Пот на верхней губе (Med., Nux-v., Rheum.).
 - **Подергивание левой стороны лица** (Agar., Calc.).
 - Акне.
 - Жар и покраснение на одной стороне лица, в то время как другая сторона холодная и бледная.
 - Увеличены слюнные железы и подчелюстные лимфатические узлы, особенно справа.
 - Бородавки.
 - Нахмуренные брови.

РОТ

- **Скрип зубов от гнева.**
- Зубная боль от любой **холодной** (Cham., Nux-v.) пищи или питья, или даже от вдыхания холодного воздуха; лучше от внешнего **тепла** (Mag-p.) и давления; зубная боль распространяется на уши, глаза, лицо, лоб, скулы и виски.
- Сухость во рту при пробуждении утром.
- Обильное, зловонное выделение слюны, усиливающееся от боли.
- Результаты теста:
 - Язык вишнево-красный.

- Неприятный запах изо рта.
- Пораженные цингой десны с болезненным отеком и нагноением; отделяются от зубов и легко кровоточат.

ШЕЯ

- **Не переносит одежды, надетой на шею** (Lach., Sep.).
- Ребенку трудно глотать **твердую пищу** (Bapt., Bar-c.), он давится при попытке есть и **вынужден запивать каждый кусочек водой**, чтобы запить его (Bell., Cast., Nat-c.).
- **Чрезвычайно чувствителен к холодным сквознякам** (Fl-ac.) и **холодным напиткам**; если тонзиллит не контролировать, он может перейти в астматический бронхит.
- Боль в горле, словно от иголки, **отдающая в ухо** при глотании (Nit-ac., Nux-v.); усиливается от воздействия холодного воздуха и при кашле.
- Еда застревает в горле.
- Липкая слизь в горле, особенно по утрам, которую невозможно проглотить или откашлять.
- Результаты теста:
 - **Удлиненный язычок.**
 - Склонность к постоянному сглатыванию (Caust., Merc-c.).
 - Экзофталмический зоб [Базедова болезнь].
 - Левосторонний тонзиллит.

ЖЕЛУДОК

- Проблемы с пищеварением, **грязно-серый язык**.
- Большинство желудочных жалоб усиливаются **после употребления холодной воды (особенно после перегревания), после еды (особенно хлеба, газированной пищи, жареной рыбы или молока)**, а также от **волнения или гнева**, что приводит к вздутию живота, тяжести и боли в желудке, а также изжоге, неполной кислой отрыжке, рвоте и рвоте.
- Все чувства ощущаются в желудке (Ant-c.).
- Иккинг.
- Ухудшение: яблоки, фасоль, **хлеб**, капуста (Lus.), холодные напитки (особенно после перегревания), кукуруза, мучная или газообразующая пища, жир, **жареная или испорченная рыба**, горячие напитки, **мороженое, мясо, молоко, выпечка** (Ant-c.), горох, каша, суп, овощи и теплая или горячая пища.
- Улучшение: Холодные блюда.
- Отвращение: **хлеб** (китайский), особенно черный или ржаной, капуста, мясо, молоко, вид еды, суп, **сладости** (арсенал).
- Пристрастия: сыр, шоколад, деликатесы, фрукты, печень, каша, **кислая пища, сахар** (Arg-n.), **сладости** и теплые напитки.

Синдром диспепсии

- Ребенок испытывает тягу к сладкому или сахару; редко он также испытывает тягу к кислому; у большинства детей, которым необходим Кали-с, наблюдается сильное **отвращение к мясу** (Calc., Puls.).

- Большинство детей Kali-с., которых я наблюдал, имеют **избыточный вес**, несмотря на хроническую диспепсию с метеоризмом и несварение желудка.
- Чрезмерное вздутие живота, чувствительное к надавливанию и прикосновению одежды; вздутие усиливается ночью или ранним утром и приводит к бессоннице у ребенка.
- Дряблый, бледный язык; толстый налет у основания или болезненный кончик языка.
- Дискомфорт после еды, поэтому малыши предпочитают питаться небольшими порциями, но часто; сразу после еды они снова чувствуют голод и дискомфорт.

ЖИВОТ

- **Колики**, усиливающиеся после кормления грудью или еды, на свежем воздухе и во время стула ; с сильным бульканьем и урчанием; уменьшающиеся при **сгибании живота**.
- **Желтуха у грудных детей после гнева матери** (Cham., Nat-с.).
- Фиксированный метеоризм (Arg-n., Raph.) с болезненным тимпаническим вздутием живота после кормления грудью или еды.
- Результаты теста:
 - **Брыжеечные железы увеличены.**
 - **Живот дрожит при кашле** (Carb-an., Sil.).
 - Асцит.
 - Твердая, увеличенная печень.
 - Паховая грыжа.
 - Паралитическая непроходимость кишечника.
 - Увеличение паховых желез.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Слизь с примесью крови в стуле, который **вначале сухой, твердый и обильный, затем становится мягким** (Bov., Lys.).
- Безболезненный, зловонный понос после **молока** (Mag-m., Nat-с.).
- Обильное, зловонное газообразование с диареей.
- Непроизвольная дефекация при метеоризме (Алоэ, Натр-п.).
- Выпадение прямой кишки во время дефекации.
- Результаты теста:
 - Открытый, расслабленный анальный сфинктер.
 - В кале: острицы, аскариды и сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Выделяет красный песок с мочой (Canth., Sep.).
- Задержка мочи с водянкой.
- Результаты теста:
 - Нефротический синдром.
 - Моча: Альбумин +++, Цилиндры +, Гной ++, Эритроциты ++, Сахар +, Мочевая кислота ++.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Хрипы, вызванные слизью, в трахее перед кашлем.
- Охриплость при простуде (Carbo-veg., Phos.).

ДЫХАНИЕ

- **Астма , чередующаяся с ночной диареей.**
- Одышка или астматическое дыхание, усиливающееся после стула, **питья холодной воды при перегреве** (Bry.), во время сна (особенно с **2 до 4 часов утра**), от воздействия холодного воздуха, от напряжения, лежа, еды, питья или письма, в сырую погоду; **облегчающееся от наклона вперед** (Ars., Lach.), **отрыжки** (Calc., Carbo-veg.), **качания** (See.), положения **сидя прямо** (Ant-t., Laur.), **полусидя** (Spig.) **или сидя, наклонившись вперед, локти или голова на коленях** (Coc-c.).
- Результаты теста:
 - Хриплое дыхание (Supr., Lys.).
 - Вздохи или громкое стонущее дыхание.
 - Свистящие или хрипящие звуки при вдохе (Aral., Kapc.) или при кашле.

КАШЕЛЬ

- Во время кашля: синюшно-красное лицо, рвотные позывы, тошнота и рвота, боль в груди или горле, **рвотные позывы** (Carbo-veg., Dros.).
- Внезапный, сильный, сокрушительный, спастический, удушающий, изнуряющий кашель от сухости и раздражения в гортани, в положении **лежа** (Rumx., Sang.); хуже после **кори** (пульс), после полуночи (примерно с **2 до 4 часов утра**, мешает спать), при пробуждении утром, от холода или свежего воздуха, перемены температуры, зимой, от пищи, хлеба, горячей пищи, молока; лучше от еды или питья (холодных напитков) и от отхаркивания.

ПНЕВМОНИЯ

- Внешний вид ребенка, больного пневмонией: **истощенный, бледный, лицо одутловатое, вид изможденный.**
- Дети, страдающие калий-связанной пневмонией, весьма восприимчивы к **эмпиеме** или эндокардиту.
- В моей практике иногда бывает сложно **отличить Kali-с от Нер. при пневмонии**, поскольку оба препарата имеют много схожих характеристик кашля. Ухудшение в 2–4 часа утра отсутствует при Нер., но обычно усиливается позже, около 7–8 утра. Кроме того, дети с Нер. хуже и выглядят более тревожными.
- На поздних стадиях, когда ребенку становится трудно дышать, он или она захочет сидеть прямо, наклонившись вперед и опершись локтями на колени.
- **Длительная пневмония, которая сохраняется и не проходит** (Sulph.).
- Пневмония **нижней доли правого легкого** у младенцев с плевритом ; с болью в боковой части грудной клетки при глубоком вдохе, усиливающейся в сырую погоду и в положении лежа на правом боку.
- **Когда у ребенка затруднено дыхание, он может делать только небольшие глотки жидкости, так как не может задержать дыхание достаточно долго, чтобы**

пить; он не может есть твердую пищу, потому что начинает кашлять, и кашель **не проходит, пока его не вырвет.**

- Губы **обычно синюшные, сухие и потрескавшиеся;** язык сухой и красный или покрыт грязным серовато-белым налетом.
- Типичное время ухудшения — между 2 и 4 часами утра, что проявляется также кашлем и затрудненным дыханием; улучшение наступает в положении **сидя с приподнятым положением и наклоном вперед** (Ars., Lach., Spong.).
- Дрожание рук и пальцев, **дергает за постельное белье** (Hyos.), подергивание **лица при пневмонии.**
- Ребенок не любит оставаться один и становится очень тревожным.
- Ребенок очень чувствителен к любому сквозняку и шуму.
- Сопутствующие пневмонии метеоризм и дискомфорт в животе.
- произошло пневмоническое уплотнение легких .
- Во рту сухость, выраженная жажда.
- Мокрота скудная и откашливается с трудом.
- Сильное потоотделение с приступами кашля (Геп.).
- Ребенок чувствует себя хуже, лежа на пораженной стороне (где происходит сдавление легкого), обычно это правая нижняя доля.
- Они очень легко раздражаются и становятся раздражительными, когда кто-то пытается их осмотреть.
- Слабый пульс.
- Если поражена еще и плевра, ребенок жалуется на сильную боль в груди, усиливающуюся при каждом движении и кашле.

Грудь

- Результаты теста:
 - Эмпиема.
 - Митральная и трикуспидальная регургитация.
 - Отек легких.

Назад

- Результаты теста:
 - Искривления позвоночника.
 - Травмы позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

- Холодные ноги ночью в постели (Кальк.).
- Заболевание тазобедренного сустава.
- Беспокойные конечности у детей перед сном.
- Результаты теста:
 - Холодные пальцы (Graph., Thuja.).
 - Обильный, холодный, зловонный, липкий пот на ногах.
 - Чувствительные к прикосновениям мозоли.
 - Цианоз с синюшным окрашиванием рук и ног.
 - Водянка или отек только одной стопы.
 - Болезненность кожи между бедрами.

СПАТЬ

- Во время сна: удушье или прерывистое дыхание (Cench., Op.), судороги в икрах и бедрах, скрежет зубов (Cina, Tub.), громкий разговор, обильное слюнотечение, зов на помощь (Rhus-t.), топание ногами, вскакивание, подергивание нижних конечностей и плач.
- Бессонница у младенцев в период прорезывания зубов.
- Ребенок не может спать на левом боку.
- Ребенок беспокоен и не может спать после полуночи из-за газовых колик или кашля.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Рвота желчью, бред, сильная жажда, раскрытие невыносимо, тошнота, боли в животе, ребенок хочет тишины.
 - Хуже после еды, вечером (17-18 часов) и от малейшего сквозняка.
 - Улучшение от внешнего тепла и в теплом помещении.
- Нагревать:
 - Сопровождается мучительной тревогой (Arn.), болью в спине (Nux-v.), неприятным привкусом с белым налетом на языке, жжением в глазах, бредом, сухим или влажным кашлем, одышкой, возбуждением (Rhus-t.), метеоризмом со вздутием живота, головной болью, отвращением к пище, тошнотой, болью в правом подреберье, сонливостью с зевотой, отсутствием жажды, рвотой.
 - Частичное тепло живота, подмышечных впадин, лица, стоп, суставов верхних и нижних конечностей, поясничной области, шеи или одностороннее тепло (правая сторона или нижняя половина тела).
 - Хуже после полуночи, с 3 до 5 часов утра, начинается утром с 9 до 17 часов вечера, в постели и в теплом помещении.
 - Лучше вставать.
- Пот:
 - Обильный, холодный, кислый или зловонный пот верхней части тела, усиливающийся после полуночи.

КОЖА

- Обильное потоотделение от малейшего напряжения (умственного или физического), от подавления секреции или во время еды.
- Сухая кожа с зудом и жжением после расчесывания.
- Болезненные, зудящие бородавки, которые постепенно увеличиваются в размерах.
- Результаты теста:
 - Веснушки.
 - Опрелость.
 - Выраженная бледность.
 - Киста сальной железы.
 - Старая, грубая, нездоровая и сморщенная кожа.

Судороги

- Жалобы на: лихорадку или гельминтозы.
- Во время судорог: клонико-тонические судороги, кашель, спазмы губ и челюсти, скованность конечностей.
- После судорог: отрыжка, тошнота и бессонница.
- Ухудшение: во время сна, вечером и ночью.

Общий

- **Очень зябкие дети**, с сильной предрасположенностью к простудам, у которых развивается синусит и лимфаденит ; состояние ухудшается от холода, влажных компрессов, сквозняков или холодного воздуха, сухой холодной погоды, пребывания в холодном помещении и т. д., улучшение от любого вида тепла.
- Хуже после или во время еды, **с 2 до 4 часов утра**, при перемене погоды, во сне, от голода, от движения или ходьбы, при пробуждении утром и **от подавления потоотделения** (особенно потоотделения стоп) (Sep., Sil., Zinc.).
- Аллергическая конституция.
- Ребенок с туберкулезной миазмой, часто имеющий туберкулез в семейном анамнезе.
- Ребенок так и не смог полностью выздороветь после того, как перенес пневмонию.
- Дети, ослабленные и анемичные вследствие изнуряющих болезней или склонности к кровотечениям; постоянное желание лечь или встать и опереться.
- Водянка вследствие болезни сердца (Dig.).
- Истощенные или очень тучные дети.
- Юношеский диабет с выраженной утомляемостью и нарушением функции печени или сердца.
- Характерна периодичность и постоянная смена симптомов.
- Правосторонние симптомы.

КАЛИУМ ХЛОРИКУМ

(Хлорат калия - Kali-chl.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Очень упрямые и трудные дети.
- ▶ Себорейный дерматит (молочный струп) — шелушащаяся или шершавая кожа на голове ребенка.
- ▶ Острые **гнойные процессы в полости рта** у грудных детей, страдающих грибковыми инфекциями. В конечной стадии развивается гангрена полости рта.
- ▶ Рот и десны чувствительны, слюна зловонная и гнойная, язык обложен, на всей слизистой оболочке имеются язвы с серым основанием.
- ▶ Инфекция среднего уха с тяжёлым катаром евстахиевой трубы. Выделения густые, белые и желтовато-зелёные. Инфекция среднего уха может привести к образованию полипов в ухе.
- ▶ Творожистые отложения на миндалинах. Горло багрово-красное. Ребёнок постоянно откашливает творожистые комочки.
- ▶ Воспаление горла и миндалин; из горла выделяется белая слизь, сильное жжение и саднящая боль в горле. Глотание затруднено. Опухшие и болезненные шейные лимфатические узлы.
- ▶ **Гидроцеле** (водянка яичка) у новорожденных.
- ▶ Опрелости с раздражением и воспалением кожи в области промежности.

КАЛИУМ МУРИАТИКУМ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Булимические расстройства пищевого поведения у детей, родители которых находятся в конфликте с другими членами семьи.
- ▶ Крайне упрямые дети (китайск., тюрк.); их невозможно заставить делать что-либо против их воли; тогда они стонут, хрипят и сидят неподвижно.
- ▶ Сознательные дети.
- ▶ Люблю раздражать других (Хьюс.).

САРЖА

- ▶ Отвращение к купанию (Ant-c.).
- ▶ Катар с обильными молочно-белыми, тягучими, вязкими выделениями.
- ▶ Опухание и затвердение желез.

Это средство похоже на Kali-c. и Nat-m.

Другие важные симптомы

Дух

- **Легко возбуждается или впадает в уныние.**
- **Тоска по родине** (Игн., Мерс.).
- Неприязнь к друзьям и членам семьи.
- Делирий перед судорогами и во время них.
- Дети, которые боятся призраков и зла.
- Равнодушный ко всему и всем.
- Плохие ученики; медленное понимание.
- Разговоры во сне.
- Потеря сознания при заболеваниях головного мозга.

Голова

- Заложенность и боль в лобных пазухах (Геп.).
- Менингит.
- Результаты теста:
 - КТ: кровоизлияние в мозг; **синусит**.
 - весы.
 - Знак Кернига +.
 - Образование корки или себорейного дерматита (Mez., Sep.).
 - Пот только на голове (Bell., Calc.).
 - Не может держать голову прямо, она запрокидывается назад.

ГЛАЗА

- Трудности с чтением, буквы кажутся мельче.
- Разрывающая боль при кашле.
- Результаты теста:
 - **Воспаление роговицы.**
 - Флебит и воспаление сетчатки.
 - Заложенность и покраснение глаз.
 - Язва роговицы.
 - Ретинальные экссудаты.
 - Гиперемия сетчатки.
 - Помутнение роговицы (Calc., Sulph.).
 - Трахома.
 - Утолщение век и образование корок на веках.
 - Желтые корки и чешуйки по краям век (Dulc.).

УШИ

- **Боль в ухе с опуханием преаурикулярных желез.**
- Хронический средний отит (Merc., Puls.).
- Рецидивирующие инфекции среднего уха, приводящие к мастоидиту.
- Результаты теста:
 - **Спайки в барабанной полости** (холестеатома) (Calc., Calc-f.).
 - **Опухшие железы вокруг ушей.**
 - Массивный выпот около ушной раковины.
 - **Разрыв барабанной перепонки** (Tub.).
 - **Нагноение отверстий для серег** (Lach., Pitu-a.).
 - Катар евстахиевой трубы (Ferr-p., Kali-s.).
 - Экзематозные высыпания вокруг ушей.
 - Нервная или сенсоневральная глухота.
 - Полипы уха.
 - Рентгенография сосцевидного отростка выявляет склероз с отсутствием воздухоносных ячеек.

НОС

- **Запор из-за простуды** (стик).
- Катаральные жалобы с обильными, густыми, молочно-белыми выделениями.
- Оживление слизи из задних отделов носовой полости.
- Результаты теста:
 - Носовые кровотечения.
 - Ретроназальный катар [катар хоаны] (Геп., Кали-би.).

ЛИЦО

- Результаты теста:
 - **Опухшие железы вокруг челюсти и шеи.**
 - Акне.
 - Потрескавшиеся губы.
 - Сыпь вокруг рта.
 - Утопленный.

- Увеличение околоушной слюнной железы (Bar-c., Sil.).
- Пульсация височной артерии, усиливающаяся от малейшего прикосновения.
- Мышечные подергивания.

РОТ

- Афазия (потеря речи).
- Результаты теста:
 - Язвы и воспаления во рту у грудных детей.
 - Увеличенный, затвердевший географический язык.
 - Кровоточивость, цинготные и опухшие десны.

ШЕЯ

- **Хроническая боль в горле.**
- **Рвота густой, белой, творожистой слизью** (Kali-chl., Phos.).
- Результаты теста:
 - Остро воспаленные и увеличенные миндалины делают глотание очень болезненным.
 - Образование твердых корочек на миндалинах.
 - Отёчный отёк язычка.
 - Фолликулярная ангина с творожистыми налетами (C hen-a., Kali-chl.) на миндалинах.

ЖЕЛУДОК

- **Булимия; тяга к еде вскоре после еды; сильный голод в промежутках между приемами пищи; голод исчезает после употребления воды.**
- **Привычная потеря аппетита; отказ от еды.**
- **Расстройство пищеварения, вызванное жирной (бобовой), обильной пищей.**
- Сильная жажда холодной воды.
- Внезапная рвота молочно-белой слизью.
- Обострение: макароны, жирная и острая пища.
- Не любит: яблоки (светлые), жирную пищу, мясо.
- Пристрастия: шоколад, холодные напитки, выпечка (Lach.), жареная пища, **уксус** (Her., Sep.).

ЖИВОТ

- Чувство сытости после еды.
- Результаты теста:
 - **Перитонит.**
 - Асцит.
 - Увеличенная селезенка.
 - Болезненность при пальпации.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Диарея после жирной пищи** (хлорид калия, бобовые).
- Непроизвольные дефекации при метеоризме.
- Зуд в заднем проходе после дефекации, вызванный острицами.

- Бледный, светлый стул.
- Стул настолько сухой, что почти крошится (Nat-m.).
- Результат теста:
 - Выделяет остриц с калом.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Хронический цистит.
- Нефротический синдром.
- Мочеиспускание по каплям.
- Результат теста:
 - Моча: Альбумин +, Сахар +.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результат теста:
 - Орхит.

ГОРТАНЬ

- Гортань очень чувствительна к прикосновению.

ДЫХАНИЕ

- Астма, связанная с желудочно-кишечными жалобами (Carbo-veg., Nux-v.).
- Результат теста:
 - Хриплое дыхание.

КАШЕЛЬ

- **Громкий, шумный кашель, исходящий, как будто, из желудка** (Сен.).
- Отхаркивание густой белой слизи, которую трудно откашливать.
- При кашле изо рта обильно вылетает молочная мокрота.
- Спастический, крупобразный кашель.
- Коклюш.

ГРУДЬ

- Бронхит.
- Результаты теста:
 - Рентгенограмма грудной клетки: пневмоническая консолидация с плевральным выпотом.
 - Хрипы от мокроты в груди (Ant-t., Cupr.).

КОНЕЧНОСТИ

- Ревматизм с экссудатами и отеками вокруг суставов.
- Ревматические боли при движении или от тепла постели.
- Скованность рук при письме (Coss.).
- Результаты теста:
 - Холодные руки и ноги.
 - Бурсит коленного сустава.
 - Вросшие ногти на ногах.

КОЖА

- Сыпь с желудочно-кишечными жалобами.
- Результаты теста:
 - Угри; эритема; экзема с толстыми белыми пузырьками, заполненными гноем.
 - Ветряная оспа.
 - Сухое шелушение кожи.
 - Опрелость.

Общий

- Последствия прививок (Sil., Thuja.).
- Отеки из-за заболеваний печени или сердца.
- Эпилептиформные судороги вследствие подавления высыпаний.
- Помогает растворить твердый фибринозный экссудат.
- Открытые порезы и раны с выраженной грануляцией и отеком.
- Полезно при эпителиоме, болезни Ходжкина, лимфадените, ревматизме, саркомах и цинге.
- Хуже на открытом воздухе и сквозняках.

КАЛИУМ ФОСФОРИКУМ

(Фосфат калия - Kali-p.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Любое эмоциональное потрясение, любое нервное перенапряжение или истощение приводят к постоянному нервному напряжению.
- ▶ Психическое выгорание или сильная тревога перед экзаменами после чрезмерной учебы.
- ▶ Слабые, нервные дети, которые не справляются с ежедневным стрессом и напряженной учебой в школе и в конечном итоге достигают состояния постоянной раздражительности и депрессии; такие дети являются типичными кандидатами на нервный срыв в будущем.
- ▶ Психическая слабость после операции на головном мозге, особенно при опухолях головного мозга или инсульте.

Тело

- ▶ Абсцессы, септические и гангренозные состояния с гнойным отделяемым.
- ▶ Золотисто-желтые выделения.
- ▶ Сильное истощение и невыносимая слабость.

DD: Аналогично Phos. и Ph-ac.

Другие важные симптомы

Дух

- **Неуклюжий; спотыкается и натывается на предметы во время ходьбы.**
- Дети, которые **чрезвычайно оптимистичны и любят иметь много друзей;** чрезвычайно **общительные** дети, которым нравится говорить обо всем, что происходит в их жизни.
- **Плохая память и утомление от слишком долгой учебы.**
- **Беспокойство у новорожденных от полностью истощенных матерей.**
- **Любитель животных.**
- **Нерешительные, осторожные и непостоянные дети.**
- **Необходимо провести.**
- **Слабо разбирается в математике, особенно в сложении.**
- Тревожность и страх по ночам.
- Дети все тянут в рот, особенно пальцы.

- Чрезмерно нервные и гиперчувствительные дети, которых легко пугают шумы, испуг, сон и прикосновения.
- Страх толпы.
- Сильная застенчивость и отвращение к разговору.
- Тоска по дому.
- Отодвигает все дела на второй план.
- Простые порученные им задачи кажутся огромной задачей.
- Жестокий и разрушительный; в гневе рвет ночную рубашку и другие предметы.
- Заламывание рук.
- Текст неясен, а писать утомительно.

Голова

- Сотрясение мозга или механические травмы головы.
- Повышенная чувствительность к шуму.
- Нервные головные боли у студентов.
- Результаты теста:
 - Гидроцефалия.
 - Ударяется головой о предметы.

Глаза

- Нарушение зрения вследствие приступа тифа, менингита, туберкулеза или истощения зрительного нерва.
- Результаты теста:
 - Паралич или подергивание левого верхнего века.
 - Воспаление сетчатки.
 - Пристальный взгляд.
 - Косоглазие после травм головного мозга.
 - Запавшие глаза.

Уши

- Атрофия слухового нерва.
- Результаты теста:
 - Перфорация или изъязвление барабанной перепонки.
 - Прыщ в ушном канале.
 - Гнойная инфекция среднего уха с выделением кровяного гноя, имеющего сильный неприятный запах.

Нос

- **Зуд в задних носовых полостях (хоаны).**
- Носовые кровотечения.
- Ночная заложенность носа.
- Результат теста:
 - Язвы в носу с выделением зловонных выделений.

Лицо

- Искажения и произвольные искривления рта из-за слабости лицевых мышц.

• Результаты теста:

- Герпетическая сыпь вокруг рта.
- Воспаление слюнной железы и подчелюстных лимфатических узлов.
- Тризм.
- Грустное выражение лица с запавшими глазами.
- Изъязвление губ.

РОТ

- **Слегка кровоточат десны.**
- **Во рту настолько сухо, что язык прилипает к нёбу.**
- Скрежетание зубами во время сна.
- Нервный стук зубов.
- Результаты теста:
 - Афтозные язвы.
 - Коричневый, толстый налет на языке.
 - Неприятный запах изо рта.
 - Речь медленная и невнятная.
 - Губчатые, отступающие, цинготные десны.
 - Гниль во рту.

ШЕЯ

- Результат теста:
 - Темно-красное горло с белыми фолликулярными пятнами на миндалинах.

ЖЕЛУДОК

- **Чувство голода сразу после обильного приема пищи; хочет есть что-нибудь каждый час.**
- **Неутолимая жажда, особенно ночью.**
- Аппетита нет, за исключением сладкого.
- Рвота при кашле.
- Не любит: хлеб.
- Пристрастия: яблоки, рыба, **ледяная вода**, оливки, **чипсы**, **орехи** и сладости.

ЖИВОТ

- Гастроэнтерит.
- Живот приходится прикрывать, так как ощущаю холод.
- Результаты теста:
 - Грыжи живота.
 - Асцит.
 - Отчетливо пальпируются печень и селезенка.
 - Тимпанит, вызывающий затруднение дыхания.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Диарея вследствие истощения, шока или эмоционального возбуждения.**
- Холера с испражнениями в виде рисового отвара.

- Диарея с золотисто-желтым, безболезненным стулом с запахом падали, выделяющимся во время или после еды.
- Дизентерия с кровавым стулом.
- Выделение большого количества громких, зловонных газов.
- Результаты теста:
 - Выпадение прямой кишки.
 - Расслабленный анус.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Постоянное ночное недержание мочи у нервных, возбудимых детей.
- Мутная, зловонная моча.
- Прерывистое или произвольное мочеиспускание вследствие нервного истощения.
- Нефрит.
- Результаты теста:
 - Пятна шафранового цвета на подгузнике.
 - Моча: Альбумин +, Сахар+.

ГОРТАНЬ

- Охриплость из-за перенапряжения голоса.
- Афония вследствие паралича голосовых связок.
- Щекотание или постоянное раздражение в гортани и трахее.

ДЫХАНИЕ

- **Астма, вызванная малейшим приемом пищи.**

КАШЕЛЬ

- Приступообразный кашель или коклюш у нервных детей, сопровождающийся сильной слабостью и исхуданием.
- Желтая пенная мокрота.

ГРУДЬ

- Ранняя стадия туберкулеза.
- Результаты теста:
 - Образование абсцесса в подмышечной впадине.
 - Запах чеснока из подмышки.
 - Увеличение подмышечных лимфатических узлов.
 - Рентгенограмма показывает пневмоническое уплотнение и отек легких.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Учащенное сердцебиение из-за волнения или горя.
- Результат теста:
 - Нерегулярный пульс.

НАЗАД

- Из-за сильной слабости вынужден вставать наклонившись.
- Результат теста:
 - Прыщи на спине (Carbo-veg. и Rumx.).

КОНЕЧНОСТИ

- Парализующая слабость от малейшего усилия.
- Спотыкается при ходьбе.
- Часто роняет вещи из-за слабых мышц рук.
- Зуд ладоней и подошв ног.
- Результаты теста:
 - Синие или фиолетовые пятна на конечностях.
 - Холодные руки и ноги.
 - Истощение парализованной конечности.
 - Беспокойные ноги (Цинк.).

СПАТЬ

- Бессонница из-за страха, беспокойства или умственного напряжения.
- Чрезмерное зевание.
- Ночные теракты, просыпаясь в страхе и с криками.
- Вздохи и стоны во сне.
- Лунатизм.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Голод из-за лихорадки.
- Септическая лихорадка.

КОЖА

- Результаты теста:
 - Синие или коричневые пятна.
 - Карбункул.
 - Ощущение холода.
 - Рожа, переходящая в гангрену.
 - Слегка желтушный цвет лица.
 - Зловонные, гнилостные выделения из сыпи.
 - Язвы с очень зловонными выделениями.

ОБЩИЙ

- **Паралич у младенцев с мышечной атрофией во время прорезывания зубов.**
- **Обильный, изнуряющий, зловонный пот от малейшей физической нагрузки, особенно ночью.**
- Анемия.
- Атрофия желез.
- Эпилептические судороги вследствие шока.
- Кровотечение жидкой, гнилостной, ярко-красной, несвернувшейся кровью.
- Лейкемия.
- Полиомиелит.
- Цинга.
- Пониженная температура.

КЕТОГЛУТАРОВАЯ КИСЛОТА

(Альфа-кетоглутаровая кислота - Кето-ак.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Нарушения обучения.** Трудности с концентрацией внимания, особенно при чтении. Спутанность сознания, головокружение и сонливость. Замедленная речь и притупление восприятия.
- ▶ Раздражён даже по мелочам, раздражителен даже утром, когда просыпается. Рассеян.
- ▶ Тихая скорбь из-за болезненного прошлого является основной причиной трудностей в обучении.
- ▶ Повышенная жажда и сильное желание холодных напитков.
- ▶ Запор, затрудненное опорожнение кишечника, даже если стул мягкий.
- ▶ Положение для сна — на правом боку.

Источник

- Это кетонное производное глутаровой кислоты было введено Дэвидом Райли и, если не указано иное, всегда относится к альфа-варианту, т. е. альфа-кетоглутаровой кислоте.
- Важнейшая функция этой кислоты в организме — образование аминокислот и транспорт азота в цикле лимонной кислоты. Её роль в качестве пищевой добавки для бодибилдеров также очень важна, поскольку считается, что она улучшает физическую форму.

КРЕОЗОТУМ

(Дистиллят из буковой смолы - креозот.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети с врожденным нарушением памяти и очень слабым пониманием (Апас., Nux-m.).
- ▶ Дети, которые часто плачут по ночам.
- ▶ Вредный и ворчливый ребёнок, который кричит на родителей за то, что они не дают ему того, чего он хочет, а если и дают, то выбрасывает (Bry., Cina, Cham., Staph.). Вид постоянного недовольства.
- ▶ Очень беспокойный.
- ▶ Раздражается по любому поводу и в гневе бросает вещи.

Тело

- ▶ Туберкулезные и сифилитические миазмы.
- ▶ Высокие, худые, старые и болезненные на вид, истощенные дети с темным цветом лица.

Это средство, сокращённо «Креос», следует изучать вместе с Ars. и Merc. Не путать с Cresolum, сокращённо «Крес».

Другие важные симптомы

Дух

- **Жалобы на насилие.** Эффективное средство для детей , подвергшихся **сексуальному насилию** .
- Подавленный гнев ребёнка по поводу перенесённого сексуального насилия проявляется в агрессивном поведении. Он бросает предметы, злится, когда ему в чём-то отказывают, проявляет непокорность и недовольство.
- Креозотум — мощное средство для детей, больных раком после сексуального насилия.
- **Ночной плач и крики у детей при прорезывании зубов.**
- В период прорезывания зубов психические симптомы значительно ухудшаются. Дети становятся ещё более раздражительными, злыми и плачут даже по самым незначительным поводам.
- Упрямый ребенок, склонный к крику, истерикам, **бросанию предметов** и хныканью, когда ему отказывают в том, что он требует.
- Раздражение, раздражительность и бессонница во время прорезывания зубов.
- Желание, чтобы его носили и ласкали.
- Забывчивый.

- Ноет и раздражителен, когда испытывает боль.
- Беспокойство, особенно ночью.
- Чувствителен к музыке; музыка его возбуждает или заставляет плакать.

Голова

- Кожа головы чувствительна даже к расчесыванию волос.
- Результаты теста:
 - Корки или шелушение с шелушением кожи головы.
 - КТ: кровоизлияние в мозг.

Глаза

- **Стафилококковая инфекция века у маленьких детей с горячими слезами .**
- Глаза неудержимо дрожат.
- Часто трёт глаза.
- Результаты теста:
 - Кровотечение из глаз.
 - Постоянное подергивание век.
 - Воспаление или кистозная опухоль мейбомиевых желез (Con., Staph., Thuj.).
 - Свищи слезных органов.
 - Веки, особенно края век, опухшие и красные, с невыносимым зудом.
 - Пристальный, тупой взгляд.
 - Запавшие глаза с расширенными зрачками и синими кругами вокруг глаз.
 - Изъязвление роговицы.

Уши

- Хроническая инфекция среднего уха с выделением водянистых и зловонных выделений.
- Зуд в ушах.
- Результаты теста:
 - Волдыри и герпетическая сыпь в области ушей.
 - Жар, покраснение и отек левого уха, увеличенные шейные лимфатические узлы.
 - Прыщ в ухе.

Нос

- **Водянистый, обильный, едкий насморк, вызывающий воспаление верхней губы.**
- Хронический катар.
- Носовые кровотечения с жидкой, ярко-красной или черной кровью со сгустками.
- Утреннее спазматическое чихание.
- Результаты теста:
 - Эпителиома.
 - Веерообразные движения ноздрей при пневмонии.
 - Ужасно зловонные выделения из носа.
 - Волчанка.

Лицо

- Результаты теста:
 - Лицо **горячее на ощупь, на щеках имеются локальные красные пятна.**
 - **Постоянно увлажняет губы** (пульс).
 - угри .
 - Трещины в уголках рта, особенно справа.
 - Герпетическая сыпь с желтыми пузырьками, особенно вокруг рта.
 - Старые дети со страдальческим выражением на лицах.
 - Цвет лица либо темный, либо светлый
 - Красные губы, которые легко трескаются и кровоточат.
 - Увеличение подчелюстных лимфатических узлов.

РОТ

- **Зловонное дыхание.**
- **Быстрое, преждевременное разрушение и кариес молочных зубов;** как только они появляются, зубы разрушаются непосредственно у линии десен (Staph., Calc-f.); скорость разрушения превышает скорость роста зубов.
- Зубная боль из-за кариеса.
- Во время **прорезывания зубов все ухудшается:** появляются судороги, запоры, диарея, кашель, аппетит также становится очень изменчивым.
- Зубы имеют тенденцию легко крошиться.
- Очень болезненное прорезывание зубов; ребенок плачет всю ночь.
- Результаты теста:
 - Афтозные язвы.
 - Черные пятна на зубах, имеющие желтоватый оттенок.
 - Синевато-красные, губчатые десны, которые легко кровоточат и слегка отслаиваются от зубов.
 - Пенистая слюна.
 - Гнойные выделения.
 - Язык обложен белым налетом.
 - Язвы, склонные к кровотечению.
 - Зубы клиновидной формы.

Шея

- Шершавость и першение при кашле.
- Результаты теста:
 - Небольшие, круглые, синевато-красные пятна или язвы.
 - Тонзиллит, особенно левой миндалины.

ЖЕЛУДОК

- **Отрыжка и икота, особенно когда встает, садится или когда его носят на руках.**
- **Глубокое и стойкое отвращение к еде в период выздоровления от пневмонии, малярии или гепатита А.**
- **Через несколько часов пища извергается наружу непереваренной.**
- **Тошнота и рвота перед походом в школу.**

- **Внезапная, постоянная рвота непереваренной пищей через несколько часов после еды.**
- Тошнота во время вождения
- Пьёт жадно.
- Пенистая отрыжка и рвота.
- Рвота кровью.
- Голод усиливается.
- Тщетные попытки вызвать рвоту, выходит только слюнь.
- Удушье при кашле.
- Рвота после употребления мяса.
- Обострение: фрукты, уксус.
- Отвращение: вареная пища, кислая пища.
- Пристрастия: **жареное или копченое мясо** (Caust., Tub.), **кислое.**
- Результаты теста:
 - эпигастрии пальпируются твердые, уплотненные участки (из-за пилоростеноза).
 - Болезненность эпигастральной области при пальпации.

ЖИВОТ

- **Ребенок сопротивляется тесной одежде на животе.**
- Результаты теста:
 - Вздутие живота после кормления грудью, но не очень сильное при пальпации.
 - Инвагинация.
 - Отек и гипертрофия брыжеечных желез.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Ребенок стонет и плачет от боли во время дефекации.**
- **Зеленоватый, водянистый, с примесью крови, очень зловонный стул при обезвоживании и неутолимой жажде у грудных детей в период - прорезывания зубов.**
- Хроническая диарея у детей, имеющих туберкулез в анамнезе или в семейном анамнезе.
- Результаты теста:
 - Сужение или стриктура ануса и прямой кишки.
 - Болезненность промежности и кожи между ягодицами из-за едкого стула.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ребенку снится, что он мочится, хотя на самом деле он мочится в постель.
- Непроизвольное выделение мочи в положении лежа, а также при чихании и кашле.
- Ночной энурез в первой фазе сна (сеп.), от которого ребенка трудно разбудить.
- Частое мочеиспускание обильной, бледной мочой.
- Зловонная, едкая моча, вызывающая болезненные ощущения в промежности.
- Внезапные позывы к мочеиспусканию во время сна, которые будят ребенка, но он не может достаточно быстро встать с постели.
- Позывы к мочеиспусканию при погружении рук в холодную воду.

- Результаты теста:

- Ультразвуковое изображение: камни в мочевом пузыре.
- Коричневая или красноватая моча или красный или белый осадок в подгузнике.
- Моча: Глюкоза ++.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Едкие, обильные бели у молодых девушек.
- Сладострастный зуд влагалища и между половыми губами.
- Результаты теста:
 - Опухшие половые губы и вульва.
 - Язвы в области влагалища.

ГОРТАНЬ

- Охриплость по утрам.
- Результат теста:
 - Туберкулез гортани.

ДЫХАНИЕ

- **Дыхание прерывистое, ребенок хватая ртом воздух при кашле.**
- Частое желание сделать глубокий вдох.
- Нервная астма.

КАШЕЛЬ

- **Кашель во время прорезывания зубов.**
- **Кашель при смене положения или повороте в постели.**
- **Приступ кашля зимой, изматывающий ребенка.**
- Обильная, сероватая, гнойная мокрота при каждом приступе кашля.
- Кашель после гриппа.
- Кашель заставляет ребенка сидеть всю ночь.
- Сухой, спазматический кашель вызывает у ребенка рвоту и тщетные - попытки вызвать рвоту.
- Кровохарканье [кровохарканье] с черной, запекшейся кровью.
- Удушье при кашле.
- Результат теста:
 - При кашле держится обеими руками за грудь.

ГРУДЬ

- Острая и запущенная пневмония.
- Бронхит во время прорезывания зубов.
- Боль в груди при кашле.
- Результат теста:
 - Рентгенограмма грудной клетки: пневмоническое уплотнение.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Результаты теста:
 - На ЭКГ — признаки эндокардита.
 - Пульс мягкий, малый, частый, прерывистый.

НАЗАД

- Спастические сокращения мышц шеи, запрокидывающие голову назад.
- Результат теста:
 - Увеличение шейных лимфатических узлов.

КОНЕЧНОСТИ

- Обильное потоотделение на ладонях и подошвах ног, с очень неприятным запахом.
- Отек запястий, чередующийся с отеком коленных суставов.
- Результаты теста:
 - Синие, налитые кровью пятна (экхимозы) на ступнях и бедрах.
 - Хрупкая и потрескавшаяся кожа на руках.
 - Отек ног, которые становятся холодными на ощупь.

СПАТЬ

- Ребенок не уснет, пока его не погладят и не приласкают.
- Выраженная сонливость в течение дня, сопровождающаяся частой зевотой, однако ночью не спит до поздней ночи.
- Громко смеется и постоянно стонет во сне.
- Большинство жалоб сопровождаются зевотой и сонливостью.
- Беспокойный, ворочается всю ночь.
- Предпочитает спать на спине.
- Спит с полуоткрытыми глазами.
- Вздрагивание во сне при первом засыпании, как будто от испуга.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Тепло не улучшает состояние, даже если ребенок чувствует сильный холод при лихорадке.
- За стадией мороза следует жар, а затем пот.
- Кашель обычно усиливает приступ лихорадки.
- Результаты теста:
 - Холодный пот.
 - Сильное физическое беспокойство в жаркую погоду, локальное покраснение лица и ледяные ступни.

КОЖА

- Сильный, неконтролируемый зуд, особенно вечером; ребенок расчесывает пораженное место до тех пор, пока оно не станет саднить и не начнет кровоточить.
- Хорошее средство от боли.
- Результаты теста:
 - Пролежни у младенцев.
 - Экзема.
 - Опрелость.
 - Мокнущая сыпь, улучшающаяся в тепле.
 - Псориаз.
 - Чесотка.
 - Небольшие раны сильно кровоточат.

- Крапивница.
- Сморщенные, увядшие.

Общий

- **Обильные, жгучие, горячие, болезненные, очень зловонные выделения, которые краснеют пораженную область.**
- **Выраженное ухудшение многих жалоб после захода солнца (сифилис).**
- **Обильное пассивное кровотечение темно-коричневого цвета, даже из очень маленьких ран (Lach., Phos.);** встречается при нарушениях - факторов свертывания крови, таких как гемофилия или дисфункция тромбоцитов; склонность к кровотечениям после тонзиллэктомии или удаления зуба.
- **Очень зябко, ноги и ступни холодные, но лицо может быть горячим.**
- Ангиома.
- Судороги во время прорезывания зубов.
- Дети истощены, истощены, слишком быстро растут, лица морщинистые и нервные.
- Левосторонние жалобы.
- Быстрое исхудание с сильной слабостью и истощением от малейшего усилия.
- Полезно при цинге.

Источник

- Семейство Буковые.

LAC CANINUM

(Собачье молоко - Лак-к.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети, которые родились и выросли в среде, где родители плохо с ними обращаются, пренебрегают ими, лишают их любви, ласки и заботы, даже если ребенок тоскует по своим родителям.
- ▶ Дети с сильным чувством вины и периодическими мыслями о самоубийстве; они чувствуют себя совершенно неадекватными и постоянно оправдывают себя чувством никчемности.
- ▶ У невысоких девочек формируется негативное и неполноценное представление о своем теле из-за прыщей, волос на теле, темной кожи, маленькой груди и низкого роста.
- ▶ Булимия после сексуального насилия (Carc., Ign., Nat-m., Op.).
- ▶ Дети матерей, которые находились в безнадежной депрессии во время беременности и не хотели оставаться наедине со своими страхами и странными фантазиями, которые мучили их больше на свету, чем в темноте.
- ▶ Дети, которые часто говорят такие вещи, как: «Меня никто не любит», «Я глупый», «Я ужасно выгляжу», «Я ненавижу себя», «Я слишком толстый и непривлекательный», «Почему я должен так жить?» и т. д.
- ▶ Дети, которые долгое время подвергались физическому и сексуальному насилию и не давали отпор. Это приводит к низкой самооценке и ненависти к себе; ребёнок считает себя ничтожным и отвергнутым окружающими. Он живёт с постоянным ощущением собственной неполноценности.

Тело

- ▶ Врожденная непереносимость молока (Aeth., Calc., Sil.).
- ▶ Блуждающая боль, попеременно крест-накрест или из стороны в сторону.
- ▶ В анамнезе рецидивирующий тонзиллит, аллергия верхних дыхательных путей, хронический рецидивирующий синусит.
- ▶ Проблемы с пищеварением и рецидивирующие инфекции у детей, которые никогда не получали грудного молока, особенно у сирот или детей, которых очень рано отлучили от груди.

DD: Это средство следует сравнить с Lach и Phos.

Другие важные симптомы

Дух

- **Рассеянные; неспособные сосредоточиться при чтении или учебе;** крайне забывчивые дети (Anac., Caust., Nat-m.).
- Дети, имеющие привычку **богохульствовать или ругаться по малейшему поводу** (Nit-ac.).
- Дети, которые **никогда не проявляют упорства в хобби, деятельности или учебе;** в конечном итоге ничего не достигают; **склонны к саморазрушению или самотажу**, например, пытаются сделать многое, но не доводят дело до конца.
- **Желание компании при страхе остаться в одиночестве.**
- У детей с синдромом Лак-Си. отсутствует **защитная броня, которая могла бы защитить их.** Внешне эти дети проявляют беспокойство, - отвлекающее их от внутренней боли.
- **Беспокойство, плач и крики у детей ночью или во время сна.**
- **Дети, склонные к саморазрушению;** это может проявляться в **поведении, склонном к несчастным случаям, или в пренебрежении собой.**
- **При письме допускают глупые ошибки,** используют слишком много слов или не те, которые нужно, пропускают последнюю букву (буквы) слова; не могут сосредоточиться на чтении или обучении (дети Bov. и Graph.).
- **У молодых людей возникают яркие и пугающие представления о змеях.**

Очень часто встречается у девочек в период полового созревания.

- Дети, на которых смотрят свысока или которых отвергают одноклассники .
- Навязчивое желание постоянно мыть руки.
- Злые, раздражительные дети, которые плачут и кричат всю ночь (Jal., Psor.).
- Желание света.
- Дети с чрезвычайно слабой волей и низким уровнем осознания своего тела.
- Страх падения с лестницы.
- Дети с тяжелыми психическими отклонениями, которые издают пронзительные крики.
- Нахальный.
- Новорожденные и дети младшего возраста, которых легко напугать.

Голова

- **Мигрень у детей школьного возраста с чередующейся болью:** когда боль стихает с одной стороны, боль с другой стороны усиливается; усиливается на холодном ветру и уменьшается в теплом помещении.
- Хронические головные боли после травм головы (Nat-s.).
- Голова оттянута в сторону, особенно в случаях тонзиллярного абсцесса и увеличенных шейных лимфатических узлов.
- Головная боль, чередующаяся с болью в горле.
- Результаты теста:
 - весы.
 - Жирные волосы.

ГЛАЗА

- **Трудности с различением объектов, даже при чтении, поскольку изображения задерживаются слишком долго, а буквы как будто перетекают одна в другую.**
- **Склонность часто тереть глаза.**
- Тяжесть век.
- Слезы текут, когда у вас болит голова, вы простудились или когда вы читаете.
- Чувствительность к свету.
- Результаты теста:
 - Темные круги под глазами.
 - Тусклые и тусклые глаза.
 - Глаукома.
 - Неотёчный отёк верхних и нижних век.

УШИ

- Кажется, что все звуки доносятся издалека.
- Врожденная глухота.
- Боль в ушах из-за холодного ветра или при глотании.
- Результаты теста:
 - Отсутствие ответа при аудиометрическом тестировании (тест BAER).
 - Сухая ушная сера.
 - Зеленые выделения без запаха.

НОС

- **Постоянная тенденция сморкаться.**
- Острое обоняние.
- Насморк меняется с одной стороны на другую.
- Заложенность носа.
- Результаты теста:
 - Холодный на ощупь.
 - Постоянно ковыряю ноздри, пытаюсь удалить корочки.
 - КТ: Воспаление и экссудация в пазухах, искривление перегородки носа, полипы в пазухах и утолщение стенок пазух.
 - Чрезмерное образование корок в носу.
 - Обильные, густые, зеленоватые, раздражающие выделения из носа по ночам, оставляющие пятна на подушке.

ЛИЦО

- Результаты теста:
 - Испуганное выражение лица.
 - Лицо попеременно красное и бледное.
 - Герпетическая сыпь или простуда на губах.
 - Шелушащиеся губы.
 - Красный цвет губ.
 - Увеличение подчелюстных лимфатических узлов и околоушных желез, распространяющееся слева направо.

РОТ

- **Заикается при попытке быстро говорить.**
- **Обильное слюнотечение, особенно во время сна при дифтерии; слюна смачивает всю подушку.**
- Боль во рту при кормлении грудью.
- Несмотря на сухость во рту, жажды не испытываю.
- Зубная боль облегчается, если держать во рту холодную воду.
- Результаты теста:
 - Афтозные язвы, которые легко кровоточат.
 - Стекланный вкус.
 - Десны опухают, отступают, кровоточат из-за недоедания.
 - Неприятный запах изо рта.

ШЕЯ

- **Ощущение удушья при засыпании.**
- Такие жалобы, как боль в горле и тонзиллит, при которых симптомы **постоянно меняют сторону.**
- **При попытке глотать из носа вытекает жидкость.**
- **Болезненное глотание, особенно твердой пищи.**
- **Боль в горле отдает в уши при глотании.**
- Хронический фарингит.
- Постоянная тенденция сглатывать из-за комка в горле.
- Сухость в горле при пробуждении утром.
- Внешняя часть шеи очень чувствительна к прикосновению.
- Постменингитический или постэнцефалитический паралич черепных нервов, особенно IX и X, с вовлечением амбициозного ядра (Both., Crot.-с.).
- Ощущение жжения в горле, словно оно наполнено маленькими вертелами.
- Результаты теста:
 - Отёчность шеи.
 - Удлиненный язычок с небольшим выделением крови.
 - Фолликулярная ангина; белые гнойные язвы на миндалинах.
 - Миндалины соприкасаются друг с другом.
 - Пурпурно-красное изменение цвета горла.

ЖЕЛУДОК

- **Постоянные или частые приступы тошноты, вызывающие страх перед едой.**
- **Сильная жажда, потребность в большом количестве воды, пьется слишком часто, но глотание затруднено.**
- Ощущение пустоты в желудке, особенно после пробуждения утром, не облегчается приемом пищи.
- Очень голоден, даже после обильного приема пищи; ненасытный аппетит.
- Лучше: рыба.
- Отвращение: жидкости (особенно вода) и сладкое.

- Пристрастия: черный перец, острая пища, горячие напитки, маринады , молоко, горчица, острая пища, соль.

ЖИВОТ

- Боль при наклоне вперед; ребенок чувствует себя лучше, откидываясь назад.
- Пульсация в животе.
- Боль в животе из-за одежды.
- Результаты теста:
 - Живот твердый и вздутый из-за метеоризма, с крайней чувствительностью к прикосновению.
 - Увеличение паховых желез.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Глина и черные стулья.
- Постоянные запоры с частыми безрезультатными позывами, даже при мягком стуле.
- Тенезмы во время дефекации.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ночной энурез; специфическое средство от ночного недержания мочи или в случаях, когда другие средства не помогли (Vas-t).
- Постоянные или частые позывы к мочеиспусканию.
- Обильное непроизвольное мочеиспускание ночью, со сновидениями о мочеиспускании.
- Подтекание мочи после мочеиспускания.
- Дизурия, при которой позывы к мочеиспусканию не удовлетворены.
- Моча темная, с обильными вкраплениями густого красноватого осадка, который трудно вымывается из подгузников.
- Результат теста:
 - Альбуминурия.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Возбудимые гениталии.
- Мастурбация у маленьких детей.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Резкие, кровянистые выделения, особенно в течение дня.
- Зуд вульвы по ночам.
- Результаты теста:
 - Неприятный запах из половых органов.
 - Опухшие половые губы.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Хриплый или изменчивый голос.
- Гнусный или хриплый голос.
- Чувствительность гортани к давлению или прикосновению.
- Не могу говорить громко.
- Потеря голоса после криков и воплей во время занятий спортом.

ДЫХАНИЕ

- Затрудненное дыхание делает невозможным лежать.

КАШЕЛЬ

- **Постоянный кашель из-за ощущения щекотания в горле и гортани.**
- Кашель при попытке глубоко вдохнуть.
- Кашель с отхождением грубой, густой, белой мокроты.
- Сухой, резкий и металлический кашель, усиливающийся при разговоре и в положении лежа .

Грудь

- Результаты теста:
 - Образование абсцесса в подмышечной впадине (Нер., Jug-r.).
 - Вонючий пот под мышками, оставляет на одежде желтые или коричневые пятна.
 - Уплотнение подмышечных желез.

Назад

- Позвоночник чувствителен к прикосновению и давлению.
- Боль в крестцовой области, распространяющаяся на бедра и ягодицы; лучше при движении и хуже в положении сидя.
- Блуждающие боли в шейном отделе вынуждают ребенка сидеть, запрокинув голову назад.
- Результаты теста:
 - Потливость шейки матки.
 - Скованность и напряжение в шейном отделе позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

- Любит ходить с непокрытыми ногами.
- Беспокойство в руках ночью в постели.
- Ревматические боли в нижних конечностях и суставах, усиливающиеся от тепла и уменьшающиеся от холода.
- Не может переносить прикосновение пальцев друг к другу из-за боли и чувствительности.
- Холодность конечностей по ночам, особенно кончиков пальцев, которые очень чувствительны к холоду.
- Судороги в ногах.
- Боль и отек в лодыжках с расширением вен на лодыжках ; улучшение от горячих компрессов.
- Результаты теста:
 - Пальцы судорожно растопырены.
 - Тепло в ладонях и ступнях.
 - Ревматизм стрептококкового происхождения; с титром антистрептолизина более 300 ед.; С-реактивный белок ++.
 - Отек и онемение левой руки.
 - Бородавки на безымянном пальце.

СПАТЬ

- Лежа, одна нога согнута или поджата, другая вытянута, ИЛИ на спине, руки над головой.
- Спит лицом вниз на подушке или на животе.
- Сны о змеях, о мочеиспускании (просыпается в тот момент, когда собирается это сделать).
- Беспокойство во время сна, невозможность найти удобное положение.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Обильный пот с резким неприятным запахом, оставляет на одежде и постельном белье желтовато-коричневые пятна.
- Жара чередуется с морозом.
- Ревматизм.

КОЖА

- Кожа чрезвычайно чувствительна к прикосновению.
- Результаты теста:
 - Синюшные экхимотические пятна на коже.
 - Врожденный ихтиоз [чешуйчатая болезнь рыб].
 - Рожа, которая постоянно меняет сторону.
 - Кожа сухая и горячая на ощупь.
 - Бородавки.

ОБЩИЙ

- **Не переносит ни малейшего прикосновения или удара; вынужден держать пальцы растопыренными.**
- **Противоположные и чередующиеся состояния** или постоянно меняющиеся симптомы.
- **Размягчение костей; рахит.**
- **Тепло ухудшает, холод улучшает.**
- Купание улучшает состояние.
- Злокачественные заболевания в детском возрасте, такие как лейкемия и лимфомы.
- Холодно; малейший сквозняк ухудшает состояние, но лучше на открытом воздухе.
- Сильная слабость и истощение.
- Половые органы легко возбуждаются при прикосновении, надавливании или трении.
- Легкое давление ухудшает; сильное давление улучшает.
- Склонность к аллергическим заболеваниям у детей, пьющих чрезмерное количество молока .
- Влажная погода ухудшается.

LAC CAPRINUM

(Козье молоко - Lac-

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Депрессия с расстройствами личности и манией.**
- ▶ Очень быстро впадает в гнев, гневается по мелочам, неконтролируемый гнев, и в основном гневается, когда его прерывают. Очень критичный, торопливый и нетерпеливый.
- ▶ Когда он злится, он хочет пойти в постель и лечь, затем становится непослушным, раздражительным и злым.
- ▶ Подозрительное и недоверчивое поведение, постоянно думает, что его друзья говорят о нем плохо.
- ▶ Озорной — пока к ребёнку хорошо относятся, он дружелюбен. Но становится злейшим врагом, как только кто-то пытается причинить ему боль.
- ▶ Ребенок очень беспокойный и тревожный, бегают с места на место; беспокойство усиливается между 16 и 23 часами.
- ▶ Чувство одиночества во время депрессии.
- ▶ Дискомфорт из-за отсутствия семьи. Отцу приходится работать вдали от дома, ребёнка воспитывает только один родитель или он отправляется в школу-интернат.
- ▶ Большое предпочтение зеленому цвету, дети любят одеваться в зеленое.
- ▶ Плач из-за головных болей при мигренях; головные боли усиливаются утром при пробуждении и после пребывания на солнце; настроение отражается в снах, которые очень тревожны и включают в себя преследование.
- ▶ Сильное желание жареной пищи, молока, острой пищи и сладостей.

Источник

- Познакомился с гомеопатией благодаря доктору Кесу Даму из Амстердама.

ЛАК ДЕЛЬФИНУМ

(Молоко дельфина-афалина - Лак-дель.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Художественно-творческий.
- ▶ Ясновидение.
- ▶ Дети с чувством семьи.
- ▶ Страх грабителей.
- ▶ Любовь к животным.
- ▶ Эмоциональный.
- ▶ Часто причиной проблем у ребенка можно считать страхи или негативный опыт матери во время беременности.
- ▶ Дружелюбные и привлекательные люди, которым нравится находиться в обществе. Они чувствуют себя брошенными и нелюбимыми, поэтому не хотят оставаться одни.

Тело

- ▶ Короткий, сухой, раздражающий кашель.
- ▶ Аллергическая астма после употребления холодных напитков и мороженого.
- ▶ Аллергия верхних дыхательных путей с синуситом.
- ▶ Склонность к синуситам.
- ▶ Солнечное тепло ослабевает.

Другие важные симптомы

Дух

- Дискомфорт, вызванный страхом.
- Ребенок испытывает потребность все трогать.
- Ребенок, как правило, очень игривый и ласковый, любит шутить и смеяться.
- Добросовестный в мелочах.
- Страх грабителей, нахождения в толпе, несчастных случаев.
- Ощущение легкой заброшенности.
- Гиперактивные дети, которые любят веселье и компанию.
- Любит плавать.
- Низкая уверенность в себе.
- Чувствительность к шуму, особенно при засыпании.
- Очень общительный, любит, чтобы все его замечали и наблюдали за ним.

ГЛАЗА

- Повышение остроты зрения.
- Светобоязнь.
- Результат теста:
 - Покраснение глаз.

УШИ

- Ощущение заложенности и сухости.
- Результат теста:
 - Покраснение наружного уха.

НОС

- Катаральные жалобы.
- Насморк с лихорадкой.
- Очень склонен к лихорадочному катару носа. Обычно он ограничивается околоносовыми пазухами, которые постоянно выделяют водянистую жидкость, но может распространяться на лобные пазухи или распространяться вниз, в верхнечелюстную пазуху.

РОТ

- Результаты теста:
 - Афтозные язвы.
 - Покраснение боковых поверхностей языка.

ШЕЯ

- Болезненная сухость горла по утрам и при глотании.
- Ноющая боль в левой части шеи.
- Повторяющаяся боль в горле, особенно с левой стороны.
- Результат теста:
 - Горло красное и опухшее, левая миндалина воспалена.

ЖЕЛУДОК

- **Раздражительные привычки в еде у детей, которые чувствуют себя брошенными.**
- Повышенный аппетит с утренней тошнотой.
- Пристрастия: шоколад, холодные напитки, мороженое, лук.

ЖИВОТ

- Вздутие живота после любого приема пищи.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея.
- Болезненный геморрой.
- Сильное вздутие живота после обеда.
- Стул: жидкий, сухой, выделяется небольшими порциями.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Частые позывы к мочеиспусканию.

ГОРТАНЬ

- Щекотание в дыхательных путях при разговоре, вызывающее кашель.

ГРУДЬ

- Боль в груди при кашле.
- У детей склонность к пневмониям.

КАШЕЛЬ

- Сероватая мокрота.
- Короткий, сухой кашель из-за ощущения щекотания в дыхательных путях.

КОНЕЧНОСТИ

- Судороги в пальцах ног и икрах.
- Боли роста, особенно в голени, усиливающиеся при ходьбе.
- Потливость ног.
- Зуд ладоней и бедер.
- Результаты теста:
 - Сыпь на ступнях.
 - Отек стоп и лодыжек.

СПАТЬ

- Острый слух, даже во время сна.
- Сны: несчастные случаи, животные (лошади, кошки, собаки, рыбы), машины и самолеты, ясновидение, друзья, укрытие от опасности, мать, вода.
- Беспокойный сон; постоянная смена положения.
- Сон чуткий и беспокойный.

ОБЩИЙ

- Желание активности и физических нагрузок.
- Слабость от физической нагрузки и воздействия тепла, особенно на открытом воздухе под солнцем.

Лас-del. часто можно спутать с Carc. и Phos., поскольку у них много общих симптомов , некоторые из которых перечислены ниже:

- Эмоциональный.
- Страх за семью.
- Ясновидение.
- Творческий и артистичный.
- Пристрастия: шоколад, холодные напитки, мороженое.
- Любовь к животным.

LAC FELINUM

(Кошачье молоко -

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ **Усыновленные дети** из центров содержания несовершеннолетних или приемных семей.
- ▶ Боль и скорбь от **смерти домашнего животного** (собаки или кошки), не может справиться с разлукой.
- ▶ Очень любит животных.
- ▶ Ясновидение и интеллект.
- ▶ Сильный страх перед иглами, острыми предметами и собаками.
- ▶ Головные боли, обычно сильнее в левой части головы или чуть выше брови. Острая, стреляющая боль, усиливающаяся при чтении и любом напряжении глаз.
- ▶ Нагноение лобной пазухи слева с острыми, режущими и стреляющими болями.
- ▶ Потрескавшийся язык; сильный запор, стул выходит, но затем очень быстро возвращается обратно.
- ▶ Выраженное отвращение к жирной пище; сильная тяга к молоку и неперевариваемым вещам, таким как карандаши, земля, мел и глина.

LAC HUMANUM

(Грудное молоко - Lac-h.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети, которые подверглись сексуальному насилию, часто видят во сне смерть, грязную воду, ужасное чувство вины, преследование и т. д.
- ▶ Крайне неуверенные в себе дети в случае семейных конфликтов или родительских ссор; эта неуверенность также косвенно отражается в снах об опасности, смерти, падениях, убийствах, ссорах, войне, диких животных и т. д.
- ▶ Ребенок чувствует себя брошенным, одиноким, неуважаемым и отчужденным от друзей и семьи.
- ▶ Ощущение «отключения». Сонливое состояние и неловкость из-за неуважения со стороны семьи, желание побыть в одиночестве, возможны даже размышления о смерти.
- ▶ Чувства ребенка подавляются авторитетной фигурой, например, родителями, учителями, старшими друзьями и т. д. Косвенно это может отражаться в снах с образами львов, борющихся за свои права или убегающих.
- ▶ Неуважение к матери или разочарование в ней во время беременности, неполная семья, смерть члена семьи или даже домашнего животного могут привести к состоянию Lachhumanum.
- ▶ После сексуального насилия здоровье уже не восстановится.
- ▶ Плохие отношения с матерью. Ребёнок считает, что мать является причиной его грусти и депрессии.
- ▶ Чувствуя себя непопулярным, ребёнок хочет что-то удержать, например, игрушку или другой выбранный предмет. Кроме того, он постоянно держит что-то во рту, например, большой палец или жевательную резинку.
- ▶ Тяжелые расстройства пищевого поведения

Тело

- ▶ Неуклюжесть, постоянно роняет вещи, **спотыкается при ходьбе.**
- ▶ Хроническая диарея при синдроме мальабсорбции и целиакии; сильные, внезапные позывы к дефекации по утрам.
- ▶ Либо очень энергичны, либо совершенно лишены энергии.

ДД: Симптомы очень похожи на симптомы Calc. и Sacch.

Другие важные симптомы

Дух

- **Бдительный и энергичный**; желание быть постоянно активным; чередуется с ленью.
- **Не любит компанию, тревожен или раздражителен в ней; нуждается в одиночестве, которое приносит облегчение.**
- **Капризный.**
- Трудности обучения, допускает **множество ошибок в правописании и письме, арифметике, времени и ориентации.** Недостаточная концентрация внимания, особенно при выполнении математических задач. Плохая память на имена, но также не может вспомнить, что только что прочитал.
- **Беспорядок или чрезмерная аккуратность.**
- Неуклюжий.
- Страх провала на экзаменах.
- Равнодушие ко всему.
- Постоянно заламывал руки.
- Патологическое влечение к игре с огнем (например, со спичками, газовыми зажигалками, электрическими зажигалками и плитами).
- Периодическое желание забраться к маме на колени, прижаться и ласкать ее.
- Ощущение «возвышенности», сопровождающееся сновидным состоянием и неловкостью, возникающее из-за неуважения со стороны семьи.
- Вспышки гнева при отказе от чего-либо, за которыми быстро следует раскаяние; тенденция причинять себе боль или вред.
- Сосание пальца.

Голова

- Катаральные головные боли.
- Мигрень, облегчающаяся в положении лежа в темной комнате или за рулем.

Глаза

- Слезы, текущие на ветру или из-за сквозняков.
- Результаты теста:
 - Экхимозы.
 - Отек правого верхнего века.

Нос

- **Заложенность ноздрей, преимущественно с одной стороны, при пробуждении утром.**
- Жгучая боль в носу, как от перца.
- Чихание без выделений, особенно на холодном воздухе и сквозняках.
- Насморк; выделения незначительные, прозрачные и водянистые.
- Результаты теста:
 - Выделения: Белые и густые.
 - полипы.

- Воспаление придаточных пазух носа.
- Ретроназальные выделения.
- Красный кончик носа.

Лицо

- Результаты теста:
 - Фурункул на лбу.
 - Герпетическая сыпь вокруг губ.

РОТ

- Слюнотечение, особенно утром после пробуждения.
- Результаты теста:
 - Афтозные язвы на внутренней стороне верхней губы.
 - Кровоточивость десен.
 - Трещины в уголках рта.
 - Неприятный запах изо рта.

Шея

- Раздражение и першение в горле.
- Иногда жидкость неконтролируемо вытекает изо рта в гортань и вызывает рвоту (Kali-с.).
- Боль в горле, распространяющаяся на уши; облегчается при глотании и от теплого питья.
- Боль в горле, усиливающаяся утром после пробуждения; облегчающаяся от теплого питья.
- Результат теста:
 - Густая, липкая слизь или катар в горле.

ЖЕЛУДОК

- **Частая жажда с желанием пить большое количество воды, особенно ночью.**
- Постоянная отрыжка, лучше после питья.
- Отрыжка пахнет тухлыми яйцами.
- Икота во время еды.
- Повышенный аппетит; постоянное желание перекусить.
- Молоко имеет кислый или очень сладкий вкус.
- Тошнота при виде или запахе пищи, облегчающаяся от еды или движения.
- Отвращение: молоко, суп и **кислая пища**.
- Пристрастия: **ветчина**, шоколад, холодные напитки, **сливки, яйца**, молоко, пудинг, жирная пища, соль, сладости, **чай**, имбирь.

живот

- Вздутие живота после еды.
- Боль в животе перед дефекацией.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Хроническая диарея из-за синдрома мальабсорбции, связанного с целиакией; сильные внезапные позывы к дефекации по утрам.**
- Зеленые стулья.

КАШЕЛЬ

- Сухой и лающий кашель, особенно в положении лежа.
- Густая, тягучая, металлическая или соленая на вкус мокрота.

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжесть рук; постоянно роняет вещи.
- Результаты теста:
 - Мурашки по ногам.
 - Тепло ладоней.

СПАТЬ

- Бессонница почти до 1-2 часов ночи из-за постоянного потока мыслей.

КОЖА

- Редкое потоотделение.

ОБЩИЙ

- **Либо очень энергичны, либо совершенно лишены энергии.**
- Хорошее средство при муковисцидозе, непереносимости лактозы, синдроме мальабсорбции и рахите.
- Дети замерзли.
- **Склонность к простудам.**
- Общая чувствительность, усиливающаяся от малейшего прикосновения.

LAC LEONINUM

(Львиное молоко - Lac-leo.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Ребенок раздражительный, легко становится агрессивным; его самолюбие легко задевается.
- ▶ Лидерские качества.
- ▶ Дети, с матерью которых обращались несправедливо и униженно или которым приходилось подавлять свой гнев во время беременности.
- ▶ Дети-диктаторы, единственные дети или первенцы.
- ▶ Хочет быть лучшим во всем.

Тело

- ▶ Пациентам, которым жарко: постоянно нужен вентилятор или кондиционер.
- ▶ Шея чувствительна к давлению одежды.

Другие важные симптомы

Дух

- **Амбициозные и конкурентоспособные** дети.
- **Высокомерный**; чувствует себя важным человеком или физически очень сильный.
- **Физическое беспокойство** у детей; потребность в постоянном движении.
- **Сильный гнев**, желание нанести удар, грубая реакция на малейшее сопротивление.
- Отвечает отрывисто и односложно; кажется очень грубым и невежливым, когда к нему обращаются.
- Неуклюжий.
- Коварно.
- Ощущение, что над ним смеются или его высмеивают.
- Импульс делать странные вещи.
- Интуитивный или ясновидящий.
- Раздражается по пустякам. Имеет очень низкий порог терпения и терпения.
- Ревность.
- Любовь к животным.
- Любит играть и плавать.
- Лживый и угрожающий персонаж.
- Музыка улучшается.
- Дети сварливые; любят затевать драки ради развлечения.
- Восприимчив к природе и ее объектам.
- Чувствителен к критике и обвинениям.
- Подозрительный.

ГЛАЗА

- Склонность подмигивать.
- Подергивание левого верхнего века.
- Результат теста:
 - Отек верхних век, особенно правого.

РОТ

- Сухость во рту.
- Болезненность кончика языка.

ШЕЯ

- Чувствительность к одежде на шее.
- Ощущение инородного тела в горле.
- Боль в горле при пробуждении утром.

ЖЕЛУДОК

- Снижение аппетита с быстрым насыщением.
- Отрыжка после еды.
- Утренняя тошнота.
- Жажда большого количества воды.
- Пристрастия: Холодные напитки, огурцы, фрукты, сочная пища, мясо, молоко, картофель, острая пища, соль, шпинат, овощи (особенно сырые), йогурт.

ЖИВОТ

- Результат теста:
 - Вздутый живот.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Метеоризм с отвратительным запахом тухлых яиц.
- Стулья темного цвета.
- Результат теста:
 - Спазматическое сокращение прямой кишки.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Раздражение уретры.
- Боль в левой почке.

ГОРТАНЬ

- Результат теста:
 - Громкий голос.

КАШЕЛЬ

- Сильный, спазматический, приступообразный кашель.

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжие движения конечностей.
- Онемение рук во время сна.
- Боль в ногах, особенно в положении стоя.

СПАТЬ

- Сны о: самолетах, преследовании дикими животными (тиграми, змеями и т. д.), кошках, насекомых, путешествиях, монстрах, играх, полиции, школе, мочеиспускании или воде.
- Дневная сонливость, особенно в положении сидя.
- Бессонница до полуночи из-за беспокойства и наплыва мыслей.

КОЖА

- Резкий, болезненный пот.
- Зуд облегчается расчесыванием, после чего наступает жжение.
- Результат теста:
 - Крапивница.

Общий

- Лучше обмахиваться веером на открытом воздухе или у моря.
- Голод усиливается.
- Утром, когда просыпаешься, все болит.
- Обычно хуже утром и лучше вечером.
- Жара усиливается.
- Слабость и неуклюжесть тела.

LAC VACCINUM DEFLORATUM

(обезжиренное коровье молоко - Лак-д.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Нежные, дружелюбные дети (Puls., Rhus-t., Sil.) с приятной внешностью.
- ▶ Привлекательная личность.
- ▶ Живая манера речи (Hyos., Lach.).
- ▶ Молча переносит все горести в своем окружении (Игн., Нац.), например, внебрачную связь отца, насилие со стороны матери, агрессию и насилие отца по отношению к другим членам семьи.
- ▶ Сильный страх потерять мать по указанным выше причинам
- ▶ Психологическая травма у детей, оставшихся без попечения матерей в период грудного вскармливания (Lac-h., Mag-m., Sacch., Sep.).
- ▶ Обладает сильным чувством справедливости, чувствует себя подавленным из-за своей беспомощности перед лицом несправедливости, особенно когда она направлена против одноклассников и друзей.
- ▶ Очень любящие дети, которые обожают свою мать. Слово «мать» для них значит всё. Чрезмерная забота о матери. Сильная эмпатия, когда мать страдает в отношениях или ребенок страдает вместе с матерью в сложных отношениях.
- ▶ Глубоко переживает за мать, когда ее притесняет партнер или муж.
- ▶ Нуждается в хороших отношениях с друзьями, друзья очень много значат для него, не может жить без друзей или без их поддержки.
- ▶ Сильный страх быть отвергнутым друзьями или одноклассниками - (Mag. c., Nat. m.).
- ▶ Он так и не смог выздороветь с тех пор, как его бросили друзья (Arg-n., Puls.)
- ▶ Сны о том, что ребенка преследуют, бьют или разлучают с друзьями, являются явным признаком неуверенности ребенка и его потребности в защите.
- ▶ Умственная отсталость вследствие недоедания.

Тело

- ▶ Заболевания, связанные с питанием, вызванные напрямую или косвенно дефицитом необходимых питательных веществ. Белково-энергетическая недостаточность у детей раннего возраста, даже при адекватном питании.
- ▶ Врожденное нарушение усвоения кальция, приводящее к рахиту и тетании.
- ▶ Различные дефицитные заболевания, такие как болезнь Кешана, дефицит железа, железodefицитная анемия, тяжелая задержка роста из-за дефицита цинка.

- ▶ Чрезмерное употребление шоколада и молочных продуктов приводит к серьезным нарушениям питания.
- ▶ Ожирение у детей раннего возраста обусловлено чрезмерным потреблением калорий по отношению к физической активности, что - приводит к нарушению энергетического баланса.
- ▶ Ожирение у детей, рацион которых содержит слишком мало питательных веществ и слишком много жиров, сахара и добавок.
- ▶ Ожирение вследствие острого перекармливания.
- ▶ Зоб у детей, вызванный употреблением зобогенных продуктов, - нарушающих усвоение йода.
- ▶ Ювенильный диабет. Помогает поддерживать уровень глюкозы при минимальном использовании инсулина.
- ▶ Острый и хронический нефротический синдром у детей с алиментарной недостаточностью.
- ▶ Жалобы у детей, которых слишком быстро отлучили от груди.
- ▶ Запор; с безуспешными попытками к дефекации (Anas., Nux-v.); стул сухой и твердый (Bru., Sulph.); стул обильный, твердый, выходит только с большим усилием, разрывы ануса; крики от боли при натуживании.
- ▶ Полное изнеможение, даже когда ничего не делаю; сильная усталость при ходьбе.
- ▶ Водянка; из-за органического заболевания сердца; из-за хронических - проблем с печенью; выраженная альбуминурия; после перемежающейся лихорадки.
- ▶ Истощение местное и общее.

Другие важные симптомы

Дух

- сильное беспокойство, крайние и длительные нарушения сна (Coss., Nit-ac.)
- Сильное отчаяние из-за физического недуга, такого как сахарный диабет, нефротический синдром, мигрень и т. д. Уныние приводит к слезам .
- Тяжелая трудность обучения с потерей памяти. Во время чтения она больше не могла вспомнить прочитанный ранее абзац (Arn., Med.).
- Ожирение или уродство приводят к возникновению у детей комплекса неполноценности (Cob., Nux-v., Tub.).
- Расстройства обучения, такие как дискалькулия, дислексия, диспраксия или синдром Герстмана
- забывает слова при разговоре, плохая память на прочитанное и слова
- Умственная нагрузка, например, школьные занятия, ухудшает состояние (Calc-p., Lyc.).
- умственная усталость после долгого дня в школе или после любой простой умственной работы
- сильный страх потерять друзей, постоянное ощущение, что друзья умрут, и он останется один
- Грусть, лучше в компании (Бов.) и при активном разговоре.

Голова

- Головные боли у детей с анемией или туберкулезом в семье или анамнезе
- Мигрень; начинается во лбу, распространяется на затылок, утром при вставании (Вгу.); сильная пульсация с тошнотой, рвотой, слепотой, скудной мочой и постоянным запором (Epig., Iris-v., Sang.); сопровождается чувством слабости, как у China и Am-c.
- хуже от шума, света, движения (mag-m., sil.), лежания и вставания с постели
- Боль преимущественно локализуется во лбу, прямо над глазами. Часто она невыносимая и сильная (у Nat-m. и Tub. головные боли схожи).
- По мере усиления боли часто возникают тошнота и рвота, у пациентов развивается отвращение к свету, шуму и движению.
- Головные боли облегчаются обильным мочеиспусканием, лежанием в темной комнате, надавливанием на голову, тугой повязкой на голове и после захода солнца.
- При применении этого средства головные боли, как правило, начинаются во внутреннем уголке правой брови.
- хронические мигрени у детей, которые пьют слишком много молока
- Ощущения, которые часто описывают дети во время мигрени: как будто голова раскалывается; как будто глаза полны камешков ; как будто макушка головы снимается; как будто комок боли находится посередине лба.

Глаза

- Светобоязнь, даже свет маленькой свечи невыносим.
- Затуманивание зрения перед головной болью (Gels., Hyos., Iris, Kali-bi., Nat-m.)
- Нарушения зрения у детей с ювенильным диабетом
- «Как будто глаза полны камешков» — распространенное ощущение во время мигрени.

Уши

- Потеря слуха у детей с умственной отсталостью

Нос

- частые простуды, вызванные употреблением молока

Лицо

- бледное, болезненное лицо
- безболезненный отек лица
- Прыщи на лице и лбу у ребенка в период полового созревания (Геп.)

Рот

- сухость
- неприятный запах изо рта

ЗУБЫ

- скрежещет зубами во сне (Вас., Tub.)

ШЕЯ

- Боль в горле, усиливающаяся при глотании
- Боль в горле, вызывающая сухой кашель

ЖЕЛУДОК

- повышенный аппетит с головными болями (Phos., Psor.)
- Тошнота, плохое самочувствие, но рвота невозможна; беспокойство, сопровождающееся ощущением холода
- Тошнота; усиливается утром, в положении лежа, при движении, при вставании утром
- сначала рвота непереваренной пищей или кофейной гущей, рвота имеет горький вкус
- постоянная рвота
- сильная жажда
- кислая отрыжка после молока (Chin., Mag-c.)
- Спазмы в эпигастрии

ЖИВОТ

- Боль в пупке при мигрени (Лепт.)
- Хроническое вздутие живота из-за нерегулярного стула, которое сопровождается ощущением камня в желудке.
- чувствительный живот (Верат.)
- Давление в области талии провоцирует обмороки.

ПРЯМАЯ КИШКА

- хронический запор при мигрени (Nat-s., Podo.)
- Стул сухой, обильный и твёрдый, часто вызывает разрывы в области ануса. Ребёнку приходится тужиться, чтобы испражниться.
- Постоянные запоры, даже самые сильные слабительные не помогают.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- При нефротическом синдроме наблюдается частое мочеиспускание, моча бледная, обильная и ее трудно удерживать.
- большое количество альбумина в моче
- Боль в области почек, отдающая в мочевой пузырь (Verb-v.) или через спину в бедра.

ДЫХАНИЕ

- астматическое дыхание с острым вздутием эпигастрия

КАШЕЛЬ

- короткий, сухой кашель с трудноотделяемой мокротой, состоящей из небольшого сгустка мокроты, что облегчает кашель
- короткий, сухой кашель, усиливающийся на холодном воздухе или в холодных помещениях

Грудь

- Рентгенограмма грудной клетки показывает изменения в первичном комплексе (Вас., Sil.)

КОНЕЧНОСТИ

- Кончики пальцев всегда холодные на ощупь, тогда как остальная часть руки теплая.
- холодные руки или ноги при головной боли (Мели., Мени.)
- опухшие лодыжки

Спать

- сонливость в течение дня и во время занятий

Общий

- Склонность к обморокам или обмороки при анемии
- сильное мочеиспускание с болью во всем теле
- Укачивание
- всегда мерзнет, нужно много одежды, чтобы согреться
- общее ухудшение всех симптомов по утрам
- очень вялый, нет желания напрягаться (Ars., Camph., Kali-p.)
- Недостаток сна вызывает вялость и физическое истощение.

P.S. Большое сходство с *Natrium muriaticum*. Здесь мы обнаруживаем «упадок сил с плачем», «частое желание большого количества жидкости», «периодические головные боли, которые возникают и исчезают с наступлением солнца» и «постоянный запор с болезненными трещинами».

LACHESIS MUTA

(Яд змеи-бушмейстера — смех.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Великий мафиози и манипулятор (Puls., Sulph.); ведет себя очень дружелюбно и любезно с людьми, стоящими выше его (старше и могущественнее), и с крайним презрением относится к равным и низшим.
- ▶ Яркие, харизматичные, обаятельные, динамичные и экстравертные дети.
- ▶ Расстройства поведения у детей и подростков, проявляющиеся бурным гневом, укусами, жестокостью, обманом, наглостью, ревностью, злобой, насмешкой, гневными ссорами на почве ревности.
- ▶ Дети любят наряжаться, чтобы привлечь внимание: например, надевать крупные браслеты на тонкие запястья, крупные серьги в маленькие ушки, использовать резкий аромат духов и дезодоранта, а также обилие лент и ожерелий на шее. Они также любят быть в центре внимания, развлекая окружающих шутками и выразительным языком жестов или мимикой.
- ▶ Хитрые (как Tarentum и другие пауки); маленькие дети предпочитают действовать окольными и непрямыми путями (подобно маленькой свернувшейся змее) с помощью лести, фальши и лжи; в спортивных состязаниях или на школьных выборах они любят побеждать своих противников с помощью лжи, клеветы, обмана и интриг (злых сплетен) (Ars., Verat.).
- ▶ Любит насмешку и сатиру (Лак-ак., См.).
- ▶ Оскорбительная речь; легко ранит чувства других.
- ▶ Болтливый, крикливый.
- ▶ Активный (иногда гиперактивный) и творческий ум, особенно с вечера до полуночи.
- ▶ Всегда любит присоединяться к разговорам других людей, особенно когда двое спорят или ведут интересную беседу.
- ▶ Незаконнорожденные дети, которые впоследствии разочаровываются, оскорбляются и несчастны.
- ▶ Дети, рожденные во враждебном мире; мать испытывала схожее психологическое состояние во время беременности, возможно, из-за насилия со стороны семьи, друзей или социальных обстоятельств. Чувство враждебности проявляется в недоверчивом поведении и депрессии.
- ▶ Необычайно умные, рано развившиеся и внимательные дети.
- ▶ Живые дети с богатым воображением и бурной фантазией.
- ▶ Низкая самооценка и ненависть к себе у детей, чьи матери чувствовали себя очень покинутыми во время беременности.

- ▶ Очень аккуратные дети (напоминают Carc., Lys., Sil.), отличающиеся остротой и умом.
- ▶ Сильное и раннее половое созревание.
- ▶ Сифилитический дух очень рано пронизывает все психические симптомы, например, драки, деструктивность, зависть, драки, вспышки гнева по малейшему поводу, ревность, драки и ссоры.

Тело

- ▶ Почти все симптомы усиливаются после или во время сна.
- ▶ Жара мучает детей как физически, так и психически; горячие напитки ухудшают состояние; горячая ванна может вызвать судороги; даже если ребенку холодно, теплая комната усиливает симптомы.
- ▶ Сильная жара или холод могут вызвать у вас недомогание (эпилепсию, обмороки, лихорадку).
- ▶ Геморрагический диатез; склонность к цианозу и пурпуре.
- ▶ Повышенная чувствительность к давлению одежды, особенно на шее (Lac-c.); мальчики, например, отказываются носить галстук со школьной формой.
- ▶ Чувствительные мышцы: малейшее прикосновение вызывает боль и синяки.
- ▶ Очень чувствителен к теплой влажной погоде; затем страдает от многочисленных аллергических симптомов.
- ▶ Воспаленные части тела чрезвычайно чувствительны к прикосновению.
 - ▶ Много жалоб на левую сторону.
 - ▶ Рецидивирующие инфекции.

Другие важные симптомы

Дух

- **Ясновидение** (Crot-c., Med.).
- **Увлечён кошками** (Aeth., Caps.).
- **Тщеславный** (Piat., Verat.); должен выглядеть свежим, как огурец.
- Любит **танцевать, петь и учиться играть на музыкальном инструменте**.
- **-собственники** (не делятся) и **материалисты**.
- Агрессивно-откровенные, эгоистичные и высокомерные дети, которые очень грубы и не уважают чувства других (друзей и семьи).
- Дети-хаотичны, не могут ничего делать организованно.
- Неуклюжий; часто роняет вещи (Апис, Капс.).
- Непослушные дети, которые склонны отказываться от всего, что от них просят.
- Дислексия: делает ошибки в правописании, письме, путает слова.
- Жизнерадостные, экстравертные дети, которым нравятся любые волнения.

- Симулируйте болезнь.
- Легко пугается мелочей, особенно после пробуждения.
- Беспокойные дети, которые постоянно играют своими пальцами и много жестикулируют.
- Просыпается в замешательстве.

Голова

- Мигрень, сопровождающаяся **заложенностью носа** (спазмом); лучше на свежем воздухе, от перевязки головы, **от насморка**; хуже от заложенности, от употребления кофе или даже от запаха кофе; от голодания или пребывания на солнце.
- Ребенок имеет тенденцию отказываться и закатывать истерики, когда его просят пойти в парикмахерскую из-за чувствительности кожи головы и волос (Подбородок).
- Результаты теста:
 - Утыкается головой в подушку, особенно во время сна (Apis., Bell., Hell., Zinc.).
 - Холодный пот на лбу.
 - КТ: кровоизлияние в мозг.
 - Энцефалит.
 - Вши.
 - Менингит.

Глаза

- Разрывающая боль с головной болью (Ign., Puls.) и холодом.
- Светобоязнь.
- Результаты теста:
 - **Конъюнктив темно-красная, видны прожилки.**
 - Хемоз [отёк конъюнктивы],
 - Дакриоцистит [воспаление слезного мешка].
 - Выделения: гнойные и желтые.
 - Глаза полуоткрыты.
 - Глаза обращены вверх.
 - Свищ слезной железы.
 - Воспаление зрительного нерва.
 - Зрачки расширены.
 - Пигментный ретинит.
 - Пристальный, стеклянный взгляд.
 - Зерна ячменя.
 - Запавшие глаза.

Уши

- **Сверлит** уши пальцами (Мез.).
- **Чувствителен к сквознякам** (Сам., Нер.).
- **Тяжелый средний отит**, характеризующийся **ночной болью**, сопровождающейся болью в горле; хуже от холодного воздуха и **прикосновения**, но лучше, если лежать на больном ухе.
- Результаты теста:
 - Полипы уха.
 - Выделения обильные, кровянистые, гнойные и зловонные.

- Сухая и затвердевшая ушная сера.
- Сыпь за ухом (атопическая).
- Катар евстахиевой трубы.
- Рентгенограмма: воспаление каменистой части височной кости; нарушение вентиляции воздухоносных ячеек сосцевидного отростка.

Нос

- **Ковырять** и ковырять в носу до крови (Арум-т.).
- **Не переносу ничего возле носа.**
- Склонность к рецидивирующим носовым кровотечениям; кровь светло- или темно-красная, со сгустками, тягучая; усиливается при сморкании, с лихорадкой, с головной болью.
- Насморк с кашлем и лихорадкой.
- Выделения обильные, капающие и текущие, особенно из левой ноздри .
- Результаты теста:
 - **Холодность кончика носа** (Apis, Calc-p.).
 - **Острый нос** (Camph.).
 - Рентгенограммы по Кейдвеллу и Уотерсу: синусит .
 - Заложенность ноздрей вследствие синусита .
 - При осмотре с помощью зеркала: носовые раковины отечные.
 - Красный нос.
 - Покрытые корками ноздри, покрытые чешуйками и корками.

Рот

- **Слюноотделение при разговоре** (радужная оболочка глаза) и при таких жалобах, как кашель, лихорадка, боль в горле и тонзиллит.
- Склонность **прикусывать язык**, особенно во время судорог (Caust., Cupr.).
- Заикание, запинание.
- Результаты теста:
 - **Почернение языка** при диарее и запорах.
 - **Вязкая, слизистая и густая слюна:** при кашле, в жару, во время сна или разговора.
 - **Губчатые и кровоточащие десны.**
 - Язык высовывается, облизывает пространство вперед и назад или **резко высовывается и возвращаясь назад** (Bufo, Phyt.).
 - Кариес зубов.
 - Пена изо рта.
 - Неприятный запах изо рта.
 - Географический язык; Клубничный язык (Bell., Tub.) ИЛИ коричневый или красный, с трещинами и изъязвлениями и красной полосой по центру, с ярко-красным кончиком.
 - Язык имеет тенденцию сильно дрожать при высовывании (Gels., Plb.).

Лицо

- **Выщипывание губ** (Arum-t, Bry).
- Результаты теста:
 - Выражение: измученный, **изможденный** и встревоженный (Ars., Кали-ч.), болезненный, **страдающий**.
 - **Покраснение лица** с кашлем, возбуждением, **лихорадкой** (Fern, Op.) и **головной болью** (Glon., Meli.).
 - Атопическая экзема на щеках и лице.
 - Раздутый.
 - Потрескавшиеся и обветренные губы.
 - Цианотичные губы с жаром и одышкой.
 - Левая околоушная железа увеличена и воспалена.
 - Одна сторона лица бледная, другая красная.

Шея

- Боль в горле усиливается при кашле, **глотании пустой пищи** (Bar-c., Kali-c.), утром при пробуждении, глотании жидкостей или сладостей и **теплых напитков** (Phyt.); лучше от **холодных напитков** (Apis); **распространяется на уши** (Her., Merc-cy.).
- **Глотание жидкостей всегда затруднено** (Lyss., Stram.).
- Шея чрезвычайно **чувствительна к прикосновениям** и малейшему давлению.
- Удушье при кашле, ложении в постель или глотании твердой пищи (трахеопищеводный свищ).
- Боль в левой миндалине, быстро распространяющаяся на правую миндалину.
- Результаты теста:
 - Изменение цвета: **фиолетовый или красный**.
 - Фарингит с **тонзиллитом**, особенно **левой миндалины**.
 - Шейные железы увеличены и чувствительны к прикосновению.
 - Удлиненный язычок.
 - Слабый рвотный рефлекс.
 - языкоглоточного нерва) и X (блуждающего нерва) черепных нервов .
 - Потливость шеи.
 - Нагноение миндалин, приводящее к паратонзиллярному абсцессу.

ЖЕЛУДОК

- **Жажда небольших количеств** (Ars., Lyc.).
- Удушье при кашле и после кормления грудью.
- Сильная и обильная рвота после кормления, особенно после молока.
- Обострение: рыба, холодная пища и молоко.
- Лучше: холодная еда и фрукты.
- Отвращение: Молоко, особенно **грудное молоко** (Sil.).
- Пристрастия: кофе, **устрицы** (Lycps-v.), **макароны** (Calc-p., Nat-m.) и другие мучные блюда, соленые огурцы, острая и кислая пища.

ЖИВОТ

- Колики в животе, уменьшающиеся при свертывании калачиком;
усиливающиеся от давления одежды (Bry., Nux-v.) и прикосновения.
- Всегда носит свободную одежду в области живота.
- Очень громкое и шумное газообразование.
- Повышенная склонность к неонатальной желтухе и индийскому детскому циррозу печени (ИДЦ) [форма цирроза печени, связанная с медью].
- Тенденция к развитию первичного вирусного гепатита в ассоциации с 5 специфическими вирусами: HAV, HBV, HCV, HDV и HEV.
- Результаты теста:
 - Асцит +.
 - Вздутие живота из-за запора.
 - Увеличенные паховые железы.
 - Увеличенная селезенка.
 - Увеличенная, твердая печень.
 - Паховая и пупочная грыжа.
 - Болезненность точки Мак-Берни из-за воспаления аппендикса.
 - Синдром Рея.
 - Припухлость барабанной перепонки.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Диарея:** инфекционная, **обычно сопровождается тифом**; усиливается после употребления **кислой пищи** или в теплую влажную погоду.
- **Овечий помет** (Alum., Plb.); **глинистый, твердый, гнойный, зловонный, с запахом туши.**
- Запор после злоупотребления слабительными; затрудненный, но мягкий стул; стул застревает в прямой кишке без позывов (врожденный мегаколон).
- Непроизвольные дефекации во время сна.

ПОЧКА

- Младенец плачет перед мочеиспусканием (Vorx., Lys.).
- Ночное недержание мочи.
- Непроизвольное мочеиспускание, когда позыв на мочеиспускание не удовлетворен.
- Ювенильный диабет.
- Задержка мочи из-за обезвоживания.
- Результаты теста:
 - Моча: Альбумин +, Гиалиновые цилиндры +.
 - Моча темная, бледная или мутная, с красным песком.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- спазм голосовой щели.
- Жидкости легко попадают в гортань, вызывая спазмы или рвоту.
- Результаты теста:
 - ларингит +.
 - Ларингоскопия: отек голосовых связок.
 - Хриплый и гнусавый голос.

ДЫХАНИЕ

- Астма от **эмоций** (Coff., Ign.); хуже от еды, прикрывания рта или носа, в **теплой комнате**, лежа или **прикосновения к горлу**; лучше в кондиционированном помещении, на холоде, на открытом воздухе и от **сидения согнувшись** (Ars., Kali-c.).
- **Астматический бронхит** у младенцев и детей младшего возраста, **чередующийся с атопической экземой**; приступы обычно случаются **во время сна**; ребенок просыпается от приступов удушья и жестами показывает, что хочет подойти к окну и подышать свежим воздухом, или **требует прямого потока воздуха в лицо, особенно холодного от вентилятора или кондиционера**.
- Желание дышать глубоко.
- Остановка дыхания ночью, при кашле и при засыпании.
- Результат теста:
 - Стоны, хрипы, хрипы и затрудненное дыхание.

КАШЕЛЬ

- ребенка **краснеет, и он хватается за горло при кашле** (Акон.).
- **Кашель во сне** (Cham.), **неосознаваемый**.
- Пароксизмальный кашель, напоминающий круп, усиливается в полночь и после полуночи; пациент должен немедленно сесть, как только начинается кашель; пациент **не может говорить**.
- Кашель из-за прикосновения к ушному каналу, гортани или горлу.
- Кашель у новорожденных, как будто жидкость попала не в то горло.
- Кашель начинается сразу после того, как ребенок засыпает, и наиболее мучителен в утренние и вечерние часы.

ПНЕВМОНИЯ

- Рентгенограмма грудной клетки: левосторонняя крупозная пневмония.
- Выражение лица ребенка: **пьяное, измученное**, изможденное, синюшное и опухшее.
- **Голова горячая**, конечности холодные как лед.
- **Легкий бред, бормотание себе под нос** или болтливость с лихорадкой (дорого).
- Кашель хриплый, мокрота отходит скудно, сопровождается **сильными - головными болями**.
- **Язык темно-красный и опухший, с липкой, тягучей слюной**.
- Не могу выносить прикосновение одеяла к моей шее.
- Губы синюшные и чувствительные к прикосновению.
- Речь невнятная (у детей старшего возраста); они запинаятся, путаясь в собственных словах, и часто заканчивают предложение только наполовину.
- Приступы одышки, когда ребенок лежит на спине, и удушья при кашле, как только голова касается подушки.
- Пневмония, вызванная этим средством, очень напоминает ту, что вызывается Бапт. и Пирогом.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

- Врожденная слабость сердечной мышцы.
- Неонатальный цианоз.
- Пульс: слабый, прерывистый, медленный и нерегулярный.
- Результаты теста:
 - Ревматический эндокардит.
 - Ревматические заболевания клапанов сердца, особенно митральная недостаточность.

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

- Частые причины сердечной недостаточности, наблюдаемые в Лахе:
 - Анемия.
 - Врожденный порок сердца, осложненный анемией или инфекцией.
 - Асфиксия новорожденных.
 - Ревматическая болезнь сердца.
- Первые «предупреждающие знаки», которые могут указывать на смех:
 - Трудности с кормлением.
 - Частые, быстрые, короткие вдохи, которые улучшаются, если ребенка носить на плече.
 - Раздражительность, плохой набор веса.
 - Постоянный кашель и хрипы.
- Острые приступы удушья с кашлем или одышкой при засыпании (Грин., соч.). Это кардиологическое заболевание усугубляется, если ребёнок засыпает на левом боку.
- Чрезмерное потоотделение с повышенной чувствительностью к теплу и непереносимостью жарких, душных помещений.
- Шумы в сердце.
- Не может переносить никакой вес, например, давление постельного белья или тесной одежды вокруг верхней части груди или шеи.
- Отек лодыжек.
- Отечность лица.

КОНЕЧНОСТИ

- Болезни роста.
- Ледяные руки и ноги, даже в теплую погоду (Асар.).
- Неуклюжесть рук; роняет вещи (Арис, Бов.).
- Детский ревматизм, особенно мягких тканей.
- Результаты теста:
 - Посинение рук.
 - Отеки ног вследствие гипопротеинемии и альбуминурии.
 - Экзостозы.
 - Плоские бородавки на кисти (Dulc., Sep.), на большом и среднем пальцах.
 - Остеомиелит.

СПАТЬ

- Положение во время сна: На животе; постоянно менять положение; положение на боку невозможно (Merc., Phos.).

- Сон часто нарушается постоянным кашлем, чувством удушья, болью, потом и малейшим шумом (Асар.).
- В период ухудшения состояния ребенок обычно спит.
- Постоянно ворочается с боку на бок, стонет и пускает слюни во время сна.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Ледяные ноги.
 - Любит тепло и жару.
 - Отсутствие жажды (Гели, Нат-м.).
 - Озноб начинается где-то между вечером и ночью (с 18:00 до полуночи), сопровождается стучанием зубов, тошнотой и рвотой.
 - Озноб обычно начинается со спины (Еур-рег.).
- Нагревать:
 - Чрезвычайно разговорчив (Bapt., Gels., Podo., Pyrog., Teuer., Tub., Zinc.); быстро меняет тему разговора, возбужден.
 - Без жажды.
 - Сильные головные боли.
 - При ожогах ладони и ступни ног должны быть открыты.
 - Потеря аппетита.
- Пот: Холодный, желтоватый.
- Язык: Географический язык, кончик темно-красный, дрожащий язык с коричневой серединой.
- Пульс: учащенный.
- Лихорадка у детей с синдромом Лакх. обычно возникает в феврале, марте и апреле (Carbo-veg., Sulph.), но, по сравнению с Европой, в Индии это встречается редко. В моей практике дети с симптомами Лакх. лихорадка развивается исключительно из-за слабого иммунитета, что приводит к рецидивирующим инфекциям.
- На ранних стадиях лихорадки у ребенка часто развивается ступор.
- Результаты теста:
 - Живот вздут и болезнен на ощупь.
 - Анализ крови: повышенный С-реактивный белок, высокая СОЭ, повышенный альфа-гаптоглобин, лейкоцитоз, снижение тромбоцитов, снижение фибриногена сыворотки.
 - Повышение температуры около 22:00, характеризующееся выраженным оцепенением.
 - Малярийные паразиты +.
 - Губчатые десны.

СЕПСИС

- Распространенные причины (среди прочих):
 - Амнионит [воспаление амниотического мешка].
 - Разрывы слизистых оболочек.
 - Использование отсасывающих устройств, катетеров, инфузионных флаконов и реанимационных мешков.
- Наиболее распространенные организмы:
 - Кишечная палочка.
 - Клебсиелла пневмонии.
 - Синегнойная палочка .
 - стафилококк .

- Признаки раннего сепсиса у новорожденных и младенцев:
 - Вздутие живота.
 - Сильная жажда (у детей старшего возраста).
 - Приступы одышки.
 - Склонность к кровотечениям (разложившаяся, скудная, несворачивающаяся кровь) из многих отверстий тела.
 - Цианоз вокруг рта.
 - Судороги.
 - Затрудненное высовывание языка, выраженный тремор (у детей старшего возраста).
 - Сухой, коричневый язык.
 - Выражение лица: пьяный, изможденный, отравленный и опустошенный.
 - Отсутствие набора веса.
 - Раздражительность.
 - Желтуха.
 - Летаргия.
 - Диарея — отвратительный, неприятный запах.
 - Болтливый бред.
 - Отказывается от еды.
 - Беспокойство.
 - Пустой, апатичный взгляд.
 - Рвота.
 - Хуже в теплую погоду.

ЭПИЛЕПСИЯ

- Типы:
 - Большой проступок.
 - Petit mal.
 - Простые фебрильные судороги.
- Жалобы, вызванные:
 - Гнев, ревность, прорезывание зубов и во время сна (Arg-n., Supr.).
- При судорогах:
 - Прикус языка.
 - Поворачиваем большие пальцы вовнутрь.
 - Пена у рта.
 - Непроизвольное мочеиспускание.
 - Бледное лицо.
 - Крик.

КОЖА

- Склонность к образованию фурункулов и абсцессов, особенно вызванных стафилококками.
- Склонность к целлюлиту.
- Нездоровая кожа.
- Результаты теста:
 - Лекарственная сыпь.
 - Атопическая экзема.
 - Импетиго.

- Tinea cruris и tinea pedis.
- Крапивница.

Общий

- **Нехватка воздуха;** сильное желание находиться на открытом воздухе; ребенок настаивает на том, чтобы сидеть у окна во время поездки на машине или поезде.
- Очень **жаркие дети;** любят находиться на свежем воздухе и играть, всегда просят включить в комнате вентилятор или кондиционер.
- **Ночное ухудшение** многих жалоб, особенно перед полночью (Ars., Cham.), например, астмы, кашля, диареи, лихорадки, мигрени, синусита.
- У детей очень распространены такие онкологические заболевания, как лейкемия, а также доброкачественные опухоли, такие как ангиомы, гемангиомы, келоиды и т. д.
- Выделения: Кровянистые (особенно при экземе, выделения из слизистых оболочек, стул, моча или рвота).
- Быстрая потеря веса при диарее (Mag-c., Ol-j.).
- Легко теряет сознание при испуге, боли, в жарком помещении или под горячим душем.
- Геморрагический диатез: небольшие раны быстро и обильно кровоточат. Кровь тёмная, несвёртываемая.
- В семейном анамнезе часто встречаются клапанные или ревматические заболевания сердца, рак, лейкемия, анемия, диабет, сепсис, цереброваскулярные нарушения.
- Склонность очень быстро простужаться.
- Склонность к отекам вследствие заболеваний сердца, печени или селезенки.

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

(Молочная кислота - Lac-ac.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Проблемы с отцом, ощущение, что отец меня недостаточно любит.
- ▶ Очень любящий и независимый.
- ▶ Множество ошибок в говорении и правописании; пропуски слов при письме.
- ▶ Дети со светлой кожей, светловолосые, изможденные, худые и истощенные.
- ▶ Очень склонен к рецидивирующим язвам во рту.
- ▶ **Ювенильный диабет.**
- ▶ Пристрастия.
- ▶ Сильное отвращение к мясу.
- ▶ **Тошнота с недомоганием** как существенный сопутствующий симптом. Тошнота с постоянным обильным слюноотделением.
- ▶ **Ревматизм у детей.**
- ▶ Ревматическое воспаление локтей, коленей и мелких суставов верхних и нижних конечностей. Боль в суставах усиливается ночью и уменьшается от тёплых компрессов. Чувствительные, воспалённые и опухшие суставы.
- ▶ Ледяной холод кончиков пальцев и ступней.
- ▶ Очень морозно, малейший сквозняк ухудшает ситуацию.

Источник

- Познакомился с гомеопатией благодаря доктору Свону .

ЛАВРОЦЕРАЗУС

(Вишня лавровая - Лор.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Содержит цианистый водород, поэтому многие симптомы схожи с симптомами воздействия этой кислоты.
- ▶ **Триас: холод, синяя окраска и затрудненное дыхание.**
- ▶ Основной симптом: **всегда хорошее настроение, несмотря на слабость и болезнь.**
- ▶ Пороки сердца любого типа у ребенка, если мать пережила сильное горе, страх или сильное эмоциональное потрясение.
- ▶ Чистый язык.
- ▶ Пот на носу.
- ▶ Острый нос.
- ▶ Лицо Гиппократово.
- ▶ **Врожденный цианотический порок сердца.**
- ▶ Синюшно-красный оттенок кожи, пальцы по типу «барабанных палочек», губы синюшные и гиперемизированные.
- ▶ Выраженная одышка, внезапная остановка дыхания, за которой следуют два-три глубоких вдоха, затем дыхание постепенно становится поверхностным, затем наступает застой, затем ещё два-три вдоха, и всё начинается сначала. Одышка значительно усиливается в положении сидя; лучше в полуположенном положении. Цианоз при минимальной физической нагрузке. Ребёнок хватает воздух ртом при минимальной физической нагрузке, хуже на свежем воздухе и в положении сидя.
- ▶ Кашель, вызванный сердечной деятельностью, особенно в положении лёжа. Кашель усиливается в положении лёжа, но в положении сидя возникает ощущение сильного сдавливания в груди, поэтому полуположенное положение наиболее переносимо.
- ▶ Рецидивирующая пневмония вследствие наследственных заболеваний сердца, в частности дефекта межжелудочковой перегородки или синдрома Эйзенменгера.
- ▶ Проблемы с сердцем и легкими усиливаются при любом движении или нагрузке.
- ▶ Обмороки, вызванные дефектами коронарных артерий сердца, бледность и синюшность лица. Холодная кожа тела, очень замедленные реакции и снижение жизненного тонуса.
- ▶ Отсутствие аппетита.
- ▶ Всегда мерзнет, мерзнет и нуждается в большом количестве тепла.

Источник

- Синоним: *Prunus laurocerasus*. Семейство розовых (Rosaceae).

ЛИКОПОДИЙ

(Клаббос - Лайк.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Выглядит уверенным и решительным (это маска), иногда переоценивает свои силы, чтобы компенсировать скрытые страхи и неуверенность.
- ▶ Обратите пристальное внимание на все, что он делает для поддержания определенного имиджа (своего рода интеллектуальная манипуляция).
- ▶ Осторожные дети, которые не рискуют; они не упрямы, но им не хватает твердости.
- ▶ Раздутое эго.
- ▶ Высокомерное поведение, при котором человек кажется очень скромным, простым и любезным с незнакомыми людьми, но дома он такой же злой, раздражительный, оскорбительный и нетерпимый по отношению к семье.
- ▶ Чувствуют себя виноватыми; часто пожинают лавры, которых не заслуживают.

- ▶ Дети, которые принижают себя; они часто считают себя маленькими и неполноценными (они не могут компенсировать свои страхи чрезмерной самоуверенностью, характерной для другого типа).
- ▶ Подавление интуитивных, творческих и художественных способностей (правое полушарие мозга) с чрезмерным акцентом на интеллектуальных и рациональных (левое полушарие мозга).
- ▶ Дети, которые могут эмоционально сломаться, когда кто-то проявляет к ним доброту; они могут даже плакать.
- ▶ Дети, которые больше полагаются на свою умственную силу, чем на физическую.
- ▶ Не уверен в своих силах; не пробует ничего нового, потому что всё равно потерпит неудачу. Часто из-за деспотичных родителей, которые постоянно его критикуют.
- ▶ Склонен к самоуважению, преувеличивает и любит говорить только о себе.

Тело

- ▶ Нехватка воздуха; хочет быть на улице, хотя многие симптомы усиливаются на свежем воздухе. Не переносит сквозняков.
- ▶ Сухость отдельных частей тела (кожи, кишечника, слизистых оболочек, носа и т. д.).
- ▶ Раздутый как барабан.
- ▶ Дети не могут полноценно питаться, поскольку им приходится снова и снова садиться и вставать из-за болезненной отрыжки и икоты.
- ▶ Бледные, худые, тощие, выглядящие старыми дети с сухой, грубой, морщинистой кожей и вздутым животом; с хорошо развитой головой, темными волосами, мутной конъюнктивой и длинной, узкой грудной клеткой (дети старшего возраста часто принимают согнутую вперед позу).

- ▶ Пожелтение кожи и выделений при простуде, мокроты, рвоты, стула, выделений, мочи и т. д.
- ▶ Днем ребенок сбрасывает теплые одеяла, но ночью они ему нужны, чтобы согреться.
- ▶ Потеря веса при хорошем аппетите (мальабсорбция).
- ▶ Расстройство пищеварения, несмотря на хороший аппетит; они часто едят и пьют больше среднего.
- ▶ При грудном вскармливании:
 - Младенец постоянно хочет грудь (внимание), даже после того, как только что плотно поел (голоден), или плачет, требуя грудь, но перестает после нескольких сосательных движений (быстрое насыщение).
 - Предпочитает правую грудь.
 - Чтобы заснуть, нужно кормить грудью (сонливость после кормления).
 - Просыпается с громким плачем и хочет, чтобы его кормили (ночной голод).
- ▶ Низкая выносливость; быстро наступает умственное и физическое истощение.

Другие важные симптомы

Дух

- Амбициозные, конкурентоспособные дети, которые используют любую возможность для победы.
- Отвращение к обществу, особенно к **незнакомцам**.
- Не любит играть на улице; предпочитает играть в помещении в такие игры, как **Lego** и **Scrabble**.
- **Необъяснимый плач** у младенцев, особенно ночью.
- Во время интервью дети-лгасиаторы **молчат**, не **общаются**.
- **Завидует** способностям других.
- Даже с лучшим другом ребёнок не всегда выражает свои чувства. Он ведёт себя сдержанно, старается утаить много информации и ничем не делится.
- Ленивые дети, которые склонны откладывать выполнение любого порученного им задания или обязательства.
- **Раннее** тщеславие у маленьких девочек.
- **Эгоистичные**, жадные дети; очень щепетильно относятся к своим вещам; не желают делиться ими ни с кем.
- **Твердые убеждения** и идеи; нетерпимость к противоречиям.
- **Ужасный почерк**, почти неразборчивый.
- Очень **бдительный**.
- Утром очень вялый, активизируется только после **завтрака**.
- Слабо разбирается в **математике**, особенно в арифметике.

- Заболевания, вызванные: ожиданием, плохими новостями, пребыванием в толпе, смертью близких, неудачами, испугом, длительной историей чрезмерного родительского контроля, унижением и сексуальным насилием.
- Дети, которые хотят, чтобы их все время носили на руках.
- Малыши, как правило, постоянно цепляются за мать, крепко держат ее за руку и не хотят, чтобы их брал на руки другой член семьи.
- Трусость; легко пугается мелочей.
- Дети, страдающие дислексией, допускают много ошибок при чтении, говорении или письме, используют неправильные слова, путают, искажают или забывают буквы или слова.
- Страх остаться в одиночестве (особенно ночью), неудач, привидений, насекомых, замкнутых пространств, шума, людей (несмотря на страх остаться в одиночестве), принятия новых вызовов, грозы.
- Пародируйте и подражайте своим бабушкам и дедушкам, учителям и т. д.
- Беспокойные дети; топают ногами, когда сидят.
- Чувствителен к боли; становится очень агрессивным, когда испытывает боль.
- Горько рыдает и плачет по пустякам, при малейшем упреке.
- Страх сцены.
- Склонность кусать или класть все в рот; особенно грызть ногти, подушки и т. д.

Голова

- Головная боль правосторонняя; провоцируется гневом или **раздражением**, эмоциональным возбуждением, **голодом**, подавленными высыпаниями (чесоткой, атопическим дерматитом), поездкой на машине или автобусе; усиливается после завтрака, после кофе, от **перегрева на теплом воздухе**, умственного напряжения и **подавленного катара** (сосудосуживающие средства для носа); облегчается при надавливании извне; **на холоде, на свежем воздухе**, при приеме пищи, в кондиционированном помещении, чихании, прикрывании головы; сочетается с **сопутствующими - симптомами со стороны пищеварения**, такими как запор и расстройство желудка, связанное с желчью.
- Экзема кожи головы, особенно на затылке, с сильным шелушением и зудом; хуже от тепла постели; сочится едкая жидкость, которая разрушает волосы.
- Чувствительная кожа головы, особенно к холодному воздуху, и отвращение к любому головному убору.
- Капли пота на лбу во время еды.
- Результаты теста:
 - **Преждевременное поседение и выпадение волос.**
 - Спинномозговая жидкость: Менингит, особенно туберкулезный.
 - КТ: кровоизлияние в мозг, гидроцефалия.
 - весы.
 - Голова повернута в сторону, особенно вправо.
 - Вши.
 - МРТ: Аневризма Берри (аневризма головного мозга).
 - Ночная потливость в постели.
 - Placa polonica.

- Киста, задерживающая кожное сало.
- Не может держать голову вертикально.

Глаза

- Острая разрывающая боль при простуде, лихорадке или на ветру.
- Катаральный конъюнктивит у младенцев.
- Близорукость.
- Зрение ослаблено и болезненно из-за длительного чтения или просмотра телевизора.
- Результаты теста:
 - **Блестящие красные глаза.**
 - **Глаза полуоткрыты.**
 - Желтуха.
 - Липкие веки.
 - Воспаление век.
 - Катаракта.
 - Хемоз.
 - Постоянное желание тереть глаза.
 - Сходящееся косоглазие.
 - Выделения кровянистые, гнойные, густые и желтые, больше из наружных уголков глаз.
 - Экхимозы.
 - Зернистые веки.
 - Свищ слезной железы.
 - Светобоязнь.
 - Выпуклые глаза.
 - Зрачки расширены.
 - Пигментная ретинопатия.
 - Ячмени возле внутренних уголков глаз.
 - Запавшие глаза.
 - Подергивание век.

Уши

- Хронический гнойный средний отит после кори, особенно **правого уха**, характеризующийся сильной болью; усиливается от сквозняков и на открытом воздухе; ребенок указывает **на ухо как на наиболее болезненную область**.
- **ковыряет** пальцами в ушах, даже во сне.
- Нарушение слуха из-за **увеличенных миндалин**.
- Уши болезненно чувствительны к ветру, холоду и пребыванию на открытом воздухе.
- Результаты теста:
 - **Экзема** мокнущая, шелушащаяся, с трещинами, особенно **за ушами**.
 - Зеленоватая, вонючая, раздражающая, правосторонняя оторрея.
 - Повышенное количество ушной серы.
 - полипы.

Нос

- **Постоянное царапание, ковыряние или щипание пальцев;** даже во сне может внезапно начать засовывать пальцы в ноздри.
- **Заложенность** носа у детей, находящихся на грудном вскармливании;

- **Шмыгание носом** у новорожденных.
- Постоянное желание высморкаться.
- Выделения: кровянистые, обильные, зеленоватые, зловонные, гнойные или беловато-желтые, с тенденцией к образованию корок и чешуек.
- Носовые кровотечения темной кровью, особенно при лихорадке и сморкании.
- Катар носа распространяется на лобную пазуху; острый насморк лобной пазухи и решетчатой кости болезнен, усиливается от надавливания (особенно давления очков) и движения .
- Заложенность носа гноем; усиливается во время сна.
- Имеет тенденцию чихать после каждого приступа кашля.
- Результаты теста:
 - **Веерообразные движения** ноздрей при жалобах на боль в груди.
 - **Ретроназальный катар.**
 - Рентген носоглотки: **аденоиды.**
 - Острый нос.
 - полипы.

Лицо

- Акне, связанное с проблемами пищеварения.
- Отек и воспаление подчелюстных и околоушных желез; начинается с правой стороны, а затем распространяется на левую.
- Результаты теста:
 - Постоянное **облизывание губ.**
 - Трещина посередине нижней губы.
 - Изменение цвета: **красное, одностороннее или локальное;** усиливается при кашле, приеме пищи или головной боли.
 - **Морщинистый лоб**, особенно как сопутствующий симптом дискомфорта в груди.
 - Атопическая экзема лица с чрезмерным образованием корок и влажными, зловонными выделениями.
 - Синеватые круги под глазами.
 - Жевательные движения нижней челюсти.
 - Изменение цвета: грязный, землистый, сероватый, желтый и бледный.
 - Экзематозные высыпания вокруг уголков рта.
 - Выражение лица: тревожное, гиппократовское, старческое, острое и болезненное.
 - Жирное лицо.
 - Ледяной пот на лице.
 - Клещи.
 - Бородавки на подбородке.

ГОТ

- **Скрежет зубов при гнев.**
- **Заикание речи**, особенно при произнесении последнего слова в предложении.
- Сухость во рту с отсутствием жажды, особенно при пробуждении утром.
- Зубная боль усиливается ночью и от употребления холодной пищи; уменьшается от любого тепла.
- Результаты теста:
 - **Облизывание и причмокивание языком.**

- Движения языка из стороны в сторону, **язык высовывается, как змея.**
- Пожелтение зубов.
- Постоянно стискивать зубы или держать палец в рту.
- Географический язык ИЛИ язык с черным или коричневатым налетом, с красными боками и красным кончиком, с трещинами и выступающими сосочками.
- Пена у рта.
- Неприятный запах изо рта.
- Обильное слюнотечение с цинготными и гнойными деснами, которые легко кровоточат от малейшего прикосновения или при чистке зубов; слюнотечение усиливается при лихорадке или во время сна.
- Гнойные выделения, нарывы на деснах.

ШЕЯ

- **Глотать жидкости** сложнее , чем твердую пищу; за один раз можно съесть только чайную ложку .
- Дискомфорт в горле (образование пленки, боль), который обычно **начинается с правой стороны** , а затем распространяется **на левую** ; боль в горле, отдающая в ухо при глотании; усиливается после **холодной пищи, холодных или теплых напитков**, но может также уменьшаться после **горячих или холодных напитков**.
- Ребенок склонен откашливать творожистые комки.
- При глотании еда и напитки выпадают из ноздрей.
- Результаты теста:
 - Титр антистрептолизина более 300 ед.
 - Удлиненный язычок.
 - Зоб.
 - Уплотненные отеки шейных лимфатических узлов, напоминающие нити жемчуга.
- языкоглоточного нерва) и X (блуждающего нерва) черепных нервов .
- Правосторонний тонзиллит и фарингит.
- Слабый рвотный рефлекс.

ЖЕЛУДОК

- **правую грудь** при кормлении грудью .
- Пристрастия: Чем больше ребёнок ест, тем больше ему хочется. Он **также просыпается ночью с чувством голода**. Дети испытывают голод даже во время болезни (например, при диарее и головных болях). Приём пищи приносит им временное облегчение.
- Проблемы с пищеварением у новорожденных, такие как обструкция желчных протоков, врожденная гипербилирубинемия и непереносимость лактозы, если у матери в анамнезе были случаи **длительного насилия, гнева с негодованием, гнева с молчаливым горем** или **подавленного гнева** во время беременности .
- Расстройство желудка с тошнотой, рвотой и вздутием живота, вызванное **хлебом, холодной пищей и напитками, фруктами, молоком, луком или устрицами**.

- Прием пищи , даже небольшой, вызывает чувство сытости.
- Вздутие живота, диспепсия и раздражение желудка из-за замедленного - опорожнения желудка или врожденного пилоростеноза; усиливаются от **холодной пищи**; облегчаются от **теплой пищи** и **ослабления одежды** (новорожденные предпочитают, чтобы их пеленали очень свободно).
- Дети прекрасно себя чувствуют, питаясь **небольшими порциями**; они никогда не смогут переварить **большую пищу** , которая вызывает у них сильные страдания.
- **Громкая отрыжка** и **икота** сопровождают практически каждый сеанс грудного вскармливания и делают ребенка злым и раздражительным.
- Жажда **небольшого количества** холодной воды, даже при лихорадке.
- Младенец часто просыпается утром из-за расстройства желудка.
- Рвота желчная, кровавая и кислая, усиливается после питья холодной воды.
- Обострение: фасоль, хлеб, капуста, морковь, шоколад, кофе, **холодные напитки, холодная пища**, яйца, жир, рыба, фрукты, молоко, лук, **устрицы**, выпечка, горох, салат, сладости, свекла.
- Отвращения: фасоль, хлеб, **капуста**, кофе, холодная пища, холодные напитки, жир, мясо, грудное молоко, лук, устрицы, выпечка, горох, соль, суп, помидоры.
- Пристрастия: хлеб, сыр, шоколад, **устрицы**, оливки, выпечка, сахар, **сладости, горячие напитки и еда**.

ЖИВОТ

- Любая **тесная одежда** вокруг живота вызывает **дискомфорт**.
- Икота при **перитоните**.
- **Шум** в животе.
- Колики в животе: ребенок сворачивается калачиком после употребления холодной пищи или холодных напитков; облегчаются отхождением газов.
- Синдром мальабсорбции [белково-энергетическая недостаточность], - непереносимость углеводов и целиакия.
- Удерживаемый метеоризм с беловатым языком и вздутием живота, даже после приема небольшого количества пищи. Обильное отхождение газов.
- Урчание и бульканье в животе при диарее.
- Результаты теста:
 - **Паховая грыжа +.**
 - **Печень увеличена** и болезненна на ощупь.
 - **Поджелудочная железа: кистозный фиброз.**
 - **Паралитическая непроходимость кишечника +.**
 - Живот втянут.
 - Асцит +.
 - Жировая ткань живота.
 - Туберкулез кишечника.
 - Перитонит +.
 - Вздутый живот +.
 - Ультразвуковое изображение: цирроз печени и портальная гипертензия, абсцесс печени и увеличенные брыжеечные лимфатические узлы.
 - Водянистые выделения из пупка.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Острая диарея, вызванная **псевдомембранозным колитом** (диарея, вызванная *Clostridium difficile*) или хроническая диарея у детей, страдающих кишечными паразитами (анкилостомами, аскаридами, *Entamoeba histolytica*), железодефицитной анемией или белково-энергетической недостаточностью, а также после чрезмерного **употребления фруктовых соков**.
- Запор после употребления молока или **во время путешествия**; стул необходимо удалить **механическим путем**.
- Стул: коричневый, обильный, грубый, зеленый, красный, слизистый, гнойный и непереваренный; **первая часть стула твердая, затем следует мягкий, жидкий или жидкий стул, или длинный, узкий стул, сопровождаемый большим количеством газов**, или стул жидкий, коричневый и бледный, смешанный с твердыми комками желтовато-зеленых или **красноватых непереваренных частиц**.
- Диарея обычно начинается или усиливается после холодных напитков, кофе, **выпечки**, фруктов, **молока**, **лука**, **устриц**, хлебобулочных изделий, картофеля, овощей; после подавления кожной сыпи, особенно чесотки; утром при вставании, после полуночи (между 1–3 часами ночи или 3–4 часами ночи) или вечером (16–20 часов вечера).
- Хорошее средство от лекарственной диареи, вызванной ампициллином, амоксициллином и клиндамицином.
- Постоянные запоры из-за вялой работы печени приводят к сильным болям в заднем проходе при попытках дефекации.
- Для диареи, вызванной этим средством, типичны следующие сопутствующие симптомы:
 - Синие круги вокруг глаз; глаза широко открыты и немигающие.
 - Повышенный аппетит при полном отсутствии жажды.
 - Лицо землистого или покрасневшего цвета.
 - Громкий грохот.
 - Настроение: раздражительное, апатичное и грустное.
 - Зловонное дыхание.
 - Болезненность по всему животу.
- Результаты теста:
 - Болезненность ануса.
 - Полипы прямой кишки.
 - Анализ кала: глисты: острицы и сегменты ленточных червей.

ПУЗЫРЬ

- Непроизвольное мочеиспускание после шока и при тифе.
- Ребенок кричит и плачет перед мочеиспусканием.
- Ночное недержание мочи.
- Частые позывы к мочеиспусканию с лихорадкой.
- Полезное средство при почечной недостаточности, ювенильном диабете, нефрите и нефротическом синдроме.
- Задержка мочи у новорожденных.
- Результаты теста:
 - Моча: Альбумин +, Глюкоза +, Кристаллы оксалата кальция, Эритроциты +.

- Моча становится мутной, молочной или мутной, кирпично-красного цвета, с неприятным запахом и наличием красного или желтого песка.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Орхит.
- Склонность к мастурбации.
- Результаты теста:
 - Влага между бедрами и мошонкой.
 - Фимоз +.
 - Вялая мошонка.
 - Маленький половой член (синдром Фрелиха или гипогонадизм).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Голос: лающий, хриплый, глухой, грубый, носовой или потеря голоса.

ДЫХАНИЕ

- Астма у детей вследствие **расстройства желудка**; ухудшается ночью, после полуночи, во время сна, на холодном свежем воздухе, лежа на спине и при ходьбе на свежем воздухе; улучшается от **еды**, в положении лежа на боку и **сидя прямо**.
- **Веерообразные движения ноздрей**: важный сопутствующий симптом затрудненного дыхания, такого как астма и пневмония.

КАШЕЛЬ

- Кашель: **лающий**; громкий; **постоянный** днем и ночью; причиняет **сильный дискомфорт**, особенно при лихорадке.
- Мокрота отходит с трудом, студенистая, зеленоватая, гнойная.

ПНЕВМОНИЯ (НАПОМИНАЕТ KALI-C.)

- Я видел детей-лисиологов, больных пневмонией, которые были очень **деспотичными и требовательными** в своих требованиях.
- Пневмония, вызванная этим средством, часто поражает **правое легкое**.
- Дыхание **учащенное, свистящее, прерывистое, затрудненное, шумное, прерывистое, хриплое и короткое**; хуже, когда ребенок лежит на спине; лучше, когда сидит.
- Ребенок выглядит **испуганным, изможденным, усталым** и хмурится; его поведение становится **вялым и апатичным**.
- Ребенок чрезвычайно чувствителен к холоду, хотя в то же время **не любит душных помещений**.
- Ребёнок очень **тревожен и обеспокоен** своей болезнью, поэтому нуждается в постоянном **внимании**, постоянно хочет, чтобы **кто-то был рядом**. Тем не менее, он склонен вести себя **сварливо и раздражительно по отношению к окружающим**, которые ему **помогают**.
- Кашель **приступообразный, спазматический, сильный**, со скудной твердой мокротой.
- При легочной лихорадке **пот полностью отсутствует**.
- Ребенок становится злым и раздражительным сразу после пробуждения.

- Запущенная пневмония из-за слабого телосложения и злоупотребления антибиотиками.
- Рецидивирующая пневмония у детей с иммунодефицитом.
- Ребёнок может испытывать жажду, требуя тёплых напитков, что немедленно приводит к ощущению переполнения и вздутия живота. Многие дети, находящиеся на диете Лус., также могут испытывать жажду.
- Повышение температуры обычно начинается около 16:00, сопровождается затрудненным дыханием и усиленным кашлем.
- Обычно показано на поздних стадиях, через 3–4 дня болезни, в течение которых ребенок изначально очень активен умственно.
- Результаты теста:
 - **Потеря веса в области ключиц.**
 - Носовое дыхание.
 - Рентгенограмма грудной клетки: пневмония, отек легких, плевральный выпот.
 - Синюшные губы.
 - Острый нос.
 - Спит с полузакрытыми глазами.
 - Белый налет на языке.
 - Подергивание мышц лица.

Назад

- **Истощение** шейного отдела.
- Кифоз.

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжесть; роняет вещи из рук.
- Обильный, вонючий пот на ногах.
- Конечности спазматически сокращаются.
- Результаты теста:
 - Ледяной холод рук и ног.
 - Детский церебральный паралич с чрезмерным сокращением мышц и сухожилий.
 - Сжатые пальцы.
 - Мозоли.
 - Синобит.

ЭПИЛЕПСИЯ

- Жалобы на гнев у детей, находящихся на грудном вскармливании, матери которых сильно страдают от подавленного гнева.
- При судорогах: стискивание пальцев рук, пена у рта и покраснение лица.
- Хуже после холодных напитков.

КОЖА

- Результаты теста:
 - Кровавые нарывы.
 - Грязная кожа.
 - Псориаз.
 - Крапивница.

СПАТЬ

- Беспокоит кашель, голод или ночные кошмары.
- Во время сна: подергивания, смех, стоны, бормотание, открытые веки, открытый рот, потоотделение, слюнотечение, крики и плач.
- Частое или постоянное зевание или тщетные попытки зевнуть.
- Вечером после кормления грудью или еды малыши становятся очень сонными.
- Положение для сна: коленно-грудное (коленно-грудное).

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Ледяной холод рук и ног.
 - Стадия озноба сопровождается тошнотой, рвотой и зевотой.
 - Мороз без жажды.
 - Холод не проходит, если укрываться.
- Нагревать:
 - Лицо, щеки, уши, глаза и ладони горячие и жгучие.
 - Сильный жар и покраснение лица.
 - Психически: Раздражительный, беспокойный, молчаливый, вялый.
 - Физические: запор, насморк, носовые кровотечения, частое мочеиспускание, слезотечение, тошнота, слюнотечение, кислая рвота, жажда, чистый или обложенный коричневым налетом язык.
- Пот:
 - Пот по всему телу, за исключением конечностей, имеет кислый запах.
- Лихорадка либо перемежающаяся, либо вызвана лейкоемией или лимфомой.

Общий

- **Потеря веса при тяге к еде.**
- В семейном анамнезе **инсульт, подагра, гипертония, ревматизм, ревматоидный артрит, камни в почках.**
- Отсутствие реакции в случае неэффективности указанных средств.
- Отеки из-за заболеваний сердца или печени.
- Склонность падать в обморок в людных помещениях из-за голода или постоянного пребывания в положении стоя.

Источник

- *Lycopodium clavatum* из семейства плаунов (*Lycopodiaceae*).

МАГНИЙ КАРБОНИКУМ

(Карбонат магния - Mag-c.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Ребенок кажется очень кротким, но за этим скрывается внутренняя буря насилия.
- ▶ **Сироты, незаконнорожденные или брошенные дети** (фильм: «Забутые Богом дети») или дети, которые неоднократно были свидетелями **насилия и конфликтов в семье**.
- ▶ Подавленные эмоции, обычно вызванные доминирующим подавлением.
- ▶ Агрессия и плохая способность устанавливать контакт, как правило, из-за неуверенности в себе и отсутствия защиты.
- ▶ Дефицит внимания, нарушения поведения и нарушения социального поведения у детей с семейным анамнезом туберкулеза.
- ▶ Дислексия; медленная обучаемость.
- ▶ Легко пугается неожиданных прикосновений или звуков.
- ▶ Эмоционально заброшенные дети, которых бросили даже на короткий период времени, например, на время отпуска, смены работы и т. д.
- ▶ Дети ночи (Мезгер).
- ▶ Сироты типа «Оливера Твиста», угнетенные, молчаливые, неуверенные в себе, худые, нуждающиеся в любви и т. д.
- ▶ Миротворец как психологическая проекция, как попытка утихомирить скрытый гнев, конфликт и горе.

Тело

- ▶ Нежные, щедущие, болезненные, кислые дети с тяжелым туберкулезным диатезом; едят хорошо, но истощены.
- ▶ Общая повышенная чувствительность: к климатическим воздействиям, эмоциям, свету, музыке, шумам, боли и т. д. Ребенок не переносит изменения температуры, прикосновения или сквозняков — все это ухудшает его симптомы (особенно боль).
- ▶ Это средство следует рассмотреть, если у ребенка наблюдается отвращение к овощам и сильная тяга к мясу. Ни одно другое средство в Materia Medica не вызывает такого пристрастия к мясу и всему, что имеет мясной вкус. Без мяса он не развивается; его необходимо включать в каждый прием пищи.
- ▶ Общее ухудшение состояния от молока; непереносимость лактозы.
- ▶ Ухудшение состояния при физической и умственной нагрузке; быстро утомляется. Несмотря на низкую выносливость и упадок сил, ребенок может выглядеть упитанным.

ШЕЯ

- Боль в горле при чихании.
- Результаты теста:
 - Сырные комочки на миндалях.
 - зоб.
 - Подчелюстные железы увеличены и чувствительны к прикосновению.

ЖЕЛУДОК

- **Младенец плачет от голода, даже после полноценного приема пищи, который состоялся всего несколько минут назад.**
- **Расстройство желудка после капусты, молока и кислых продуктов.**
- Постоянная кислая отрыжка после завтрака и после каждого приема пищи, особенно после капусты.
- Сильная жажда во время лихорадки, после обеда, до, во время и после дефекации.
- Рвота после кормления, особенно непереваренным или свернувшимся молоком.
- Ухудшение: холодная пища, кислые фрукты, сливы, картофель, горячая пища.
- Лучше: кофе, холодные блюда, свинина, соль.
- Отвращение: хлеб, масло, вареная пища, фрукты, мясо, молоко, баранина, салат, овощи, горячая пища.
- Пристрастия: к хлебу, маслу, капусте, кофе, деликатесам, фруктам (особенно кислым), сочным продуктам, мясу (маринованному, соленому или консервированному), молоку, соленьям, супу.

ЖИВОТ

- Колики: сопровождаются чрезмерным вздутием живота и постоянной кислой отрыжкой; сильнее в левой части живота (справа: Лус.) или вокруг пупка; за коликами следует диарея (за коликами следует запор: Лус.); хуже с 6 до 7 утра или с 7 вечера, от употребления зеленой пищи, зеленых овощей или молока; лучше от мясной диеты.
- Вздутие живота после еды; с диареей; улучшение после отхождения газов.
- Бурчание в животе.
- Результаты теста:
 - Живот болезненный при надавливании.
 - Увеличенная печень.
 - Паховая грыжа.
 - Пальпируемая толстая кишка.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея:
 - Дискомфорт или ухудшение состояния из-за: **искусственного молока, других добавок, прорезывания зубов, фруктов, жаркой погоды.**
 - Перед стулом: сильные **колики** и метеоризм.
 - Во время дефекации: сильные **колики.**

- Сопутствующие симптомы: белый налет на языке, **сильная жажда**, вздутие живота из-за метеоризма.
- Лучше сочетается с: теплым супом.
- У ребенка наблюдаются бесплодные позывы к дефекации, стул выделяется небольшими порциями, но при этом наблюдается обильное газообразование.
- Запор с затрудненным стулом, даже если он мягкий; постоянный и хронический запор после эмоциональной травмы.
- Стул: обильный, с кислым запахом, непереваренный; зеленый или зеленовато-желтый; пенистый, слизистый или водянистый; с кровянистой слизью, зеленой пеной или белыми комочками, похожими на кожное сало.
- Глисты: острицы и аскариды.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ночное недержание мочи.
- Частое мочеиспускание.
- Ювенильный сахарный диабет.

КАШЕЛЬ

- Через голод.

НАЗАД

- Результат теста:
 - Потливость в области шеи.

КОНЕЧНОСТИ

- Быстрая утомляемость из-за мягких и дряблых мышц.
- Результат теста:
 - Холодные руки и ноги.

СПАТЬ

- Сонливость после кормления, особенно после обеда.
- Во время сна: стоны, потливость, крики, вздохи, вздрагивание, разговоры, подергивание мышц и плач.
- Чтобы чувствовать себя бодрым утром, необходимо много часов сна.
- Положение во время сна: с раздвинутыми ногами.
- Сон нарушается судорогами или кошмарами.

КОЖА

- Повышенное потоотделение, особенно после приема горячей пищи и перед сном; пот имеет неприятный запах, становится маслянистым, кислым и оставляет желтые пятна на постельном белье.
- Зуд усиливается во время купания.
- Склонность к рецидивирующему образованию нарывов.
- Результат теста:
 - Псориаз.

ОБЩИЙ

- **Потеря веса у младенцев и детей, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как диарея.**

- **Пациенты крайне зябкие;** состояние ухудшается от малейшего сквозняка, холодной погоды, холодных напитков и холодной пищи.
- Выделения едкие, разъедающие и зловонные.
- Общее ухудшение состояния ночью, особенно колики и диарея.
- Склонность к простудам.
- Склонность к увеличению желез: аденоидов, лимфатических узлов, миндалин и т. д.
- Слабость из-за диареи, после еды, потоотделения, после дефекации или рвоты.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ МАГ-К. И ЧАМ.

Ребенок с синдромом Магнезии может быть похож на ребенка с синдромом Чам. Некоторые важные **общие симптомы** включают:

Дух

- Жалобы, вызванные эмоциональным возбуждением.
- Отвращение к прикосновениям и взглядам.
- Отвращение к умственному напряжению, сопровождающееся вялостью.
- Капризный.
- Бунтующий, склонный к противоречию.
- Трудности с концентрацией внимания во время обучения.
- Легко становится нервным, особенно ночью.
- Забывчивый.
- Ленивый.
- Делает ошибки при письме.
- Выраженная раздражительность и сильный гнев.
- Сварливый.
- Беспокойство в постели; вынуждает вставать с постели; ворочается в постели.
- Чувствительность к шуму.
- Быстро плачет, особенно во время сна, при пробуждении и при возникновении боли.

Голова

- Потливость головы.
- Если он не может держать голову прямо, его будет тянуть назад.
- Прикрывание головы ухудшает ситуацию.

Уши

- Боль при прикосновении.
- Изменение цвета на красный.

Нос

- Чувствительное обоняние, особенно к резким запахам.
- Насморк с кашлем.
- Выделения: Капающие, водянистые.

Лицо

- Красный цвет.
- Опухание щек при зубной боли.

РОТ

- Кариес зубов.
- Затрудненное и медленное прорезывание зубов.
- Слюноотделение при зубной боли.
- Заикание.

ЖЕЛУДОК

- Аппетит: капризный и волчий.
- Рвота после молока.
- Ухудшение: кофе, молоко, горячая пища.
- Не любит: мясо.
- Пристрастия: Холодные напитки, холодная вода, хлеб, кислая пища.

ЖИВОТ

- Коликообразные боли у детей, находящихся на грудном вскармливании.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея у детей, особенно в период прорезывания зубов.
- Стул: пенистый, зеленый, водянистый и слизистый.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ночное недержание мочи.

СПАТЬ

- Во время сна: стоны, крики, легкое вздрагивание, разговоры и подергивание мышц.
- Частое зевание.
- Сонливость после обеда.
- Бессонница во время прорезывания зубов, из-за страха, из-за беспокойства.

ОБЩИЙ

- Усиливается при купании, холодных влажных компрессах, раскрытии и ходьбе на открытом воздухе.
- Отвращение к купанию.
- Судороги с болями в животе.
- Истощение.

Отличительные черты Маг-с. и Cham.	
МАГНИЙ КАРБОНКУМ	РОМАШКА
Дух • Причина жалоб: Разногласия между родителями. • Тревожность со страхом; перед походом к врачу или стоматологу. • Отвращение к насилию; стремление к гармонии; дискомфорт от конфликта. • Желание путешествовать. • Желание пожевать. • Трудности с концентрацией внимания при письме. • Росомеха. • Жадность. • Тоска по дому. • Сироты; чувство покинутости. • Беспокойство из-за зубной боли. • Подпрыгивания во сне, особенно в полночь. • Громкий разговор во сне. • Застенчивость.	Дух • Жалобы: возражение. • Тревожность у маленьких детей; ночью. • Гнев: бросает вещи, когда не получает желаемого. • Отвращение к ласкам. • Проблемы с поведением: оскорбления, пинки, вызывающее поведение и удары. • Не могу выносить, когда на меня смотрят. • Унылость. • Трудности с концентрацией внимания при чтении. • Желание, чтобы тебя несли. • Страх: приближаться к другим, к людям. • Жесты: кладут пальцы в рот или топают ногами. • Безутешно. • Раздражительность во время прорезывания зубов. • Стон: Жалко. • Беспокойство облегчалось только тогда, когда его носили на руках. • Плач: Во время прорезывания зубов и колик.
Голова • Бьется головой о стену, особенно во время сна. • Открытые роднички с запавшим затылком. • При рвоте пот выступает на лбу, на затылке.	Голова • Пот: влажный, горячий, во время сна, кислый. • Теплое укутывание головы усиливает боль. • Мытье головы ухудшает ситуацию.
Нос • Постоянная тенденция сморкаться. • Заложенность носа при пробуждении. • Изменение цвета на красный.	Нос • Насморк при ларингите.
рот • Откройте рот, когда у вас простуда. • Зубы чувствительны и болезненны на ощупь. • Зубная боль: усиливается при перемене погоды, от холодной воды и стискивания зубов; облегчается в положении лежа на больной стороне.	рот • Зубная боль: с непроизвольным слюноотделением; хуже от эмоционального возбуждения, например, гнева, от переохлаждения после перегрева, в положении лежа на здоровой стороне; лучше от холодной воды во рту.

МАГНИЙ КАРБЕНИКУМ	РОМАШКА
желудок • Рвота: После супа; от свернувшегося и непереваренного молока. • Ухудшение: капуста и выпечка. • Отвращения: хлеб с маслом, грудное молоко, овощи, особенно зеленые. • Желание: деликатесы.	желудок • Боль: усиливается после завтрака, после кофе, перед приступом кашля, от прикосновения. • Обострение: кофе, сладости, теплые напитки. • Отвращение: к еде, особенно после перекуса, супа, горячей пищи и напитков. • Пристрастия: Холодная пища.
живот • Боль: колики после молока и после поноса; лучше, если свернуть себя калачиком.	живот • Боль: после гнева, после кофе, от холодных напитков; коликообразная боль, облегчающаяся от теплых компрессов, но не облегчающаяся от надавливания.
прямая кишка • Диарея: После искусственной пищи, после молока. • Стул: Зеленый, как пена на пруду с лягушками; твердый стул сменяется мягким, крепким и обильным стулом.	прямая кишка • Диарея: у младенцев; усиливается при движении вниз, испуге, после сырой пищи или после употребления холодной пищи. • Стул: Зловонный, как тухлые яйца; зеленый, как маленькие кусочки шпината или рубленые яйца.
Спать • Бессонница из-за волнения, особенно после полуночи.	Спать • Бессонница у новорожденных, младенца приходится носить на руках. • Спит, поджав или вытянув ноги.
Общий • Потеря веса: в случаях диареи; у младенцев; при сильном голоде. • Кислый запах тела.	Общий • Простуда улучшает состояние. • Сбрасывает все одеяла. • Прикосновение к чему-либо ухудшает ситуацию. • Слабость, особенно изнурительная,

MAGNETIS POLI AMBO

(Магнит - М-амбо.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Рассеянный и мечтательный.
- ▶ Сильное желание молока.
- ▶ Чрезмерный голод, но очень быстрое насыщение.
- ▶ **Фимоз, парафимоз и паховая грыжа.**
- ▶ Поза для сна: руки на животе, руки под головой или на спине, колени и локти согнуты или колени разведены.
- ▶ Позднее пробуждение.
- ▶ Хуже всего — когда просыпаешься утром.

Источник

в гомеопатию Ганеманом, но ошибочно объявлен нозодом доктором Х. К. Алленом .

MAGNETIS POLUS ARCTICUS

(северный магнитный полюс - М-аркт.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Чувствительный и сдержанный.
- ▶ Нервные дети, которые откладывают дела, если они кажутся опасными или трудными.
- ▶ Поспешно, вечно в спешке.
- ▶ Застенчивые и нежные дети, ленивые и допускающие ошибки при письме.
- ▶ **Грыжи живота или болезненные паховые грыжи.**
- ▶ Лунатизм.
- ▶ Положение для сна: на спине или на боку.
- ▶ Склонность к простудам.
- ▶ Тяжелая реакция на гомеопатические средства.

Источник

- Введен в гомеопатию Ганеманом.

MAGNETIS POLUS AUSTRALIS

(южный магнитный полюс - М-австр.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Непредсказуемые, капризные дети, никому не позволено их трогать.
- ▶ Сильное отвращение к обществу и очень сварливый характер. Чувствует себя нелюбимым и брошенным, поэтому сварлив и недоволен.
- ▶ Сильное отвращение к молоку.
- ▶ **Паховая грыжа, грыжи брюшной стенки и опущение яичек.**
- ▶ Внезапные позывы к мочеиспусканию, приходится бежать в туалет, иначе моча вытечет.
- ▶ **Ночное недержание мочи.**
- ▶ **Вросшие ногти на ногах.**
- ▶ Болезни роста.
- ▶ Проснулся в шоке.
- ▶ Спит, положив руки под голову.

Источник

- Введен в гомеопатию Ганеманом.

МАЛАНДРИНУМ

(Лихорадка лошадей - Маланд.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Постоянно играет со своими гениталиями.
- ▶ Многочисленные прививки, но с тех пор так и не стал по-настоящему здоровым.
- ▶ Истощение вакцинированной части тела.
- ▶ Инфекционные заболевания, такие как **корь и ветряная оспа**.
- ▶ Агрессивные выделения, особенно стул, дыхание и пот ног.
- ▶ Импетиго.
- ▶ Акне при жирной коже лица.
- ▶ Нездоровая кожа; сыпь трудно поддается лечению.

Источник

- Это средство от экземы пястей лошадей было введено в гомеопатию доктором Босковицем из Бруклина, Нью-Йорк, США.

МАНЧИНЕЛЛА

(Манхинелловое дерево - Mane.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Дети, которые испытали **страх и ужас** , видели ужасные фильмы, слышали страшные истории или смотрели пугающие сериалы по телевизору; сильный страх по ночам, страх перед инопланетными существами, страх остаться одному в темноте, страх быть захваченным дьяволом, страх перед злом, страх перед привидениями, страх того, что что-то случится, страх перед монстрами и страх оказаться в замкнутом пространстве.
- ▶ Чрезмерное родительское доминирование.
- ▶ Слабовольный и слабоумный, но не тупой и глупый, как Бар-к.
- ▶ Слабость ума с неконтролируемыми мыслями; навязчивые идеи, от которых невозможно избавиться.
- ▶ В крайних случаях — слуховые и зрительные галлюцинации. Они постоянно борются с этими тревожными или обсессивно-компульсивными расстройствами и боятся однажды заболеть психически.
- ▶ Неуклюжее поведение, роняет предметы из рук.
- ▶ Большинство симптомов проявляются в период полового созревания.
- ▶ Желание соленой пищи и холодных напитков.

Источник

- Также называется *Hippomane mancinella*, принадлежит к семейству молочайных (Euphorbiaceae).

МЕДОРРИНУМ

(Гонорея нозод - Мед.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

РАЗУМ И КОНСТИТУЦИЯ

- ▶ **следящие за своей внешностью** , которые любят укладывать волосы особенно стильно или модно, которые активно пользуются дезодорантами, духами и лосьонами для тела и предпочитают носить дорогую дизайнерскую одежду, например, от Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Lacoste и т. д.
- ▶ Дети из семей, родители и/или бабушки и дедушки которых болели гонореей (**Agn, Nat-s., Thuj.**), **которую подавляли** аллопатическими препаратами (Cann-s., Canth., Sars., Thuj.).
- ▶ Дети из семей, где наблюдается строгое воспитание и **угнетение** (Anac., Carc., Naja., Lys., Sep.) , **насилие** (Carc., Hyos., Lac-c., Lyss., Nat-m., Sep.) или сильная **дисгармония** между родителями (Graph., Lach., Mag-m., Nit-ac.).
- ▶ Дети, родители которых имеют в анамнезе следующие заболевания:
 - Рак (Brom., Calc-ar., Carb-an., Carc., Con., Cund., Being, Trif-p.).
 - Хронический оофорит.
 - Хронический сальпингит.
 - Синдром Дауна.
 - Подагра (Calc., Lys.).
 - Невралгии, такие как ишиас, невралгия тройничного нерва.
 - Параметрит.
 - Ревматизм (Sep.).
 - Ревматоидный артрит.
 - Миомы.
- ▶ Раннее социальное и интеллектуальное развитие, иногда также задержка физического развития. **Интеллектуальное раннее развитие** проявляется в нетерпении и желании всё исследовать, жажде приключений и тоске по обществу (Филип Бейли: Aug., Calc-p., Lach., Verat.).
- ▶ У младенцев, малышей и детей младшего возраста либидо развивается рано, и они испытывают влечение к своим гениталиям. Они начинают непроизвольно мастурбировать, исследуя их. **Мастурбация в раннем возрасте становится чрезмерной.** Молодые девушки-медики очень чувственны и любят флиртовать с мальчиками. Им нравится трогать гениталии друг друга и заниматься взаимной мастурбацией. В подростковом возрасте у молодой женщины-медика может уже быть полноценный сексуальный роман с мужчиной. Дети-медики влюбляются легко, быстро и страстно (Филип Бейли).
- ▶ Телосложение: бледное, рахитичное; умственно отсталое и слабое.
- ▶ Желание **свежего воздуха** (Carbo-veg., Lys., Puls., Sulph.).
- ▶ **Безграничная энергия** (Tar., Merc-sol., Tub.).
- ▶ Очень **любопытны** (Aran-ix., Lach., Phos., Sulph., Verat.) и чрезмерно усердны, что может вызывать головные боли у окружающих.

- ▶ Бесстрашные (Agar., Ign., Op.) во всех своих действиях, почти никогда не робеют; они могут есть, разговаривать и находиться с совершенно незнакомым человеком без каких-либо проблем; малыш идет ко всем.
- ▶ Ощущение, будто кто-то стоит позади него в темноте (Anac., Calc., Crot-c., Ferr., Lach., Sanic.).
- ▶ Свободная, раскрепощённая натура детей (Bell., Nux-v., Sulph.); любят всё делать самостоятельно.
- ▶ **Нетерпеливые дети** (Cham., Ign., Ipsec., Sep.) , которые не могут стоять в очереди или не могут дождаться, пока еда будет подана на стол.
- ▶ У многих детей с психическими расстройствами отсутствуют идеалы или цели в жизни; этот дефицит становится особенно выраженным, когда они испытывают эмоциональные нарушения (например, в период полового созревания) или когда они сталкиваются с употреблением алкоголя и наркотиков.
- ▶ С миазматической точки зрения у детей Med. не наблюдается полной сикотической картины, как у Thuja, а скорее туберкулезные черты с оттенком сикоза.
- ▶ Они ненавидят ограничения, правила и указания и отвергают любую власть (Merc., Nat-m., Tub.).
- ▶ Им нравится дразнить животных и маленьких детей, например, пнуть друга во время игры в футбол или бейсбол, тянуть кошку за хвост, столкнуть друга в воду или бросить собаку в пруд.
- ▶ Плохая память; не может вспомнить имена (Anac., Chlor., Euon., Guaj., Lys., Sulph.), слова или начальные буквы; **вынужден спрашивать имя своего лучшего друга**; забывает даже собственное имя (Alum, Cic., Kali-br., Sulph., Valer.); плохо пишет (Helo-s., Lach., Lys.); не может понять, как пишется известное имя; ребенок постоянно теряет нить разговора (Calc-sil., Lys., Tarent.).

Тело

- ▶ **Артритические или ревматические боли** у маленьких детей как результат **подавленной гонореи** у родителей.
- ▶ **Рыбный запах выделений** (Ol-an., Teil., Sanic.).
- ▶ **-за сильного жара** ребенок бродит по дому и саду полураздетым; ему нравится свежий воздух в комнате или вентилятор; ночью ребенок сбрасывает одеяло.
- ▶ У детей, получающих такие препараты, как Nat-s., Kali-s., Arg-n., Sep. для лечения заболеваний дыхательных путей, таких как бронхиолит или астма, почти всегда необходима промежуточная доза Med.
- ▶ **Они любят море и побережье** (Caac.). Дети, нуждающиеся в медикаментозном лечении, с удовольствием плавают, поскольку не могут подавить свою сильную потребность в воде. Они также лучше себя чувствуют во влажном климате (Caust., Nux-v.).

- ▶ **Новорожденным и младенцам удобнее лежать на животе** (Bell., Chel., Coloc., Podo., Stann.).
- ▶ **Новорожденные, которые спят весь день и активны ночью** (Сиф. - новорожденный много плачет ночью без причины).
- ▶ Может быть прохладным (10%) или теплым (90%).
- ▶ Дети чрезвычайно чувствительны к туманной (Аран., Гипер., Рус-т.) и влажной погоде.
- ▶ Дети с общим пониженным тонусом и постоянной усталостью, у которых тщательное систематическое обследование ничего не выявляет (Alum., Calc-p., Gels., Kali-p., Phos-ac., Zinc.).
- ▶ Хронические катаральные заболевания, особенно дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей, с обильными, резкими выделениями и зудом.
- ▶ **Карликовый, отстающий в росте**, напоминающий Bar-c., Calc-p. и Syph.
- ▶ **Никогда больше не был здоров с момента последней прививки** (Maland., Merc., Sars., Sil., Sulph., Thuj.), с такими заболеваниями, как нейродермит, крапивница, экзема и в целом со сниженной иммунной защитой.
- ▶ Нарушения функции гипофиза, такие как болезнь Симмондса, характеризующаяся гипогонадизмом, отсутствием вторичных половых признаков, акромегалией (Bar-c., Carc., Pitu., Pitu-gl., Thyр.), гигантизмом, синдромом Сотоса, кретинизмом.
- ▶ **Рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей** у детей младшего возраста (Apis, Asaf., Borx., Caps., Lach., Lyc., Sars., Sep., Tub.) с органической причиной в мочевыводящих путях или без нее.
- ▶ Улучшение: **лежа на животе**; свежий воздух; укрываясь (Iod., Lyc., Puls.); энергичное растирание (Rad-br.); **у моря** (Acon., Aq-mar., Borx., Brom., Carc., Iris, Sulph-ac.); влажная погода; **закат солнца** (Alum., Coca., Lil-t., Sei.).
- ▶ Хуже: **сырая погода**, холод; **днем** (Alum., Euphr., Ferr., Sang., Stann., Sep., Sulph.); 3-4 часа утра; после мочеиспускания (Coloc., Merc., Thuj.); прикосновения (Ant-t., Cina); закрытых помещений (Alum., Arg-n., Just., Tub., Vib.); при мысли о неприятностях (Caust., Gels., Ox-ac., Oxyt., Pip-m., Ran-b., Sabad., Spong.); жары; солнца; гроз (Bry., Lach., Nat-c., Phos., Rhod., Sep., Sil.); малейшего движения; потоотделения; растяжения (Cham., Plat., Puls., Ran-b., Rheum.); наклона головы вперед; Ванны в соленой воде (Ars., Mag-m., Mur-ac., Rhus-t., Sep., Zinc.).
- ▶ Когда правильно подобранные средства не обеспечивают облегчения или длительного улучшения симптомов у ребенка, особенно в случаях
 - аллергические реакции на **животных** (респираторные и кожно-сосудистые);
 - аллергическая реакция на **пищевые продукты** (поражающая желудок и кожу);
 - аллергическая реакция на **растения** (респираторная и кожная);
 - бронхиальная астма;
 - ювенильный ревматоидный артрит;
 - нефротический синдром.

Med. — гигант среди сикотических средств. Он очень похож на Thuji., Nat-s., Arg-n., Tub. и Tarentum.

Другие важные симптомы

Дух

- **Грызть ногти** (Arum-t., Bar-c., Brom., Carbo-veg., Carc., Plb., Verat.), покусывать пальцы (Acon., Arum-t., Carc., Stram.), руки (Acon., Arum-t., Hura, Op., Plb.) и всё остальное.
- Не может говорить без слез (Kali-c., Puls., Sep.).
- Ребенок всегда торопится, когда что-то делает (Dulc., Merc., Sil., Sulph-ac., Tarent.); но в конце концов эта спешка утомляет его (ср. Merc., который торопится, но никогда не устает).
- Дети, глубоко проникшие в сферу фантастики и мистических прозрений, часто носят определенный тип одежды или модные амулеты, кольца, браслеты, серьги и т. д.
- Дети из семьи, где один из родителей постоянно обвиняет их и не способен понять чувства ребёнка; в результате ребёнок иногда замыкается в себе или ищет убежища в мире фантазий, интуиции и воображения. [*Разум; бредовые идеи — нереальность — всё кажется нереальным*]
- Дети, которым необходим Med., преуспевают в спорте, учебе, искусстве, они - красноречивы и изобретательны в повествовании (Lach., Lyc., Nux-v., Sulph.).
- Я очень хочу получать разнообразный опыт, независимо от того, приемлем он в обществе или нет. Мне нравится исследовать мир в молодости. Мне нравится пробовать новые отношения, один за другим, часто с совершенно разными людьми.
- У маленьких детей клиническая картина варьируется в широких пределах: от интровертной до экстравертной, от дружелюбной до жестокой, от тупой до интеллектуально-интуитивной, от эмоционально открытой до замкнутой и изолированной.
- Необычайно **страстные** (Carbo-veg., Lach., Nux-v.) и **полные энтузиазма** (Carc., Lach., Merc., Nux-v., Plat., Stram.) дети, которым нравится жить полной жизнью.
- Страх смены школы, переезда, а также любого вида спорта или игры (Arg-n., Calc-sil., Lyc.).
- **Они очень чувствительны к событиям до того, как они произойдут, и обычно их интуитивное восприятие оказывается верным** (Acon., Anh., Crot-c., Phos.).
- **Хорошее понимание** (кофеин, лактат, подавление, фразировка), хорошие способности в учебе, часто пользуется одинаковой популярностью у учителей и одноклассников.
- Хорошо пишет эссе благодаря своему богатому воображению (соч.).
- Дети Мед известны своим **непослушанием** (Caust., Merc., Plb., Tarent.), особенно когда им дают разумные советы (Bell., Carc., Ign., Phos., Plat.).
- В своей необузданности, нетерпении и спешке дети Средиземноморья могут вызвать состояние, которое обычно описывается как паническая атака; в таком случае их настроение полностью выходит из-под контроля.
- **Оптимистичные дети** (Calc., Sulph., Tub.), которые готовы учиться на любом опыте и хотят расширить свои горизонты в жизни; они не теряют надежды до конца.

- Хорошо декламирует стихи, владеет устной речью, поэтому часто получает награды.
- Склонность выглядеть «отсутствующим», забывая простые слова, не имея возможности построить обычные предложения или не в состоянии запомнить только что сказанное. Такие дети часто возвращаются домой из школы, совершенно забыв, что им нужно было делать.
- Склонность видеть лица в темноте, связанная с яркими фантазиями (Phos., Stram.).
- Ребенку очень трудно описывать свои симптомы; гомеопату часто приходится повторять свои вопросы.
- Девочки хотят обнажить свою грудь и бедра уже в самом раннем возрасте и поэтому носят мини-юбки и топы с глубокими вырезами (Hyos., Phos., Tarent.); это делается главным образом для того, чтобы казаться привлекательными для мальчиков.
- Дети среднего возраста — совы. В этот период их уровень энергии повышается, и они постепенно переходят от рационального к более спонтанному и романтическому настроению. В этот период дети значительно более креативны и артистичны и могут легко завершить школьные проекты без особых умственных усилий (Филип Бейли).
- Дети раздражительны днём, но с наступлением ночи становятся очень активными (Lyc.), весёлыми (Caust., Cypr., Verat.) и хотят играть всю ночь напролёт. «Угрюмые днём, весёлые ночью; хотят играть». (HC Allen, Materia Medica of Nosodes).
- маленьких детей есть привычка сжимать **руки в кулаки** (Hyos.).

Голова

- Головные боли у школьников (Calc-p., Nat-m., Ph-ac.), усиливающиеся при чтении (Calc., Plat., Sep., Tub.), при простуде (All-c., Chlor., Lyc., Merc.), от света, удара, солнца; **сводящие с ума боли**, блуждающие боли; боли во лбу и затылке.
- Движение головы в стороны, **покачивание головой из стороны в сторону для облегчения боли** (Agar., Cina).
- Результаты теста:
 - Перхоть с зудом.
 - Голова откинута назад (Cic., Cypr., Tax.).
 - Кожные высыпания, покрытые корками, струпьями, влажные (Anan., Bar-c., Graph., Olnd., Psor.), разрушающие волосы (Dulc.).
 - Волосы: выющиеся (Mez.), сухие (Calc., Iod., Plb., Thuj.), свободные (Ph-ac.), жирные (Caust., Nat-m.), тусклые (Arn., Canth., Jab., Thuj.) и густые; всегда выглядят нечесаными.
 - Воспаление лобных пазух.
 - Большая голова (Calc., Calc-p., Sil.).
 - Вращение головой (Bell., Stram., Sulph., Tarent., Tub.); **потирание головы о подушку всякий раз, когда возникает головная боль или дискомфорт**.
 - Tinea capitis (стригущий лишай головы) (Bac., Brom., Dulc., Graph., Part.).
 - Взьерошенные волосы.

ГЛАЗА

- Диплопия.
- Выпадают ресницы (Rhus-t., Staph.).
- **Уплотнение на верхнем веке.**
- Воспаления глаз: хронические (Ars., Calc., Hep., Phos., Sil.), артритные (Ant-t., Form., Phyt.), конъюнктивиты (All-c., Apis, Euphr., Rhus-t., Sulph.), блефариты (Arg-met., Carbn-s., Petr., Teil.).
- **Кажется, что ребенок пристально смотрит на все вокруг.**
- **Боль, словно глаз вырывают, когда он закрыт.**
- Ощущение выпячивания глаза (Bry., Eupi., Par., Scut.).
- Зрение: Предметы кажутся маленькими (Glon., Hyos., Merc-c., Plat., Stram.); перед глазами появляются коричневые цвета (Agar., Bell., Lac-c.).
- Результаты теста:
 - Липкий пот по утрам (Arg-n., Calc., Clem., Rhus-t.).
 - Астигматизм (Lil-t., Tub.).
 - Вытянутые наружу (Aloe, Crot-c., Lach.).
 - Мечтательный взгляд.
 - Панофтальм у новорожденных (Hep., Iod., Phyt., Rhus-t.).
 - Паралич верхнего века (Caust., Gels., Nit-ac., Rhus-t., Sep., Spig.).
 - Светобоязнь.
 - Коростные высыпания на веках (Ars., Graph., Merc., Sep., Thuji.).
 - Стриктур слезного протока (Abrot., Nat-m., Puls., Rhus-t., Sil.).
 - Ячмень (Carbn-s., Con, Puls, Staph).
 - Отек век; верхнего века (Apis., Kali-c., Puls.); под веками (Apis, Ars., Hep., Kali-c., Phos.).
 - Изъязвление роговицы (Apis, Brom., Calc., Euphr.).

УШИ

- Хронический средний отит (Bar-m., Hydr., Iod., Merc-d.), особенно левого уха (Spig., Sulph.).
- Врожденная глухота.
- Частичная или временная глухота вследствие хронического среднего отита (Asar., Calc., Kali-m., Kali-s.).
- Нарушение слуха из-за увеличенных миндалин (Agra., Kali-bi., Staph.).
- **Боль, хрящевые части уха болезненны при лежании на них.**
- Результаты теста:
 - Сыпь за ухом: трещины (Graph., Hydr., Syc-co.), экзема (Graph., Lyc., Mez., Olnd., Psor., Tub.).
 - Отверстие для серьги воспалено и изъязвлено (Ars., Lach.).
 - Опухоль уха.

Нос

- Хронический ретроназальный катар у детей.
- Насморк облегчается от купания в море; выделения белые, желтоватые, желтовато-зеленые, кровянистые, зловонные, вонючие, густые.
- Конгестия, особенно у корня носа (Ars., Elaps, Kali-i, Mur-ac., Par., Sin-n., Stict.), хоан (Calc-s., Petr., Rhod., Stann.).

- Постоянно трёт нос, особенно кончик носа (Cina, Napht., Sil.).
- Результаты теста:
 - Холодность кончика носа (Apis, Calc-p., Camph., Cedr., Tab.).
 - Грязные, черные ноздри (Ant-t., Chlor., Colch., Hell., Zinc.).
 - полипы.
 - Насморк у детей (Lyc., Nux-v., Samb.).
 - Вздутый.

РОТ

- Учащенное дыхание через рот.
- **Высовывание языка облегчает состояние при астме.**
- Рецидивирующие афты на языке, маленькие и болезненные (Borx., Merc-су., Mur-ac., Sul-ac., Sulph.).
- Результаты теста:
 - Прикусывание языка во время сна (Phos-ac.).
 - Кровоточивость десен (Bov., Carbo-veg., Merc., Phos., Sep.).
 - Зубы: кариес, полые зубы (Ant-c., Fl-ac., Kreos., Merc., Mez., Staph.), дырки между двумя центральными верхними резцами, крошащиеся (Calc-f., Calc-p., Plb., Staph., Thuj.), зазубренные края (Bac., Lach., Plb., Syph., Tub.), мягкие (Alum., Calc-p., Caust., Nit-ac., Nux-m.).
 - Пена у рта во время судорог (Art-v., Bufo., Ind., Oena., Op.).
 - Неприятный запах изо рта (Ars., Carbo-veg., Kreos., Merc.).
 - Кладет пальцы в рот (Calc., Cham., Ipec., Sacch.).
 - Рецидивирующие абсцессы десен (Bar-c., Calc., Caust., Hep., Lyc., Sil., Sulph.).
 - Во время сна изо рта выделяется вязкая слизь.
 - **Язык коричневый и толстый;** густо обложенный (Auran., Bapt., Colch., Gels., Podo.); вялый (Camph., Hydr., Merc., Ph-ac., Sep.); со следами зубов (Ars., Chel., Merc., Rhus-t., Sep.); географический язык (Bac., Graph., Lach., Nat-m., Tarax.).
 - Тремор языка (Agarin., Camph., Lach., Merc., Op.).
 - Язвенный стоматит (Astac., Kali-i., Nux-v., Sulph.).
 - Липкая слюна (Chel., Kali-bi., Lach., Lyss., Merc., Merc-c.).
 - Желтушность зубов (йод, ликопин, кремний, туя) у детей, получавших большие дозы антибиотиков в младенчестве и грудном возрасте; также **желтушность зубов после еды.**

Лицо

- Угловатое, широкое лицо, прямой нос, полные (Bar-c., Bufo, Op., Syph.) и чувственные (Bufo, Plat.) губы, длинные ресницы (Phos., Tub.).
- Выпадают ресницы (Ars., Calc-s., Rhus-t., Sei., Staph., Sulph.) и брови (Agar., Anan., Bell., Nit-ac., Sei.).
- Результаты теста:
 - Угри перед менструацией (Graph., Mag-m., Psor., Sep.) у молодых девушек.

- Лицо покрыто угрями и веснушками (Lyc., Phos., Sulph.).
- Болезненное пятно от лихорадки на нижней губе (Ars., Ign., Nat-m., Rhus-t., Sulph.).
- Жирные (Nat-m., Rhus-t., Thuj., Tub.).
- Бледные губы (Ars., Ferr., Kali-ar.).
- Потливость во время сна (Prun., Sep., Tab.); на верхней губе (Acon., Coff., Kali-c., Nux-v., Rheum.).
- Выщипывание губ (Arum-t., Bry., Lach., Nit-ac.).
- **Красные сосудистые звездочки** на лице.
- **Толстые губы из-за дыхания через рот.**
- Восковой (Apis, Ars., Phos., Sep., Sil.), бледный.

ШЕЯ

- **Приступы удушья вследствие спазма надгортанника .**
- Воспаление.
- Слизь скапливается в хоанах.
- Результаты теста:
 - Увеличенные миндалины.
 - Постоянно заполнены густой серой слизью из хоан (Hydr.).
 - Густые желтые выделения из ретроназальной полости.
 - Удлиненные суппозитории (Bar-m., Crot-t., Hyos., Kali-i.).

ЖЕЛУДОК

- Отвращения: холодные напитки, холодная пища, **баклажаны**, бамия (Calc., Caust., Cob., Nat-m., Puls., Zinc.), соль, **слизистая пища** (Calc., Calc-pic., Nat-m.), сладости.
- Постоянная жажда ледяной воды (Sil., Verat.); **жажда настолько сильна, что ребенку снится, что он пьет воду**; сильнейшая жажда, особенно во время лихорадки; неутолимая жажда.
- Пристрастия: Газированные напитки (Nat-c., Ph-ac., Phos., Sulph.), сыр, шоколад, кофе (Ang., Bry., Sei., Sep.), утка (Phos.), жирное (Calc-p., Nit-ac., Nux-v., Sil.), жирное и соленое, жирное и сладкое, сыр фета (Calc-n., Ign., Puls., Sulph.), рыба; Картофель фри (Calc., Carc., Puls., Tub.), незрелые фрукты (Calc., Calc-s., Lepi., Lept.), мороженое (Calc., Elaps, Nat-s., Verat.), мороженое (Bung-fa., Calc., Phos., Sil., Sulph.), сочные фрукты (Ant-t., Ph-ac., Sabin., Verat.), лимоны (Bell., Merc., Sabad., Thea., Verat.), апельсины (Cub., Elaps, Lyc., Olnd., Sol-t-ae., Ther.), пападам (Ars., Chin., Mag-p, Merc., Nux-v.), пицца (Calc-p., Gaert., Nat-m., Phos., Puls., Tub.), картофель (Calc., Calc-p., Nat-c., Nat-m., Ol-an., Olnd., Puls., Tub.), сырой лук (All-c., Cub., Sabad., Staph., Thuj.), сальса (Nux-v., Tub.), соленая и сладкая пища, соленая пища (Arg-n., Carbo-veg., Lac-c., Nat-m., Phos., Verat.), кислая пища (Acon., Cor-r., Hep., Verat.), сладости, теплые напитки (Ars., Bry., Lac-c.).
- Тошнота после питья воды (Acon., Cocc., Op., Phos.), после еды (Am-c., Cocc., Nux-v., Puls., Sep.); сильная рвота (Ant-t., Ars., Verat.).
- **Боль усиливается при сгибании ног.**
- Волчий голод; голод сразу после еды (Cina, Lyc., Psor.); усиление **голода в полночь.**

- Ухудшение: мясо (Bry., Colch., Ptel., Rumx.); апельсины (Arg-n., Old., Syc-co.); апельсиновый сок (Androc., Scor.); сладости (Arg-n., Граф., Игн., Сей.).
- Результат теста:
 - Рвота черной (Ars., Cadm-s., Nux-v., Phos., Verat.), прозрачной слизью (Arg-n., Ars., Iris, Jatr., Kali-bi., Verat-v.), вязкой (Cor-r., Kreos.).

ЖИВОТ

- Колики у новорожденных.
- Результаты теста:
 - Асцит.
 - Врожденный детский цирроз.
 - Выделения из пупка (Abrot., Calc., Calc-p., Kali-c., Lyc.).
 - Большой живот у детей (Bar-c., Calc., Psor., Sanic., Sars., Sil.).
 - Печень увеличена (Chin., Lyc., Mag-m., Nat-s., Nux-v.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- Детская холера (Aeth., Guaj.).
- Запор: у новорождённых (Alum., Nux-v., Op., Sulph., Zinc.); **ребёнок может дефекаль, только сильно наклонившись назад; стул** затруднённый, стул проскальзывает назад (Lac-d., Op., Sanic., Sil., Thuj.); даже при мягком стуле необходимо натуживание (Alum., Nux-m., Op., Plb., Sanic., Sep., Sil.). Стул плотный; как шарики (Lach.), как глина (Calc., Lac-c., Podo., Sil.); вялый, не может натужиться из-за ощущения выпадения ануса (Alum.).
- Понос рано утром (Aloe, Nat-s., Nuph., Podo., Psor., Rumx., Sulph.), с напряжением ожидания (Aeth., Arg-n., Gels., Ph-ac.), желчный (Asc-t., Nat-s., Podo.), при прорезывании зубов (Calc., Cham., Dulc., Ferr., Rheum., Sil.), хуже от молока (Calc., Mag-m., Nat-ar., Nat-c., Sep.). Стул кровавый, рваный (Calc., Cham., Kreos., Rhus-t.), цвета глины (Calc., Hep., Nat-s.), творожистый (Calc., Nit-ac., Rheum., Sanic., Valer.), хуже от поездки на поезде.
- Сильный зуд в заднем проходе.
- **Боль во время дефекации — это кошмар: она настолько сильная, что на глаза наворачиваются слезы.**
- Результаты теста:
 - Анальная экзема с сильным зудом (Nit-ac.).
 - **Анус красный как огонь.**
 - **Сыпь вокруг ануса у новорожденных, особенно после подмывания.**
 - Болезненность промежности (Calc., Carbo-veg., Graph., Lyc., Merc., Sulph.).
 - Зловонные газы.
 - Из ануса сочится влага, неприятный запах рыбного рассола (Caust., Hep.).
 - Выпадение прямой кишки.
 - **Сыпь на заднем проходе и промежности у новорожденных.**
 - Черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Не может долго удерживать мочу, моча окрашивает подгузники в грязно-коричневый цвет.
- Рецидивирующий цистит у детей, которые чрезмерно мастурбируют.
- Хронический цистит (Cann-s., Sep., Tub.) у молодых девушек.
- Хронический нефротический синдром, резистентный к назначению конституциональных средств.
- Нефрит, гломерулонефрит, камни в почках.
- Склонность к образованию камней в почках или другим заболеваниям почек у детей раннего возраста; почечная колика характеризуется сильной болью в области почек, облегчающейся при обильном мочеиспускании (Lyc.); выраженным сопутствующим симптомом является желание льда.
- Постоянное недержание мочи в постель; огромное количество аммиачной и ярко окрашенной мочи каждую ночь в постели, хуже от игр, напряжения, сильной жары или холода (Caust., Dulc., Rhus-t.); показано, когда тщательно подобранные средства не облегчают недержание мочи или когда в семейном анамнезе имеется гонорея.
- Результаты теста:
 - **Огненно-красная промежность из-за резкой мочи.**
 - Моча: альбумин, цилиндры, сахар.
 - Моча вытекает очень медленно (Alum., Clem., Op.).

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Дети играют со своими гениталиями (Merc., Stram., Zinc.).
- Результат теста:
 - Затвердение яичек (Clem., Con., Rhod., Sil., Spong.).

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- **Хронические заболевания органов малого таза у детей раннего возраста, приближающихся к половому созреванию, особенно при наличии в - семейном анамнезе подавленной гонореи.**
- Зуд вульвы.
- Бели у молодых девушек (Calc., Cann-s., Merc., Sep.); зеленоватые, желтые, беловатые или похожие на грязную воду; зловонные; густые (Ars., Calc., Hydr., Kali-bi.); жидкие (Graph., Nit-ac., Puls.); обильные; оставляют желтые пятна на белье (Agn., Carb-ac., Carb-an., Kreos., Nux-v., Prun.); едкие (Bacillus, Morg-p., Morg-g., Syc-co.), вызывают жжение и зуд вульвы (Anac., Kreos., Sep.) и влагалища.
- Результат теста:
 - Бородавки (Calc., Lyc., Merc., Nat-s., Nit-ac., Sabin., Sars., Sep., Thuj).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Астматическое дыхание вследствие спазмов и слабости надгортанника .
- Ощущение удушья у новорожденного из-за слабости и спазмов надгортанника и гортани.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

- **Астма облегчается, когда пациент лежит на животе с высунутым языком, лучше в положении лежа на животе, в коленно-локтевом положении** (Carc.); хуже от сырой, холодной погоды (Ars., Dulc., Nat-s., Thuj., Verat.); **лучше у моря** (Brom., Carc., Syc-co.).
- Ребенок может хорошо вдыхать, но у него нет сил выдыхать (Самб.).
- Астма у маленьких детей, которая при отсутствии лечения правильными конституциональными средствами переходит в туберкулез легких.
- Астма у детей с сикотической болезнью в анамнезе.
- Астма усиливается **в 2 часа ночи** (Ambro., Ars., Kali-bi., Rumx.), **2-4 часа утра** (Kali-c.); **нуждается в стимуляции** (Carbo-veg., Lach.).
- Аллергическая астма, чередующаяся с ревматизмом (Dulc) или кожными - высыпаниями (Crot-t., Hep., Kalm., Psor., Sulph.).
- Дыхание хриплое, свистящее и хрипящее.

КАШЕЛЬ

- Постоянный кашель ночью (Anac., Calc., Con., Sep.); при отходе ко сну (Agar., Carbo-veg., Kali-c., Lach., Sulph.), пробуждает от сна (Caust., Phos., Sulph.); лающий; глухой, хриплый; глухой кашель, лучше сидя в постели (Nat-c., Phos.); сухой (Hyos., Spong.), непрекращающийся (Ign.); хуже ночью, **от употребления сладостей** (Spong., Zinc.) и конфет, в положении лежа, в теплой комнате (Bry., Coc-c., Kali-s., Puls.); **лучше в положении лежа на животе** (Alum., Bar-c., Caust., Phos., Podo., Rhus-t.); Очень болезненный кашель, словно гортань разрывается (All-c., Bell., Borx., Calc., Cist., Phos., Staph.); когда ребенок кашляет, кажется, что в груди скапливается большое количество мокроты.
- Мокрота: Небольшие зеленоватые шарики слизи, откашливаемые с трудом, студенистые (Alumn., Arg-met, Cact., Ferr., Samb.).

Грудь

- Грудь (Cham., Lac-c., Sil.) и соски (Arn., Caust., Lach.) новорожденного болезненны и чувствительны к прикосновению.
- Результаты теста:
 - Первичный комплекс.
 - Бронхоэктатическая болезнь у детей вследствие хронической астмы или рецидивирующей бронхопневмонии.
 - Зловонный пот в подмышечных впадинах (Hep., Nit-ac., Petr., Sil., Sulph.).
 - Туберкулез легких.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Поражение клапанов сердца вследствие ревматизма.

НАЗАД

- Пот в области шеи (Calc., Chin., Ph-ac., Sulph.).
- Чувствительный позвоночник.

КОНЕЧНОСТИ

- Легкое подкручивание лодыжек при ходьбе (Carb-an., Led.).
- Жжение кончиков пальцев (Sars., Sil., Sulph.).
- Жжение в руках и ногах; хотелось бы, чтобы их укрыли и обмахивали веером (Lach., Sulph.).
- Хронический артрит, хронический ревматизм.
- Болезненная скованность всех суставов тела.
- Ноги постоянно двигаются, когда сидишь (Lyc.).
- Ребёнок хотел бы размять ноги.
- Дрожание ног при ходьбе (Led., Puls.).
- Ребенок постоянно хочет, чтобы его носили на руках, так как он не может выдержать усилий при ходьбе даже на расстояние нескольких сотен метров, так как вся энергия рук и ног уходит на малейшее усилие .
- Результаты теста:
 - Сжимание пальцев в кулак (Apis, Ars., Cupr., Oena.).
 - Холодность стоп (Calc., Carb-c., Phos., Sil.) и кистей рук, особенно ночью (Aur., Bry., Phos., Sep., Thu.).
 - Трещины на кончиках пальцев (Aur-m., Graph., Petr., Sars.), на пятках (Arund., Lyc.).
 - Деформированные кисти рук, суставы, особенно суставы пальцев.
 - Повышенная **чувствительность пяток** (Jatr-c.) и подушечек стоп (Kali-c., Lyc., Merc-ir., Staph.), особенно у детей, много занимающихся спортом.
 - Волосатые руки.
 - Тепло в руках, ладонях и ступнях.
 - Затвердение пальцев
 - Большие опухшие лодыжки.
 - Болезненные мозоли (Agar., Ant-c., Calc-s., Iod., Nit-ac., Sulph.).
 - **Потливость ног усиливается зимой** (Arg-n.).
 - Беспокойные, суетливые ступни и ноги ночью и днем (Цинк.).
 - Опухшие лодыжки.

РЕВМАТИЗМ

- Холод в ногах, ступнях, кистях рук и предплечьях.
- Нижние конечности болят всю ночь, мешая спать (Kali-bi., Mez., Rhus-t., Syph.).
- Поясничной отдел позвоночника болезненный и чувствительный к прикосновению.
- Боль в ногах от бедра до колена (Кали-би., Сеп.) только при ходьбе.
- Боль в крестце, копчике и задней части бедер; боль распространяется вокруг конечностей и вниз по ним (Agar., Coloc., Pic-ac., Sep.).
- Ревматизм плеча (Colch., Ferr., Rhod., Rhus-t., Sulph.) и руки (Fern, Kalm., Rhus-t., Sang.); боль распространяется от руки до кончиков пальцев.

СПАТЬ

- **Прикусывает кончик языка во время сна** (Cic., Mygale., Ph-ac.).
- Может спать только на спине, положив руки на голову (Lac-c., Nux-v., Plat., Puls., Viol-o.).
- **Сны:** Ужасные; привидения; кошмары; змеи; **боли** (Asar., Bry., Cain, Cocc., Лус.).
- Положение для сна: колено-грудное; положение стоя на коленях, лицо прижато к подушке (Aeth., Petr., Sep.), свернувшись калачиком, на животе.
- Бессонница из-за зуда и боли.
- Пробуждение полностью отдохнувшим после короткого сна, как будто он был долгим (Fl-ac., Nux-v.); пробуждение от головокружения (Dulc., Kali-c., Nux-v., Phos., Sulph.).

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Отсутствие жажды при лихорадке (Apis., Gels., Puls., Sabad.).
- Хотел бы, чтобы меня обмахивали веером, когда у меня жар (углеводо-вегетарианство, смех), даже если поверхность моего тела холодная.
- Хочет прикрыться (Apis, Chin., Nat-m., Puls., Op.).

КОЖА

- Экзема у детей после подавленной бронхиальной астмы (Sulph.).
- **Крапивница, вызванная давлением одежды.**
- Результаты теста:
 - Чрезмерный рост волос, иногда в необычных местах (Thu.j., Thyr.).
 - Контагиозный моллюск (бородавки-моллюски).
 - Неви (Acet-ac., Fl-ac., Phos.).
 - Кожные разрастания и бородавки на ножке (Caust., Dulc., Nit-ac., Thu.j.).
 - Бородавки: нитевидные, на стебле, мягкие (Ant-c., Calc., Nit-ac., Sil., Thu.j.), заостренные.

ОБЩИЙ

- Лучше у моря (Borx., Carc., Iris, Nat-m., Sul-ac., Tub.) и хуже в горах.
- Холодный, липкий пот (Camph., Ph-ac., Verat.).
- **Симптомы обычно усиливаются от восхода до заката** (в противоположность сифилису).
- Дети Мед. чрезвычайно чувствительны к изменениям погоды, словно к «человеческому барометру» (Phos., Merc.).

МЕРКУРИЙ ЦИАНАТУС

(Цианид ртути - Мерс-су.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Это средство не проходило классических испытаний.
- ▶ Очень близок к Kalium chloricum.
- ▶ Запавшие глаза.
- ▶ Сильные носовые кровотечения, темно-черные, несколько раз в день.
- ▶ Слюнотечение, отёк языка и дёсен, почерневший, серый или молочно-белый язык. Слизистые оболочки рта покрыты язвами, которые чрезвычайно болезненны и превращаются в множественные язвы.
- ▶ Острая стрептококковая инфекция горла.
- ▶ Темный цвет горла, грязный, серый и красный; заложенность горла и миндалин, фолликулярное воспаление горла и миндалин, сероватая слизь из горла, боль в горле, распространяющаяся на ухо, сухость и болезненность в горле. По мере прогрессирования заболевания наблюдается сильное нагноение и экссудация из миндалин. Увеличенные и болезненные шейные лимфатические узлы.
- ▶ Быстрое начало и быстрое развитие боли в горле; сопутствующая слабость и потливость делают ребенка совершенно беспомощным.
- ▶ Лающий кашель, усиливающийся ночью.
- ▶ Отвращение к горячим и тёплым напиткам.
- ▶ Тяжёлые последствия вакцинации АКДС.

МЕРКУРИУС ДУЛЬЦИС

(Хлорид ртути - Merc-d.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Худой, изможденный и истощенный.
- ▶ Воспаление полости рта с язвами, неприятным запахом изо рта и слюнотечением.
- ▶ Губчатые десны, язык белый или грязно-желтый.
- ▶ Обильное, зловонное слюнотечение ночью и во время сна.
- ▶ Катар евстахиевой трубы, хроническое воспаление среднего уха, особенно слева; втянутая барабанная перепонка, потеря слуха из-за катара евстахиевой трубы; даже простуда приводит к потере слуха.
- ▶ Увеличенные, опухшие миндалины, особенно с правой стороны, боль отдает в уши при глотании.
- ▶ Аллергия на молоко, молоко в любой форме обостряет.
- ▶ Диарея во время прорезывания зубов или вследствие заражения кишечной палочкой.
 - ▶ Воспаление печени из-за вирусных инфекций, которое также может привести к желтухе.
 - ▶ При желтухе наблюдается толстый, расширенный, обложенный желтым налетом язык со следами зубов, тимпанит живота, болезненность в области печени и ее увеличение. Слюнотечение и зловонный запах изо рта. Светлый стул может содержать слизь. Тенезмы при дефекации.
 - ▶ Диарея, скудный, кровавый, темно-зеленый и водянистый стул с сильными спазмами; болезненность и жжение в анусе, постоянные позывы на дефекацию без тенезмов.
 - ▶ Амебная дизентерия; небольшое количество стула, состоящего из слизи и желчи, с примесью крови.
 - ▶ Большое количество круглых червей в стуле.

Источник

- Также известен как каломель, редкий минерал из класса галогенидов.

МЕРКУРИЙ СОЛЮБИЛИС

(Черный оксид ртути - Merc.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Агрессия** как немедленная реакция на **малейшее противоречие**; немедленно дает отпор в форме **оскорблений, деструктивности и ссор** (Androc., Crot-c., Lac-leo.) и все это **без какого-либо чувства вины** (Ars., Hep., Lach.).
- ▶ **Расстройства поведения** с агрессивным поведением и физическим насилием [*категории: вспыльчивость – деструктивность, деструктивная ярость, вспыльчивость – выдергивание волос; – желание выдернуть кого-то за волосы*], проступки, вплоть до опасного применения насилия [*категории: вспыльчивость – вызывающая и дерзкая*]. Типичные примеры из практики: – издевательства над другими.
 - Сексуальное насилие, включая изнасилование, в отношении другого ребенка (того же или противоположного пола).
 - Начинается с драк.
 - Запугивает других детей.
 - Жестокое обращение с животными.
 - В споре пускает в ход оружие, используя дубинку, кирпич, хоккейную клюшку, камни и т. д.
- ▶ **Синдром гиперактивности:**
 - **Беспокойство** в пальцах рук, ног и кистей (Caust., Tarent., Zinc.); желание дернуть кого-нибудь за волосы или нос на улице.
 - Постоянно бегать вокруг да около или делать гимнастику на всем подряд (Страм.).
 - Постоянно активный (торопливые движения) (Страм., Тарент.).
 - Ему трудно чем-то заняться в свободное время.
 - Часто меняет места в классе, не может долго усидеть на месте.
 - Слишком много говорит (смеется).
- ▶ **Расстройства контроля над импульсами:** неспособность противостоять импульсу, побуждению или искушению причинить вред другим или себе (проявляется в виде агрессии и навязчивого желания нанести удар ножом или совершить другие насильственные действия).
- ▶ **Независимые дети** (Bell., Nux-v., Sulph.), которые любят свободу, чего бы она ни стоила (Falco-pe., Haliae-lc., Lyc., Med., Tub.).
- ▶ **Оппозиционное, вызывающее поведение**, характеризующееся **сварливостью и спорами** с родителями, учителями и другими старшими; провоцирует или **отказывается** выполнять требования родителей или школьные правила, намеренно раздражает членов семьи, иногда **мстительно и злобно** (Anac., Caust., Cham., Cina, Lyc., Tarent.); не принимает авторитета или опеки со стороны родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек, администрации школы или учителей.

Как правило, такие дети избегают любого принуждения, демонстративно восставая против авторитетных фигур.

- ▶ **Ответственные** дети, которые очень добросовестно выполняют свои обязанности (Calc., Kali-c., Nit-ac.); они очень много работают и могут производить впечатление молодых трудолюбивых.
- ▶ **Беспокойные дети** (Acon., Vac., Jal., Rhus-t.), которые постоянно меняют положение, ворочаются в постели **и двигаются** (Bell., Calc-p., Cyp.); особенно **во время лихорадки** (Ars., Puls., Rhus-t.), во время **боли** (Acon., Cham., Plb.), во время **потоотделения** (Bry., Ign.) и во время **сонливости** (Hep., Stram.).

Тело

- ▶ **Ухудшается при колебаниях температуры**; чувствителен к холоду и жаре, легко простужается или перегревается.
- ▶ Детские **заболевания желез или золотуха** (кальций, кремний); лимфаденит, свинка, боль в горле или тонзиллит.
- ▶ **Дети с ослабленным иммунитетом** (Des-ac., Phos., Sarc., Syph., Tub-r.) со многими детскими инфекциями, такими как:
 - Амебный колит.
 - Бактериальная дизентерия.
 - Конъюнктивит.
 - Энцефалит.
 - Импетиго.
 - Инфекционный мононуклеоз.
 - Мастоидит.
 - Менингит.
 - Свинка.
 - Инфекция среднего уха.
 - Больное горло.
 - Сепсис.
 - Синусит.
 - Тонзиллит.
 - Коклюш.
 - Черви.
- ▶ Многие физические симптомы **усиливаются ночью** (сифилис), а также из-за **тепла в постели, сырой погоды**, промокания (дождя или даже мокрых пеленок) и **пота**.
- ▶ **Выраженная склонность к нагноению** (Anthrax., Calc-s., Galen., Phos., Sil., Staphyloc., Streptoc.).
- ▶ Заболевания костей и костных структур в виде воспалений, инфекций, некрозов, экзостозов и рака (Calc., Fl-ac., Ph-ac., Staph., Syph.).
- ▶ Детские онкологические заболевания, такие как лейкемия (Calc-p., Nat-ar., Nat-s.), лимфомы, саркомы (Crot-h., Kali-chl.) и т. д.
- ▶ Железы уплотняются, инфицируются, воспаляются, некротизируются и опухают (Ars., Bufo, Sil.).

- ▶ Слабость, упадок сил и истощение при малейшей нагрузке, особенно после дефекации.
- ▶ Выделения едкие, жгучие, гнилостные, зеленоватые или зеленовато-желтые, слизистые, густые или жидкие.
- ▶ Медленное заживление ран после любой травмы.
- ▶ Пожелтение глаз, зубов и выделений из носа; заболевания желчного пузыря, желтуха.

Другие важные симптомы

Дух

- **Предприимчивые** дети, с желанием деятельности, очень слабым страхом за себя и отсутствием чувства опасности (Агар., соч.).
- **Хвастовство** (Лyc., Med., Sulph.).
- **Дислексия**, характеризующаяся непродолжительной концентрацией внимания, из-за чего ему трудно сосредоточиться на учебе и письме; допускает ошибки в арифметике, чтении, говорении, путает слова и неправильно их произносит; неспособен к математике (Псор.).
- **Экстравагантный** (Bell., Op., Stram., Verat.).
- **Набивает карманы** всякой всячиной (Ars., Stram., Sulph.).
- Веселые и **подвижные** (Coff., Lach.) дети, которые любят петь и танцевать (Bell., Hyos., Ph-ac.).
- **Скороспелость** (Calc., Calc-p., Lach., Verat.).
- Сильные **лидерские качества** (Aur., Kali-c., Lac-leo., Lyc.).
- **Наркомания** у детей (Cham., Hyos., Lach., Op., Phos.).
- Не выполняют свои школьные обязанности, допуская постоянные пропуски занятий или плохие результаты на экзаменах, что в конечном итоге приводит к исключению из школы.
- **Вспышки гнева**; плюет людям в лицо (Bell., Cupr., Verat.) и на землю; возбужденный, упрямый, настырный до ярости.
- Предпочтение синему, небесно-голубому и темно-синему цветам, например, в одежде, велосипедах, школьных сумках, письменных принадлежностях и т. д.
- Ребенок сонлив в течение дня, но не спит ночью.
- Компьютерный вентилятор (Bufo, цинковый).
- Чрезмерный страх по незначительным причинам.
- Страх темноты, кошек (Bac., China, Tub.), собак, огня (Cupr., Stram.), друзей, за здоровье родителей, высотных зданий, уколов, грабителей, удушья и грозы.
- Грязный на физическом и ментальном уровне.
- Внутреннее ощущение спешки при замедленности действий.
- Любит игры или занятия, которые являются авантюрными (Falco-pe., Haliae-lc., Med., Tub.) или рискованными, где излишняя энергия преобразуется в скорость, поэтому он предпочитает такие игры, как катание на скейтборде или роликовых коньках (Buteo-j.), прыжки со стен; также любит играть с игрушечными машинками или кататься на быстрых автомобилях с родителями (Med., Tub.).

- Ворчливый и молчаливый, постоянно недовольный, ноющий и жалующийся.
- Заикание.
- У матери имелся явный анамнез испуга в первые месяцы беременности, о котором она забыла к моменту начала родов (Gels., Op.).
- Внезапные вспышки насилия и гнева у детей, с которыми обращаются несправедливо (Staph.).

Голова

- Головная боль усиливается ночью, при простуде, прорезывании зубов, от **сквозняков**, при пробуждении, от запора и при чтении (Nat-m.); уменьшается от внешнего давления и в положении сидя с руками на голове.
- **Чувствителен** к малейшему сквозняку (Bell., Chin., Sil.).
- Головная боль после травмы (Cic., Hyper., Nat-s., Staph.).
- Менингит с пульсацией во лбу (Bell., Glon.).
- Крики от боли из-за гидроцефалии.
- Результаты теста:
 - Голова **чувствительна к прикосновению**.
 - **Мокнущие высыпания** на коже головы, разъедающие волосы (Kali-bi., Nat-m., Rhus-t.).
 - **Жирная** кожа головы (Bry.).
 - Кефалгематома (Calc-f., Sil.).
 - Кровоизлияние в мозг (Both., Ipec., Op.).
 - Холодный пот на лбу (предательство).
 - Экзостоз головы (Aug., Phos.).
 - Выпадение бровей и ресниц.
 - Гидроцефалия; лежит с низко опущенной головой (Apis, Zinc.).
 - Открытые роднички (Calc-p.).
 - Вращение головой из стороны в сторону со стонами.

Глаза

- **Простуда распространяется вверх** от носа и поражает глаза.
- Чувствителен к **яркому свету огня** (Canth., Glon.).
- Все проблемы со зрением обостряются ночью.
- Дальтоник (Carbn-s., Santin.).
- Сильная светобоязнь.
- Результаты теста:
 - **Хемоз** (Apis, Eupr., Vesp.).
 - **Гипопион** [скопление гноя в передней камере глаза] (Hep., Sil.), поражающий легкие (Phos.).
 - Обильные, резкие, **слизисто-гнойные** выделения из глаз.
 - Липкие веки.
 - Язвы роговицы.
 - Дегенерация сетчатки (Phos., Syph.).
 - Отслойка сетчатки (Ben-d., Napht., Pilo.).
 - Эписклерит.
 - Веки полуоткрыты (Bell., Cupr., Op.).
 - Свищ слезной железы.
 - Стекловидный вид (Ph-ac., Op.).

- Зернистые веки.
- Ирит.
- Кератоконъюнктивит (Ran-b., Merc-n.).
- Флегмона глазницы (Rhus-t.).
- Панофтальм (Нер., Rhus-t.).
- Паралич зрительного нерва (Гели., См.).
- Зрачки расширены, вялые, не реагируют на свет (Am., Hyos., Op.).
- Зерна ячменя.

уши

- Боль в ухе, связанная с **болью в горле**, после холодной пищи или **холодной воды**, а также с проблемами с зубами.
- Снижение слуха из-за **увеличенных миндалин** (Kali-bi., Staph.).
- У детей Мерс почти всегда поражаются уши (Cham., Puls.).
- Уши чувствительны к прикосновению.
- Боль в ушах усиливается ночью из-за тепла постели.
- Результаты теста:
 - **Фурункулы** и фурункулы в наружном слуховом проходе (рис. 1).
 - Выделения густые, желтые, кровянистые и зловонные (хроническая оторрея).
 - отит .

Нос

- Насморк усиливается при чихании, особенно в **сырую погоду** (Dulc., Нер., Puls.), в теплом помещении и на улице, на солнце.
- **Катар носа, распространяющийся на лобные пазухи** (Kali-bi., Puls., Thu.).
- Выделения густые, обильные, поражают верхнюю губу; едкие, зеленовато - желтые и зловонные, с запахом старого сыра.
- Носовые кровотечения во время сна (Crot-c., Nit-ac.) и при сморкании (Phos.).
- Насморк из-за сквозняков, как холодных, так и теплых.
- Результаты теста:
 - **Жирный** (Hydr., Puls.) и **блестящий** нос (Iris, Phos.).
 - Красный, саднящий и **грязный** нос у детей, с воспалением ноздрей из-за едких выделений (Ars., Kali-bi., Nit-ac., Sulph.).
 - Постоянное дергание за нос (Лус., Дорого.).
 - полипы.
 - Запавший (Aug., Psor.).

Лицо

- Губы всегда солоноватые на вкус.
- Результаты теста:
 - **Отечность лица** (после длительного приема стероидов).
 - **Потрескавшиеся губы** и уголки рта (Graph., Sil.).
 - Атопическая экзема.
 - Увеличение околоушных желез, подчелюстных и подбородочных лимфатических узлов.
 - Морщинистый лоб (Nux-v.).
 - Рентген: слюнные камни.

РОТ

- **Сильная жажда, несмотря на повышенное слюноотделение.**
- **Стоматит, вызванный жевательной резинкой.**
- Густая, мыльная, тягучая, **обильная, вонючая** слюна (Chin., Kali-bi., Kali-i., Nit-ac., Sep., Sil.) является основным сопутствующим симптомом кашля, лихорадки, головной боли, сна, боли в горле и зубной боли.
- Постоянная тенденция к глотанию.
- Зуд нёба является важным сопутствующим симптомом тонзиллита.
- Результаты теста:
 - **Афты с повышенным слюноотделением** (Con., Hell.).
 - Язык: покрытый **желтым** налетом, **дряблый, увеличенный, влажный** и толстый, со следами зубов (Chel., Podo., Rhus-t.), с продольной трещиной посередине.
 - Афты на языке, из-за которых ребенок не может сосать грудь (Borh.).
 - Гингивит +.
 - Воспаление языка +.
 - Зловонное дыхание (Bapt., Carb-ac., Kali-p., Nit-ac., Sil.).

ЗУБЫ

- Затрудненное и позднее прорезывание зубов.
- Результаты теста:
 - **Абсцесс корней зуба.**
 - Альвеолярный абсцесс.
 - Коронки зубов остаются нетронутыми, когда корни разрушаются (Мез.).
 - Желание постоянно стискивать зубы (Bell., Hyos.).
 - Зубная эмаль слишком слабая (Calc-f., Sil.).
 - Десны становятся губчатыми, легко кровоточат и склонны к образованию язв на зубах.

ШЕЯ

- **Склонность к постоянному сглатыванию.**
- **Выраженная чувствительность горла к сквознякам.**
- Сухость в горле с повышенной жаждой.
- Боль в горле обычно поражает правую сторону, усиливаясь ночью, при глотании и разговоре.
- Боль в горле распространяется на уши (Bell., Lac-c., Lach.) и подчелюстные железы.
- Результаты теста:
 - **Удлиненные суппозитории** (Bar-m, Hyos, Lach, Phos).
 - **Хриплый** и хриплый голос.
 - Шейные железы опухли и увеличены.
 - Слабый кашлевой рефлекс.
 - Темное, красное, болезненное горло.
 - Тонзиллит +.

ЖЕЛУДОК

- **Капризный аппетит**, ребенок не знает, чего хочет, отказывается от многого, когда ему его предлагают (Chin., Cina, Puls.).

- Употребление сладостей, **хлеба**, кофе или **молока** вызывает вздутие живота, отрыжку и колики.
- Постоянно хочет грудь (изнуряет мать); **ненасытный аппетит**; младенец голоден даже после хорошего кормления (Chin., Lyc., Psor.).
- **Рвота калом** (Op., Plb.) при кишечной непроходимости (Ars., Verat.).
- **Икота** после **каждого приема пищи**, даже во время еды (циклическая).
- **Сильная и неутолимая жажда**, особенно около полуночи (Mag-m., Sulph.).
- Тошнота при чистке зубов (Сен.), при кашле, при коликах, после употребления сладкого (Граф.).
- Пристрастия к еде при слабом пищеварении.
- Чувствительность в области подложечной области.
- Рвота вследствие повышения внутричерепного давления (Arom., Bell., Hell., Zinc.).
- Рвота вследствие кашля или диареи.
- Обострение: горячая пища, молоко, чернослив, картофель, сладости.
- Отвращения: масло, кофе, приготовленная пища, жир, мясо, грудное молоко, жирная, соленая, твердая пища, острый сыр, сладости, острая пища.
- Пристрастия: **Хлеб с маслом** (Fern, Mag-c.), **холодные напитки, лимоны** (Verat.), мясо.
- Результат теста:
 - Эпигастрий чувствителен к прикосновению.

ЖИВОТ

- **Неонатальная желтуха** (Bov., Chin., Nat-s.).
- **Сильные тенезмы и постоянные позывы даже после дефекации; ощущение, что дефекация никогда не заканчивается.**
- Асцит возникает вследствие воспаления брыжеечных желез.
- Колики при запоре, сопровождающиеся голодом; лучше от стула с кровью и тенезмами (Nux-v.).
- Вздутие живота после молока (Calc., Nat-c.) и при мочеиспускании (Lyc.).
- Язвенный колит у маленьких детей; с сильным дискомфортом до и во время дефекации, в основном из-за мучительных тенезмов и колик.
- Результаты теста:
 - Живот холодный на ощупь (Colch., Verat.).
 - Аппендицит.
 - Асцит.
 - Колит.
 - Паховые железы увеличены и чувствительны (Hep., Rhus-t., Sil.).
 - Инвагинация [кишечная непроходимость],
 - Печень: атрофия, увеличение, жировая дегенерация, болезненная на ощупь (Chin., Lyc., Mag-m.).
 - Перитонит.
 - Селезенка увеличена.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Дизентерия с **белым налетом на языке** (тром.).
- Частые, безрезультатные позывы на дефекацию; с **сильными тенезмами**.
- Непроизвольные дефекации во время **сна** (Hyos., Ph-ac., Podo., Psor.).

- Стул напоминает **рубленые яйца** (Cham., Puls.), **рубленый шпинат** (Acon., Arg-n.), творожистый, зеленоватый, кровавистый и слизистый.
- Сильное метеоризм.
- Безболезненная диарея: после употребления сахара в любой форме (Arg-n.), во время и после кори, во время прорезывания зубов и желтухи (Chion., Dig., Sulph.).
- Результаты теста:
 - Болезненные участки в области ануса, вызванные дефекацией (Aloe, Apis, Nit-ac.).
 - Абсцесс вокруг ануса.
 - Выпадение прямой кишки.
 - Черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Количество выделяемой мочи значительно превышает количество грудного молока, потребляемого младенцем (Bell., Lac-ac., Nux-v.).
- Постоянные и частые позывы, днем и ночью, с чрезмерным мочеиспусканием, особенно во время лихорадки (Lyc., Ph-ac., Rhus-t.).
- Болезненные позывы к мочеиспусканию; ребенок касается половых органов и громко плачет (Acon.).
- Задержка мочи при дизентерии.
- Внезапные позывы к мочеиспусканию; необходимо быстро бежать в туалет, иначе моча вытечет.
- Полезно при нефрите и нефротическом синдроме.
- Результаты теста:
 - Слабый луч.
 - Раздвоенный луч (Thu.).
 - Моча молочного цвета.
 - Моча: Альбумин ++, Эритроциты ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Ребенок постоянно играет с гениталиями (Страм.).
- Склонность к мастурбации.
- Результаты теста:
 - Воспаление головки полового члена (Jas-c.).
 - Гидроцеле с увеличенными и уплотненными яичками.
 - Влага между бедром и мошонкой.
 - Парафимоз (Nit-ac.) и фимоз с нагноением.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Выделения у маленьких девочек.
- Результат теста:
 - Вульва опухла и болит.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Потеря голоса вследствие нервозности (Caust., Gels.) и паралича голосовых связок (Caust.).
- Постоянное прочищение горла.
- Охриплость при простуде (Carbo-veg., Phos.).
- Результаты теста:
 - Отек голосовой щели.
 - ларингит.

ДЫХАНИЕ

- Астма: от вдыхания пыли и попыток заснуть; ребенок **не может лежать на левом боку** (Apis, Kali-c.); улучшение от воздействия холодного воздуха (вентилятор, кондиционер или прогулка на свежем воздухе).
- Ускоренное дыхание во время сна (Чел.).
- Одышка при кашле (Ant-t., Cina, Ipec.).
- Результат теста:
 - Хрипы.

КАШЕЛЬ

- **Лающий кашель** (Нер., Spong.), вызванный **холодными напитками** и простудой.
- **При кашле необходимо придерживать грудную клетку обеими руками** (Арн., Брай., Дрос.).
- **Приступы двух видов кашля** (Bell., Phos., Puls., Sulph., Thuj.), следующие друг за другом в быстрой последовательности; усиливаются ночью, от тепла постели, в положении лежа на правом боку и от табачного дыма.
- Сухой кашель вследствие раздражения гортани, после кори (гной, пульс).
- Сухой, спазматический кашель, быстро утомляющий; отхождение едкой, гнойной, жидкой мокроты в течение дня.
- Коклюш с носовым кровотечением (Арн.).

Грудь

- **Невозможно лежать на правом боку**, особенно при пневмонии (невозможно лежать на левом боку: Лус.).
- Результаты теста:
 - **Холодный пот** на груди (Сен., Станн.).
 - Фурункулы в подмышках.
 - Рентгенограмма грудной клетки: уплотнение в правой нижней доле (Chel., Kali-c.).

Назад

- Не переношу сквозняк в области шеи.
- Результаты теста:
 - Искривление позвоночника.
 - Расщелина позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

- Растущие боли в костях по ночам (Нер., Nit-ac., Sil.).
- Конечности чувствительны к холодному воздуху.
- Синдром Стилла [тяжелый ювенильный хронический артрит].
- Нагноение тазобедренного сустава.
- Результаты теста:
 - Потрескавшиеся руки.
 - Холодный, влажный, липкий пот на руках.
 - Сжимание пальцев (Cic., Nux-v., Str.) и больших пальцев (Bufo, Cic., Cupr., Lach., See.).
 - Экзостоз большеберцовой кости (Nit-ac.).
 - Ледяные кончики пальцев (Ant-t., Thuj., Zinc.).
 - Ногти: ломкие и деформированные.
 - Неустойчивая походка.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Озноб при дизентерии (особенно появляется перед стулом и во время него), испуге (Gels., Puls., Verat.) и после гнева (Bry., Nux-v., Tarent.), с дрожью всего тела.
 - Холодность живота (Meny.) с ледяными руками и ногами и отсутствием жажды.
 - Если вы наденете одежду, вы не будете чувствовать себя лучше от холода.
 - Хуже на свежем воздухе (похоже на Rhus-t., противоположно Puls.).
- Нагревать:
 - Нежелание раскрывать себя даже на этом этапе.
 - Полное отсутствие жажды, жгучий жар, хуже ночью.
 - Покраснение лица и ладоней в жаркую погоду.
- Пот:
 - Стоны в стадии потоотделения.
 - Обильное потоотделение ночью и при каждом движении.
- Лихорадка возникает при любом возможном источнике сепсиса в организме, например , при наличии постоянных катетеров, игл-бабочек, трахеальных трубок, назогастральных зондов, внутривенных трубок и т. д.
- Когда у младенца или ребенка жар, он испытывает жажду и хочет молока.
- Лихорадка сопровождается катар верхних или нижних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

КОЖА

- Зуд усиливается ночью, от пота и тепла постели (Mag-act., Rhod.); кожа горит после расчесывания.
- Потливость по ночам и после теплых напитков, оставляет кровавые (Lach.) или желтые пятна на простыне и делает ее жесткой (Nat-m., Sei.).
- Склонность к образованию фурункулов.
- Трещины на коже зимой (Calc., Sep., Sulph.).
- Обильное потоотделение при каждой жалобе, но не облегчение (Bell.). (Обильное потоотделение, которое приносит облегчение: Nat-m., Verat.).
- Результаты теста:
 - Кровянистые, едкие выделения разрушают волосы (Lyc., Rhus-t.).
 - Атопическая экзема.
 - Контактный дерматит.
 - Трещины на коже в складках суставов пальцев; не переносит даже малейшего прикосновения.
 - Опрелости (Canth.).
 - Чесотка (Psor., Sulph.).
 - Кожа сухая и легко кровоточит при расчесывании (Ars., Sulph.).
 - Бородавки.

СПАТЬ

- Не могу лежать на правом боку (подбородок, пульс).
- Во время сна: холодные руки, зловонный пот на голове, скрежет зубов, стоны, хрипы (bar-c., stram.), открытый рот с обильным слюноотделением, физическое беспокойство, вздохи, разговоры.

- Спит голым (Sulph.).
- Сон легкий.
- Сон нарушается страхом разбойников (Nat-m., Sil.), ужасными сновидениями, болями в желудке (Caust., Rhus-t.) и потом.
- Бессонница из-за головной боли, лихорадки, боли в костях (Daph., Kalm., Plb.).

Судороги

- Дискомфорт или ухудшение состояния из-за: прорезывания зубов, **ночи**, сна.
- Судороги при **гидроцефалии** или объемных процессах головного мозга.
- Крики во время судорог.
- Бессонница во время или после судорог.
- Тетаническая ригидность.
- Лучше: очень плотно обернуть тело.

Общий

- Жалобы на злоупотребление йодом, железом, ртутью, хинином или серой; **перемены погоды** (Dulc., Rhus-t., Tub.) с теплой на холодную; подавление потоотделения, особенно ног; вакцинация.
- **Хрупкие кости** (Calc., Ph-ac., Ruta, Sil.).
- Генерализованные отеки при заболеваниях, связанных с дефицитом питательных веществ, таких как **квашеоркор** (Aeth., Abrot.) и **белковая недостаточность** (Calc-p., Sil., Tub.).
- Непереносимость **шерстяной одежды** (Corn., Sulph.).
- **Стоны** вообще, особенно во время боли (Bell., Coff., Coloc.), сна (Bry., Bar-c.) или потоотделения (Phos., Stram., Verat.).
- Абсцессы с выделением кровянистых, зловонных, желто-зеленых выделений.
- Дети с анемией.
- Ребенку становится лучше, если его потереть или нежно погладить (Calc., Cycl., Nat-c.).
- Дети с рецидивирующими ушными инфекциями в анамнезе.
- Зябкость из-за недостатка жизненного тепла, но также и ухудшение от тепла.
- Отеки вследствие заболеваний печени, почек или вследствие подавления перемежающейся лихорадки.
- Железистое затверждение (Bar-m., Iod., Spong.).
- Значительное воздействие на лимфатическую систему (Carc.).
- Неприятный запах тела.
- Полиомиелит.
- Цинга.
- Синусит со склонностью к простудам, ухудшается при воздействии холода или на открытом воздухе.
- Размягчение костей и рахит.
- Гнойные раны, которые заживают медленно.
- Дрожь в холодную погоду от малейшей физической нагрузки (Cocc., Gels.).
- Слабость с холодным потом, особенно по ночам.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК

(Тысячелистник - Мельница.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Агрессивен; гнев с насилием. Бьёт себя или других. Бьётся головой о стену, когда злится.
- ▶ Головная боль с носовым кровотечением.
- ▶ Мигрень у детей, при которой боль настолько невыносима, что ребёнок бьётся головой о стену. Боль возникает после употребления кофе или во время сна. Это острая боль, чаще локализующаяся справа, особенно у маленьких девочек.
- ▶ Постоянно сверлить ухо пальцем.
- ▶ Носовое кровотечение. Если положить лист тысячелистника в нос, у вас немедленно пойдёт кровь из носа.
- ▶ Носовые кровотечения усиливаются ночью, обильные, непрекращающиеся и непрерывные; кровь ярко-красная, темно-красная или очень бледная.
- ▶ Носовые кровотечения, вызванные сморканием.
- ▶ Во время прорезывания зубов возможны судороги или эпилепсия со скованностью.
 - ▶ Ущемленные грыжи у детей.
 - ▶ Острицы.

Источник

- Относится к семейству астровых (Asteraceae/Compositae).

МУСКУС

(Секрет препуциальных желез кабарги - Моск.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Маск может излечить многих истеричных мальчиков и девочек, которые никогда не имели возможности узнать, что такое послушание. Они жестоки, критичны, презрительны, склонны к разрушению, упрямы и эгоистичны. С младенчества и до полового созревания они привыкли добиваться своих прихотей с помощью хитрости и коварства. Таким образом, они в конечном итоге становятся идеальным объектом для лечения по рецепту Маска. Асаф, Игн, Мош и Валер — четыре основных средства от истерии у детей.
- ▶ У этих детей наблюдается множество реальных и воображаемых симптомов, которые увеличиваются как по количеству, так и по интенсивности до тех пор, пока все желания ребенка не будут исполнены.
- ▶ Хотя ребёнок, кажется, описывает свои симптомы правдиво и честно, информация оказывается недостоверной. Дети так часто преувеличивают или искажают свои чувства и восприятие, что уже не могут ничего точно передать.
- ▶ Ругающиеся и злые дети.
- ▶ Эмоциональные расстройства вследствие **чрезмерного контроля со стороны родителей**, особенно отца.
- ▶ Спазматический кашель, мастурбация или непроизвольные дефекации во время сна из-за чрезмерного патернализма.
- ▶ Бесстрашные дети.
- ▶ Чрезмерный, **неконтролируемый смех** по мелочам.
- ▶ Гнев с побоями.
- ▶ Неуклюжие дети; в спешке роняют вещи.
- ▶ Хаотичный и разрушительный.
- ▶ Веселый и возбужденный, когда лихорадит.
- ▶ Хитроумный, многое переворачивает с ног на голову.
- ▶ Желание активности, несмотря на физическую слабость.
- ▶ Постоянно теревит пуговицы.
- ▶ Не отвечает на вопросы.
- ▶ Симулирует болезни.
- ▶ Жестикულიрует и громко разговаривает сам с собой.
- ▶ Страшный.
- ▶ Разговорчивый, говорит возбужденно и торопливо.
- ▶ Нервные дети.
- ▶ Избалованные и избалованные дети.
- ▶ Сварливые, злобные и упрямые дети.
- ▶ Бесстыдно.

- ▶ Серьёзная неспособность к счёту. Очень плохо разбирается в математике.
- ▶ Поспешная речь.
- ▶ Лунатизм.

Тело

- ▶ **Легко падает в обморок**, когда болеет или получает выговор.
- ▶ У молодых девушек наблюдается внезапная потеря сознания или обморок с сильными судорогами конечностей.
- ▶ Ребенку нравится, когда его растирают и вытирают полотенцем.
- ▶ Повышенная чувствительность к воздуху, ухудшение от холода.
- ▶ Отсутствие реакции, особенно после частого применения антибиотиков, седативных или противоэпилептических препаратов.
- ▶ Неврологические расстройства с судорогами, спазмами, эпилепсией, удушьем и подергиваниями.

Другие важные симптомы

Голова

- Энцефалит или менингит.
- Головная боль с ощущением холода, обильной бледной мочой, обмороками и произвольным стулом.
- Результаты теста:
 - Во время судорог голова многократно и быстро тянется вниз и назад.
 - Произвольное покачивание головой.
 - Символ Кернига ++.
 - Обильное потоотделение.

Глаза

- Желание часто тереть глаза.
- Результаты теста:
 - Расширенные зрачки.
 - Пристальный взгляд, блестящие, выпученные, неподвижные или устремленные вверх глаза.
 - Из левого глаза текут слезы.

Уши

- Снижение слуха после гнева.
- Результаты теста:
 - Кровянистые выделения из ушей.
 - Ушная сера ++.

Нос

- Насморк с лихорадкой.
- Результат теста:
 - Носовые кровотечения из-за спазмов или судорог.

Лицо

• Результаты теста:

- **Синюшность лица и губ при гневе.**
- **Одна щека красная, сухая и холодная, а другая бледная, влажная и горячая.**
- Жевательные движения нижней челюсти.
- Потрескавшиеся губы.
- Подергивание в области носа и рта.

РОТ

- **Горький вкус.**
- Затрудненное открывание рта.
- Сухость с очень незначительной жаждой.
- Спазматические сокращения рта.
- Отсутствует язык.
- Результаты теста:
 - Пена у рта.
 - Зеленовато-желтое окрашивание языка.

ШЕЯ

- **Ощущение сдавливания шеи с удушьем** является наиболее важным и распространенным симптомом у таких истеричных детей.
- **Задуть.**
- **Globus hystericus:** ощущение комка в горле.
- Спазмы мышц гортани, особенно во время еды.
- Результат теста:
 - При глотании в горле слышно бульканье жидкости.

ЖЕЛУДОК

- **Отвращение к виду еды.**
- **Вздутие живота и чувство переполненности.**
- **Частая, сильная отрыжка с горячей слюной во рту.**
- **Спастическая икота у нервных детей.**
- Сильная жажда или полное отсутствие жажды.
- Обмороки во время еды.
- Тошнота от вида или запаха пищи.
- Пристрастия: **сыр** и крепкий черный кофе.

ЖИВОТ

- **Задержанный метеоризм.**
- Чрезмерное вздутие живота с метеоризмом у истеричных детей.
- Обильное вздутие живота с неприятным запахом, похожим на запах чеснока.
- Результаты теста:
 - Чрезмерный липкий пот по всему животу.
 - Втягивание пупка.
 - Спазмы диафрагмы и мышц живота.
 - Вздутие живота, сопровождающееся тимпанитом; однако отхождение газов невозможно никакими способами.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Обильный водянистый стул **выделяется непроизвольно во время сна или мочеиспускания.**
- Обильный, водянистый, ночной понос со вздутием живота и отвращением к пище; даже вид еды вызывает у ребенка тошноту.
- **Сладкий запах стула.**
- Покалывание в анусе, облегчающееся при растирании.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Сильный аммиачный запах мочи с дрожжевым осадком.
- Моча обильная и прозрачная, как вода.
- Моча нормальная или бледная в течение дня, но темно-красная и зловонная ночью.
- Непроизвольное мочеиспускание после дефекации.
- Ювенильный диабет: полиурия или глюкозурия с сильной жаждой, исхуданием, жжением в уретре.
- Результат теста:
 - Моча: Альбумин +, Глюкоза ++, Эритроциты +.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Ларингизмусный хрип при простуде.
- Спазматические сокращения гортани во время наказания.
- Спазмы голосовой щели.
- Результат теста:
 - Голос: Громкий.

ДЫХАНИЕ

- **Острая, внезапная, спастическая астма** с сильной тревогой и страхом, цианозом и угрожающей асфиксией.
- **При кашле дыхание как будто останавливается.**
- Постоянное желание дышать глубоко.
- Результаты теста:
 - Хрипы.
 - Нерегулярное, хриплое дыхание.

КАШЕЛЬ

- **Приступообразный или спазматический кашель** от простуды, от **выговора, от полудня до полуночи.**
- Кашель, сопровождающийся носовыми кровотечениями.
- Коклюш.

Грудь

- **Громкие хрипы от мокроты в груди, но откашливается она почти не полностью.**
- Стеснение в груди со спастическим кашлем.
- Результат теста:
 - Рентген грудной клетки: поднятая диафрагма как признак паралича.

Назад

- Результат теста:
 - Потливость шейной области.

КОНЕЧНОСТИ

- Конечности напряжены, кажутся слишком короткими.
- Результаты теста:
 - Синяки на бедрах.
 - Холод в одной руке и пот в другой.
 - Непроизвольные движения пальцев, как будто они что-то перебирают или считают пальцами.
 - Непроизвольные движения рук и ног.
 - Одна рука горячая и бледная, другая холодная и красная.
 - Спастические сокращения пальцев.
 - Скованность конечностей при судорогах и кашле.
 - Подергивание ног или большого пальца.

СПАТЬ

- Просыпается каждые полчаса и сбрасывает одеяло; ему слишком жарко, хотя он не потеет.
- Не может долго лежать в одном положении; спит очень беспокойно.
- Спите на боку.
- Сонливость с часто повторяющимися зевотами.
- Бессонница из-за перевозбуждения.
- Сонный днем и бессонная ночь.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Жгучий жар во время сна с желанием укрыться.
- Озноб, сменяющийся жаром.
- Продолжительная застойная лихорадка с параличом легких.
- Нисходящий озноб с дрожью, хуже от сквозняка.
- Результат теста:
 - Пот пахнет мускусом.

КОЖА

- Укусы насекомых.
- Результаты теста:
 - Синяки.
 - Холодность кожи является важным сопутствующим симптомом при многих жалобах.

СУДОРОГИ

- **Судороги гнева у младенцев.**
- Аура/Перед приступом:
 - **Нетерпение**, сопровождающееся сильным беспокойством.
 - Терпеть не могу, когда меня накрывают.
 - Давление в груди.
- Во время атаки:
 - Прогибается назад и кричит.

- Холод тела.
 - Голову многократно быстро тянут вниз и назад.
 - **Ларингоспазм (хрипы) при простуде**, с отеком глотки.
 - Скованность конечностей.
 - Все движения мышц (например, подергивания) происходят в определенном направлении: либо сверху вниз, либо снизу вверх.
 - Во время спазмов подавляются все секреты и выделения.
 - Сокращение пальцев.
 - Глаза ярко блестят, пристально смотрят и заметно выступают.
 - Носовые кровотечения.
 - Бледное и подергивающееся лицо с открытым ртом.
 - Спастические сокращения мышц гортани, особенно во время еды.
 - Тетанические спазмы.
- После нападения:
 - Приступ заканчивается отрыжкой и подергиванием различных частей тела, а затем возникает покалывание в руках.
 - **Чередование тонических и клонических судорог.**
 - Судороги с потерей сознания или иногда без него.
 - Уремические судороги.

Общий

- **Холод**, сильное желание тепла или огня.
- **Заболевания не имеют нормального течения.**
- На **последней стадии крупа**, когда все остальные средства не дали результата.
- **Дрожь по всему телу и холодный пот.**
- Сухость обычно влажных частей.
- Кровотечения.
- Обморок с цианозом.

MYGALE LASIODORA

(Черный южноамериканский тарантул - Mygal.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Беспокойное подергивание, особенно в руках.
- ▶ Любит быструю, громкую и ритмичную музыку.
- ▶ Беспокойные дети, которые быстро говорят и действуют.

Тело

- ▶ Беспокойство: постоянное движение, особенно рук и ног.
- ▶ Чувствителен к звуку, прикосновению и вибрации.
- ▶ Лучше вздремнуть днем.
- ▶ Холодно.
- ▶ Очень волосатые дети.
- ▶ Преимущественно правостороннее средство.
- ▶ Склонность к лимфангиту.

Происхождение: Это лекарство получают из крупного тарантула из Бразилии. Это один из древнейших видов на Земле. Этот вид пауков на 150 миллионов лет старше известного *Tarentula hispanica*. Таким образом, он существовал задолго до динозавров. *Mygale* — очень примитивный, но эффективно сложенный паук. У него нет глаз, но вместо них на восьми ногах расположены восемь разных типов волосков, которые позволяют ему «слышать» и, следовательно, обладать трёхмерным восприятием. Он может ловить мелких птиц в воздухе.

Самец тарантула живёт всего два года, а самка — до 35. Самец ведёт опасную жизнь в поисках подходящих самок, в то время как самки проводят большую часть жизни под землёй, в своих норах. Поэтому самцы очень быстро созревают, чтобы успеть спариться за свою короткую жизнь. Паук-мигал — один из самых мохнатых пауков. Несмотря на свою медлительность, он может нападать очень быстро.

У тарантулов, подобных *Mygale*, нет паутины. Вместо этого они плетут плотные белые трубчатые гнезда между листьями и в трещинах старых деревьев. Как и у большинства пауков, у *Mygale* очень узкий пищевод, поэтому он не может питаться крупными животными. *Mygale* может высоко прыгать и лазать по деревьям. (Предоставлено Виллемом Ваутманом, Утрехт, Нидерланды).

Дети, которым требуется препарат *Mygale*, похожи на детей групп *Agar*, *Stram*, *Tarent* и *Ziz*.

Другие важные симптомы

Дух

- **Активные, агрессивные и беспокойные дети, особенно при пробуждении по утрам .**
- **Чувствителен к музыке, звукам, прикосновениям и вибрации.**
- Желание играть с веревками.
- Страх смерти и замкнутого пространства.
- Делает много жестов, особенно одной рукой и одной ногой.
- Мстительные дети.
- Речь невнятная, при попытке говорить слова вырываются рывками .

Голова

- Результаты теста:
 - Голова падает набок, обычно на правую.
 - Запрокидывает голову назад, а затем резко вытягивает ее вперед.

Глаза

- Результат теста:
 - Веки быстро открываются и закрываются.

Уши

- **Острая боль в ухе, особенно с правой стороны, усиливающаяся после полуночи,** заставляет ребенка вставать с постели.
- Слух интенсивный и острый.

ОСТРАЯ БОЛЬ В УХЕ

В моей практике не было ни одного случая отрицательного результата при лечении острых болей в ухе, из-за которых дети просыпаются от плача посреди ночи. Я всегда начинаю с **Ферро-П 200 С** , а если это не помогает, то использую **Хамоме 50 М**.

Лицо

- Мимические тики, особенно при подражании кому-либо.
- Результаты теста:
 - Выражение страха.
 - Постоянные подергивания мышц лица.
 - Утром лицо искажено.
 - Лицо горячее и красное.

Рот

- **Скрежет зубами со склонностью прикусывать язык во время сна.**
- Результат теста:
 - Рот быстро открывается и закрывается.

ЖЕЛУДОК

- **Чрезмерная жажда с лихорадкой.**
- **Тошнота** с сильным сердцебиением является **сопутствующим симптомом** при многих других состояниях.
- Отвращение к еде.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Обжигающе горячая моча.
- Учащенное мочеиспускание.

ДЫХАНИЕ

- Затрудненное дыхание с тревогой.

НАЗАД

- Судороги и подергивания после травм.
- Результаты теста:
 - Опиостотонус.
 - Кривошея.

КОНЕЧНОСТИ

- Хорея и другие непроизвольные движения улучшаются во время сна (как у Агара, и в отличие от Зиз.), но ухудшаются утром и от движения.
- Неуклюжесть ног, спотыкание при ходьбе.
- Результаты теста:
 - Интенсивные красные полосы идут по лимфатическим сосудам ног, от икр по всему телу.
 - Непроизвольные судорожные движения конечностей, особенно правой.
 - Ноги постоянно находятся в непроизвольном движении, когда сидят (Zinc.), и волочатся при попытке ходить.
 - Беспокойство: постоянное движение, особенно рук и ног. Не может удерживать руки в одном положении даже минуту.
 - Пожимание плечами или судорожные движения плеч.

СПАТЬ

- Беспокойный сон.

КОЖА

- Результат теста:
 - Карбункул

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Озноб с дрожью во всем теле.
- Чрезмерная жажда с лихорадкой.
- Покраснение лица и сухой коричневый налет на языке в жаркую погоду.
- Сильный озноб, за которым следует жар.

ХОРЕЯ

Mugale наблюдается хорея, особенно в области лица и верхней части тела. Для сравнения следует рассмотреть следующие препараты:

- Агар.: Очень похоже на Mugale, но отличительным симптомом является зуд век или других частей тела, как при обморожении; позвоночник чувствителен к прикосновению.
- Ign.: Хорея эмоционального происхождения.
- Stram.: Характеризуется высунутым языком, заиканием, гневным выражением лица и частым подниманием головы с подушки.
- Tarentum: показан при хорее правой руки и правой ноги. Движения сохраняются даже ночью.
- Зиз.: Хорея продолжается во время сна.

Общий

- **Непрерывное движение всего тела.**
- **Неустойчивая походка.**
- Холодно.
- Исхудание при хореических заболеваниях.
- Невозможность нормально ходить и стоять.
- Периодические жалобы.
- Преимущественно правостороннее средство.
- Красные полосы вдоль лимфатических сосудов.
- Подергивания и судорожные сокращения мышц.

НАДЖА ТРИПУДИАНЦЫ

(Яд кобры - Наджа)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Булимия у маленьких детей, чьи матери имели похожую проблему во время беременности, характеризуется перееданием и последующим - очищением или приемом большого количества пищи за короткий период времени, за которым следуют попытки избавиться от съеденного, как правило, с помощью рвоты или чрезмерных физических нагрузок.
- ▶ Дети матерей, которые во время беременности вступили в брак, в котором их отвергали, преследовали или с ними обращались несправедливо их родственники (Mag-c., Mag-m., Sacch.)
- ▶ Дети матерей, которые во время беременности были в гневе и ярости из-за угнетения и насилия, которым они подвергались в отношениях, но в то же время терпеливо и молчаливо переносили все из чувства долга
- ▶ Дети матерей, которые сильно страдали в отношениях и чувствуют себя беспомощными и загнанными в угол, чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
- ▶ Дети матерей, которые во время беременности жили в постоянном конфликте между гневом и ненавистью, с одной стороны, и уважением, ответственностью и чувством долга перед семьей, с другой.
- ▶ Дети испытывают чувство вины, как будто они совершили что-то неправильное. Это может быть паранойей, часто встречающейся при шизофрении (Alum., Anac.).
- ▶ Дети, живущие в среде, где существует большой страх эмоционального или физического вреда
- ▶ Дети, которым необходим Наджа, имеют связь со змеями, например, видят сны о змеях или испытывают интерес к этим животным.
- ▶ Трудности с концентрацией внимания во время учебы, приводящие к нелюбви к учебе и школе
- ▶ Дети народа наджа часто живут как роботы, как будто они находятся под контролем высшей силы или сильной личности — будь то строгие родители или строгие религиозные ограничения в семье (Stram., Thuj.).
- ▶ Ответственные дети, которые воспринимают всё слишком серьезно. Они хотят выполнять свои обязанности наилучшим образом.
- ▶ Самооценка у маленьких детей, ставших жертвами строгих и доминирующих родителей или подвергшихся сексуальному насилию
- ▶ застенчивые дети, которые не могут выразить свое мнение и гнев по отношению к семье и друзьям (Calc., Gels., Kali-c.)

Тело

- ▶ особенно влияет на мозжечок и продолговатый мозг
- ▶ Одышка и диспноэ из-за врожденного порока сердца, например
 - Аортальный стеноз
 - Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)
 - Дефект атриовентрикулярной перегородки (ДАВС)
 - Коарктация аорты (КТА)
 - Декстрокардия
 - Аномалия Эбштейна
 - Синдром гипоплазии левых отделов сердца (СГЛС)
 - Синдром гипоплазии правых отделов сердца (СГПС)
 - Митральный стеноз
 - Персистирующий артериальный проток (ПА)
 - симптом Кантрелла
 - Легочная атрезия
 - Стеноз легочной артерии
 - Сияющий комплекс
 - Тетрада Фалло
 - Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)
- ▶ Заболевания клапанов сердца у детей, например, клапанный стеноз, клапанная регургитация, атрезия или пролапс митрального клапана (Kalm., Lysps-v.)

Другие важные симптомы

Дух

- не может выразить свои чувства, не способен отреагировать, когда его эмоционально ранили (Nat-m., Puls.)
- Депрессия у детей характеризуется недовольством всем, лёгкой плаксивостью или плачем при малейшем эмоциональном возбуждении. Депрессия иногда компенсируется агрессией, раздражительностью или агрессивным и саморазрушительным поведением.
- постоянное беспокойство, как будто он сделал что-то не так
- Страх, что его близкие могут попасть в аварию
- Страх дождя или ливня. У ребёнка развивается сильная фобия попасть под дождь и намокнуть.
- Проблемы с идентичностью из-за эмоционального, физического или сексуального насилия
- представляет себе стресс и проблемы, а затем любит думать о них
- любит музыку
- любит рисовать
- любит писать стихи (Агар., Ант-к.)
- чувствительные дети, которые скрывают свои чувства
- полная потеря уверенности в себе из-за хронического горя

Голова

- катаральная головная боль с кашлем и простудой
- Головные боли, вызванные расстройствами желудка (Bry., Iris)
- Головные боли от вожделения
- Мигрень у детей, которая часто вызывает депрессию
- Мигрень, начинающаяся во время сна (Ferr., Ptel.)
- Мигрень усиливается при физических нагрузках и острой пище, уменьшается при занятиях на свежем воздухе и применении холодных компрессов.
- Результаты теста
 - чешуйки кожи
 - Выпадение волос на макушке
 - чувствительная кожа головы

Глаза

- Результаты теста
 - приклеенный
 - Паралич верхнего века
 - Зрачки инертны и нечувствительны к свету (Ад., соч.)
 - затонувший
 - Отек верхнего века

Уши

- хронический средний отит, черные выделения, похожие на рыбий рассол
- Результаты теста
 - Воспаление барабанной перепонки

Нос

- аллергический ринит, который в конечном итоге оседает в груди и вызывает астму
- аллергический вазомоторный ринит, особенно ночью, сопровождающийся чиханием, особенно весной и осенью
- Сморкание с очень незначительными выделениями
- заложенность носа, усиливающаяся в течение дня, облегчающаяся при чихании
- Результаты теста
 - акне
 - опухшие ноздри

Лицо

- Красный цвет при головных болях
- Результаты теста
 - тревожное, болезненное выражение лица
 - Бледность, покраснение

Рот

- Сухость по утрам после пробуждения
- Речь замедленная, неуклюжая, невнятная и неясная

- Результаты теста

- Отбеливание языка
- Гингивит
- обильная, пенистая слюна
- грязный налет на губах и языке
- язвы языка

Шея

- острый фарингит
- Одышка при отходе ко сну (Cencl., Lac-c.)
- постоянная тенденция к глотанию
- Затруднения глотания из-за паралича продолговатого мозга
- Боль после кашля
- чувствителен, не переносит тесную одежду вокруг шеи
- Боль в горле, усиливающаяся по утрам и при глотании
- Отек глотки и миндалин, затрудняющий глотание
- Результаты теста
 - красный или темно-красный обесцвеченный
 - воспаленный
 - Воспаление левой миндалины
 - густая слизь

ЖЕЛУДОК

- Тошнота от вождения
- Колики после основного приема пищи

ЖИВОТ

- постоянное ощущение, будто у него понос
- спазмы и скручивания в области пупка и вокруг него
- болезненное вздутие живота из-за метеоризма
- грохочущие и булькающие звуки
- Результаты теста
 - пальпируемая толстая кишка
 - увеличенная селезенка
 - Болезненность левой подвздошной области
 - Болезненность в левой паховой области

ПРЯМАЯ КИШКА

- Диарея из-за малейшей неосторожности во время еды
- сильные, обильные испражнения, водянистый стул, как при холере
- недостаточные, неудовлетворительные дефекации

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- скудное мочеиспускание
- Результаты теста
 - Отложения красного осадка в моче (Dig., Merc-c.)
 - Моча темно-соломенного цвета

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- крупоподобные жалобы на гортань и трахею
- постоянное очищение гортани
- Охриплость при чтении вслух и разговоре

ДЫХАНИЕ

- аллергическая астма, сопровождающаяся кожным заболеванием
- Астма у детей с проблемами сердца
- Астма после простуды (Aral., Nux-v.)
- Астма, ухудшается ночью, в положении лежа, на левом боку и во время сна, облегчается при обмахивании веером и в положении лежа на правом боку
- Кашель, усиливающийся после полуночи, от холодного воздуха, от физической нагрузки
- Кашель вследствие кардиомегалии (Лаур., Табл.)
- короткий и болезненный кашель
- Выделение беловатой, густой слизи утром после пробуждения
- Раздражение и щекотание в гортани и трахее
- Дыхание очень медленное, поверхностное и едва заметное; напряженное и затрудненное
- короткий, хриплый кашель каждые несколько минут
- Результаты теста
 - учащенное дыхание, дыхание «рыбьим ртом», одышка

СЕРДЦЕ

- Стеснение в груди, сопровождающееся астмой
- Проблемы с сердцем после инфекционного заболевания (Спартан-с.)
- Проблемы с сердцем, сопровождающиеся проблемами с дыханием, мигренями и цианозом
- Проблемы с сердцем, усиливающиеся в положении лежа на левом боку (Саст., Phos.)
- Сердечная недостаточность, сопровождающаяся клапанным поражением сердца (Ацетан, Стрый-ар., Стрый-с.)
- нервное сердцебиение
- Сердцебиение после малейшего напряжения или шока
- Ревматизм, поражающий сердце (Bry., Sulph.)
- Повреждение сердечного клапана после стрептококковой инфекции горла
- Результаты теста
 - слышимые тоны сердца
 - Тетрада Фалло
 - Гипертрофия сердца
 - Гипотония
 - Недостаточность митрального клапана
 - Митральный стеноз
 - Шум в сердце
 - Перикардит
 - Пульс частый и полный или слабый и медленный

- одна нога холодная, другая горячая
- синие руки
- фиолетовые руки
- Пот на руках, лодыжках и ступнях
- Пот на ладонях при кашле
- потливость ног, разъедает обувь (Sanic., См.)
- Синдром беспокойных ног
- опухшие руки и ноги

Назад

- хроническая боль из-за горя

Спать

- страшные сны, много кошмаров
- Нарушения сна, сопровождающиеся проблемами с сердцем
- Пробуждение от удушья (Грин., Оп., Спонг.)

КОЖА

- Результаты теста
 - Пурпура

Общий

- Судороги во время сна и мастурбации
- Цианоз у маленьких детей
- Чувство слабости после завтрака
- Фрукты, особенно кислые, обычно облегчают симптомы.
- Склонность к кровотечениям
- Боль при раке у детей с лейкемией
- склонность к простудам

НАФТАЛИН

(Нафталин - Наф.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Катаракта у детей.
- ▶ Воспаление сетчатки.
- ▶ Помутнение роговицы и отслоение сетчатки.
- ▶ Сенная лихорадка или вазомоторный ринит с болью в глазах, постоянным чиханием, жаром в голове и резкими, болезненными выделениями. Насморк может распространяться вниз и приводить к приступу бронхиальной астмы, которую лучше лечить на свежем воздухе.
- ▶ Коклюш.
- ▶ Вирусный и бактериальный бронхит.
- ▶ Продолжительные приступы спазматического кашля с одышкой, сопровождающиеся синюшно-красным или красным лицом. Сильное напряжение с потоотделением и отхаркиванием густой, вязкой мокроты.

Источник

- Производное угля, получаемое при производстве угольного газа.

НАТРИЙ МУРИАТИКУМ

(поваренная соль - Nat-m.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Заболевания, вызванные **отсутствием настоящей родительской любви** и заботы.
- ▶ Плачет быстро (пульс), но **от утешения становится хуже**.
- ▶ **Во время сна возникают страхи**, сопровождающиеся многочисленными сновидениями, кошмарами и бессонницей.
- ▶ **Скрывает свою глубокую и горькую обиду** от родителей и семьи из-за страха потерять близких навсегда.
- ▶ Ребенок становится агрессивным, потому что ему не хватает любви.
- ▶ Избегает людей, которые пытаются его утешить, особенно тех, кто его балует и суетится (раздражительность, когда его утешают: Ign., Plat., Sep., Sil.).
- ▶ Эмоциональная неуверенность после перерезания пуповины; нуждается в большой любви и ласке.
- ▶ Крайне чувствительный, с чрезмерными реакциями (раздражительность, все воспринимает с плохой стороны: Caps., Caust., Croc., Nux-v., Pall.).
- ▶ Страх, что с ним или с кем-то, кого он любит или от кого зависит, может что-то случиться.
- ▶ Неопределенность на первых этапах развития становится для ребенка такой эмоциональной травмой, которую он никогда не забудет.
- ▶ Гнев проецируется в форме раздражительности, импульсивности и порывистого поведения.
- ▶ Ребенок лелеет эмоциональную травму и отказывается от нее освободиться; он предпочитает горевать молча.
- ▶ Ребенок предпочитает разговаривать с умершим человеком, если он потерял привязанность близкого человека (бред, разговоры с умершими людьми).
- ▶ Эта эмоциональная травма ребенка становится очевидной, когда он смотрит в зеркало: он думает, что выглядит ужасно.
- ▶ Трудности с кормлением; повторяющиеся истерики, связанные с едой. С психологической точки зрения, еда — это оральный стимул, олицетворяющий любовь и заботу, которые ребенок подсознательно отвергает. Если ребёнка заставляют есть, он становится тревожным и раздражительным (постпищевая тревожность).
- ▶ Не может и не будет принимать веселую, счастливую и радостную сторону жизни; поэтому не может смеяться над шутками.
- ▶ Генерализованные тревожные состояния; сны и бред о ворах и грабителях (возможно, из-за того, что ребенок лишен ласки).

- ▶ Различные сны о выпадающих или вырванных зубах символически выражают подавленный гнев и другие эмоции ребёнка: ребёнок не может использовать зубы для жевания (высказывания от своего имени) или кусания (выражения гнева). У малышей мало зубов, и прорезывание зубов у детей в Нат-м также задерживается.

Тело

- ▶ Потеря веса при хорошем аппетите (Abrot., Calc., Cina, Iod., Petr., Tub.).
Шея и горло особенно тонкие, с выступающими скулами.
- ▶ **Географический язык** (Merc., Tarax.).
- ▶ Боль в животе уменьшается при надавливании одеждой (Fl-ac.).
- ▶ Врожденный стеноз слезных протоков; у новорожденных глаза постоянно слезятся.
- ▶ Задержка развития; поздно начинает говорить и ходить.
- ▶ Мальчишеское поведение у девочек (Плат.).
- ▶ Кожа становится бледной, анемичной, землистой и жирно-желтой.
- ▶ Слезотечение при кашле (Puls., Squil.).
- ▶ Витулкас говорит: «Часто можно увидеть тонкую, изящную горизонтальную линию, разделяющую нижнее веко на две части. Она часто встречается у молодых девушек с истеричным характером» (Асаф., Лил-т., Мош.).

Другие важные симптомы

Дух

- **Склонен к несчастным случаям** и неуклюж из-за спешки, легко смущается; в конечном итоге роняет вещи или натывается на них во время бега.
- Жалобы, вызванные: одиночеством (брошенностью), **сексуальным насилием**, конфликтом между родителями, **смертью любимого человека** (родителей, близких родственников или домашних животных), притеснением, обвинениями, презрением, подавленным гневом с **молчаливой скорбью**.
- **Не способны проявлять привязанность ни к кому, кроме** любимых животных. Такие дети обычно любят иметь много животных и очень к ним привязаны.
- **Страх птиц**, темноты, врачей, неудач, полетов на самолетах, привидений, насекомых, иголок, грабителей, пауков, гроз, туннелей.
- Ненавидит математику; **очень слаб в арифметике**.
- Они **очень боятся щекотки** и поэтому не любят, когда их трогают или ласкают, особенно незнакомцы.
- Гнев с молчанием и очень бледным лицом.
- Не любит школу, испытывает трудности с концентрацией внимания на учебе.
- Застенчивые и пугливые дети, которые плачут при малейшем беспокойстве или гнев и чувствуют себя еще хуже, когда их подбадривают или утешают.

- Ощущение себя покинутым и нелюбимым близкими и любимыми, особенно после рождения младшего брата или сестры, из-за ревности.
- Непроизвольный смех в неподходящее время.
- Нежные и сентиментальные дети.
- Обсессивно-компульсивное расстройство; постоянная необходимость проверять, что он только что сделал, снова и снова, ИЛИ постоянная необходимость мыть руки.
- Не по годам развитые дети.
- По натуре замкнутый, жаждет уединения, не любит компанию .
- Маленькие дети, которые находятся в плохом настроении и ведут себя очень грубо и оскорбительно по отношению к своим родителям, склонны пинаться в порыве гнева.
- Страх сцены.
- Застенчивые дети, которые постоянно грызут ногти или тянут пальцы в рот.
- Употребляет неправильные слова при разговоре и путает слова или буквы при письме.
- Найдите очень дисциплинированных и ответственных детей с высокими моральными принципами .
- Очень ленивый и склонный к прокрастинации.
- Очень чувствителен к грубости и выговорам; молча плачет при малейшем выговоре от старших.

Голова

- Заболевания, вызванные **перенапряжением** (умственным и физическим), **жирной пищей** и **солнцем**.
- Головная боль, сопровождающаяся тошнотой, рвотой и болью в шее; периодическая сильная, пульсирующая, распирающая, разрывающая головная боль у школьников; **хуже в первой половине дня** (с 10 часов), от кашля, еды, тряски, света или чтения; лучше на свежем воздухе, от холодных компрессов, местного давления на пораженную область и в - положении лежа с плотно закрытыми глазами.
- Боль в травмированной области, с повышенной чувствительностью к прикосновениям, сохраняющаяся в течение длительного времени после травмы.
- Туберкулезный менингит.
- Головокружение при вставании и после напряжения глаз (например, при длительном просмотре телевизора или занятии рукоделием).
- Результаты теста:
 - Волдыри или **экзематозные высыпания вдоль линии роста волос**, особенно на затылке, которые вызывают болезненные ощущения и разъедают волосы.
 - КТ: кровоизлияние в мозг.
 - Частые произвольные подергивания или кивания головой.
 - Жирные волосы или очаговое выпадение волос на лбу и висках.
 - Гидроцефалия.
 - Знак Кернига +.
 - Белые корки или чешуйки, особенно на затылке.
 - Хмурится и краснеет, когда страдает от головной боли.

Глаза

- Ребенок жалуется на плавающие черные пятна в поле зрения.
- Затуманенное зрение с частым мерцанием перед глазами и головной болью .
- Воспаление краев век с образованием корок и сильным зудом.
- Непроизвольное слезотечение при кашле, головной боли, смехе или на ветру.
- Боль в глазах с покраснением из-за напряжения во время выполнения деликатных задач, таких как чтение, шитье и письмо при искусственном освещении.
- Результаты теста:
 - Суженные зрачки.
 - Язвы роговицы.
 - Эктропион [выворот век наружу],
 - Полуоткрытые веки.
 - Паралич внутренних прямых мышц; расходящееся косоглазие [косоглазие наружу],
 - Периметрия: Вертикальная гемианопсия [частичная потеря поля зрения],
 - Сужение слезного протока.
 - Ячмени, особенно во внутренних уголках глаз.

Уши

- Катар евстахиевой трубы.
- Результаты теста:
 - **Ушная сера ++.**
 - Фурункулы на мочках ушей и волдыри за ушами.
 - Постоянно ковырять уши пальцами.
 - Белые или желтоватые выделения из ушей.

Нос

- **Сильное, спазматическое чихание по утрам** (аллергия на домашнюю пыль и пылевых клещей) и при раскрытии.
- Обильный, альбуминоподобный, белый или желтый катар.
- Носовые кровотечения с выделением темной и сгустившейся крови у маленьких детей, особенно при сморкании.
- Нужно чихнуть один или два раза, прежде чем начнется приступ кашля.
- Склонность часто сморкаться, несмотря на боль в корне носа.
- Катар носа, распространяющийся на лобные пазухи или обратно в горло.
- Заложенность носа усиливается на открытом воздухе.
- Результаты теста:
 - **Пот на носу.**
 - Сухие, покрытые корками ноздри; постоянное ковыряние в них.

Лицо

- Свинка, метастазирующая в яички.
- Свинка с нагноением околоушных желез и повышенным слюноотделением.
- Потливость лица во время еды.
- Результаты теста:
 - **Повышенный рост густых волос на лице**, из-за чего ребенок выглядит старше, чем он есть на самом деле.

- **Блестящее или жирное** лицо.
- Язвы или **трещины** в уголках рта или посередине **губ**.
- Твердая и болезненная припухлость подчелюстных лимфатических узлов.
- Губы опухли и слегка шелушатся.

РОТ

- Ребенок постоянно тянет пальцы в рот.
- Сухость во рту с повышенной жаждой.
- Повышенное слюноотделение во время сна или при язвах во рту, затрудненном прорезывании зубов, лихорадке или зубной боли.
- Потеря аппетита, отсутствие вкусовых ощущений при простуде.
- У младенцев болит рот, откуда трудности и боль при грудном вскармливании.
- Часто прикусывает язык.
- Результаты теста:
 - **Географический язык или белый, покрытый красными островками.**
 - Ранула [слюнная киста на дне полости рта, вызванная закупоркой выводного протока подъязычной или подчелюстной железы],
 - Опоясывающий лишай на языке.
 - Налет.
 - Губчатые, сине-красные десны вокруг пораженных кариесом зубов; имеют сильный гнойный запах и легко кровоточат.

ШЕЯ

- Рвотные позывы при глотании твердой пищи; вынужден **запивать каждый глоток водой**.
- Результаты теста:
 - **Истощенная шея.**
 - Горло темно-красное с фолликулами.

ЖЕЛУДОК

- **Желание поесть возникает примерно в 10-11 утра.**
- Рвота желчью или кислотой с болью в животе, усиливающаяся при лихорадке.
- Неэффективная и слабая отрыжка после еды или питья.
- Неутолимая жажда большого количества воды.
- Быстрое расстройство желудка от хлеба или небольшого количества жирной пищи, сопровождающееся повышенным слюноотделением.
- Сильная икота.
- Ухудшается из-за: чрезмерного употребления соли, меда, жирной или острой пищи.
- Отвращение: фасоль, сливочное масло, **курица, яичные белки**, жирная и маслянистая пища, **мед**, устрицы, **горох**, пудинг, соль, **слизистая пища, овощи**.
- Пристрастия: **Горькая пища и напитки**, черный перец, **хлеб**, поджаренные или обугленные продукты (например, поджаренные тосты и т. д.), шоколад, **ледяные напитки, рыба** (особенно соленая), чеснок, **неперевариваемые вещи** (мел, глина, известь, мокрая грязь, карандаши и т. д.), лимоны, устрицы, **макаронны, соленая и кислая пища**, квашеная капуста, **уксус** и теплые супы.

ЖИВОТ

- Скопившийся газ, который, по-видимому, перемещается вперед и назад в брюшной полости.
- Результаты теста:
 - Отечный живот с исхуданием конечностей у детей с маразмом.
 - Печень и селезенка чувствительны и пальпируются, особенно при лихорадке.
 - Выступающий пупок, из которого сочится секрет (Abrot., Calc-p.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- Запор; стул у ребенка через день, при этом он либо очень мягкий и проскальзывает назад, либо очень сухой и рассыпчатый по краю ануса, с небольшим кровотечением или без него.
- Диарея, чередующаяся с запорами.
- Непроизвольное выделение стула при метеоризме.
- Зловонный метеоризм.
- Безболезненная диарея с водянистым, обильным стулом, особенно по утрам; хуже после употребления немытых фруктов или овощей на открытом воздухе, а также в летние месяцы.
- Жалобы на гельминтозы у истощенных детей.
- Результаты теста:
 - Экзематозные или герпетические высыпания вокруг ануса.
 - Выпадение прямой кишки после дефекации.
 - Кал: острицы, круглые черви или сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Может мочиться только находясь в комнате один (Амбр.).
- Частые, бесплодные позывы к мочеиспусканию ночью, с произвольным выделением мочи во время сна у мальчиков-подростков.
- Непроизвольное мочеиспускание, при котором пациенту приходится сдерживать позывы к мочеиспусканию, даже на короткое время.
- Полезно при таких состояниях, как гломерулонефрит и нефротический синдром.
- Результаты теста:
 - Стриктура уретры.
 - Моча: альбумин +, повышенный удельный вес, эпителиальные цилиндры ++, глюкоза +, лимфоциты +, эритроциты ++, осадок ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результаты теста:
 - Отечность мошонки с оттянутой крайней плотью.
 - Зловонный пот из половых органов.
 - Парафимоз.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Обильные выделения, похожие на белок, по ночам.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Охриплость голоса из-за напряжения голоса или пения.
- Днем и ночью ощущение щекотания в гортани, приводящее к сухому кашлю.

КАШЕЛЬ

- **Приступы кашля из-за раздражения или першения в гортани.**
- Приступы сухого кашля начинаются сразу же **после того, как больной приходит с улицы в теплое помещение.**
- Кашель, по-видимому, исходит из желудка (Вгу., Сер.) с удушьем.
- Сухой или хриплый, спазматический кашель, который продолжается и днем, и ночью, лишает человека дыхания и истощает его.
- Сопутствующими симптомами кашля являются носовые кровотечения и повышенное слюноотделение.
- Мокрота окрашена кровью.
- При кашле приходится держаться за грудь обеими руками, чтобы облегчить боль в груди.
- Зевание или чихание и кашель одновременно.

Грудь

- Тревожные и анемичные дети жалуются на сильное, слышимое сердцебиение от любого странного шума и в положении лежа на левом боку; лучше в положении лежа на правом боку.
- Пневмония при сыпном тифе.
- Полезно при запущенном плеврите.
- Результаты теста:
 - **Выступающие ключицы** с исхуданием окружающей области.
 - Шумы в сердце у детей, больных эндокардитом.
 - Зловонный пот в области подмышек.

НАЗАД

- Скованность и спазмы в области шеи, особенно слева, с головной болью.
- Результаты теста:
 - Истощение области шеи.
 - Знак Кернига +.

КОНЕЧНОСТИ

- Лодыжки слабые и легко сгибаются (Nat-с.).
- Сокращение мышц икр, подколенных сухожилий, рук и области коленной чашечки.
- Ребенок крайне неуклюж при ходьбе и переноске предметов, спотыкается и роняет вещи.
- Хорея от страха.
- Трещины между пальцами ног, которые сильно чешутся.
- Дрожание рук при попытке писать и вследствие шока.
- Результаты теста:
 - Чувствительные, плоские бородавки на ладонях и подошвах ног.

- Сухость и трещины кожи вокруг ногтей.
- Болезненность между пальцами ног и зловонный пот.
- Ногти: ломкие, деформированные, слоющиеся; вросшие ногти и воспаленные заусенцы.
- Кожа на руках сморщенная и увядшая.

СПАТЬ

- Ребенку снятся пугающие сны, даже во время дневного сна, которые мешают ему спать, но кажутся реальными после пробуждения.
- Спать может только на животе.
- Во время сна: стоны, подергивания, разговоры или хныканье.
- Бессонница у маленьких детей после любого стресса.
- Очень чуткий и беспокойный сон; дети постоянно ворочаются и легко пугаются малейшего шума, даже во время глубокого сна.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- До лихорадки (продромальная стадия): ребенок боится мороза, поскольку каждый приступ мороза начинается с сильных головных болей, тошноты и рвоты.
- Мороз:
 - Сильная жажда в фазе замерзания с сильными головными болями.
 - Сильный озноб, начинающийся с ступней, пальцев рук и ног или спины (Гельс.).
 - Хуже утром или в предполуденные часы (Nux-v.), не облегчается от тепла.
- Нагревать:
 - На этой стадии начинаются приступы сухого кашля, вызывающие резкое повышение температуры.
 - На этом этапе ребенок хочет укрыться.
 - Головные боли и повышенная жажда продолжают и в этой стадии, но здесь наблюдается выраженное состояние ступора (Bell., Bapt., Op.) с чрезвычайной слабостью, вынуждающей ребенка лежать.
 - При лихорадке ребенок становится нетерпеливым, раздражительным и сонным.
- Пот:
 - Обильное и изнуряющее потоотделение после стадии жара оставляет соляной налет на наволочках и простынях.
 - Пот постепенно уменьшает головную боль и жар.
- Характерной особенностью является неутолимая жажда большого количества воды на всех стадиях лихорадки.

КОЖА

- Атопическая экзема, которая обостряется на море.
- Чрезмерный рост волос у детей, со склонностью к высыпаниям в этих местах.
- Сильная сухость; просто не может потеть, даже при физической нагрузке.
- Сыпь выделяет беловатую или желтоватую жидкость, которая очень едкая и повреждает волосы (Lyc., Rhus-t.).

- Сухость и трещины кожи вокруг ногтей.
- Болезненность между пальцами ног и зловонный пот.
- Ногти: ломкие, деформированные, слоющиеся; вросшие ногти и воспаленные заусенцы.
- Кожа на руках сморщенная и увядшая.

Спать

- Ребенку снятся пугающие сны, даже во время дневного сна, которые мешают ему спать, но кажутся реальными после пробуждения.
- Спать может только на животе.
- Во время сна: стоны, подергивания, разговоры или хныканье.
- Бессонница у маленьких детей после любого стресса.
- Очень чуткий и беспокойный сон; дети постоянно ворочаются и легко пугаются малейшего шума, даже во время глубокого сна.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- До лихорадки (продромальная стадия): ребенок боится мороза, поскольку каждый приступ мороза начинается с сильных головных болей, тошноты и рвоты.
- Мороз:
 - Сильная жажда в фазе замерзания с сильными головными болями.
 - Сильный озноб, начинающийся с ступней, пальцев рук и ног или спины (Гельс.).
 - Хуже утром или в предполуденные часы (Nux-v.), не облегчается от тепла.
- Нагревать:
 - На этой стадии начинаются приступы сухого кашля, вызывающие резкое повышение температуры.
 - На этом этапе ребенок хочет укрыться.
 - Головные боли и повышенная жажда продолжают и в этой стадии, но здесь наблюдается выраженное состояние ступора (Bell., Bapt., Op.) с чрезвычайной слабостью, вынуждающей ребенка лежать.
 - При лихорадке ребенок становится нетерпеливым, раздражительным и сонным.
- Пот:
 - Обильное и изнуряющее потоотделение после стадии жара оставляет солевой налет на наволочках и простынях.
 - Пот постепенно уменьшает головную боль и жар.
- Характерной особенностью является неутолимая жажда большого количества воды на всех стадиях лихорадки.

КОЖА

- Атопическая экзема, которая обостряется на море.
- Чрезмерный рост волос у детей, со склонностью к высыпаниям в этих местах.
- Сильная сухость; просто не может потеть, даже при физической нагрузке.
- Сыпь выделяет беловатую или желтоватую жидкость, которая очень едкая и повреждает волосы (Lyc., Rhus-t.).

- Корь с сопутствующим симптомом повышенного слюноотечения.
- Крапивница с сильным зудом; хуже от малейшего воздействия тепла и физических упражнений.
- Результаты теста:
 - Плоские бородавки.
 - Герпетическая сыпь с лихорадкой.

Судороги

- Жалобы на: лихорадку, испуг, полнолуние, горе.
- Аура: Рассеянность с общим чувством тревоги или страха.
- Во время судорог: клонические подергивания, особенно в левой части тела, непроизвольное мочеиспускание, бледность лица и головокружение.

Общий

- Жалобы, вызванные злоупотреблением аллопатическими препаратами (особенно хинином) и мастурбацией.
- Дети, имеющие в анамнезе туберкулез, тревожность и депрессию.
- Пациент зябкий, не любит раскрываться, но очень хочет находиться на открытом воздухе и купаться в холодной воде.
- Хорея вследствие увещевания или эмоций (гнев, страх, шок, горе).
- Генерализованные отеки вследствие заболеваний печени или сердца.
- Вялость с желанием прилечь после еды, после чего состояние улучшается.
- Паралич, вызванный шоком или другими эмоциями.
- Пернициозная анемия вследствие горя, кровотечения или изнурительной болезни.
- Растяжения или вывихи, вызванные перенапряжением или перенапряжением мышц.
- Склонность к простудам.
- Дрожащая слабость от малейшего усилия у бледных анемичных детей.
- Хуже летом и в холодную, сырую погоду.

НАТРИЙ-КРЕМНИЙ

(Силикат натрия - Nat-sil.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети с большим **состраданием** и глубокой привязанностью к животным (своего рода перенос чувств от людей к животным).
- ▶ Ребенок скрывает свои чувства и внешне кажется очень спокойным и тихим.
- ▶ Дети, которые были брошены или оставлены без присмотра и отчуждены от своих семей.

Тело

- ▶ Жалобы после вакцинации.
- ▶ Отвращение или ухудшение состояния от холода и свежего воздуха, улучшение после горячей ванны.
- ▶ Худые, худые, быстро теряющие вес дети с хрупким телосложением.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ СИМПТОМЫ ПРИ IGN., NAT-M. И SIL.:

- Любящий, теплый.
- Неуклюжий.
- Запор с твердым стулом.
- Желание танцевать также усиливается.
- Тяга или отвращение к сладкому.
- Сны о призраках и воде.
- Нерешительность.
- Безделье.
- Сентиментальный.
- Тихая печаль.
- Кислый пот.
- Сострадательный.
- Склонность к простудам.
- Мелочи кажутся важными.
- Хуже от употребления молока.

Другие важные симптомы

Дух

- **Отвращение к обществу и желание одиночества**, которое улучшается.
- **Неуклюжесть**: роняет вещи, натывается на предметы при ходьбе и т. д.
- **Никогда не сможет заплакать, как бы грустно ему ни было.**

- **Танцы и музыка улучшают большинство психических симптомов;** также любит петь.
- **Дислексия, вызванная горем:** совершение большого количества ошибок в арифметике, устной речи или письме; неправильные ответы, забывание или путаница букв и слов в предложении; нежелание писать.
- **Ленивый и нерешительный даже в незначительных вещах.**
- Любящие и чуткие дети.
- Отвечает медленно и часто неточно.
- Отвращение к купанию.
- Может быть очень резким, критичным и грубым; иметь резкий тон голоса.
- Дети, чувствительные к грубости и мнению окружающих.
- Ясновидение.
- Депрессия и грусть, вызванные пренебрежением и недостатком любви. Депрессия характеризуется отращиванием к обществу, отращиванием к чтению, унынием, спутанностью сознания, отчаянием, недовольством - всем, скукой, импульсивными настроениями, бездеятельностью, безразличием к окружающему, грустными сновидениями или сновидениями о неудачах и бездонной пропасти, а также жалостью к себе. Депрессию всегда облегчают танцы, бег или любая другая физическая нагрузка.
- Желание сострадания.
- Страх неудачи из-за забывчивости, особенно перед экзаменами.
- Вздрагивает и подпрыгивает от малейшего шума или во время сна.
- Нерешительность в мелких вопросах, лень.
- В гневе бьется головой о предметы.
- Потеря уверенности в себе.
- Любит животных и очень сострадательны к ним.
- Обсессивно-компульсивные расстройства, такие как постоянное мытье рук, постоянная проверка всего и т. д.
- Заводит много хобби, но не задерживается ни на одном из них.

Голова

- Голова чрезвычайно чувствительна к расчесыванию.
- Головные боли после любой эмоциональной реакции и перед грозой.
- Зуд кожи головы из-за пота; необходимо почесать, чтобы почувствовать облегчение.
- Результаты теста:
 - Холодный пот на лбу.
 - Сыпь по линии роста волос.
 - Волосы: Сухие, ломкие, легко спутываются и ломаются при расчесывании.

Глаза

- Жжение в глазах при чтении или письме.
- Слезотечение при кашле, на открытом воздухе или простуде.
- Гнойные выделения из глаз, склеивающиеся по утрам.
- Результаты теста:
 - Ребенок постоянно трёт глаза.
 - Рефракционная ошибка.
 - Отек верхних век с невозможностью их открыть, особенно утром после пробуждения.

Уши

- Сильный зуд в левом ухе; расчесывание до крови.
- Результат теста:
 - Сыпь вокруг ушей.

Нос

- Повышенная чувствительность обоняния.
- Сенная лихорадка.
- Заложенность носа ночью и в положении лежа.
- Приступы чихания с зудом в ноздрях, особенно в левой, утром после пробуждения, на открытом воздухе и от запахов (цветов, духов, табака, дыма и т. д.).
- Результаты теста:
 - Выделения из задних отделов носовой полости, особенно по утрам.
 - Желтые или желтовато-зеленые выделения из носа.

Лицо

- Щеки горят.
- Результаты теста:
 - Сухие и потрескавшиеся губы, особенно в уголках рта.
 - Экзематозные высыпания по линии роста волос.
 - Жирный лоб.
 - Отеки под глазами, особенно при пробуждении по утрам.

Рот

- Прикусывание внутренней стороны щек при разговоре или жевании (Игн.).
- Во рту сухо, но жажды нет.
- Десны легко кровоточат, становятся чувствительными и болезненными при жевании.
- Неприятный запах изо рта по утрам.
- Зубная боль после пломбирования или других стоматологических процедур.
- Результаты теста:
 - Постоянно кусает нижнюю губу.
 - Разрушение зубов, особенно по краям десен.
 - Гингивит, особенно вдоль резцов.
 - Густая слюна.

Желудок

- Ночные пристрастия.
- Жажда при пробуждении утром и отсутствие жажды в течение всего дня.
- Отвращение: брокколи, вареная пища, мясо, **грудное молоко**, жирная пища, горячая пища и напитки.
- Пристрастия: **миндаль**, сыр, курица, шоколад, кофе, **холодная пища, сваренные вкрутую яйца**, рыба, фрукты, мороженое, газировка, выпечка, острая пища, чай, помидоры, йогурт.

Прямая кишка

- Жирный и липкий стул выделяется вместе с большим количеством зловонных газов.
- Безболезненная диарея при пробуждении утром.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Обильная, пенистая, зловонная, темно-желтая или оранжевая моча.
- Непроизвольное мочеиспускание при кашле.
- Внезапные позывы к мочеиспусканию; необходимо торопиться, иначе моча выйдет первой.

ДЫХАНИЕ

- Одышка во время сна, особенно после полуночи.
- Задыхаюсь от малейшего усилия.

КАШЕЛЬ

- Кашель из-за сухости и першения в горле и гортани.
- Кашель сразу после пробуждения.
- Пенистая, зеленая мокрота.
- Внезапные спазматические приступы кашля вечером при отходе ко сну; облегчение от употребления небольшого количества воды.

ГРУДЬ

- Зловонный пот из подмышек.

НАЗАД

- Пот на спине.
- Ревматические боли в области шеи, облегчающиеся от горячих компрессов.

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжесть при ходьбе или удержании предметов; постоянно спотыкается или роняет вещи.
- Мышечные спазмы и напряжение в икрах.
- Неприятный запах пота на ногах, вызывающий раздражение кожи, даже между пальцами.
- Боль в суставах кисти, пальцев и большого пальца при письме.
- Болезненная припухлость лодыжек.
- Дрожание рук при выполнении тонкой работы, например, при покраске или вышивании.
- Результаты теста:
 - Ломкие ногти.
 - Сухие, шершавые руки.
 - Экзостозы пальцев рук.
 - Ледяной холод рук, ступней и пальцев ног.
 - Волдыри на предплечьях с сильным зудом.
 - Бородавки на кончиках пальцев.

СПАТЬ

- Очень чуткий сон: просыпается от малейшего шума и кашля.
- Его мучают кошмары и пугающие сны о привидениях, крутых обрывах, диких животных, преследующих его, и т. д.
- Беспокойство и бессонница всю ночь, много ворочается с боку на бок, из-за чего трудно просыпаться утром.
- Яркие сны о прекрасных пейзажах.

Общий

- Желание физической нагрузки усиливается, но ухудшается при любой умственной нагрузке.
- Жирное потоотделение с кислым или неприятным запахом, особенно по ночам или при малейшей физической нагрузке.
- Затвердение желез.
- Недостаток жизненного тепла; хуже от холода и на открытом воздухе, лучше от горячей ванны.
- Рецидивирующие абсцессы; полезно для ускорения нагноения постоянного абсцесса.
- Вялость и апатия с постоянным желанием прилечь в течение дня.
- Склонность к простудам.
- Хуже при приближении грозы и во время полнолуния.

НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ

(Сульфат натрия - Nat-s.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Расстройства поведения после черепно-мозговой травмы** (спортивные травмы, дорожно-транспортные происшествия и т. д.).
- ▶ Дети, которые раздражительны и агрессивны после пробуждения; не хотят разговаривать и чтобы с ними разговаривали (Iod, Lys, Sil).
- ▶ Страстное стремление к учебе и учёбе.
- ▶ Очень уязвим в конфликтах, поэтому избегает любой конфронтации.

Тело

- ▶ **Астма у детей с выраженным сикотическим Семейный анамнез** (артрит, рак, гонорея, подагра, ревматизм, бородавки и т. д.).
- ▶ Дети, которые не переносят морской воздух и не могут есть овощи и фрукты, выращенные на побережье, растущие в болотистых местностях или вблизи рек.
- ▶ Дети, которые медленно выздоравливают после неонатальной желтухи или гепатита А.
- ▶ Грязно-коричневый налет на языке (Bry., Nat-p.).
- ▶ Сыпь или экзема каждую весну (Псориаз).
- ▶ Очень холодно, даже летом недостаточно тепло.
- ▶ Наличие в семье случаев рака толстой кишки, язвенного колита или

болезни Крона.

- ▶ Наследственная астма, обостряющаяся при каждом изменении погоды на влажную, при ливневых дождях или при резком похолодании.
- ▶ Младенческие или газовые колики между 2 и 3 часами ночи.
- ▶ Новорожденные и младенцы, которые никогда не были по-настоящему здоровыми после получения черепно-мозговой травмы во время родов (наложение щипцов, вакуум-экстракция или другая травма).
- ▶ После менингита так и не оправился.
- ▶ Желтоватые или зеленоватые, водянистые или густые выделения (простуда, мокрота, выделения при экземе, стул и т. д.).

Другие важные симптомы

Дух

- **Спутанность сознания, тупость и грусть после несчастных случаев или травм головы.**
- **Сильное чувство долга и ответственности.**
- Любящие, сердечные дети с большим художественным талантом.
- Неуклюжий.
- После дефекации чувствует себя бодро.
- Вялый и ленивый после завтрака и после дневного сна (Nat-c.).
- Страх публичных выступлений, замкнутых пространств и шума.
- Испытывает трудности с концентрацией и применением умственной энергии.
- Раздражительность утром при вставании, лучше вечером и после еды.
- Ревность.
- Сентиментальный.
- Хорошие навыки наблюдения и самосознания.
- Очень чувствителен к обвинениям.

Голова

- **Отек мозга** и травмы при **наложении щипцов.**
- Головные боли от запоров, каждое лето и умственного напряжения; сопровождаются болью в шее, чувствительностью к свету, тошнотой и рвотой; лучше от надавливания и мытья головы холодной водой.
- Менингит.
- Обильное потоотделение кожи головы во время чтения.
- Результаты теста:
 - Образование корок или перхоти на коже головы.
 - Голова оттянута назад.
 - Непроизвольное подергивание головы из стороны в сторону.

Глаза

- Жжение в глазах при взгляде на огонь или чтении, особенно ночью.
- Утром веки склеены.
- Зуд краев век.
- Результаты теста:
 - Гранулированные веки.
 - Птоз.
 - Конъюнктивит с образованием пустул.

Нос

- **Гнойный, густой, желтовато-зеленый насморк.**
- Носовые кровотечения во время сна.
- Заложенность носа по ночам.
- Чихание при сенной лихорадке.
- Результат теста:
 - Грязные ноздри (отд.), полные сухих зеленоватых чешуек и корок.

Лицо

- Бледное лицо **при пробуждении** утром.
- **Потливость лица после кормления грудью.**
- Результаты теста:
 - Корки на носу.
 - Сухие губы, шелушение кожи.
 - Запавшее лицо.
 - Увеличение подчелюстных лимфатических узлов.

Рот

- Ребенок постоянно тянет пальцы в рот.
- Затрудненное открывание рта.
- Повышенное слюноотделение после еды.
- Зубная боль облегчается при полоскании рта холодной водой.
- Результаты теста:
 - Толстый желтовато-коричневый или **зеленовато-серый** налет на языке, особенно на задней поверхности.
 - Неприятный запах изо рта.
 - Нагноение десен со склонностью к изъязвлению.

Шея

- Удушье при глотании жидкости.
- Результаты теста:
 - Из задней части носа выделяется **густая желтая слизь** .
 - Удлиненный язычок.
 - Увеличение миндалин, увеличение шейных лимфатических узлов.
 - Пульсирующие сонные артерии.

Желудок

- Периодическая рвота **желтовато-зеленой или черной желчью** с головной болью и гневом.
- **Расстройство желудка после употребления мучной пищи.**
- Отрыжка после кормления грудью.
- Вздутие живота и ощущение распираания в животе после кормления, сопровождающееся одышкой .
- Икота после хлеба с маслом.
- Сильная жажда и тяга к кислому после головной боли.
- Кислая отрыжка.
- Ухудшение: фрукты и овощи.
- Отвращение: хлеб, мясо, **молоко**, картофель, **йогурт**.
- Пристрастия: ледяная вода, мороженое, **соленая рыба, йогурт**.

Живот

- **Желтуха** с поносом и болью в правом подреберье **после гнева** (Cham.); **хуже от тряски** и кашля; лучше в положении лежа на правом боку с подтянутыми ногами.

- **Непереносимость лактозы.** Вздутие живота с тимпанитом и скоплением газов, особенно после употребления молока.
- Область живота очень чувствительна к одежде.
- Колит в сырую погоду (Гели.).
- Режущие, схваткообразные боли в животе у младенцев, сопровождающиеся метеоризмом; ребенок чувствует себя лучше после дефекации или отхождения газов, а также при разминании живота.
- Боль в илеоцекальной области.
- Результаты теста:
 - Аппендицит.
 - Воспалительный отек брыжеечных желез.
 - Чувствительность области печени и селезенки.
 - Язвенный колит.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Диарея после холодных напитков летом;** безболезненная диарея после выпечки, **фруктов**, мороженого, тортов, **жирной пищи** и **овощей**.
- Жгучая боль и тенезмы в прямой кишке во время дефекации.
- Понос после кашля и при желтухе, особенно в сырую погоду и зимой, при пробуждении утром; стул желтовато-зеленый, зловонный, шумный, струйный, с прожилками крови.
- Непроизвольные испражнения во время сна, при отхождении газов и мочеиспускании .
- Результаты теста:
 - Цисты и трофозоиты *Entamoeba histolytica*.
 - Цисты лямблий.
 - Зуд в области ануса.
 - Выпадение и изъязвление прямой кишки.
 - В кале: сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Острое воспаление почечной паренхимы.
- Чрезмерное мочеиспускание ночью.
- Результаты теста:
 - Розовая моча, оставляющая желтоватый или красноватый осадок в подгузнике.
 - Моча: Альбумин ++, Желчь ++, Глюкоза ++, Повышенный удельный вес, Фосфаты.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результаты теста:
 - Отёчность полового члена и мошонки.
 - Потливость мошонки.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Обильные, густые, желтовато-зеленые выделения.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Звук хрипов в гортани после кормления грудью.

ДЫХАНИЕ

- **Астма после сальной лихорадки или любой простуды.**
- **Астма, вызванная горем** (смерть родителей или домашнего животного).
- Астматическое дыхание начинается во время сна.
- Одышка от малейшего усилия или движения, а также после еды из-за метеоризма; лучше в положении сидя и на свежем воздухе.
- Постоянное желание делать длинные и глубокие вдохи.
- Одышка у младенцев с 4 до 5 часов утра.
- Периодическая астма, вызванная холодной, влажной погодой.
- Результаты теста:
 - Хриплое дыхание.
 - Задыхаюсь.

КАШЕЛЬ

- **Астматический кашель из-за влажной погоды.**
- Сухой кашель из-за першения в гортани.
- Отхаркивание обильной зеленой слизи.
- Невозможность кашлять из-за боли в груди.
- Влажный, хриплый и сильный кашель утром при вставании и ночью после 4 часов утра; вынужден сесть в постели или выйти на улицу.

Грудь

- Чувства, похожие на боль от ушиба в боках при кашле; вынужден сидеть прямо и держаться за грудь обеими руками во время кашля.
- Результаты теста:
 - Рентгенограмма грудной клетки: уплотнение в левой нижней доле.
 - Спазмы грудных мышц.
 - Увеличение подмышечных желез.
 - Туберкулез.

НАЗАД

- Боль в спине после травмы и при лихорадке.
- Результаты теста:
 - Опиистотонус.
 - Спинальный менингит.

КОНЕЧНОСТИ

- Зуд между пальцами.
- Пожимание рук при письме.
- Слабость и боли в конечностях во время и после лихорадки.
- Результаты теста:
 - Холодность рук и ног.
 - Отёчность стоп.

- Заусенцы.
- Жар в ногах и тыльной стороне кистей рук с лихорадкой.
- Чувствительные мозоли на подошвах ног.
- Волдыри на руках.
- Бородавки на руках и ступнях.

СПАТЬ

- Подергивание мышц во время сна.
- Часто меняет позу во время сна.
- Сонливость при чтении или письме.

КОЖА

- Желтуха новорожденных с желтоватым или зеленоватым оттенком кожи, особенно после гнева.
- Результат теста:
 - Бородавки.

Судороги

- Жалобы, вызванные: травмами головы или цереброспинальным менингитом.
- Эпилептиформные судороги.

ОБЩИЙ

- **Дискомфорт из-за** приближающейся грозы; изменения погоды с холодной на теплую; хронических травм; **холодной, сырой погоды; травм головы; промокания;** продуктов, содержащих хинин.
- Аллергическая конституция.
- Анемия.
- Лучше на открытом воздухе.
- Истощенные дети с ювенильным диабетом, непереносимостью лактозы или синдромом мальабсорбции.
- Нетерпимость к одежде.
- Потливость при малейшей нагрузке.
- Лейкемия (Бен.).
- Отсутствие в семейном анамнезе астмы, рака толстой кишки, болезни Крона или язвенного колита.
- Слабость после дефекации или рвоты.

АЗОТНАЯ КИСЛОТА

(Азотная кислота - Nit-ac.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Несчастливые дети;** вечно жалуются и едва ли способны угодить.
- ▶ **Упрямый и бесчувственный;** отказывается понимать чувства других.
- ▶ **Чувствителен к шуму,** особенно к погремушкам, музыкальным игрушкам и петардам.
- ▶ Сильный гнев и вспышки ярости с ругательствами.
- ▶ Дети испытывают горе, когда теряют близких друзей, родственников или одноклассников.
- ▶ Быстрое возбуждение и гнев после пломбирования зуба амальгамой (ртутью).
- ▶ Раздражительность по утрам из-за плохого сна.
- ▶ Остается враждебным очень долго, если кто-то его оскорбляет.
- ▶ Эгоистичные дети, которые не хотят делиться одеждой, письменными принадлежностями или игрушками с другими.
- ▶ Чувствительные дети, которые немедленно начинают плакать при малейшем беспокойстве или выговоре.
- ▶ Раздражается по любому поводу.

Тело

- ▶ Обильная ночная потливость.
- ▶ Дети, склонные к диарее (Calc., Phos.).
- ▶ Дети, склонные к простудам.
- ▶ Дети с темной кожей, черными волосами и глазами.
- ▶ Ледяной холод ступней.
- ▶ Большинство физических и психических симптомов улучшаются, когда ребенок совершает длительную поездку на машине.

Другие важные симптомы

Дух

- **Отвращение к ласкам** (Сакх.) или утешениям.
- **Беспричинный плач у младенцев.**
- **Дети, презирающие других,** испытывают ненависть к тем, кто их оскорблял, пренебрегал, оскорблял, наказывал или ругал. Эта ненависть может сохраняться годами, даже во взрослой жизни.

- Эмоциональные проблемы у детей, когда **между родителями происходят постоянные ссоры** (Mag-m., Nat-m.) или когда детей ругают в присутствии посторонних .
- **Повышенная чувствительность к звукам и музыке.**
- **Умные, но жестокосердные дети** , у которых отсутствуют чувства и эмоциональная связь с другими; они почти никогда не улыбаются.
- Всегда склонен противоречить или бросать вызов авторитету (Nat-m., Tub.).
- Отвращение к прикосновениям из-за повышенной чувствительности и щекотки.
- Отвращение к мытью или купанию.
- Капризный.
- Постоянное грызение ногтей.
- Неудовлетворенность всем (разочарование из-за страха за здоровье и страха остаться без внимания со стороны семьи).
- Ест и пьёт торопливо и жадно.
- Возбуждение от ссоры (Caust.) с сильным сердцебиением.
- Чувствует себя брошенным и отчужденным от своей семьи.
- Легко пуглив по мелочам; сильно боится гроз.
- Жадный и эгоистичный, лишенный моральных принципов; очень умный и хитрый.
- Постоянно вспоминает и заикливается на неприятных событиях прошлого.
- Упрямые дети, которые закатывают истерики и впадают в ярость, кричат, ругаются и плюются при малейшем возражении, выговоре или упреке, а также когда их прихоти не удовлетворяются.
- Сильное чувство долга.
- Разговаривает очень грубым и резким тоном.

Голова

- Сильная головная боль после травмы или ушибов, сопровождающаяся тошнотой и рвотой; **усиливается от малейшего шума или удара.**
- Болезненная чувствительность кожи головы к давлению головного убора (Chel., Lys.).
- Пот на лбу во время еды (Carbo-veg., Nux-v.).
- Результаты теста:
 - Голова оттянута назад.
 - Повышенное внутричерепное давление.
 - Вши.
 - МРТ: кровоизлияние в мозг; объемные процессы.
 - Отечность кожи головы у младенцев (после вакуумной экстракции).
 - Шелушащиеся, экзематозные высыпания по линии роста волос на затылке (Nat-m.).

Глаза

- Слипание век, из-за чего их трудно открыть по утрам.
- Затуманенное зрение при головной боли и чтении.
- Разрывается при чтении и на открытом воздухе.
- Вторичные инфекции после травмы глаза, вызывающие язвы роговицы (Merc-s.).

• Результаты теста:

- **Бородавки на нижних веках, которые легко кровоточат при прикосновении.**

- Помутнение роговицы (Цинк-с.).
- Расширенные зрачки, вялая реакция на свет.
- Заворот век наружу или внутрь.
- Уплотненные опухоли на веках.
- Ирит со спайками.
- Свищ слезного протока.
- Лимбус заблокирован (Апис, Кали-би.).
- Птоз правого верхнего века.
- Покраснение и воспаление глаз.

УШИ

- Глухота или снижение слуха после кори или тифа.
- Снижение слуха из-за рецидивирующих инфекций среднего уха или увеличенных миндалин.
- Боль в ухе, особенно в правом, с болезненностью в горле; усиливается при глотании.
- Воспаление евстахиевой трубы при среднем отите, вызванном рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей.
- Звуки жевания эхом отдаются в ухе.
- Результаты теста:
 - Атопическая экзема за мочкой уха.
 - Выделение зловонной коричневой ушной серы или кровянистых выделений из правого уха после кори.
 - Увеличение и нагноение лимфатических узлов перед ушами и за ними.

Нос

- Носовые кровотечения темной, жидкой кровью, которая быстро сворачивается, ночью во время сна и плача.
- Сильное, приступообразное чихание от малейшего дуновения воздуха с профузным, водянистым, острым, капающим насморком, который - закупоривает лобные и гайморовы пазухи (Кали-и.).
- Постоянное дергание за нос из-за зуда в ноздрях (Китай, Дорого.).
- Нисходящая простуда с ретроназальным катаром.
- Ночью во время сна ноздри заложены, особенно левая ноздря (Кали-би), из-за чего больной резко просыпается.
- Результаты теста:
 - **Бородавки на носу и в ноздрях (Caust.).**
 - Фетишистиевидные, зеленоватые, разъедающие выделения, оставляющие твердые корки и чешуйки; при снятии остается очень нежная, шершавая и кровянистая поверхность, которая затем покрывается новыми корками (Кали-би., Лас-с.).
 - Полипы носа.
 - Красный, шелушащийся кончик, с трещинами в уголках ноздрей.
 - Язвы в ноздрях.

Лицо

- **Потрескавшиеся и инфицированные губы и уголки рта из-за разъедающей слюны.**
- Смертельно бледное лицо, которое при кашле становится темно-красным.
- Искажение лица при глотании из-за боли.
- Сухие, потрескавшиеся и опухшие из-за постоянного ковыряния и снятия кожицы (Agut-t.).
- Результаты теста:
 - **Мягкие угри** с затвердевшим основанием.
 - **Бородавки на губах** (Caust., Kali-s.).
 - Веснушки.
 - Бледное, осунувшееся лицо.
 - Подчелюстные лимфатические узлы и околоушные железы увеличены.

РОТ

- **Прикусывает щеку при разговоре и жевании** (Caust., Ign.).
- Затрудненное прорезывание зубов, зубы черные, гнилые (Chin., Creos.).
- Десны легко кровоточат, наблюдается тенденция к выделению гноя.
- Результаты теста:
 - Дряблый язык с толстым желтоватым или зеленоватым слизистым налетом и **трещинами во всех направлениях** (Fl-ac.).
 - Грязные на вид афтозные язвы по бокам языка и неба, с жирным дном.
 - Зловонное дыхание.
 - Ранула [киста дна полости рта].
 - Молочница во рту.

ШЕЯ

- **Боль в горле распространяется на уши при глотании** (Elaps, Phyt.).
- Рвотные позывы при глотании твердой пищи или жидкости из-за спазмов в пищеводе.
- Хронический рецидивирующий тонзиллит.
- Результаты теста:
 - **Потливость наружной части шеи по ночам.**
 - **Бородавки на шее.**
 - Шейные лимфатические узлы увеличены и чувствительны из-за тенденции к нагноению.
 - Отёчный отёк язычка.
 - Густой, желтый ретроназальный катар.

ЖЕЛУДОК

- **Не** переносит жирную пищу и молоко в любом виде; они вызывают - расстройство желудка, тошноту и т. д.
- Отвращение к еде после употребления нескольких кусочков.
- Отрыжка после кормления грудью.
- Необходимо пить много воды во время еды или сразу после пробуждения утром.
- «Отрыжка» при простуде или после употребления спиртного.

земля, известь, стилос и т. д.), лимонад, баранина, свинина, острая пища, **соль**, соленая рыба, сладости.

ЖИВОТ

- **Бульканье во время еды.**
- Хронический гепатит, вызванный амебиазом.
- Результаты теста:
 - Паховые лимфатические узлы увеличены.
 - Паралитическая непроходимость кишечника.
 - Селезенка и печень увеличены, твердые и болезненные на ощупь.
 - Ущемленная паховая грыжа (Nux-v., Op.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Ребенок очень раздражителен и беспокоен после дефекации из-за болей в прямой кишке.**
- Полная неподвижность прямой кишки или спазматическое сокращение мышц прямой кишки вызывают у маленьких детей сильные запоры, затрудняющие дефекацию даже мягкого стула.
- Острый стул, который вызывает болезненные ощущения или разрывает анус, даже если он мягкий.
- Диарея в зимние месяцы (Nat-s.).
- Зуд заднего прохода, вызванный круглыми червями.
- Зловонный метеоризм.
- Стул: Сухой и твердый, как черные шарики, с прожилками крови.
- Результаты теста:
 - **Выделение резкой влаги из прямой кишки** (Carbo-veg., Merc-s., Thuj.).
 - Трещины.
 - полипы.
 - Выпадение прямой кишки.
 - Наружный геморрой.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Непроизвольное мочеиспускание при кашле и ночью.
- Скудное выделение мочи при лихорадке с сильной болью.
- Результаты теста:
 - Спастическое сужение уретры (кант.).
 - Красноватый осадок в подгузниках.
 - Покраснение, изъязвление и спайки наружного отверстия уретры.
 - Моча: Альбумин ++, Билирубин +, Гной +, Эритроциты ++, Увеличение удельного веса, Глюкоза ++.
 - Моча имеет резкий аммиачный запах (кашицеобразная).

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результаты теста:
 - Уплотнение правого яичка.
 - Фимоз и парафимоз с нагноением под крайней плотью.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Круп со сужением гортани во время сна (Lach., Spong.).
- Охриплость при каждой простуде (Ires.), хуже от разговора.

ДЫХАНИЕ

- Одышка по утрам при пробуждении и после разговора; лучше от отхаркивания.
- Одышка во время сна и при кашле.
- Результаты теста:
 - Свистящее, хриплое дыхание.
 - Свистящее дыхание при вдохе.

КАШЕЛЬ

- Лающий кашель вечером и во время сна.
- Приступы кашля, провоцируемые промоканием или холодным сквозняком. Мокрота отходит только по утрам ; слизисто-гнойная, желтоватая или зеленоватая, с прожилками крови и зловонная.
- Короткий, сухой, отрывистый кашель из-за першения в гортани ночью до - полуночи; влажный кашель утром.

Грудь

- Результаты теста:
 - **Зловонный пот под мышками.**
 - **Опухание подмышечных желез**, склонных к нагноению и образованию абсцессов.
- Шумы в сердце.
- Длительная пневмония и плеврит.
- Пневмонические симптомы при сыпном тифе.
- Туберкулез легких.
- Бородавки на груди.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Учащенное сердцебиение от малейшего движения или волнения.
- Результаты теста:
 - Пульс: частый, **прерывистый**, каждые 3, 4 или 5 ударов.
 - Шумы в сердце.

НАЗАД

- Травмы позвоночника.
- Скованность шейного отдела после простуды (Dulc., Rhus-t.).
- Результаты теста:
 - Потливость в области шеи.
 - Расщелина позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

- Обильный, зловонный пот ног, вызывающий болезненность подошв и пальцев ног (Bar-c., Calc., Sil.).
- Боли в костях по ночам (Conch., Merc., Syph.).
- Судороги в подошвах стоп и икрах по ночам.

- Спонтанный вывих тазобедренного сустава.
- Тремор конечностей из-за гнева.
- Слабость в голеностопных суставах, особенно ощущаемая при ходьбе (Nat-c.).
- Результаты теста:
 - Бородавки на тыльной стороне кистей и пальцев (Anac., Dulc., Lac-c.).
 - Глубокие кровотокающие трещины на руках.
 - Болезненность между ягодицами и бедрами.
 - Экзостозы большеберцовой кости (Syph.).
 - Ногти: ломкие, изогнутые, деформированные и с белыми пятнами.
 - Повышенная потливость ладоней и ступней.
 - Чувствительные мозоли.

СПАТЬ

- Во время сна: повышенное слюноотделение, подергивание мышц, стоны, вздрагивание, разговоры, метания и плач.
- Потливость головы ночью в постели.
- Лунатизм.
- Вздрагивает во сне из-за кошмаров и кашля.
- Внезапное пробуждение в 2 часа ночи, после чего наступает бессонница.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Озноб с лихорадкой, но хочется раскрыться.
- Нагревать:
 - Сухой внутренний жар, но наружные части тела холодные, или горячая голова и холодные ноги при лихорадке. Жар особенно ощущается в подмышках, спине, груди и глазах.
 - Повышенное слюноотечение, тошнота, боль в глазах, учащенное сердцебиение, сильная слабость и беспокойство нижних конечностей в жару.
 - Хуже: после еды; во время сна (Samb.).
- Пот:
 - Потливость, особенно ладоней и ступней после воздействия тепла.
- Лихорадка с увеличенной и болезненной печенью.

КОЖА

- Сыпь с корками и сильным зудом кожи, особенно на открытом воздухе; приходится расчесывать до крови.
- Воспаленные, болезненные и волдыри от обморожения.
- Результаты теста:
 - Глубокие кровавые разрывы отверстий и других слизистых оболочек.
 - Большие, зазубренные, ороговевшие или имеющие ножку бородавки, которые легко кровоточат при прикосновении или мытье.
 - Темные веснушки.
 - Сыпь и язвы, которые легко кровоточат при прикосновении.
 - Келоиды.
 - Невусы.
 - Нездоровый вид кожи.

Судороги

- Аура / перед судорогами: мурашки по телу и крики.
- Во время судорог: **крик, скованность конечностей, прикусывание языка.**
- Хуже всего в левой части тела и ночью, особенно после полуночи.
- Лучше во время вождения.

Общий

- **Зябкий, склонный к простудам, но ненавидящий укрываться.**
- Симптомы **усиливаются ночью** и в **холодную, сырую погоду.**
- **Обильное потоотделение во время еды и от малейшей физической нагрузки.**
- Чувствительность к **холоду**, перемене погоды, **сквознякам, шуму** транспортных средств или даже шагам, боль.
- Абсцессы с острыми, кровянистыми, зловонными и желтыми выделениями.
- Жалобы, вызванные аллопатическими препаратами, особенно непреднамеренным применением антибиотиков против вирусных инфекций (Nix-v.) или подавлением потоотделения ног (ношением нейлоновых носков или парусиновой обуви) или подавлением ринита (использованием антигистаминных препаратов в виде назальных спреев или сиропов).
- Отвращение к купанию.
- Выделения (простуда, мокрота, рвота, диарея, слюна, моча, экзематозная жидкость): резкие, кровянистые, коричневатые, жгучие, зловонные, жидкие, грязные, желтовато-зеленые, вызывающие покраснение и разрушающие волосы.
- Водянка вследствие заболевания почек (Colch., Oxyd.).
- Истощенные и анемичные дети.
- Отверстия тела красные, опухшие или треснувшие.
- Обильный, вонючий, едкий пот, особенно на укрытых частях тела или на тех частях, на которых он лежит, окрашивает простыню в коричневый цвет.
- Рахит.
- Переломы заживают медленно.

Нукс Вомика
(Nux - Nux-v.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Целеустремлённый** (хочет быть лучшим), **амбициозный** (движимый своими целями), **вспыльчивый и вспыльчивый** (Карцинома, Мед., Сульф.). Фанатичный (усердный); неспособный расслабиться, постоянно учится.
- ▶ **Очень осторожные** дети, **педантичные и целеустремленные**; быстро злятся, если что-то беспорядок.
- ▶ Дети, которые **не переносят шум** (например, громкую музыку).
- ▶ **Самостоятельные дети**, которые с самого раннего возраста предпочитают все делать самостоятельно.
- ▶ Ориентирован на сроки, не умеет ждать, **крайне пунктуален** во всех процессах.
- ▶ Дети, которые всегда чем-то заняты (Hyos., Iod., Lach., Op., Sulph., Tarent., Verat.).
- ▶ Дети, склонные к злобе, злобе и гневу (Ганеман).
- ▶ Дети, которые любят ругать своих младших братьев и сестер (им нравится доминировать над теми, кто ниже их по статусу).
- ▶ Им не нравится, когда кто-то пользуется их личными вещами, потому что они боятся, что их не вернут на место после использования [*заголовок: не успокоятся, пока вещи не будут возвращены на место*].
- ▶ Дети с низкой переносимостью даже более легких заболеваний.
- ▶ Завистливые дети, которые не могут видеть, что другие учатся лучше (Хьюс., Смех.).
- ▶ Дети, которых легко напугать.
- ▶ Перфекционизм.

Тело

- ▶ Подходит для детей, стремящихся к обучению, любознательных, у которых возникают проблемы с желудком и кишечником **из-за чрезмерной учебы** и недостатка физической активности.
- ▶ Раннее **пристрастие к чрезмерному потреблению стимуляторов**, таких как чай, кофе и фастфуд (острый и жареный).
- ▶ Дети, чувствительные к холоду (воздуху, ванне, климату, сквознякам, напиткам, температуре, погоде, ветру и т. д.).
- ▶ **Пупочная грыжа** из-за запора или плача.
- ▶ Полезно, если ребенку **дали слишком много лекарств**, таких как сиропы от кашля, антигистаминные препараты, слабительные, антибиотики и т. д.
- ▶ Дети часто просыпаются от приступа чихания.
- ▶ Дети, родившиеся с проблемами пищеварения и никогда не бывшие по-настоящему здоровыми.

- ▶ Дети, которые длительное время перенапрягались, готовясь к экзамену, и не высыпались (Сосс., Nit-ac.).
- ▶ Колики у детей, находящихся на грудном вскармливании, возникают, когда мать употребляет слишком много стимуляторов (чай, кофе, алкоголь, острая или горячая пища).
- ▶ М. Крон, язвенный колит (Merc.).
- ▶ Чрезвычайно чувствительны к запахам.
- ▶ Пот на верхней губе.
- ▶ Задержка мочи у новорожденных, облегчаемая теплой ванной.
- ▶ Худой, изможденный, с крепким телосложением, темными волосами и темной кожей.

Другие важные симптомы

Дух

- Жалобы из-за **неудовлетворенных амбиций**, например, неизбрание в качестве представителя класса или проигрыш в школьных или спортивных соревнованиях.
- **Ненавидит, когда его беспокоят, когда он занят.**
- **Чувствительность к шуму и музыке;** значительно ухудшается.
- **Склонность постоянно хмуриться.**
- Оскорбительный.
- Неуклюжесть из-за застенчивости; роняет вещи.
- Капризный.
- Жалуется во сне (критичные натуры).
- Всё и все неправы; прав только он.
- Становятся очень раздражительными, когда им задают слишком много вопросов о них (они ненавидят любопытных людей).
- Поздно учится писать.
- Во время разговора делает много жестов руками (Arg-n., Lach., Sep.).
- Делает много ошибок при разговоре, письме или различении предметов.
- Стоны от боли и жара.
- Дружелюбен с незнакомцами (любит производить впечатление на посторонних); груб и оскорбителен с членами семьи.
- Трудности в обучении, особенно арифметике.
- Не по годам развитые дети.
- Тщеславие.
- Очень непослушные, злобные, упрямые, лживые, сложные дети с проблемами поведения; вспышки ярости с деструктивными тенденциями (рвать, ломать, пинать, кусаться, кричать, плевать, бить и т. д.) при малейшем противоречии или когда их заставляют отвечать, с красным лицом.
- Очень жадные, эгоистичные и сварливые дети, которые любят драться, издеваться и высмеивать других детей в школе.
- Плач после гнева (быстрое и легкое раскаяние).

Голова

- Голова **очень чувствительна к сквознякам.**
- Головные боли, вызванные **недостатком сна или чрезмерной учебой** по ночам.
- **Пот на лбу при употреблении острой и горячей пищи.**
- Головная боль от переедания, прорезывания зубов, гнева, воздействия холода, испуга, шока, шума или звука шагов, подавленного потоотделения; лучше от укутывания головы или прикладывания горячих предметов.
- Результаты теста:
 - Кровоизлияние в мозг.
 - Когда у ребенка болит голова, он хочет наклонить голову, лечь или обхватить ее руками.
 - Гидроцефалия.
 - Неспособность поднять или удерживать голову вертикально (детский церебральный паралич).

Глаза

- Разрывается от простуды.
- Полезно при **остром конъюнктивите у младенцев и детей младшего возраста** (Arg-n., Puls.).
- Боль в глазах по утрам при пробуждении или при нагрузке на глаза; лучше от холодных компрессов.
- Чувствительность к свету во время истерик и головных болей.
- Результаты теста:
 - Атрофия зрительного нерва.
 - Налитые кровью глаза с диким взглядом.
 - Расширенные зрачки при лихорадке.
 - Дальновзоркость.
 - Нистагм; маятникообразные движения из стороны в сторону.

Уши

- **Снижение слуха при простуде** (Cham., Puls.).
- Заболевания ушей, особенно правого.
- Боль в ухе, вызванная воздействием ветра, нахождением в теплом помещении или глотанием.

Нос

- **Повышенная чувствительность к обонянию**, особенно к запахам цветов; **длительные приступы чихания.**
- **Обильный, болезненный нос в течение дня; сухой нос ночью.**
- Катар распространяется на лобные пазухи.
- Постоянное дергание за нос из-за зуда в ноздрах.
- Насморк во время еды; с повышенной сонливостью.
- Шмыгание носом у новорожденных, особенно ночью и в теплых помещениях.
- Сильные приступы чихания при пробуждении по утрам и при раскрытии носа, с обильным водянистым насморком.

- Результаты теста:
 - Корки и чешуйки в ноздрах.
 - Острый и заостренный нос.

Лицо

- **Прыщи на лбу возникают из-за проблем с желудком, особенно при запорах и после употребления сыра.**
- Результаты теста:
 - **Трещины на нижней губе, особенно посередине;** постоянное оттягивание губ.
 - Темные круги вокруг глаз.
 - Левый угол рта опущен вниз (левосторонний паралич VII нижнего двигательного черепного нерва - лицевого нерва).
 - Одна сторона бледная и холодная, другая красная и горячая.
 - Пот на верхней губе.
 - Покраснение лица с лихорадкой.
 - Увеличенные подчелюстные лимфатические узлы.
 - Дрожащие губы.
 - Нахмуренные брови.

РОТ

- **Желание постоянно стискивать зубы.**
- **Неприятный запах и привкус во рту при пробуждении утром (пульс).**
- Затрудненное прорезывание зубов.
- Зубная боль после пломбирования.
- Зубы чувствительны к холодной воде (кальцинация).
- Результаты теста:
 - **Язык сухой и потрескавшийся, особенно по бокам**, на задней поверхности имеется толстый желтый налет (Merc-ir.).
 - **Язвенный стоматит; ротовая полость покрыта язвами, которые мешают ребенку сосать грудь.**
 - Обильное слюнотечение после еды и ночью.
 - Губчатые, цинготные десны, которые легко кровоточат.
 - Заикание.

ШЕЯ

- **Удушье при отходе ко сну** (лай, смех); постоянно приходится прочищать горло или сглатывать, чтобы почувствовать себя лучше.
- Необходимо всегда держать горло хорошо прикрытым (Нер., Kali-c., Sil.).
- Боль в горле распространяется на уши при глотании или кашле; лучше от теплого питья.
- Боль в горле при простуде.
- Результаты теста:
 - Отёчность язычка и миндалин.
 - Выступающие и вздутые вены на шее.
 - Кривошея; шея оттянута в левую сторону (Лус., Phos.).

ЖЕЛУДОК

- **Рвота желчью, зловонная, горькая или кислая, с тошнотой и коликами в животе, после гнева, переедания и при лихорадке, лучше от питья теплых жидкостей.**
- **Повышенная чувствительность живота к прикосновению, даже к давлению одежды.**
- **Сильная, спазматическая икота** при рвоте или после еды или питья.
- Спазмы в желудке с позывами к дефекации сразу после еды (Алоэ) (лямблиоз или амебная инфекция); лучше, если свернуться калачиком.
- Голод, но отвращение к еде.
- Позывы к еде из-за диареи, дизентерии или кашля.
- Рвота и позывы к рвоте сразу после питья или кашля или через несколько часов после еды.
- Замедленное пищеварение с дискомфортом после употребления жирной, молочной или кислой пищи.
- Теплая еда и напитки улучшают состояние.
- Отвращения: хлеб, кофе, еда, лимоны, мясо, вода.
- Пристрастия: горькая пища, черный перец, жирное, трудноперевариваемые продукты (лайм, грифель карандашей), перец, свинина, специи, **стимуляторы, сладости.**

ЖИВОТ

- **Колики у грудных детей, вызванные стимуляторами, принимаемыми матерью.**
- Спазматические, спастические боли в животе при запоре, через 2–3 часа - после еды или после гнева у младенцев; усиливаются от прикосновения, уменьшаются после дефекации, сгорбления и от местного применения тепла.
- Полоскание горла живота по утрам.
- Неонатальная желтуха вследствие подавленного материнского гнева во время беременности (Cham.).
- Тимпаническое вздутие живота после еды или питья.
- Результаты теста:
 - **Левосторонняя паховая грыжа у детей с выраженной болезненностью, которая может указывать на ущемление.**
 - **Пупочная грыжа.**
 - Асцит.
 - Инвагинация.
 - Печень твердая и чувствительная на ощупь.
 - Паралитическая непроходимость кишечника.
 - Перитонит.
 - Увеличенная селезенка.
 - *Tabes mesenterica* [кишечный туберкулез].

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Понос после гнева (Coloc., Gels.) или испуга (Gels.).**
- **Постоянные запоры у новорожденных.**

- **Тенезмы и жгучие боли в животе, облегчающиеся после дефекации .**
- Постоянные, бесполезные позывы к дефекации из-за колик.
- Диарея, чередующаяся с запорами.
- Диарея у младенцев после грудного вскармливания или вследствие малейшего изменения рациона питания.
- Выделение большого количества зловонных газов во время дефекации (лямблиоз) и при кашле.
- Непроизвольные дефекации при метеоризме.
- Стул: черный, обильный, твердый, сухой и очень зловонный, с прожилками кровавой слизи.
- Результаты теста:
 - Болезненность прямой кишки из-за едкого стула.
 - Трещины.
 - Большие, ущемленные, слепые или обильно кровоточащие геморроидальные узлы.
 - Мокнувшая, зудящая кожа вокруг ануса.
 - полипы.
 - Выпадение прямой кишки во время дефекации.
 - В кале: цисты амёб, лямблии *Giardia*, острицы, круглые черви и сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Спастическое сужение уретры вызывает болезненную задержку мочи у новорожденных.
- Дизурия с болезненными спазмами мочевого пузыря; плач и крики перед мочеиспусканием .
- Спастический ночной энурез.
- Результаты теста:
 - Грязный желтоватый или красноватый осадок в подгузниках.
 - Пиелонефрит (вследствие врожденного сужения пиело-мочеточникового угла).
 - Моча: Альбумин ++, Глюкоза ++, Лейкоциты ++ и Эритроциты +.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Орхит после свинки.
- Результаты теста:
 - Гидроцеле.
 - Парафимоз.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Выделения у молодых девушек; постоянные, незначительные и зловонные, оставляют желтые пятна на одежде.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Периодическая потеря голоса или охриплость.

- Хрипы от мокроты в гортани и трахее, особенно по утрам; мокрота отходит с трудом.
- Першение в гортани из-за кашля и вдыхания холодного воздуха.

ДЫХАНИЕ

- **Астма зимой.**
- Аллергия на пыль или клещей, вызывающая бронхоспазмы.
- Дыхание затруднено или затруднено при кашле или из-за метеоризма.
- У новорожденных дыхание нарушается после полуночи.
- Результаты теста:
 - Горячее дыхание.
 - Хрипы от мокроты в груди.
 - Свистящее или хриплое дыхание с хрипящим выдохом.

КАШЕЛЬ

- Постоянный, сухой, изнуряющий кашель с лихорадкой или во время еды.
- Кашель при выходе с улицы в теплое помещение, облегчается от теплого питья.
- Сухие, непрекращающиеся приступы кашля у младенцев, вызванные гневом.
- Приступы спазматического, сухого, сильного кашля после того, как ложится спать ночью, лучше в положении на боку.
- Ребенок падает из-за сильного кашля.
- Результат теста:
 - Держит голову во время кашля.

Грудь

- **ощущение холода в груди; необходимо постоянно держать грудь тепло укрытой.**
- Пневмония у младенцев и детей младшего возраста (Ant-t., Ipec.).
- Результат теста:
 - Зловонный пот подмышек, оставляющий красноватые пятна на одежде (Carbo-veg., Lach.).

НАЗАД

- **Боль в спине после гнева и от сквозняков** (Verat.); хуже от переворачивания в постели; сначала вынужден сесть, а затем перевернуться; **лучше от теплых компрессов** (Rhus-t.).
- Пот на шее.
- Скованность шеи из-за простуды.
- Результаты теста:
 - **Спазматическое натяжение в шее, тянущее голову назад.**
 - Опиостотонус.
 - Спинальный менингит.

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжесть конечностей; роняет предметы, спотыкается или натывается на предметы, падает при ходьбе.

- Небольшой вывих лодыжек (Nat-c., Ruta).
- Во время бега его колени сталкиваются, из-за чего он спотыкается и падает.
- Пот, особенно на ладонях.
- Болезненные мозоли.
- Результаты теста:
 - Синюшные, цианотичные руки и ногти.
 - Синевато-черные экхимотические пятна на ногах.
 - При беге волочит ноги.
 - *Genu valgum* или *genu varum*.
 - Вены на руках вздуты.

СПАТЬ

- Очень чуткий сон, просыпается от малейшего шума.
- Во время сна: скрежет зубов, подергивание конечностей, стоны, открытый рот, слюнотечение, вздрагивание, как от испуга, разговоры, метания и плач.
- Засыпает, когда пытается сидеть и читать (Гел.), особенно вечером.
- Поздно засыпает и с трудом просыпается утром.
- Нарушения сна у детей в полнолуние.
- Короткий сон освежает его.
- Сонливость во время головной боли и после еды.
- Спит на спине, положив руки под затылок или над головой, а нижние конечности раскинув.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Недомогания от: гнева, осени, прорезывания зубов, расстройства желудка, чрезмерной учебы, пребывания на открытом воздухе.
- Отвращение к раскрытию на любой стадии лихорадки, с желанием тепла, которое не улучшает состояние.
- Мороз:
 - Сильный озноб, ледяное тело и синюшный оттенок лица, рук и ногтей.
 - Заморозки с нерегулярной периодичностью у детей, склонных к рецидивирующей малярии.
 - На этой стадии лихорадки возникают судороги с дрожью тела или попеременным сгибанием и разгибанием конечностей.
 - Хуже после питья, от физической нагрузки, от малейшего сквозняка, по утрам и на свежем воздухе.
- Нагревать:
 - Обострение слуха, боли в спине, сухость и боль в гортани с сухим приступообразным кашлем, сильная жажда, боль в глазах, обильное слюнотечение и скудная красновато-коричневая моча после длительного безуспешного позыва к мочеиспусканию.
 - Одностороннее сухое, жгучее тепло тела или только лба; очень горячие, ледяные руки.
 - В период течки ребенок становится молчаливым и очень сонным.
 - Хуже ночью.
- Фаза тепла чередуется с фазой заморозков.
- Нерегулярные приступы лихорадки, нарастающие по интенсивности.

КОЖА

- Крапивница вечером или ночью.
- Результаты теста:
 - Мурашки по коже (черт возьми).
 - Невусы.

Судороги

- Дискомфорт, вызванный: После кормления, **гневом**, коликами, прорезыванием зубов, **волнением**, лихорадкой, кровотечением, **травмой, светом**, мастурбацией, движением, **шумом, видом незнакомых людей**, во время дефекации, **глистами**.
- Перед судорогами: отрыжка.
- Во время судорог:
 - Судорожное сжимание или сокращение сухожилий рук и ног, двоение в глазах, одышка, **непроизвольное мочеиспускание**, потливость, **ярость, красный или синюшный цвет лица, крики** и плач.
 - Во время эпилептического припадка ребенок находится в сознании.
 - Ребенок лежит с вытянутыми конечностями.
 - Судороги у новорожденных усиливаются под воздействием яркого света, сквозняков и прикосновений.
 - Судорожные движения устраняются путем крепкого удерживания ребенка и принудительного вытягивания его тела.
 - Голова откидывается назад или ребенок падает назад или на бок.
 - Нижние конечности попеременно сгибаются и вытягиваются.
- После судорог: бессонница или **глубокий сон**.

Общий

- Заболевания, вызванные злоупотреблением слабительными средствами или хинином (и всеми другими противомаларийными препаратами); **изменениями погоды; сухой, холодной погодой**; кровотечениями; мастурбацией; **подавленными простудами или сыпями**.
- Упасть с ледяной кожей.
- Цианоз.
- Изнуряющий пот с неприятным кислым запахом, оставляет красные пятна на одежде; потеет при малейшей провокации.
- Отеки вследствие заболевания печени (билиарная атрезия, ведущая к циррозу).
- Потеря веса у младенцев, несмотря на пристрастия к еде.
- Обмороки в переполненном помещении, из-за запахов, после диареи, из-за гнева.
- Нетерпимость к одежде.
- Правосторонние жалобы.

Источник

- Синоним: *Strychnos nux vomica*. Семейство Loganiaceae.

OENANTHE CROCATА

(Ядовитый зонтик виноградной лозы – Оэна.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ В гневе они агрессивны, оскорбительны и деструктивны; рвут вещи на части; отрывают пуговицы от одежды; крайне нервны и недовольны. Дети ведут себя так, потому что родители, которые сами страдают хронической эпилепсией, их чрезмерно балуют.
- ▶ Неуклюжие дети, которые постоянно причиняют себе вред.
- ▶ Судороги, похожие на эпилептические, с опухшим, землистым или бледным лицом, пристальным взглядом или запавшими глазами: спазмы вначале клонические, а затем тонические.
- ▶ Судороги с пеной у рта, остановкой дыхания, похолоданием конечностей, слабым пульсом, прикусыванием языка, непроизвольным стулом и мочой, расширением зрачков, бульканьем в пищеводе, синюшным или красным лицом и сжатыми пальцами.
- ▶ Судороги усиливаются во время сна, кашля и прорезывания зубов.
- ▶ Судороги с похолоданием тела.
- ▶ Падение назад во время судорог.
- ▶ Эпилепсия вследствие черепно-мозговых травм.
- ▶ Засыпает между судорогами.
- ▶ Беспокойство после судорог.
- ▶ Крики перед приступами судорог и во время них.
- ▶ Тяга к уксусу и острой пище, отвращение к сладкому и фруктам.
- ▶ Повышенная жажда.
- ▶ Внезапные позывы к мочеиспусканию с внезапной сильной болью, если позыв не сдержать.
- ▶ Зловонный пот.

Источник

- Семейство Зонтичные (Apiaceae/Umbelliferae).

ОЛЕАНДР

(Олеандр - Стар.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Замедленное умственное развитие, плохая концентрация, особенно при чтении. Ощущение пустоты при попытке сосредоточиться. Трудности в обучении и очень низкая производительность при выполнении интеллектуальных задач. Замедленное понимание и отсутствие мыслительной деятельности. Эта умственная слабость приводит к сильному гневу, который быстро провоцируется, особенно при столкновении с противоречиями.
- ▶ Мокнувшие высыпания, особенно на голове; на затылке или по линии роста волос образуются влажные, толстые корки. Седой дерматит у новорожденных.
- ▶ Высыпания, похожие на экзему, за ушами, вокруг них и перед ними, на лице, лбу и носу. Они жгучие, покрыты коркой, влажные и шелушащиеся. Зуд усиливается ночью, а сыпь усиливается после расчесывания.
- ▶ Белый налет на языке.
- ▶ Желание апельсинов и холодных напитков. Хуже после употребления апельсинов; сильное отвращение к сыру.
- ▶ Диарея у детей в период прорезывания зубов с жидким, жёлтым стулом, обычно содержащим неперевааренную пищу, оставшуюся после предыдущего дня. Газы сопровождаются непроизвольным, водянистым, кислым стулом.
- ▶ Диарея усиливается по утрам, сильное жжение в заднем проходе до и после стула.
- ▶ Диарея у детей, в семейном анамнезе которых есть туберкулез.
- ▶ Урчание в кишечнике с отхождением газов, пахнущих тухлыми яйцами. Частое загрязнение нижнего белья из-за газов. Олеандр лечит эту неприятную проблему гораздо лучше любого другого средства Materia Medica, когда стул выходит непроизвольно и неперевааренным, как описано выше.
- ▶ Атопическая экзема, аллергическая экзема и контактный дерматит у детей.
- ▶ Чувствительность кожи к малейшему трению, в результате чего она становится болезненной и ломкой.
- ▶ Морозно, но хочется пить и холодной воды.

Источник

- Это растение, также называемое розовым лавром, принадлежит к семейству кизиловых (Arosupaseae).

OLEUM ANIMALE AETHEREUM

(Костное масло - Ол-ан.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Подавленный и грустный, а потому рассеянный, мечтательный, тупой и сварливый.
- ▶ Задержка развития и роста.
- ▶ Мигрень у детей со слабым зрением. Головные боли обычно возникают после ужина и усиливаются при любой умственной нагрузке.
- ▶ Сильная потливость головы, потоотделение во время еды.
- ▶ Подергивание век (как у *Agaricus*) и подергивание губ.
- ▶ Бронхиальная астма вследствие подавленной потливости ног.
- ▶ Желание съесть яйца всмятку и отвращение к мясу.
- ▶ Обильное выделение мочи с запахом рыбного рассола.
- ▶ Опухание яичек и боль по ходу семявыносящих протоков.
- ▶ Беспокойные конечности.
- ▶ Сильные боли роста.
- ▶ Трение в сгибах суставов, вызывающее болезненность.
- ▶ Морозный.

Источник

- Пироил; его получают путем перегонки оленьих рогов.

OLEUM JECORIS ASELLI

(Рыбий жир - Ol-j.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Туберкулез в семейном анамнезе.
- ▶ Истощение, беспокойство и лихорадка по ночам, как у Jod., Phos и Tub.
- ▶ Туберкулез у детей – изможденность, худоба и истощение; сухой, отрывистый и раздражающий кашель, усиливающийся ночью, с саднением и острыми, колющими болями в груди; гектическая лихорадка с ночными потами.
- ▶ Рахит. Выглядит бледным, истощенным и старым, с увеличенной головой из-за несращения черепных швов. Также наблюдаются задержка прорезывания зубов; увеличенный, выступающий живот; увеличенная печень и увеличенные брыжеечные лимфатические узлы; и карликовость из-за задержки формирования костей.
- ▶ Чрезмерный рост волос на лице.
- ▶ Склонен к катаральным инфекциям, особенно ушей и носа.
- ▶ Потеря веса после диареи.
- ▶ Ухудшение и отвращение: молоко.
- ▶ Горячие руки и горячая голова.
- ▶ Боли роста, в основном в ногах.
- ▶ Склонность к простудам.

Источник

- Изготовлено из свежей печени трески.

ОПИУМ

(Papaver somniferum — Опиный мак — соч.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Дети-сорвиголовы** не умеют правильно оценивать опасность.
- ▶ Поведенческие нарушения и неврологические проблемы, вызванные смерть **в семье** или **пугающее событие** ; шок настолько глубоко запечатлевается в костях ребенка, что **страх перед шоком может сохраняться годами** .
- ▶ **Равнодушие к боли** (побоям или наказаниям со стороны родителей). Ребёнок становится нелюбящим и жестокосердным, не проявляет никакой привязанности.
- ▶ Антисоциальное поведение у детей из неполных семей и после сексуального насилия.
- ▶ Дети, родившиеся во время войны, часто нуждаются в хирургическом вмешательстве (Страм.).
- ▶ После многократных болезненных переживаний ребёнок отстраняется от внешнего мира и замыкается в себе. Эта внутренняя отстранённость проявляется в рассеянности, безразличии, безразличии, задумчивости, спутанности, мечтательности, вялости, лени, отстранённости, оцепенении и молчаливости.
- ▶ Нарушение памяти и притупление внимания у детей, длительно принимающих фенотимал для лечения эпилепсии.
- ▶ Дети-обманщики и клептоманы, которые постоянно подвергаются физическому насилию и обвинениям со стороны своих родителей.
- ▶ Скрытая агрессия у детей, подвергающихся притеснениям, оскорблениям, наказаниям и критике со стороны родителей или учителей. Эта агрессия может проявляться в швырянии предметов, грубости, укусах, деструктивных действиях, злобе, ссорах и бурных вспышках гнева.
- ▶ Жизнерадостный и энергичный. Постоянно нуждается в занятиях, особенно по ночам; особенно любит рукоделие, рисование, живопись и т. д.

Тело

- ▶ Жалобы после **черепно-мозговой травмы** (наложение щипцов, механическая травма, несчастный случай, операция на черепе).
- ▶ Новорожденные с **низкими оценками по шкале Апгар**.
- ▶ Асфиксия новорожденных.
- ▶ Тревожное и пьяное выражение лица с расширенными зрачками, темно-красным лицом и толстыми губами.
- ▶ Фотостатичные зрачки и анизокория (неодинаковый размер) при коме с хрипами.
- ▶ Уже имел околосмертный опыт, например, анафилактический, кардиогенный или нейрогенный шок.
- ▶ Новорожденные, которые полностью красные.

- ▶ Задержка мочи или остановка дыхания у новорожденных, матери которых перенесли анестезию (кесарево сечение или безболезненные роды).
- ▶ Внезапное подавление кожных заболеваний (чесотки, бородавок, атопического дерматита) с последующим дефицитом внимания, проблемами с поведением, дислексией, эпилепсией или фебрильными судорогами.
- ▶ Опиум пробуждает готовность реагировать, когда хорошо подобранные средства не дают эффекта (Psor., Tub., Sulph., Zinc.).

Другие важные симптомы

Дух

- **Активен и жизнерадостен при лихорадке** (Acon., Thuj.).
- **Трусость или абсолютное бесстрашие и безрассудная смелость.**
- Имеет талант **хорошо писать и убеждать** уважаемых людей и друзей (язык, убедительность).
- **Равнодушие к боли и страданиям**, особенно во время лихорадки; **говорит, что чувствует себя хорошо, даже когда очень болен.**
- Строит **гигантские планы для каждого проекта.**
- **Хитрые и остроумные** дети, которые быстро действуют.
- Задержка развития у детей со склонностью к мастурбации.
- Неуклюжесть; столкновение с предметами при ходьбе.
- Капризный; отказывается от того, о чём его просят.
- Вялость у детей, которым трудно сосредоточиться на обучении .
- Страх темноты и крыс.
- Симулирует болезнь.
- Легко пугается и вскакивает; в конце концов дрожит от страха.
- Непроизвольное стягивание постельного белья во время потоотделения при лихорадке.
- Раздражительность при боли, с топанием ногами и воем.
- Смеётся по мелочам; также склонен плакать и рыдать по пустякам.
- Говорит громко.
- Медленно учится говорить (нац.).
- Избалованный ребенок с вспыльчивым характером; злится по пустякам или из-за малейшего противоречия; катается по полу, бросает вещи, становится разрушительным, бьется головой о стену и т. д.
- Разговаривает сам с собой (аутизм).

Голова

- Невозможность поднять голову с подушки из-за ощущения **свинцовой тяжести в затылке** (гидроцефалия).
- Полезно при менингите и энцефалите с **повышенным внутричерепным давлением и отеком мозга.**

- Головные боли после черепно-мозговых травм, шока или эмоционального - потрясения; сопровождаются тошнотой, болью и скованностью шеи, покраснением лица, слюноотделением и рвотой.
- Результаты теста:
 - **Кровоизлияние в мозг** (Оба, Кокк.).
 - **Холодный пот на лбу** (Carbo-veg., Verat.).
 - Постоянные произвольные движения головы; вращение или поворот головы из стороны в сторону (при менингите).
 - Гидроцефалия; горячая голова с холодными конечностями.

Глаза

- Диплопия [двоение в глазах],
- Желание часто тереть глаза.
- Разрывающая боль при кашле.
- Результаты теста:
 - Глаза **блестящие**, красные и **широко раскрытые**, с диким взглядом.
 - Зрачки сужены и вялые или не реагируют на свет.
 - Сходящееся косоглазие.
 - Симптом Гиппуса + [моргание, быстрое чередование сужения и расширения зрачков без стимулов].

уши

- **Повышенная чувствительность слуха**, даже во время сна.
- Результаты теста:
 - Нарушение слуха вследствие паралича слухового нерва.
 - Покраснение ушей.

Нос

- Повышенная чувствительность обоняния.
- Жидкость вытекает из носа при попытке глотания (паралич IX (языкоглоточного нерва) и X (блуждающего нерва) черепных нервов).
- Результаты теста:
 - Постоянно ковыряет в носу пальцами (Арум-т., Кина).
 - Острый нос.

Лицо

- Подергивание уголков рта (Игн.).
- Результаты теста:
 - **Холодный пот на лице.**
 - Опухшие губы на впалом и **морщинистом старческом лице** с расширенными венами и пустым, глупым выражением.
 - Синеватые круги вокруг глаз.
 - Открытый рот, из уголков рта течет слюна.
 - Тризм.

РОТ

- Затрудненное прорезывание зубов.
- Скрежетание зубами.
- Результаты теста:
 - **Постоянные движения языка во рту.**
 - Паралич мышц языка, язык оттянут вправо (паралич правого подъязычного нерва).
 - Изменение цвета языка от фиолетового до черного.
 - Речь неясная, неловкая и заикающаяся.

ШЕЯ

- Нарушенное или затрудненное глотание из-за спазмов или паралича пищевода (гастрит); пища застревает в горле, а жидкости выбрасываются через нос (паралич IX (языкоглоточного нерва) и X (блуждающего нерва), вовлекая в процесс двойное ядро).
- Результаты теста:
 - Увеличенные миндалины.
 - Экзофтальмический зоб (болезнь Грейвса).
 - Расширение вен с видимой пульсацией сонных артерий (синдром Белла). - Кривошея.

ЖЕЛУДОК

- Ребенок делает тщетные попытки вызвать рвоту или рвоту.
- Спазматические или режущие боли с вздутием желудка после еды.
- Рвота слизью из-за кашля.
- Не любит: еду в целом, мясо, лук.
- Пристрастия: бренди, сахар.

ЖИВОТ

- **Паралитическая непроходимость кишечника после операции.**
- **Обратная перистальтика с рвотой каловыми массами.**
- Спазматические боли в животе перед стулом, особенно при запоре в течение нескольких дней, облегчающиеся при свертывании калачиком или от теплого молока.
- Затрудненное скопление газов с урчанием в животе.
- Скованность мышц живота, ощущение втянутости желудка.
- Результаты теста:
 - **Чувствительная и воспаленная паховая грыжа, склонная к ущемлению** (Bell., Nux-v.).
 - Увеличенная селезенка.
 - Живот твердый, тимпанический.
 - Инвагинация.
 - Чувствительность илеоцекальной области (Bell.).
 - Пупочная грыжа (Nux-m.).

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Непроизвольное опорожнение кишечника, например, вследствие шока, горя или внезапной радости.**
- **Сильный запор у новорожденных;** каловые массы долгое время остаются в прямой кишке без позывов на дефекацию.
- Запор, чередующийся с поносом (Ant-c., Nux-v.).
- Понос у младенцев после Цорна (Coloc., Gels.) или при тифе (Hyos., Phos.).
- Зуд вокруг ануса.
- Задержка стула при кишечной непроходимости, особенно после операции.
- Стул: сухой, твердый, крошащийся в анусе или в виде черных шариков, с очень неприятным запахом; должен быть удален механически (Nux-m.).
- Тенезмы перед дефекацией и во время нее.
- Невозможность испражняться в присутствии других людей (Ambr., Nat-m.).
- Результат теста:
 - Из открытого ануса сочится кровавая слизь.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Болезненная задержка мочи у грудных детей после шока (Acon., Bell.).
- Ребенок много пьет, но редко мочится.
- Затрудненное мочеиспускание; из-за спазмов сфинктера ребенку приходится ждать и тужиться, пока моча не выйдет.
- Непроизвольное мочеиспускание во время сна у детей после испуга.
- Отсутствие позывов к мочеиспусканию, несмотря на растянутый, полный мочевого пузыря (Caust.).
- Слабость мышц мочевого пузыря, особенно после операции.
- Результаты теста:
 - Моча темно-коричневого цвета, оставляющая красноватый песчаный осадок в подгузнике.
 - Моча: Альбумин ++, Эритроциты ++, Глюкоза +.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Ранняя склонность к мастурбации у мальчиков.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Зловонные выделения у детей со склонностью к мастурбации.

ГОРТАНЬ

- Потеря голоса у мальчиков после пережитого шока (Эйкон, Гелес).
- Паралич или спазм мышц гортани.

ДЫХАНИЕ

- **Асфиксия новорожденных** (Ant-t., Camph.).
- Хриплое дыхание, грубый вдох и громкий, свистящий выдох, особенно во время сна и после судорог.
- Внезапные приступы спастической астмы с апноэ при засыпании ; необходимо разбудить, чтобы предотвратить удушье (Ухмылка, Смех).

- Результаты теста:

- **Центральная нервная гипервентиляция.**
- Рентгенограмма грудной клетки: отек легких.
- **Дыхание Чейна-Стокса.**
- Нерегулярное дыхание, иногда медленное, иногда учащенное.
- Дыхательный ацидоз.

КАШЕЛЬ

- Сильный, удушающий кашель, особенно ночью и при вставании утром ;
лучше от холодного питья (Caust., Supr.).
- Спастический, сухой кашель, приступы по ночам с ощущением щекотания в гортани; влажный в течение дня, с мокротой, окрашенной кровью.
- Результат теста:
 - Цианоз с посинением лица при кашле.

Грудь

- Результаты теста:
 - Аспирационная пневмония.
 - Пневмоническое уплотнение у детей раннего возраста.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Учащенное сердцебиение после шока.
- Результаты теста:
 - Сердечная недостаточность.
 - Пульс: нерегулярный, прерывистый, мягкий или твердый, частый или медленный.

НАЗАД

- Результаты теста:
 - Искривление позвоночника; опистотонус.
 - Миелит или спинальный менингит.
 - Спастическое оттягивание шеи и головы назад.

КОНЕЧНОСТИ

- Неуклюжесть ног; толчки и спотыкания при ходьбе.
- Склонность постоянно вытягивать ноги.
- Тремор конечностей после шока.
- Результаты теста:
 - Автоматические, произвольные движения конечностей, особенно рук (атетоз).
 - Пальцы рук сжаты вместе, ноги подтянуты вверх.
 - Судорожные подергивания конечностей.
 - Цианоз с синюшным окрашиванием кончиков пальцев рук, ног и ногтей.
 - Тонкие ногти.
 - Неустойчивая походка; при ходьбе волочит ноги.
 - Вены на руках вздуты (Puls., Sulph.).

СПАТЬ

- Во время сна: глаза полуоткрыты или пристальный взгляд, вращательные движения глазных яблок; громкий храп; гримасы и странные выражения лиц, произвольные движения рук; стоны; открытый рот с высовыванием языка; вздохи, всхлипывания, хрипы (с резким вдохом и громким хриплым выдохом), всхлипывания.
- Почти при всех жалобах наблюдается сильная сонливость.
- Не могу лежать на левом боку.
- Ребенок чувствует сильную сонливость, когда пытается сосредоточиться на учебе .
- Коматозный сон при уремии.
- Обильный, горячий пот во время сна, с желанием раскрыться.
- Сон часто нарушается ужасными видениями и кошмарами.
- Имеет тенденцию быть очень разговорчивым перед сном и во время него.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Желание раскрыться на всех стадиях лихорадки; не переносит никакой формы тепла.
- Мороз:
 - Глубокая сонливость, громкий храп и скованность конечностей с ознобом.
 - Начинается мороз на руках и ногах (Нат-м.).
- Нагревать:
 - Активный, веселый, беспокойный при лихорадке.
 - В жаркую погоду ребенок погружается в глубокий, бесчувственный сон или у него появляются такие жалобы, как носовые кровотечения, головные боли, отвращение к пище или ее чрезмерная тяга, чрезмерное слюнотечение, покраснение лица, задержка мочи или скудное мочеиспускание, неутолимая жажда или полное ее отсутствие, рвота (зловонной, зеленоватой или фекальной массой).
 - Жар и покраснение головы и лица, холодные конечности.
 - Гиперпирексия [температура выше 41 °C].
- За стадией холода следует жар с горячим потом.

КОЖА

- Результат теста:
 - Выпадение волос на различных участках тела.

СУДОРОГИ

- Недомогания, вызванные: **гневом; глубоким сном; прорезыванием зубов; приемом лекарств/лекарств; воздействием яркого света; испугом, перенесенным матерью; высокой температурой, травмами; шоком; видом или приближением незнакомых людей;** подавлением сыпи или отсутствием сыпи; уремией; нахождением в теплом помещении.
- Аура/Предсудороги: **прилив крови к голове;** крики, рвота.
- Во время судорог:
 - Психика: **Неистовство, с криками и плачем.**

- Физические признаки: прикусывание языка, холодная кожа с дрожью, **суженные зрачки**, носовое кровотечение, **лицо синюшно-красное** или очень бледное, падение назад, пена у рта, запрокидывание головы назад, зловонная зеленоватая или фекальная рвота, **опистотонус**, красное лицо, вздохи или медленное поверхностное дыхание, спастические или судорожные движения мышц грудной клетки, скованность конечностей, **тетаническая ригидность**.
- Судороги без сознания.
- Хуже вечером и ночью; лучше на открытом воздухе.
- После судорог: сумасшествие, сонливость и **хрипы**.
- Анестезия с сильной сонливостью между судорогами.

Общий

- **Центральный цианоз у младенцев и детей младшего возраста.**
- **Облегчение боли при состояниях, которые обычно вызывают боль.**
- **Потеря сознания с дыханием Чейна-Стокса**, бредовая речь, отвисшая - челюсть, непроизвольное выделение стула и мочи, храп, широко открытые глаза; на обращение реагирует правильно, но тут же возвращаются бред и потеря сознания.
- Тяжёлые последствия приёма лекарственных препаратов, в том числе жаропонижающих (парацетамол), анальгетиков (бруфен), анестетиков (хлороформ, диазепам); воздействия угарного газа, злоупотребления йодом (сироп от кашля) и т. д.
- Хорея вследствие шока.
- Коллапс с обильным, проливным, горячим потом по утрам и во время сна, на всех частях тела, за исключением нижних конечностей, с желанием раскрыться.
- Темнокожий, краснолицый и сморщенный ребенок, похожий на маленького, иссохшего старика.
- Истощенные, карликовые или дети-инвалиды, которые очень ленивы и всегда хотят на что-то опереться.
- Инсулинозависимый ювенильный диабет.
- Лейкемия.
- Рахит.
- Септические состояния.

Источник

- Семейство маковых (Papaveraceae).

ПАЛЛАДИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

(Палл.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Хорошее дополнение к Platinum.
- ▶ творческие дети, которые хотят посвятить все свое время реализации своих творческих интересов
- ▶ Аккуратные, следящие за модой, развязные и нахальные дети (Hyos., Lyc., Verat.) ▶ Чувствительные дети, малейшее замечание ухудшает ситуацию.
- ▶ Матери, которых унижали и пренебрегали во время беременности, и чьи дети впоследствии страдают от интеллектуального высокомерия, эгоизма, жадности и высокомерия
- ▶ Дети, которые «горды, как павлины» и повсюду ищут аплодисментов
- ▶ Дети Палладия напоминают греческих богов Зевса и Афины Палладу. Зевс сверг своего отца Кроноса с трона, а затем разделил власть со своими братьями Посейдоном и Аидом. Афина родилась непосредственно из головы Юпитера (Зевса ¹) (а не через обычную женскую репродуктивную систему).
- ▶ Дети, которые любят хвастаться, открыто демонстрируют всем свою гордыню и тщеславие. (Смеётся. Платон, Сульф.)
- ▶ Хорошие соблазнитель. Они пытаются соблазнить родителей, братьев и сестёр, друзей и всё общество своим обаянием и блеском. (Флакон, Тарент.)
- ▶ Дети, которые без компании становятся плаксивыми и впадают в депрессию
- ▶ воображает, что его игнорируют при малейшей провокации
- ▶ не может выносить чувство заброшенности (Arg-n., Lac-h.)

Другие важные симптомы

Дух

- бодрый и веселый в компании, сменяющийся истощением и слабостью
- Дети, которые придают большое значение хорошему мнению окружающих (Calc-sil., Kali-sil.)
- Дети, которые страдают весь вечер после вечеринки или веселья
- делает все, чтобы добиться признания своих собратьев
- Эгоцентричные дети, любящие лесть (Lyc., Sulph.)
- Страх, что случится что-то плохое
- нетерпеливый
- Склонность к агрессивному языку
- снисходительный и дерзкий в речах и поведении (Cic., Nux-v.)
- Раздражительность при пробуждении (Cycl., Nit-ac.)

- большая любовь к удовольствиям (Croc., Tub.)
- хочет быть в центре внимания или создавать настроение
- Потеря памяти из-за головных болей или других болей (Anac., Ner.)

Голова

- Мигрень. Боль распространяется по всей макушке головы, от одного уха до другого. После эмоционального возбуждения и кофе, лучше после сна.
- раздражительность (China) и нетерпеливость (Sulph., Zinc.) с головными болями

Глаза

- сухость
- Результаты теста
 - синюшность вокруг глаз

Уши

- Боль в левом ухе
- Результаты теста
 - Экзема за ухом (Cic., Psor.)

Нос

- острое восприятие неприятных запахов
- Боль при простуде (Bell., Merc.)
- Результаты теста
 - Прыщи, пустулы, фурункулы, особенно на кончике носа

Лицо

- Результаты теста
 - Прыщи на нижней губе

Рот

- Результаты теста
 - Раздражение уголков рта (Arum-t., Cund.)
 - красные полосы на языке

Зубы

- чувствительный
- Результаты теста
 - чувствительные резцы

Шея

- Результаты теста
 - студенистая слизь (Caust.)

ЖИВОТ

- Результаты теста
 - Вздутие живота из-за метеоризма
 - Тяжесть и дискомфорт из-за смещенных ветров
 - Ребёнок хочет, чтобы ему помассировали живот. (Нат-с., Подо.)

ПРЯМАЯ КИШКА

- выход газов во время дефекации
- Позывы к дефекации при ходьбе (насморк)
- Результаты теста
 - твердый стул, за которым следует кашицеобразный стул (Ph-ac.)
 - белый стул (кальций, подозол.)
 - Стул загустевший, узловатый, комковатый, белый, как мел

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Ощущение наполненности мочевого пузыря, но выделяется лишь небольшое количество мочи.
- постоянные позывы к мочеиспусканию

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Бели, похожие на яичный белок (Graph., Sabin.)
- Дети с легко возбудимыми гениталиями, такие как Платинум и Ориганум
- Дети матерей с унаследованными мутациями генов, например, гена рака молочной железы 1 (BRCA1), гена рака молочной железы 2 (BRCA2), с поразительно высоким количеством случаев рака яичников в семейном анамнезе или матери которых болели раком яичников или раком молочной железы
- Результаты теста
 - Опухоль эпителия яичников
 - кистозная масса яичника

ДЫХАНИЕ

- Астма после эмоционального возбуждения (Кофф., Гели., Игн.)

КОНЕЧНОСТИ

- Результаты теста
 - Бородавки на лодыжках, суставах пальцев и кистях рук (Bar-c., Caust.)
 - Подергивание пальцев (Nat-c., Phos.)
 - Покраснение лодыжек (Cham., Lach.)
 - Сокращение мышц и сухожилий
 - холодные руки (Камфора, Хел.)

СПАТЬ

- Вождение во время сна
- Дети, которые засыпают в машине (Лyc., Sulph.)
- непреодолимая потребность во сне во второй половине дня (Apis, Bell.)
- Сонливость из-за головных болей
- сны о том, что за тобой гонятся

КОЖА

- Зуд после раздевания (Dros., Rumx.)
- Склонность к образованию прыщей, особенно на лице, носу, губах, шее и веках
- маленькие прыщики, похожие на укусы блох (Jug-c.)
- Результаты теста
 - Псориаз

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ У ДЕТЕЙ

- оскорбительный, оскорбительный
- Жалобы из-за эгоизма
- Жалобы из-за оскорбления
- амбициозный
- сильный гнев
- снисходительный
- не терпит никаких противоречий
- Заблуждение, что его бросили
- Заблуждение, что его игнорируют
- властный
- неудовлетворенный
- эгоизм
- страх высоты
- высокомерный
- нетерпеливый
- грубый, грубый
- эгоистичный
- тщеславный
- острое обоняние
- твердый, комковатый стул
- холодные руки

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПАЛЛАДИЕМ И ПЛАТИНОЙ У ДЕТЕЙ

	ПАЛЛАДИЙ	ПЛАТИНА
резкий, резкий		+
затронутый, затронутый		++
любящий, сердечный		+
Жалобы на сексуальное насилие		+

	ПАЛЛАДИЙ	ПЛАТИНА
Жалобы в связи со смертью родителя или брата/сестры		++
Жалобы из-за оскорбления		+
Желание удовольствия	+	
тревожиться о самых приятных вещах		+
Страх за здоровье родителей и родственников		+
неуклюжий, роняет предметы		+
не вижу крови		+
Выпендриваться		+
полный забот		+
Отвращение к ласкам		+
веселый в компании	+	
Неуверенность в себе	+	
Развлечения улучшаются	+++	
Проклинать	+	
Танец		+
Бред насилия	+	
Иллюзия критики	+	
Бред оскорбления	+	
грязный		+
Волнение через музыку	+	
Страх несчастных случаев	+	
Страх, что случится что-то плохое	+	
Страх замкнутого пространства	+	
Желание лести	+	
пижонский		+
отрывистый		+
Плач после того, как ему причинили боль	+	
Головная боль, ухудшение при чтении.		+
Головная боль в переполненных помещениях		+++
Головная боль, мысли о дискомфорте уменьшаются.	+	

	ПАЛЛАДИЙ	ПЛАТИНА
сухие глаза	+	
черный стул		+
Стул твердый, как будто обожженный		++
белый стул	+	
черви		+
Отвращение к мясу		+
темный цвет лица		+

ФОСФОР

(Элементарный желтый фосфор - Phos.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ **Активные** дети с разносторонними интересами и **творческими способностями**, но быстро утомляющиеся.
- ▶ Привязанность проявляется спонтанно, они **общительны** и любят **человеческое тепло** (нежность и поцелуи) (Пульс.).
- ▶ Дети, которые привлекательны своей обаятельной, динамичной и общительной личностью; они излучают тепло и ум.
- ▶ Непоседливые дети, которые не могут усидеть на месте.
- ▶ Умные, дружелюбные и чувствительные дети.

Тело

- ▶ Дети, которые **очень быстро растут в начале полового созревания (Sulph.)**. Они становятся худыми, стройными и долговязыми.
- ▶ Дети кашляют при виде незнакомых людей (Ambr., Caust.).
- ▶ Быстрое носовое кровотечение при малейшей провокации.
- ▶ Пот по всему телу, за исключением ступней.
- ▶ Пристрастия к еде, сопровождающиеся потерей веса и чрезмерной жаждой.

Другие важные симптомы

Дух

- **Мучительная тревога и страх в одиночестве.** Одиночество — настоящее наказание для детей с синдромом Фосфора. Они **любят компанию и нуждаются в ней**.
- **Беззаботные** дети, которые не слишком утруждают себя учебой, потому что они умны, или дети, которые преуспевают как в академических предметах, так и во внеклассных мероприятиях.
- **Веселый, подвижный и рано развившийся ребенок**, который любит путешествовать и проводить время на природе.
- **Ясновидящий.**
- **Тьма** в любой форме **усиливается**, поскольку у ребенка появляются ужасные видения умерших родственников, друзей, призраков и злых людей.
- **Легко пугается** и испытывает сильный страх, когда его спрашивают:
 - Сдача крови (обычно с потерей сознания).
 - Для оказания первой помощи, например, наложения повязки на место ушиба, раны и т. д.
 - Раздеться для медицинского осмотра.
 - Посещение врача или стоматолога для осмотра.
- Часто грызет ногти или подушки, когда волнуется.

- **испытывает эмоциональную привязанность** к людям или животным (поэтому **навязчивость является** важным симптомом).
- Страх тараканов, **темноты, привидений**, пауков.
- Часто предается фантазиям и впадает в состояние **мечтательности**, чтобы уйти от реальности (в основном из-за чувства покинутости).
- **Очень люблю животных**, особенно собак и других ручных. С удовольствием бегал и спал с домашним любимцем. Также с удовольствием покормил бы бездомных животных и с удовольствием посетил бы зоопарк.
- **Бдительные, внимательные и наблюдательные дети.**
- Сильное желание заниматься **творческой деятельностью**, такой как гончарное дело, рукоделие, рисование, живопись и т. д.
- Сильное желание, чтобы его притягивали и нежно гладили. Ребёнок часто просит членов семьи пощекотать или **нежно погладить его**.
- Счастливые и довольные дети (потому что они нежные).
- Остановка развития.
- Очень щекотливый
- Любит носить одежду светло-голубого, розового или красного цвета с веселыми узорами.
- Делайте смешные и странные жесты, когда вы смущены или находитесь в присутствии незнакомцев.
- Стон от боли.
- Послушные дети, которые проявляют уважение к старшим, членам семьи, учителям и друзьям и поэтому всегда и везде желанные гости.
- Обожает играть с куклами Барби, докторскими сумками, в «Скрэббл», «Уно», игрушечные машинки и т. д. Дети Фос также любят в игровой форме разыгрывать сказки.
- Приступы потери сознания или обмороки во время голодания, при лихорадке, из-за резких запахов и при виде крови.
- Сильное беспокойство при заболевании члена семьи.
- Истерики; в гневе бьется головой и другими предметами о стену.
- Склонность кусать людей, подушки или ногти из-за страха разлуки, страха и ужаса.
- Хуже во время гроз. Во время гроз и молний потребность в компании очень велика; находясь в компании, ребёнок стремится прижаться к окружающим и любит прятаться в безопасном месте, крепко обнимая членов семьи.

Голова

- Головные боли, сопровождающиеся **повышенным обонянием**, тошнотой, болезненностью и скованностью шеи, **волчьим голодом** (псориазом) и рвотой.
- Периодические головные боли у школьников, вызванные переменой погоды, голодом, механическими травмами, солнечными лучами, **перед грозой** и в **теплом помещении**; уменьшающиеся после сна, на свежем воздухе и при умывании лица холодной водой.
- Результаты теста:
 - **Очаговое выпадение волос.**
 - Кровоизлияние в мозг вследствие разрыва артериовенозных мальформаций или небольших аневризм.
 - Холодный пот на лбу.
 - Сухая кожа головы с белыми чешуйками или грибковыми инфекциями (Thu.).

- Гидроцефалия у детей с менингитом или энцефалитом.
- Открытые роднички.
- Морщинистый лоб от головной боли.

ГЛАЗА

- **Слезотечение из глаз при простуде, на улице, в теплом помещении, при чтении, а также при дефекации или мочеиспускании.**
- Веки слипаются по утрам из-за вязких выделений.
- Потеря зрения после менингита.
- Боль в глазах от света; лучше после сна.
- Светобоязнь.
- Результаты теста:
 - **Длинные, изогнутые ресницы.**
 - Расходящееся косоглазие.
 - Отёчность нижнего века.
 - Экзофтальм.
 - Паралич зрительного нерва.
 - Птоз с параличом наружных глазных мышц.
 - Запавшие глаза.

УШИ

- **Снижение слуха при ходьбе на ветру** из-за катара евстахиевой трубы.
- Средний отит с зудом в ушном канале.
- Результаты теста:
 - Выделение кровавой ушной серы.
 - Мастоидит.
 - полипы.
 - Покраснение ушей.

Нос

- **Заложенность носа, попеременно то одна, то другая, особенно в теплом помещении; лучше на свежем воздухе.**
- **Нос чувствителен к запахам и сквознякам.**
- Простуда, нарастающая.
- Носовые кровотечения с обильным выделением ярко-красной крови во время лихорадки, при умывании лица по утрам или при натуживании во время дефекации.
- Чихание без выделений, вызванное запахами или мытьем рук; лучше на открытом воздухе.
- Результаты теста:
 - **Веерообразные движения ноздрей, особенно у детей, больных пневмонией.**
 - **Веснушки на носу.**
 - Полипы, которые **быстро** и обильно **кровоточат**.
 - Он постоянно ковыряет пальцами в носу, пока не идет кровь.
 - Нос опухший, красный и блестящий, особенно кончик.
 - Односторонний катар; обильные, зеленоватые, с прожилками крови выделения.
 - Ретроназальный катар.

Лицо

- Воспаление и нагноение околоушных желез и подчелюстных лимфатических узлов со склонностью к образованию абсцессов.
- Только пот на лице.
- Результаты теста:
 - **Локальное покраснение лица**, но бледность вокруг носа и рта.
 - **Веснушки.**
 - **Повышенный рост волос на лице, даже между бровями** (мед.).
 - Челюсти либо плотно сжаты, либо **совершают постоянные жевательные движения.**
 - **Выраженная носогубная складка.**
 - угри .
 - Кровянистые корки по краям ноздрей.
 - Трещины посередине нижней губы, которые легко кровоточат.
 - Склонность к вывиху челюсти.
 - Жирная или восковая кожа.
 - Псориаз бровей.
 - Отек и нагноение нижней челюсти, приводящие к кариесу и некрозу (Amph, Necla).
 - Язвы или герпес в уголках рта.

Рот

- **Чрезмерная кровоточивость десен после удаления зуба.**
- Утром, когда вы просыпаетесь, во рту сухо.
- Медленное прорезывание зубов.
- Результаты теста:
 - Затрудненное открывание рта, язык дрожит при высовывании.
 - Гингивит, склонный к нагноению и образованию свищей.
 - Десны отделяются от зубов и легко кровоточат, даже при прикосновении.
 - Неправильное расположение нижних зубов.
 - Во рту много язв, особенно на языке и нёбе.
 - Ранний, быстро распространяющийся кариес с черными зубами.
 - Налет.

Шея

- Рвотные движения при глотании; жидкость втягивается обратно и выбрасывается через нос (слабый кашлевой рефлекс у детей с неврологическими расстройствами).
- Затрудненное глотание, особенно жидкостей (в отличие от Kali-c.).
- Сухость в горле после пробуждения.
- Устраняет творожистые образования (творожистые отложения на миндалинах).
- Результаты теста:
 - Сухое, темно-красное, блестящее горло.
 - Зоб, особенно справа.
 - Выделение крови из миндалин.

- Увеличение шейных лимфатических узлов.
- Миндалины и язычок опухшие, язычок удлиннен.
- Кривошея, голова повернута влево.

ЖЕЛУДОК

- **Рвота после употребления даже самых маленьких порций воды и как только она становится теплой в желудке.**
- Аппетит: Должен есть часто, иначе обморок; голод вскоре после еды, особенно после ужина.
- Дети пьют много холодных напитков, от которых вскоре возникает рвота.
- Бурчание в желудке после употребления спиртного.
- Тошнота и рвота у ребенка, которому во время операции ввели хлороформ.
- Боль в желудке через несколько часов после еды (из-за гастрита), от горячей пищи или напитков, а также от хлеба; лучше от холодной пищи и напитков, а также от мороженого.
- Болезненная икота с лихорадкой.
- Стеноз привратника: пища застревает у входа в желудок.
- Желание что-то съесть, когда у вас жар или головная боль.
- Отсутствие жажды, несмотря на сухость языка.
- Сильная рвота желчью или черной кровью.
- Отвращение: **кипяченое молоко, хлеб, масло, кукурузные хлопья, кофе, рыба, мука, фрукты, чеснок, лук, выпечка, картофель, пудинг, чай, помидоры, овощи, горячая пища и напитки.**
- Пристрастия: сыр, курица, шоколад, **кола, холодные напитки, холодная еда, соленья, гамбургеры, мороженое, сочные продукты, пицца, рис, соль**, кислое и острое.

ЖИВОТ

- **Отвращение к одеялу на животе (смеется).**
- **Вздутие живота с запором и скоплением газов , не облегчающееся отхождением газов или отрыжкой.**
- Боль в илеоцекальной области, особенно при кашле.
- Обильный пот на туловище.
- У детей со слабой иммунной системой из-за гепатита А или В или ВИЧ-инфекции может развиваться пневмония.
- Потирает живот для облегчения (Podo., Nat-s.).
- Полезно при индийском детском циррозе печени [ЦП, генетическая и вызванная медью форма цирроза печени], желтухе, вызванной гепатитом, и панкреатите.
- Результаты теста:
 - **Инвагинация кишечника (Op., Plb.).**
 - Аппендицит.
 - Увеличенный и дряблый живот.
 - Ядерная желтуха [билирубиновая энцефалопатия].
 - Печень и селезенка увеличены, плотные и болезненные при пальпации.
 - Болезненная паховая грыжа.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Хронический запор с **сухим, сероватым, похожим на собачий, длинным, узким и твердым стулом**.
- Понос после острой и жирной пищи, от малейшей неосторожности в еде; у детей, больных туберкулезом; в теплую погоду; **лучше от мороженого или холодных напитков**.
- **Непроизвольное испражнение или моча во время сна или после испуга**.
- **Стул, похожий на рисовый отвар**, с истощением, чистым языком и ледяными руками и ногами у младенцев и детей младшего возраста, больных холерой.
- Болезнь Крона.
- Дизентерия, сопровождающаяся сухим потрескавшимся языком.
- Зуд в прямой кишке по ночам.
- Безболезненный, обильный понос, возникает сразу после пробуждения утром, стул ярко- желтого или зеленоватого цвета, кровавый, зловонный, с примесью слизи и неперевааренными частицами пищи.
- Обильное выделение зловонных газов во время дефекации.
- Результаты теста:
 - Полипы с постоянным выделением влаги.
 - Выпадение прямой кишки.
 - Расслабленный и открытый анус.
 - В кале: лямблии ++, острицы, лейкоциты++, аскариды и членики ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Обильная моча, прозрачная или мутная, с позывами к мочеиспусканию, с лихорадкой.
- Кровавая моча при остром нефрите; выделяется темно-коричневая моча или красный песок в моче.
- Хроническая белковая моча у детей, страдающих паренхиматозным нефритом.
- Непроизвольное мочеиспускание после дефекации, при кашле, чихании или ходьбе.
- Ночное недержание мочи, особенно в первой фазе сна.
- Результаты теста:
 - Густая, молочная, резко пахнущая моча, оставляющая много белого осадка в подгузнике.
 - Моча: Альбумин ++, цилиндры (эпителиальные и гиалиновые), жир +, глюкоза +++, фосфаты ++, гной +++ и эритроциты ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Ранняя склонность к мастурбации.
- Результат теста:
 - Гидроцеле.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Ранняя и интенсивная склонность к мастурбации.
- Молочные или кровянистые едкие выделения, вызывающие выпадение лобковых волос у молодых анемичных девушек.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Сильное раздражение, саднение или першение в гортани с непрекращающимся сухим кашлем на свежем воздухе или ночью, особенно в положении лежа на левом боку; ребенок должен постоянно прочищать горло.
- Внезапная безболезненная потеря голоса или болезненная охриплость, с простудой или без нее, от малейшего изменения погоды или от продолжительного разговора.
- Ларингизмус стридулус с внезапным сужением гортани при засыпании.
- Гортань воспалена и болезненна при разговоре и кашле; ребенок хватается за горло при кашле.

ДЫХАНИЕ

- Одышка с кашлем; **вечером в постели до 22:00**, после еды или теплых напитков, от физической нагрузки, от **воздействия запахов** или в положении лежа на спине; **лучше в положении лежа на боку**.
- Астма у маленьких детей, дыхание затруднено из-за метеоризма и полного желудка.
- Результаты теста:
 - Брюшное дыхание.
 - Гипервентиляция с частым, глубоким дыханием у нервных и чувствительных детей.
 - Хриплое дыхание, словно в груди скопилось много мокроты.

КАШЕЛЬ

- Астматический кашель от **прогулок на свежем воздухе** или употребления холодных напитков; **по-видимому, исходит из желудка или живота**.
- **Кашель усиливается, когда ребенок лежит на левом боку, и уменьшается, когда он поворачивается на правый бок** (Rumx, Sep).
- Непрекращающийся, мучительный кашель, днем и ночью, с удушьем, которое изматывает; от щекотания в гортани и трахее; хуже от **смеха, чтения** или разговора вслух и при засыпании.
- Кашель при малейшем изменении погоды, при выходе из теплого помещения на холод и наоборот.
- Сухой кашель при заболеваниях клапанов сердца (Laur., Spong.).
- Нервный кашель из-за резких запахов или появления незнакомца.
- Короткий, прерывистый кашель по ночам из-за ощущения сдавливания гортани; ребенок вынужден сидеть.
- Результаты теста:
 - При кашле ребенок держится обеими руками за грудь и горло.
 - Коклюш.

ГРУДЬ

- Боль в боках, **особенно в нижней левой части**; усиливается при кашле; облегчается от теплых компрессов.
- Бронхит начинается после каждой простуды.
- Пневмония с ощущением стеснения, хуже в положении лежа на левом боку.

- Отек легких (Ant-t., Merc-sul., Solin-act.).
- Полезно в случаях рецидивирующей пневмонии или персистирующей пневмонии у детей с ослабленным иммунитетом.
- Результаты теста:
 - Абсцесс легкого.
 - Бронхиальное дыхание.
 - Куриная грудка.
 - Рикетотические четки.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- **Сердцебиение от малейшего движения** или усилия, при пробуждении и вставании с постели; лучше в положении лежа на правом боку.
- Сердечная недостаточность.
- Ревматический эндокардит (Aug., Spig.).
- Заболевания клапанов сердца.
- Результаты теста:
 - Шумы в сердце.
 - ЭКГ: Расширение сердца и регургитация вследствие недостаточности митрального клапана.
 - Пульс: малый, мягкий, слабый, частый вечером и медленный утром.

НАЗАД

- Результаты теста:
 - Фурункулы в области шеи (Kali-i., Sil.).
 - Истощение и искривление позвоночника в шейном отделе.
 - Миелит.
 - Опиостонус.
 - Расщелина позвоночника (Sil.).

КОНЕЧНОСТИ

- Болезни роста.
- Сирингомиелия [заболевание спинного мозга].
- Слабость от малейшего усилия.
- Результаты теста:
 - Руки дрожат при письме и при вытягивании (Мн.ч.).
 - Сжатые пальцы.
 - Псориаз ладоней с болезненными трещинами.
 - Стоит и ходит, широко расставив ноги.
 - Чувствительные мозоли на ступнях.
 - Походка неустойчивая, легко спотыкается.

СПАТЬ

- Во время сна: непроизвольное прикусывание языка, подергивание конечностей, брыканье, стоны, потоотделение (особенно в области шеи), слюнотечение, лунатизм и хрипы.

- Спит на спине, положив руки под голову; не может спать на левом боку.
- Бессонница у детей во время кашля, прорезывания зубов или голода.
- Сонливость в течение дня, бессонница до полуночи.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Мороз:
 - Повышение температуры тела с ознобом и диареей.
 - Желание раскрыться, несмотря на мороз, тепло не улучшается.
 - Ледяной холод рук и ног на морозе.
- Нагревать:
 - Боль в спине, мутная моча, суженные зрачки, диарея, расширенные вены на руках, сильная усталость и зевота, красные глаза с заложенностью, беспокойные нижние конечности и неутолимая жажда холодных напитков.
 - Лихорадка со жгучим жаром, особенно в груди и под мышками.
 - Чем выше температура, тем сильнее кашель.
 - Хуже после кормления.
- Пот:
 - Обильный, холодный и зловонный пот в области подмышек, ступней и ладоней.
- Лихорадка, чередующаяся с ознобом.

КОЖА

- Зуд от шерсти.
- Нездоровая кожа с гнойными язвами и свищами, выделениями с неприятным запахом.
- Результаты теста:
 - Веснушки.
 - Желтуха.
 - невусы; петехии; Геморрагическая пурпура .

Общий

- **Жалобы, связанные с изменением погоды**, мастурбацией, подавленной сыпью или **подавленной потливостью ног**, грозами и прививками.
- Симптомы появляются **после анестезии (хлороформом)** или после злоупотребления препаратами фетидина, йода или хинина.
- Аллергическая конституция, **склонность к простудам**.
- **Склонность к кровотечениям**; также полезно в случаях шока, вызванного кровотечением.
- **Сильная слабость с потоотделением** из-за диареи, лихорадки или кровотечения; вынужден наклониться или лечь.
- Ожоги от рентгеновских лучей или поражения электрическим током.
- Дети, имеющие в анамнезе хроническую диарею, пневмонию , туберкулез, рецидивирующий бронхит, круп, носовые кровотечения и т. д.
- Пациенты с повышенной чувствительностью к холоду, которые не переносят холодный ветер или свежий воздух.
- Хорея усиливается от эмоционального возбуждения и во время грозы.

-
- Диморфная анемия вследствие хронической дизентерии, заражения анкилостомами или лямблиозом .
 - Отеки из-за заболеваний почек или сердца.
 - Потеря веса у детей, несмотря на пристрастия к еде.
 - Поздно учится ходить.
 - Обильный, холодный, влажный, зловонный, изнуряющий пот днем и ночью, от малейшего усилия и после еды; пот покрывает все части тела, кроме стоп.
 - Рахит.

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Сосна - Pin-s.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Скрофулезный диатез.
- ▶ Медленное развитие.
- ▶ Склонен к рахиту.
- ▶ Слабые лодыжки, поэтому поздно учится ходить.
- ▶ Тяжелое недоедание.
- ▶ Истощение нижних конечностей вследствие недоедания. Истощение голеней и бёдер; начинается с нижних конечностей и распространяется вверх. Иногда причиной истощения являются скрытые аскариды.
- ▶ Увеличенная печень.
- ▶ Туберкулез лимфатических узлов, особенно шейных и мезентериальных.

Источник

- Происходит из Сибири и принадлежит к семейству сосновых (Pinaceae).

ПЕРЕДНЯЯ ДОЛЯ ГИПОФИЗА

(Аденогипофиз - Питу-а.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Плач по мелочам.
- ▶ Ночная потливость головы.
- ▶ Мигрень, особенно в висках, со светобоязнью и тошнотой, усиливается от света, шума, солнца и теплых помещений.
- ▶ Головные боли от слишком долгого ношения очков.
- ▶ Носовые кровотечения во время сна.
- ▶ Воспаление мочки уха, вызванное серьгами из никеля или другого некачественного материала.
- ▶ Язык карты.
- ▶ Сильная тяга к пирожным, шоколаду и жареному картофелю; выраженная тяга к сладкому.
- ▶ Усугубляется употреблением яиц, жира и молока.
- ▶ Непереносимость лактозы. Сильная боль в животе с урчанием и диареей после употребления молока.
- ▶ Непереносимость лактозы из-за разочарования в материнской любви во время беременности.
- ▶ Запоры случаются ежедневно, через день или через три. Стул твёрдый, сухой и обильный.
- ▶ Все, что мы едим, превращается в газ, особенно фрукты и овощи.
- ▶ Диарея из-за ожидания.
- ▶ Втянутые яички.
- ▶ Медленный рост ногтей.
- ▶ Спит чутко, просыпается от малейшего шума.
- ▶ Аллергическая конституция, контактный дерматит на любом участке тела, где металлические цепи или браслеты соприкасаются с кожей.

Источник

- Образуется из передней доли гипофиза.

PLATINUM METALLICUM

(Платина - Плат.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети «платинового» уровня сразу же **очаровываются красотой, макияжем, стилем и модой**; с ранних лет они хотят стать либо королевой красоты, либо кинозвездой и т. д.
- ▶ **их хвалили и льстили** за каждую мелочь (Lyc., Pall., Verat.).
- ▶ Высокомерные, гордые и эгоистичные дети.
- ▶ Они любят привлекать всеобщее внимание дорогой и элегантной одеждой.
- ▶ Раннее и выраженное желание мастурбации и полового акта.
- ▶ Чувствительный, плачет от малейшего замечания.
- ▶ Сильно раздражается даже по мелочам (Ign., Staph.).

Тело

- ▶ **Чувствительные гениталии**; ребенок плачет при прикосновении к подгузникам или нижнему белью.
- ▶ Сухой кашель у истеричных детей.
- ▶ Непроизвольные движения уголков рта и век.
- ▶ Чувствительные и легко утомляемые дети.
- ▶ Стройные, круглолицые дети с пухлыми, выдающимися губами и гордой осанкой.
- ▶ Маленькие девочки, которые не принимают свой пол и ведут себя как мальчики (Nat-m.); в противоположность этому, мальчики, которым нужна платина, выглядят довольно женоподобно (Lyc., Sil.).

Другие важные симптомы

Дух

- Заболевания, вызванные: **гневом**, смертью родителей, эгоизмом, горем, обвинением или презрением, а также **сексуальным насилием**.
- **Демонстрирует фальшивые чувства**, чтобы произвести впечатление на других, что часто приводит к **наигранности** (Страм.), например, обнимает и целует всех подряд.
- **Желание научиться играть на пианино; любит слушать фортепианную музыку.**
- **лидерские качества** в очень раннем возрасте (Lyc., Sulph.).
- сильно **преувеличивают собственные достижения, хвастаются и тратят много времени на саморекламу.**
- Очень **грубые и невежливые** дети, которые оскорбляют даже собственных родителей.

- Булимия или анорексия возникают вследствие подавленного гнева или чувства заброшенности.
- Капризные дети, которые склонны быть всем недовольны.
- Комфорт ухудшается.
- Лживые дети добиваются исполнения своих желаний лестью (предательством).
- и критиковать других детей, которые физически и умственно слабее .
- Страх перед привидениями.
- Чувствую себя нелюбимым, брошенным и быстро отвергнутым (Puls., Staph.).
- Высокомерные, упрямые дети; не воспринимают слово «нет»; трудно поддаются дрессировке и дисциплине.
- Никаких художественных навыков.
- Безутешный плач, когда нас увещевают, злят или упрекают.
- Крайне амбициозный.
- Чрезмерный смех, даже по серьезным вопросам.
- Обсессивно-компульсивное расстройство, постоянное мытье рук.
- Чувствителен к боли; кричит и плачет, когда испытывает боль.
- Бесстыдство, непристойная одежда.
- Угрожает и избивает своих друзей в ярости, с бледным лицом.
- Очень официально и корректно.
- Очень эгоистичные и неблагодарные дети; жестокосердные.

Голова

- Головная боль, вызванная **гневом**, у детей, находящихся под влиянием строгости родителя или учителя.
- Головная боль особенно сильно ощущается в висках или на одной стороне головы, сопровождается затуманиванием зрения и слезотечением; усиливается от напряжения глаз и в переполненном или душном помещении; облегчается с закрытыми глазами и от ходьбы на свежем воздухе.
- Результаты теста:
 - Гидроцефалия.
 - Мигрень.

Глаза

- Результаты теста:
 - Глаза закатились.
 - Зрачки нечувствительны к свету.
 - Пристальный взгляд.
 - Запавшие глаза.
 - Подергивание век.

Нос

- Повышенная чувствительность обоняния.
- Заложенность носа с обеих сторон в теплом или закрытом помещении.
- Результат теста:
 - Носовые кровотечения с темной, запекшейся кровью.

Лицо

- Красное лицо во время приступов ярости (Bell., Hyos., Nux-v., Stram.).
- Результаты теста:
 - Потрескавшиеся губы или склонность к шелушению.
 - Осунувшееся лицо с синими кругами под глазами и холодом, особенно с правой стороны.

РОТ

- Затрудненное прорезывание зубов.
- Обильное слюнотечение.
- Заикание.
- Результаты теста:
 - Синюшное окрашивание языка.
 - Расшатывание кариозных зубов.

Шея

- Склонность к постоянному сглатыванию.
- Результаты теста:
 - Удлиненный язычок.
 - Болезненный зуб.
 - Опухшая правая миндалина (фит.).

ЖЕЛУДОК

- Иккинг.
- Громкая отрыжка при голоде (Nux-v.).
- Ночью после ужина хочется пить.
- Не любит: **мясо**.
- Пристрастия: хлеб, холодные напитки, сладости.

ЖИВОТ

- **Боль в животе от испуга и голода** (Calc., Sep., Staph.).
- Схваткообразные, режущие боли в животе, особенно в области пупка, с запором.
- Задержанный метеоризм.
- Результаты теста:
 - Паховая грыжа.
 - Большой живот.

ПРЯМАЯ КИШКА

- **Сладострастный зуд вокруг ануса** (Sulph.).
- Запор во время путешествия, сопровождающийся тщетными позывами и натуживанием, даже при мягком стуле; стул приходится удалять механически.
- Стул, похожий на овечий помет, сухой, твердый, комковатый, распадающийся на черные шарики.
- Результаты теста:
 - Трещины прямой кишки.
 - В кале: острицы и сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- Результат теста:
 - Красная моча, оставляющая красный осадок в подгузниках.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Склонность к мастурбации у маленьких детей, особенно во время сна.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Раннее и сильное сексуальное влечение у молодых девушек приводит к мастурбации (Ориг.).
- Белые или прозрачные, безболезненные выделения, особенно в течение дня, с приятным зудом вульвы.

ГОРТАНЬ

- Охриплость из-за узелков на голосовых связках.
- Laryngismus stridulus.

ДЫХАНИЕ

- Спастическая астма; ухудшается на открытом воздухе или в ветреную погоду.

КАШЕЛЬ

- Кашель при ветрянке (Ant-c.).
- Ощущение, будто кашель исходит из желудка (Bry., Kali-bi., Sep.).
- Приступы короткого и сухого кашля с лихорадкой.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

- Ревматический эндокардит.
- Результат теста:
 - Пульс: слабый.

КОНЕЧНОСТИ

- Сокращение сухожилий пальцев, в результате чего пальцы остаются сжатыми (паралич разгибателей пальцев, например, глубокого разгибателя пальцев, длинного и короткого разгибателей большого пальца).
- Склонность обнажать ноги ночью (Med., Sulph.).
- Слабость в ногах.
- Результаты теста:
 - Беспокойство нижних конечностей, особенно ног, в положении сидя (Med., Zinc.).
 - Судороги рук.
 - Дрожание рук при потягивании.

СПАТЬ

- Спит на спине, положив руки на голову, широко расставив и не укрыв ноги.
- Быстро засыпает во время чтения (Гельс.) или после еды.
- Потоотделение во время сна.

КОЖА

- Сладострастный зуд по ночам, не облегчающийся расчесыванием.
- Результат теста:
 - Холодная, бледная кожа.

Судороги

- Заболевания от гнева, испуга, мастурбации и глистов.
- Судороги с тетанической ригидностью.

Общий

- **Повышенная чувствительность к боли, которая постепенно то усиливается, то ослабевает.**
- Дискомфорт при мастурбации и подавленное потоотделение.
- Очень быстро меняющиеся физические симптомы ИЛИ физические симптомы, чередующиеся с психическими симптомами.
- Правосторонние симптомы.
- Дрожь от холода, страха или боли.

PLUMBUM METALLICUM

(Свинец - Плб.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Дети с замедленным пониманием; размышления также требуют времени, и ответы приходят соответственно медленно.
- ▶ Средние способности к обучению, часто в специальных школах.
- ▶ Дети, которые преувеличивают свои жалобы.
- ▶ Замедленная умственная и физическая реакция; трудно усваивает впечатления, медленно раскрывается и требует времени для самовыражения.
- ▶ Застенчивые и молчаливые дети.

Тело

- ▶ Постоянные запоры или колики у маленьких детей.
- ▶ Ребенок плачет и кричит перед мочеиспусканием (Lys, Sanic).
- ▶ Любит тянуться и вытягиваться в разных положениях.
- ▶ Дети с врожденными или приобретенными заболеваниями спинного мозга (Phos., Pic-ac., Zinc.), например, астроцитомами, дермоидными кистами, метастазами лимфомы, туберкулезом позвоночника, сдавлением спинного мозга и нервных корешков, спинальным дизрафизмом и сирингомиелией.
- ▶ Истощенные дети с большими животами и истощенными конечностями.
- ▶ Дрожащий язык.

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ PLB., BAR-C. И ALUM.

Plb. очень напоминает **Bar-c.** и **Alum**, и клинически их легко спутать. У них есть следующие общие симптомы:

- Отвращение к умственному напряжению.
- Страх страхом.
- Жалобы, связанные с ожиданием.
- Затвердение желез.
- Живот втянут и твердый при пальпации.
- Серьезно.
- Сильная жажда.
- Лень ухудшает симптомы.
- Трусость.
- Рассеянный или погруженный в свои мысли.
- Умственная отсталость, идиотия.

- Задержка мочи.
- Всегда опаздывает, никогда не приходит вовремя на встречу.
- Холодная пища ухудшает ситуацию.
- Спазмы пищевода.
- Медлительность.
- Капризный.
- Чувствителен к свету.
- Тенденция к медленному заживлению ран.
- Обильное слюнотечение.
- Прямая кишка вялая.
- Ретроназальный катар.
- Потрескавшиеся губы.
- Беспокойство по ночам.
- Быстро испугался.
- Ощущение паутины.
- Разговоры и стоны во сне.
- Упрямый и упрямый.
- Критиковать.
- Утром грустно или подавленно.
- Нерешительность.
- Недовольство.
- Чувство покинутости.
- Снижение слуха.
- Полнота рук и ног.
- Непослушный.
- Подпрыгивания во сне или при засыпании.

Другие важные симптомы

Дух

- **Отвечает медленно**, односложно; особенно при токсических заболеваниях (септические миндалины, вирусные инфекции, менингит, энцефалит, сепсис) дети часто отвечают медленно, но правильно и ступор быстро возвращается после ответа (Бапт.); избегает зрительного контакта.
- **Симулирует болезнь** (иногда преувеличивает симптомы).
- **Страх публичных выступлений**, усугубляемый давлением ожиданий; застенчивость и робость на публике.
- **Медлителен во всем** (как Бар-к., не может быстро все понять, не торопится).
- **Имеет тенденцию грызть все**: одежду, пальцы, себя и свои ногти.
- Не любит компанию, предпочитает одиночество (застенчив и сдержан, не хочет показывать свои чувства и поэтому избегает общества).
- Неуклюжий.
- Дети, испытывающие трудности в обучении, неуверенность в себе и значительные трудности с концентрацией внимания, делают много ошибок при чтении (тяжелая дислексия).

- Дети, которые постоянно делают смешные жесты и выходки (чувствуют себя брошенными и хотят привлечь к себе внимание).
- Страх прикосновения (все средства от пауков и Kali-с.).
- Дети пугливые и застенчивые; они особенно боятся кошек, собак и незнакомцев, которые к ним приближаются.
- Усердная молитва за маленьких детей (просите Бога облегчить их физические страдания).
- Хорошо подстрекает других детей к плохим поступкам.
- Дети-идиоты, которые постоянно хмурятся.
- Непроизвольный, чрезмерный смех.
- Своенравные дети, которые не терпят ответа «нет» и не любят, когда на них смотрят, говорят с ними или трогают их; громко плачут (хронические физические заболевания, которые приводят к физическим и психическим отклонениям, часто проявляются в подобном поведении).
- Таинственный, сдержанный.
- Медленно учится говорить (нац.).
- В гневе бьёт, топает ногами, плюётся и кусает других; успокоить его можно только лёгким покачиванием.
- Внезапные громкие крики при буйном бреде, в случаях неврологического инсульта.
- Во время игры разговаривает сам с собой.
- Громкое хныканье или рыдания по мелочам с целью привлечения внимания.

Голова

- **Головная боль со скованностью, болью в шее и рвотой фонтаном** (Bell., Hyos., Phos., Zinc-s.).
- Головная боль от запора, чередующаяся с болями в животе.
- Результаты теста:
 - Детский церебральный паралич.
 - Холодный пот на лбу.
 - Жирные волосы.
 - Горячая голова, красное лицо и холодные конечности.
 - Гидроцефалия.
 - Повышенное внутричерепное давление.
 - Подергивание головы из стороны в сторону.
 - Признаки нарушения мозгового кровообращения.
 - Признаки раздражения мозговых оболочек +.
 - Не может держать голову прямо.

Глаза

- Спайки век.
- Результаты теста:
 - Атрофия зрительного нерва.
 - Центральная скотома.
 - Помутнение роговицы.
 - Глаза полуоткрыты (Bell., Supr., Op.).

- Выпадение волос на бровях.
- Hippus pupillae (ритмическое сужение и расширение зрачков, не зависящее от света)
- Иридоциклит.
- Неврит зрительного нерва.
- Паралич верхних век, особенно левого.
- Воспаление сетчатки.
- Постоянно трёт глаза.
- Прищуриться.
- Зрачки неравные: один сужен, другой расширен.
- Дикий, пристальный взгляд.

уши

Снижение слуха из-за увеличенных миндалин.

Нос

Обильные водянистые или желтовато-зеленые выделения из носа во время еды.
Потеря обоняния.

Результаты теста:

Острый красный нос.

Ретроназальный катар с густыми, вязкими выделениями.

Лицо

• Результаты теста:

Жирный и блестящий, словно смазанный маслом (Nat-m., Thuj.).

Жевательные движения.

Холодный пот на лице.

Истощение мышц лица.

Бледный и пепельный; краснеет только при лихорадке или головной боли.

Паралич правой стороны лица.

улыбка или столбняк.

Глупый, тупой, старый, изможденный и морщинистый.

Опухшие губы, которые непроизвольно дрожат или подергиваются.

РОТ

Обильное, пенистое слюнотечение во время судорог, во время сна и при разговоре.

Сладкий или металлический привкус во рту.

Неразборчивая или заикающаяся речь.

Результаты теста:

Бледные, губчатые, цинготные десны **с тонкой красновато-фиолетовой полоской по краю зубов**; они легко кровоточат, даже от самого легкого прикосновения.

Все зубы черные, гнилые, с кариозными полостями или неровные и легко крошатся.

Может высунуть язык с большим трудом; при высовывании он дрожит.

Открытый рот.

Отвратительный неприятный запах изо рта.

Паралич языка; при высовывании он оттягивается в левую сторону (паралич XII пары черепных нервов).

Гладкий язык с выступающими красными сосочками, следами от зубов и коричневатым налетом в центре.

Зубы расшатываются, поскольку десны отделяются от зубов.

ШЕЯ

Спазмы пищевода; может глотать только жидкости, **малейшее количество твердой пищи вызывает рвоту.**

Паралич шеи (синдром Гийена-Барре); жидкость вытекает из носа при попытке глотания (паралич IX (языкоглоточного нерва) и X (блуждающего нерва) черепных нервов).

Результаты теста:

Афтозные язвы.

Опухший язычок, с опухшими и уплотненными миндалинами.

Густые и вязкие выделения из ретроназальной области.

Слабость передней зубчатой , грудино-ключично-сосцевидной и надостной мышц.

ЖЕЛУДОК

Сильная жажда с невозможностью пить из-за тошноты и рвоты вследствие кишечной непроходимости или перитонита; отсутствие жажды при лихорадке.

Рвота фекалиями вследствие калового завала или кишечной непроходимости; зеленовато-желтая или зеленовато-черная масса, имеющая неприятный запах и прожилки крови.

Громкая отрыжка.

Желание поест вскоре после еды.

Удушье с сильной, постоянной рвотой и спазматическими болями в животе сразу после еды или питья, независимо от его количества.

Обострение: рыба (особенно испорченная).

Не любит: овощи.

Пристрастия: **печенье**, хлеб (особенно ржаной), холодные напитки, **жареная пища**, соленое, кислое и сладкое.

ЖИВОТ

Колики чередуются с бредом.

Спазматические, режущие боли в животе, особенно в области пупка, с выраженным запором; лучше, если свернуться калачиком.

Потливость живота.

Урчание в животе при пробуждении по утрам.

Сильные колики, отдающие во все части тела.

Результаты теста:

- **Большой и твердый** живот.

Раздутая и пальпируемая толстая кишка.

Инвагинация с каловым завалом и скоплением газов.

Паралитическая непроходимость кишечника.

Втяжение живота в области пупка, как будто он соединен с позвоночником (важный признак перитонита).

Селезенка и печень увеличены и болезненны.
Ущемленная паховая грыжа.
Чувствительность илеозоэальной области (Bry., Iris-t., Lach., Merc-c.).
Пупочная грыжа.

ПРЯМАЯ КИШКА

Кал мелкий, черный, шаровидный, в области ануса рассыпчатый; похож на овечий помет, покрыт слизью.

Полная бездеятельность прямой кишки; тяжелый, хронический, упорный запор с постоянными, бесплодными позывами к дефекации.

Диарея, чередующаяся с запорами.

Зуд вокруг ануса.

Зловонный метеоризм.

Непроизвольные испражнения ночью в постели.

Результаты теста:

Сужение или спастическое сокращение прямой кишки (основная причина сильного запора).

Анальные трещины.

Отсутствует анальное отверстие.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Это средство хорошо подходит для лечения всех видов нефротического синдрома.

Отсутствие позывов к мочеиспусканию, несмотря на растянутый мочевой пузырь (из-за паралича спинномозговых нервов) (Ars., Caust.).

Темно-коричневая или мутная моча; оставляет красный или темно-коричневый осадок в подгузнике.

Дизурия: ребенок плачет и кричит перед мочеиспусканием; слабый напор мочи приводит к подтеканию.

Воспаление почек с повышенным артериальным давлением.

Задержка мочи с интенсивными коликами.

Результаты теста:

Биопсия почки показывает склероз и утолщение базальной мембраны клубочков.

Спастическая стриктура уретры.

Моча: Альбумин ++, оксалат кальция, цилиндры (эпителиальные и гиалиновые), глюкоза ++, низкий удельный вес, лейкоциты ++ и эритроциты +.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Склонность к мастурбации.

Результат теста:

- Неопущение яичек.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Охриплость или потеря голоса из-за паралича голосовых связок.

Результат теста:

- Ларингизмус стридулус.

ДЫХАНИЕ

Во время колик происходит остановка дыхания.

Одышка, чередующаяся с ступором.

Одышка в положении лежа; необходимо находиться возле открытого окна.

Результаты теста:

Хриплое дыхание.

Затрудненное дыхание.

КАШЕЛЬ

Постоянный, сухой, короткий кашель, днем и ночью.

Пенистая, кровянистая и гнойная мокрота.

Боль в животе при кашле.

Короткие приступы кашля в положении лежа ночью, при глубоком дыхании и при вставании утром.

Грудь

Результаты теста:

- Пот на груди.

- Сотрясение грудной клетки при кашле (Phos.).

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Сильное сердцебиение.

Результаты теста:

- Эндокардит.

Гипертрофия сердца.

Шумы в сердце.

Пульс: нерегулярный, частый, нитевидный, едва прощупывается.

НАЗАД

Скованность и спастическое оттягивание шейного отдела назад.

Результаты теста:

Искривление позвоночника.

Похудение мышц спины.

Опистотонус.

Спинальный менингит.

КОНЕЧНОСТИ

Нечувствительность рук и пальцев к теплу от огня или боли (характерно для синингомиелии).

Неуклюжесть пальцев.

Ноги спазматически подтягиваются вверх, возникают коликообразные боли в животе.

Зловонный пот ног.

Слабые запястья.

Результаты теста:

Мозжечковый знак +.

Истощение мышц конечностей, особенно кистей, тенарных бугров, предплечий и ягодичной области.

Рукопожатие при письме, удержании предметов, протягивании рук, еде и т. д.
Ломкие ногти.

Сокращение пальцев вследствие паралича глубокого и поверхностного разгибателей пальцев, а также длинного и короткого разгибателей большого пальца.

Цианотичные ногти.

Сухие руки.

Истощение парализованных конечностей (паралич нижних двигательных нервов).

Паралич Эрба [паралич верхнего плечевого сплетения].

Ганглий.

Ледяной холод рук и ног.

Опустите руку.

Спать

Спит на животе или спине, подтянув ноги и зажав правую руку между ног.

Сонливость при лихорадке и после судорог.

Во время сна: холодный и липкий пот, скрежет зубов, стоны и беспокойство ; хочет перейти из одной кровати в другую.

Бессонница при заболеваниях почек или коликах.

Просыпается от ужасных снов.

КОЖА

Кожа всегда сухая и холодная, даже после длительной физической активности или игры.

Сильный зуд; необходимо расчесывать пораженный участок до тех пор, пока он не станет саднить и болеть.

Результаты теста:

Опрелость.

Желтуха.

Судороги

Жалобы на: колики в животе, **падения**, кровотечения, мастурбацию и уримию .

Аура/предсудороги: спутанность сознания, крики, вздохи, опухание языка и **головокружение**.

Во время судорог: синюшное или желтоватое окрашивание лица; клонические и тонические судороги конечностей, поражающие только одну сторону; расширенные зрачки; носовое кровотечение; **согнутые конечности**; пена изо рта; голова повернута в левую сторону; **непроизвольное мочеиспускание** на пол с диким бредом и искаженным лицом; **неистовство**; тетаническая ригидность; потеря сознания; плач.

После судорог: спутанность сознания, **бессвязная речь**, потливость, **сонливость** и потеря сознания.

Периодические судороги при ТИА (транзиторной ишемической атаке).

Общий

Хроничность всех жалоб.

Полиомиелит.

Анасарка вследствие заболевания почек (Охун.).

Дети с анемией, страдающие хроническими запорами.

Нечувствительность выражена столь же сильно, как и повышенная возбудимость.

Сужение и спазмы наружных сфинктеров.

Дети с темной кожей, чья кожа на ощупь холодна как лед.

Отсутствие реакции.

Маразм у маленьких детей в, казалось бы, безнадежных случаях; живот - большой и твердый.

Прогрессирующая мышечная атрофия вследствие дегенерации позвоночника.

Рахит.

Гнойные раны или раны, которые легко кровоточат и медленно заживают.

Телеангиэктазии по всему телу.

Дрожь от малейшего умственного или физического напряжения.

Псоринум (Псорный нозод - Psor.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Множество необоснованных страхов. Чтобы понять ребёнка с

Псориазом, нужно объединить страхи Кальция и Страма.

Дети, оставшиеся на анальной стадии психосексуального развития (в понимании Фрейда).

Обучение затруднено, например, из-за синдрома дефицита внимания и дислексии.

Комплекс неполноценности (у Sulph. комплекс превосходства).

Тело

Выделения и пот имеют **запах падали** (Ars.).

Жирное лицо с красным, впалым носом.

Повышенная чувствительность к холодному воздуху или переменам погоды.

Может быть полезен, **когда правильно подобранные средства не действуют** или хронические случаи (в острых случаях: Sulph и Tub.) не приводят к стойкому улучшению или когда Sulph, кажется, подходит, но не помогает.

Дети, в семейном анамнезе которых есть случаи астмы, аллергии, экземы или рака.

Преждевременное старение: ребенок выглядит как старик.

Руки выглядят грязными даже после частого мытья.

Голова имеет форму скрученной пирамиды с острым длинным носом, длинной верхней губой и большими ушами.

Отсутствие ответа (Carbo-veg., Caps., Cupr., Op., Zinc.) после острых заболеваний, таких как корь, ветряная оспа, первичный туберкулез, пневмония, бронхит.

Неясное состояние слабости или разбитости после острых заболеваний.

Другие важные симптомы

Дух

Напряжение ожиданий, возникающее из-за **пессимистического настроения** или страха неудачи.

Чувство **покинутости и отчуждения** от близких. Такие чувства чаще всего встречаются у детей из многодетных семей, живущих в крайней нищете и испытывающих неудовлетворённые физические, эмоциональные и пищевые потребности. Классическое проявление псориаза развивается у детей из бедной страны, где постоянно идёт война или царит голод.

Ленивые, нечистоплотные дети, которые ненавидят купаться.

Не любит компанию; избегает общения с людьми (как мизантроп, который избегает людей, чтобы скрыть свои слабости).

Днем ребенок ведет себя хорошо, но ночью он становится очень капризным, беспокойным и плаксивым, постоянно ворочается и громко плачет.

Легко расстраивается, если не может выполнить задание; проявляет своего рода отчаяние, в основном из-за недостатка сил и пессимистического настроения.

Легко пугается мелочей, вздрагивает.

Страх пересечения улиц, многолюдных улиц, неудач и полетов.

Жесты; постоянное заламывание рук или теребление постельного белья.

Нерешительность, неуверенность в себе и пессимизм после лечения экземы местными стероидами в младенчестве или раннем детстве.

Раздражение и днем и ночью.

Нервный, беспокойный и легко пугающийся.

Навязчивое желание постоянно мыть руки.

Упрямые дети, которые постоянно ноют и жалуются.

Религиозный (молитва и размышления о Боге — единственный выход для ребенка вырваться из нищеты и безнадежности).

Слабые способности к арифметике и математике.

Плохая кратковременная память на то, что он только что прочитал или чему его научили.

Голова

Головная боль, как у школьницы, словно стучат маленькие молоточки, каждое утро; лучше от носового кровотечения или от теплого укутывания головы.

Зуд кожи головы из-за тепла в постели.

Результаты теста:

Жирный пот на лбу.

Зарывает голову в подушку.

весы.

Сухие, тусклые, слипающиеся и легко запутывающиеся волосы.

Очаговое выпадение волос или поседение.

Вонючие, влажные, желтые корки или чешуйки на затылке, которые легко кровоточат при расчесывании.

Вши.

Колыбельная.

Глаза

Утром глаза слипаются.

Жгучие слезы, особенно по ночам.

Конъюнктивит при аллергическом рините.

Затуманенное зрение или черные пятна в поле зрения перед головной болью.

Рецидивирующие ячмени или узелки на веках (Sil., Sulph.).

- Результаты теста:

- Постоянное трение глаз.

- Изъязвление роговицы.

- Отёчность век.

- Заворот или выворот век.

- Пустулезный конъюнктивит с зловонными желтыми выделениями.

- Прищуриться.

Уши

Хронические выделения из уха после кори (Puls.).

Хроническая гнойная инфекция среднего уха с обильными, жидкими, желтоватыми или коричневатыми, очень зловонными выделениями.

Зуд в ушах, особенно в правом, усиливающийся к вечеру.

Постоянные выделения из уха из-за холестеатомы (дифтерии).

Результаты теста:

Мокнувшие и шелушащиеся экзематозные высыпания или волдыри за ушами (Calc.).

Постоянно засовывает пальцы в уши.

Снижение слуха из-за увеличенных миндалин (Kali-bi., Merc.).

Красноватая ушная сера.

Нос

Насморк и заложенность носа из-за сквозняков (Dulc.).

Сухость в носу заставляет ребенка постоянно ковырять или сморкаться пальцами, несмотря на отсутствие выделений.

Зловонные выделения при хроническом рините.

Сенная лихорадка с приступами чихания каждую осень (Дульц).

Потеря обоняния.

Чихание во время или после кашля (Agar., Squil.).

Результаты теста:

- Аденоиды.

Постоянно ковыряет в носу пальцами.

Полипы носа.

Ретроназальный катар с выделением гнойной, вязкой массы.

Красный, опухший кончик носа.

Густые, желтоватые или кровянистые выделения из носа, которые очень быстро высыхают и образуют зловонные, твёрдые корки или чешуйки. При снятии они оставляют болезненное место и образуются снова (Kali-c., Kali-bi., Nit-ac.).

Лицо

Корки, шелушащиеся или мокнувшие **экзематозные высыпания** на лице с сильным зудом, **усиливающимся от любого тепла**.

Результаты теста:

Выраженный рост волос на лице (Calc., Nat-m., Sulph., Thu.).

Жирное лицо, особенно **лоб**, который выглядит так, будто его обмазали маслом.

Атопическая экзема [нейродермит].

Обильное потоотделение на лице во время лихорадки и после еды (Cham.).

Бледное лицо; неряшливый, грязный, неопрятный вид, словно покрытое грязью.

Опухшие, воспаленные и уплотненные подчелюстные лимфатические узлы и околоушные железы.

Бородавки вокруг рта.

РОТ

Затрудненное прорезывание зубов.

При простуде еда кажется безвкусной (Nat-m., Puls.).

Результаты теста:

Синеватые, губчатые десны, которые легко кровоточат и отделяются от зубов.

Сухой и потрескавшийся язык с желтоватым или беловатым налетом.

Чрезмерное слюнотечение при разговоре (смехе).

Вонючее дыхание.

Ранула.

Дрозд.

Язвенный стоматит с афтами на деснах и языке.

ШЕЯ

Хроническое и рецидивирующее воспаление и нагноение миндалин с болезненным глотанием.

Сухость в горле без жажды (Apis, Puls.).

Из задней части носовой полости вытягивается густая слизь.

Результаты теста:

Темно-красное горло с жирными, похожими на сыр, отложениями
(Белл., Кали-би.).

Удлиненный язычок.

Устраняет творожистые комки.

Болезненные и воспаленные железы, опухающие, словно нить жемчуга на шее.

Увеличение щитовидной железы.

ЖЕЛУДОК

Сильная жажда во время еды и при лихорадке.

Икота после кормления.

Повышенный аппетит до появления каких-либо симптомов, особенно до и во время головной боли.

Желание поест сразу после еды, особенно ночью.

Кислая рвота каждое утро перед завтраком.

Быстрое расстройство желудка с отрыжкой неприятным запахом после употребления персиков или свинины.

Обострение: молоко, **персики** и кислые фрукты.

Отвращение: вареная пища, **свинина, картофель, сладости, помидоры**, острые блюда.

Пристрастия: к древесному углю, деликатесам, **неперевариваемым вещам** (например, извести, сланцу, земле, мелу, глине и т. д.), кислой пище.

Результат теста:

- Эндоскопия: гастрит.

живот

Хронический гепатит с болями в правом подреберье при кашле.

Вздутие живота (белковая недостаточность) с метеоризмом после еды.

«Индийский детский цирроз» [ICSS, генетически обусловленная форма цирроза печени, вызванная воздействием меди],

Боль в желудке после употребления персиков.

Грохот.

Результаты теста:

Паховая грыжа.

Печень и селезенка увеличены.

ПРЯМАЯ КИШКА

У ребенка хронический запор; ему приходится тужиться даже при мягком стуле, который долго остается в прямой кишке без позывов.

Сильный зуд в области ануса из-за сыпи или глистов.

Непроизвольные дефекации во время сна.

Безболезненный, водянистый понос сразу после пробуждения утром; после острых заболеваний, во время прорезывания зубов, из-за подавленных сыпей, летом.

Стул темный, мягкий, с примесью слизи и запахом тухлых яиц.

Полезно при целиакии, болезни Крона и синдроме мальабсорбции.

Результаты теста:

Выделение **горячих, очень зловонных газов**, запах которых распространяется по всему дому.

Врожденный мегаколон (болезнь Гиршпрунга).

Потливость ануса и промежности (Нер., Thu.).

Полипы прямой кишки.

Кал: сегменты ленточных червей и круглые черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Непроизвольное мочеиспускание при кашле, смехе, чихании и ночью во время сна, особенно в полнолуние.

Постоянные случаи ночного недержания мочи (Lac-c.) при наличии в семейном анамнезе экземы.

Результат теста:

- Мутная или темно-коричневая моча, оставляющая густой красный осадок в подгузнике.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

• Результаты теста:

Гидроцеле.

Затверждение и неопущение яичек (крипторхизм).

Зловонный пот в области гениталий (Fl-ac., Iod., Sulph.).

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

• Результаты теста:

Молочные или комковатые, очень зловонные выделения у маленьких девочек.

Полипы во влагалище.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Хроническая охриплость, усиливающаяся от разговора.

Боль в гортани при кашле.

ДЫХАНИЕ

Астма у маленьких детей, чередующаяся с атопическим дерматитом.

Одышка на свежем воздухе, на открытом воздухе; лучше лежа на спине с вытянутыми руками (Sulph.).

Одышка у детей, страдающих ревматическим пороком сердца (обусловлена декомпенсацией деятельности сердца вследствие поражения клапанов сердца).

КАШЕЛЬ

Кашель после подавления различных кожных заболеваний путем местного применения мазей (Dulc.).

Кашель, сопровождающийся слюноотделением (Bar-c.) и заканчивающийся чиханием (Agar.).

Кашель после употребления холодных напитков и при прикосновении к области вокруг ушного канала.

Сухой, отрывистый кашель в положении лежа ночью из-за ощущения щекотания в гортани.

Приступообразный, влажный кашель при пробуждении утром, со светлой - зеленоватой мокротой.

Приступы спазматического кашля, возникающие каждую зиму.

Грудь

Сердцебиение с одышкой и болью в области сердца от малейшего усилия; лучше в положении лежа, особенно на спине с вытянутыми руками, или в положении лежа на правом боку.

Слабость в груди из-за кашля.

Результаты теста:

Абсцесс легкого.

Едкий пот подмышек, который разъедает дыры в белье (Iod).

Гипертрофия сердца.

Пансистолические шумы.

Перикардальный выпот у детей, больных астмой.

НАЗАД

• Результаты теста:

Фурункулы и нарывы в области шеи.

Экзема в области шеи с сильным зудом.

Кифоз и сколиоз позвоночника.

Расщелина позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

Не выношу звука соприкосновения его конечностей по ночам и тяжести его рук на груди.

Неуклюжие дети, склонные спотыкаться и падать, а также вывихивать и растягивать лодыжки.

Зуд с экзематозными высыпаниями и шелушением на сгибательных поверхностях суставов, особенно зимой.

Беспокойство в ногах по утрам в постели.

Слабость и боли в конечностях от малейшего изменения погоды и во время грозы (Rhod.).

Результаты теста:

Обильный, холодный и зловонный пот рук и ног.

Ломкие ногти.

Трещины кожи на руках, между пальцами ног и на сгибательных поверхностях суставов, особенно зимой (график).

Паронихия.

Псориаз на ладонях.

Чувствительные мозоли на пятках.

Бородавки на руках и пальцах.

СПАТЬ

Младенцы очень раздражительны и не спят с 3 часов ночи до рассвета.

Желание остаться в постели утром.

Во время сна: скрежет зубами, крики и разговоры.

Частые ночные пробуждения из-за голода или зуда кожи у новорожденных .

Испытывает страх во сне из-за ужасных снов.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Рвота желчью, раздражительность и сильная слабость, с обильным, - изнуряющим потом во время лихорадки.

Сильный озноб с нежеланием раскрываться на всех стадиях лихорадки.

Делирий вечером при высокой температуре.

Жара чередуется с морозом.

Нерегулярно повторяющаяся, перемежающаяся лихорадка, без определенной закономерности, но с каждым приступом лихорадки интенсивность симптомов усиливается.

Озноб при малярии, начинающийся с рук и бедер.

КОЖА

Отчаяние из-за зуда (отчаяние ребенка и семьи).

Рецидивирующая чесотка.

Экзема с коркой, зловонной сыпью по всему телу, сопровождающейся зудом; хуже зимой и ночью при согревании в постели; вынужден расчесывать пораженный участок до тех пор, пока он не станет саднить и не начнет кровоточить.

Ношение шерстяной одежды усиливает зуд (Hep., Sulph.).

Полезно в случаях, когда сыпь не проходит (Stram., Sulph., Zinc.).

- Результаты теста:

- Грязная, нечистая, нездоровая кожа.

- Жирный, словно облитый маслом.

- Шероховатая и неровная, легко трескается, кровоточит; хуже зимой.

- Бородавки.

Общий

Аллергическая конституция, склонность к простудам.

Отвращение к купанию.

Потеря веса у детей с волчьим голодом; потеря веса распространяется вниз , с увеличением желез.

Обильный, кислый, изнуряющий пот от малейшей физической нагрузки или во время острого заболевания, например, при ходьбе или даже письме, а также ночью после 3 часов ночи.

Очень зябкий, даже летом приходится укрываться теплыми одеялами; все жалобы усиливаются при любой форме холода.

Жалобы, вызванные: изменением погоды, подавленной сыпью, подавленным потоотделением (особенно потливостью ног), вакцинацией, ветреной и штормовой погодой , зимой.

Анемичные, бледные, хрупкие, болезненные дети, с очень грязной кожей и неприятным запахом.

Дети с рецидивирующими инфекциями в анамнезе: абсцессы, конъюнктивит, лихорадка, ячмени, тонзиллит.

Дети, в семейном анамнезе которых есть случаи алкоголизма, астмы, экземы.

Противоречивые и чередующиеся состояния.

Цианотичные дети.

Непереносимость шерстяной одежды.

Никогда не был здоров с момента последнего гриппа или инфекционного заболевания.

Периодичность симптомов: повторяются через день или каждые 2–3 недели.

Рахит.

PULSATILLA PRATENSIS

(Прострел, первоцвет - бобовые.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Сильная эмоциональная привязанность к матери (цепляние); не хочет расставаться с ней ни на секунду.

Девушки, которые хотят рано выйти замуж, чтобы **стать домохозяйками** и родить много детей, или девушки, которые мечтают о **карьере медсестры**.

Подходит для детей со следующими характеристиками (в отличие от Nux-v.): **эмоциональные, нежные, нерешительные, кроткие, застенчивые и послушные.**

Дети с персистирующим Эдиповым комплексом или оральной фиксацией по Фрейду.

Дети, требующие слишком много внимания.

Дети, у которых наблюдаются эмоциональные нарушения после рождения брата или сестры.

Дети, которые чувствуют себя обделенными вниманием из-за мелочей.

Дети, которые не хотят делиться любовью своей матери с другими детьми, даже со своими братьями и сестрами.

Ревность, когда новорожденный брат или сестра внезапно привлекают внимание семьи.

Тело

Все слизистые выделения **незначительные** и **желтовато-зеленые** (Kali-s., Nat-s.).

Симптомы постоянно меняются (Ign., Tub.).

Подходит для детей с голубыми глазами, светлой кожей, бледным лицом и песочными волосами.

Для мальчиков, которые больше похожи на девочек.

Инфекция паротита распространяется на яички.

Блуждающие боли, быстро перемещающиеся из одной части тела в другую (Kali-bi., Lac-c., Mang-act.).

Боль и многие другие жалобы сопровождаются чувством холода.

Отсутствие жажды почти при всех жалобах.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ PULS., CARC и PHOS.

Puls можно спутать с Carc или Phos . Их сходства:

Отвращение: к маслу, яйцам, жиру, фруктам, мясу, молоку и соли.

Страх за свою семью и собственное здоровье.

Возбужден после плохих новостей.
Лучше на открытом воздухе.
Чувствительные дети.
Страх одиночества, толпы, темноты, привидений, насекомых, ночи, открытых пространств, ужаса.
Скупость.
Добросовестный.
Тоска по дому.
Капризный.
Немного обиделся.
Неуверенность в себе в школе.
Сострадательный.
Грызть ногти.
Любопытный.
Рецидивирующие ячмени.
Рецидивирующая диарея.
Спит на животе.
Бессонница из-за оживления.
Быстро испугался.
Разговоры во сне.
Притупление чувств при головных болях.
Любовь к животным.
Комфорт повышается.
Нерешительность.
Пристрастия: сыр, шоколад, холодная пища, яйца, выпечка, жирное, мороженое, специи и сладости.
Сны об опасности, кошмары.
Желание компании.
Чувство покинутости.
Смена настроений.
Истерики.

Другие важные симптомы

Дух

Эмоциональные дети , которые любят и нуждаются в получении ласки в виде объятий, поцелуев и нежности; нуждаются в постоянном внимании (Carc., Phos.).

Стоны являются основополагающей чертой характера: перед дефекацией, во время сна, при лихорадке , боли и т. д.

Жалобные вопли и плач от боли.

Неуклюж во всех действиях; склонен к несчастным случаям.

Грызть ногти.

Капризные дети, которые отказываются от того, о чем только что попросили.

Беспричинный плач и рыдания у младенцев.

Смена настроений.

Ребенок постоянно цепляется за близких ему людей, особенно за мать.

Обожаю розовый цвет.

Часто плачут во время принятия душа, боясь, что вода польется им на голову (Страм.).

Темнота сгущается.

Желание, чтобы вас медленно несли на плече.

Трудности с концентрацией внимания во время обучения.

Завистливые, эгоистичные и жадные дети.

Полон страхов; боится темноты или сумерек (Phos., Stram.), собак, привидений, стоматолога, насекомых, узких и многолюдных мест, поездок на поезде.

Представьте, что вас бросили и оставили без внимания близкие люди.

Представляете, что видите призраков и ужасные лица.

Нерешительные дети (в основном из-за зависимости).

Раздражительность с плачем и беспокойством во время лихорадки и при пробуждении по утрам; лучше на свежем воздухе.

Любит животных.

Делает ошибки при письме или разговоре, путает или забывает буквы и слова.

Манипулятивные дети, которые склонны лгать и симулировать болезни, чтобы привлечь к себе внимание (Hyos., Tarent., Verat.).

Чувствителен к грубости и критике.

Кричит с красным лицом, когда злится.

Застенчивые дети, которые легко краснеют и прячутся за мать; отвечают только односложно или кивают.

Неуверенность в себе у школьников.

Нарушение памяти при заучивании стихов.

ГОЛОВА

Сильный пульсирующий приступ мигрени у детей младшего возраста или школьников в период полового созревания.

Жалобы и ухудшения со стороны:

Вечером и всю ночь.

Шрек (Акон., Игн.).

Мороженое (Арс.).

Тепло в любой форме (солнечное тепло, лето, теплая еда или напитки, теплое помещение и т. д.).

После намокания или мытья волос.

Наклонившись.

Слишком много чтения или учебы.

• Лучше за счет:

Тугое обматывание головы (Arg-n., Sil.).

Холодные примочки (алоэ, репейник).

Медленная ходьба или вынос на руках на улицу.

• Сопутствующие симптомы:

Затуманенное зрение.

Тошнота и рвота.

Светобоязнь (натр.).

Скованность мышц шеи.

Обильный и вонючий пот, выделяемый только кожей головы.

Результаты теста:

Гидроцефалия вследствие воспаления мозговых оболочек.

Открытые роднички.

Пустулезные высыпания на затылке.

Чувствительность придаточных пазух носа.

Чувствительная кожа головы с воспалением надкостницы.

Невозможно поднять или удерживать голову вертикально; голова отклонена в сторону.

ГЛАЗА

Воспаление глаз у новорожденных и младенцев (Arg-n., Merc-c.).

Рецидивирующие ячмени и узелки век.

Сильная жгучая боль с сухостью и зудом в глазах; хуже от чтения, в теплом помещении и вечером; лучше от промывания глаз холодной водой и на холодном воздухе.

Разрывание является важным сопутствующим симптомом при большинстве жалоб; ветер его усиливает.

Офтальмия новорожденных; катаральное заболевание глаз, вызванное гонореей или герпесом у матери.

Светобоязнь, вызванная искусственным светом.

Густые, желтые, обильные, незначительные выделения из глаз, из-за которых глаза склеиваются утром после пробуждения.

Полезно при конъюнктивите после травм глаз или попадания в глаза инородных тел (Кокк).

Слабость глаз после кори (Kali-c.).

Результаты теста:

Постоянное протираание или трение глаз.

Кератоконус с помутнением.

Отёчность и утолщение век.

Свищ слезной железы с выделением гнояного содержимого из слезной железы при надавливании.

Глаукома.

Гранулёзный и аллергический конъюнктивит и ирит.

Вросшие ресницы, с нависанием век или без него.

Паралич зрительного нерва.

Маятникообразные или вращательные движения глазного яблока.

Прищуриться.

Стеноз слезного протока.

Запавшие глаза.

Опухоли хрящей век.

Трахома.

УШИ

Последствия кори: выделения, снижение слуха, воспаление и т. д.

Ребенок плачет при боли в ухе, которая усиливается в теплом помещении и ночью (Cham., Ferr-p.).

Хронический гнойный средний отит с обильными гнойными, густыми, желтовато-зелеными выделениями, особенно из левого уха.
Снижение слуха в холодную, сырую погоду или из-за простуды, при катаре евстахиевой трубы.
Инфекция среднего уха с высоким риском перфорации в полость височной кости, приводящая к гнойному менингиту, особенно у новорожденных.
Результаты теста:
Абсцесс с образованием спаек в среднем ухе.
Черная затвердевшая ушная сера.
Мочки ушей красные.
Сыпь на козелке и в слуховом проходе.
Экзостоз.
Воспаление или катар евстахиевой трубы.
Пот ушей.
Пустулезные высыпания с шелушением за ушами.
Отек слухового прохода и лимфатических узлов перед ухом.

Нос

Частое приступообразное чихание в теплых помещениях (All-с.).
Шмыгание носом у новорожденных (Lyc., Nux-v., Samb.).
Хронический водянистый катар в сырую погоду (Mer с.), на открытом воздухе (Nit-ас.) и в теплом помещении (All-с., Mer с., Nux-v.).
Обильные, текущие, пресные, густые, желтоватые или зеленоватые, зловонные выделения из носа, особенно по утрам.
Сухость чередуется с насморком.
Носовые кровотечения с выделением черной крови при сморкании и в теплом помещении.
Катар носа распространяется на лобные пазухи.
Заложенность носа в теплых помещениях и ночью; лучше на открытом воздухе.
Результаты теста:
- Абсцесс у корня носа.
Жирный нос.
Полипы носа.
Покрытые коркой ноздри.

Лицо

Отек и воспаление околоушных и подчелюстных желез, распространяющееся на яички.
Результаты теста:
Ребенок постоянно трёт лицо и глаза кулачками во время кашля.
Сухость губ; постоянное причмокивание и облизывание.
Корки и шелушащиеся высыпания на носу и ноздрях.
Лицо красное в положении лежа и бледнеет при вставании.
Верхнечелюстной синусит.
Одна сторона красная, другая бледная, с голубоватыми кругами вокруг глаз.
Спазмы мышц лица.
Подергивание или дрожание нижней губы.
Нахмуренные брови (Nux-v.).

РОТ

Ребенок кусает стекло во время кормления.

Сухость во рту и языке при пробуждении утром, отсутствие жажды.

Неприятный запах изо рта, неприятный привкус во рту по утрам.

Зубная боль с опуханием щеки; хуже от жевания и любого тепла (теплая комната, тепло постели, теплая еда или напитки и т. д.); лучше от холодных компрессов и холодной воды во рту.

Результаты теста:

Абсцесс корней зубов, проявляющийся нагноением десен.

Затрудненное прорезывание зубов, зубы черные, полные кариеса.

Непроизвольное прикусывание кончика языка при разговоре или жевании (Игн.).

Густой желтоватый или беловатый налет на языке (Кали-би.).

ШЕЯ

Склонность к постоянному глотанию, что является болезненным.

Сухость в горле, особенно при пробуждении утром, при полном отсутствии жажды.

Пища застревает в горле, вызывая рвоту (Кали-ч.).

При попытке глотать из носа вытекает жидкость.

Результаты теста:

Хронически опухшие, темно-красные и воспаленные миндалины и язычки.

Выпячивание кровеносных сосудов в горле.

Опухшие и уплотненные лимфатические узлы на шее и перед ушами.

ЖЕЛУДОК

Голодный, но не знаю почему.

Расстройство пищеварения с сильной отрыжкой, метеоризмом и болями в желудке после **жирной или обильной** пищи, особенно масла, мороженого и свинины; лучше от холодных напитков.

Медленное пищеварение.

Икота после употребления спиртного.

Откусывает ложку или стакан вместо того, чтобы нормально есть или пить.

Тошнота со рвотой через несколько часов после еды, улучшение после холодных напитков.

Удушье и рвота при кашле; пенистая, зеленоватая, кисло пахнущая масса, полная слизи.

Отсутствие жажды.

Обострение: хлеб с маслом, капуста, жирная или обильная пища, замороженные продукты, фрукты, выпечка, свинина, картофель, сырая пища, испорченная рыба.

Отвращение: масло, яйца, жир, фрукты, ветчина, мясо, молоко, свинина, горячая пища и напитки, вода.

Пристрастия: сыр, холодные напитки, сливочная пища, яйца всмятку, замороженные продукты, сельдь, сочная и освежающая пища, арахисовое масло, копчености, кислая пища и кислые фрукты, чай.

ЖИВОТ

Коликообразные боли в животе после жирной пищи, фруктов или мороженого. Затрудненное скопление газов с тимпаническим вздутием живота, хуже после еды.

Боль в животе после возбуждения, при кашле и перед дефекацией; боль заставляет сворачиваться калачиком.

Урчание в животе после еды и перед дефекацией.

Результаты теста:

Твердая, болезненная припухлость паховых лимфатических узлов.

Паховая грыжа.

Кольцевидная припухлость вокруг пупка.

Tabes mesenterica [кишечный туберкулез].

ПРЯМАЯ КИШКА

Различная текстура стула: плоский, горячий и едкий ИЛИ тестообразный и зловонный с зеленоватой слизью.

Диарея является важным сопутствующим симптомом большинства заболеваний, таких как желтуха, корь, крапивница и др.

Диарея усиливается после жирной пищи, после испуга или гнева, после фруктов, после малейшей сыпи во время еды, во время прорезывания зубов, во время лихорадки и в теплую погоду.

Непроизвольные дефекации во время сна.

Непереносимость лактозы.

Стул у него два-три раза в день, что для него совершенно нормально.

Отхождение горячих, зловонных газов после еды.

Сладострастный зуд и потертости в области прямой кишки, усиливающиеся от расчесывания.

Результаты теста:

Выпадение прямой кишки с болезненными, изъязвляющимися геморроидальными узлами; ребенок плачет и кричит, когда область вытирают после дефекации.

Вялый анус, с влажностью в этой области.

В кале: сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Ребенок кричит и плачет в конце мочеиспускания (Sars.), из уретры выделяется кровь.

Задержка мочи у новорожденных при любой простуде (Caust., Dulc.) и у детей, у матерей которых в анамнезе гонорея.

Частые позывы к мочеиспусканию в холодную или сырую погоду.

Зеленовато-желтые, густые выделения из уретры при приапизме.

Непроизвольное мочеиспускание во время сна, особенно в первой фазе сна, при отхождении газов, при чихании, смехе, кашле и т. д.

Скудная, коричневая, зловонная моча.

Результаты теста:

Красный песок или осадок прилипает к подгузнику.

Спастическая стриктура уретры.

Моча: Альбумин ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Часто мастурбирует.

Результаты теста:

- Врожденное гидроцеле.

Орхит или эпидидимит у детей родителей, больных гонореей.

Потливость в области мошонки.

Покрасневшие, твердые, опухшие, горячие и болезненные половой член и яички вследствие травмы половых органов или свинки.

Неопущение яичка справа.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Менархе задерживается.

Результаты теста:

Суженное, красное, затвердевшее влагалище с изъязвлениями вокруг него.

Молочные или гнойные, безболезненные выделения у маленьких девочек, особенно по утрам и в положении лежа.

Полипы влагалища.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Сухость, раздражение и першение в гортани, как от пыли, усиливающиеся в теплом помещении.

При кашле ощущается боль и раздражение гортани.

Огрубение голоса или его осиплость в теплом помещении.

ДЫХАНИЕ

Астма после подавления сыпи, особенно после подавления кори, крапивницы или оспы.

Аллергическая астма у младенцев после вакцинации MMR (Carc., Thuj.) и после простуды (Spong.); ухудшение вечером до полуночи; улучшение на свежем воздухе (Kali-s.).

Одышка в теплом помещении; хочется, чтобы его отнесли к открытому окну или вынесли на холодный, свежий воздух.

Одышка после еды, из-за метеоризма, с ощущением полноты и вздутия живота, лучше от отрыжки.

Одышка в положении лежа, особенно на левом боку (Phos., Spig.).

Результаты теста:

Громкий вдох.

Стоны, вздохи, хрипы и хриплое дыхание.

КАШЕЛЬ

Хронический влажный кашель после кори (Dros.); ухудшается в положении лежа, при разговоре, теплой пище и **в теплой комнате**; ребенок вынужден сидеть во время кашля и **чувствует себя лучше на свежем воздухе** (Am-s.).

Постоянный астматический кашель вечером до полуночи, нарушающий сон.

Мокрота обильная, густая, желтоватая или зеленоватая; выделяется только в течение дня.

Влажный кашель по утрам, который к вечеру становится сухим и отрывистым, с сухостью и раздражением в гортани.

Спазматические, удушающие, пароксизмальные, изнуряющие приступы кашля по утрам и ночью в положении лежа, нарушающие сон.

Грудь

Пневмония у младенцев с беловатым налетом на языке.

Результаты теста:

Рентгенограмма грудной клетки: компрессия; эмфизема; первичный комплекс.

Отек легких.

Увеличение и уплотнение подмышечных лимфатических узлов у детей, больных туберкулезом.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Сильное сердцебиение у детей с ревматическим заболеванием сердца, особенно в положении лежа на левом боку или при лихорадке.

Результаты теста:

Гипертрофия сердца.

Шумы в сердце.

Слабый, едва прощупываемый пульс.

Назад

Боль в поясничной области при кашле и в положении лежа; лучше при осторожном движении.

Результаты теста:

Дорсальное искривление позвоночника.

Пот на спине.

Жесткие и напряженные мышцы в шейном и поясничном отделах.

КОНЕЧНОСТИ

Жгучий жар в ступнях; сбрасывает одеяло.

Судороги в икроножных мышцах ночью в постели.

Зуд нижних конечностей ночью в постели.

Беспокойство в конечностях, особенно в стопах, в положении сидя и во сне.

Ревматизм, особенно коленей, в сырую или холодную погоду, с лихорадкой ; боль и опухание уменьшаются от холодных компрессов и физических упражнений.

Спонтанный, небольшой вывих тазобедренного сустава.

Результаты теста:

Холодный, вонючий пот на ступнях и между пальцами ног (Sil.).

Потрескавшиеся руки.

Ознобление рук, ног и пальцев ног с синюшным окрашиванием суставов и зудом в этих частях тела.

Задняя часть стопы опухшая и отечная.

Болезненность и крапивница между ягодицами.

Язвы на ногтях и ногтевые язвы; улучшение при обливании холодной водой.

Полнокровие вен рук.

Одна рука и одна нога горячие, другая рука и нога ледяные.

Болезненные, воспаленные мозоли.
Нагноение тазобедренного сустава.
Дрожание рук при потягивании.

Спать

Во время сна: стук зубов, икота, подергивание головы и конечностей, веки слегка приоткрыты, стоны, обильное слюноотечение, хриплое или свистящее дыхание, беспокойство, вращение глазных яблок, урчание в животе, крики, вздохи, храп и разговоры.

Сильная сонливость днем и бессонница ночью.

Засыпаю поздно ночью и просыпаюсь рано утром.

Положение: на животе или на спине, руки скрещены над головой или животом, ноги подтянуты.

Спит без одеяла.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Полное отсутствие жажды на всех стадиях лихорадки, сухость во рту; младенец имеет тенденцию непрерывно причмокивать губами.

Мороз:

- Не переносит одеял и тепла в любой форме, несмотря на мороз; хочет находиться на открытом воздухе (Apis).

- Нагревать:

- Холодность рук и ног с жаром в теле ИЛИ руки и ноги красные и горячие с одной стороны тела и красные и холодные с другой.

- Кашель повышает температуру.

- Делирий с сухим, жгучим жаром.

- На этой стадии ребенок жалуется на коричневую и скудную мочу, локальное покраснение лица, повышенное слюноотечение, боли в пояснице и ноющие боли в гортани с охриплостью голоса.

- На этом этапе ребенок постепенно погружается в глубокий коматозный сон.

- Пот:

- Холодный и зловонный, обильный пот после стадии жара, особенно на лице, с упадком сил и сонливостью.

Нерегулярная периодичность с чередующимися приступами лихорадки, которые обычно усиливаются с каждым разом.

Полезное средство, особенно при сыпи и лихорадке.

КОЖА

Невыносимый зуд, усиливающийся от тепла постели (Psor, Sulph); пациент вынужден расчесывать пораженный участок до тех пор, пока он не станет саднить и не начнет кровоточить, но облегчения не наступает; затем возникает сильное жжение.

Желтуха с желтоватым окрашиванием кожи и диареей.

Корь с водянистыми желтовато-зелеными выделениями из кожных высыпаний и водянистым насморком со слезотечением.

Кожа кажется горячей, особенно после пробуждения утром, но у ребенка нет лихорадки.

Крапивница с сильным зудом по ночам и диареей как сопутствующим - симптомом.

- Результаты теста:

Ветряная оспа с большими пузырьковыми высыпаниями.

Обильный рост волос по всему телу у младенцев и детей младшего возраста.

Веснушки.

Судороги

Заболевания, вызванные: гневом (у младенцев) и травмами.

Различные симптомы.

Эпилептические судороги во время сна с бледностью лица, особенно в положении лежа на боку.

Общий

Жалобы из-за неправильного применения антибиотиков, жаропонижающих средств, препаратов железа, пероральных стероидов; **после кори** или **подавления сыпи**; из-за изменения погоды или температуры, из-за **промокания**.

Анемичные дети с выраженной бледностью, вялостью и запорами.

Аллергия на кошек.

Ребенку необходим холодный, свежий воздух, от которого становится лучше, но сквозняки ухудшают состояние.

Противоречивые и чередующиеся состояния ИЛИ постоянная и быстрая смена симптомов с блуждающей болью.

Выделения: Незначительные или раздражающие, обильные, зловонные, горячие, гнойные и желтовато-зеленые.

Горячие, болезненные, уплотненные лимфатические узлы с синюшным оттенком в этой области.

Непереносимость одеял и шерстяной одежды.

Большинство симптомов усиливаются после наступления темноты.

Никогда больше не был здоров после перенесенных инфекций среднего уха и инфекционных заболеваний.

Мягкие кости; рахит.

Источник

Семейство лютиковых (Ranunculaceae).

РЕВЕНЬ ПАЛЬЧАТЫЙ

(Ревень - Rheum.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Капризные дети , которые отказываются от тех самых вещей, о которых их ранее просили (Cham., Cina, Staph.).

Тихие и молчаливые дети (Ад., Игн., Оп.), которые не любят играть с другими детьми, страдают поносами и коликами.

Раздражительное беспокойство и плач всю ночь, но бодрость днем (Ant-t., Jal., Psor.).

Жалобы, ссоры и плач во сне (крайнее недовольство) (Bell., Ign., Nux-v., Stann.).

Тело

Кислый запах; ребенок пахнет кислым даже после купания (Нер., Mag-c., Sil., Sulph.).

Кожа головы всегда влажная от пота, и днем, и ночью.

Хорошее средство, если мать дала ребенку много магнезии или лекарств от колик с ревнем или без него.

Другие важные симптомы

Дух

Крики, крайняя раздражительность днем и ночью, особенно во время прорезывания зубов , крайнее беспокойство.

Отсутствие чувствительности (Bism., Op., Sep.).

Придерживается странных мнений и взглядов.

Неуклюжий.

Хочет, чтобы его несли.

Спутанность сознания с вялостью и ленью при пробуждении по утрам.

Раздражительность с плачем и беспокойством всю ночь, но жизнерадостность в течение дня.

Ворчливые и угрюмые дети, которые постоянно хмурятся.

Грубые и непослушные дети (Chin., Staph.) , очень импульсивные.

Голова

Небольшое потоотделение на голове, особенно на лбу, с кислым запахом, усиливающееся от малейшего усилия или после употребления супа.

Результат теста:

Волосы влажные, мокрые (Anac., Calc., Cham., Merc., Sil.).

ГЛАЗА

Глаза слипаются по утрам .

Вырывается наружу.

Результаты теста:

- Гранулированные веки.
- Судороги и подергивание век во время сна.

УШИ

• Результат теста:

- Постоянно ковыряет пальцами в ушах.

НОС

Зуд кончика носа.

Результат теста:

- Постоянно ковыряет в носу пальцами (Arum-t., Cina, Sil.).

ЛИЦО

Небольшой вывих челюсти.

Лицо бледнеет во время сна и дефекации.

Результаты теста:

Холодный пот на носу и вокруг губ (подбородок).

Постоянное подтягивание губ.

Одна сторона бледная, другая красная.

Блестящее лицо с припухлостями вокруг глаз.

Нахмуренные брови.

Морщинистое лицо

Подергивание уголков рта.

РОТ

Горький привкус во рту.

Трудное прорезывание зубов. **Проблемы с прорезыванием зубов.**

Слюноотделение во время дефекации.

Зубная боль в кариозных зубах с повышенным слюноотделением.

Результаты теста:

Паралич языка.

Белый налет на языке.

ЖЕЛУДОК

Отсутствие жажды, несмотря на сухость во рту во время лихорадки (Bry., Chin., Nux-m., Puls.) и **жажда во время дефекации** (Bry., Chin., Sulph., Verat.).

Капризный аппетит; ребенок голоден, но не знает почему.

Рвота кислым, молочным содержимым во время дефекации.

Жажда с диареей.

Абсолютная непереносимость молока у новорождённых и детей раннего возраста. Молоко, особенно грудное, вызывает немедленную рвоту.

Не любит: кофе, жирное, грудное молоко.

Пристрастия: Освежающие продукты, сладости.

ЖИВОТ

Резущие, схваткообразные боли в животе, особенно во время дефекации; при коликах младенец склонен сворачиваться калачиком.

Вздутие живота после еды.

Бурчание в животе.

Задержанный метеоризм.

Боль в паховых железах.

Результат теста:

- Паховая грыжа.

ПРЯМАЯ КИШКА

Диарея; стул жидкий, коричневатый или вязкий, слизистый или беловатый, содержащий свернувшиеся яичные белки, которые зеленеют в подгузнике при контакте с воздухом. Стул с примесью зеленой слизи имеет кислый запах, пенистый и ферментированный. Диарея всегда усиливается во время прорезывания зубов, после еды и в жаркую погоду. Диарея сопровождается неэффективным мочеиспусканием и спазмами в животе, которые облегчаются скручиванием. Сильные колики во время дефекации; ребенок плачет, поджимает ноги или становится полностью напряженным. Сильные тенезмы после стула. Диарея сопровождается беспокойством, бледностью лица, холодным потом на лице и тошнотой.

Диарея после еды, особенно после употребления **незрелых фруктов** (Aloe, Ipec., Ph-ac., Sul-ac.).

Диарея у истощенных, желтушных младенцев (Bry., Cham., Lyc., Op.).

Первая часть стула мягкая и тестообразная (Alum., Nux-v.).

Кислый, неприятный запах стула (Calc., Hep., Merc., Sulph.), который выглядит **створоженным** (Calc., Nit-ac.) или пенистым и полным слизи.

Диарея с позывами на дефекацию после еды, злоупотребления молоком магнезии, во время прорезывания зубов и при ходьбе.

Утром при пробуждении отходит кисловатый газ.

Беспокойство и раздражительность после дефекации.

Плач у детей перед дефекацией и во время нее.

Результаты теста:

Болезненность анальной области из-за дефекации.

Кровотечение из заднего прохода во время дефекации.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Слабое, прерывистое мочеиспускание из-за слабости мышц мочевого пузыря; требуются большие усилия для опорожнения мочевого пузыря.

Ночное недержание мочи.

Результаты теста:

Моча темно-красного, лимонного или зеленоватого цвета.

Розовый осадок в подгузнике.

Моча: Лейкоциты +.

ДЫХАНИЕ

Затрудненное дыхание во время сна.

Сухой кашель вечером и влажный утром.

Результат теста:

- Громкий вдох.

КОНЕЧНОСТИ

Жар в ладонях и ступнях (Bru., Med., Sep., Sulph.).

Небольшие вывихи.

Ревматические боли в суставах.

Результаты теста:

Холодный пот на ладонях.

Вздутые вены на руках.

СПАТЬ

Ребенку требуется очень мало сна и совсем немного еды (углеводов, кофеина, сульфидов).

Спит, заложив руки за голову (Nux-v., Plat., Puls., Sulph.) или загнув руки назад.

Во время сна: жалобы или споры, стоны, крики, храп, внезапное вздрагивание, разговоры, дрожь тела, подергивание мышц, плач и хныканье.

Очень беспокоен, даже ночью во время сна; ворочается всю ночь или начинает ходить взад-вперед в постели.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Дискомфорт, вызванный прорезыванием зубов.

Тревога со стонами во время лихорадки.

Во время сна повышается температура, возникает буйный бред.

КОЖА

Холодный, обильный, кисло-пахнущий пот от малейшей физической нагрузки, который оставляет желтые пятна на одежде.

Результаты теста:

- Голубоватые пустулы.

Морщинистая кожа.

Желтушность кожи.

Общий

Кислый запах тела (Her., Mag-c., Sil., Sulph.).

Ключевой симптом этого средства — **кислый вкус**. Кислые выделения, такие как стул и пот, привкус во рту и даже настроение. У ребёнка кислый вкус настолько, что он даже ругается во сне.

Другим ключевым симптомом этого средства является **обильное потоотделение** — пот на голове, лбу, лице, рту и носу.

Погодные изменения ухудшаются.

Клонические судороги, возникающие особенно во время сна и прорезывания зубов.

Расширенные кровеносные сосуды.

Истощенные дети, страдающие частыми приступами диареи.

Левосторонний.

Оцепенение прерывается приступами крика.

Слабость мышц и суставов.

Источник

Семейство спорышевые (Polygonaceae).

РИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА

(Рибонуклеиновая кислота - РНК - Рибонуклеиновая кислота)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Расстройства обучения и личности.

Умственная бедность, недостаток концентрации при умственной деятельности; недостаток выносливости при умственной нагрузке.

Уставшие, сонные и голодные дети.

Нестабильный вес, резкий набор веса и затем повторная потеря веса в течение нескольких недель.

Должен часто есть, отвращение к жирной и горячей пище, тяга к мясу и сахару. Предпочитает уксус и вареную, острую пищу.

Ревматизм, опухание рук и ног, боли усиливаются утром и вечером.

Воспаление вокруг ногтей, особенно на указательном, втором и третьем пальцах правой руки.

Склонен к рецидивирующему герпесу; **атопическая экзема, которая часто рецидивирует.**

Источник

- Познакомился с гомеопатией благодаря доктору О.А. Джулиану.

АЛЬБОМ САХАРА

(Белый тростниковый сахар - Sacc-alb.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Проблемы в школе, плохая концентрация внимания во время учебы, ошибки при письме, путаница и пропуск букв, использование неправильных слов и нечеткий почерк.

Низкая уверенность в себе, нуждается в большой поддержке со стороны семьи и друзей.

Добросовестный и исполнительный.

Предпочтение пению и танцам.

Пренебрежение со стороны матери и семьи, а также частые унижения напрямую влияют на умственные способности, значительно затрудняя обучение. Спутанность сознания, путаница в мыслях и вещах, замешательство при разговоре, работе и слушании. Плохая память на всё, что нужно сделать, что произошло или что только что прочитали.

Тихий и сдержанный.

Мигрень с болью во лбу, усиливающейся от свежего воздуха.

Потливость лба усиливается ночью.

Потрескавшаяся нижняя губа.

Желание съесть шоколад, фрукты, горчицу, суп и уксус.

Тошнота во время вождения.

Ноги, пальцы и руки холодные.

Кожная сыпь, вызванная воздействием солнца.

Быстро нагнаивающиеся прыщи в период полового созревания.

Источник

- Синоним: Saccharum officinale (из сахарного тростника или свеклы).

САХАР ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Сахарный тростник - Сакх.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Расстройства поведения (Anac., Hyos., Stram., Tarent., Tub., Verat.) , такие как истерики и СДВГ у детей, матери которых подавляли гнев или горе во время беременности.

Грызть ногти.

Любит класть пальцы и другие предметы в рот.

Нетерпеливые, гиперактивные и беспокойные дети (Bac., Cham., Cina, Merc.).

Отвращение к обществу и присутствию незнакомцев (Ambr., Bar-c., Cic.).

Капризная, нуждается в разнообразии.

Дети, которые чувствуют себя обделенными вниманием из-за новорожденного брата или сестры и у которых из-за зависти или ревности развиваются аллергические реакции или инфекции.

Сильная ревность между детьми.

Злые, угрюмые и плаксивые дети (Cham., China, Merc., Tarentum, Tub.).

Лживые и хитрые дети.

Желание физических нагрузок и спортивных тренировок.

Навязчивое желание дотронуться до всего, очень беспокойный (Carc., Cina, Hyos., Merc.).

Любит, чтобы его носили, держали на руках и ласкали (Puls.).

Устраивает преднамеренные розыгрыши.

Чувствителен к упрекам и наставлениям.

Раздражительность до, во время и после завтрака.

Тело

Отвращение к вареным овощам (Ник.).

Лучше угощения, чем обычная еда.

Глистные заболевания.

Дискомфорт из-за изменений температуры или погоды.

Асцит с болезненным уплотнением живота.

Толстые, опухшие дети с длинными конечностями ИЛИ худые, но с хорошим аппетитом.

Истощенные дети.

Облегчение боли при состояниях, которые обычно вызывают боль.

Бледное лицо Гиппократа.

Цинга и рахит у детей, находящихся на искусственном вскармливании.

Медленное заживление ран.

Плотный, толстый, белый налет на языке.

Другие важные симптомы

Дух

- Ребёнок либо испытывает сильную **потребность в объятиях и поглаживаниях** (запястный, подоидозный, пульсирующий), и заставляет родителей оставаться с ним, пока он не заснёт, ЛИБО ему трудно признать свою потребность и он испытывает отвращение к любому виду контакта. Ребёнку очень нужна любовь, но он не знает, как её получить.
 - Родители пренебрегают ребёнком, отдавая предпочтение братьям и сёстрам или слишком заняты своими делами. Ребёнок пытается привлечь к себе внимание, грызя ногти, много разговаривая или устраивая шалости.

Легко пугается мелочей (Kali-c., Lyc., Phos.).

Тоска по дому, желание вернуться домой (Caps., Ign., Mag-m., Ph-ac.).

Самонадеянный (Lyc., Plat., Verat.).

Чувствует себя нелюбимым родителями и другими членами семьи (Mag-c., Puls.).

Пишет неясно, допускает много **ошибок в устной и письменной речи**, употребляет неправильные слова или забывает слова (Lyc., Merc., Stram., Thuj.).

Жалобы из-за недостатка ласки и физического контакта в раннем детстве.

Добросовестный.

Недоволен всем.

Непослушный и дерзкий.

Страх неудачи.

Низкая уверенность в себе приводит к тревожности.

Имеют высокий болевой порог; не плачут, когда им больно.

Раздражительность, особенно когда голоден; лучше после еды.

В шутку.

Любит петь и танцевать.

Отсутствие инициативы.

Жалобы.

Улучшается замах.

Закрывается.

Чувствителен к боли, критике и моральному давлению.

Вздрагивает от малейшего шума и во время сна.

Молчаливый и тихий; отвращение к разговору.

Беспокойные дети, съевшие слишком много сахара.

Коварное и жестокое, ухудшающееся после употребления слишком большого количества шоколада и сладостей.

Голова

Волосы растут быстро.

Периодические головные боли в школе.

Пот на лбу по ночам.

Результат теста:

- Сухие волосы.

ГЛАЗА

Желание часто тереть глаза (Caust., Op., Puls., Squil.).

слабовидящие.

Офтальмия.

Результаты теста:

Склеивание.

Катаракта начинается позади слезного протока и закрывает его (Caust., Sil.).

Сухость и покраснение.

Глаза закрыты из-за отека век.

Запавшие глаза с усталым выражением.

Подергивание верхних век, особенно правого.

УШИ

Рецидивирующие инфекции среднего уха.

Результат теста:

- Гнойные выделения.

НОС

Насморк, который опускается в грудную клетку и вызывает астму.

Насморк усиливается, особенно по утрам.

Результаты теста:

Воспаление ноздрей.

Носовые выделения попадают в горло.

ЛИЦО

• Результаты теста:

Неподвижное, маскообразное выражение лица (мангр.).

Потрескавшаяся нижняя губа.

Бледное, отечное лицо, с красными губами (Chin., Ferr., Verat.).

РОТ

Воспаление слюнных желез с **повышенным слюноотделением** (Bell., Merc., Puls., Rhus-t.).

Сухость во рту без жажды.

Результаты теста:

Кладет пальцы или другие предметы в рот (Cham., Ipec., Sulph.).

Белый налет на языке (Ant-c., Bry., Merc., Rhus-t.), настолько толстый, что делает язык жестким.

Афтозные язвы и болячки на внутренней стороне щек, на деснах и нёбе. Ранула.

ШЕЯ

Сухость в горле, особенно утром после пробуждения, однако жажды нет никакой.

Результат теста:

- Язвы в горле.

ЖЕЛУДОК

Обожает лакомства и отказывается от обычной еды.

Патологический голод вскоре после обильного приема пищи (Лус., Phos.)
или отсутствие аппетита.

Ненасытные желания.

Громкая отрыжка после еды.

Повторяющаяся тошнота и рвота при заболеваниях желудка (Арс.).

Склонность часто перекусывать между приемами пищи из-за ощущения слабости, головокружения, дрожи, головной боли и т. д.

Сильная рвота с рвотой кровавой слизью.

Слабое пищеварение из-за повышенной кислотности.

Отвращение: **вареные овощи**, сладости, масло и горячая пища.

Пристрастия: хлеб с маслом, **шоколад, холодные напитки**, лимон, лакрица, мясо, **молоко**, горчица, выпечка, острая пища, прохладительные напитки, картофель, салат, соль, газировка, суп, сладкая и кислая пища, специи, **сахар или сладости, чай, сырые овощи** и уксус.

Ухудшение: шоколад и сладости.

Хочу пить тонны воды.

ЖИВОТ

Туберкулез брюшины (Bar-c., Calc., Iod.).

Метеоризм.

Расстройства пищеварения, вызванные недоеданием.

Синдром раздраженного кишечника.

Боль в области пупка.

Ощущение чего-то сжимающего в животе.

Результаты теста:

- **Асцит** (Аpis., Арос., Лус.).

- Брыжеечные железы опухшие и отечные.

ПРЯМАЯ КИШКА

Анальный зуд (Aloe., Merc., Sulph.), особенно утром в постели.

Запоры, чередующиеся со слизистой диареей.

Запор с постоянными и частыми позывами к дефекации.

Диарея: разъедающая, кровавая, изнурительная, водянистая, с блестящей слизью.

Диарея после ужина.

Стул сухой, комковатый, с запахом труп.

Внезапные позывы к дефекации по утрам.

Результат теста:

- Болезненность между ягодицами и в анальной области из-за дефекации.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Хроническая почечная недостаточность.

Частые позывы к мочеиспусканию.

Результаты теста:

- Камни в почках.

Моча: Белок ++ (Apis, Hell, Ph-ac).
Белый осадок в подгузнике.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Результат теста:
 - Сильно опухшая мошонка.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Зуд во влагалище.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Желание дышать глубоко.

Охриплость или грубость голоса, особенно по утрам или при кратковременном чтении вслух.

Раздражение гортани вызывает сухой кашель.

ДЫХАНИЕ

Дышать можно только в вертикальном положении.

Из-за одышки вынужден лежать с приподнятой головой.

Одышка по утрам, облегчающаяся отхаркиванием мокроты.

КАШЕЛЬ

Обильная, желтоватая, кремообразная, соленая, холодная и **очень зловонная** (Borx., Calc., Phel., Sang.) мокрота, особенно на свежем воздухе.

Сухой кашель у детей.

Влажный, хриплый кашель.

ГРУДЬ

Потливость подмышек, особенно ночью.

Результаты теста:

Истощение груди, атрофия мышц.

Пневмония.

Отек нижней части грудины.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Недостаточность сердечной мышцы без поражения клапанов.

Ревматическая болезнь сердца.

Результаты теста:

Нерегулярный, слабый пульс.

Тромбоз.

КОНЕЧНОСТИ

Судороги в икроножных мышцах.

Жар в подошвах ног по ночам с желанием раскрыться.

Результаты теста:

Холодность рук и ног.

Очень сухие руки и ноги

Истощение рук, ягодич и бедер (Calc., Chin., Plb.).

Твердые, отежные припухлости рук, ног, лодыжек и стоп (Ars., Chin., Sulph.).

Беспокойство в руках и ногах.

Подергивание конечностей при засыпании.

СПАТЬ

Легко засыпает, иногда даже сидя (Nux-m., Nux-v., Sulph.).

Необходимо много часов сна.

Вздрагивает во сне.

Зевание на открытом воздухе.

КОЖА

Укусы насекомых.

Сыпь в виде волдырей, вызванная воздействием солнца.

Результаты теста:

Сухая кожа; потоотделение полностью подавлено (Colch., Graph., Plb.).

Чрезмерная грануляция язв.

Панариций.

Цинга.

Общий

• Альтернативные и противоречивые состояния (Abrot., Lac-c., Lyc., Sulph.).

Холодно или жарко.

Компульсивное переедание или анорексия; ожирение или истощение.

Желание ласки или отвращение к прикосновению.

Нежный или агрессивный.

Чувствительный к боли или нечувствительный к боли.

Чувствительный к упрекам или непослушный и дерзкий.

Отёк (Apis, Hell., Plb.).

Потеря веса при повышенном аппетите (Abrot., Calc., Iod., Nat-m., Tub.).

Сильная сухость (глаз, стоп, волос, рук, рта, ногтей, носа, прямой кишки, кожи, горла, влагалища) (Bry., Nat-m., Nux-m.).

В целом это горячее средство (Calc., Gels., Lach., Sulph.), но в случаях тяжелой депрессии или истощения наблюдаются озноб и дрожь.

Любит купаться (Тарент.).

Безболезненность при состояниях, которые обычно являются болезненными (Hell., Op., Stram.).

Незаживающие или медленно заживающие раны (Hep., Lach., Nit-ac., Sil., Sulph.).

Полезно после операций для ускорения заживления и профилактики сепсиса - (Ars., Crot-h., Lach., Pyrog.).

Полезен при недоедании и дефиците различных минералов и витаминов : дефицит кальция, дефицит хрома (вызывает затвердение артерий), дефицит витамина С (приводит к цинге) и дефицит витамина D (приводит к рахиту), дефицит железа (приводит к анемии) и дефицит тиамина (вызывает бери-бери и сердечную недостаточность).

Полезно при ослаблении иммунной системы, например, при потере сил из-за СПИДа, *Candida albicans* (молочницы), пневмонии с атрофией грудных мышц, раке и т. д.

Очень ранняя зависимость: амфетамины, каннабис, сигареты, героин, нездоровая пища и опиум.

Семейный анамнез сахарного диабета.

Хуже: ночью (около 1 часа ночи) и утром.

Улучшение: после еды и на свежем воздухе (Aug., Carbo-veg., iod., Puls.).

Источник

Saccharum officinale производится из сахарного тростника.

БУЗИНА ЧЕРНАЯ

(Черная бузина - Самб.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Тяжёлые последствия шока, особенно повторяющиеся приступы удушья при бронхиальной астме. Ужасающие образы, возникающие, когда закрываешь глаза в постели.

Маленькие дети, заболевшие простудой, не могут нормально сосать грудь, потому что у них заложен нос. Нос сухой и полностью заложен.

Насморк, переходящий в астму.

Откройте глаза во время сна.

Катар дыхательных путей носа и бронхов,

Чрезмерное скопление мокроты в бронхах, которую трудно откашливать.

Спазматический кашель с ночными приступами, сопровождающийся сильной одышкой и насморком. Сухость и заложенность носа.

Тревожное, громкое, свистящее и хриплое дыхание. Ребенок становится беспокойным, тревожным и трясущимся из-за приступов удушья, которые обычно случаются ночью. Ребенок внезапно просыпается ночью, почти задохнувшись, и садится в постели. Ребенок синеет и жадно хватая ртом воздух. Приступы астмы усиливаются ночью и в положении лежа с низко наклоненной головой.

Приступы обычно возникают во время прорезывания зубов, сопровождаясь глухим, сухим кашлем по ночам; наиболее интенсивными они становятся около полуночи. Ребёнок практически задыхается. Лицо, губы и руки синеют, а затем из-за тяжести приступа появляется обильное потоотделение. Ребёнок просыпается от тяжёлого приступа астмы и сильно потеет. Внезапный приступ удушья или кашля при засыпании заставляет ребёнка просыпаться после полуночи, покрытый потом от шока.

Астма усиливается в 3 часа ночи.

Кашель у детей с первичным комплексом. Обильное потоотделение по всему телу, но только в состоянии бодрствования. **Во время сна потоотделение прекращается**, и возвращается сухое тепло.

Хорошее средство от многих случаев **лихорадки у детей**. Глубокий, сухой, щекочущий кашель в продромальной стадии лихорадки, который продолжается и до стадии озноба. Кашель сопровождается тошнотой. Потоотделение начинается с холодных на ощупь рук и ног и длится несколько часов. Отсутствие жажды как при ознобе, так и при жаре. Обильное потоотделение, пот по ночам стекает по лицу и всему телу. Пациенты мерзнут и, как правило, не испытывают жажды. Чрезмерное потоотделение, но только во время бодрствования. Ухудшается от холодных напитков, молока и фруктов.

Источник

- Также называется бузиной европейской и принадлежит к семейству бузиновых (Sambucaceae).

САНИКУЛА АКВА

(Минеральная вода из целебного источника в Оттаве, Иллинойс, США - Sanic.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

детям, которых приемные родители **бросили, ненавидели** (смех) и **пренебрегли (Mag-c).**

Ребенок, чья мать испытывала сильные страдания и переживания во время беременности, всегда был один и не получал никакой поддержки.

Тело

Обильный, гнилостный, липкий, разъедающий пот на ступнях с натертостями пальцев; пот разъедает носки и обувь (Graph., Sec., Sep., Sil.).

Каловые **массы крошатся** в области ануса (Am-m., Mag-m., Merc., Nat-m.) или отступают после частичного выведения и **должны быть удалены механически** (Lyc., Nat-m., Op., Sep., Sil.).

Просыпаясь, ребенок трёт нос и глаза.

Потеря веса вопреки желанию поесть.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ЯЗЫКОВ SANIC., CINA, CHAM И TUB.

Психические симптомы Sanicula часто путают с симптомами Cina, Cham и Tub .

Поэтому важно изучить **общие симптомы всех четырёх препаратов:**

Быстро злится.

Отвращение к прикосновениям.

Раздражительные и непослушные дети

Раздражительность при пробуждении.

Кричащие дети.

Немного обиделся.

Бросает предметы.

Беспокойные дети.

Потливость рук.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ САНИКА И СИЛА.

На физическом уровне препарат очень похож на **Sil. К общим симптомам** относятся:

Потеря веса у детей с тягой к еде.

Выделения из носа корчатые, зеленовато-желтые.

Вздутие живота на фоне потери веса всего тела.

Сыпь за ушами.

Жажда в мороз; отсутствие жажды в жару.
 Пустулы на голове.
 Ледяной холод рук и ног.
 Рвота после употребления холодной воды или грудного молока.
 Потливость ног, болезненность, холод, неприятный запах, обильный.
 Выпадение волос на бровях.
 Кашель: глубокий и глухой; усиливается ночью и в положении лежа.
 Катар евстахиевой трубы.
 Головная боль, особенно в затылке, распространяющаяся на лоб;
 усиливается от холодного сквозняка, уменьшается от укрытия головы.
 Заусенцы.
 Рахит.
 Потливость ночью и во время сна.
 Потеет только голова, особенно затылок.
 Стул: Твердый, узловатый и большой.
 Склонность к образованию абсцессов.
 Слезы текут на холодном, свежем воздухе.
 Опухоли на веках.
 Не может держать голову прямо.
 Тяга к яйцам, жиру, молоку, соли и сладкому.
 Запор, стул необходимо удалить механическим путем.
 Удушье при кашле.
 Нежные, слабые и болезненные дети.

Другие важные симптомы

Дух

Не любит, чтобы его носили (Брай.), **но любит, чтобы его качали** (Чам.).

Отвращение к прикосновениям и разговорам (Ant-c., Arn, Cham., Tarent.); становится очень злым и раздражительным.

Страх **темноты** (Calc., Cann-i., Lyc., Med., Stram.).

Раздражительность чередуется с веселостью (Aur., Borx., Chin., Stram.).

Непослушные дети, которые очень раздражительны и склонны кричать, плакать и брыкаться после пробуждения (Ant-c., Cham., Cina, Tub.).

Беспокойные дети (Bac., Merc., Rhus-t.); не могут усидеть на одном месте даже короткое время.

Грызть ногти.

Дети, которые постоянно хотят грудного вскармливания (чувство покинутости; неонатальная булимия).

Страх быть поднятым и перенесенным в воздухе из-за страха падения (эмоциональная незащищенность).

Страх сидеть на колесе обозрения, особенно во время движения вниз.

Тяжелая умственная усталость.

Люблю путешествовать.

Медленно учится говорить.

Хочет сделать много дел, но оставляет их незавершенными; не хочет - заканчивать работу.

ГОЛОВА

Головные боли от холодных сквозняков или холодного ветра; лучше от **укутывания головы** (Nux-v., Sil.).

Потливость головы во время **сна**, особенно **затылка** (Calc.).

Результаты теста:

Ребенок не может держать голову прямо из-за атрофии шеи. весы.

Сухие, шелушащиеся высыпания на коже головы.

Роднички закрыты при рождении.

ГЛАЗА

тереть глаза (Mez., Op.).

Слезы текут наружу, на холодном свежем воздухе.

Светобоязнь.

Результаты теста:

Корковые высыпания на веках (граф.).

Опухоли век (Стафилококк, Цинк.).

Опухшие веки с красными, воспаленными и гноящимися краями.

Изъязвление роговицы.

УШИ

Выделения из ушей с неприятным запахом.

Результаты теста:

- Катар евстахиевой трубы.

Инфекция среднего уха.

Влажные, липкие высыпания и болезненность за ушами.

НОС

Холод во время еды (Nux-v., Plb., Sulph.).

Результаты теста:

Зеленоватые, густые, вязкие выделения из носа, которые высыхают и образуют **в ноздрах твердые корки** (Bov., Kali-bi.), которые трудно удаляются (Bov., Graph., Kali-bi., Stict.).

Язвы и изменение цвета ноздрей.

ЛИЦО

Просыпаясь, ребенок трет глаза и нос кулаком.

Результаты теста:

Постоянное оттягивание верхней губы (Кали-би.).

Перхоть с выпадением волос на бровях (Nit-ac., Ph-ac.).

Старое и грязное лицо (Nat-m., Op.) с пустым выражением.

Сыпь в виде пузырьков с корками или шелушением вокруг губ, особенно верхней.

Желтоватые или коричневатые пятна на носу (Sep., Sulph.).

РОТ

• Результаты теста:

Сухой, жгучий, большой, дряблый язык со **следами зубов** (Chel., Merc., Rhust., Ser.), вынужден высовывать его, чтобы он оставался холодным.

Быстрые подергивания и вытягивания языка, как у змеи (Supr., Supr-act., Lys., Merc., Merc-s.; средства от змей: Crot-h., Elaps, Lach., Vip.).

Пустулы на деснах.

Полость рта и нёбо покрыты язвами.

Стригущий лишай языка.

ШЕЯ

Боль в горле с затруднением глотания, сильнее при употреблении жидкости, чем твердой пищи.

ЖЕЛУДОК

Сильная рвота фонтаном **створоженного молока** (необходимого, кальцинированного, натурального и плотного) сразу после кормления; затем засыпает.

Пристрастия к еде при потере веса (Calc., iod., Nat-m., Sulph., Tub.).

Тошнота и рвота при поездке на машине или автобусе.

Медленное пищеварение.

Частая жажда с желанием пить небольшое количество холодной воды, однако во время лихорадки жажда отсутствует.

Пристрастия: **Бекон** (Calc-p., Caust., Tub.), Яйца (Carc., Puls.), **Ледяное молоко**, Соль.

Результат теста:

- Вздутие эпигастрия после кормления.

ЖИВОТ

• Результаты теста:

Дряблый (Calc., Merc., Phos.).

Дети с большим животом и истощенными конечностями (Calc., Ipec.).

ПРЯМАЯ КИШКА

Вздутие живота сопровождается очень неприятным запахом, напоминающим запах **гниющего сыра**.

Каловые массы крошатся в области ануса (Am-m., Mag-m., Merc., Nat-m.) или отступают после частичного выведения и **должны быть удалены механически** (Lys., Nat-m., Op., Sep., Sil.).

Непроизвольное выделение стула при метеоризме (Aloe, Old.).

Позывы к дефекации во время еды.

Результаты теста:

Стул меловой, светлый.

Болезненность анальной области.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Ночной энурез.

Плачет и воет перед мочеиспусканием.

Результат теста:

- Моча оставляет красный осадок в подгузнике.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

• Результаты теста:

Холодный пот половых органов (Carbo-veg.).

Экзематозные высыпания в паховой области.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Зловонные бели, имеющие запах гнилого старого сыра (Геп.).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Ощущение слизи в гортани с постоянным желанием откашляться, особенно - после еды.

ДЫХАНИЕ

Астма у маленьких детей.

Одышка после еды (Lach.).

Результаты теста:

Погремушка.

Задыхаюсь.

КАШЕЛЬ

Приступы кашля, вызванные ощущением щекотания в горле утром при пробуждении, при **разговоре** (Dros., Rumx.) **или смехе** (Bry., Chin.) , а также ночью в положении лежа.

Обильная, желтоватая, творожистая мокрота, особенно по утрам после пробуждения и после еды.

Кашель усиливается в теплом помещении.

Глубокий, влажный, хриплый кашель, особенно после кормления грудью.

ГРУДЬ

Обильный, едкий **пот в подмышечных впадинах** (Petr., Sei.).

НАЗАД

Потливость **области шеи** (Calc., Hyos., Lach.), особенно во время сна.

Результат теста:

- Ребенок не может держать голову прямо из-за истощения и слабости мышц шеи.

КОНЕЧНОСТИ

Обильный, гнилостный, липкий и болезненный пот на ступнях с открытыми, болезненными пальцами; пот проникает в носки и обувь (Graph., Sil.).

Склонность обнажать ноги ночью в постели (Cham., Med., Puls., Sulph.).

Ревматические боли в суставах, особенно в левом тазобедренном суставе, левом колене и правом плече.

Отек и скованность рук при пробуждении утром.

Результаты теста:

Глубокие трещины на руках (Nit-ac., Petr.), особенно на тыльной стороне рук и на суставах пальцев, усиливающиеся зимой.

Холодные и липкие руки и ноги.

Истощение нижних конечностей.
Мурашки по коже верхних конечностей (Phos.).
Заусенцы.

Спать

Сны о грабителях.
Сонливость после рвоты.
Спит, положив руки под голову.
Подпрыгивания во сне.

КОЖА

Результаты теста:
Кондиломы.
Грязная, потрескавшаяся кожа, особенно зимой.
Медленно созревающие фурункулы.

Общий

Изменчивость симптомов или чередование состояний (Abrot., Lac-c., Lys., Sulph.).

Абсцессы с густым, едким гноем.
Аллергическая конституция.
Не переносит холодного воздуха на затылке и шее.
Зябкий, но не переносит одежду и одеяла; сбрасывает одежду в самую холодную погоду.
Желание свежего воздуха, усиливающееся от малейшего сквозняка .
Малыши и новорожденные хотят постоянно находиться на грудном вскармливании, но при этом они, как правило, теряют массу тела и становятся худыми.
Выделения с неприятным запахом, напоминающим запах старого сыра или рыбы.
Обильное потоотделение на шее, затылке и других частях тела.

SCUTELLARIA LATERIFLORA

(Шлемник болотный - Scut.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Нервное беспокойство, страх и ужас ночью , перед несчастьем, перед чем-то случившимся, перед катастрофами.

Мигрень от эмоционального возбуждения, чрезмерной радости, резких запахов; лучше от еды.

Ночные кошмары вызывают множество неврологических симптомов, таких как хорея, подергивания и судороги.

Крепко стискиваются зубы во время прорезывания зубов, бессонница во время прорезывания зубов.

Сильная бессонница из-за страшных снов.

Источник

- Относится к семейству яснотковых (Labiatae).

СЕННА

(Сенна уходит - Сенн.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Крики во сне.

Часто очень беспокойны.

Колики со вздутием живота из-за газов или колики с диареей, стулом желтовато-зеленоватого цвета и ощущением невозможности опорожнить кишечник. Частый стул с кровью.

Увеличенная и болезненная печень.

Запор с коликами и метеоризмом у младенцев. Из-за скопления газов ребёнок кричит так громко, что синееет.

Гернси описал это средство как типичное для колик у детей, когда они переполнены воздухом.

Источник

- Синоним: *Cassia acutifolia*. Это растение из Северной Африки относится к семейству бобовых.

СЕПИЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ

(Чернила Кальмара - сентябрь)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Дети, которым **сложно выразить свою любовь и привязанность**

(натур.). Во время первого визита ребёнок может казаться замкнутым и равнодушным.

Подавление (Anac., Carc., Lys., Staph.) может вызвать у таких детей две модели поведения:

Несмотря на (Bar-c., Caust., Lys.).

Горе и депрессия (принятие) (Kal., Nat-m.).

Тело

Задержка развития груди у девочек или очень маленькая грудь (Con., Iod., Kali-i., Staph.).

Задержка развития (Bar-c., Calc., Calc-p., Phos., Sil.).

Другие важные симптомы

Дух

Заболевания от сексуального насилия (Carc., Ign., Nat-m., Op., Staph.), скорби и увещания.

Жадность и алчность у детей (Ars., Kali-c.), в основном из-за **неуверенности** или **чувства заброшенности** или **пренебрежения** (Arg - n., Pall., Puls.).

Дети, которые любят **танцевать, заниматься гимнастикой или бегом, что способствует излечению** большинства недугов (избегание доминирования) (Carc., Ign., Tarent.).

Зависть и ревность у детей (Puls., Tarent., Verat.).

Легко пугается пустяков; особенно боится врачей (Phos., Stram.), крыс (Calc.), пауков (Abel.), купания, **грозы** (Borx., Nat-m.).

Одиночки, изолирующие свои чувства (Nat-m., Phos.).

Неуклюжий (Am-m, Caps, Op, Plb), **неловкий, склонный к несчастным случаям** (Arn., Aur., Caps., Med., Puls., Staph.); натыкается на предметы при ходьбе.

Нечистые дети (чувствуют себя никчемными), в крайних случаях они мочатся и испражняются везде (Lach., Psor., Sulph.).

Капризный; требует постоянных перемен (из-за неудовлетворенности, - вызванной эмоциональной неуверенностью).

Склонность постоянно хмуриться.

Легко обижается; постоянно думает, что другие дети издеваются или смеются над ним.

Эмоциональная незащищенность у детей, ставших свидетелями дискуссий и споров между родителями.

Ему трудно сосредоточить свое внимание и сосредоточиться на том, что он делает.

Лжец (предательство), склонный воровать (пульс) и делать это тайно (смех).

Обожает грозы; очень счастлив и жизнерадостен, когда слышит гром и молнию (нуждается в волнении, чтобы облегчить депрессивные чувства).

Делает много ошибок в устной и письменной речи, использует неправильные слова, описывает предметы неправильными терминами.

Нервные дети, легко поддающиеся влиянию прикосновений, споров или утешения.

Обсессивно-компульсивное расстройство; постоянно моет руки.

Не по годам развитые дети.

Закрытые дети.

Равнодушие выражается в форме раздражительности, что приводит к сварливому, грубому и дерзкому поведению.

ГОЛОВА

Волосы **слипаются** на концах или легко путаются; **их** трудно расчесывать (Borh., Med., Petr.).

Кислый (Her., Sil.), холодный пот кожи головы.

Сильные головные боли заставляют ребенка кричать от боли; после стрижки волос и при подавлении простуды; хуже от искусственного света, при наклоне и от чтения; лучше от укрывания головы, **еды** (Anac., Arg-n., Kali-bi.) и **сна** (Gels., Glon., Pall., Phos.).

Головные боли при желтухе.

Результаты теста:

весы.

Сухие, зловонные, желтые корки и шелушение кожи головы, особенно за ушами.

Непроизвольное подергивание или кивание головы вперед и назад во время разговора (наблюдается очень часто).

Колыбельная.

Открытые роднички.

ГЛАЗА

Затуманивание зрения перед головной болью (Ирис, Кали-би.).

Тяжесть век (Caust., Gels., Rhus-t.) с трудом удерживать их открытыми, особенно утром после пробуждения, а также с головной болью (возможный ранний симптом синдрома Горнера или объемных процессов в головном мозге).

Воспаление **конъюнктивы** (Arg-n., Euphr., Rhus-t., Sulph.), **роговицы, эписклеры** (Kalm., Merc., Sep., Thuj.), **век и склеры**, особенно летом и вследствие **катаральных заболеваний носа и горла** (Calc., Dulc., Euphr., Merc., Psor., Puls.); улучшение от **холодных компрессов** (Arg-n., Bry., Caust., Puls.).

Жгучая боль в глазах со слезотечением; при лихорадке и на открытом воздухе, на холодном, свежем воздухе; лучше при промывании глаз холодной водой.

Мышечная астенопия (alum., gels., nat-m., onos.); плохое зрение при чтении или письме.

Густые, желтые, гнойные выделения из глаз по утрам, склеивание век ночью.

Результаты теста:

Опущение век (Caust., Gels., Spig.).

Чешуйчатые, шелушащиеся, **герпетические** или **экзематозные** высыпания или пустулы по краям век (Bry., Calc-sil.).

Корки вокруг бровей.

Образование узелков и затверждение хряща века, отек после повторных ячменей.

Дальнозоркость.

Трахома.

уши

Снижение слуха из-за катара евстахиевой трубы.

Результаты теста:

Трещины за ушами (Graph., Нер., Лyc., Sulph.).

Влажные **герпетические** или **везикулярные** высыпания на мочках ушей и за ушами, распространяющиеся на лицо (Caust., Puls.).

Повышенное выделение гнойной, зловонной ушной серы.

Нос

Сильное обоняние, особенно необходимое для приготовления пищи.

Носовые кровотечения темной, свернувшейся кровью (Carbo-veg., Lach., Puls., Sei.), особенно из левой ноздри; от сморкания, с лихорадкой, головной болью или от **любого удара по носу, даже самого слабого** (Cic., Hydr., See.).

Хронический катар носа и синусит.

Хронический водянистый ринит с ларингитом и диареей.

Результаты теста:

Узкий нос (Camph., Kali-bi., Лyc.) с желтоватым или коричневатым седлом над носом и блестящим красным кончиком носа.

Ретроназальный катар (Ferr-p., Kali-bi., Nat-c., Nat-m., Psor.).

Густые, желтоватые или зеленоватые (Hydr., Kali-br., Merc., Puls., Tub.), **зловонные** выделения из носа, которые становятся твердыми и сухими и образуют болезненные, большие корки и чешуйки, даже в задних носовых полостях (Bar-c., Calc-ar., Elaps, Kali-c.).

Полипы носа.

Покрытые коркой ноздри.

Отек носовых раковин в левой ноздре.

Лицо

Холодный пот на лице (Ars., Camph., Carbo-veg., Cina, Merc., Verat.), особенно при употреблении теплой пищи и напитков, а также во время сна.

Результаты теста:

Корковые и шелушащиеся герпетические **высыпания** вокруг носа и губ (Aeth., Calc., Nat-c.).

Сухие, потрескавшиеся губы, особенно середина нижней губы (Kali-c., Nux-v.).

Импетиго на лбу (Ant-c., Med., Rhus-t.).

Бородавки вокруг рта (Psor.) и на подбородке (Lyc., Thuj.).

Морщинистый лоб (Cham., Hell., Lyc., Nux-v., Stram.).

Коричневые пятна на лице.

Жевательные движения во время сна.

Веснушки.

Рост волос над верхней губой.

Бледное, старческое, изможденное лицо с синими кругами под глазами.

Восковое лицо.

РОТ

Затрудненное прорезывание зубов с ранним и **очень быстро прогрессирующим кариесом**, зубы почернели (Calc., Calc-p., Fl-ac., Med., Phos.).

При простуде еда кажется безвкусной (Ant-c., Calc., Hep., Nat-m., Puls., Sulph.).

Зубная боль после пломбирования зубов, после употребления сладостей, от горячих или холодных напитков, от вдыхания холодного воздуха и от прикосновения.

Крепко стискивает зубы ночью (Ther.).

Результаты теста:

Дряблый язык со следами зубов и выступающими сосочками.

Неприятный запах изо рта.

Губчатые, опухшие, темно-красные, чувствительные десны, которые легко кровоточат при малейшем прикосновении или надавливании.

Язвенный стоматит.

ШЕЯ

Не может носить ничего тесного на шее из-за ощущения удушья (Cench., Crot-c., Crot-h., Lach.).

Боль в **левой** части шеи и области **левой** миндалины (Crot-h., Lach.).

Постоянное желание сглотнуть из-за комка в горле, но глотание не облегчает ситуацию.

Боль в горле при глотании пустого содержимого.

Результаты теста:

Хронический фарингит с темно-красным окрашиванием (Calc., Fl-ac., Lac-c., Merc., Nat-m., Sil.).

Отечность и нагноение миндалин, особенно **левой** (Bar-c., iod., Lach., Phos., Sulph.), с образованием пустул.

Зоб правосторонний.

Опухшие, затвердевшие железы на шее.

ЖЕЛУДОК

Икота, горькая отрыжка и боли в животе по **утрам**, после **завтрака** (Plat.).

Тошнота от **запахов** (Colch., Dig.) и **утром** перед **завтраком** (Calc., Lyc., Nit-ac., Tub.), облегчение от **еды** (Kali-bi., Nat-c., Petr.).

Тошнота при вождении автомобиля (Calc., Coss., Mag-c., Petr.).

Отсутствие жажды в стадии жара, несмотря на сухость во рту, но сильная жажда на **морозе** (Apis, Caps., Cina, Ign., Nat-m., Nux-v., Verat.).

Повышенный аппетит с головными болями.

Рвота молоком или желчью, горькой и зловонной жидкостью при кашле или лихорадке.

Морская болезнь.

Ухудшение: **жиры** (Ferr., Graph.) или обильная пища, **фрукты** (Ars., Bry.), **молоко** (Calc., Chin.), **картофель** (Alumn., Coloc.), клубника (Ant-c.).

Отвращение: хлеб, жир, **мясо** (Calc., Graph., Nux-v., Puls., Sil.), **молоко** (Aeth., Lac-d., Nat-c., Staph.), картофель, **сырые овощи** (Ant-c., Ant-t., Nat-n.).

Пристрастия: Горькая пища и напитки (Graph., Nat-m., Nux-v.), шоколад, холодные напитки, орехи, **соленья** (Nat-c., Lach., Sulph.), острая пища, редис, **кислая пища** (Cor-r., Hep., Verat.), сладости, **уксус** (Cor-r., Hep., Nat-m.).

Результаты теста:

Эндоскопия: язвенная болезнь.

Уплотнение привратника .

ЖИВОТ

Полезное средство при **холестатической желтухе** (Chin., Chion., Lyc.), **вызванной синдромом Криглера-Наджара, синдромом Дубина-Джонсона, синдромом Жильбера-Мейленграхта и индийским детским циррозом** [ICC, генетически обусловленная форма цирроза печени, вызванная воздействием меди] (Cupr., Iod., Phos., Sulph.).

Не переносит **тесную одежду** в области **живота** (Arg-n., Calc., Crot-c., Lach., Lyc., Nux-v.).

Вздутие живота после **еды** (Carbo-veg., Chin., Lyc., Sulph.) и при **запоре** (Bry., Iod., Lach.), лучше от отрыжки.

Неонатальная желтуха (Acon., Bry., Chin., Nat-s., Podo.).

Боль в животе после вставания, при кашле или после употребления **супа** (Kali-c., Mag-c.); лучше от тепла, отхождения **газов** (Carbo-veg., Tarent.) или отрыжки, лучше от подтягивания **ног** (Bell., Bry., Coloc.).

Результаты теста:

Увеличенная, твердая, болезненная печень (Chin., Iod., Mag-m., Phos.).

Асцит с расширением вен живота.

Увеличение паховых желез.

ПРЯМАЯ КИШКА

Диарея: **зеленоватая** у младенцев (Cham., Gamb., Merc.); усиливается после гнева или испуга, во время прорезывания зубов, от **кипячёного молока** (Nux-m.), холодных напитков; с быстрым истощением и желтухой. Стул, похожий на понос, вызывает болезненные ощущения в промежности и коже между ягодицами.

Бездеятельность прямой кишки без позывов на дефекацию, стул приходится **удалять механически** (Nux-m., Sil.), он напоминает овечий помёт или комковатый и покрыт слизью.

Кислый, **зловонный метеоризм** (Asaf., Carbo-veg., Lach., Nat-s., Sulph.).

Сладострастный зуд в области прямой кишки, вызванный глистами.

• Результаты теста:

Выпадение прямой кишки (Ferr., Nux-v., Podo., Ruta).

Кровянистая, вонючая жидкость из прямой кишки.

Выделение сегментов ленточных червей и остриц с калом.

Потливость в области ануса и промежности перед дефекацией и во время нее.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Хронический нефрит (Lyc., Nat-m.).

Непроизвольное мочеиспускание при смехе или кашле.

Молочная (Apis, Ph-ac.), резкая, кисло пахнущая моча; выделяемое количество кажется большим, чем количество ранее принятой жидкости.

Ночной энурез, особенно в первой половине сна (Caust., Kreos., Ph-ac., Puls.), обычно когда ребенку снится мочеиспускание (Kreos., Ph-ac., Sulph.); разбудить ребенка очень трудно.

Моча: Альбумин ++, желчный пигмент, мочекислые цилиндры и сахар.

Белый, глинистый или красный осадок на подгузнике или нижнем белье, который очень трудно отмыть.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Склонность постоянно играть с гениталиями и мастурбировать.

Результаты теста:

Отёчность мошонки и крайней плоти (Apis, Graph., Rhus-t.).

Гениталии холодные (Agn., Gels., Sulph.).

Опухшее и затвердевшее левое яичко (Clem., Puls., Rhod., Spong.).

Парафимоз и фимоз.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

• Результат теста:

- Обильные, разъедающие и зловонные, молочные (Calc., Kali-m., Puls.) или зеленовато-желтые, гнойные бели у маленьких девочек (Calc., Med., Merc., Puls.); особенно после мочеиспускания, вызывающие сладострастный зуд (Calc., Kreos., Nit-ac.) в области влагалища.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Щекотание в гортани и трахее, заставляющее ребенка постоянно кашлять и прочищать горло.

Охриплость при простуде или лихорадке.

ДЫХАНИЕ

Астма начинается **во время сна** (Кали-би., Кали-ц.) или при пробуждении утром, отхождение мокроты улучшается.

Одышка от кашля, в положении лежа или при пробуждении утром; **лучше от наклона головы вперед** (Ars., Kali-bi., Kali-c., Lach., Spong.) или от **быстрой ходьбы**.

Одышка у детей с ревматическим заболеванием сердца.

Результат теста:

- Вдохните громко и выдохните медленно, с хрипами.

КАШЕЛЬ

Постоянный, сухой, изнуряющий кашель, всю ночь, в положении лежа; **вынужден сидеть в постели** (Bry., Con., Phos., Puls.).

Кашель усиливается при **чистке зубов** (Carbo-veg., Coc-c., Staph.), при употреблении **кислого** (Brom.), в **туманную** (Menth.) или **штормовую** погоду (Rhod., Sil.), в положении лежа на спине или на левом боку; лучше от отхаркивания, в положении лежа с **приподнятой головой** (Carbo-veg., Chin.) или на **правом боку** (Phos., Rumx.).

Кажется, что кашель **исходит из желудка или живота** (Arn., Bry., Kali-c., Nux-v.).

Мокрота: **молочная** (Ars., Sulph.) или желтоватая, зловонная и соленая.

Дети, склонные к простудам из-за малейшего изменения погоды или при выходе из теплого помещения на холодный воздух и наоборот.

Внезапный, спазматический, продолжительный, приступообразный и удушающий кашель из-за щекотания в гортани, при этом один приступ следует за другим через короткие промежутки времени.

Результат теста:

- **При кашле держится за грудную клетку** обеими руками (Arn., Bry., Dros., Phos.).

Грудь

Отсроченная пневмония.

Худая и плоскогрудая.

Результат теста:

- Хрипы с мокротой в груди при кашле.

Назад

Холодный пот по ночам.

Результат теста:

- Искривление позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

Неуклюжий (Apis, Bov., Calc., Hell.); роняет вещи или натывается на них.

Обильный, холодный и едкий пот на ладонях, стопах, бедрах и между пальцами ног; кожа становится грубой (Petr.) и болезненной (Sanic.).

Легкие, спонтанные вывихи суставов (кальцификация).

Склонность оставлять ноги непокрытыми (Cham.).

Непроизвольные подергивания и подёргивания конечностей во время сна.

Результаты теста:

Вывих большого пальца (Cupr., Merc.).

Шелушение ладоней.

Экзематозная сыпь в области сгибов суставов.

Плоские, затвердевшие бородавки на руках.

Воспаленные и очень чувствительные мозоли.

Ногти: ломкие, крошащиеся, деформированные, слоющиеся, поврежденные, толстые.

Остеомиелит.

СПАТЬ

Спит на животе или в коленно-грудном положении (Calc-p., Lyc., Med., Tub.), колени и лицо прижаты к подушке.

Кислый (Hep., Sil.), холодный пот головы.

Громко разговаривает во сне (из-за подавления).

Дети, которые ночью засыпают очень крепко и их трудно разбудить.

Сны о мочеиспускании и сражении с призраками.

Засыпает во время чтения (Nat.-m.).

Бессонница ночью из-за волнения или страха с сонливостью по утрам.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Жалобы: от гнева (Staph.) или после еды (Lyc., Phos.).

При лихорадке: холодный и кислый (Hep, Sil) пот на голове, конечности холодеют (Stram.), покраснение лица, вздохи (Arn.).

Лихорадка уменьшается после питья холодной воды (Caust., Cupr., Op., Phos.).

Жар невыносим, несмотря на сильный озноб с ледяным холодом тела (Apis, Camph., Ipec., Puls., See.).

КОЖА

Хроническая сухая экзема, не поддающаяся лечению, с утолщением кожи (Ant-c., Graph.) из-за расчесывания.

Холодность кожи с внутренним жжением, усиливающимся при расчесывании.

Обильный, холодный, зловонный пот (Graph., Lyc., Nit-ac., Rhus-t.), который истощает, оставляет желтые или коричневые пятна на простыне и трудно смывается.

Шелушение кожи с трещинами, особенно зимой (Calc., Petr.).

Сыпь усиливается после употребления рыбы (Ars.) или молока (Calc.), а также зимой (Calc., Dulc., Hep., Psor., Rhus-t.).

Грибковые инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом (Thu.).

Обильное потоотделение утром при пробуждении, во время и после еды (Carbo-veg., Kali-c., Merc., Nit-ac.).

Рецидивирующий паховый дерматомикоз и кольцевидный дерматомикоз на различных участках тела, устойчивый ко всем противогрибковым препаратам (Bac., Nat-ar., Tell.).

Желтуха новорожденных с желтоватым окрашиванием кожи.

Результаты теста:

Выраженный рост волос на теле (кортизон, лекарства).

Гипопигментированные пятна или белые пятна на коже (Ars., Kali-c., Sil.).

Pityriasis versicolor (Bac., Lyc., Nat-ar., Tell.).

Ветряная оспа.

Веснушки.

Роговые или плоские, твердые бородавки.

Опрелость.

Общий

Жалобы на промокание, мастурбацию, подавленную потливость ног, подавленные кожную сыпь и **вакцинацию** (Вакцина, Цинк.).

Отвращение к купанию (Rhus-t.).

У ребенка повышенная чувствительность к **аллопатическим препаратам** и гомеопатическим средствам **высокой концентрации** (Cham., Puls., Sulph.).

Сильно **зябкий** (Bar-c., Calc-ar., Kali-p., Sil.), **хуже** от малейшего сквозняка, склонность к простудам.

Дети со светлой кожей, голубыми глазами, рыжими или черными волосами и **истощением** (Calc., Iod., Nat-m., Sil.).

В анамнезе рецидивирующий тонзиллит (Bar-c., Sil., Tub.) или **цистит** (Hep., Lys., Med., Puls., Tub.).

Размягчение костей (Asaf., Calc., Merc., Sil.); полезно для детей, больных рахитом.

Слабость и **истощение** от **малейшего усилия** (Ars., Calc., Crot-h., Nat-c., Rhus-t., Tub.), от бега, от потоотделения.

Укачивание (кинетоз); невозможность путешествовать на автобусе или автомобиле.

Выделение слизи: резкое, разъедающее, раздражающее, зловонное, гнойное, тягучее и вязкое.

Внезапный обморок в теплом помещении или при лихорадке.

SILICEA TERRA

(Диоксид кремния; кремнезём; горный хрусталь - Sil.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Любящий и чувствительный (Ars., Lyc, Sulph).

Физически истощен, но умственно непреклонен (Gels., Kali-p., Pic-ac сдаются). Отличное средство для учащихся.

Экстравертные, воспитанные, **элегантные** дети, которых можно принять за Фос.

Умный (Ars., Lyc., Phos., Plat.), дружелюбный со всеми, но в конечном итоге придерживается своего мнения.

Недостаток решимости, дети без характера (Бар-к., Кальк.).

Дети, которые выбирают карьеру в раннем возрасте; обычно выбирают профессию художника, врача, инженера, юриста, математика, учителя и т. д.

Эмоциональные и физические расстройства у подростков, вынужденных брать на себя работу родителей.

Повышенная чувствительность, как умственная, так и физическая.

Ранний.

Дети из приютов (Calc).

Тело

Элегантно одетые; дети свежие, как огурчики (Lyc., Plat.).

Неуклюжи в своих действиях.

Дети со светлой кожей, бледными лицами и тонкой, сухой кожей; их телосложение кажется слабым и хрупким, а их мышцы, как правило, дряблые.

У матери были тяжелые роды с проблемами дыхания и кровообращения во время родов.

Другие важные симптомы

Дух

Отвечает **односложно** (Arg-n., Puls., Tub., Zinc.); только тихое «да» или «нет» или отвечает шепотом и разговаривает только с матерью, а не напрямую с врачом.

Напряжение ожидания с тревогой перед экзаменом (Aeth., Anac., Gels.), независимо от того, насколько хорошо он подготовлен.

Ясновидение (Lach., Med., Phos., Verat-v.).

Добросовестный в мелочах (Ars., Ign., Lyc., Puls., Sep., Staph., Sulph., Thuj.); очень следит за **чистотой**; все должно быть на своем месте (Ars., Ign., Thuj.).

Страх одиночества, кошек, темноты, собак, молнии, **игл** и **уколов** (Alum., Apis, Spig.), **незнакомцев** (Bar-c., Con., Cupr., Thuj.), **сильного ветра** (Cham., Rhod., Tarent.), грозы.

Чувствует себя **брошенным** и **нелюбимым**; желает быть загипнотизированным (Calc., Phos.); легко очаровывается чем-либо.

Не определился; просто не может принять решение (Bar-c., Hell., Lyc., Op., Staph.).

Отсутствие инициативы, особенно когда необходимо сделать что-то новое (Agar., Aur., Calc., Lach.).

Математика — предмет, который они ненавидят и с которым испытывают трудности (Nux-v., Plb.).

Кладут пальцы в рот и постоянно **грызут ногти** (Arum-t., Bar-c., Med., Nat-m., Verat.), особенно когда нервничают.

Чувствителен к малейшему прикосновению; очень **боится щекотки** (Kali-c., Phos.).

Застенчивые и смущенные дети с неуверенностью в себе, особенно в школе (Calc-p., Carc., Phos., Puls.).

Жалобы, вызванные ожиданием (Arg-n., Gels., Lyc., Med., Puls.), плохими новостями (Calc., Gels., Ign.), угнетением, испугом (Acon., Gels., Lyc., Op.) и умственным напряжением (чтением и письмом).

Неуклюж из-за смущения (Bar-c., Calc., Nat-m.), особенно с незнакомыми людьми.

Осторожные и предусмотрительные дети (Bar-c., Lyc., Puls.).

Детям трудно сосредоточиться на учебе, они не способны сосредоточить свое внимание.

Спутанность сознания с вялостью и забывчивостью при пробуждении утром; при разговоре, чтении, письме; лучше после еды.

Темнота сгущается.

Страх падения, особенно при движении вниз, например, ребенок начинает плакать, когда его кладут в колыбель.

Усталость от малейшего умственного напряжения, ухудшение памяти.

Нетерпеливый и торопливый, особенно во время употребления спиртного.

Клептомания.

Любит танцевать, что само по себе улучшает ситуацию.

Непослушные, упрямые и сварливые дети, которые постоянно плачут и жалуются.

Отложите все на следующий день.

Медленно учится говорить и писать (Caust.).

Вскакивает, как будто от испуга, особенно при прикосновении, от малейшего шума (Borx., Kali-c., Nat-c., Nux-v., Op., Phos.) или во сне, особенно при лихорадке.

Слезы, когда его носят на руках (Cina); ненавидит, когда его утешают (Ign., Nat-m., Sep., Syph.).

ГОЛОВА

Катаральная головная боль, особенно над **лобными пазухами** (Кали-би.); из-за простуды, подавленной антигистаминными или сосудосуживающими средствами.

Хронические головные боли, усиливающиеся от любого вида умственного напряжения (Aur., Calc., Nat-c., Pic-ac.); уменьшающиеся от носовых кровотечений (Bufo, Kali-bi., Meli., Psor.) и частого мочеиспускания (Acon., Gels., Ign., Meli.).

Головная боль над глазами от **ношения очков** (Lyc.).

Головные боли **усиливаются** перед грозой, от перемены погоды, **холода** (Bry, Dulc, Hep, Nux-v, Rhus-t), **сквозняков** (Bell., Chin., Kali-c., Merc., Nux-v., Sulph.) и света; уменьшаются от **горячих компрессов** (Kali-ar., Mag-p.), укутывания **головы** (Arg-n., Puls.) и лежания в темной комнате с плотно закрытыми глазами.

Болезненная чувствительность кожи головы к малейшему сквозняку холодного воздуха, **малейшему сотрясению** (Bell., Bry., Glon., Nit-ac.), **расчесыванию волос** (Bry., Cina, Mez.) и даже **ношению шляпы** (Carbo-veg., Lach., Nit-ac., Valer.).

Головные боли сопровождаются болью в шее и скованностью затылочных мышц. Сильные головные боли, особенно во время прорезывания зубов, повторяющиеся периодически каждую неделю (Lac-d., Phos., Sang., Sulph., Tub.).

Результаты теста:

Большая голова с задержкой закрытия родничков (Calc., Calc-p., Sep., Sulph.); **ребенок не может держать голову прямо, кажется, что она оттянута назад или в стороны** (Aeth., Calc-p., Gels., Op., Verat.).

Обильный, **холодный пот** (carbo-veg., op., verat.) с кислым запахом на лбу и затылке, особенно во время сна.

Кефалгематома.

Сухая, покрытая корками экзематозная сыпь на коже головы с шелушением; ухудшается зимой.

Раннее поседение и выпадение волос.

Экзостоз.

Колыбельная.

Открытые роднички (Calc., Calc-p., Ipec.) при гидроцефалии (Apis, Calc., Lyc.).

Туберкулезный менингит.

Кисты, задерживающие салоотделение (атеромы).

ГЛАЗА

Воспаление глаз после травмы или проникновения инородного тела (Acon., Arn., Calc., Coc-c., Puls.).

Плохое зрение; буквы как будто наслаиваются друг на друга при чтении или письме; вынужден постоянно тереть глаза, чтобы лучше видеть (Calc., Puls.).

Жгучее слезотечение на холодном воздухе (Calc-sil., Puls., Sep.).

Хронический пустулезный или зернистый конъюнктивит, особенно в холодную, сырую погоду (Dulc., Rhus-t.).

Плохое зрение из-за головных болей и подавленной потливости ног.

Результаты теста:

Свищ роговицы и слезной железы, при надавливании выделяющий густой желтый гной (Puls., Stann.).

Помутнение правой роговицы (Am-c., Kali-c., Nit-ac.).

Рецидивирующие твердые ячмени, особенно во внутренних углах глаз (Lach., Lyc., Nat-m., Puls.).

Отек и **воспаление слезных желез** (Calc., Nat-m., Puls.) и слезных протоков, приводящее к **образованию стриктур** (Abrot., Nat-m., Puls., Rhus-t.), **особенно у новорожденных**.

Пустулы вокруг глаз.

Экзематозные и пустулезные высыпания на веках.

Выпадение ресниц.

Гиперметропия [= дальнозоркость],

Энтропион или эктропион [= веко вывернуто внутрь или наружу],

Ирит с гипопионом [= гной в передней камере] (Hep., Merc-s.).

Орбитальный целлюлит [= воспаление глазницы].

Страбизм [= косоглазие],

Отек хряща века или кистозные узелки по краю века (Staph.).

Изъязвление роговицы вследствие рубцов.

уши

Хронические, **творожистые** (Hep.), зловонные, **гнойные** (Calc-s., Hep., Kali-bi., Merc., Puls.), густые или водянистые выделения (Calc-s., Hep., Kali-bi., Kali-s., Puls.), особенно из **правого уха** (Lyc., Merc., Nit-ac.).

Боль в ухе из-за **перемены погоды** (Mang., Rhus-t.) и сырой погоды (Calc-p., Dulc., Nat-s.).

Хронический или рецидивирующий гнойный средний отит (Calc-s., Hep., Kali-bi., Merc.), особенно после вакцинации.

Зуд в евстахиевой трубе, заставляющий ребенка кашлять или глотать (Mang.).

Результаты теста:

Сверление ушей пальцами (Arund, Cina, Psor.), особенно во время сна.

Катар евстахиевой трубы (Asar., Calc., Ferr-p., Kali-s., Puls.).

Холестеатома.

Покраснение барабанной перепонки при сосцевидном периостите (Caps.).

Трещины за ушами.

Уплотнение околоушной железы при ушных инфекциях.

Мокнущая сыпь за ушами, приводящая к перхоти (Bar-c., Graph., Lyc.).

Перфорация барабанной перепонки (Iod., Kali-bi., Merc., Merc-d.).

Полипы уха.

Обильное отделение жидкой ушной серы (Cham., Hep., Merc., Tell.).

Отек и образование абсцессов за ушами, угрожающий кариес сосцевидного отростка (Aug., Caps., Nit-ac.).

Изъязвление слухового прохода (Calc., Lyc., Merc., Puls.).

Нос

Хроническая сухость (Am-c., Ambr., Caust.) и **заложенность носа каждое утро** (Calc., Hep., Kali-bi., Lyc., Nat-ar., Phos.), с насморком в течение дня.

Сенная лихорадка с астмой (Ars., Iod., Nat-s., Nux-v.).

Постоянные простуды с жалобами на боли в ушах (Dulc., Merc., Puls.).

Частое, сильное, приступообразное чихание без насморка.

Потеря обоняния вследствие хронической заложенности носа (Нер., Kali-bi., Puls.).

Ретроназальный катар, распространяющийся на лобные пазухи (Лyc., Merc.).

Результаты теста:

Постоянно ковыряет пальцем в носу до крови (Арум-т., Китай).

Густые, гнойные, желтовато-зеленые (Hydr., Kali-bi., Merc., Puls., Sep., Tub.), зловонные **выделения** с шелушением в правой ноздре.

Кариес носовых костей (Asaf., Aur., Hecla).

Трещины в ноздрях (Dulc., Merc.).

Ярко-красный нос (Phos.), особенно во время еды и после физической нагрузки.

Лицо

Боли в **лобных и гайморовых пазухах** (Bell., Kali-bi., Kali-i.).

Результаты теста:

Экзематозные высыпания или узелки в углах рта (Mez., Nat-m.).

Жирное и воскообразное лицо (Nat-m., Rhus-t.).

Затвердевшие **трещины** и **изъязвления** в **углах рта** (Arum-t., Cund., Graph., Nit-ac.).

Розацеа, которая оставляет некрасивые шрамы.

Стиснутые челюсти.

Веснушки.

Воспаление, затвердение и нагноение подчелюстных и околоушных желез, приводящее к образованию абсцесса.

Потливость лица у спящих младенцев.

Опухоль щеки, сопровождающаяся зубной болью.

РОТ

Хроническое воспаление десен, красные, **отслоившиеся от зубов** (Carbo-veg., Kali-p., Merc.) и **легко кровоточащие** (Caust., Lach., Merc-c., Phos.), с **белым налетом на языке** (Ant-c., Bry., Calc., Kali-bi., Merc., Nit-ac., Puls., Sulph.).

Сухость во рту при отсутствии жажды.

Медленное прорезывание зубов с повышенным слюноотделением.

Безвкусоность пищи при простуде.

Зубная боль усиливается от холода и жевания, уменьшается от теплых компрессов.

Результаты теста:

Пена у рта во время **сна** (Stram.) и во время **судорог** (Bufo, Caust., Cham., Cina, Cupr., Hyos., Op.).

Обильное, вязкое слюноотечение.

Рецидивирующие фурункулы (Carbo-veg., Kali-chl., Kali-i., Лyc., Merc., Nux-v.) и везикулярные высыпания с образованием абсцессов и свищей десен.

Зубы: легко ломаются (Calc-f., Lach., Plb.), **плохая эмаль** (Calc-f., Nat-m.).

Дети постоянно тянут пальцы в рот.

Неприятный запах изо рта по утрам.

Ранний кариес нижних зубов, особенно поражающий **корни** (Am-c., Fl-ac., Merc., Thu.).

Красный, твердый язык с коричневым налетом слизи.

Болезненность полости рта у детей, находящихся на грудном вскармливании.

ШЕЯ

Боль в **левой миндалине** при глотании (Arg-met, Lach, Merc-ir).

добавочного) и XII (подъязычного) черепных нервов ; в связи с этим у ребенка возникают трудности с глотанием твердой пищи; жидкости он может проглотить, но они вытекают через нос.

Результаты теста:

Булькающие звуки из горла при питье (Ars., Cina, Cupr., Elaps, Hell., Hydr-ac., Laur.).

Хроническое воспаление и изъязвление в горле.

Холодный абсцесс шейных желез со склонностью к образованию свищей (кист).

Затвердевшие, болезненные отеки шейных желез, образующие на шее «бусины».

Рецидивирующий фарингит.

Правосторонний зоб.

Опухший язычок.

Киста щитовидно-язычного нерва.

Миндалины опухшие, воспаленные и гнойные.

Бородавки на шее.

ЖЕЛУДОК

Отвращение к виду и запаху пищи (Ars., Colch., Mosch., Sep.).

Громкая, неконтролируемая **отрыжка** после любой **пищи** (Arg-n., Carbo-veg., Ferr., Nat-m., Puls., Sulph.).

Тошнота после вакцинации.

Тошнота и рвота при **поездке** на автобусе или автомобиле (Cocc., Mag-c., Sep.).

Очень **медленное** и слабое пищеварение (Chin., Sulph., Tarent.), особенно **мяса** (Ferr., Ferr-p., Ptel.) и **орехов** (Symph.).

Рвота **створоженным молоком** (Aeth., Calc., Nat-m., Valer.) через несколько часов после кормления грудью.

Боль в эпигастральной области после любого приема пищи или быстрого глотания воды; облегчается от теплых компрессов и в положении лежа с подтянутыми вверх ногами.

Слабый аппетит, отвращение к еде.

Удушье при кашле.

Рвота во время или после еды или питья, особенно по утрам.

Обострение: фасоль, холодная пища, мед, горох.

Отвращение: бульон, сыр, вареная пища, **мясо** (Calc., Chin., Graph., Nux-v., Puls., Sep.) и **грудное молоко** (Calc-sil., Cina, Nat-sil.).

Пристрастия: **Холодная пища** (Phos, Puls), **жареные яйца** (Calc-p., Nat-p., Tub.), лед, мороженое, неперевариваемые продукты, такие как **мел, известь и песок** (Alum., Calc., Lach., Tarentum.), устрицы, сырая пища.

Результат теста:

- Затвердение привратника .

ЖИВОТ

Спазматические боли в животе от запора, после приема **молока** (Bufo, Cupr., Lac-d., Mag-c., Mag-s.) или пищи; лучше от отхождения газов или от **теплых компрессов** (Cham., Mag-p., Nux-v.).

Хронический аппендицит.

Хронический гепатит с болезненностью в области печени, усиливающейся в положении лежа на правом боку.

Газовая ловушка у детей ночью.

Результаты теста:

Вздутый, твердый и горячий, с исхудавшими конечностями (Calc., Sulph.).

Асцит при хронической диарее.

Затвердевшая и опухшая печень.

Паралитическая непроходимость кишечника.

Ущемленная паховая грыжа (Bell., Nux-v., Op.).

Отек и воспаление паховых желез, особенно с левой стороны.

Tabes mesenterica [туберкулез брыжеечных лимфатических узлов].

Язвы вокруг пупка (Aesc., Calc., Rhus-t.).

Ультразвуковое изображение: абсцесс печени.

ПРЯМАЯ КИШКА

Безболезненный понос у истощенных детей (Chin., Ferr., Hyos., Podo., Nat-m., Phos., Sulph., Tub.); из-за затрудненного прорезывания зубов, **жаркой летней погоды** (Bry., Chin., Crot-t., Dulc., Gamb., Podo.), после приема холодных напитков или грудного молока и после вакцинации; улучшение при укутывании **ребенка в теплую одежду**.

Нарушения стула (dulc., podo., puls., sulph.); запоры, чередующиеся с поносами.

Безуспешные позывы и усилия вытолкнуть стул; если стул выведен частично, он отступает; стул приходится удалять механически (Bry., Calc., Nat-m., Sep., Sulph.); даже мягкий стул выводится с трудом.

У детей-холериков стул белый, меловой.

Результаты теста:

Трещины прямой кишки (Cham., Graph., Nit-ac., Rat., Sep., Thuja.).

похожий на овечий помет (Alum., Chel., Mag-m., Nat-m., Nit-ac., Op., Plb., Sulph.), зловонный стул.

Абсцесс и свищ прямой кишки чередуются с жалобами на боли в груди (Berb., Calc-p.).

Абсцесс в области промежности (Ant-c., Caust., Hep., Merc.).

Выпадение прямой кишки с выделением кровянистой жидкости из заднего прохода (Sulph.).

В кале: острицы, аскариды и сегменты ленточных червей.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Непроизвольное подтекание мочи после мочеиспускания (Agar., Cann-i., Staph.) и в положении сидя (Caust., Nat-m., Puls., Rhus-t., Sars.).

Обильный ночной энурез, вызванный глистами (Cina).

Результаты теста:

Хронические желтые выделения из уретры (Agn., Arg-met., Merc., Nit-ac., Puls., Sep., Thuj.).

Камни в мочевом пузыре.

Полипы мочевого пузыря (кальцинированные, дорогие).

Красноватый или желтоватый осадок в подгузнике.

Моча: Гной ++ и сахар ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Зуд полового члена и мошонки из-за потоотделения (Calc., Thuj.).

Склонность к мастурбации.

Результаты теста:

Уплотнение яичек, особенно правого (Aur., Nit-ac., Rhod.).

Фимоз (Merc.).

Гидроцеле (Puls., Rhod.).

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Обильные, разъедающие, зловонные (Carb-ac., Kali-ar., Nit-ac., Nux-v., Psor., Sep.), молочные бели, болезненные в окружающей среде (Borx., Graph., Lys., Merc., Nit-ac., Sep.); особенно после кислой, кислой пищи или цитрусовых.

Зуд во влагалищной области из-за белей.

Бели после того, как ребенок пожаловался на колики в животе или после мочеиспускания (Kreos., Nat-c., Sep.).

Результаты теста:

Потливость генитальной области.

Острицы во влагалище (Sabad., Sulph.).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Ощущение стеснения в гортани во время сна, заставляющее ребенка вставать с затрудненным дыханием, со стридором (Lach., Nux-v., Spong.).

Охриплость с раздражением гортани по утрам, особенно в холодную, сырую погоду (Carbo-veg., Dulc., Rumx., Sulph.).

Першение и боль в гортани на холодном воздухе (Carbo-veg., Nat-m., Nux-v., Phos., Rumx., Sulph.).

ДЫХАНИЕ

Астматическое дыхание в холодную, сырую погоду (Dulc., Med., Nat-s., Verat.) или перед грозой (Sep., Syph.); от **сквозняков, пыли** или **сена** (Carbo-veg., Dulc., iod., Lach., Nat-s., Op.).

Одышка после еды, с **лихорадкой** (Apis, Kali-c., Lach., Tub.) и **кашлем** (Ant-t., Ars., Cupr., Dros., Ipec., Op.).

Одышка от **малейшего усилия** (Nat-sil., Stann.), даже от движения верхних конечностей, от разговора, быстрой ходьбы или **бега** (Cupr., Hyos., Phos.).

Храп в постели с **одышкой** в положении лежа (Ars., Carbo-veg., Kali-c., Tub.), особенно в положении лежа на спине, что затрудняет дыхание и поэтому просыпается.

Результат теста:

- Хриплое дыхание.

КАШЕЛЬ

Кашель от **перемены погоды** (Dulc., Lach., Nit-ac., Phos., Rumx., Spong.), на **холодном воздухе** (All-c., Ars., Hep., Kali-n., Nux-v., Rumx.) и в штормовую, сырую погоду (Rhod., Ser., Sulph.).

Кашель усиливается от плача, поспешной еды и питья, холодных напитков, разговора; **уменьшается от приема теплых жидкостей** (Ars., Lys., Nux-v., Rhus-t.) и теплого укрывания.

Глубокий кашель (Kali-bi., Stram.), который, по-видимому, исходит из глубины горла, усиливается при пробуждении утром, с зеленоватой мокротой.

Мокрота: обильная и пенистая в течение дня, с кровью и слизью (Arn., Dros., Hep., Phos.) ИЛИ зловонная, обильная, желтая и комковатая.

Кашель из-за раздражения и першения в гортани и трахее.

Результат теста:

- Лицо ребенка при кашле краснеет или синеет.

Грудь

Затяжная пневмония (Am-c., Lach., Lys., Sulph.).

Начинающийся туберкулез (Calc., Calc-p., Kali-c., Med., Puls., Tub.).

Паралич диафрагмы (Cupr., Mosch.).

Задержка выздоровления от пневмонии.

Слабость в груди при разговоре (Ph-ac., Stann., Sulph.).

Результаты теста:

Зловонный пот в подмышечных впадинах (Hep., Nit-ac., Petr., Sulph.).

Фурункулы в подмышечной области с тенденцией к нагноению или образованию абсцессов (Hep., Merc., Nit-ac., Rhus-t.).

Кариес ключиц.

Эмпиема.

Назад

• Результаты теста:

Потливость шейного (Calc., Chin., Ph-ac., Sulph.) и поясничного отделов ночью.

Опухание и **уплотнение** шейных желез (Bar-c., Bar-m., Hell.).

Кариес поясничных позвонков.

Искривление позвоночника, особенно в грудном отделе, сопровождающееся болью.

Болезненные пустулезные высыпания или фурункулы на спине, особенно в области шеи, с зудом.

Spina bifida (Calc., Calc-s., Psor.).

КОНЕЧНОСТИ

Неуклюжий (Agar., Apis, Bov., Calc., Hell., Ipec.); непреднамеренно роняет вещи ; спотыкается при ходьбе из-за слабости лодыжек (Calc-p., Nat-c.).

Поздно учится ходить (Кальк., Кальк-п., Нат-м.).

Ревматические боли в верхних конечностях; усиливаются ночью, от перемены погоды и сырой погоды (Dulc., Rhod., Rhus-t.); уменьшаются от теплого укутывания (Ars., Graph., Mag-p.).

Судороги в икрах и стопах при ходьбе.

Полезно при замедленном заживлении переломов (Calc., Calc-p., Ruta., Symph.).

Сладострастный зуд в подошвах ног, усиливающийся от расчесывания.

Слабость и тремор верхних конечностей, особенно рук, при письме или удержании предметов.

Результаты теста:

Абсцесс поясничной мышцы (Cupr., Ph-ac., Syph.) и суставов конечностей.

Деформированные конечности (Кальк., Кальк-п.).

Трещины на руках и между пальцами ног (Graph., Nat-m., Sars.) и на кончиках пальцев рук (Aur-m., Graph., Petr.), особенно вокруг ногтей.

Обильный, зловонный, едкий пот между пальцами ног (Bar-c., Kali-c., Lyc., Puls.), на ладонях рук и на подошвах ног делает кожу грубой и болезненной и даже разъедает одежду и обувь (Lyc., Nat-m., Sep.).

Экзостозы (Calc-f., Dulc., Ruta) суставов, особенно пальцев рук и ног.

Ногти: Атрофированные или атрофированные (Carc., Caust., Graph., Nit-ac., Thuja.), ломкие, крошащиеся, деформированные, шелушащиеся, шершавые, расколотые, толстые, с белыми пятнами на них.

Синовит ++ суставов (Verb., Bry., Caust., Hep., Rhus-t., Sulph.).

Тонкие, исхудавшие пальцы (Lach., Thuja.).

Артритические узелки на суставах пальцев, которые остаются согнутыми.

Отёчные, губчатые припухлости коленных суставов и стоп.

Ганглий на тыльной стороне кисти или запястья (Calc., Mag-m., Thuja.).

Заусенцы и вросшие ногти на ногах с изъязвлениями.

Ледяной холод рук и ног (Camph., Verat.).

Плохо вылеченная паронихия с болезненностью и воспалением вокруг ногтей и под ними вследствие травмы осколками стекла.

Нагноение на плече после вакцинации.

Размягчение костей, особенно бедренной кости.

Чувствительные, ороговевшие мозоли, затвердения и бородавки на кистях рук и подошвах ног (Calc., Nat-c., Nit-ac., Sep.).

СПАТЬ

Ребенок поздно засыпает и спит чутко.

Во время сна: подергивание конечностей, смех (Hyos., Lyc., Stram., Sulph.), жалобы (Aur., Bar-c., Stram.), крики (Borx., Lyc., Puls., Tub.), разговор (иногда громкий) (Ambr., Lach., Psor.), плач или хныканье.

Ощущение сонливости после еды и чтения (Carbo-veg., Gels., Nat-m.).

Спит с низко опущенной головой (Nux-v., Spong.).

Частое зевание.

Судороги в икрах и стопах при ходьбе.

Полезно при замедленном заживлении переломов (Calc., Calc-p., Ruta., Symp.).

Сладострастный зуд в подошвах ног, усиливающийся от расчесывания.

Слабость и тремор верхних конечностей, особенно рук, при письме или удержании предметов.

Результаты теста:

Абсцесс поясничной мышцы (Cupr., Ph-ac., Syph.) и суставов конечностей.

Деформированные конечности (Кальк., Кальк-п.).

Трещины на руках и между пальцами ног (Graph., Nat-m., Sars.) и на кончиках пальцев рук (Aur-m., Graph., Petr.), особенно вокруг ногтей.

Обильный, зловонный, едкий пот между пальцами ног (Bar-c., Kali-c., Lyc., Puls.), на ладонях рук и на подошвах ног делает кожу грубой и болезненной и даже разъедает одежду и обувь (Lyc., Nat-m., Sep.).

Экзостозы (Calc-f., Dulc., Ruta) суставов, особенно пальцев рук и ног.

Ногти: Атрофированные или атрофированные (Carc., Caust., Graph., Nit-ac., Thuj.), ломкие, крошащиеся, деформированные, шелушащиеся, шершавые, расколотые, толстые, с белыми пятнами на них.

Синовит ++ суставов (Verb., Bry., Caust., Hep., Rhus-t., Sulph.).

Тонкие, исхудавшие пальцы (Lach., Thuj.).

Артритические узелки на суставах пальцев, которые остаются согнутыми.

Отёчные, губчатые припухлости коленных суставов и стоп.

Ганглий на тыльной стороне кисти или запястья (Calc., Mag-m., Thuj.).

Заусенцы и вросшие ногти на ногах с изъязвлениями.

Ледяной холод рук и ног (Camph., Verat.).

Плохо вылеченная паронихия с болезненностью и воспалением вокруг ногтей и под ними вследствие травмы осколками стекла.

Нагноение на плече после вакцинации.

Размягчение костей, особенно бедренной кости.

Чувствительные, ороговевшие мозоли, затвердения и бородавки на кистях рук и подошвах ног (Calc., Nat-c., Nit-ac., Sep.).

Спать

Ребенок поздно засыпает и спит чутко.

Во время сна: подергивание конечностей, смех (Hyos., Lyc., Stram., Sulph.), жалобы (Aur., Bar-c., Stram.), крики (Borx., Lyc., Puls., Tub.), разговор (иногда громкий) (Ambr., Lach., Psor.), плач или хныканье.

Ощущение сонливости после еды и чтения (Carbo-veg., Gels., Nat-m.).

Спит с низко опущенной головой (Nux-v., Spong.).

Частое зевание.

Ужасные сны о том, что его преследуют призраки или дикие животные и т. п., с бесплодными попытками закричать (Am-m., Ars., Mag-m.); затем просыпается, вздрогнув, в холодном поту.

Обильный, кислый пот во время сна.

Видит ужасные лица, не может заснуть.

Сонливость днем, бессонница ночью.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Отвращение к обнажению тела при лихорадке (Nux-v., Psor., Puls., Rhus-t., Stram.).

При лихорадке: носовые кровотечения ярко-красной кровью, выраженная жажда и обильное слюнотечение, вязкая кровь (Bell., Carbo-veg., Nit-ac., Nux-v., Rhus-t., Sulph.).

Постоянная лихорадка во время прорезывания зубов (Calc., Cham., Gels., Sulph., Verat-v.).

Стадия жара начинается во время сна (Calad., Mez., Op., Samb.).

Беспокойство, жалобы и бормотание при высокой температуре (Bell., Coff., Ipec., Lach.).

КОЖА

Нездоровая кожа (Alum-p., Borx., Graph., Psor.); раны заживают медленно, а сыпи имеют тенденцию к нагноению (Calc., Graph., Hep., Nat-m., Sulph.).

Сладострастный зуд кожи (Anac., Merc., Sulph.), усиливающийся от расчесывания; с ощущением жжения.

Прыщи сильно чешутся (Ant-c., Graph., Sulph.).

Результаты теста:

Полезное средство при мозолях, келоидных рубцах, родинках, бородавках, кистах сальных желез (атеромах) и бородавках (Ant-c., Med., Thuj.).

Бородавки: мясистые, твердые, крупные, на ножке (Caust., Lyc., Med., Nit-ac., Rhus-t., Staph., Thuj.), гнойные и болезненные.

Сухая гангрена (Arc., Cm.).

Пролежни у младенцев (Calc., Cham., Med., Sep., Sulph.).

Сухая чесотка (Ars., Sep., Sulph.).

Свищевые или гангренозные язвы с синевато-черным основанием и приподнятыми, неровными, блестящими, губчатыми и уплотненными краями; имеют тенденцию к нагноению с обильным гнилостно-кровянистым отделяемым.

Гусиная плоть.

Опрелость.

Влажные, покрытые коркой высыпания или волдыри на коже.

Бледно-красные или коричневые невусы на коже.

Бледная, восковая кожа.

СУДОРОГИ

Недомогания от: прорезывания зубов, **испуга** (Calc., Hyos., Ign., Kali-br., Op., Stram., Zinc.), травм, мастурбации, **новолуния** (Bufo, Caust., Cupr., Kali-br.), резких запахов, **подавленного потоотделения ног** (Form.), **вакцинации** (Carc., Cic., Thuj.), глистов.

Во время судорог: клонико-тонические судороги, холод левой стороны тела (кальций, ипекакуана, сера), пена у рта, плач, бормотание, бледность лица, крики, потеря сознания, головокружение.

После судорог: бессонница, несмотря на крайнее истощение (Cic., Kali-br.).

Хуже **ночью** во время сна (Bufo).

Общий

Кости: хрупкость, кариес и размягчение (Calc., Merc., Sep.).

грозой и во время нее (Bry., Gels., Med., Nat-c., Phos., Rhod., Sep.), при перемене погоды (Dulc., Rhus-t., Tub.), от **холодной, сырой погоды** (Ars., Calc., Dulc., Nat-s., Rhod., Rhus-t., Tub.), холодного ветра, промокания (Alum., Calc., Caust., Nat-s., Puls., Rhus-t.), подавления секрции или кожных высыпаний (Bry., Dulc., Ipec., Kali-bi., Nux-v., Stram., Sulph., Zinc.), подавления потоотделения ног (Bar-c., Cupr., Sep., Thuj., Zinc.), вакцинации (Mez., Sulph., Thuj., Zinc.), **глистов** (Calc., Spig., Sulph.).

Зябкость (Ars., Calc., Dulc., Hep., Kali-c., Nit-ac., Nux-v., Rhus-t.) с отвращением к холоду или свежему воздуху и ухудшением от них.

Любая небольшая рана нарывает и заживает очень медленно (Hep., Lach., Nit-ac., Petr., Sulph.).

Твердые, узловатые, уплотненные железы, с исхуданием (Bar-m., Iod., Tub.).

Задержка **развития костей**; задержка развития с карликовостью (Bar-c., Calc.).

Полезно при **осложненных переломах** (Arn., Calc., Lach., Ruta); **ударных - травмах** (Arn., Bad., Hyper., Nat-s.), **вывихах** (Agn., Arn., Calc., Ign., Lys., Nat-c., Phos., Rhus-t.), медленном заживлении костей после переломов, растяжениях и т. д.

Теплый пот при **судорогах** и **холодный пот** при **поносе** (Ars., Camph., Sec., Tab., Verat.).

Дети с повышенной чувствительностью к аллопатическим препаратам, особенно к анальгетикам, антибиотикам и отхаркивающим средствам.

Обильный, зловонный, изнуряющий пот от испуга, малейшего усилия и во время еды.

Язвы со свищами на коже, вокруг суставов, желез, костей и т. д.

Худые, быстрорастущие дети с опущенными плечами и тонкими волосами.

Дети, больные риккетсиозом, которые очень быстро теряют вес, несмотря на волчий голод (Calc., Iod., Nat-m., Petr.).

Рахит.

Полезно при абсцессах, когда необходимо рассасывание гноя (Iod., Lach., Phos.).

Полезно для удаления мелких инородных тел, таких как осколки стекла и т. п. (Arn., Hep.).

SQUILLA MARITIMA

(Сквиль - Сквил.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

При кашле трёт лицо кулаком.

Просыпаясь, трёт нос кулаком.

Вирусные инфекции верхних и нижних дыхательных путей.

Насморк усиливается на свежем воздухе; катар сопровождается слезотечением; обильные, капающие, раздражающие, зеленоватые выделения. Жидкость выделяется струями, липкая и вязкая.

Сенная лихорадка с резкими водянистыми выделениями из носа, усиливающимися рано утром, от холодного воздуха, холодных напитков и холодной пищи, а также с зудом в глазах, слезотечением, чиханием и слюнотечением.

Сухой, раздражающий кашель, хотя в груди, по-видимому, присутствует большое количество хриплой мокроты. Выделяется скудная, очень густая мокрота.

Сильный, спазматический, мучительный кашель, провоцируемый глубоким дыханием или питьём. Чихание всегда после кашля. Кашель усиливается до и после полуночи, рано утром, в тёплых помещениях, от холодных напитков и при перемене погоды с тёплой на холодную. Кашель постоянный днём и ночью, облегчается после обильного отхождения мокроты.

Кашель с лихорадкой, усиливающийся во время лихорадки. Сон нарушается кашлем, сопровождающимся пробуждением. Обильная разрывающая боль при кашле. Кашель с мокротой по утрам, становящийся всё более сухим к вечеру. Жгучая боль под рёбрами при кашле, особенно слева.

Кашель во время или после кори.

Кашель может привести к проблемам с дыханием и астме, которые усиливаются при употреблении спиртного, при лихорадке и при пробуждении.

Одышка при кашле с множеством хрипов в гортани и трахее, с непроизвольным мочеиспусканием.

Пневмония, посткоревой пневмонит. Пневмонит характеризуется сухим кашлем, обильным выделением мочи, высокой температурой, учащенным пульсом и постоянным хриплым кашлем.

Липпе отмечает, что все продукты имеют сладкий вкус.

Желание кислых и холодных напитков с выраженным отвращением к еде.

Непроизвольный стул при кашле или чихании.

Диарея во время или после кори.

Острицы.

Основным симптомом Сквила является **чрезмерное выделение мочи**.

Внезапные позывы к мочеиспусканию, необходимо торопиться, иначе моча вытечет, непроизвольное мочеиспускание ночью.

Непроизвольное мочеиспускание при кашле.

Ночное недержание мочи.

Ломкие, истертые, слезающиеся и падающие ногти.

Очень зябко, хуже от холодного воздуха и холодных напитков.

Источник

- Синоним: *Urginea maritima*. Происходит из семейства лилейных (*Lilia ceae*).

СТАФИЗАГРИЯ

(Delphinium staphisagria, дельфиниум - Staph.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Чувствительные дети с **эстетической** восприимчивостью (Carc., Lach., Sil.).

Чрезмерная мастурбация из-за **чувства пренебрежения** (Arg-n., Carc., Hyos.), заброшенности или разлада в семье (Lach., Merc.). Слишком послушный, **склонный к смирению** (Carbo-veg., Carc., Puls., Sil.). Во время беременности у матери часто возникали ссоры, отношения распадались, ее любовь разочаровывалась, и она реагировала **негодованием, подавленным гневом** (Ign., Lys., Nat-m.).

Дети легко раздражаются (Aur-mn., Carc., Ign., Kali-p., Puls.) и могут расстроиться по любому поводу; даже безобидные слова обижают их (Calc., Carc., Nat-m.).

В добром здравии — застенчивый (Bufo, Carc., Sacch., Sil.), **дружелюбный, сдержанный и милый; в болезни — гневливый, жалующийся и угрюмый** (Lys.).

Дети, которые хотят всем угодить (Carc., Lys., Puls., Sil.).

Подавленный гнев после эмоциональных травм.

Драться, когда их оскорбляют, ниже их достоинства (Aur., Coloc., Ign.).

Тело

Кишечные колики после возмущения (Coloc.).

Булимия вследствие эмоциональных расстройств (Ign., Nat-m.).

Хронический тонзиллит каждую зиму (Bar-c., Dulc., Hep.).

Корки, покрытые чешуйками, высыпания на волосистой части головы (Dulc., Graph., Merc., Nat-m., Psor., Sulph.); при снятии чешуек выделяется водянистое отделяемое; кожа под ними болезненна и чрезвычайно чувствительна к прикосновению.

Очень чувствительны: живот, кожа, желудок, зубы, раны и т. д.

Зубы уже плохие, когда прорезываются (calc., calc-f., creos.).

Другие важные симптомы

Дух

Рассеянные дети с выраженной склонностью к **мечтательности** (механизм бегства от эмоциональной травмы).

Жалобы, вызванные: **гневом с негодованием** (Aur., Coloc., Nat-m., Nux-v.) и унижением, ожиданием, очень ранним **сексуальным насилием**.

(Carc., Med., Nat-m., Plat., Sep.), смерть родителей, смущение или стыд, эмоции, крайнее родительское угнетение, наказание и увещания .

Не видно ни ран, ни капель, ни малейших следов крови (Alum., Calc., Phos.).
Неуклюжие (Apis, Caps., Nat-m.) и дети с высоким **риском несчастных случаев** (Arn., Caps., Med., Puls.).

Грязные и неопрятные дети; склонны мочиться и испражняться где попало (Hyos., Sep., Sil., Sulph.).

Страх **врачей** (Arn., Ign., Phos., Stram.), лифтов, зла, **узких пространств** (Arg-n., Stram.) и **грозы** (Bry., Gels., Nat-m., Phos., Rhod.).

Злобный (Anac., Ars., Stram., Tub.); ненависть к тем, кто их **обидел** (Aug., Lach., Nat-m., Nit-ac., Sulph.).

Непослушные, дерзкие и раздражительные дети (Ant-c., Cham., Cina, Tub.) , у которых часто случаются истерики; легко впадают в гнев и ярость при малейшем противоречии, бьют других или наносят себе увечья, бросают или ломают предметы; у них красное лицо и одышка.

Слабо разбирается в математике (вычислительной, кали-химической, естественнонаучной, псориатрической), особенно в алгебре и арифметике.

Чувствителен к боли (Cham, Coff, Hep, Sil) и **выговорам** (Carc., Med., Nat-m., Sacch.), **затем много плачет** (Carc., Plat.).

Молчаливы и **неспособны реагировать, когда чувствуют эмоциональную боль** (Ign., Kali-c., Mag-m., Nat-m., Phos., Puls.).

Склонность к **мастурбации очень часто** приводит к возникновению чувства вины (Bufo, Med.).

Застенчивые и смущенные дети (Bar-c., Calc., Coca., Puls.); избегают компании .

Нежный.

Капризный; ребенок отказывается от вещей, о которых он или она ранее просил. Смех или плач по мелочам (Bufo, Ign., Op., Puls.).

Любит белый и синий; хочет, чтобы все игрушки и одежда были только этих двух цветов (Nux-v., Sep., Sil., Tub.).

Плохо разбирается в рисовании и искусстве.

Имеет привычку постоянно грызть ногти.

Полезно в случаях, когда леворуких детей насильно заставляют писать правой рукой.

Голова

Головная боль после **гнева** (Bry., Cham., Lys., Nux-v., Plat.) или умственного напряжения (Aug., Calc-p., Lys., Nat-m., Ph-ac., Sil.).

Боль в затылке после **расстройства пищеварения** (Cann-s., Ipec.).

Очаговое выпадение волос, особенно на затылке и висках, после смерти близкого человека, унижения или разочарования.

Результаты теста:

Весы (Carbn-s., Graph, Nat-m., Phos., Sulph.).

Сухие, шелушащиеся высыпания на коже головы с шелушением или влажные, гнилостные, разъедающие себорейные корочки, очень **чувствительные к прикосновению** (Hep., Nit-ac.).

Экзематозные высыпания на затылке (Caust., Lyc., Petr., Sil., Sulph.) и за ушами, которые сильно зудят (Caust., Lyc., Petr., Sil., Sulph.).

Вши (Carb-ac., Lyc., Merc., Psor.).

Холодный пот на лбу (Carbo-veg., Op., Verat.).

Преждевременное выпадение волос и поседение.

ГЛАЗА

Боль в глазах ночью, при **чтении** (Con., Dulc., Nat-m., Ruta, Sep.) или при искусственном освещении; лучше в темноте.

Рецидивирующие ячмени (Con., Graph., Psor., Sil.) после употребления свинины или жирной пищи (Puls), после перенесенного горя или - вследствие систематического приема антибиотиков.

Полезно после **травм глазного яблока** (симф.) или после операций на глазах. Разъедающее слезотечение и зуд краев век (Calc., Nat-s., Puls., Sulph.) на открытом воздухе.

Катаральное воспаление глаз при простуде (All-c., Calc., Dulc., Euph., Merc., Puls.).

Утром ребенок с трудом открывает веки из-за спазмов век.

Результаты теста:

Халязион (Platan-oc., Thuj.).

Темные круги вокруг глаз (Китай).

Ячмень на левом верхнем веке с тенденцией к затвердению (Puls., Sil.).

Экзематозные высыпания вокруг глаз.

Выворот век (эктропион).

Ресницы выпадают.

Воспаление краев век, конъюнктивы и радужной оболочки.

Косоглазие.

Запавшие глаза.

Отек хряща века (ферр-пи.).

УШИ

Снижение слуха из-за аденоидов и увеличенных миндалин (Kali-bi., Merc., Nit-ac.).

Боль в ушах, вызванная сквозняками.

Угрожающий кариес сосцевидного отростка.

Результаты теста:

Мокнувшие высыпания за ушами и в ушах, которые сильно зудят (Her., Mez., Nit-ac., Psor.).

полипы.

Нос

Односторонняя заложенность носа, особенно на той стороне, на которой лежит. Внезапные и сильные приступы чихания и насморка; густые желтые выделения, которые высыхают и образуют корки и чешуйки в ноздрях (Lac-c., Stict.).

• Результаты теста:

Аденоиды (Agra., Spig., Sulph., Thuj.).

Острый нос (Camph., Verat.).

Корки и чешуйки в ноздрах.

полипы.

Болезненность и чувствительность перегородки носа и левой ноздри.

Лицо

Боль в лице из-за кариозных зубов или после удаления зубов.

Результаты теста:

Покраснение лица при **кашле** (Bell., Cupr., Ipec., Kali-c., Sang.) или при **гневе** (Bell., Bry., Cham., Nux-v.).

Розовые угри и обыкновенные угри.

Сыпь вокруг рта, особенно на верхней губе, которая опухает и трескается.

Околоушные, подъязычные, нижнечелюстные и подбородочные лимфатические узлы увеличены и болезненны.

Старческое, заостренное, осунувшееся, болезненное выражение лица.

РОТ

Зубы **очень чувствительны** (Ant-c., Lach., Merc., Sulph.), особенно к прикосновению и холодной воде; ребенок **не переносит лечения зубов** (Ant-c., Fl-ac., Ign., Mag-c.).

Зубная боль, особенно в нижних правых молярах, отдающая в ухо; усиливается после полуночи, **от холода** в любой форме (calc., caust., cham., merc.), на свежем воздухе, при жевании, при чистке зубов; улучшается от внешнего тепла.

Зубная боль в **больных зубах** (Ant-c., Cham., Kreos., Merc., Thuj.), после неприятностей или после лечения зубов.

Десны кровоточат при чистке зубов.

Затрудненное прорезывание зубов.

Повышенное слюноотделение во время сна.

Результаты теста:

Ранний кариес зубов (calc-f., calc-p., creos., mez., plan.), особенно боковых поверхностей зубов, как только они прорезываются.

Образование абсцессов и свищей десен.

Неприятный запах изо рта.

Ранула.

Болезненные афты с желтоватым основанием у младенцев и детей младшего возраста.

Воспаленные, чувствительные, цинготные, губчатые десны, склонные к нагноению с образованием язв, покрытых струпьями; десны легко кровоточат и легко отделяются от зубов.

Зубы черные и крошащиеся, с темными полосами.

Шея

Боль в горле, распространяющаяся на **левое** ухо при глотании (Nit-ac., Nux-v.).

Хронический тонзиллит.

• Результаты теста:

Опухание и уплотнение **шейных желез** вследствие сыпи на коже головы (Bar-c., Cist., Hell., Sil.).

Постоянная тенденция сплывать во время разговора, особенно при волнении.

Зоб.

Красные, опухшие, твердые миндалины.

ЖЕЛУДОК

Повышенная тяга к еде, даже при полном желудке (хинин-с., йод-, фос-).

Боль в желудке после горя, гнева или досады; лучше **в положении сидя, наклонившись вперед** (Bry., Coloc., Nux-v.) или **после отхождения газов** (Hep., Tarent.).

Жажда после сна (Ther.).

Отрыжка после жирной и обильной пищи.

Частая икота после еды.

Пищевая тяга в отсутствие лихорадки, т. е. до или после лихорадки.

Медленное пищеварение.

Отвращение: сыр, **молоко** (Aeth., Calc., Cina, Lac-d., Nat-c.), **твердая пища** (Bry., Ferr., Sulph.) и вода.

Пристрастия: хлеб, шоколад, **сочная или жидкая пища** (суп, холодное молоко) (Ant-t., Ars., Chin., Ph-ac., Verat.), много еды (Cina), **мясо** (обязательно мясо) (Arum-t., Mag-c., Sanic.), **сырой лук** (All-c., Carc., Lac-del., Sabad., Thu.), **рис** (Alum., Phos.), сахар и **сладости** (Arg-n., Chin., Lyc., Phos.).

ЖИВОТ

Постоянно **держится за желудок** (Carbo-veg., Merc., Sep.) из-за ощущения дискомфорта.

Вздутие живота с обильным скоплением газов и спазматическими болями у - новорожденных и маленьких детей.

Затрудненное скопление газов с болью в подчревной области.

Боль в животе после еды или питья, после чувства негодования или после мочеиспускания; лучше от тепла и в положении сидя с наклоном вперед.

Потливость живота по ночам.

Результаты теста:

Вздутие живота.

Паховые железы увеличены.

Печень пальпируемая и болезненная.

Паралитическая непроходимость кишечника.

ПРЯМАЯ КИШКА

Хроническая диарея (Ars., Vac., Calc., Graph., Phos.) у детей после еды или питья, особенно холодных напитков.

Диарея после **испуга** (Arg-n., Cham., Coff., Gels., Nux-v., Op.) или других эмоций, таких как **негодование** (Coloc., Gels., Ipec.), **унижение** (Aloe, Bry., Cham., Coloc.) или **гнев** (Calc-p., Cham., Coloc., Petr., Sulph.).

Отхождение горячих, **зловонных газов с запахом тухлых яиц** (Arn., Cham., Psor., Sulph.) во время дефекации, что приносит облегчение.

Непроизвольное выделение стула с метеоризмом (Aloe, Nat-p., Podo.).

Запор с безуспешными позывами к дефекации и натуживанием, даже при мягком стуле.

Зуд в области ануса после дефекации.

Результат теста:

- В стуле обнаружены круглые черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Жжение в уретре вне мочеиспускания (Verb., Graph., Merc.).

Непроизвольное подтекание мочи после мочеиспускания (Agar., Cann-i., Sil.).

Боль в мочевом пузыре или уретре после катетеризации или цистоскопии (Arn., Coloc., Nupreg.).

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей у восприимчивых молодых девушек.

Моча темно-красного и едкого цвета.

Дизурия с позывами к дефекации.

Ночной энурез.

Результаты теста:

- Камни.
- Моча: лимфоциты, эритроциты: ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Ранняя половая зрелость заставляет ребенка осознавать свои половые органы (Hyos., Lach., Merc., Phos.).

Чрезвычайная чувствительность (Kali-c., Ph-ac., Plat.) и жар половых органов, особенно мошонки и яичек.

Повышенное половое влечение с частыми эрекциями (Hyos., Lach., Merc., Phos.), ранняя склонность к мастурбации.

Орхит, особенно левосторонний (Puls., Rhod.), вызванный свинкой.

Полезно после любого типа травм половых органов.

Результаты теста:

- Лобковые вши (Coss., Sabad.).
- Потливость мошонки, особенно ночью (Ham., Mag-m., Sil.).

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Чрезвычайная чувствительность влагалища к прикосновению (Lyss., Plat.).

Кремообразные бели с интенсивным зудом половых органов.

Повышенное сексуальное влечение у молодых девушек со склонностью к мастурбации, особенно в сочетании с зудом половых органов.

Результат теста:

- Candida albicans++ (Calad., Nit-ac., сент.).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

- Сужение в ямке горла при глотании со слабым, низким голосом (Ant-t., Canth., Нер., Stann., Verat.); хуже после таких чувств, как гнев.

- Результаты теста:

Носовой звук голоса (Caust., Kali-bi., Phos.) с увеличенными миндалинами.
Отек голосовой щели.

ДЫХАНИЕ

Одышка от холода, горя, боли или унижения, лучше от **еды** (Graph., lod., Spong.) и **ходьбы** (Dros., Ferr., Nicc.).

Астматическое дыхание со спазмами диафрагмы.

Результат теста:

- Медленный вдох.

КАШЕЛЬ

Ребенок хватается за гениталии при кашле (Цинк.).

Кашель после таких чувств, как **гнев и ярость** (Ant-t., Arn., Cham., Cina, Ign., Nat-m.).

Сухой кашель после питья, влажный кашель после **еды** (Bell., Nux-m., Phos., Sanic., Sil., Thuj.); с лихорадкой.

Чихание и кашель одновременно (Agar., Bell., Cina, Squil.).

Хронические, постоянные, частые и надоедливые приступы кашля.

Кашель после мяса или холодных напитков, после чистки зубов.

Кашель от першения в гортани и за грудиной; начинается, как только ложится после обеда.

Приходится глотать откашливающуюся мокроту.

Приступы кашля в течение дня, особенно с 9 до 12 часов.

ГРУДЬ

Боль в груди из-за холодных напитков (Carbo-veg., Psor.).

Результаты теста:

Увеличенные подмышечные железы.

Рентгенограмма: первичный комплекс.

НАЗАД

Слабость и скованность шейного отдела.

Результат теста:

- Расщелина позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

Неуклюжесть конечностей (Agar., Apis, Bov., Calc., Hell., Ipec., Lach.).

Боли роста (Ferr-act., Guaj., Ph-ac.).

Слабость в коленях, улучшение в положении сидя (в отличие от Coloc., Mag-c., Phos.).

Судороги в икрах и подошвах ног при пробуждении, особенно на той стороне, на которой лежит.

Судороги в пальцах рук, большие пальцы поджимаются.

Боль в суставах из-за неправильного положения лежа.

Результаты теста:

Покраснение правой руки (Agar., Apis, Bell., Fl-ac., Sulph.).

Ломкие ногти.

Мурашки по коже, особенно на ногах (Aur., Calc., Rhod.).

Воспаленные и чувствительные мозоли.

Воспаление и отек костей пальцев, стоп и лодыжек.

Вросшие ногти на ногах.

Обильный, холодный, вонючий пот на ногах, особенно по ночам.

Беспокойство нижних конечностей из-за боли и судорог в икроножных мышцах.

Чувствительные подошвы и кончики пальцев.

Нагноение тазобедренного сустава.

СПАТЬ

Сны: Драки (Ferr., Nat-m., Nux-v., Stram.), споры, кошмары и т. д.

Сонливость после еды (Agaг., Calc., Nux-v.).

Бессонница после мастурбации или унижения (Calc., Coloc., Ign.).

Спит, наклонив голову вперед (Cic., Cupr., Stann.).

Ребенок просыпается, отталкивает все от себя и хочет, чтобы все ушли; часто зовет мать.

Подергивание мышц во время сна.

Беспокойный сон из-за кошмаров.

Сонливость в течение всего дня, бессонница ночью.

Сильное зевание и потягивание, глаза начинают слезиться.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Лихорадка вследствие гнева (Bry., Cham., Sep.) с расширением кровеносных сосудов (Chin., Hyos., Puls.).

Отсутствие жажды при лихорадке (Apis, Cina, Gels., Puls.).

Обильный, очень зловонный пот с запахом тухлых яиц, особенно ночью, который ухудшается.

Хочет, чтобы его раскрыли, когда температура спадает.

КОЖА

Псориаз (Aur-mn., Lyc., Nat-m.) вследствие горя или подавленного гнева.

Сильный зуд, усиливающийся от холодного воздуха, ночью, при раздевании (Cocc., Dros., Nat-s., Psor., Rumx.) и от расчесывания; с последующим жжением; зуд меняет место при расчесывании (Anac., Canth., Mez.).

Хроническая кожная сыпь, склонность к крапивнице или рецидивирующим - фурункулам.

Высыпания на сгибаемых поверхностях суставов.

Чувствительная кожа, склонная к воспалениям и нагноениям.

Результаты теста:

Жесткая кожа (словно слишком тугая) (Asaf., Canth., Ph-ac., Sil.).

Атопическая экзема.

Простой хронический лишай.

Бородавки на ножке и нитевидные; болезненные на ощупь и легко кровоточат.

«Стригущий лишай» (стригущий лишай, опоясывающий лишай).

Желтые, покрытые коркой, влажные, экзематозные высыпания, при расчесывании которых сочится жидкость.

Судороги

Жалобы: **Гнев** у младенцев (Cham., Cupr., Nux-v., Puls.).

Во время судорог: **раздавливание больших пальцев рук** (Bufo, Caust., Cic., Lach., Stann.), судороги в пальцах рук при вытягивании, пена у рта и потеря сознания.

Общий

Жалобы на **мастурбацию** (Calc., Gels., Ph-ac., Sep., Thuj.), перенапряжение - мышц и сухожилий, подавление кожных высыпаний (особенно чесотки) и **операции** (Arn., Bell-p., Calen., Hyper., Stront-c.).

Хорея после горя или наказания (Agar., Caust., Ign., Nat-m.).

Видимое **дрожание** тела **из-за гнева или эмоционального возбуждения** (Cocc., Plb., Psor., Zinc.).

Отвращение к купанию.

Истощенные и анемичные дети.

В анамнезе рецидивирующий цистит, ячмень или отек хряща века.

Затвердение и опухание желез у истощенных детей.

Повышенная чувствительность к боли.

Полезно при кариесе и размягчении костей, рахите и цинге.

Медленное заживление костей после переломов; очень полезно при сложных переломах.

Склонность к простудам.

Полезно при сотрясениях мозга, вывихах, порезах, травмах от острых предметов, колотых ранах, осколочных ранениях, рваных ранах и т. п., которые легко кровоточат и очень медленно заживают, образуя болезненное нагноение.

Хуже в сырую и лучше в сухую погоду.

Источник

Семейство лютиковых (Ranunculaceae).

СТРАМОНИУМ

(Дёрновое яблоко - Страм.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Умственно отсталые дети или дети с врожденными уродствами, мать которых получила эмоциональную или физическую травму, например, из-за разочарования в любви, испуга, горя, насилия в браке, обвинений и т. д. (Bufo, Carc., Hyos., Kali-br., Op., Ph-ac.).

Привязанность и покорное поведение по отношению к родителям, в первую очередь из-за неуверенности или страха их потерять.

Тело

Непроизвольные движения (Crot-c., Cupr., Hell., Merc., Zinc.) , такие как тремор, хорея и подергивания, вызванные испугом или выговором.

Легко получает судороги при лихорадке.

Неврологические жалобы вследствие сильных эмоций, таких как шок или унижение, или из-за подавленной секреции ушей.

Паралич одной стороны тела и судороги другой.

Другие важные симптомы

Дух

Ведет себя странно и постоянно делает **глупые жесты** (Bell., Hyos., Verat.).

Отвращение к воде (Bell., Hyos., Lyss., Phos.); даже звук текущей воды пугает его.

Расстройства поведения (Anac., Cham., Cina, Hyos., Med., Tarent., Tub., Verat.) , вызванные жестоким обращением (Anac., Carc., Lyss., Med.), испугом (Carc., Op.), обвинениями (Ambr., Op., Plat., Staph.) и насилием (Aur., Bry., Carc.).

Ребенок очень **активный и жизнерадостный**, постоянно хочет **прыгать, лазать и танцевать** (Bell., Cic., Hyos., Tarent.).

Когда дети злятся , они склонны **кусать, царапать** или **пинать** других (Bell., Cham., Tub.), **дергать за волосы** (Bell., Lil-t., Tarent., Tub.), **топать ногами** (Verat.) и **бить** (Cham., Cina, Cur., Tub.).

Разрушительный (Carc., Cupr., Hyos., Tub.); желание ломать вещи, рвать одежду и подушки.

Непослушные, упрямые, злобные, сварливые и оскорбительные дети (Cham., Hyos., Nux-v., Tub., Verat.).

Страх привидений и животных, особенно **черных собак** (Bell.) и пауков (Arg-n., Cupr., Nat-m., Phos., Sep., Tarent.).

Беспокойство ночью, особенно в темноте; **нуждается в компании и свете** (Arg-n., Ars., Hep., Lyc., Phos.).

Болтливость и бред при лихорадке (Bapt., Lach., Sulph.).

Делает много ошибок в речи и письме (Cham., Sil.); забывает или путает буквы и слова; называет вещи неправильными названиями; плохой почерк, пишет неразборчиво (Lyc.).

Отказывается принимать лекарства (Arn., Hyos., Lach.).

Молчаливый ребенок (Cocc., Gels., Op., Puls., Verat.); сидит напряженно, погруженный в глубокие раздумья, не двигаясь.

Сильный гнев, обычно возникающий внезапно, чередующийся с веселостью и игривым настроением (Aur., Coff., Ign.).

Тревожность и страх в присутствии незнакомых людей; избегает зрительного контакта.

Отвращение к черному цвету.

Слегка краснеет.

Дети с переменчивым настроением; постоянно нуждаются в разнообразии.

Ребенок отказывается отвечать или отвечает неуместно и неправильно.

Дети, которые любят хвастаться и выдумывать неправдивые истории.

Мечтательные дети, которым трудно сосредоточиться на учебе.

Они боятся упасть или получить травму, поэтому они чрезвычайно осторожны и активны.

Неточная оценка расстояний, вследствие чего происходит столкновение с предметами.

Любит читать экстравагантные истории.

Судорожный и громкий смех по пустякам (Bell., Cann-i., Hyos., Mosch.).

Часто громко кричит, особенно перед судорогами (Cic., Cupr.) и во время них (Lyc., Op.), во время лихорадки (Bell., Caps.) и во время сна (Borx., Lyc., Puls., Zinc.).

ГОЛОВА

Базальный менингит (Bell., Hell., Op.) и энцефалит вследствие **подавленной оторей**.

Ярко-красное лицо (прилив крови) во время **приступов ярости** (Bell., Op.).

Сильные головные боли (Bell., Cact., Glon., Meli.), особенно в затылочной - области, со слезотечением и рвотой; усиливаются на солнце, от тряски, от взгляда на яркие предметы; уменьшаются от **холодных компрессов** (Aloe, Psor., Spig.) и сидения в **темной комнате** (Bell., Lac-d., Sang., Sil.).

Результаты теста:

Зарывает голову в подушку (Apis, Bell., Hell., Tub.).

Не может держать голову прямо, постоянно падает набок или назад.

КТ: кровоизлияние в мозг.

Гидроцефалия.

Повышенное внутричерепное давление.

Непроизвольные движения головы (Agar., Cann-i., Caust., Hell., Zinc.); подергивания, спазматическое поднятие головы с подушки, переворачивание, запрокидывание головы назад.

Знак Кернига +.

Нахмушивание при головных болях и повреждениях мозга.

ГЛАЗА

Паралич **зрительного нерва** (Bell., Gels., Kali-i., Phos., Puls., Sil.).

Светобоязнь, особенно при гневe (Acon., Bell., Hyos.).

Косоглазие по Шреку (Cic., Nux-m.).

Результаты теста:

Глаза полуоткрыты во время сна (Bell., Cocc., Lyc.) и **при бреду** (Crot-h.)

Пристальный взгляд, блестящие, широко раскрытые глаза с головной болью (Bell., Glon, Spig.).

Дикий взгляд (Bell., Lyss., Nux-v.), глаза кажутся выпученными (Bell., Ferr-i., Nat-m.).

Постоянное вращение или маятникообразное покачивание глаз из стороны в сторону.

Корковая слепота.

Недальновидный.

Зрачки расширяются, особенно после замечания или выговора.

Косоглазие при заболеваниях головного мозга.

Подергивание верхних век.

УШИ

Снижение слуха с шумом в ушах (Caust., Lyc., Merc., Sil.), ощущение, будто слышит какую-то музыку или **пение** (Chin., Kali-c.).

сосцевидного отростка распространяется на мозговые оболочки.

Жалобы, связанные с подавлением ушной секреции (Carbo-veg., Merc.).

Нос

Приступы чихания.

Заложенность левой ноздри.

Результаты теста:

Носовые кровотечения с **черной, запекшейся кровью** (Cham., Chin., Ipec., Rhus-t.).

Морщины от носа к уголкам рта (Calc., Staph., Sulph.).

Ноздри бледные.

Лицо

• Результаты теста:

Синюшность лица при **одышке** (Arg-n., Brom., Bry., Op.).

Жевательные движения (Bry., Calc., Hell., Lyc., Phos., Verat-v.).

Холодный пот на лице (Carbo-veg., Cina, Merc-c., Verat.).

Выдающаяся **линия носа** (Aeth., Ant-t., Cina, Ipec., Phos., Tarent.).

Дрожание **губ** при **разговоре** (Arap., Белл., Гелий, Цинк.).

Пустое (Camph, Hell, Phos) и **испуганное** (Acon., Bapт.) выражение лица.

Потрясающе.

Рожa одной стороны лица и носа.

Лицо горячее, красное и опухшее, конечности холодные.

улыбка .

Отек и воспаление подчелюстных и околоушных желез, особенно правой.
Отек, изъязвление и трещины на губах, особенно на нижней, из-за постоянного ковыряния и шелушения.

РОТ

Затрудненное прорезывание зубов (Borx., Calc., Cham., Mag-m., Nux-v., Sil., Sulph.).

Речь затруднена из-за **хореи** (Agar., Bufo, Caust., Cupr., Mag-p.).

Скрежет зубами во сне (Bac., Bell., Cina, Tub.) **и при гнев** (Hyos., Kali-c., Lys.).

Афазия с параличом языка.

Сильное заикание (Bell., Caust., Merc.); требуются длительные усилия, прежде чем пациент может произнести хоть одно слово.

Результаты теста:

Прикусывание языка во время судорог (Art-v., Bufo, Cic., Cupr., Oena., Op.).

Желание постоянно **стискивать зубы** (Bell., Cic., Hyos., Merc.).

Заостренный (Chel., Lach., Plb.), **потрескавшийся** (Ars-i., Fl-ac., Hyos., Nit-ac., Phos., Rhus-t.) язык **со следами зубов** (Merc., Rhus-t., Sep.), покрытый белым налетом, с торчащими красными сосочками, кажется напряженным, дрожит при высовывании.

Открытый рот со слюноотделением.

Бледность вокруг рта.

Темный, грязный налет на зубах.

ШЕЯ

Поперхивание при питье (Hyos., Nat-m.) из-за **затруднения глотания, особенно жидкостей** (Brom., Coc-c., Hyos., Ign., Lach.), из-за **паралича или спазмов пищевода** (Alum., Ars., Caust., Gels., Op., Plb.).

Сухость в горле, не проходящая после питья, частое покашливание и - откашливание.

Результаты теста:

Зоб.

Видимая пульсация сонных артерий.

ЖЕЛУДОК

Неутолимая жажда с большим количеством воды во время лихорадки (Bry., Eur-per.) **и при пробуждении утром** (Acon., Mag-m., Nat-m.).

Сильная икота с судорогами (Cic., Cupr., Hyos., Nat-m.).

Рвота зеленой желчью при кашле и малейшем усилии.

Зловонная отрыжка вечером.

Сильные рвотные позывы, даже после рвоты.

Повышенный аппетит во время диареи.

Рвота из-за лихорадки и воздействия яркого света.

Отвращение: **холодные напитки** (Lys., Sabad., Verat.), **грудное молоко** (Borx., Calc-sil., Cina, Sil.) и **вода** (Hyos., Nux-v., Staph.).

Пристрастия: пахта, **кислая пища** (Acon., Cor-r., Hep., Verat.), **шпинат** (Calc-p., Lac-leo., Symph.) и уксус.

ЖИВОТ

Спазматические, щемящие боли в животе перед стулом (Aloe, Arg-n., Chin., Coloc., Mag-c., Podo., Sulph.); лучше при наклоне вперед.

Воспаление **аппендикса** (Apis, Bell., Bry., Lach., Merc., Rhus-t.).

Результаты теста:

Увеличение паховых желез.

Тимпаническое вздутие живота.

ПРЯМАЯ КИШКА

Детская холера.

Диарея у детей, когда они смотрят на яркие предметы или когда они остаются одни в темноте.

Выделение зловонных газов.

Задержка стула с безуспешными позывами и усилиями.

Водянистый, черный, гнойный стул; выделяется непроизвольно во время мочеиспускания.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Ночной энурез, обширный, вызванный эмоциональными расстройствами, такими как испуг (Op.) или выговор (Staph.).

Непроизвольное подтекание мочи после дефекации или мочеиспускания (Arg-n., Ars., Hyos., Mur-ac., Phos., Zinc.).

Задержка мочи при эпилепсии и лихорадке (Ferr-p., Op.).

Острый гломерулонефрит.

Обильное и частое мочеиспускание во время лихорадки или после делирия; в остальное время мочеиспускание редкое.

Задержка выделения мочи; приходится долго ждать и тужиться, чтобы вызвать выделение мочи; выделение мочи прекращается, когда пациент перестает дышать.

Результаты теста:

Спастическая стриктура уретры (Canth., Nit-ac.).

Моча: Альбумин++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Ребенок постоянно трогает свои гениталии и мастурбирует, даже во время судорог (Bufo, Calc., Lach., Plat.).

Результат теста:

- Неопущение яичек.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

• Результаты теста:

- Отек голосовой щели.

Laryngismus stridulus [спазм голосовой щели].

Паралич гортани .

Измененный голос: становится писклявым или очень хриплым, неясным.

ДЫХАНИЕ

Слышно хрипы от мокроты в груди во время сна, усиливающиеся перед - полночью.

Одышка при разговоре, лучше на открытом воздухе.

Затрудненное, хриплое дыхание из-за спазмов в груди.

Астма у нервных детей, которые во время острого приступа впадают в глубокий сон, сопровождающийся храпом.

Результаты теста:

Брюшное дыхание (Ant-t., Ferr., Phos., Spong.).

Стонущее (Ant-t, Op.), **вздыхающее** и **хриплое** (Am-c., Op.) дыхание.

Медленный вдох и резкий, резкий выдох.

КАШЕЛЬ

Астматический, **хриплый** кашель по утрам (Arap.).

Хронический, глубокий, **лающий** (Bell., Dros., Hep., Spong.), **изнуряющий кашель днем и ночью** (Cupr., Kali-c., Spong., Stann.).

Кашель от холодных напитков, **испуга** (Acon., Arg-n., Bell., Cina, Ign., Rhus-t.), ветра или холодного воздуха, а также от взгляда на яркие или светящиеся предметы.

Лицо становится **темно-красным** (Bar-c., Cor-r., Kali-c., Squil.), с подергиванием ног при кашле.

Периодический сухой кашель, возникающий при прикосновении к гортани , разговоре или пении.

ГРУДЬ

Хронический аллергический бронхит у **детей с иммунодефицитом** (Kali-c., Tub.).

Пневмония после тифа (Ant-t., Bry., Op., Phos.).

Результаты теста:

Инфильтрация нижней доли **правого** легкого (Brom., Bry., Kali-c., Лус., Merc., Sang.).

Абсцесс легкого.

Судороги грудных мышц.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Сильное сердцебиение в груди после нагрузки, **испуга** (Acon., Aur-m., Coff., Op.) или при **кашле** (Calc., Nat-m., Puls., Sulph.).

Результаты теста:

Шумы в сердце.

Пульс: медленный, мягкий, слабый, почти непрощупываемый ИЛИ полный, твердый, частый.

НАЗАД

Позвоночник чувствителен к **малейшему давлению** (Хинин-с., Цинк.).

Сильное ощущение холода, распространяющееся по спине.

Результаты теста:

Опистотонус (Bell., Cic., Cupr., Hyos., Nux-v., Op., Stry.).

Спазмированная, жесткая шея; невозможность отогнуть голову назад.

КОНЕЧНОСТИ

Неуклюжий; роняет вещи или пропускает ступеньки при спуске по лестнице; затем часто спотыкается и падает (Agar., Apis, Bov., Nat-m.).

Хорея от страха (Calc., Caust., Ign., Kali-br., Laur., Nat-m., Zinc.), беспокойства или после чрезмерных танцев (Bell., Hyos.).

Ревматические жалобы или нагноение с сильной болью и болезненностью - тазобедренного сустава (Calc., Calc-p., Kali-c., Nat-s., Sil., Tub.), особенно с левой стороны (Nat-s.).

Холодный пот на ступнях и ногах.

Безболезненный паралич ног после судорог.

Дрожание ног или рук при удерживании чего-либо.

Результаты теста:

Пустулы на стопах (Calc., Led., Lyc., Sil.).

Непроизвольные подергивания или подёргивания ноги и руки (Cina, Graph., Hyos., Kali-br.).

Хореоподобные движения левой руки и правой ноги; не может ходить, вынужден бегать или прыгать и двигаться.

Пальцы сжаты в кулак, особенно большой палец.

Ледяной холод с синюшным оттенком ногтей, рук и ног.

Медленное сокращение мышц и сухожилий рук, попеременно также ног.

СПАТЬ

Сны: Драки, ссоры, ужасные кошмары (Borx., Carc., Kali-p.).

Во время сна: глаза открыты, пена у рта (Sil), скрежещет зубами (Ars., Bac., Bell., Cina, Tub.), смеется, громко стонет, беспокойно, ворочается, кричит, рыдает, храпит, разговаривает, плачет, скулит.

Спит в коленно-грудном положении (Calc-p., Carc., Lyc., Med., Phos., Tub.), голова зарыта в подушку.

Сонливость после любого волнения.

Внезапные вздрагивания во сне из-за шока.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Отвращение к раскрытию тела на всех стадиях лихорадки.

Лихорадка с экзантемой, например, при скарлатине или кори (Acon., Apis., Bry., Euphr., Puls., Sulph.).

Мороз:

Ледяной холод рук и ног с синюшным оттенком.

Сильные морозы с бредом.

Хуже от малейшего раскрывания; лучше от теплого укутывания.

• Нагревать:

Горячая голова, горячее лицо с синюшным оттенком кожи рук и ног, которые кажутся ледяными (Eup-per., Lyc., Meny., Phos., Verat.) ИЛИ жгучий, сухой жар тела с холодностью головы и лица, с сильным бредом.

Неутолимая жажда большого количества воды (Bru., Eup-per., Nat-m.).

Болтливость (Bapt., Gels., Lach., Pyrog., Tub.), беспокойство (Ars., Op., Puls., Rhus-t.) и крики (Bell., Caps., Cham., Coff., Op.); ребенок мечется и ворочается с одной кровати на другую.

Даже на этой стадии ребенок не может выносить пребывания без одежды, несмотря на жгучее, сухое тепло тела.

Судороги, обильные и частые позывы к мочеиспусканию, жар и боль в глазах.

Засыпает глубоким сном с громким храпом.

• Пот:

- Обильный, холодный ночной пот, который стихает к рассвету.

Постоянная лихорадка при менингите с полным помрачением сознания и быстрым, очень высоким подъемом температуры, особенно ночью, особенно между 16:00 и полуночью.

КОЖА

Сильно потеет, когда злится (Cham., Petr., Sep.) или нервничает (Calc., Ph-ac.), а также во время дефекации (Merc., Verat.).

Полезно в случаях, когда сыпь не появляется при кори или других заболеваниях, сопровождающихся кожной сыпью.

Результаты теста:

Маслянистый пот (Chin., Mag-c., Thu.) с очень неприятным запахом.

Огненно-красные или алые пятна на коже.

Гангренозные заболевания кожи.

Грубая, грязная на вид кожа.

Судороги

Дискомфорт или ухудшение от: кашля, прорезывания зубов, употребления воды или **кофе**, лихорадки, **испуга** (Calc., Hyos., Ign., Kali-br., Op.), травмы (Cic., Nuperg., Nat-s.), взгляда на яркие или блестящие предметы, мастурбации, попыток глотания, **вида воды** (Bell., Canth., Lyss.), сна, резких запахов, подавленной секреции, подавленных высыпаний или, если они не появляются, глистов.

Перед судорогами: крики (Cham., Cic.).

Во время судорог:

Прикус языка (Art-v., Bufo, Caust., Cic., Cupr., Op.).

Большие пальцы рук подтянуты внутрь (Bufo, Caust., Cic., Lach., Stann.).

Красное лицо (Cic., Cupr., Op.) с тусклым видом.

Крики (соч.).

Жесткие и **согнутые конечности** (Hyos., Plb.).

Чередующиеся клонические и тонические судороги различного характера.

Судороги верхних конечностей выражены сильнее, чем судороги нижних конечностей, или чередуются.

Кашель.

Диплопия.

Гидрофобность.

Сильный жар или абсолютный холод кожи.

Чрезмерный смех.

Мастурбация.

Опистотонус.

Спазмы одной стороны тела (обычно левой) при полной неподвижности другой.

Склонность падать назад.

Тетаническая ригидность с **тризмом** (Bell., Cic., Hyper., Nux-v., Op., Stry.).

Хуже после **3 часов ночи** (после полуночи: Nit-ac.).

После судорог: холодный пот, сонливость и слабость.

Общий

Дискомфорт от мастурбации, приема таких лекарств, как антибиотики или местные стероиды, **подавления секреции** (например, подавления гноя из абсцесса, подавления потоотделения и т. д.) (Asar., Graph., Psor., Sil.) и **подавления кожных высыпаний** (Bry., Dulc., Psor., Sulph., Zinc.).

Подергивания и дрожание во время **сна** (Hyos., Zinc.), при **испуге** (Ign., Op.) и после **эмоционального возбуждения** (Cocc., Staph.).

Нуждается в свежем воздухе, но состояние ухудшается при любом сквозняке, в пасмурную, сырую погоду и осенью.

Отсутствие реакции.

Хуже во время и после **сна** (Crot-c., Lach., Spong., Sulph.), особенно после длительного сна.

Источник

Синоним: *Datura stramonium*. Семейство пасленовых (Solanaceae).

СЕРА

(Сера - Сульф.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Не хочет мыться или купаться, особенно вокруг ушей (холодной водой: Ant-c.) (Am-c., Calc., Psor., Rhus-t.).

Дети, родители которых слишком вмешиваются и оказывают давление (Anac., Carc., Lys., Staph.), относятся к ним презрительно (Bry., Cham., Nat-m., Nux-v.), критикуют их (Coloc., Ign., Lys., Nat-m., Pall., Staph.) и притесняют; в конце концов они унижаются и становятся типичными детьми Sulphur.

Любознательные (Agar., Aur., Lach., Lys., Puls., Sep., Verat.) и любопытные дети; когда они чего-то не понимают, они расстраиваются и затем начинают теоретизировать в качестве компенсации.

дети Sulphur ведут себя деструктивно: они трогают все подряд (Bell., Cina, Hyos., Merc., Sacch., Thuj.) и оставляют после себя беспорядок.

Они не заботятся о своей внешности (Aur-s., Calc., Nat-sil.); обычно грязны, потрепаны и неопрятны. Но встречается и противоположный тип: очень чистоплотные, словно вылизанные и опрятные.

Дети, развивающиеся не по годам (Aur., Calc-p., Lach., Med., Merc., Verat.); очень умные и бдительные.

Эти дети живут в постоянном внутреннем конфликте между эго и честью, с одной стороны (Aur-s., Nat-m., Nux-v., Pall., Staph.), и унижением и стыдом, с другой (Ambr., Bar-c., Merc., Op.). Взрослея, они перестают заботиться о родителях, становятся дерзкими и равнодушными.

Дети, которых постоянно сравнивают с братьями и сестрами и которые из-за этого чувствуют себя смущенными своими способностями и качествами (Mag., Nat., Nux., Plat., Staph.), презираемыми (Bry., Cham., Nat., Nux.) и незначительными, учатся жить в своем собственном мире, где они чувствуют себя более комфортно и защищенно.

Эгоистичные (Calc., Lys., Med., Nux-v., Pall., Plat., Verat.) и непослушные дети.

Зависть и ревность к другим детям в семье или школе; это особенно касается любви, привязанности, знаний, общих занятий и т. д.

Играя с другими детьми, дети Sulphur обычно берут на себя инициативу (Caust., Lys., Nux-v., Plat., Sil.) и, как правило, избирательны в общении со своими друзьями.

Тело

► Клинически выделяют три «конституции»:

Толстый, упитанный и откормленный, с **красным лицом и ушами** и неопрятным видом.

Худой, тощий, но с большим животом (Bar-c., Calc., Iod., Nat-m., Sil.) и **сутулой осанкой** (Carbo-veg., Mang., Phos., Sil., Tub.); дети с глистными инвазиями, которые сидят и ходят сгорбленными, как старики.

Сморщенные (Ant-t., Apis, Merc., Op., Plb.) и растрепанные дети, которые выглядят нематыми и неприятно пахнут, даже если их только что вымыли.

Ярко-красные отверстия тела (Apis, Vac., Med., Merc.): веки, губы, рот, нос, уши, анус и уретра.

Очень чувствителен к изменениям погоды (Геп., Псор.).

Ощущение жжения, адского жжения во всем теле.

Отсутствие реакции, особенно когда внешние симптомы заболевания подавляются мазями, хирургическим вмешательством или пероральным/парентеральным введением антибиотиков.

Много пьет и мало ест.

Дети Sulphur не любят стоять (Coss., Merc.); положение стоя для них — наихудшее.

DD: Сравните Охуг с этим средством.

Другие важные симптомы

Дух

Хвастовство (Lyc., Med., Plat., Stram.).

Капризный (Ant-c., Cham., Cina, Plat., Verat-v.).

Дети, которые **всегда нетерпеливы** (Cham., Ign., Ipec., Nux-v., Sep., Sil.); не могут ждать, все должно происходить немедленно, иначе они становятся раздражительными.

Любят быть в центре внимания (Calc-s., Hyos., Ign., Mag-m., Phos., Pall., Plat., Puls., Stram., Tarent., Tub.) , **потому что им нужно много любви и признания со стороны друзей или группы.**

Дети со злым, раздражительным характером, крайне сварливые; постоянно в плохом настроении (Ars., Cham., Nux-v., Tub.).

Любовь к кошкам (Aeth., Lac-f., Lach., Tub.).

Любит коллекционировать и копить вещи, независимо от того, насколько они старые, изношенные или бесполезные (Ars.).

Любит читать книги о цивилизации, культуре, истории и философии (Aur., Nat-c., Stram., Tub.).

Неудержимое желание трогать вещи и класть всё в рот (Calc., Merc.).

Постоянно грызет ногти и другие вещи.

Всегда активен, всегда занят тем или этим.

Критический.

Страх купания или мытья; страх призраков по ночам; страх высоких мест.
Высокомерный.

Клептомания.

Люблю играть в шахматы и головоломки или играть в футбол и крикет на открытом воздухе.

Дети-манипуляторы (Puls., Sil., Staph., Tarent., Tub.) , которые льстят и угождают, чтобы достичь своих целей.

Самоосуждение (Aug., Lac-c., Naja, Nux-v.); недостаток уверенности в себе.

Истерики: топает ногами и катается по полу, когда злится.

Склонность раздражать и игнорировать других детей; очень злобный (Anac., Cham., Cina, Nux-v.).

Очень деструктивны в отношении своих игрушек и одежды, любят ломать вещи

Заламывание рук (Kali-p., Phos., Psor., Stram., Tarent.).

ГОЛОВА

Волосы ломкие, сухие, **спутанные** (Borx., Lyc., Med., Petr.), **тусклые** (Med., Psor., Thuj.) и трудно расчесываются (Thuj.).

Чувствительность к прикосновению (Bell., Chin., Gels., Mez., Nux-v., Sil.).

Головные боли, вызванные перенапряжением во время учебы, подавленной - секрецией (например, простудой), подавленной сыпью и мытьем волос (длинные волосы у молодых девушек).

Мигрень, которой предшествует сонливость с потливостью головы.

Результаты теста:

Зарывает голову в подушку (Apis, Bell., Hell., Med., Stram., Tub.) при менингите, мигренях и истериках.

Горячая голова (Apis, Bell., Glon., Lach., Phos.).

Знак Кернига++ (Bell., Hell., Op., Stram., Zinc.).

Открытые роднички (Calc., Calc-p., Sil.).

Вращение головой (Bell., Stram., Tarent., Tub.).

КТ: кровоизлияние в мозг.

Экзематозные высыпания на коже головы и по линии роста волос с желтыми, зловонными выделениями, которые высыхают, образуя корки и чешуйки.

При ходьбе голова наклонена вперед.

Гидроцефалия.

Опоясывающий лишай головы.

Морщит лоб, когда болит голова.

ГЛАЗА

Сухость глаз в помещении (Puls.) **с выделением едких слез на открытом воздухе** (Calc.).

Воспаление глаз у маленьких детей после простуды (Arg-met., Calc., Dulc., Euphr., Merc., Puls., Thuj.).

Веки опухшие, жгучие и зудящие (Pulse.), **хуже при промывании глаз** (в отличие от Pulse.).

Рецидивирующая неонатальная офтальмия (Apis, Arg-n., Ars., Calc., Nit-ac., Puls., Thuja.) **с обильными, гнойными, густыми желтыми выделениями** (Arg-n., Euphr., Kali-bi., Puls., Sil.) **и опухшими веками.**

Слипание век по утрам (Arg-n., Graph., Med., Rhus-t.).

Плохое зрение при чтении или головные боли.

Частое желание тереть глаза.

Куриная слепота из-за недоедания.

Болезненное воспаление глаз, вызванное инородным телом в глазу (Кокк).

Светобоязнь.

Покраснение и заложенность глаз, усиливающиеся по утрам.

Ретинит из-за перенапряжения глаз.

Результаты теста:

Экзема с сухостью и образованием корок на веках.

Ресницы выпадают.

Заворот век (энтропион).

Непроизвольное закрывание глаз (Caust., Chinin-s., Con.).

Свищ слезного протока.

Кровоизлияние в сетчатку (Bell., Crot-h., Lach., Phos.).

Косоглазие.

Ячмень и халязион.

Запавшие глаза с синими кругами.

Трахома.

Подергивание век.

УШИ

Катар евстахиевой трубы (Asar., Calc., Ferr-p., Kali-s., Puls.).

Обильные, разъедающие (Ars-i., Calc-p., Hep., Merc.), **кровянистые** (Calc-s., Merc., Psor., Sil.), **зловонные** (Aur., Cist., Lyc., Merc., Psor., Sil.) **и гнойные** (Calc-s., Kali-bi., Merc., Puls., Sil.) **выделения; возникают периодически каждые 7 дней, ухудшаются от подавления высыпаний** (Aur-s., Mez.) **или вакцинации** (Sil.).

Катаральная глухота от сморкания.

Хронический средний отит, особенно левого уха.

Зуд в ушах, особенно в левом.

Результаты теста:

Красные уши (Agar., Apis, Chin., Puls.).

Экзематозные высыпания и фурункулы за ушами.

Затвердение или перфорация барабанной перепонки (Tub.).

Полипы уха.

Нос

Хронический сухой катар с образованием корок, легко кровоточит при удалении (Arg-n., Kali-bi., Nit-ac.).

Носовые кровотечения по утрам, при сморкании и кашле.

Зуд и жжение в ноздрах.

Заложенность носа, особенно в теплом помещении, лучше на открытом воздухе.

Сильное, приступообразное чихание с едкими водянистыми выделениями.

• Результаты теста:

Аденоиды (Agra., Spig., Staph., Thuj.) и полипы.

Постоянно ковыряет пальцем в носу (Арум-т., Китай).

Веерные движения ноздрей (Ant-t., Brom., iod., Lyc., Phos., Spong.).

Опухший нос с ярко-красным кончиком (Aur., Kali-c., Lach., Rhus-t.).

Густые, желтые, гнойные, зловонные, едкие выделения из носа, вызывающие раздражение губ.

Язвы в носу.

Лицо

Свинка.

Результаты теста:

Щеки попеременно красные и бледные (Acon., Ferr., Lac-c.) ИЛИ **одна щека красная, а другая бледная** (Cham., Ipec., Mosch., Nux-v., Puls.).

Старо выглядит (Arg-n., Calc., Nat-m., Op.).

Очень красные, сухие и потрескавшиеся губы (Apis, Arum-t., Bell., Merc., Rhus-t.).

Черные точки и веснушки на лице, особенно вокруг носа.

Твердая, болезненная припухлость железы.

Увеличение околоушных и подчелюстных желез со склонностью к образованию абсцессов.

Подергивание или дрожание губ.

Рот

Повышенное слюноотделение, особенно во время лихорадки и сна.

Зловонное или **кислое** дыхание (Eup-per., Graph., Nux-v., Verat.) по утрам.

Затрудненное прорезывание зубов.

Болезненность полости рта у грудных детей.

Результаты теста:

Афты у маленьких детей (Bry., Merc., Nux-v., Sul-ac.) не хотят сосать из-за боли.

Постоянно стискивает зубы (Bell., Hyos., Stram.).

Сухой, коричневый или **белый язык с красным кончиком и красными краями** (Rumx., Verat.).

Кладет в рот пальцы (Calc., Cham., Ipec., Sacch.) и **все, что попадает ему под руку.**

Попеременное выдвигание и западание языка у детей с гидроцефалией.

Свищ в области зубов.

Десны опухают, легко кровоточат и отступают.

Скрежетание зубами

Цинга.

Дрозд.

ШЕЯ

Боль в горле от холодных напитков (Lyc., Sabad., Syph.).

Склонность к нагноению или очень медленное выздоровление после ангины или дифтерии (Bar-c., Bar-m., Нер., Merc.).

Хроническая боль в горле с постоянным покашливанием и отхаркиванием.

Опухание миндалин с болью, отдающей в уши при глотании.

Результаты теста:

Удлиненные суппозитории (Bar-m., Crot-t., Hyos., Kali-i., Lach., Phos.).

Уплотнение желез вокруг шеи, напоминающее **нить жемчуга** (Bar-i., Bar-m., Calc-i., Tub.).

Кривошея.

ЖЕЛУДОК

Отрыжка после еды (Arg-n., Carbo-veg., Ferr., Nat-m., Puls.) **или при надавливании на желудок.**

Расстройство пищеварения, вызванное молоком (Aeth., Chin., Mag-m., Nit-ac.) или жирной пищей (Carbo-veg., Chin., Kali-m., Ptel., Puls.).

Рвота кислым, свернувшимся молоком сразу после кормления грудью (Ant-c., Calc., Ipс., Mag-c., Nat-m., Sil.).

Скопление слюны во рту после еды.

Пищеварение, по-видимому, начинается медленно.

Удушье и рвота при кашле.

Кислая или зловонная отрыжка.

Ненасытный аппетит, особенно около 11 часов (йод, лактоза, натрий, цинк).

Обострение: **хлеб** (Bry, Puls), **масло** (Carbo-veg., Puls.), капуста, крупы, яйца, **выпечка** (Ant-c., Lyc., Puls.), горох, перец и сахар.

Отвращение: **вареные яйца** (Bry.), хлеб, жир, рыба, **грюйер и острый сыр** (Нер., Merc., Nit-ac.), **курица** (Bac., Nat-m.), кофе, мясо, **молоко** (Lac- d., Nat-m., Staph.), **оливки**, сырая пища, клубника, сладости.

Пристрастия: шоколад, кофе, **огурцы** (Ant-c., Ant-t., Phos., Verat.), яйца, выпечка, **жир** (Calc-p., Nit-ac.), фрукты, **чеснок** (Agar., Phos., Thu.), мясо, **выпечка** (Calc., Puls., Sacch.), соленья, соль, специи, **сладости** (Arg-met., Aur-s., Chin., Lyc.), помидоры и **овощи** (Kali-i., Mag-c., Mag-m.).

ЖИВОТ

Булькающие и урчащие звуки перед дефекацией (Aloe, Crot-t., Gamb., Olnd., Podo.).

Хроническая или рецидивирующая желтуха (Aur., Chel., iod., Phos.).

Сжимающие боли у младенцев рано утром (Caust., Dios., Nux-v.), **а также до, во время и после дефекации** (Aloe, Am-c., Op., Podo.).

Хронический рецидивирующий аппендицит (Kali-c., Sul-i.).

Хронический язвенный колит.

Коликообразные боли со вздутием живота после еды (особенно сладкого) или питья молока, ребенок сворачивается калачиком.

Инвагинация.

Синдром раздраженного кишечника.

Задержанное газообразование вследствие запора.

Портальная гипертензия.

Результаты теста:

Абсцесс брюшной стенки (Hep., Rhus-t., Sil.), который не заживает.

Печень и селезенка увеличены и пальпируются (подбородок).

Зловонный пот на животе (Ambr., Anac., Arg-met., Cocc., Phos., Sei.) и в паху (Ambr., Sep., Thuj.).

Ультразвуковая картина: **кальцификация брыжеечных желез** (Aug., Calc., iod.).

Растяжение поперечно-ободочной кишки.

Паховая грыжа, воспаленная и ущемленная.

Паралитическая непроходимость кишечника.

Перитонит.

Язвы вокруг пупка.

ПРЯМАЯ КИШКА

Запор у новорожденных вследствие застоя в системе воротной вены (Med., Nux-v., Op.); даже дефекация мягким стулом требует усилий, и стул постоянно отстывает.

Понос после острого заболевания, например, простуды (Dulc., Nux-m.), во время прорезывания зубов, из-за **молока** (Calc., Lys., Mag-c., Mag-m., Nat-c., Sep., Sil.) и из-за **подавления высыпаний** (Bry., Hep., Lys., Psor., Urt-u.).

Утренняя диарея (просыпается с позывами на стул) (Aloe, Cench., Graph., Lys., Tub.), которая протекает безболезненно и может иметь разную природу.

Непереносимость лактозы у детей младшего возраста и младенцев (Calc., Lys., Mag-c., Mag-m., Nat-c.).

Диарея, чередующаяся с запорами.

Непроизвольная дефекация при чихании, смехе или метеоризме.

Выделение очень зловонных газов с запахом тухлых яиц.

Сладострастный зуд в анальной области, особенно ночью в постели; растирание этой области до появления болезненных ощущений.

Результаты теста:

Выпадение прямой кишки во время и после **дефекации** (Aesc., Merc., Nit-ac., Podo.).

Покраснение и изъязвление вокруг **ануса** (Cham., Sil.).

Анализ кала: **очень высокое содержание жира** (Caust., Iris, Phos.) (признаки синдрома мальабсорбции), **глисты** (Cina) (аскариды, - острицы, членики ленточных червей, острицы).

Абсцесс.

Кровянистые выделения из ануса после расчесывания.

Образование трещин или свищей.

Геморрой, внутренний и внешний, который легко воспаляется или кровоточит.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Непроизвольное мочеиспускание ночью, когда больному снится, что он мочится (Kreos., Ph-ac., Sep.).

Задержка мочи из-за холода (Acon., Caust., Dulc., Puls.) или после подавления высыпаний (Ars., Calc., Camph., Con.).

Моча едкая (Med., Merc.), содержит белок, мутная (Apis, Canth., Chin., Cina, Graph., Merc., Phos., Sep.) и имеет неприятный запах; оставляет белый или меловой осадок в подгузнике.

Ювенильный сахарный диабет (Caps., Lyc., Tarent.).

Нефротический синдром (Apis, Apoc., Merc.).

Результаты теста:

Красное и воспаленное отверстие уретры с чувственным зудом (Hep., Led.).

Ультразвуковое изображение: камни.

Моча: Альбумин +, низкий удельный вес, гиалиновые цилиндры +, гной ++, эритроциты +, сахар ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Склонность к мастурбации.

Сладострастный зуд, особенно от тепла постели ночью.

Результаты теста:

Гениталии кажутся ледяными (Agn., Dios., Gels., Lyc.).

Гидроцеле (Puls., Rhod., Sil.).

Фимоз с красной крайней плотью (Merc., Nit-ac.).

Отёчное опухание полового члена.

Болезненность в области мошонки из-за едкого, зловонного пота.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Зуд в области лобка и вульвы.

Результаты теста:

Обильный, зловонный пот из половых органов.

Острицы и язвы в области влагалища.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Постоянное прочищение горла (Ant-t., Brom., Nux-v., Phos., Rumx.).

Сужение или спазмы гортани ; усиливаются от гнева, плача и засыпания.

ДЫХАНИЕ

Астма, вызванная подавлением кожных высыпаний (Ars., Carbo-veg., Dulc., Ipec., Psor.) **или чередованием с кожными высыпаниями** (Crot-t., Hep., Psor.).

Хочет, чтобы во время приступа астмы были открыты двери и окна (Am-c., Bry., Carbo-veg., Ipec., Lach., Puls., Tub.).

Учащенное или затрудненное дыхание в положении лежа.

Желание дышать глубоко.

Чувствую себя лучше, если ослабить или снять одежду.

Результат теста:

- Хриплое дыхание, лучше после отхаркивания.

КАШЕЛЬ

Обильная, зеленоватая (Calc-sil., Carbo-veg., Kali-i., Merc., Nat-s., Puls.), гнойная и зловонная мокрота.

Кашель, особенно ночью, как только ребенок погружается в глубокий сон (Lach., Lyc.).

Сухой кашель ночью, влажный в течение дня (Arg-met., Hep., Lys., Puls.).

Кровянистая мокрота.

Кашель после кори.

Кашель в положении лежа на левом боку, лучше в положении лежа на правом боку.

Кашель обычно заканчивается чиханием (Agar., Bell., Carbo-veg., Squil.).

Раздражение гортани обычно вызывает спазматический приступ кашля.

Коклюш.

Результат теста:

- **Держит голову руками при кашле** (Bry., Nicc., Nux-v.).

Грудь

Острая пневмония (Carbo-veg., Kali-c., Lys., Tub.).

Хриплая мокрота в груди при кашле.

Спазмы в груди при кашле.

Результаты теста:

Рентгенограмма грудной клетки: затемнение нижней **доли левого легкого** (Хел., Нац.).

Плевральный выпот (Ant-ar., Ars.).

Ателектаз.

Эмпиема.

Запах чеснока из подмышек.

Гидроторакс.

Первичный комплекс.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

• Результаты теста:

Перикардит с выпотом (Ars., Psor., Spig.).

Гипертрофия сердца.

Пульс утром быстрее, чем вечером.

НАЗАД

Потливость шейного отдела во время сна (Calc., Chin., Ph-ac.).

Слабость в поясничной области (Calc); постоянная потребность **наклоняться** (Chel.).

Сползает вниз, когда садится, из-за слабости и утомления.

Скованность шеи.

Результаты теста:

Гнойное воспаление шейных желез (Bar-c., Hep., Merc., Sil.).

Ходит согнувшись из-за боли и искривления позвоночника (Calc-f., Merc-c., Phos., Sil.).

Абсцесс с образованием свища.

Пустулы на шее.

Мышцы шеи слабые и истощенные; не может держать голову вертикально.

Позвонки становятся мягкими (уменьшается твердость костей).

Расщелина позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

Жгучая боль в ладонях и подошвах по ночам (Lach.); хочется их раскрыть (Cham., Med., Puls.).

Судороги в икрах и подошвах ног, особенно по ночам (Calc., Cham., Gels., Lyc., Nux-v., Sil.).

Из-за неуклюжести роняет вещи.

Ювенильный ревматоидный артрит.

Спонтанный вывих бедра.

Напряжение и сокращение подколенных сухожилий.

Пожимание рук при письме.

Результаты теста:

Артритические узелки (Apis, Calc-f., Led., Lyc.) суставов пальцев рук и ног, как при синдроме Стилла.

Постоянное движение ног, даже в положении лёжа (Caust.).

Эпилептические судороги, начинающиеся в руках.

Ледяной холод (Camph., Lach., Phos., Verat.) или сильный жар (Cham., Led., Puls., Sep., Staph.) рук и ног.

Покраснение, опухание и скованность суставов (Cocc., Kali-bi., Rhus-t.).

Абсцессы со свищами суставов.

Трещины и сколы между пальцами.

Отёчность и скованность коленных и голеностопных суставов.

Экзематозные высыпания на сгибательных поверхностях суставов.

Заусенцы и вросшие ногти на ногах.

Нарушение координации ног при беге.

Лежа с расставленными конечностями.

Остеомиелит.

Толстая кожа с мозолями и болезненными натоптышами на ладонях и ступнях.

Туберкулез коленных и тазобедренных суставов.

Белые пятна на ногтях.

СПАТЬ

Достаточно короткого сна (Fl-ac., Nux-v.), он оказывает освежающее действие.

Кошмары, снятся в положении лёжа на спине (Cadm-s., Mang-s., Nicc-s.).

Лунатизм (Bry., Cycl., Nat-m., Op., Phos., Zinc.).

Во время сна: глаза полуоткрыты, слюнотечение (Lyc., Merc., Puls., Rhus-t.), дрожание и подергивание мышц ног (Arg-n., Phos.), нытье, крики, вздохи и громкий разговор (особенно обо всем, что он прочитал или узнал).

Не могу спать с 2 до 5 утра.

Не могу заснуть из-за тепла постели; постоянно ищу прохладное место.

Спит на спине, заложив руки за голову.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Жалобы, связанные с: прорезыванием зубов, корью.

Нагревать:

Жар в голове и лице при холодных руках и ногах (Sep., Stram.).

Локализованное покраснение щек (Bell., Chin., Sep.).

Желание раскрыться, когда лихорадит.

• Пот:

- Холодный пот с резким сернистым запахом.

Ремиттирующая или постоянная перемежающаяся лихорадка у маленьких детей (Calc., Op., Sep.).

Септическая лихорадка.

КОЖА

Сыпь, чередующаяся с другими жалобами (например, астмой) (Ars., Psor.).

Сыпь: фурункулы, ветряная оспа, экзема, герпес, корь и т. д.; с острым зудом, особенно ночью из-за тепла постели (Ant-c., Lyc., Merc., Psor.); зловонные выделения и образование корок.

Любая, даже самая маленькая рана, вызывает нарыв.

Результаты теста:

Болезненные участки у детей младшего возраста и младенцев (Calc., Cham., Chin., Lyc., Med., Sep.).

Избыточный рост волос у детей (Carc., Nat-m., Sep., Thu.).

Чесотка (Ars., Carbo-veg., Kali-s., Psor., Sep.).

Потрескавшаяся, сухая, шелушащаяся, нездоровая кожа.

Экхимотические пятна.

Опрелость.

Невусы.

Судороги

Жалобы или ухудшение от: **гнева** (Calc., Cham., Cupr., Nux-v.); кашля; сна; **подавления высыпаний** (Bry., Camph., Cupr., Ipec., Stram., Zinc.) или когда высыпания не появляются.

Во время судорог: поджатые большие пальцы рук; глубокий сон; подергивания и произвольные движения, **начинающиеся в руках** или с левой стороны и распространяющиеся на правую.

После судорог: глубокий, почти коматозный сон и истощение.

Общий

Все жалобы **усиливаются ночью и от тепла постели** (Apis, Cham., Merc., Op., Puls.).

Отвращение к мытью или купанию (Am-c., Ant-c., Psor., Sep.).

Ребенок чувствует себя очень **неудобно в положении стоя** (копчик, пульс, перегородка); постоянно наклоняется, когда стоит, или предпочитает сидеть.

Выделения едкие, кровянистые, **зловонные** (Bapt., Kreos., Lach., Nat-c., Nit-ac.), вызывают **жжение** (Ars., Gels., Kali-i., Merc., Nit-ac.), **зуд и болезненность**.

Потеря веса, несмотря на ненасытный аппетит (кальций, цин, йод, натр-м).

Все оказывает влияние на эпигастрий (Kali-c., Mag-p.).

Аллергия на аллопатические лекарства, особенно на антибиотики.

Последствия вакцинации: оторрея и гнойничковые высыпания.

Походка: с опущенными плечами.

Когда тщательно подобранные средства не дают результата, особенно при острых заболеваниях (Carc., Mosch., Op., Tub.).

Раны заживают медленно или нагнаиваются; старые, зажившие раны открываются вновь.

SULPHUR IODATUM

(Йодистая сера - Sul-i.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Чувствительность ко всему (Canth., Kali-p., Mag-p.).

Тело

Маразм у детей с повышенным аппетитом (кальций, йод, натр.).

В личном или семейном анамнезе **туберкулез** (Bac., Carc., Kali-c., Phos., Tub.).

Подходит для детей Sulph, которые также нервны, беспокойны и истощены, с ослабленной жизненной силой.

Дети с хроническими заболеваниями кожи, не поддающимися лечению явно показанными средствами (Carbo-veg., Carc., Psor., Sulph., Tub.).

Другие важные симптомы

Дух

Не может сосредоточиться во время учебы (Aeth., Hell., Nux-v.).

Страх любого **физического напряжения** (Calc-sil., Guaj., Mez., Ph-ac., Phos.), своего рода лень, являющаяся результатом компонента Sulphur.

Легкое вздрагивание при пробуждении (Bell., Bry., Kali-c., Lach., Pall.) .

Ходит быстро, как будто всегда **торопится** (Arg-n., Sul-ac., Tarent.).

Спутанность сознания с отвлечением внимания при чтении.

Ленивый; отвращение к любым домашним делам.

Голова

Менингеальная головная боль; лучше от **холодных компрессов** (Bell, Stram, Zinc) и на холодном воздухе (Glon., Puls., Seneg.).

Туберкулезное воспаление мозговых оболочек.

Результаты теста:

Голова кажется большой по сравнению с телом (Calc., Calc-p., Sil.).
весы.

Экзематозные высыпания на коже головы, часто сопровождающиеся зудом.

Роднички остаются открытыми слишком долго.

Знак Кернига +.

Колыбельная.

Потливость кожи головы.

ГЛАЗА

Катаральное воспаление глаз вследствие простуды.

Разрывается на холодном воздухе.

Результаты теста:

Расширенные зрачки (Белл, Гелес, Хелл, Хайос, Страм).

Запавшие глаза (Ant-t., Chin., Sec., Spig.).

Спайки век.

Выпученные, пристально глядящие глаза.

Покраснение конъюнктивы.

УШИ

Нарушение слуха из-за увеличенных миндалин (Aur., Kali-bi., Merc., Staph.).

Ощущение, будто я заблокирован.

Результаты теста:

Перфорация барабанной перепонки (Calc-i., Kali-bi., Sil., Sulph., Tub.).

Воспаление евстахиевой трубы.

Зудящие высыпания в ушном канале (Merc., Psor., Sulph.).

Гнойная, зловонная оторрея.

Красные уши, холодные на ощупь (Chin., Kali-c., Merc., Nit-ac., Psor.).

НОС

Нисходящая простуда (All-c., Bry., Ipec., Merc., Nux-v.).

Хроническая простуда, особенно на открытом воздухе (Dulc., Kali-bi., Nit-ac., Puls.).

Чихание, особенно вечером (Iod., Puls., Sulph.).

Густой, зеленый, болезненный нос при кашле.

Результаты теста:

Постоянно ковыряет в носу пальцами (Arum-t., Cina, Sil., Zinc.).

Раздувание ноздрей, особенно при пневмонии у маленьких детей (Ant-t., Kreos., Lyc., Phos., Sulph.).

Кончик или крылья носа красные и опухшие (Aur., Calc., Kali-c., Sulph.).

ЛИЦО

• Результаты теста:

Ограниченная краснота щек (Chin., Ferr. Lyc., Phos., Sulph., Tub.) **с красным подбородком** (Canth., Colch., Merc., Nat-m., Zinc.) **и губами** (Apis, Bell., Lach., Sulph., Tub.).

Грязный, старческий на вид (Arg-n., Ars., Calc., Iod., Lyc., Merc., Sulph.), **бледный, болезненный и осунувшийся**.

Потливость лица во время кормления (Ign., Kali-p., Nat-m., Sulph.).

Розовые угри или пустулезные высыпания, особенно вокруг губ (Borx., Caps., Hydr., Psor.).

Веснушки.

Опухание и уплотнение околоушных и подчелюстных желез.

Подергивание.

РОТ

Затрудненное прорезывание зубов.

Зубная боль после еды.

Результаты теста:

Язык: Трешиноватая поверхность с **красным кончиком** (Ars., Lach., Nit-ac., Rhus-t., Sulph.), **красными** краями (Ars., Chel., Merc., Sulph.) и **желтым** основанием (Merc., Merc-if., Nat-p., Nat-s., Nux-v.).

Абсцессы корней зубов (Bar-c., Hecla., Hep., Lys., Merc., Sil.).

Афтозные язвы и молочница.

Кариозные зубы.

Скрежетание зубами.

Десны отделились от зубов, опухли, кровоточили, образовались язвы.

Неприятный запах изо рта.

Болезненность полости рта у грудных детей.

Заикание.

ШЕЯ

Хроническая гипертрофия небных миндалин (Bar-c., Bar-m., Calc., Lac-c., Sil., Tub.).

Глотание **жидкостей** затруднено (Cic., Iod., Lach., Lyss., Stram.).

Сухость в горле, постоянная потребность сглатывать.

Боль в горле при глотании или кашле.

Болезненность по утрам после пробуждения.

Результаты теста:

Удлиненный и опухший язычок.

Зоб.

Опухшие, твердые, болезненные шейные лимфоузлы, похожие на нить жемчуга (Bar-i., Bar-m., Calc-i., Iod., Merc., Sil., Sulph., Tub.).

ЖЕЛУДОК

Ест мало, но пьет много (Calc., Colch., Ferr., Kali-n., Phos., Sulph.).

Голодный, но тем не менее истощенный (Calc., Cina, Iod., Nat-m., Sulph.); у ребенка ненасытный аппетит, он хватается любую пищу, как будто голодает.

Удушье и рвота при кашле (Carbo-veg., Cina., Cос-c., Dros., Hep.).

Иккинг.

Рвота после еды и питья, особенно молока.

Не любит: мясо.

Пристрастия: **лимонад** (Bell., Nit-ac., Ptel., Puls.), соленья и **кислые продукты** (Acon., Cor-r., Hep., Puls., Verat.).

ЖИВОТ

Хронический **аппендицит** (Kali-c., Merc-d., Plb., Pyrog., Sil., Sulph.).

Режущие, щемящие боли в области пупка во время дефекации (Dulc., Iod., Phos.).

Боль в животе после еды.

• Результаты теста:

Уплотненные, опухшие, болезненные брыжеечные (Bar-c., Bar-m., Calc., Lys., Nat-s.) и паховые лимфатические узлы (Dulc., Hep., Tub.).
Увеличенные, твердые, болезненные селезенка и печень.
Живот в форме барабана, тонкие ноги и руки.

ПРЯМАЯ КИШКА

Диарея у истощенных детей с волчьим голодом (Calc., Calc-p., Iod., Rheum., Sil., Sul-ac.), **улучшение после еды** (Brom., Chel., Hep., Iod., Lys., Nicc., Petr.).

Стул: гнилостный, пенистый, сероватый, безболезненный, блестящий, водянистый, желтый; хуже после **молока** (Calc., Mag-m., Nat-c., Sep.) ИЛИ обильный, **сухой, черный** (Bry., Nat-m., Nit-ac., Op., Plb.), зловонный и болезненный; страх дефекации из-за боли (Graph., Nit-ac., Nux-v., Rat., Sil.).

Жжение в заднем проходе после дефекации.

Какашки повсюду.

Зуд в прямой кишке.

Результаты теста:

Покраснение вокруг ануса (Aloe, Med., Nat-m., Petr., Sulph., Zing.).
Черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Непроизвольное мочеиспускание повсюду (Arg-met., Caust., Chin., Kali-p., Lys., Staph.).

Хронический пиелонефрит с альбуминурией (Apis, Merc-c., Rhus-t., Ter.).

Зловонная моча, иногда с запахом малины.

Результаты теста:

- Красный осадок в подгузнике.
Уретральный клапан.
Анализ мочи: Альбумин ++.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Туберкулез семенных канатиков и яичек.

Результаты теста:

Гидроцеле у детей младшего возраста (Abrot., Ars., Aur., Calc., Calc-s., Graph., Puls., Rhod., Sil., Sulph.).
Трещины крайней плоти.
Пот мошонки с неприятным запахом (Thuj.).
Опухшие и твердые яички, висят низко.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Охриплость по утрам (Calc., Caust., Phos., Sulph.).

Щекотание и першение в гортани с постоянным прочищением горла.

Слабый или гнусавый голос (Caust., Kali-bi., Lach., Phos., Staph.).

Результаты теста:

Воспаление гортани .
Laryngismus stridulus (Bell., Gels., Ign., Mosch., Op.).
Туберкулез гортани (Caust., Iod., Mang., Spong., Stann.).

ДЫХАНИЕ

Астма, вызванная сеном (Ars-i., Carbo-veg., Iod., Lach., Nat-s., Nux-v., Sabad., Sil.).

Одышка, особенно при подъеме; хуже ночью и от любого волнения (Calc-ar., Ipec., Merc., Nat-m., Nit-ac.).

Результаты теста:

Хрипы (Ars., Carbo-veg., Ipec., Kali-c.).

Нерегулярное дыхание (Bell., Cupr., Dig., Op.).

КАШЕЛЬ

Удушье от кашля (Alum., Cос-c., Ipec., Kali-c., Nux-v., Puls.).

Сухой, отрывистый, спазматический, изнуряющий кашель; хуже от **разговора** (Dros., Rumx., Sanic.), в положении лежа ночью (Caust., Hyos., Puls., Rumx.); лучше только когда ребенка выносят на **свежий воздух** (Brom., Bry., Cос-c., Iod., Kali-s., Mag-p., Puls.) и после отхаркивания.

приходится сидеть (Ant-t., Bry., Con., Kali-bi., Phos., Puls., Sep.).

Мокрота густая, зловонная, гнойная или кровянистая.

Грудь

Отсроченная пневмония (Lyc., Sil., Sulph.).

Боль в боках при кашле.

Заболевания клапанов сердца.

Результаты теста:

Частое хриплое состояние слизи в груди.

Шумы.

Плевральный выпот (Ars., Ars-i., Nat-m., Sil., Sulph.).

Первичный комплекс.

Увеличение подмышечных желез.

КОНЕЧНОСТИ

Холодный пот на ладонях (Acon., Cham., Tub.).

Жгучая или ноющая боль в подошвах ног при стоянии.

Холодные ноги ночью в постели (Aur., Calc., Ferr., Sil., Zinc.).

Результаты теста:

Артритические узелки в суставах пальцев рук.

Отёчность стоп и коленных суставов.

Вросшие ногти на ногах.

Болезненные, чувствительные мозоли (Ant-c., Calc-s., Nit-ac., Sulph.).

СПАТЬ

Короткие интервалы сна (Camph., Rhus-t., See., Sulph.) с открытым ртом.

Бессонница ночью и сонливость днем.

Беспокойный сон с частыми пробуждениями от кошмаров (Lyc., Stram., Sulph., Zinc.).

КОЖА

Обильный, кислый пот во время сна (Graph., Hep., Merc., Sulph.).

Крапивница с сильным зудом и жжением.

Результаты теста:

Веснушки (Lyc., Phos., Sep., Sulph.).

Мокнувшие, экзематозные высыпания.

Папилломы (Calc., Caust., Graph., Lyc., Nit-ac., Staph., Thuja.).

Общий

Быстро **истощается при малейшем усилии** (Ars., Lach., Nat-c., Phos., Rhus-t., Tub.), хуже после поноса (Ars, Chin, Nat-s, Phos, Podo., Verat.), голода (Crot-h., Iod., Phos., Sulph., Zinc.) и потоотделения (Camph., Chin., Merc.).

Потеря веса у детей младшего возраста, несмотря на пристрастия к еде (Calc., Cina, Iod., Nat-m., Sulph.).

Большинство жалоб **усиливаются ночью** (Ars., Lach., Merc., Sulph.), в **сырую погоду** (Am-c., Ars., Calc., Dulc., Nat-s., Puls., Rhod., Rhus-t.) и **от любого тепла** (летом, на тёплом воздухе, в тёплой комнате, тёплой постели, от тёплого укутывания). **Улучшение на открытом воздухе, на холоде или свежем воздухе** (Apis, Arg-n., Iod., Kali-s., Puls., Sec.).

Симптомы сильнее всего проявляются на правой стороне тела.

Твердые, уплотненные, узловатые железы, имеющие тенденцию к раку.

Отсутствие реакции.

Известно, что это средство ускоряет рассасывание экссудатов (Ant-t., Ars., Kali-i., Lyc., Phos., Sulph.).

СИФИЛИН

(Нозод сифилиса - Syph.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Антисоциальное поведение (Anac., Aur., Cupr., Hyos., Nat-c.); совершенные лжецы (Morph., Op., Verat.).

Обсессивно-компульсивные расстройства (Arg-n., Ars., Cupr., Iod., Kali-c., Nat-m., Nux-v., Sulph., Tub.), такие как постоянное мытье рук, частая смена одежды и т. д.

Непослушные, **непослушные** дети (Chin., Merc., Sacch., Tarentum, Tub., Verat.).

Постоянный, беспричинный плач у новорожденных (Cham., Hyos., Ign., Kali-c., Puls., Thuj.).

Тело

Очень **худой** (Abrot., Iod., Nat-m., Stann., Tub.).

Задержка развития (Bar-c., Calc., Calc-p., Phos., Sil.); замедленные этапы развития.

Внешность: Лысая голова; кариес зубов; деформированные ногти (Graph., Sil., Thuj.); толстый живот; потрескавшийся язык; плоский, широкий нос; выступающий лоб (Bell., Cupr., Hell.); открытые роднички (Calc., Calc-p., Merc., Sil., Sulph.); запавшие глаза; толстые, пухлые губы (Bufo, Op., Plat., Zinc.).

Врожденные пороки развития (Agar., Bufo., Caust., Hell., Med., Merc., Op.).

► Внезапные необъяснимые выкидыши в анамнезе матери.

Отсутствие реакции (Am-c., Hell., Laur., Op., Sulph., Tub.).

Другие важные симптомы

Дух

Антисоциальное поведение (Anac., Aur., Cupr., Hyos., Nat-c.); очень **хорошие лжецы** (Morph., Op., Verat.).

Постоянное мытье рук (Lac-d., Med., Merc., Nat-sil., Sulph.) из-за страха заразных болезней (Borx., Calc., Lach., Sulph.).

Беспричинный, постоянный плач у новорожденных (Cham., Hyos., Ign., Kali-c., Puls., Thuj.).

Трудности с концентрацией внимания при обучении или расчетах; приводит к необходимости **многократно все проверять** (Arg-n., Ars., Brom., Carc., Iod., Nat-m.); особенно слабы в математике (Alum., Aur., Merc., Nat-c., Ph-ac., Psor., Rhus-t.).

Буйные и непослушные дети (Merc., Sacch., Tarent., Tub., Verat.). Крики и визги при малейшем гневе; бьют кулаком стену или головой о стену (Bell., Hyos., Med., Nat-c., Tub.).

Плохая кратковременная память; плохая память на места, имена, лица, даты и т. д.; хорошая долговременная память (Bell., Elaps., Hyos.).

Отвращение к обществу.

Кусание ногтей (Bar-c., Carc., Med., Sacch.).

Экстравагантный; склонен тратить деньги впустую.

Страх кошек (Bac., Med., Tub.) и змей (Elaps, Lac-c., Lac-f., Lach.).

Симулируйте болезни (Bell., Ign., Op., Puls., Tarent., Verat.).

Высокомерный; чувствует себя великой личностью (Agar., Cupr., Lach., Plat., Verat.).

Ипохондрия (Ars., Ign., Mag-m., Nux-v., Puls., Sulph.).

Равнодушие к членам семьи и близким (Hell., Phos., Sep.).

Клептомания.

Закрывает.

Страх сцены.

Часто впадает в отчаяние при малейшей провокации.

ГОЛОВА

Детские мигрени, не поддающиеся лечению (Nat-m., Sil., Sulph., Tub.); **сильные, пульсирующие и пульсирующие боли** (Bell., Gels., Glon., Nat-m., Sang.) со светобоязнью (Ferr-p., Kali-p., Nat-s.).

Невыносимая боль; бьется головой о стену (Ars., Bell., Stram.).

Мигрени, **начинающиеся на закате и длящиеся до восхода солнца** (Hep., Merc.).

Боль распространяется вдоль позвоночника, **тянет голову назад** (Arg-n., Cic., Hell., Nux-v., Op., Stram.).

Солнечный удар (Aml-n., Bell., Glon., Nat-c., Ther.).

Результаты теста:

Врожденная алопеция (Bar-c., Fl-ac., Graph., Nat-m., Phos., Sil., Zinc.).

Врожденный глиоматоз (Bar-c., Bell., Plb.).

Открытые роднички (Calc., Calc-p., Merc., Sil., Sulph.).

Аневризма ягодиц в головном мозге.

Врожденная церебральная атрофия.

Врожденный порок развития головного мозга, например, синдром Денди-

Уокера.

Сыпь, имеющая грязный вид (Psor., Sulph., Thu.).

Раннее поседение волос; волосы выпадают клоچьями.

Выступающий лоб.

Гидроцефалия.

Большая голова (Calc., Calc-p., Merc., Sil.).

Болезненные экзостозы (Aur., Kali-i., Merc.).

Морщинистый лоб (Cham., Hell., Lyc., Nux-v., Stram.).

ГЛАЗА

Хроническое **рецидивирующее фликтенулезное** (везикулярное) **воспаление** по краю конъюнктивы, распространяющееся на **роговицу** (Calc., Merc., Sulph., Thuj.) и приводящее к изъязвлениям.

Ранняя **миопия** (Agar., Phos., Phys., Puls.) у детей младшего возраста.

Боль в глазах усиливается **ночью** (Merc., Merc-s., Zinc.), уменьшается от промывания глаз **холодной водой** (Apis, Aur., Form., Phos., Puls.).

Слипание глаз по ночам (Alum., Graph., Lys., Sep.).

Хронический пустулезный конъюнктивит (Apis, Calc., Graph., Puls., Sulph.) с гнойным отделяемым.

Обильные, едкие, ранящие слезы.

Вертикальная диплопия (Cic., Kali-bi., Stram.); видит одно изображение ниже другого.

Результаты теста:

Острая офтальмия новорожденных (Apis, Arg-n., Ars., Nit-ac., Puls., Thuj.).

Атрофия зрительного нерва.

Врожденное сходящееся косоглазие (Camph., Cic., Cina, Cycl., Lys., Op.).

Корковая слепота (Merc., Sil., Stram.).

«Сонный вид» из-за опущенных век (Caust., Gels., Graph.).

Врожденная катаракта.

Язвы роговицы.

Выпадение бровей, выпадение ресниц.

Синдром Фостера-Кеннеди.

Синдром Горнера.

Воспаление с выраженным покраснением краев век.

Интерстициальный кератит.

Ирит.

птоз; Паралич верхней косой мышцы (Caust., Gels., Rhus-t., Spig.).

Отек верхних век.

УШИ

Хронический средний отит.

Хронические изъязвления в местах перфорации (Kali-m., Lach., Med., Stann.).

Нарушение слуха или глухота без видимых причин.

Невралгии, заставляющие ребенка просыпаться с криком (Cham., Ferr-p.).

Результаты теста:

Чрезвычайная чувствительность сосцевидного отростка (Caps.).

Полная глухота (Caust., Hep., Lys., Sulph.).

Образование абсцессов или пустул в среднем ухе.

Тест Бера положительный.

Отложения кальция на барабанной перепонке (Calc-f.).

Катаральная глухота (Calc., Kali-m., Kali-s., Puls., Sil.).

Паралич VI черепного нерва (отводящего нерва).

Тест Ринне: костная проводимость сильнее воздушной.

Водянистая, гнойная, очень зловонная оторея (Kali-bi., Kali-s., Merc., Psor., Sil.).

Нос

Частые простуды (Merc., Nit-ac., Nux-v., Puls.).

Сухость слизистых оболочек носа с хронической заложенностью по ночам (Am-c., Ferr-i., Lys., Mag-c., Nux-v.).

Океана с густыми, желтовато-зелеными, зловонными выделениями.

Шмыгание носом у новорожденных (Dulc., Lys., Merc., Nux-v., Puls., Samb.).

Склонность к рецидивирующим носовым кровотечениям (Ferr., Ferr-p., Sil.).

Результаты теста:

Хронический **ретроназальный катар** (Hep., Kali-bi., Nat-c., Nat-m., Sep.) с образованием корок или шелушения в задних носовых полостях (Bar-c., Bufo, Calc-ar., Sep.).

Широкий и плоский нос.

Коричневатое или желтоватое пятно, похожее на седло, на переносице (Lys., Op., Sanic., Sep., Sulph.).

Кариес носовых костей (Asaf., Aur., Hecla, Phos., Sil.).

Перфорированная носовая перегородка (Alum., Kali-bi., Kali-i., Merc., Sil.).

Лицо

Односторонний паралич лица с затруднением речи (Dulc.).

• Результаты теста:

Дети, которые **выглядят старыми и сморщенными** (Calc., Nat-m., Op., Sep.).

Врожденная асимметричная деформация лица.

Трещины в углах рта с утолщением губ (Bufo, Mez., Op.).

Экзема с образованием корок, особенно на подбородке (Graph., Merc-ir.).

Лицо краснеет при головной боли (Bell., Glon., Mill., Op.).

Уплотненная припухлость подчелюстных желез.

РОТ

Обильное слюноотечение ночью, особенно во время сна (Bar-c., Lys., Merc., Puls., Rhus-t.).

Выпадение зубов (Borx., Calc-f., Lach., Plb., Sil.) из-за постоянного сжимания челюстей.

Затрудненное прорезывание зубов.

Задержка речи.

Результаты теста:

Расщелина неба.

Грязно-белый налет на языке с **двумя глубокими продольными трещинами**, идущими параллельно средней линии.

Губчатый географический язык с **четкими отпечатками зубов** (Chel., Merc., Rhus-t., Sep.).

Зубы: деформированные, атрофированные, неровные; зубы Гетчинсона; быстро разрушаются, особенно у корней и краев десен (Am-c., Fl-ac., Merc., Mez., Sil., Thuja.).

Афазия с высыванием языка (Crot-h., Lach., Plb., Stram.).

Скрежетание зубами.

Неприятный запах изо рта.

Ранула (Ambr., Calc., Nat-m., Thuj.).

Отек и изъязвление языка, неба и слизистых оболочек полости рта с отслоением, кровотечением и жировой основой.

Толстые губы (Bufo, соч., плат.).

Язвенный стоматит.

Шея

Острый, болезненный фарингит.

Хроническая гипертрофия небных миндалин (Bar-c., Calc-i., Tub.).

Боль в горле после холодных напитков (Lyc., Sabad.); обычно распространяющаяся с правой стороны на левую (Bell., Merc-if.).

Результаты теста:

Твердые, пальпируемые шейные железы.

Трахеопищеводный свищ (Phos., Sil.).

ЖЕЛУДОК

Атрезия желчных протоков (Nat-s.).

Никакая пища его не привлекает и не удовлетворяет (Ant-c., Nux-v.).

Повышенный аппетит с головной болью (Phos., Sep.).

Неутолимая жажда большого количества воды.

Стойкая неонатальная желтуха.

Рвота при кашле (Bry., Ipec.).

Отвращение: мясо (Chin., Nux-v.).

Результат теста:

- Врожденный гипертрофический пилоростеноз.

ЖИВОТ

• Результаты теста:

Абсцесс в паховой области.

Врожденный мегаколон.

ПРЯМАЯ КИШКА

Постоянные запоры, кошмар для всей семьи; **иногда стул отсутствует неделями** (Bry., Coll., Nat-m., Nux-v., Plb.).

Безболезненный понос, особенно **ночью** (Chin., Puls., Verat.) и в ранние - утренние часы.

Едкий, желтоватый или оранжевый стул (Colch., Lach., Sul-ac.).

Зуд в заднем проходе.

Постоянная диарея.

Боль в прямой кишке во время дефекации.

Результаты теста:

Неперфорированный анус (врожденный порок развития, аноректальная атрезия).

Образование абсцесса или изъязвления в прямой кишке.

Трещины в заднем проходе и прямой кишке (Mur-ac., Thuj.).

Влажные выделения из прямой кишки (Nit-ac., Sulph.).

Выпадение прямой кишки (Aloe, Podo.).

Полипы прямой кишки (Kali-br., Phos.).

Стриктура или трещина слизистой оболочки прямой кишки (Calc-sil., Ruta).

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Ребенок мочится редко (Canth., Merc.), возможно, только один раз в 24 часа, но выделение мочи обильное.

Обильное мочеиспускание после стадии озноба при лихорадке (мед.).

Ребенку следует дожидаться, пока моча начнет выделяться (Lys., Sep.); ее легче вывести стоя (Caust., Sars.).

Врожденный порок развития почек.

Пенистая и жгучая моча.

Нефротический синдром.

Ночной энурез (Caust., Puls.).

Результат теста:

- Синдром Альпорта.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

• Результаты теста:

Воспаление яичек и семенных канатиков (Spong.).

Врожденное гидроцеле (Puls.).

Гениталии ребенка все еще находятся в стадии полового созревания.

Фимоз (Merc., Nit-ac.).

Неопущение яичек (крипторхизм) (Клем., Род.).

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Обильные, разъедающие, зловонные и желтоватые бели у молодых девушек, особенно по ночам.

Крайняя чувствительность гениталий к прикосновению.

Зуд, вызванный белями (Calc., Kreos., Sep.).

Рецидивирующий вульвовагинит.

Результаты теста:

- Candida albicans ++.
- Трихомонадный вагинит.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Рецидивирующая афония.

Результат теста:

- Трахеомаляция.

ДЫХАНИЕ

Астматическое дыхание **летом** (Arg-n.), в **сырую погоду** (Aur., Chin.) и особенно **перед грозами и во время них** (Sep., Sil.); лучше в горных районах.

Хроническая астма, чередующаяся с сыпью.

Затрудненное дыхание ночью, особенно с 1 до 4 часов утра (Кали-би., Кали-ч.).

Результаты теста:

Ясные хрипы с обеих сторон легких.

Задыхаюсь.

КАШЕЛЬ

Кашель усиливается **зимой и весной** (Cina, Gels., Verat.).

Не может лежать на правом боку из-за кашля (Cina, Merc., Phos., Spong., Stann.); **лучше в положении лежа** (Am-c., Calc., Med., Phos.).

Сухой, сильный, сотрясающий кашель, усиливающийся после обеда (Coss., Ipec.) и ночью, будит ребенка; облегчается после восхода солнца (Agar., Coss.).

Коклюш с гнойной мокротой.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Дефекты сердечных клапанов.

Грудь

Результаты теста:

Ricketomyces rosary (Calc., Merc., Sil.).

Воспаление реберного хряща (Арн.).

Куриная грудка.

Назад

Ревматические боли в спине от заката до восхода солнца (Nat-m., Nit-ac.) и особенно после мочеиспускания (Caust.).

Аутоиммунные заболевания, коллагенозы.

Ревматоидный артрит.

Результаты теста:

Искривление шейного и спинного отделов (кальцин., фос.);
кифосколиоз .

Увеличенные шейные лимфоузлы (бар-м., кальцин., йод., сил.).

Шейное ребро.

Менингомиоцеле (Белл, Гелес, Оп).

Расщелина позвоночника (Calc, Calc-s, Psor, Sil).

Туберкулез позвонков (Aur., Calc-p., iod., Phos., Tub.).

КОНЕЧНОСТИ

Боли в костях и ревматические жалобы усиливаются ночью (Kali-i., Phyt.).

Желание, чтобы руки были постоянно прикрыты (Игн.).

Скованность суставов пальцев.

Результаты теста:

Искривление и сгибание длинных трубчатых костей (Calc., Calc-p., Лус., Sil.).

Остеосаркома.

Болезненность большеберцовой кости (Lach., Rhus-t.).

Врожденный вывих бедра (Calc., Caust., Thuj.).

Сокращение мышц и сухожилий конечностей, особенно мышц-сгибателей верхних конечностей.

Поврежденные ногти, с нарушением кровообращения.

Истощение конечностей.

Экзостоз.

Руки холодные и влажные.
Перкуссия костей болезненна.
Абсцесс поясничной мышцы.
Дополнительные пальцы на руках или ногах.

КОЖА

Рецидивирующее образование абсцессов (Arn., Pyrog., Sulph., Tub.).

Результаты теста:

- Тонкая как бумага кожа (натур.м.).
Рожа.
Опрелость.
Бородавки.

СПАТЬ

Бессонница у младенцев, которые плачут без видимой причины (Кофф.).

Общий

Периодические ухудшения **каждое второе полнолуние**.

Холодные ванны улучшают состояние (Apis, Aur-m., Calc-s., Nat-m., Puls.).

Истощение и задержка роста у детей (Abrot., Calc., Nat-m., Sil.).

Невыносимая боль, которая постепенно появляется и исчезает (Nat-m., Plat., Stann.).

Медленное, непрерывное движение облегчает почти все жалобы (железные, магнитные, пульсовые, серные).

Ребенок полностью здоров при пребывании в горах и на **высокогорном воздухе** (Туб.).

Дети, в семейном анамнезе которых есть случаи алкоголизма, инсульта, хронической депрессии, психических заболеваний, сифилиса, заболеваний сердечных клапанов и т. д.

Дети, имеющие в анамнезе рецидивирующие абсцессы, фурункулы или тонзиллиты.

Влажная погода обычно ухудшает состояние (Rhus-t.).

Зловонный пот.

Опухание и затвердение желез.

Склонность к заболеваниям костей, таким как экзостозы, остеомиелит, остеокластома, остеосаркома, остеохондрит и периостит.

Слабость по утрам после пробуждения.

TARENTULA HISPANICA

(Испанский паук, тарантул — Tarentum.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Тип **бойкого пройдохи**, чертика из табакерки: Невероятная скорость; внезапно вскакивает; не может усидеть на месте ни секунды (Hyos., Merc., Rhus-t.); внезапные порывы.

Они хотят привлечь к себе внимание (Calc., Hyos., Ign., Mag.-m., Plat., Puls., Stram., Tub.); они делают это, потому что чувствуют себя брошенными и обделенными вниманием, когда их родители слишком заняты работой или спорами.

симулировать любую болезнь (Bell., Plb., Puls., Verat.).

Полный активности и неиссякаемой энергии, как неутомимый конь; невероятное изобилие энергии.

Незаконнорожденный ребенок, мать которого страдала от безответной любви (Hyos., Ign., Nat-m., Staph.).

Суетливый (Sulph., Stram., Zinc.), все хватает и вынужден к этому прикасаться.

Умный (Lach., Med., Nux-v., Sacch.) и разрушительный (Carc., Tub.).

Тело

Танцы улучшают (Игн, Сен).

Питается неперевариваемыми материалами, такими как песок, зола, мел, сырой картофель и т. д.

Постоянно хочет пить большое количество холодной воды (Ars., Bry., Phos., Verat.).

Особенно упорные запоры, при которых не помогают даже клизмы и слабительные (Calc., Nux-v., Op.).

Очень чувствительные кончики пальцев (Lac-c., Staph., Sulph.).

Быстрые движения.

Другие важные симптомы

Дух

Недомогания от: **гнева**, плохих новостей, наказания или выговора, **эмоционального возбуждения**, чрезмерной радости, горя.

Они реагируют очень резко и грубо (Calc., Hep., Nux-v., Puls.). Они могут даже оскорблять и причинять боль собственным родителям (Lyc., Plat., Tub.).

Отвращение к обществу, страх остаться в одиночестве (Con., Nat-m., Sep.).

Отвращение к свету; **любят темноту** (Aur., Bry., Phos.).

Очень активные, энергичные и беспокойные дети, постоянно бегающие, прыгающие и пинающие (Bell., Hyos., Nux-v., Stram.).

Хитрые и лживые (Lach., Nux-v., Op., Sacch.) дети; **очень манипулятивные натуры** (Puls., Sulph., Thuj., Tub.).

Возбуждение при прослушивании музыки, пении и танцах (Aur., Carc., Croc., Nat-sil.).

Непроизвольный и чрезмерный смех по пустякам (Cann-i., Ign.).

Злобный, ненавидящий и мстительный по отношению к тем, кто его обидел (Aur-m., Nat-m., Sulph.).

Бесстыжие дети с желанием раздеться и остаться голыми (Hyos., Phos., Verat.).

Внезапная смена настроения: **безразличие, грусть или крик, чередующиеся с веселостью и смехом** (Androc., Stram.).

Приступы ярости (Bell., Cham., Cina, Hyos., Nux-v., Tub.); катается по полу из стороны в сторону (Ars., Calc., Op., Sulph.) и бьет себя руками по голове (Ars., Bell., Hyos., Stram., Tub.) или бьется ею о стену в гневе (Bell., Mill., Tub.); тащит за волосы (Bell., Cupr., Med., Tub.).

У таких детей часто очень развито чувство **цвета : они испытывают либо отвращение , либо влечение к темным** (Ign., Lach., Nux-v., Sep.) или интенсивным цветам, таким как **черный** (Ign.), синий, красный, желтый и зеленый.

Угрожать родителям и родственникам (Hep., Stram., Tub.).

Сильный гнев от противоречия и **прикосновения** (Ant-c., Cham., Cina, Iod.), с желанием нападать или драться.

Отсутствие моральных принципов (Bell., Hyos., Stram., Verat.); большие лжецы со склонностью к клептомании; тайно крадут деньги.

Грызть ногти.

Ясновидение.

Бунтарское поведение; вызывающее, противоположное.

Непослушный и разрушительный (Bell., Stram., Tub.), имеет тенденцию рвать вещи, особенно одежду, в гневе или когда его вечные прихоти не удовлетворяются.

Из-за неуклюжести роняет вещи.

Страх пауков и монстров.

Симулирует болезнь.

Любят быть постоянно активными и занятыми, даже если из этого ничего не получается (Апис, Лил-т.).

Люблю головоломки и игры, требующие мышления и интеллекта.

Мономания.

Эгоистичный и жадный.

Очень импульсивные и торопливые дети, ходят очень быстро (Arg-n., Sul-ac.).

Постоянно заламывает руки (Asar., Kali-p., Phos., Stram., Sulph.); совершает непроизвольные движения, как будто вяжет или хватает что-то; постоянно играет пальцами (Calc., Mur-ac.).

ГОЛОВА

Постоянно хочет, чтобы его волосы **расчесывали** или **дергали** , а голову **массировали** и **терли** (Bell., Cupr., Med., Tub.).

Зарывает голову в подушку (Apis, Bell., Hell., Med., Stram., Tub.).

Головная боль от расстройства пищеварения (Ant-c., Bry., Ipec., Nux-v., Puls., Sulph.).

• Результаты теста:

дергает, вращает или **мотаает** головой (Agar, Cupr., Hyos., Stram.).

Потливость головы при кашле (Ant-c., Calc., Ipec., Merc., Sil.).

Горячая голова с красным лицом (Aeth., Bry., Mag-c., Nat-c., Plb.).

Покачивание головой из стороны в сторону для облегчения боли (Agar., Cina, Med.).

ГЛАЗА

Утром веки склеены.

Светобоязнь с головной болью; не может держать глаза открытыми (Nux-v., Ph-ac.).

Пристальный взгляд при прослушивании музыки.

Результаты теста:

- Вирусный конъюнктивит ++.

Помутнение роговицы.

Вращательные движения глазного яблока (Agar., Bufo, Cupr., Stram., Zinc.).

УШИ

в ушах при **сверлении их пальцами** (Anac., Ruta, Sep.).

Результаты теста:

Обильные **коричневатые выделения** из ушей (Anac., Kali-s., Nit-ac., Psor.).

Красные уши (Apis, Chin., Puls.).

НОС

Насморк из правой ноздри (Ars., Calc-s., Sang.).

Носовое кровотечение темной, черной кровью со сгустками, особенно из **левой ноздри** (Ferr., Kali-n., Sep.), при умывании лица (Am-c., Arn., Calc-s., Kali-c.).

Результаты теста:

- Постоянное ковыряние **пальцами в носу** (Arum-t., Cina, Sil., Zinc.).

ЛИЦО

• Результаты теста:

Выраженные носогубные складки (Cina, Phos., Stram.).

Постоянное оттягивание губ (Arum-t., Bry., Lach., Nit-ac., Nux-v., Stram.).

Стиснутые челюсти.

Искажение рта.

Исхудание лица.

Глупое (Agar., Laur., Lyc., Stram.) или испуганное выражение лица.

Импетиго (Ant-c., Calc., Graph., Mez., Rhus-t.), особенно вокруг губ.

Потливость лица при кашле (Ipec.).

Отек и воспаление подъязычных желез.

РОТ

Медленное прорезывание зубов (Calc., Calc-p., Sil., Tub.).

Сухость языка, особенно вечером или ночью.

Пища кажется кислой или соленой (Merc., Nat-m.).

Результаты теста:

Постоянно кладет пальцы в рот (Calc., Cham., Ipec., Sacch., Sil.).

Афтозные язвы на языке.

Кровоточивость десен.

Постоянное желание стискивать зубы (Bufo, Hyos., Phyt.).

ШЕЯ

Наружная часть шеи очень чувствительна к одежде (Cench., Lach., Sep.).

Спазмы и боли в горле, отдающие в уши при глотании (Elaps, Gels., Lac-c., Nit-ac., Nux-v.).

Результаты теста:

Темно-красное или пурпурное окрашивание глотки (Ail., Lach.).

Отек и воспаление миндалин, особенно правой.

Опухание шейных желез.

ЖЕЛУДОК

Отсутствие жажды или **неутолимая жажда большого количества воды** (Ars., Bry., Nat-m., Phos., Sulph.).

Тошнота, рвота и боли в желудке после еды (Nux-v., Phos.); лучше после отхождения газов и отрыжки.

Рвота желчью по утрам.

Удушье и рвота при кашле.

Расстройство пищеварения после горя или гнева (Cham., Ign.).

Волчий голод, особенно ночью (Chin., Pos., Psor.).

Медленное пищеварение.

Отвращение: хлеб, **шоколад** (китайский, сах.), какао, мясо.

Пристрастия: Холодные напитки, острая пища (Hep., Puls.), **неперевариваемые продукты** (например, **пепел**, мел, глина, земля, **песок**, стилос и т. д.) (Lach., Sil.), лимон, сырая пища (Lycps-v., Mag-s., Sulph.), соленая пища.

ЖИВОТ

Боль в животе распространяется в пах, особенно при кашле, уменьшается при свертывании калачиком (Coloc., Kali-c., Puls.).

Инвагинация (Ars., Bell., Op., Plb., Verat.).

Задержанные газы (Aur., Chin., Nit-ac., Puls.).

Результаты теста:

Асцит.

Увеличенная печень.

Увеличение паховых желез.

ПРЯМАЯ КИШКА

Паралич прямой кишки (Mur-ac., Plb., Sil.).

Сильный запор, не облегчающийся слабительными средствами или клизмами; **стул долгое время остается в прямой кишке без позывов** (Bry., Nat-m., Nux-v., Plb., Sulph.).

Стул: **черный** (Coll., Merc., Op., Plb., Verat.), зловонный и **маслянистый** (Caust., Iod., Iris, Phos.).

Кровотечение из заднего прохода во время дефекации.

Стул изначально твердый, затем становится водянистым и жидким.

Результаты теста:

Кал: **Жир ++** (едкие вещества, йод, фосфор), эритроциты ++.

Колоноскопия: врожденный мегаколон.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Непроизвольное мочеиспускание вследствие запора (Lyc.).

Задерживает мочу; может выделять ее только в одиночестве (Ambr., Hep., Lyc., Nat-m.) или когда слышит шум текущей воды или музыку (Lyss., Zinc.).

Подавление выделения мочи вследствие травмы позвоночника (Arn.).

Цистит или гломерулонефрит с постоянным, неэффективным мочеиспусканием, с выделением темно-красной или коричневой мочи (Benz-ac., Chin., Merc.), которая очень агрессивна (Apis, Bapt., Carbo-veg., Dulc., Nit-ac., Sep.).

Непроизвольное мочеиспускание при ходьбе, кашле, чихании или смехе.

Результаты теста:

- Обильный красный осадок в подгузнике (Canth., Lyc., Merc-c., Nat-m., Sep.).

Моча: Альбумин +, Эритроциты ++ (Bufo), Сахар ++ (Heln., Lyc., Plb.).

Камни в мочевом пузыре.

Уретральный клапан.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Склонность к мастурбации (Hyos., Lach., Merc., Phos.).

Результаты теста:

Опухоль яичка (Aug.).

Гангренозная инфекция полового члена вследствие парафимоза (Ars., Lach., Merc.).

Вялая мошонка.

Яички сращены с мошонкой, очень чувствительны к прикосновению.

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Чрезвычайная чувствительность гениталий (Lyss., Plat., Staph.).

Зуд и сухость вульвы.

Мастурбация у маленьких девочек (Hyos., Lach., Merc., Phos.).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Сухость, раздражение и першение в гортани и трахее постоянно побуждают ребенка прочищать горло (Brom., Phos., Rumx.).

Охриплость голоса в течение дня, особенно при пробуждении утром (Iod., Par.).

Laryngismus stridulus.

ДЫХАНИЕ

Затрудненное дыхание в положении сидя или **лежа**, особенно на **левом боку** (Apis, Kali-c., Puls., Spig.).

Хрипы ночью и рано утром в 5 часов (Кали-и).

Хрипы при физической нагрузке.

КАШЕЛЬ

Кашель от **шума** (Arn., Ph-ac.) и от **волнения** (Cham., Op., Spong.), с позывами на рвоту и рвотой.

Кашель при пробуждении утром из-за раздражения или першения в гортани. Спастический, удушающий, приступообразный и обычно изнуряющий кашель, особенно **ночью** (Caust., Hyos., Puls.).

Грудь

Область сердца чувствительна к давлению одежды (Caust., Lach., Merc.).

Результаты теста:

Образование абсцесса в подмышечной впадине.

Бронхиальное дыхание.

Рентгенограмма органов грудной клетки: терминальная стадия туберкулеза легких с образованием каверн.

Задыхаюсь.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Ревматические боли в сердце или заболевания сердечных клапанов с затруднением дыхания (Adon., Laur., Lycps-v.).

Ревматический эндокардит (Aur., Kalm., Lach., Phos.).

Результаты теста:

Пульс: малый и медленный или частый, слабый и прерывистый.

Систолические и диастолические шумы (железистые, тошнотворные, острые).

НАЗАД

Болезненная **чувствительность позвоночника; прикосновение вызывает боль** в груди и области сердца (Agar., Хинин-с., Цинк.).

Результат теста:

- Искривление позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

Эффективное средство при различных видах наследственной атаксии (атаксия Фридрейха, мозжечковая атаксия) и хореи (хорея Сиденгама).

Судорожные и хореатические движения конечностей (Agar., Caust., Mygal.).

Беспокойство нижних конечностей, особенно ночью в постели (Caust., Rhus-t.); лучше от движения (Ars., Rhus-t.) и прослушивания музыки.

Шатающаяся походка; бежит лучше, чем ходит (Bufo, Nat-m, Stram).

Слабые ноги (Cocc., Nat-s., Nux-v., Plb., Rhus-t.); не может ступать устойчиво ; кажется, что они не подчиняются его воле.

Рассеянный склероз.

Потливость ладоней и стоп.

Полезно при травмах тазобедренного сустава.

Результаты теста:

- Абсцесс.

Синие ногти.

Сокращение мышц и сухожилий нижних конечностей и пальцев.

Беспокойные, суетливые руки и пальцы, которым постоянно приходится что-то теревить.

КОЖА

Нездоровая кожа с глубокими болезненными нарывами, фурункулами и язвами - синюшного оттенка (Tarent-c.), которые часто вызывают сильное жжение (Anthraci., Ars., Pyrog., Tarent-c.).

Абсцессы, возникающие вследствие укусов насекомых.

Результаты теста:

- Сливающиеся прыщи (Cic., Ph-ac.).

Экзема.

Импетиго.

Пигментные пятна.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Холодные ноги при лихорадке (Arn., Lach., Stram., Sulph.).

Насморк или сухой кашель с сильной сонливостью (Bapt., Nux-m.) в случае лихорадки.

Полезно при менингитной лихорадке.

СПАТЬ

Хочет часто менять постель из-за постоянного беспокойства (Cina, Hyos., Lach.).

Сны о преследовании дикими зверями (Lac-leo., Nux-v., Sil., Sulph.).

Из-за волнения не мог заснуть до полуночи.

Бессонница или легкое пробуждение от малейшего шума.

СУДОРОГИ

Жалобы, вызванные: глубоким сном (Nux-v., Op.), возбуждением (Hyos., Op.), испугом (Calc., Hyos., Ign., Kali-br., Op.), **давлением на позвоночник** и видом посторонних людей (Lyss., Nux-v., Op.).

Во время судорог: прикусывание языка, **засовывание головы** в подушку, - стискивание зубов, искривление рта, скрежетание зубами, **ледяной холод тела** (Camph., Hell., Oena., Verat.), непроизвольная дефекация, сардоническая улыбка, вращение или подергивание головы, косоглазие или **вращательные движения глазных яблок**, ступор или потеря сознания.

Судороги, подергивания или хореатические движения, особенно правой стороны тела (Bell., Lys., Nux-v.).

Эпилептиформные или клонические судороги, возникающие периодически (Bufo, Cedr., Chion., Cupr., Stram.), обычно каждые 15–20 дней.

ОБЩИЙ

Зябкость, но желание свежего воздуха (Camph., Puls., Tub.).

Потеря веса из-за гиперактивности (операция, хирургическое вмешательство).

Отсутствие реакции (Am-c., Carbo-veg., Gels., Hell., Op., Sulph., Tub.).

Правосторонние жалобы (Apis, Crot-c., Lys., Nux-v.).

Дискомфорт, вызванный мастурбацией.

Коллапс с ледяным холодом тела (Camph., Verat.).

Жалобы, которые часто усиливаются и ослабевают в зависимости от луны (Clem., Phel.).

Желание лечь в темноте.

Твердые и уплотненные железистые опухоли.

Нетерпимость к одежде.

Неврологические жалобы с онемением по всему телу при прикосновении.

Сепсис.

Дрожание тела при переживании таких чувств, как шок или радость.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ TARENTUM, BELLUM, STRAM., TUBA и VERA.

спутать с такими препаратами, как Bell, Stram, Tub и Verat, поскольку у них много схожих симптомов. Я часто путал их в рецептах. Следующие симптомы являются общими для всех препаратов:

Оскорбительный.

Ломает вещи.

Хорея.

Разрушительность.

Эпилепсия.

Носовые кровотечения.

Сильная жажда.

Страх остаться в одиночестве.

Наглость.

Сильный и жестокий гнев.

Злобный и сварливый.

Патологическое желание бежать.

Мятежный, упрямый.

Светобоязнь.

Беспокойный.

Бесстыдно.

Удушающий кашель.

Сильный гнев при нанесении ударов.

Отсутствие морального чувства.

ЦИНК МЕТАЛЛИКУМ		Тарентул	
Различия:			
Немного истощён. Беспокойство в ногах.		• Повышение уровня энергии при насилии. • Беспокойство во всем теле.	
Распространенные симптомы:			
Запор. Малейшее прикосновение к спине вызывает рефлекторное раздражение межреберных мышц. Тонкий.			

ФОСФОР		Тарентул	
Различия:			
• На него влияют внешние события. • Онемение кончиков пальцев.		• В основном определяется внутренними приводами. • Покалывание в кончиках пальцев.	

ФОСФОР	Тарентул
Распространенные симптомы:	
Истощение. Головная боль, усиливающаяся от шума, света, прикосновения. Повышенное сексуальное влечение. Любовь к сырой пище. Чувствительность к холоду. Облегчение при растирании пораженной части тела.	

Йод	Тарентул
Различия:	
Ребенок боится людей и поэтому всех избегает. Ребенок не так физически беспокоен, как Tarentum, а наоборот, быстрее истощается, у него наблюдается обильное потоотделение. Более выражены атрофия и уплотнение желез. Пациенту жарко, но он желает находиться в более прохладной среде. Потеря вещества, несмотря на тягу. Не такой уж конкурентный и лживый. Сексуальное желание не такое сильное, как в Таренте.	Ребенок избегает общества, но хочет, чтобы кто-то был рядом. Очень беспокойный ребенок, как физически, так и психически. Характерны истерические и нервные симптомы. Холодный пациент. Потеря веса происходит не из-за отсутствия аппетита, а из-за быстрого насыщения. Очень конкурентоспособные и хитрые дети, которые используют любые возможные средства, чтобы не дать другим их обогнать. Раннее и сильное сексуальное влечение.
Распространенные симптомы:	
• Большинство жалоб облегчаются на открытом воздухе.	

Альбом Arsenicum	Тарентул
Различия:	
Тревожность и беспокойство возникают из-за внутренней неуверенности и имеют скорее эмоциональную подоплеку. Очень требовательный, но часто и довольно зависимый.	Беспокойство из-за перевозбуждения ЦНС. Не такой уж и зависимый. Говорите очень быстро и отвечайте быстро и резко. Вам нужно всего лишь 2–3 часа сна каждую ночь. Они ходят очень быстро, не могут никого ждать и легко раздражаются, если другие дети перед ними медлят. Угрожать родителям, братьям и сестрам и может отреагировать агрессивно. Очень конкурентоспособный (Nux-v.).
Распространенные симптомы:	
• Потеря веса.	

Нукс Вомика	Тарентул
Различия:	
• Ребенку необходимо много стимуляторов, таких как чай и кофе, чтобы поддерживать свой ритм жизни.	
Распространенные симптомы:	
• Высокий уровень энергии. • Настойчивые и требовательные дети, движимые чувством соперничества.	

Наблюдения за детьми, которым необходимо средство от пауков

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ ОТ ПАУКОВ

Дух

Сильное **чувство покинутости** характерно для многих средств, связанных с пауками. Оно может проявляться психологически, например, в виде дискомфорта, вызванного неразделённой любовью (Tarent.), бреда о присутствии посторонних в комнате (Tarent.) или снов о смерти родственников (Aran-ix.).

Руки и пальцы постоянно находятся в движении. Дети любят играть с верёвками, девочки любят вязать.

Детям нравится играть с красками, маркерами и т. д. Они **любят темные или насыщенные цвета**, такие как черный, красный, зеленый и т. д.

Умные и лживые. Они знают, как добиться желаемого, потому что являются мастерами манипуляции.

Полон энергии. Окружающие удивляются, откуда берётся столько энергии.

подражайте родителям, учителям, школьным друзьям, уличным торговцам и т. д.

Сильное чувство **ритма в музыке** (дети-ауры обычно предпочитают религиозную и симфоническую музыку, в то время как дети-нат-к наслаждаются романтической музыкой).

Придумывают истории, чтобы выразить свое воображение или обмануть кого-то (например, «морские байки» можно сравнить с прядущейся паутиной).

Бред и слуховые иллюзии; речь кажется отстранённой. В данном случае рубрика указывает на то, что голос самого любимого человека звучит где-то вдалеке. Однако собственный голос может казаться нереальным — своего рода отчуждённостью.

Любят симулировать болезнь, сетовать и преувеличивать симптомы.

Умственно отсталый.

Требуется много внимания.

Беспокойство приводит к спешке и нетерпению.

Сильное желание прикоснуться к вещам.

Устраивают истерики, ведут себя очень агрессивно и разрушительно.

Вас интересуют компьютерные игры, такие как Game Boy и Nintendo.

Полезное средство при таких состояниях, как синдром дефицита внимания и дислексия.

Маленькие дети любят, когда родители носят их на спине.

Общий

Холодно.

Предпочитает есть жидкую пищу, а не твердую.

Выраженные туберкулезные признаки.

Склонны злоупотреблять наркотиками в детстве и курить в очень раннем возрасте; сильная склонность к сексу и порнографии в очень раннем возрасте.

Эпилепсия, хорea и различные другие формы дискинезий.

Сильное беспокойство во всем теле, особенно в руках, ногах и голове.

Многие виды пауков застывают и цепенеют, когда им угрожает опасность или они подвергаются воздействию солнечного света; аналогично, ребенок, нуждающийся в средстве от пауков, может не любить солнце и чувствовать себя более комфортно в темноте.

Плохой аппетит или другие расстройства пищевого поведения.

Сильное желание фруктов и молока.

Склонность к простудам и развитию фебрильных судорог.

Склонность к истощению (за исключением Agar-ix., довольно тучного).

Склонность к истерии и бессилию.

Подергивания и судороги мышц, особенно во время сна.

Дети с чрезмерным ростом волос (как у пауков, которые обычно покрыты волосками).

Голова

Менингит.

Спать

Сны: о полётах; длительные путешествия в поисках умерших родителей, родственников, друзей или знакомых. В этом отношении препараты, связанные с пауками, очень похожи на Convo-d. и Rhus-g. (Сны о полётах также могут быть связаны с интересом ребёнка к НЛО.)

СРЕДСТВА ОТ ПАУКОВ В СРАВНЕНИИ С РОДСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Детей, которым необходимо средство от пауков, можно легко спутать с: - детьми-арс. из-за их страхов.

Фос. детей, из-за их повышенной возбудимости.

Цинк. у детей, из-за физического беспокойства.

TEUCRIUM MARUM VERUM

(Кошачья мята - Дорого.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Симптомы этого средства очень напоминают Cina и Santin.

Тяжелые туберкулезные миазмы.

Крайне чувствительный и раздражительный. Возбужденный и нервный из-за лихорадки;

Очень раздражительный, с головными болями; очень разговорчивый.

Чувствительный, особенно в период полового созревания, с непреодолимым желанием петь; поёт произвольно. Болтливый, говорит и говорит. Чувствительный и суетливый.

Волнение после услышанных ужасных историй.

Бледное лицо.

Фиброзные опухоли глаз, опухоли мейбомиевой железы века.

Полипы носа, полости рта и прямой кишки.

Гернси описывает хороший симптом: носовые полипы и заложенность носа на той стороне, на которой вы лежите.

Хронический катар носа, особенно левосторонний, обусловленный носовыми полипами; хронический насморк, усиливающийся на свежем воздухе; постоянные, обильные выделения образуют корки и струпья в носу, после удаления которых нос становится болезненным.

Выделения зеленоватые, комковатые или густые, жёлтые, грязноватые.

С простудой, сильным зудом в носу. Заложенность носа, усиливающаяся вечером, от чтения или громкого разговора. Постоянноековыряние в носу.

Пот на носу.

Склонен к фронтиту после каждой простуды.

Чихание из-за сильного ползания мурашек и покалывания в носу.

Хроническая инфекция среднего уха с постояннымковырянием в носу.

Все виды гельминтозов: острицы, аскариды, ленточные черви и анкилостомы. Сильный зуд в анусе или ощущение ползания мурашек в прямой кишке ночью или в постели, усиливающееся вечером и от тепла постели. Крайне беспокойный и раздражительный; трёт нос; диарея из-за гельминтоза; бессонница из-за сильного зуда в прямой кишке; зуд в прямой кишке во время или после дефекации; зуд вокруг ануса после дефекации.

Резкая потеря веса при ненасытном аппетите.

Сильная постоянная икота с отрыжкой после кормления грудью.

Паховая грыжа.

Необычный голод , мешающий спать.
Желание соли и отвращение к хлебу.
Вросшие ногти на ногах.
Большое желание свежего воздуха.

Источник

- Относится к семейству губоцветных.

Theridion curassavicum

(Оранжевый паук - Ther.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Постоянно пытается чем-то себя занять из-за **внутреннего беспокойства**, но ничего не доставляет ему удовольствия.

Возбужденная **болтливость** (Curg., Lach.); бурное состояние, напоминающее Hyos.

они изобретательны и креативны, как Агар и Мед (Тарент и Тер — единственные креативные пауки).

Очень чувствителен к шуму: даже шелест бумаги или царапание белья (Asar., Nat-c.) невыносимы.

Трудности со сравнительным методическим мышлением в школе, но высокая творческая развитость. Слабые аналитические способности по математике (лайк., псор.).

Быстро хватается за мелочи (Borgh., Sil.).

Тело

Дети теряют вес без видимых причин (Ars., Calc-p.).

Повышенная чувствительность нервов, особенно к шуму.

Увеличенные лимфатические узлы у истощенных детей.

Не излечивался с тех пор, как перенес туберкулез или имелись случаи туберкулеза у близких родственников.

Другие важные симптомы

Дух

Всем недоволен (Нер., Merc., Nat-m.).

Сильное отвращение к работе (кит., гр.).

Лень и нежелание вставать по утрам.

Неуверенность в себе (Апас., Ваг-с.).

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Головокружение уха или внутреннего уха, вызванное процессами в области мозжечка или моста.

Головокружение с **тошнотой и рвотой** (Petr., Verat.) **от малейшего движения** (Bell., Mosch.), особенно **в машине или на корабле** (Coss., Petr.), хуже при закрывании глаз (Lach., Sep.) (несмотря на большую - чувствительность к свету) и от любого шума (Asar., Nux-v.).

ГОЛОВА

Помогает от головной боли.

Мигрень у детей, усиливающаяся после дефекации (Agar., Carbn-s.).

При головной боли невозможно лежать, приходится сидеть или ходить.

ГЛАЗА

Нарушение зрения при туберкулезном менингите.

Чувствительность к свету (Bell., Chin.).

Результат теста:

- Подергивание правого века (Falco-pe., Lach.).

УШИ

Невыносимый зуд за ушами.

НОС

Хронический катар носа.

Приступы чихания (Gels., Sabad.), постоянная необходимость сморкаться (Stict., Teucr.).

Результаты теста:

Густые, желтовато-зеленые (Hydr., Kali-bi.), **зловонные выделения** (Asaf., Hep.).

Ретроназальный катар (Psor., Sep.).

ЛИЦО

Смертельная бледность при морской болезни.

РОТ

Зубы чувствительны к холодной воде (кальций, слезотечение) и резким звукам;
каждый резкий звук словно пронзает зубы.

Соленый вкус.

Результаты теста:

Прикусывает кончик языка во время сна (мед.).

Пена изо рта при охлаждении.

Рот остается непроизвольно открытым; закрыть его не может.

ЖЕЛУДОК

Постоянное желание есть и пить, но неизвестно, что именно (Bry., Chin., Ign.). **Детская булимия и расстройства пищевого поведения** весьма характерны для средств, содержащих пауков.

Тошнота и рвота **при закрывании глаз** (Lach, Tab), при движении (Ars., Kali-c.) и от шума (Coss.); лучше от питья **теплой воды**.

Сильная жажда.

Пристрастия: кислые напитки, кислые фрукты, **бананы** (Tub.) и **апельсины** (Cub., Elaps).

Результат теста:

- Чувствительность к прикосновению в эпигастрии.

ЖИВОТ

Сильная жгучая боль.

Результат теста:

- Абсцесс печени.

ПРЯМАЯ КИШКА

Диарея без колик.

Стул к концу затруднен, хотя и не твердый.

Результаты теста:

Анус выпячивается и становится болезненным, особенно в положении сидя (Lyc., Rat., Sep.).

Спастические сокращения анального сфинктера.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Частое мочеиспускание ночью, редкое днем (Vorh.).

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Результат теста:

- Сморщенная мошонка (Crot-t., Zinc.).

ДЫХАНИЕ

Склонность к вздохам, часто необходимо делать глубокие вдохи (Bru., Ign.).

КАШЕЛЬ

Сильный кашель, сопровождающийся **спазматическими подергиваниями** тела, с **наклоном головы вперед и поднятыми вверх коленями** (сравните Agar.).

Ночной кашель.

ГРУДЬ

Результаты теста:

Рентгенограмма грудной клетки показывает фиброз верхушки левого легкого.

Мелкие звуки трения (крепитация) по всему легкому.

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

• Результат теста:

- Медленный пульс.

НАЗАД

Повышенная чувствительность между позвонками (Agar.).

Будьте осторожны, сидя на стуле; **садитесь боком**, чтобы не оказывать давление на позвоночник, так как это может быть болезненно.

Раздражение спинного мозга, особенно грудного отдела позвоночника (Phos., Tell.).

Результаты теста:

КТ позвоночника показывает туберкулез позвоночника и абсцесс поясничной мышцы.

Искривление позвоночника (Асаф., Сил.) у растущих девочек.

КОНЕЧНОСТИ

• Результаты теста:

Непроизвольное движение пальцами (Calc., Mur-ac.) или заламывание рук (Asar., Kali-p.).

Зуд (Caust., Mag-c.) и узловатая припухлость ягодиц (Colo., Ph-ac.).

При кашле колени резко подтягиваются вверх.

Лежит или сидит, скрестив ноги; не может выпрямить их.

Остеомиелит костей (Dros., Tub.).

СПАТЬ

Бессонница от малейшего шума (Coff., Nux-v.).

Бессонница, несмотря на усталость (Cham., Tarent.).

КОЖА

Чувствительность к прикосновению (Lac-c., Ran-b.).

Сильный зуд.

ОБЩИЙ

Кариес или абсцессы костей (Asaf., Fl-ac.).

Размягчение костей (остеомалация) (Calc., Merc.).

Полезно при **солнечном ударе** с невыносимой головной болью, тошнотой и рвотой (Bell., Nat-m.).

Ухудшается при закрывании глаз.

Аллергический диатез.

Эпилепсия с тетанической ригидностью и тризмом.

Обмороки после малейшего усилия (Lach., Sep.), с холодным потом (Dig., Verat.).

Травмы особенно болезненны из-за повышенного нервного напряжения.

Периодичность жалоб: появляются ежегодно (Ant-t., Lach.).

Рахит.

Дрожь от слабости (Anac., Stann.).

Вода во время купания кажется слишком холодной.

ТИОЗИНАМИНА

(Производное горчичного масла - тиозин.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Стриктура слезного протока.
- ▶ Потеря слуха из-за спаек и катара среднего уха.

ТУЯ ЗАПАДНАЯ

(Древо жизни — Arbor vitae — Туй.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

- ▶ Чувство **ненависти к себе** (Lac-s., Naja.), в основном из-за подавленности, чувства заброшенности, мастурбации и сексуального насилия. См. рубрики: настроение, переменчивое; уверенность в себе, её отсутствие; самоуничтожение; бред, что её не признают; бред, что дальнейшее существование тела распадётся; бред, что она изгой; бред, что она никчёмна; нерешительность, нерешительность и т. д.
- ▶ Дети, которым давали **слишком много указаний**, особенно со стороны **чрезмерно опекающей или чрезмерно строгой матери** (Carc., Lys., Staph.). См. рубрики: Заболевания, вызванные угнетением; Бред истощения; Бред, что они больше не могут существовать; Бред, что их голова принадлежит кому-то другому; Бред, что они находятся под сильным влиянием.
- ▶ **Подавляемое чувство покинутости приводит к булимии.** См. разделы: Бред покинутости; бред потери привязанности друга; бред отсутствия друзей; бред изгоя; бред нахождения под сверхчеловеческим контролем; страх быть заброшенным.
- ▶ **Умственная и физическая отсталость.** Физическая задержка роста очевидна; эмоции довольно примитивны и лишены тонкости. В подростковом возрасте они замкнуты и сдержаны. См. категории: страх приближаться к окружающим; страх врачей; страх провалить экзамены.

Тело

- Аллергическая конституция** (Apis, Dulc.); аллергия на яблоки, кофе, красители, рыбу, чеснок, пылевых клещей, лук, аптечный жир, сахар, пшеницу, глютен и т. д.
- Дети с **множественными врожденными пороками развития**, такими как ягодичные аневризмы сосудов головного мозга, врожденная хоррея, цианотический порок сердца, неперфорированный анус, несовершенный остеогенез и открытый урахус (первичный мочевой проток).
- Лечение детей неправильно подобранными гомеопатическими средствами высокой потенции (Nit-ac., Nux-v.), особенно Sulph., привело к хронической сухой экземе, нервной возбудимости, диарее и истощению. Замедленное выздоровление после применения антибиотиков (Ars., Nit-ac.).

Другие важные симптомы

Дух

Дети **часто сознательно создают себе определенный образ, чтобы скрыть** от общества или семьи свои **чувства вины и горя** — религиозные пристрастия, сильное чувство долга, стремление угодить другим и постоянная уступчивость.

Дети, чьи **родители постоянно ссорятся**.

Дети, которые **увлечены спортом** и вкладывают в него все свои силы и энергию. Они обожают смотреть спортивные состязания по телевизору или в прямом эфире и испытывают при этом невероятную радость; это своего рода фанатизм.

Хронический гнев, очень злые дети, которые взрываются даже по мелочам - (Cham., Plat.).

Обсессивно-компульсивные расстройства, возникающие в раннем детстве; обусловленные отягощённым семейным анамнезом сикотических заболеваний. Например, необходимо расчёсывать волосы каждые несколько часов; ребёнок чрезмерно осторожен, постоянно всё проверяет; щепетилён в отношении своего имущества, граничащий с эгоизмом; навязчивое поведение при ходьбе, будь то по краю тротуара или по проезжей части; развивает странные жесты; моет руки после каждого использования и т. д.

Тяжелая умственная отсталость вследствие злоупотребления антибиотиками, вакцинации или наличия **в анамнезе у матери во время беременности инфекций, таких как токсоплазмоз, цитомегаловирус или краснуха**.

Застенчивые, робкие и застенчивые дети (Coca., Lach.), не проявляющие смелости. Спокойный характер (Ign., Ph-ac.).

Голова

Волосы сухие, тусклые, их **невозможно расчесать**.

Потливость головы **во время сна** (Calc., Sil.), имеющая **запах меда**.

Катаральные головные боли (Dulc., Ner.).

Результаты теста:

КТ: кровоизлияние в мозг, гидроцефалия.

Себорея ++.

Белые, шелушащиеся чешуйки.

Морщинистый лоб.

Глаза

Воспаление конъюнктивы, радужной оболочки, сетчатки и склеры **после вакцинации или вследствие аутоиммунных заболеваний**, таких как болезнь Крона, тиреоидит Хашимото, синдром Рейтера, ревматоидный артрит, ревматизм, язвенный колит и т. д.

Воспаление глаз, вызванное **бактериальными или вирусными инфекциями**, такими как хламидиоз, гонорея, герпес, токсоплазмоз, туберкулез и др.

Рецидивирующие ячмени с затвердением (Sep., Staph.).

Катаральное воспаление глаз (Arg-n., Asaf.).

Диплопия при чтении (Camph., Graph.).

Глаза часто слипаются по утрам (Arg-n., Med.).

Повреждение глаз (Arn., Euphr.).

Слезотечение на холодном свежем воздухе (Phos., Sulph.).

Светобоязнь.

Близорукость.

Результаты теста:

Халязион (Platan-oc., Staph.).

Синдром Фостера-Кеннеди.

Осмотр с помощью щелевой лампы: язвы роговицы, эписклерит, **иридоциклит** (Bry., Merc.-с.), ирит **с гипопионом** (Hep., Sil.), фликтенулезный конъюнктивит, **ревматический ирит** (Rhus-t., Spig.) и трахома.

Паралич левого верхнего века (Caust., Plb.).

Хемоз.

Выделения: Густая, желтая слизь (Puls., Sil.).

Эпителиома век.

Экзофтальм, вызванный опухолями за глазным яблоком.

Веки остаются полуоткрытыми (Bell., Op.).

Выпадение волос на боковой половине бровей.

Повышенное внутриглазное давление.

Паралич зрительного нерва.

Зрачки сужены или расширены.

Стафилома роговицы (Aug-m., Chel.).

Отек хряща века.

уши

Хронический средний отит с зловонными гнойными выделениями из ушей.

Результаты теста:

Постоянное сверление ушами пальцами (Mez., Psor.).

Экзема за ушами с выделением густой, липкой, зловонной субстанции (Graph.).

Отоскопия: повышенное количество ушной серы, перфорация барабанной перепонки, мягкие и легко кровоточащие полипы (Calc., Merc.).

Тональная аудиометрия: сенсорная глухота.

Тест Ринне ++.

Тест Вебера ++.

Рентгенограмма каменистой части височной кости: деструкция воздухоносных ячеек сосцевидного отростка.

Нос

Катар после кори и ветрянки.

Катар носа, распространяющийся на лобные пазухи (Kali-br., Merc.).

Простуда проходит лучше на открытом воздухе (All-c., Nux-v.).

Носовые кровотечения с лихорадкой (Bell., Sil.), вызванные полипами.

Сенная лихорадка.

Результаты теста:

Трещины на ноздрях (Caust., Merc.).

Ранообразующие, зеленовато-гнойные, зловонные выделения, образующие кровянистые корки или чешуйки, которые трудно удалить. Язвы в носу (Aur., Nit-ac.).

Высокоразрешающая КТ (ВКТ) придаточных пазух носа: **полипы**, возникающие из стенки ячеек решетчатой кости или верхнечелюстных пазух; **утолщение слизистой оболочки придаточных пазух носа**.

Левосторонняя простуда (Arum-t.).

Ретроназальный катар (Kali-bi., Psor.).

Рентген носоглотки : **отек мягких тканей, указывающий на аденоиды**.

Рентгенография околоносовых пазух (проекции Уотера и Кейдвелла): **уровни жидкости в пазухах, нечеткая визуализация пазух и искривление носовой перегородки**.

Ковыряет в носу пальцами (Арум-т., Китай).

Озена.

Бородавки на носу (Caust.).

Лицо

Акне у анемичных девочек (Aster., Graph.).

Результаты теста:

Угри на **подбородке** (Hydr., Viol-t.) и **носу** (Caust., Sulph.), оставляют **некрасивые шрамы** (Kali-br., Sil.).

Жирное, блестящее, воскообразное лицо (Ars., Med.).

Бледность лица во время каждого приступа лихорадки (Croc., Hyos.).

Постоянно дергает за губы (Arum-t., Bry.).

Красные высыпания на носу (Androc., Lach.).

Отёчность лица (Apis, Graph.).

Увеличение околоушных желез.

Веснушки.

Ярко-красное лицо или локальное покраснение лица.

Волосы в необычных местах; у девочек оволосение по мужскому типу (Puls., Sep.).

Herpes labialis (Nat-m., Rhus-t.).

Внешний вид умственно отсталого человека (Agar., Lach.).

Пот на верхней губе (Ign., Med.).

Бородавки на подбородке (Lyc., Sep.).

РОТ

Обильное слюнотечение, особенно при кашле (Am-m., Mez.).

Медленное и затрудненное прорезывание зубов (Calc., Sil).

Заикание, неясное произношение (Merc., Stram.).

Прикусывает язык (Bufo, Ign.).

Результаты теста:

Десны легко кровоточат и отделяются от зубов (Carbo-veg., Phos).

Географический язык с потрескавшимися краями (Lach., Nux-v.) и **красным кончиком** (Ars., Rhus-v.).

Ранула (киста дна полости рта) (Ambr., Calc.).

Зубы: Желтоватый или черный цвет зубов из-за **кариеса боковых поверхностей и корней** (Mez.); зубы хрупкие и легко крошатся (Plb., Staph.).

Дентальный абсцесс.

Пиорея.

Язвенный стоматит (Kali-i., Nux-v.).

Язвы на языке (Bapt., Nit-m-ac., Psor.).

ШЕЯ

Хронический и рецидивирующий тонзиллит (Bar-c., Tub.).

Пища застревает в горле (Lach., Nit-ac.).

Частое безуспешное прочищение горла и кашель (Arg-n., Med.).

Результаты теста:

Увеличенные шейные железы.

Ретроназальный катар (Kali-bi., Psor.).

Небольшие бородавки, похожие на **цветную капусту, и кожные наросты** на шее (Nit-ac., Sil.).

Миндалины увеличены и гипертрофированы, особенно левая (Lach., Phos.).

Удлиненный суппозиторий (Kali-i., Sulph.).

Язвы глотки (Merc-ir., Mez.).

языкоглоточного) и X (блуждающего) черепных нервов вследствие менингита или энцефалита.

ЖЕЛУДОК

Часто наблюдается жгучая, сильная жажда холодной воды (Bry., Phos.) ; отсутствие жажды встречается редко.

Ребенок не может переваривать яблоки (Ant-t., Phos.), **масло** (Carbo-veg., Puls.), **жир, рыбу** (Kali- s., Sep.), **лук** (Lyc., Puls.), **свинину** (Cyc.l, Graph.), **сахар** (Arg-n., Sulph.) **в любой форме.**

Рвота желчью с лихорадкой (Ant-t., Nat-m.).

Чрезмерные рвотные позывы при кашле (Cina, Dros.).

Ненасытный или повышенный аппетит, особенно с головными болями (Phos., Psor.).

Шумное глотание; громкая отрыжка (Arg-n., Plat.).

Не любит: мясо, лук (Sabad.) и **картофель** (Phos., Sep.).

Пристрастия: **к шоколаду** (Carc., Staph.), чесноку (All-s.), **сырому луку** (All-c., Rhus-g.), кислой и соленой пище (Carbo-veg., Verat.), кислым фруктам (Med.) и **чаю** (Chin., Sacch.).

ЖИВОТ

Урчание в кишечнике, метеоризм.

Результаты теста:

Левая паховая грыжа и пупочная грыжа становятся заметными, когда ребенок плачет; ребенок плачет непрерывно и успокаивается только тогда, когда боль в левой паховой области уменьшается путем надавливания или когда бедро сгибается к животу.

При аускультации: **живот беззвучный.**

Паралитическая непроходимость кишечника (Plb., Op.).

Болезненность в правой подвздошной области.

Абсцесс паховой железы.

Асцит +.

Врожденные паховые грыжи.
Печень увеличена и болезненна.
Припухлость барабанной перепонки.

ПРЯМАЯ КИШКА

Понос от волнения (Ars., Op.), **жирной пищи** (Kali-chl., Puls.), **лука** (Lyc., Nux-v.) ИЛИ периодический понос, всегда возникающий в один и тот же час (Apis).

Паралич прямой кишки после операции по поводу расщепления позвоночника или менингомиоцеле .

Стул: **Черные, шарообразные комки** (Calc-p., Plb.), с запахом газа, твердые или с примесью хлещущей жидкости (Crot-t., Podo.), **маслянистые** (Iod.), выбрасывающиеся струей.

Непроизвольные испражнения во время сна или при отхождении газов (Nat-s., Ph-ac., Podo.).

Результаты теста:

Разъедающая влага вокруг ануса (Merc-s., Nit-ac.).
Нарост вокруг ануса, похожий на цветную капусту.
Большое количество жира в стуле (Caust., Iris).
Геморрой++.
Образование абсцесса или стриктуры прямой кишки.
Посев кала: *Vibrio cholerae*.
Кал: *Entamoeba histolytica*, аскариды, острицы.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Подтекание мочи из-за наличия уретрального клапана.

Общий Луч (Cann-s., Merc-s.).

Энурез.

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей у ребенка с камнями в почках или аномалиями мочевого тракта.

Мочеиспускание по каплям после операции на позвоночнике.

Непроизвольное мочеиспускание, если позыв к мочеиспусканию не удовлетворен немедленно (Lach., Sep.).

Пенистая моча (Lyc., Sei.).

Результаты теста:

Моча: Альбумин +, желчные пигменты ++, желчные соли, эритроциты +, сахар.
Посев мочи: кишечная палочка.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Прикосновение к гениталиям (Hyos., Merc., Stram.).

Зловонный пот гениталий (Iod., Sulph.).

Склонность к мастурбации, даже во сне (Camph., Plat.).

Ночное недержание мочи.

Результаты теста:

Парафимоз и фимоз (Merc., Nit-ac.).
Опрелости.
Экзема на мошонке (Crot-t., Graph.).

Красноватое окрашивание мошонки (Чел., Петр.).
Задержка яичек, особенно левого (Calc., Par.).
Грибковая инфекция в паховой области (tinea cruris).

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Склонность к мастурбации, особенно во время сна.
Хронические зловонные бели (Carb-ac., Kali-ar.) у маленьких детей с вульвовагинитом и семейным анамнезом сикоза.

Результаты теста:

Вонючий пот.
Грибковая инфекция в паховой области (tinea cruris).
Бородавки возле половых губ.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Хроническая охриплость (Argum-t., Kali-bi.) из-за полипов на голосовых связках.
Спазмы или судороги голосовой щели, особенно во время сна (хлор., смех.).
Охриплость при простуде (Caust., Phos.).

Результаты теста:

Ларингоскопия: полипы в гортани (арг., санг.) и на голосовых связках - (берб.).
Носовой звук голоса (Кали-би.).

ДЫХАНИЕ

Астма у сикотических детей **после вакцинации** (Carc.) или в **холодную, сырую погоду** (Dulc, Nat-s); ухудшение ночью (Ars., Chel.).

Результаты теста:

Центральный цианоз.
(плевритный) шум трения ++.
Свистящие дыхательные звуки ++.

КАШЕЛЬ

Сухой, лающий, изнуряющий, отрывистый, короткий, спазматический и удушающий **кашель, усиливающийся** от холодных напитков (Ars., Psor.), в течение дня (Argmet., Euphr.), во время еды, **утром** (Coc-c.) и **в положении лежа на левом боку**; лучше при повороте на правый бок (Phos., Rumx., Sep., Sulph.).

Постоянный кашель после вакцинации (Carc.).

Кашель, сопровождающийся повышенным слюноотделением (Ам-м., Бар-к.).
Мокрота: Шаровидная, зеленоватая, на вкус как сыр (Chin., Lyc.).

ГРУДЬ

Персистирующая пневмония, например, пневмония, вызванная метациклин-резистентным золотистым стафилококком.

Запущенная или плохо вылеченная пневмония (Sil., Sulph.), особенно вызванная стафилококками и у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Результаты теста:

Цианоз в области ключиц.
Рецидивирующие фурункулы в подмышечной области (Lyc.).

Назад

Травмы позвоночника (гипер., нат.).

Результаты теста:

Атрофия длинных мышц, таких как трапецевидная мышца и передняя зубчатая мышца.

Кифосколиоз.

Расщелина позвоночника.

Стоит, наклонившись вперед.

Бородавки.

КОНЕЧНОСТИ

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева), ювенильный ревматоидный артрит, синдром Стилла, все эти заболевания сопровождаются гонореей или выраженным сикотическим миазмом в семейном анамнезе.

Растяжения связок и сухожилий из-за чрезмерного участия в таких видах спорта, как футбол, хоккей, бейсбол, крикет и т. д.

Неуклюжесть (Apis, Bov.).

Хруст в суставах при растяжении.

Истощение верхних конечностей после вакцинации (Маланд).

Болезнь Пертеса-Кальве-Легга.

Привычный вывих тазобедренного сустава (Calc., Caust.).

Результаты теста:

Холодность кончиков пальцев (Chel., Zinc.) и предплечий (Graph., Phos.).

Истощение указательного (смех) и большого пальцев.

Гнилостный, разъедающий пот стоп (Nit-ac., Sil.).

Ногти: синие, ломкие (Calc., Graph.), ребристые, деформированные, скрученные, мягкие и низкорослые; заусенцы (Nat-m., Sulph.), вросшие ногти на ногах (Graph., Teucr.) и белые пятна на ногтях рук (Nit-ac.).

Бородавки на кончиках пальцев, особенно на указательном пальце (Caust.).

Кариес вследствие остеомиелита.

Мозоли.

Замедленное заживление переломов.

Экзема на сгибательных поверхностях локтевых суставов.

Недостаточное закрытие швов.

Множественные переломы вследствие несовершенного остеогенеза.

Спать

Дети с беспокойным сном после прививок.

Может спать, только подложив руки под голову (Nux-v., Puls.).

Бессонница в положении лежа на левом боку (Ars., Lach., Phos.) или может спать только на левом боку (Nat-s., Sulph.).

Засыпает во время письма (Ф-ак.).

Скрежет зубами во время сна (Ars., Tub.).

Постоянная бессонница из-за тревоги или грусти (Ign., Kali-c.).

КОЖА

Результаты теста:

Обильный рост волос на обычно безволосых частях тела (сентябрь).

Пот пахнет медом.

Кровоточащие бородавки у молодых девушек (Caust., Nit-ac.), которые
мокнули и пахнут старым сыром (Calc., Hep.).
Кожа коричневая, с грязными пятнами, волосатая.
Сыпь только на закрытых частях тела (Led.).
Гнилостные пустулы с впалыми кончиками.

Общий

Дети, в **семейном анамнезе которых** есть случаи рака, диабета, экземы, гипертонии или ревматоидного артрита.

Дети с **врожденными новообразованиями**, такими как ангиомы, липомы, родинки, папилломы и т. д.

Дети с **врожденными нарушениями обмена веществ**, такими как непереносимость лактозы.

Зябкие дети, которые очень чувствительны к малейшему холодному сквозняку, но нуждаются в свежем воздухе.

Замедленное выздоровление после приема антибиотиков.

Анемия.

катар всех видов; бели, носовой, уретральный катар и т. д.

В анамнезе рецидивирующие инфекции, такие как мононуклеоз, синусит и тонзиллит.

Дети, перенесшие многочисленные стоматологические процедуры с использованием большого количества ртутной амальгамы и у которых впоследствии развилась атопическая экзема.

Дискомфорт после подавления потоотделения из-за беспорядочного использования детской присыпки, что может привести к аллергии, астме и поведенческим проблемам.

Темный цвет кожи, черные волосы, нездоровая кожа, коричневые или красные пятнышки, глубокие носовые складки, белые чешуйки, некрасивые - деформированные ногти, дряблые мышцы, светлые волосы, сладковатый запах.

Дети, развитие которых предрасположено к сильному сикотическому семейному анамнезу.

Выделения едкие, кровянистые, абразивные, болезненные, зловонные, серые, зловонные, желтые.

Левосторонние симптомы.

Периодичность: ухудшение состояния на растущей луне.

Пот: Запах меда, затхлый, прогорклый, кислый, сладкий, маслянистый; потоотделение во время сна, лучше при пробуждении или после него; обильное потоотделение открытых частей тела, за исключением головы.

Рецидивирующее абсцессообразование, вызванное стафилококком.

Рахит.

Источник

Семейство Кипарисовые.

ТИРЕОИДИН

(Тироидный гормон - Thyр.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Отсталые, глупые и идиотские дети. Синдром Дауна.
Подростки с эксцентричным, капризным поведением.
Худые, тощие и истощенные дети.
Семейный анамнез заболеваний щитовидной железы, диабета, аллергии и ожирения.
Замедленное и заторможенное развитие, задержка как роста, так и дальнейшего развития (умственного и физического).
Различные аллергии, такие как сенная лихорадка, аллергический конъюнктивит, аллергическая астма, крапивница и ангионевротический отёк. Аллергическая астма возникает при любой перемене погоды.
Потеря веса у детей.
Плохое зрение.
Плохой рост волос у детей. Необычный рост волос у девочек. Волосы над верхней губой у девочек.
Судороги во время прорезывания зубов.
Кашель при входе в теплое помещение.
Сильная тяга к сладкому и холодной воде.
Отвращение к жиру.
Хроническая и постоянная диарея.
Испытывает жажду, требует большого количества воды.
Неопущение яичек, при котором яички либо всё ещё находятся в брюшной полости, либо почти в области гениталий. Перевернутые яички.
Непроизвольное мочеиспускание ночью у ослабленных анемичных детей.
Ночное недержание мочи, когда все другие средства не помогают.
Сломанные кости, на срастание и заживление которых требуется много времени.
Холодные руки и ноги.
Обильный маслянистый пот.
Псориаз у маленьких детей.
Очень морозно.

Источник

- Изготовлено из щитовидной железы овцы или теленка.

TUBERCULINUM AVIS

(Нозод из туберкулезной куриной печени - Туб-а.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Часто туберкулез в анамнезе и семейный анамнез.

Истощение вследствие туберкулеза.

Первичный комплекс кори, астматического бронхита и вирусного бронхита.

Полипы носа.

Насморк с водянистыми, а затем гнойными выделениями.

Заложенность носа. Постоянное чихание. Простуда распространяется вниз, поражая гортань, трахею и бронхи.

Рецидивирующая инфекция среднего уха.

Инфекция среднего уха левого уха.

Рецидивирующий тонзиллит.

Дыхание затруднено, слышны многочисленные хрипы при кашле, но мокрота не отходит. Болезненный, раздражающий кашель, в лёгких слышны хрипы. Бронхит и послекоревой кашель.

Желание есть фрукты, усиливающееся от жирного.

Источник

- Этот туберкулезный нозод был приготовлен из куриной печени доктором Картье из Франции.

ТУБЕРКУЛИНУМ БЫЧИЙ

(Нозод из туберкулезного абсцесса - Tub.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Оскорбительные, злые и **дерзкие** дети, которые часто проклинают своих родителей (Lyc., Plat.) и в гневе бросают в них предметы (Cina, Staph.).

Недовольный, **дерзкий** ребенок (Bar-c., Caust.) со склонностью к злобности, особенно когда его требования не удовлетворяются родителями или авторитетными лицами.

Дети **полны энергии**, не могут усидеть на месте (Coff., lod., Merc., Rhus-t.); им всегда хочется чем-то заняться; как только они заканчивают одно дело, им хочется заняться следующим.

Тело

Потеря веса со слабостью и волчьим голодом (кальций, йод, натрий).

Аллергическая конституция: аллергия на шерсть животных, особенно кошек (Ars., Dulc., Kali-c., Lac-f., Sulph.).

Сильное желание свежего воздуха (Calc-i., Carbo-veg., Kali-c., Puls., Sulph.); любит сидеть у окна в машине, автобусе или поезде, чтобы подышать свежим воздухом.

АЗБУКА ТУБЕРКУЛИНУМА

- А** - Художественный
- Б** - Поведенческие проблемы
- С** - Мужественный
- Д** - Дерзкий
- Е** - Экстраверт
- Ф** - Боязливый
- Г** - Жесты, автоматические (автоматические жесты)
- Н** - Беспечный (небрежный)
- Я** - Идеи, в изобилии
- Дж** - Прыгать, желание (желание прыгнуть)
- К** - Брыкание во сне или в гневе
- Л** - Похотливый
- М** - Озорной
- Н** - Печально известный
- О** - Упрямый (мятежный)
- Р** - Precocious (преждевременный, скороспелый)
- Q** - Сварливый (сварливый)
- Р** - Беспокойный

- S** - Бесстыжие
- T** - Талантливый
- U** - Бесчувственный
- V** - Жестокий, когда зол (жестокий, когда злится)
- W** - Плач по пустякам

Другие важные симптомы

РАЗУМ

Очаровательные, дружелюбные и общительные дети (Lach., Sulph.), которые легко заводят дружбу со всеми, даже с незнакомцами в автобусе, поезде или в парке.

В течение дня ребенок весел и жизнерадостен, но как только приближается вечер или ночь, возникает множество тревог (Ars., Calc., Lach., Puls.).

Дети с чрезвычайной тревожностью, с сильным страхом **птиц** (Apis, Nat-m.), пушистых животных, включая **кошек** (Bac., Chin., Merc.) , и **собак** (Bell., Chin., Stram.). Один из важных препаратов в гомеопатии при выраженной **ночной панике** (очень похож на Aur-br., Cina, Gal-ac., Kali-br., Stram.).

Разговорчивый и полный энтузиазма; постоянно болтает с родителями, родственниками и друзьями (Lach., Stram., Sacch.).

Манипулятивный (Puls., Sanic., Sulph., Tarent.).

Дети, которые всегда хотят быть одетыми по последним модным тенденциям (Puls., Verat.).

Дети, которые редко бывают дома; они всегда в саду, в парке или с друзьями.

Желание разнообразия (Bry., Sacch., Sep.).

Разрушительный; любит ломать свои игрушки и другие вещи (Carc., Stram., Tarent.), рвет на себе волосы, когда злится.

Во время драки с другими детьми он обычно таскает их за волосы , кусает или пинает их (лает, пинает, тявкает).

Льстивое, соблазнительное поведение у детей (Lach., Phos., Verat.).

Любит бегать по пляжу или плавать в море (Барнаул, Лако-Леоне, Медеарио, Тарент).

Любит смотреть захватывающие фильмы; может даже пропустить прием пищи, чтобы посмотреть фильм.

Ребёнок приходит в восторг и волнение, как только узнаёт, что собирается на пикник или прогулку. Он хочет выйти на улицу, даже если ему очень плохо.

НОВОРОЖДЕННЫЕ И ДЕТИ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Синие склеры.

Ярко-красные губы (Bell., Lach., Sulph.).

Затрудненное прорезывание зубов.

Раннее разрушение зубов (кальций, креоз, мезофильный, стафилококковый).

Выраженный рост волос на спине.

Роднички долгое время остаются открытыми (Calc., Calc-p., Sil.).

Задержка внутриутробного развития плода в анамнезе.

Дефектные зубы растут в неправильном порядке (Bac., Phos.).

Частые случаи туберкулеза в семейном или материнском анамнезе (Bac., Carc., Dros., Kali-c., Sulph., Ther.).

Недостаточный вес.

Очень тонкие волосы.

ГОЛОВА

Крайне чувствителен к расчесыванию (Arn., Carbo-veg., Nit-ac., Sil., Sulph.); не любит, когда его расчесывают.

Бьется головой о стену (Bell., Mill., Phos., Tarent.), **особенно в состоянии гнева, разочарования или истерики, когда его требования не выполняются.**

Потливость головы по ночам (Calc., Merc., Sil.).

Во время сна ворочает голову или зарывается ею в подушку (Bell., Hell., Stram., Sulph., Tarent.).

Результаты теста:

КТ: Размытые передние и задние рога; **расширение желудочков** (яркое); множественные инфаркты; смещение срединных структур из-за повышенного внутричерепного давления.

Открытые роднички (Calc., Calc-p., Sil.).

Симптом Кернига + (Bell., Hell., Stram., Zinc.).

Вши (Carb-ac., Lys., Merc., Psor., Staph.).

ЦСЖ: Посев показывает наличие H. influenzae, менингококков и туберкулезной палочки; образование паукообразных сгустков, тест Падея +; белок ++ и сахар ++.

Сухие, тусклые волосы (Thuj.).

Чрезвычайно выступающий лоб (Cupr., Hell.).

Голова оттянута в сторону (Bar-c., Lys.).

Кольцевидный герпес на волосистой части головы.

Седой дерматит у новорожденных.

Pluca polonica (спутанные волосы).

Себорея.

ГЛАЗА

Астигматизм (Sep.).

Близорукость.

Разрывающая боль при кашле.

Светобоязнь.

Результаты теста:

Синие склеры.

Халазион.

Помутнение роговицы.

Экзема по краям век (граф.).

Ячмень, особенно в правом глазу.

Длинные, изогнутые ресницы (Calc., Phos.).

Периметрия: Горизонтальная и вертикальная гемианопсия.

Зрачки суженные, неровные, нечувствительные к свету.

Чешуйчатые веки.

Осмотр с помощью щелевой лампы: язвы роговицы, кератит и туберкулезный ирит.

Косоглазие при менингите.

уши

Склонность к рецидивирующим средним отитам.

Ребенок просыпается ночью от сильной боли в ухе.

Результаты теста:

Атопическая экзема за ушами.

Тест Бера: **Врожденная глухота.**

Правосторонний средний отит с зловонными гнойными выделениями из уха.

Перфорация барабанной перепонки (гидр., кали-би.) **с неровными краями.**

Аудиометрия: глухота с отсутствием костной проводимости.

Нос

Хронический ринит.

Склонность к повторным простудам и сенной лихорадке.

Простуда, за которой следует диарея.

Насморк зеленоватый, вонючий, гнойный и желтый.

Носовые кровотечения с головной болью.

Результаты теста:

Ноздри покрыты корками и чешуйками.

Множество мелких гнойных прыщей на носу.

КТВЧ: Хронический синусит с утолщением слизистой оболочки. Отёк носовых раковин с искривлением носовой перегородки.

Пот на носу.

Ретроназальная секреция через зеркало.

Риноскопия: аденоиды и полипы носа.

Лицо

Покраснение лица при кашле (Bell., Sang.) **или при лихорадке** (Sep.).

Склонность к угревой сыпи на лице при наличии туберкулеза в анамнезе (в том числе в семейном).

Результаты теста:

Красные губы (лай, смех).

Угри с комедонами, которые имеют тенденцию очень легко нагнаиваться.

Синеватые круги вокруг глаз.

Грязное и жирное лицо.

Отек верхней губы.

Рот

Затрудненное и медленное прорезывание зубов.

Результаты теста:

- Десны: **при надавливании выделяется кровь или гной; гнойные выделения;**

Отек и опущение десен.

Зубы: Кариес; атрофированные зубы с **неровными краями** (Med., Plb.).
Язык: кремообразный налет на передней половине языка с красными полосами, спускающимися по середине, или **географический язык** (Ars. Nat-m.) с увеличенными и торчащими сосочками; язвы на языке.
Неприятный запах изо рта.

ШЕЯ

Хроническое или рецидивирующее воспаление миндалин.

Частые боли в горле после употребления даже самых малых количеств красителей, используемых во многих продуктах быстрого питания.

Сухость задних отделов носовой полости.

Боль в горле распространяется на уши.

Результаты исследования:

- **Зоб.**

Шейные лимфатические узлы увеличены, твердые, бугристые и болезненные.

Воспаленные и нагноившиеся миндалины с видимыми фолликулами.

Ретроназальная секреция.

ЖЕЛУДОК

Неутолимая тяга к еде, усиливающаяся ночью, сопровождающаяся потерей веса.

Тошнота при виде или запахе пищи с повышенной жаждой.

Рвота с диареей.

Отвращение: сыр, яйца, мясо, молоко, ананас и кислая пища.

Пристрастия: **бекон** (Ars., Sanic.), бананы, сыр, шоколад, **холодное молоко** (Apis, Rhus-t.), жир, **ветчина** (Uran-n.), мясо (сырое и **копченое**), мороженое, **свинина** (Crot-h., Mez.), картофель, острая пища, соль, **салями** (Calc-p.), **колбаса** (Sil.), специи и сладости.

ЖИВОТ

Боль в области пупка с диареей.

Результаты теста:

- Асцит ++.

При пальпации: паховые лимфатические узлы увеличены и уплотнены.

При перкуссии: тимпанит.

Сферически вздутый живот.

Ультразвуковая картина: печень и селезенка увеличены, брыжеечные железы увеличены .

ПРЯМАЯ КИШКА

Диарея, вызванная туберкулезными процессами в каком-либо органе.

Утренняя диарея (Cench.) **без истощения** или слабости (Ph-ac., Sulph.).

Хроническая безболезненная диарея с повышенным потоотделением у истощенных детей.

Непроизвольные дефекации при метеоризме или мочеиспускании.

Стул: коричневый, выходящий струей под давлением, гнилостный, зловонный, внезапно выходящий струей, непереваренный и водянистый.

Результаты теста:

Колоноскопия: болезнь Крона.

Болезненность ануса.

Проктоскопия: трещины, свищи и геморрой.

Плановый анализ кала: острицы и аскариды.

Ректороманоскопия: язвенный колит.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Нефротический синдром.

Брызги струи.

Гломерулонефрит после гнойной ангины.

Результаты теста:

Биопсия почки: мембранопролиферативный гломерулонефрит.

Моча: Альбумин ++ и зернистые цилиндры.

Посев мочи: кислотоустойчивые бактерии положительные.

ГЕНИТАЛИИ

Чрезмерное сексуальное влечение в очень раннем возрасте.

Склонность к мастурбации.

Результаты теста:

Повышенный уровень тестостерона в сыворотке крови у молодых девушек.

Вялая мошонка.

Неопущение яичка (крипторхизм).

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Ларингит.

Результат теста:

- Прямая и непрямая ларингоскопия: отек голосовой щели, узелки на голосовых связках и отек черпаловидных хрящей.

ДЫХАНИЕ

Астма усиливается ночью, в положении лежа или **в теплом помещении**; **облегчается на свежем воздухе** (Am-с.).

Респираторные аллергии в основном вызываются холодной пищей, замороженными продуктами, консервами или продуктами, содержащими большое количество красителей и эмульгаторов.

Аллергическая астма у детей с отягощенным семейным анамнезом туберкулеза или туберкулезной миазмой.

Результаты теста:

Частота дыхания учащена, одышки нет.

Бронхиальное дыхание ++.

Необходимо часто делать глубокие вдохи.

Хрипящий дыхательный звук +.

КАШЕЛЬ

Сухой, лающий и удушающий кашель или коклюш.

Кашель во сне, мешает спать и усиливается в положении лежа на правом боку; облегчается от холодных напитков.

Зеленоватая, густая желтая мокрота, которая по утрам становится кровавой.

• Результаты теста:

Заложенность горла ++.

Держит грудную клетку при кашле (Дрос.).

Задняя стенка глотки воспалена.

Грудь

Склонность к тому, что любая простуда оседает в груди и приводит к бронхиту или бронхопневмонии или вызывает хрипы.

Милиарный или легочный туберкулез.

Туберкулезный плевральный выпот.

Результаты теста:

Рентгенограмма органов грудной клетки: верхушки легких размыты или имеют полосы; тени в виде бабочки над обоими легочными полями; полости; спайки в плевральном углу; **увеличение лимфатических узлов ++** (кальцификация, йод); уплотнение в левой нижней доле и **множественные милиарные затемнения.**

Уплотнение правой верхней доли (Чел., Нат-с.).

Дребезжащие шумы ++ и хрипы.

Уменьшение объема грудной клетки, особенно в области ключиц и ребер.

Эмпиема.

Вонючий пот подмышек.

Пес Кавус.

Плевральный выпот.

Шум трения плевры +.

Рикетотические четки.

Назад

Спинальный менингит.

Результаты теста:

КТ: **Холодный абсцесс** (силиконовый); коллапс позвонков и замыкательных пластинок; дегенерация межпозвоночных дисков; дегенерация поясничных и шейных позвонков; воспалительный отек с деструкцией кости.

Искривление позвоночника.

Рост волос на позвоночнике.

Знак Кернига +.

Кифосколиоз.

SLR (Lasegue) +.

Рентген: расщепление позвоночника.

КОНЕЧНОСТИ

Синдром Рейтера.

Синдром Шегрена.

Синдром Стилла.

Результаты теста:

Кривые, ломкие, миндалевидные ногти с белыми пятнами на них.

Тест на анти-АНА и анти-ДНК +.

С-реактивный белок ++.

Выпот в коленном суставе.

Сгибательная деформация коленного, тазобедренного и локтевого суставов.

Genu valgum.

Реакция Менделя-Манту считается положительной, если уплотнение и воспаление достигают размеров более 20 мм.

Красноватое изменение цвета пальцев ног.

Сывороточный тест на РА ++.

СПАТЬ

Положение: коленно-грудное (положение колено-грудное) (Med., Phos.), на животе, лицо прижато к подушке.

Бессонница от голода (Лус.); не может заснуть, пока что-нибудь не съест.

Во время сна: кашель, скрежет зубов, подергивание мышц, крик или внезапный подпрыгивание от шока.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Сухой отрывистый кашель во время простуды и жара.

Тошнота и рвота с повышенной жаждой во время лихорадки.

Чрезвычайно полезен при лихорадке воспалительного или септического происхождения, а также при лихорадке неизвестного происхождения.

Лихорадка при злокачественных заболеваниях, особенно при болезни Ходжкина, лимфоме и лейкемии .

КОЖА

Атопическая экзема; экзема, развивающаяся после неправильного применения антибиотиков и чрезмерной вакцинации, особенно после BOG, гепатита В и полиомиелита.

При экземе ребенок сильно чешется, как только на кожу попадает холодная вода, а затем ищет близость к обогревателю, чтобы получить облегчение.

Аллергические высыпания на коже после употребления молока.

Сухая, грубая и чувствительная кожа, которая легко загорает.

Зуд усиливается при раздевании и уменьшается от тепла духовки.

Результаты теста:

эритема .

Импетиго.

Келоид.

Бледная, тонкая и полупрозрачная кожа.

Псориаз.

ОБЩИЙ

Аллергическая конституция; особенно на шерсть животных (мех) и кошек (Ars.).

Потеря веса со слабостью и тягой к еде.

Сильное желание свежего воздуха (Sulph.); хочет сидеть у окна в машине, автобусе или поезде, чтобы ощущать прямой ветерок.

Задержка выздоровления после любого инфекционного заболевания, такого как ветряная оспа, грипп, корь, свинка или тиф.

Никогда больше не буду здоров после прививок или приема антибиотиков.

Часто помогает, когда правильно подобранные средства не дают результата и есть признаки туберкулезного миазма; когда присутствует множество симптомов; когда картина неясна или когда симптомы меняются очень часто.

Обильное потоотделение во время сна, после полуночи, особенно в области горла, с сильной слабостью.

Рецидивирующие абсцессы.

Склонность к нагноению костей и желез.

ТУБЕРКУЛИНУМ МАРМОРЕК

(Туберкулиновый нозод из конского кашля - Tub-m.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Семейный анамнез туберкулеза.

Всегда уставший, изможденный, худой и истощенный, с очень плохим аппетитом.

Лицо бледное, но губы красные, темные, сухие и потрескавшиеся.

Красный язык.

Увеличенные и уплотненные нижнечелюстные лимфатические узлы.

Желание съесть копченое, соленое и маринованное мясо.

Сильный запор из-за бездеятельности прямой кишки; сухой, твердый стул, холодные пальцы рук и ног.

Любая физическая нагрузка ухудшает ситуацию.

Блуждающие ревматические боли у детей.

Бессонница у детей младшего школьного возраста.

Источник

- МармореК изготовил это лекарство в 1903 году, вакцинировав лошадь приготовленной культурой свежих туберкулезных палочек.

ВАКЦИНА АТТЕНЮ БИЛИ

(нозод вакцины БЦЖ - Ваб.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Худой, изможденный и истощенный.

В анамнезе рецидивирующий бронхит и отягощенный семейный анамнез рецидивирующего туберкулеза.

Слабость и дискомфорт от умственной нагрузки.

Каждый день приходит из школы с головной болью. Головная боль усиливается при умственной нагрузке или концентрации во время учёбы.

Потрескавшиеся уголки рта.

Сильная боль в левом ухе.

Рецидивирующий тонзиллит с увеличением шейных лимфатических узлов.

Хроническое воспаление шейных лимфатических узлов может также переходить в нагноение. Сухой, изнуряющий, надсадный кашель.

Плохой аппетит.

Слабость позвоночника; искривление позвоночника.

Склонность к простудам.

Очень морозно.

Вред от вакцинации БЦЖ.

ЧЕМЕРИЦА АЛЬБОМНАЯ

(Белая морозница - Верат.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Искусственный (Страм.); любит украшать себя наигранными жестами и вычурными словами.

Амбициозные дети (Nux-v.): они с самого начала точно знают, кем хотят стать, когда вырастут, например, врачом, инженером, ученым и т. д.

Любопытный (Lyc., Puls.); задает много вопросов и хочет знать, как и почему все происходит.

От щегольского до глупого (китайский).

Высокомерный (Plat., Sulph.), любит хвастаться, маленький хвастун.

Беспокойные дети (Merc., Rhus-t.); переезжают с одного места на другое; не могут усидеть на месте.

Задавайте религиозные вопросы.

Расстройства поведения у детей, вызванные горем, шоком или страхом.

Хорошее поведение по отношению к властям (например, родителям или учителям), но становится дьявольским по отношению к тем, кто слабее.

Приходится все трогать.

Ранний.

Склонен намеренно лгать и симулировать болезни.

Тщеславие (Белл.).

Тело

Жажда большого количества холодной воды.

Типичная картина шокового состояния вследствие гиповолемии или низкого сердечного выброса, периферических сосудистых нарушений и септицемии.

Характеризуется коллапсом с цианозом и холодным потом, лицом

Гипократа и ледяным холодом всего тела с малым, едва прощупываемым пульсом и неопределяемым артериальным давлением.

Другие важные симптомы

Дух

Грызет ногти.

Ребенок беспокойно бродит по дому и в школе.

Коварный (Lach., Nux-v.), ловко пользуется ситуацией.

Любит писать, рисовать и заниматься живописью. Очень креативный.

Хочет быть голым (Hyos., Phos.); предпочитает не носить пижаму или ночную рубашку.

Разрушительный (Страм., Тарент.), **любит ломать вещи**: режет или рвет - одежду, бумагу, тетради, ломает карандаши, мебель, инструменты и игрушки.

Непослушный и дерзкий, особенно по отношению к более слабым или мягким людям.

Страх врачей (Ign., Phos.), **собак** (Chin., Stram.) **и воды**.

Его трудно кормить, и он капризный во время еды.

Ревность между детьми или при появлении в семье новорожденного брата или сестры.

Страстно издевается над одноклассниками и друзьями.

Кладет пальцы в рот.

Всегда глупо улыбается (Меркурий).

Сильные вспышки гнева: хмурится, дергает за волосы, кричит и **плюется** (Supr., Lyss.).

Желание, чтобы тебя несли.

Грязный.

Экстравагантный (Bell., Caust.) в речах и одежде.

Сильный страх перед черными игрушками или черными предметами домашнего обихода.

Только и делает, что шалит целый день.

Любит путешествовать и бродить.

Озорной.

Плач во сне и при боли.

Синдром дефицита внимания (СДВ)

Гиперактивность с непослушанием.

Топают ногами.

Крайнее беспокойство, выражающееся в повторяющемся поведении: - **разрезании одежды и бумаги на мелкие кусочки, поедании ластика, засовывании предметов в рот, жевании карандашей или воротничков рубашек и т. д.**

Хочет получить немедленные ответы на все свои вопросы.

Обнимает и целует всех, чтобы стать популярнее.

Гнев, переходящий в насилие.

Устойчивость внимания слабая и кратковременная; не может ни на минуту сесть за учебу; также мешает другим ученикам в классе.

Разговорчивый.

Бегают вокруг.

Бесстыдно.

Слегка кричит.

Детское разочарование из-за:

- Разногласия между родителями.

Внезапное изменение социального/финансового статуса.

Слишком мало внимания со стороны чрезмерно амбициозных родителей.

Это разочарование делает ребенка недовольным, он становится дерзким и непослушным.

Неискренне.

В обеденное время он бежит по дому, а мама за ним бежит; поэтому на то, чтобы поесть, ему может потребоваться четыре часа.

ГОЛОВА

Во время сна зарывает голову в подушку.

Волосы легко спутываются.

Результаты теста:

Холодный пот на лбу.

Потирает лоб рукой.

Знак Брудзинского +.

Церебральные гематомы у новорожденных после рождения.

КТ: кровоизлияние в мозг; гидроцефалия.

Знак Кернига +.

Вращение головой.

Не может держать голову прямо.

Морщинистый лоб.

ГЛАЗА

Разрывается от простуды.

Паралич зрительного нерва.

Светобоязнь.

Результаты теста:

Веки полуоткрыты.

Периметрия: Гемианопсия.

Спазмы круговой мышцы века .

Блефарит.

Синие круги вокруг запавших глаз.

Синие склеры.

Глаза обращены наружу и вверх.

Паралич левого верхнего века (Гельс, Спиг).

НОС

• Результаты теста:

Узкий (Лус.) и заостренный нос (Camph.).

Постоянно ковыряет в носу пальцами.

Ледяной холод, особенно в области верхушки (Apis).

ЛИЦО

• Результаты теста:

Синеватый, холодный, Гиппократ (Ant-t, См.), заостренный и смертельно бледный, когда встает; выглядит испуганным.

Стисните челюсти.

Синюшный оттенок лица при судорогах, кашле, диарее или гнев.

Потрескавшиеся губы.

Левая щека красная (Phos.).

Увеличение подчелюстных лимфатических узлов.

РОТ

При кормлении кусает стакан (Cina, Cupr.).

Скрежетание зубами, особенно во время сна (Bac., Bell., Cina, Tub.).

Затрудненное прорезывание зубов.

Повышенное слюноотделение с кашлем и лихорадкой.

Результаты теста:

Прикусывает язык.

Пена у рта.

Шепелявость и заикание.

Отек десен.

Язык: вялый, бледный, с красной полосой посередине ИЛИ белый, с красным кончиком.

ШЕЯ

Глотание невозможно.

Проглоченная жидкость выталкивается через нос под давлением .

Результаты теста:

Паралич **пищевода** (Ars., Bapt., Gels., Op.).

Экзофталмический зуб.

языкоглоточного нерва) и X (блуждающего нерва) черепных нервов .

ЖЕЛУДОК

Фрукты не переносятся, вызывают болезненные отеки (Ars., Chin., Lach., Merc.).

Пристрастия (Am-c., Cina, Graph., Iod., Psor.).

Рвота во время дефекации (Ars., Camph., Tab.); сильная рвота с профузным поносом.

Рвота с позывами на рвоту сразу после еды (Ferr., Sanic.) **или после питья холодной воды** (Bry., Cupr., Kali-c., Verat-v.).

Хочет есть только мясо и пить молоко, что приносит облегчение (Apis, Ars., Chel., Nux-v.).

Икота возникает при рвоте.

Рвота во время прорезывания зубов.

Рвота: желчная, черная, пенная, зеленая, желтая или похожая на рисовый отвар, с кислым запахом.

Не любит: завтрак, горячие напитки и горячую еду.

Пристрастия: **Холодные напитки** (Ars., Cham., Chin., Cina, Nat-s., Phos.), **огурцы** (Ant-c., Phos., Sulph.), **лед** (Calc., Elaps, Med., Nat-s.), мороженое, **лимоны** (Bell., Merc., Sabad., Sacch.), освежающие продукты, **соль** (Carb-v., Lac-c., Nat-m., Phos.), сардины и **кислые фрукты** (Ars., Cist., Med., Thuja.).

ЖИВОТ

Желудочно-кишечные жалобы, сопровождающиеся холодным потом на лбу (Carbo-veg., Chin., Op.).

Очень полезен при перитоните, вызванном инвагинацией, разрывом аппендикса или ущемленной грыжей (Bell., Lyc., Nux-v., Plb.) .

Задержанный метеоризм.

Боль в животе, распространяющаяся на мошонку и семенные канатики, усиливающаяся при кашле.

Болезненное втягивание живота во время рвоты.

Обратная перистальтика.

Результаты теста:

- **Паховая грыжа** (Bell., Guaj., Lyc., Nux-v.).

При пальпации: **холодная** (Ambr., Hell., Meny., Phos., Sulph.), твердая и болезненная.

Пупок чувствителен к прикосновению (Kali-c., Lyc., Sep., Sil.).

Чувствительность к точке Макберни.

ПРЯМАЯ КИШКА

Детская холера, сопровождающаяся обильным холодным потом (Ars., Camph., Sec., Sil., Tab.).

Запор у маленьких детей (Alum., Bac., Caust.); стул затрудненный, хотя и мягкий.

Безболезненный понос после гнева, страха, **огурцов**, питья холодной воды в жаркий день (Carbo-veg., Nat-s., Nux-m.), **фруктов** (Ars., Bry., Chin., Coloc., Nat-s., Puls.) или после промокания под дождем (Acon., Calc., Rhus-t.).

Стул выходит **непроизвольно из-за шока** (Gels., Op., Phos.) или вместе с газами.

Стул: Остро-едкий, желчный, черного или зеленого цвета, без запаха; водянистый и выделяется в больших количествах.

Результаты теста:

Кал: лейкоциты ++ (Arn., Merc., Puls.), эритроциты и членики ленточных червей.

Посев кала: E. coli, Salmonella typhi, Shigella и V. cholerae.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Непроизвольное мочеиспускание при кашле или чихании (Caust., Nat-m., Puls.).

Отсутствие позывов к мочеиспусканию, несмотря на растянутый мочевой пузырь (Ars., Caust., Hyos., Phos., Plb.).

Задержка мочи у детей, страдающих гиповолемическим шоком вследствие обезвоживания (Camph., Canth., Lach., Op.).

Скудная, густая, зеленоватая моча (Camph., Merc-c.).

Результат теста:

- Моча: кишечная палочка, зернистые цилиндры + и лейкоциты ++.

ГОРТАНЬ И ТРАХЕЯ

Laryngismus stridulus (Bell., Gels., Ign., Mosch.).

Спазмы в гортани вследствие кашля (Cor-r., Cupr., Dros., Hyos., Sulph.).

ДЫХАНИЕ

Астма в сырую погоду (Aur., Chin., Dulc., Nat-s.) **или от эмоционального возбуждения** (Acon., Coff., Gels., Ign.); **с коллапсом**.

Ребенку становится легче дышать, если запрокинуть голову назад (Bell., Cham., Spong.).

Результат теста:

- Нерегулярное, хриплое и неровное дыхание.

КАШЕЛЬ

Запущенный коклюш с осложнениями.

Постоянный сильный кашель с удушьем (Carbo-veg., Dros., Nit-ac., Puls.).

Кашель, особенно во время плача (Arn., Bell., Cina, Hep.).

Кашель глухой и приступообразный, с 3–4 кашлями каждый раз.

Коклюш с судорогами (Cupr., Kali-br., Meph., Sep.).

Результат осмотра: Задыхающийся воздух при кашле.

Грудь

Пневмония при сыпном тифе (Ant-t., Arn., Ars., Bry., Op., Phos., Sulph.).

Ревматический эндокардит.

Спазмы диафрагмы (Arg-n., Bell., Mosch., Stram.).

Результат теста:

- Рентгенограмма грудной клетки: коллапс; консолидация; усиление бронховаскулярного рисунка; плевральный выпот; тромбоэмболия легочной артерии.

Назад

Шея настолько слаба, что больной едва может держать голову прямо (Gels., Nux-m.).

Результаты теста:

Похудение мышц шеи (Calc, Lyc, Nat-m, Sanic).

Спазмы мышц шеи при повороте головы.

КОНЕЧНОСТИ

Подергивания и судороги конечностей ночью в постели.

Результаты теста:

Походка: шатающаяся, покачивающаяся, шатающаяся и шатающаяся (Arg-met., Bar-c., Caust., Nux-v., Plb., Rhus-t.).

Ледяной холод рук и ног (Camph., Carbo-veg., Eup-per., Nux-m.).

Морщинистые руки и пальцы (Ph-ac., Phos.).

Посинение кистей рук и ногтей с ознобом (Ars., Chin., Nat-m., Nux-v., Rhus-t.).

КОЖА

Мурашки по коже, особенно после употребления спиртного (китайск.).

Результаты теста:

Синюшное изменение цвета (Carbo-veg., Dig., Lach., Op., Verat-v.).

Ледяной холод (Ars., Calc., Camph., Carbo-veg., Nat-m.).

Чесотка (Ars., Kali-s., Psor., Sulph.).

СПАТЬ

Коматозное состояние или длительный сон, длящийся несколько дней (Lach., Sep.).

Во время сна: носовые кровотечения, скрежет зубов (Ars., Bac., Cina, Tub.), стоны (Bar-c., Bry., Op., Stram.), крики (Borx., Lyc., Puls., Tub., Zinc.) и внезапные вздрагивания (Hyos., Kali-c., Op., Tarent.).

Сонливость при лихорадке (Anac., Apis, Borx., Rhod., Sulph.).

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Сначала мороз, потом жар, потом пот.

Мороз:

- Хуже по утрам, не лучше от тепла в любой форме (Chin., Cina, Lach., Merc., Nux-v., Phos.).

• Нагревать:

Желание раскрыться (Apis, Chin., Ferr., Op., Puls., Staph.).

Суженные зрачки.
Носовые кровотечения.
Покраснение лица.

• Пот:

Суженные зрачки.
Длительное, кислое (Colch., Hep., Iod., Merc., Psor., Sulph.) потоотделение, даже в афебрильной стадии.

• Результаты теста:

Анализ крови: анемия и лейкоцитоз.
ЦСЖ: H. influenzae +, менингококки +.
Мазок/толстая капля: малярийные паразиты (церебральная малярия).

Судороги

• Жалобы, вызванные:

Лихорадка (малярийная или менингеальная) (Bell., Caust., Cina, Ferr-p., Hyos., Nux-v., Stram.).

Гнев или испуг у младенцев (Cham., Cupr., Nux-v., Op., Puls., Staph.).

Кашель (Cina, Cupr., Ipec.).

• Во время судорог:

Жевательные движения или плотное стискивание челюстей (Bry., Calc., Hell., Lyc., Phos., Stram.).

Ледяной холод лица и конечностей (Bell., Camph., Cic., Cupr., Hell.).

Выраженный цианоз с синюшным оттенком лица (Bell., Cic., Cina, Cupr., Hydr-ac., Hyos., Ipec., Oena.).

Клонико-тонические сокращения.

Пена у рта.

Подергивания, начинающиеся в конечностях.

Стон.

Вращательные движения головой (Bell., Cupr., Stram., Tarent., Tub.).

Крик.

Буйный темперамент (Bell., Stram.).

• После судорог:

- Обморок с холодным потом (Cupr., Nux-v.).

Общий

Это средство представляет собой типичную картину шока с сердечно-сосудистой недостаточностью, вызванной либо гиповолемией, либо низким сердечным выбросом, периферической недостаточностью кровообращения или сепсисом; оно характеризуется коллапсом с ледяным холодом всего тела, холодным потом, цианозом, гипократовыми чертами лица, малым, едва прощупываемым пульсом и неопределяемым артериальным давлением.

Легко теряет сознание даже при незначительных травмах или боли (Cham., Hep., Nux-v.).

Слабость от потоотделения (Arn., Camph., Quinin-s., Iod., Merc., Psor.).

Хуже от перемены погоды с теплой на холодную (Caust., Dulc., Merc., Rhus-t., Sil.).

Источник

Синоним: Морозник белый. Семейство Лилейные .

БАРВИНОК МАЛЫЙ

(Вечнозеленое растение - Лиана.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Раздражительный из-за психического напряжения. Угрюмый и склонный к спорам, но быстро раскисающийся и извиняющийся.

Экзема кожи головы и лица. Мокнувшие, гнойные высыпания с неприятным запахом. Седой дерматит; сильный зуд кожи головы, усиливающийся ночью.

Выпадение волос, отрастающие волосы седые. Спутанные волосы (синтетические). Незначительная спутанность волос. Ощущение покалывания и жжения, сопровождающееся зудом в коже головы, вызванное головными вшами.

Мокнувшая экзема на лице, особенно вокруг носа; жирная кожа лица.

Чесотка у детей: неприятно пахнущая сыпь с шелушащимися чешуйками.

Непреодолимое желание чесать голову.

Красный нос, когда злишься.

Источник

- Относится к семейству кутровых (Аросупасеае).

ФИАЛКА ДУШИСТАЯ

(Мартовская фиалка - Виол-о.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Сильное отвращение к музыке.

Высокие, худые девушки со светлой кожей и темными волосами.

Постоянное чувство напряжения в коже головы, заставляющее ребенка хмуриться.

Склонность к мигреням в области бровей.

Хориоидит (воспаление сосудистой оболочки глаза).

Инфекция среднего уха, подавленная аллопатической медициной (антибиотики и противовоспалительные ушные капли), и в результате — глухота как отдаленное последствие.

Выделения из уха с рождения. Инфекция среднего уха слева, гной в ухе с сильной, колющей и стреляющей болью.

Заражение глистами.

Чрезмерная слабость мышц шеи. Невозможность держать голову прямо из-за её тяжести.

Ревматизм у детей, особенно правосторонний, в правой дельтовидной мышце, правом запястье и правом колене. По словам доктора Геринга, это специфическое средство от ревматизма запястья.

Источник

- Относится к семейству фиалок (Violaceae).

ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ

(Пэнси - Виол-т.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Вредный и ворчливый. Торопливый во всех делах. Весёлый вечером и раздражительный днём.

Дети с импетиго и хронической экземой эмоционально страдают от отвержения или несправедливости со стороны членов семьи, от которых они эмоционально зависят. Ситуация становится настолько тяжёлой, что ребёнок не может избежать этой ситуации, но также не способен защитить свои права.

Импетиго и розацеа. Сыпь с лица распространяется на кожу головы.

Себорейный дерматит или корки на голове с толстыми корками и обильными выделениями густой желтоватой жидкости, которая склеивает волосы.

Болезненная сыпь с сильным, непреодолимым зудом. Зуд усиливается ночью и временно облегчается растиранием. Экзема обостряется зимой. Увеличенные, опухшие и затвердевшие шейные лимфатические узлы.

Нервные жалобы, особенно мышечные подергивания из-за подавленных кожных высыпаний.

Потливость лица во время еды.

Глистная инвазия у детей.

Угревая сыпь в подмышках, нездоровая кожа, каждая царапина нарываяет или заживает очень медленно.

Моча с резким запахом, напоминающим запах кошачьей мочи.

Бели у молодых девушек.

Очень морозно.

Спите, запрокинув голову назад.

Источник

- Относится к семейству фиалок (Violaceae).

ZINCUM METALLICUM

(Элементарный цинк - Цинк.)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Дух

Болтливый при лихорадке (Bapt., Gels., Lach., Pyrog., Stram., Teucr., Tub.).

Щекотка (Kali-c., Phos., Sil.).

Множество жестов: тики (Agar., Cupr., Stram., Verat.), кладение пальцев в рот (Calc., Cham., Ipec., Sacch.), стояние или сидение в странных позах (Agar., Cina, Coloc., Nux-m., Op., Plb.).

Поспешная еда и питье (Bell., Coff., Hep., Sulph.).

Ночные ужасы (pavor nocturnus) (Aur-br., Cina, Kali-br., Stram.).

ТЕЛО

Беспокойные ноги, особенно беспокойные стопы, хуже в постели (Sulph.) и сидя (Alum., Bar-c., Puls.).

Чувствительность к холодным сквознякам (Calc., Kali-c., Rhus-t., Sil., Sulph.).

Перевозбуждение ЦНС приводит к беспокойству и непроизвольным движениям (Agar., Hyos., Stram.); затем наступает состояние вялости (Anac.).

Нервное истощение из-за стресса, связанного с учебой в школе (Bar-c., Lyc., Nux-v., Sil.).

Подергивания во время сна, иногда здесь, иногда там (Cham., Hyos., Stram.).

Другие важные симптомы

Дух

Притупление сознания с невозможностью сосредоточиться (Agar., Bar-c., Bar-m., Op.).

Легко вздрагивает по пустякам и во сне (Borx., Hyos., Kali-c., Merc., Puls., Tarent., Verat.).

Ночные кошмары у детей (Ars., Borx., Calc., Cina, Kali-br., Stram., Tub.).

Беспричинный плач (Apis, Cina, Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.).

Ребенок чрезвычайно чувствителен к музыке и шумам; даже шелест бумаги для него невыносим (Asar., Ferr., Lyc., Nat-c., Nat-s.).

Послушные дети.

Предпочтение розовому цвету (Ign., Nux-v., Phos., Sep., Sil.) и белому цвету (Ars-i., Lach., Nux-v., Phos., Sep., Sil., Staph., Tub.).

Страх темноты (Carc., Cann-i., Med., Stram., Tub.), привидений (Lyc., Med., Phos.) и грабителей (Ars., Lach., Merc., Nat-m., Phos.).

Слабые художественные способности (Bell., Calc., Hyos., Mag-c., Plat., Staph., Stram.).

Крики от гнева (Cham., Lod., Lac-e., Nux-v.) и во сне (Borx., Lys., Puls., Tub.).
 Очень недоволен (Anac., Carc., Hep., Merc., Tub.).
 Плохая память.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМ

Цинк. -ДЕТСКИЙ

Долго думает, прежде чем ответить (Bar-c., Cocc., Hell., Ph-ac., Phos.).

Анамнез: Мать перенесла сильный шок, связанный с гневом или унижением во время беременности, и родила умственно отсталого ребенка (Bufo, Carc., Cham., Kali-br., Op.).

Язык: Повторяет одно и то же снова и снова (смех, ругательства, банальности).

Отвечает односложно (Kali-br., Ph-ac., Puls., Verat.).

Реагирует очень медленно (Alum., Gels., Hell., Merc., Ph-ac., Phos.).

Хаотичный.

Тупой и сонливый, не понимает ни малейшей детали разговора, происходящего в его присутствии (Calc-sil., Sacch., Staph.).

Постоянно смеётся, в том числе и по пустякам (Cann-i., Hyos., Lys., Mosch., Puls., Stram., Stry.).

Любое умственное напряжение ухудшает состояние (Arg-met., Calc., Ign., Kali-p., Lys., Nat-c., Nux-v., Pic-ac., Staph., Tub.).

Язык бессвязный.

Речь медленная.

Язык неграмотный (Bell., Hyos., Ph-ac., Stram.).

ГОЛОВА

Головные боли у детей, перегруженных учебной работой (Bar-c., Calc-p., Kali-p., Pic-ac.).

Гидроцефалия после детской холеры или диареи.

Результаты теста:

Холодный лоб с горячим затылком (Agar., Camph., Sulph., Verat.).

Дети с гидроцефалией, которые имеют тенденцию зарывать голову в подушки или биться головой о предметы и постоянно скрежещут зубами (Apis, Bell., Tub.).

Непроизвольные движения головы при разговоре (Acon., Cocc.).

Наморщенный лоб (Caust., Cham., Graph., Lys., Nux-v., Stram.).

Знак Брудзинского +.

Ребенок не может держать голову прямо.

Волосы: Ощущение, будто они стоят дыбом, чувствительные.

Знак Кернига +.

Вращение головой.

ГЛАЗА

Слезы текут во время еды (Оп-ан.).

Светобоязнь.

Результаты теста:

Гиппус (зрачки лопастеобразные).

Помутнение роговицы (Arg-n., Con.).

Зрачки: Один узкий, другой широкий (Физика, Род.).

Отек хряща века (Staph., Thuja.).

Симптом Аргайла-Робертсона.

Халазион.

Конъюнктивит.

Синдром Фостера-Кеннеди.

Ученики Холмса-Эйди.

Ирит.

Паралич верхних век (Caust., Gels.).

Птериgium.

Покачивание, нистагм.

Прищуриться.

Запавшие глаза.

Уши

• Результаты теста:

Отorea с выделением зловонного гноя.

Пот вокруг ушей (Calc., Puls.).

Нос

• Результат теста:

- Постоянно ковыряет и ковыряет пальцами в носу (Arum-т., Сил.).

Лицо

• Результаты теста:

Гиппократовое выражение лица (Эф., См.).

Губы липкие, сухие и потрескавшиеся.

Рот

• Результаты теста:

Трещины в углах рта (Cund., Graph.).

Десны губчатые, отслоенные от зубов (Kali-p., Merc.).

Неприятный запах изо рта.

Герпес на языке (Nat-m.).

Шея

Пища застревает в горле при попытке ее проглотить (Lach., Nit-ac.).

Поперхивание при глотании (Lys., Puls.).

Мокрота: зеленовато-желтая, труднооткашливаемая.

Результаты теста:

Паралич блуждающего нерва.

Миндалины увеличены и воспалены.

Желудок

Большая спешка во время еды и питья (Coff., Hep.).

Рвота возникает сразу после употребления жидкости (Ant-c., Phos.).

Приступы голода в 11 утра (йод., сульф.).

Сильная икота (Nat-m., Nicc., Stram.).

Сильная жажда.

Потеря аппетита при чистом языке.

Рвота: черная и кровавая.

Ухудшение: хлеб (Bry.), молоко (Aeth., Mag-m.) и дыни (Ars., Puls.).

Отвращения: **рыба** (Colch., Graph.), сахар (Caust.) и **сладости** (Graph., Phos.).

Пристрастия: Холодные напитки и холодная еда (Phos., Verat.).

Результат теста:

- Эндоскопия: **ахалазия кардии**, спазмы пищевода, гастрит и *Helicobacter pylori*.

ЖИВОТ

Непроизвольное выделение стула (Podo., Psor.) **и мочи** (Aloe, Mur-ac.) **во время сна.**

Результаты теста:

Врожденный мегаколон.

Паралитическая непроходимость кишечника.

Паховая грыжа.

Печень увеличена и тверда.

Втянутая брюшная стенка.

ПРЯМАЯ КИШКА

Затрудненное отхождение стула, хотя стул мягкий (Nux-m., Sep.).

Нервная диарея (Arg-n., Gels.).

Стул обильный, сухой и трудноопорожняемый (Bry., Mag-m.).

Результаты теста:

Разъедающая влага вокруг ануса (Carbo-veg., Nit-ac.).

Выпадение прямой кишки.

Черви.

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Непроизвольное мочеиспускание при кашле (натур., пульс.).

Результаты теста:

Мочевой песок образует осадок в подгузнике.

Уродинамическое исследование: паралич детрузора мочевого пузыря со слабостью сфинктера.

КАШЕЛЬ

Ребенок каждый раз при кашле прикасается к своим гениталиям (чтобы избежать непроизвольного мочеиспускания).

Сильный кашель (Апас., Nux-v.).

ДЫХАНИЕ

Астма, начавшаяся после подавленной кори (карбо-вег.).

Хотелось бы, чтобы меня обмахивали веером от астмы.

Если у ребенка астма, у него возникают трудности с кашлем.

Затрудненное дыхание из-за метеоризма (Carbo-veg., Nux-v.).

• Результаты теста:

дыхания при кашле (Ant-t., Cupr., Dros.).

Быстрое, тревожное, прерывистое, хриплое и медленное дыхание.

Хрипы по всей груди.

Грудь

• Результаты теста:

Перикардальный выпот.

Плевральный выпот.

МУЖСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

Склонность к мастурбации.

Результат теста:

- Неопущенные яички следует пропальпировать в брюшной полости.

НАЗАД

Спина чувствительна к прикосновению или давлению.

Результат теста:

- Опиостонус во время судорог (Ars., Cic.).

КОНЕЧНОСТИ

Чувствительные подошвы ног (Kali-c., Lyc., Med.).

Результаты теста:

Непрерывные автоматические движения пальцев (Lach., Stram.), рук (Kali-i.) и ног (Caust.): непроизвольные (Crot-c., Stram.) и нервные.

Синие руки.

Феномен шестерён.

Сокращение мышц и сухожилий верхних и нижних конечностей.

Глубокие сухожильные рефлексy слишком сильны.

Руки дрожат, когда лежат на столе (Станн.).

Мышечный тонус ++.

Спотыкающаяся, спастическая походка; шатается при ходьбе (Agar., Caust.), особенно в темноте и с закрытыми глазами (симптомы со стороны задних столбов).

СПАТЬ

Во время сна: жевательные движения челюсти (Calc., Ign.); скрежетание зубами (Ars., Tub.); открытый рот; крик; подергивание мышц и плач (Cham.).

Спит, зарывшись головой в подушку (Apis, Hyper.).

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Гнойный или криптококковый менингит.

Сильный озноб с лихорадкой.

Пот после лихорадки.

Полезно при постоянной лихорадке, лихорадке с экзантемой (особенно при кори) и тифе.

Результат теста:

- Коричневая окраска языка.

Судороги

Жалобы, вызванные **травмами головы (Cic., Nat-s.)** или **позвоночника** , а также после **подавления высыпаний** (Cupr., Hyos.).

Во время судорог ребенок вскакивает с кровати, **скрежещет зубами, закатывает глаза, крутит или зарывает голову в подушку или ударяется ею о предметы** и непроизвольно мочится (Bufo, Hyos.).

Общий

Улучшается любая форма секреции (диарея, пот и т. д.) (Lach., Phos.).

Не вызывает сыпи при тяжелом иммунодефиците.

Потеря веса у детей, несмотря на хорошее питание (Calc-p., Nat-m.).

Неврологические жалобы, возникающие после подавления высыпаний (Bry., Dulc.) или после подавления секреции.

Затрудненное прорезывание зубов с диареей.

Выделения: едкие, кровянистые, абразивные и разъедающие слизистые - выделения, гной, стул, язвы, моча и рвота.

В целом улучшается прием пищи (Iod., Nat-c.).

Увеличение желез, болезнь Ходжкина.

Чувствительность к холодным сквознякам (Rhus-t., Sil.).

Склонность к простудам (Bar-c., Kali-c., Tub.).

ЧАСТЬ III

РЕПЕРТОРИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ РЕПЕРТОРИЙ ДЕТСКИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ СРЕДСТВ

(Примечание редактора: данный реперториум не претендует на полноту. Не все препараты, перечисленные в реперториуме, имеются в фармакологии.)

А

Злоупотребление
слабительными
истощение

Agar, Ant-c, Bry, Coloc, Lach, Nux-v, Op, Puls
Аброт, Ацет-ак, Амбр, Апис, Арс, Арум-т, Бак, Бар-ц, Бар-м, Белл, Бор, Буфо, Кальк, Кальк-хп, Кальк-сил, Карк, Кауст, Чин, Чир-ф, Сина, Купр, Ферр, Граф, Лодоф, Лод, Кали-п, Креос, Лак-ак, Лах, Лед, Лик, Маг-с, Маланд, Мош, Мигаль, Нат-м, Нит-ак, Нукс-в, Ол-дж, Оп, Фос, Пин-с, Плб, Псор, Пульс, Сакх, Саник, Сек, Сен, Сил, Стафилококк, Сульф, Сульф-и, Сиф, Тарент, Тойер, Тер, Туй, Тир, Туб, Туб-а, Туб-м, VAB, Верат

Абсцессы

Anan, Ant-c, Ant-t, Apis, Arn, Ars, Asaf, Aur, Bac, Bar-c, Bar-s, Bell, Berb, Bor, Brom, Bry, Bufo, Calc, Calc-hp, Calc-m, Calc-p, Calc-pic, Calc-sil, Caps, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Con, Crot-h, Elat, Fl-ac, Hecla, Hep, Ign, Iod, Jug-r, Kali-br, Kali-c, Kali-i, Kali-p, Lac-c, Lac-h, Lach, Led, Lyc, Mag-c, Merc, Narc-ps, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Ph-ac, Phos, Pyrog, Psor, Puls, Rhus-t, Sanic, Sil, Staph, Stram, Sulph, Сульф-и, Сиф, Тарент, Тарент-с, Тер, Туй, Туб

Ахалазия
Эддисон М.

Цинк
Ant-c, Bac, Calc, Calc-p, Caust, Chin, Iod, Nat-m, Phos, Sil

Аденит
Аденоиды

Апис, Бар-с, Кали-с, Кали-м, Мерк
Агра, Кальк, Кальк-п, Карк, Лик, Маг-с, Псор, Спиг, Стафилококк, Сульфат, Туй, Туб

Ожирение см. ожирение
Аденопатия
СПИД см. ВИЧ
акне

Бар-с

Amph, Ant-c, Aran, Ars-i, Bar-s, Bell-p, Bov, Brom, Bufo, Calc, Calc-pic, Caps, Carb-v, Carc, Chlorpr, Graph, Hydr, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Lyc, Mag-m, Maland, Med, Nit-ac, Nux-v, Psor, Puls, Sep, Sil, Staph, Thuja, Tub, Viol-t

Акне розацеа

Арс, Аур, Кальк, Кальк-сил, Кауст, Креос, Фос, Сил, Стафилококк, Сульфи-и, Виол-т

Акромегалия

Бар-к, Карб, Мед, Тир

Алкаптонурия	Янтарь
алкоголизм	Агар, Капсулы, Карцинома, Псориаз, Сифилис
Аллергии	Апис, Агар, Агат-а, Амбр, Ант, Антип, Муравей-т, Арс, Бак, Бар-м, Бор, Бов, Бром, Кальк-сил, Чин, Хлор, Кок-с, Купр, Дес-ак, Кали-с, Лак-с, Лак-д, Лак-дель, Лах, Мед, Мер-д, Нат-с, Нукс-в, Олнд, Фос, Питу-а, Псор, Пульс, Саник, Сульф, Тер, Туй, Тир, Туб
Аlopecia areata sa выпадение волос синдром Альпорта амблиопия амёбы	Aur, Vac, Calc-p
	Сиф
	Китай
	Анис, Anth, Ant-t, Calc-p, Caps, Gamb, Lyc, Merc, Merc-d, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Thuj
анемия	Abrot, Ant-t, Bor, Bry, Calc-lac, Calc-p, Calc-sil, Carc, Chin, Chlorpr, Cupr, Ferr, Kali-c, Kali-p, Lach, Lyc, Merc, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Phos, Plb, Psor, Puls, Sacch, Staph, Thuj, Verat
анестезия	Оп, Фос
Анальное кровотечение	Apis, Vac, Bar-s, Calc, Calc-p, Ign, Nat-m, Rheum, Tarent
Анальные трещины	Кальк-сил, Чам, Граф, Игни, Мур-ак, Нит-ак, Плат, Плб, Крыса, Рута, Сен, Сил, Сульф, Сиф, Туй, Туб
Анальные свищи sa Fistulas	Ant-c, Verb, Calc-p, Caust, Нер, Merc, Sil, Sulph, Tub
Анасарка	Acet-ac, Aeth, Apis, Oxyd, Plb
аневризма	Аур, Бар-ц, Кали-бр, Лик, Фосс, Сиф, Туй
Ангиомы	Ant-t, Kreos, Lach, Thuj
Ангионевротический отек (отёк Квинке)	Агар, Антип, Апис, Тир
анорексия	Муравей-ц, Бар-ц, Карк, Чам, Чин, Цина, Ферр, Игн, Кали-бр, Кали-м, Кали-п, Лах, Мерк, Нат-м, Плат, Псор, Сакч, Сил, Тарент, Цинк
Антибиотики	Ant-t, Ars, Bry, Coff, Lyc, Mosch, Nit-ac, Nux-v, Puls, Sil, Staph, Stram, Sulph, Thuj, Tub
Дефект аортального клапана, аортальный стеноз, апоплексия, см. инсульт, аппендицит	Аран, Аур, Сакх, Сиф
	Аур
	Apis, Bell, Bry, Echi, Kali-c, Lach, Merc, Merc-d, Nat-s, Phos, Plb, Pyrog, Rhus-t, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Verat
Афтозные язвы	Аэт, Агар, Анис, Муравей-с, Аран, Арс, Бапт, Бор, Брай, Шапки, Карк, Чин, Хлор, Кон, Ад, Кали-бр, Кали-м, Кали-п, Креос, Лак-ак, Лак-к, Лак-дель, Лак-ч, Лик, Мед, Мерс, Мерс-си, Мер-д, Мур-ак, Нат-м,

Афтозные язвы (продолжение)	Nit-ac, Nux-v, Phos, Plb, Psor, Sacch, Sanic, Sars, Staph, Sulph, Sulph-i, Sul-ac
артрит	Abrot, Acon, Ant-c, Apis, Aur, Bry, Calc-f, Calc-p, Caust, Cham, Cic, Graph, Hipp, Led, Lith-c, Lyc, Med, Merc, Nat-s, Nux-v, Rhus-t, Sil, Sulph, Sulph-i, Syph, Thuj
Остеоартрит	Бенц-ак
синдром Аспергера	Андрок, Ант-с, Бар-с, Буфо, Хиос
Астенопия	Агар, Квасцы, Арт-в, Кальк, Кауст, Сина, Гели, Джеб, Нат-м, Онос, Рута, Сен
астма	Acon, Aeth, Agar, Am-c, Ambr, Ant-c, Ant-t, Apis, Aral, Aran, Arg-n, Ars, Ars-i, Aur, Bac, Bar-c, Bar-m, Bar-s, Bell, Bromine, Bry, Bufo, Calc, Calc-p, Calc-sil, Camph, Caps, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chel, Chin, Хлор, Кофф, Крот-т, Купр, Дес-ак, Дульк, Ферр, Гели, Грин, Хиос, Иктод, Игн, лод, Ипек, Кали-би, Кали-с, Кали-м, Кали-п, Кали-с, Креос, Лак-дель, Лах, Лик, Мед, Мерс, Мош, Нафтин, Нат-м, Нат-с, Нукс-в, Ол-ан, Оп, Фосс, Плат, Psor, Puls, Sabad, Sach, Samb, Sanic, Sep, Sil, Spong, Squil, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Thuj, Thyр, Tub, Verat, Zinc
Астигматизм Астроцитомы	Ferr, Lil-t, Med, Sep, Tub
Асцит	Плб Аброт, Ацет-ак, Ант-т, Апис, Апок, Арс, Брай, Камф, Кауст, Чин, Колх, Купр, Диг, Ферр, Кали-бр, Кали-с, Кали-м, Кали-п, Лах, Лик, Мерс, Нит-ак, Нукс-в, Оксид, Сакх, Сен, Сил, Тарент, Туй, Туб
Атаксия	Агар, квасцы, кон, гиос, тарентум
Ателектаз	Гиос, сульфид
Атерома (см. кисты, задерживающие салоотделение)	Агар, Ор
Атетоз	
Атопическая экзема см. атопический дерматит Синдром дефицита внимания (СДВ)	Эт, Агар, Белл, Маг-с, Мигаль, Оп, Псор, Сакч, Тарент, Тер, Верат
Воспаление глаз	Apis, Arg-n, Ars, Bad, Calc, Coc-c, Euphr, Hep, Ign, Kali-bi, Med, Merc, Naphtin, Nit-ac, Phos, Puls, Rhus-t, Sacch, Sil, Sulph, Thuj
Заболевания глаз Язва глаза Боль в глазах Травмы глаз	Укол Апис, Арс, Calc-p, Jab, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Staph, Syph Acon, Arn, Calc, Cic, Coc-c, Euphr, Merc-c, Nit-ac, Puls, Sil, Staph, Symph, Thuj
Сыпь см. экзема	Аброт, Ает, Агар, Аил, Андрок, Ант-с, Ант-т, Арс, Аур, Бак, Бар-с, Бар-с, Бор, Брай, Кальк, Кальк-п, Кальк-сил, Кант, Капс, Карк, Кауст, Чам, Цик,

Цист, Клем, Кофф, Купр, Дульк, Граф, Ад, Хеп, Гидр, Хиос, Игн, Кали-бр, Кали-с, Кали-м, Кали-п, Креос, Лак-с, Лак-д, Лак-дель, Лак-ч, Лах, Лед, Лик, Маланд, Мед, Мерк, Мез, Нат-м, Нат-сил, Нат-с, Nit-ac, Nux-v, Olnd, Op, Petr, Phos, Psor, Puls, Rhus-t, Sacch, Saccha, Sanic, Sep, Sil, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Thuj, Tub, Vac, Vinc, Viol-t, Цинк

Обезвоживание см. Обезвоживание

Истощение см. Истощение Аутизм

Аутоиммунные заболевания Aeth, Bar-c, Bufo, Hyos, Op
Сиф, Тудж

Б

Баланит Мерс
дегенерация диска Ванна
ленточный червь Ambr, Ars, Calc, Caust, Cina, Cinnb, Coff, Cupr, Fil, Ign, Kali-c, Lyc, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Phos, Plat, Psor, Puls, Sep, Sil, Sulph, Expensive, Verat

Перитонит см. перитонит боль в животе Ant-c, Ant-t, Ars, Cina, Ign, Merc, Nat-m, Nux-v, Pitu-a, Psor, Puls, Sep, Staph, Sul-i, Taranto

Грыжа брюшной стенки М-ост
вакцинация БЦЖ Abrot, Calc, Tub, VAB

Ночное недержание мочи см. энурез

Конъюнктивит
см. конъюнктивит

Биполярное расстройство

Укушенные раны (включая укусы языка)

метеоризм Андок
Абсин, Арс, Арт-в, Буфо, Кауст, Цик, Купр, Хиос, Лах, Нита-ак, Оп, Фосс, Фос-ак, Страм, Тарент
Агар, Агат-а, Алоэ, Амбр, Анис, Муравей, Муравей-т, Арге, Арг-н, Арн, Арс, Асаф, Аур, Бак, Бар-с, Бар-с, Белл, Бисм, Бор, Брай, Буфо, Кальк, Кальк-п, Карб-в, Кастм, Кауст, Чам, Чин, Кофф, Ферр, Гамб, Геп, Хиос, Игни, Джал, Кали-бр, Кали-с, Кали-м, Кали-п, Лак-с, Лак-дель, Лак-лео, Лах, Лик, Маг-с, Маг-п, Мерс, Мосх, Нат-м, Нат-п, Нат-сил, Нат-с, Нит-ак, Нукс-в, Олнд, Оп, Фак, Фос, Плат, Плб, Подо, Псор, Пульс, Раф, Реум, Сакх, Саник, Сенн, Сен, Сил, Стафилококк, Страм, Сульфат, Таранто, Туй,

Инфекция мочевого пузыря см. цистит

Полипы мочевого пузыря

Кальк, Сил, Дорого
Ambr, Creos, Sil, Tarentum

Блефарит	Aeth, Ant-c, Arg-met, Ars, Bac, Bar-c, Bar-s, Borax Carbn-s, Cham, Graph, Kali-c, Lyc, Mag-c, Med Syph, Part, Verat
Аппендицит см. аппендицит	
Высокое кровяное давление, см.	
Гемангиома имеет тенденцию кровоточить.	Акон, Бак, Белл, Карк, Ферр, Хиос, Кали-с, Кр Лах, Мош, Фосс, Сабин
Пограничный синдром	Андрок
бронхит	Ant-t, Ars, Bac, Bar-c, Bar-m, Bar-p, Bar-s, Bry, C act, Calc-sil, Carc, Cham, Cina, Diph, Diphtox, I- Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kreos, Lach, Phos, Psor, St Tub, Tub-a, VAB
Бронхоэктатическая болезнь	Бакалавр, Мед.
Бронхопневмония	Ant-t, Bac, Med, Tub
горбатый	Bac, Calc-p, Plb, Tub
булимия	Агар, Агат-а, Анан, Муравей-с, Аур, Шапки, К Граф, Хиос, Игни, Кали-с, Кали-м, Лак-с, Нат-м, Плат, Саник, Стафилококк, Тер, Тудж
Бурсит	Кали-м
с	
Инфекция Candida см. молочница	
синдром Карпентера	Аур
Халазион	Benz-ac, Platan-oc, Psor, Puls, Staph, Sulph, Thuja, Tub, Zinc
Хемоз	Акон, Апис, Белл, Брай, Евфр, Лах, Лик, Мерк, Туй, Весп
Хинин, злоупотребление	Aran, Ign, Merc, Nat-m, Nux-v, Phos
Хламидиоз	Туй
холера	Муравей, Белл, Кальк, Кальк-п, Купр, Гамб, Гуай, Джатр-ц, Кали-бр, Кали-п, Фосс, Сал-ак,
Детская холера	Aeth, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Calc-p, Camph, Cham, Chin, Ferr, Guaj, Kali-br, Med, Phos, See, Sil, Tab, Stram, Verat, Цинк
Холестеатом	Calc, Calc-f, Diph, Kali-m, Psor, Sil
Хорея	Аброт, Агар, Агарин, Ант-т, Арт-в, Белл, Буфо, Кальк, Кастм, Кауст, Чам, Хлорпр, Цик, Сина, Кофф, Купр, Кипр, Ад, Хиос, Игни, Индг, Кали-бр, Кали-п, Лаур, Лик, Маг-п, Мигаль, Нат-м, Нукс-в, Оп, Ф-ак, Фос, Скат, Спиг, Стафилококк, Страм, Таранто, Тер, Тудж, Зиз
Малая хорея (хорея Зуденхема)	Art-v
Хориоретинит	Кали-м

Хориоидит	Джеб, Виол-о
Колит	Алоэ, Арс, Гели, Лик, Нат-с, Мерк
Язвенный колит	Вас, Calc-p, Cham, Ign, Merc, Nat-s, Nux-v, Sulph, Thuj, Tub
Commotio см. сотрясение мозга	
Костохондрит	Арн, Сиф
Соха vara	CALC, CALC-п
Синдром кошачьего крика	Аур, Карк
болезнь Крона	Calc-p, Nat-s, Nux-v, Phos, Psor, Thuj, Tub
Цитомегалия см. цитомегалия	
Д	
Дакриоцистит	Ant-c, Cupr, Lach
Кишечная непроходимость	Атро-с
Заворот кишок см. инвагинация	
Обезвоживание	Эт, Муравей, Муравей, Арс, Камф, Кант, Чин, Купр, Креос, Лах, Оп, Верат
пролежни	Кальций, Чам, Игн, Креос, Мед, Сеп, Сил, Сульф
бред	Aeth, Agar, Ail, Ant-t, Apis, Ars, Bapt, Bell, Bry, Bufo, Carb-v, Cina, Crot-h, Hyos, Ign, Lach, Kali-c, Kali-m, Merc, Op, Ph-ac, Phos, Plb, Psor, Puls, Rheum, Stram, Sulph, Expensive, Verat
Контагиозный моллюск	
лихорадка денге	Аран, Хёс
депрессия	Агат-а, Аур, Кальк-сил, Кауст, Игн, Кали-бр, Лак-ч, Лак-ср, Лах, Нат-м, Нат-сил, Ол-ан, Плб, Сакх, Сен, Сиф
Дермоидные кисты	Плб
Отклонение см. искривление носовой перегородки	
диабет	Alumn, Ambr, Ars, Calc, Calc-p, Carc, Caps, Caust, Chlorpr, Cupr, Ferr, Kali-c, Lac-ac, Lac-d, Lach, Lyc, Mag-c, Mosch, Nat-s, Op, Sacch, Sulph, Tarent, Thuj, Thyр
Диабет во время беременности	
Диарея см. диарея	Муравей-т
дифтерия	
Вакцинация против дифтерии, последствия	Caust, Lac-c, Sulph Дифтокс
Диплопия	Агар, Мед, Нукс-в, Оп, Страм, Тудж
синдром Дауна	Аур, Бар-к, Буфо, Кальк-п, Карк, Дес-ак, Мед, Тир
Злоупотребление наркотиками	Мерс
Вакцинация АКДС, последствия	Милосердие

Диарея

Abrot, Acon, Aeth, Agar, Agath-a, Agra, Aloe, Anth, Ant-c, Ant-t, Apis, Aran, Arg-n, Ars, Asaf, Aur, Bac, Bapt, Bar-c, Bar-s, Bell, Benz-ac, Bism, Bor, Brom, Bry, Calc, Calc-act, Calc-p, Calc-sil, Camph, Caps, Carb-v, Carc, Castm, Caust, Cench, Cham, Chel, Chin, Chion, Cina, Coff, Coli, Coloc, Crot-h, Crot-t, Cupr, Dig, Dulc, Eucal, Ferr, Flor-p, Gamb, Gels, Graph, Hell, Hep, Hyos, Ign, Iodof, Iod, Ipес, Jab, Jal, Jatr-c, Kali-br, Kali-c, Kali-chl, Кали-м, Кали-п, Креос, Лак-д, Лак-дель, Лак-ч, Лах, Лит-с, Лик, Маг-с, Маг-м, Мед, Мерс, Мер-д, Моск, Нат-м, Нат-с, Никс, Нит-ак, Нукс-м, Нукс-в, Олнд, Ол-j, Оп, Петр, Фак, Фос, Питу-а, Подо, Псор, Пульс, Реум, Рус-т, Румкс, Сакх, Саник, Сек, Сенн, Сен, Сил, Сквил, Стафилококк, Страм, Сул-ак, Сульф, Сульф-и, Сиф, Таб, Тойер, Тер, Туй, Тир, Туб, Урт-у, Верат, Цинк

Дизентерия

Дислексия (дислексия)

Капс, Ферр, Кали-п, Мерс, Нукс-в, Фосс

Бар-п, Белл, Кальк-п, Кальк-сил, Кауст, Хиос, Игни, Кали-бр, Лак-ч, Лах, Лик, Маг-с, Мерк, Мигаль, Нат-сил, Оп, Плб, Псор, Тарент, Тер

Дисрафизм

Плб

Э

Кишечная палочка

Ант-т, Арс, Купр, Гамб, Хиос, Лах, Мерс-д, Туй, Верат

Entamoeba histolytica см.

амёба, синдром Элерса-

Данлоса, синдром

Эйзенменгера, фурункулы,

абсцессы, нагноение

CALC

Лор

Антраци, Апис, Арс, Бар-ц, Бар-с, Белл, Бор, Буфо, Кальк, Кальк-лс, Кальц-п, Кальк-с, Календ, Чам, Чин, Тарент, Туй, Купр, Игнин, Кали-с, Кали-хл, Кали-м, Лах, Мерс, Мерс-ци, Нат-м, Нат-сил, Нат-с, Нит-ак, Фос, Plb, Psor, Puls, Sacch, Sep, Sil, Staph, Staphycos, Stram, Streptoc, Sulph, Tub, VAB, Viol-o

Экхимоз

Apis, Arn, Bell, Chin, Ferr, Kreos, Lac-c, Lac-h, Лыс, Nux-v, Sulph

Эклампсия (последствия у детей)

Ant-t, Cic, Hyos, Kali-br

Apis, Nat-m, Sil, Staph

Эктропион/Выворот века

Агар, Анак, Анан, Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Anthracо, Aur, Bac, Bar-c, Bar-s, Bor, Bry, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-sil, Carb-v, Carc, Caust, Chel, Cic, Crot-t, Cupr, Ferr, Graph, Ign, Kali-m, Kreos, Lach, Лыс, Маг-с, Мед, Мерк, Мерк-ир, Мез, Нат-м, Нат-сил, Нат-с, Нит-ак, Олнд, Оп, Петр,

Экзема с сыпью

	Psor, Sanic, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Thuj, Tub, Vinc, Viol-t
Экзема, атопический дерматит.	
Эмпиема	Апис, Арс, Ферр, Кали-с, Сил, Сульф, Ванночка
Эндокардит	Аброт, Ант-т, Арс, Аур, Хиос, Кали-с, Кальм, Креос, Лах, Нат-м, Фосс, Плат, Плб, Спиг, Тарент, Верат
Энурез	Aeth, Apis, Bac, Bac-t, Bar-s, Benz-ac, Calc-sil, Caps, Carc, Caust, Cham, Chlol, Chlorpr, Cina, Equis-h, Ferr, Gels, Hyos, Ign, Kali-br, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lach, Lyc, Mag-c, M-aust, Nux-v, Op, Ph-ac, Phos, Psor, Пульс, Реум, Саник, Сен, Сил, Сквил, Стафилококк, Страм, Сульф, Сиф, Туй, Тир
Энцефалит	Агар, Вак, Бар-с, Белл, Бор, Бры, Calc, Cham, Chin, Cic, Cina, Cupr, Hell, Hyos, Lac-c, Lach, Merc, Mosch, Op, Phos, Plb, Stram, Thuj
Энцефалопатия	Des-ac, Hyos, Phos
Эозинофилия	Карц
Эпендимома	Вертолеты
Эпидидимит	пульс
Эпилепсия с судорогами	Aeth, Agar, Am-br, Anan, Ant-t, Aran, Arg-n, Art-v, Aur, Bufo, Calc, Castm, Chlorpr, Cic, Cupr, Indg, Kali-br, Lach, Lyc, Mill, Mosch, Nat-s, Oena, Op, Plb, Puls, Stram, Sulph, Tarent, Ther, Цинк
Эписклерит	Aur, Kalm, Merc, Sep, Thuj
Эпителиома	Cic, Con, Kali-m, Kreos, Thuj
вирус Эпштейна-Барр са моноклеоз Ail	
Рвота	Аброт, Аэт, Агар, Андрок, Муравей-с, Муравей-т, Апис, Апом, Арс, Бак, Бар-с, Белл, Бисм, Бор, Брай, Буфо, Кальк, Кальк-м, Кальк-п, Камф, Карб-в, Карк, Кауст, Чам, Чин, Хлорпр, Цик, Сина, Кок-с, Кокк, Кофф, Колх, Купр, Кур, Дрос, Elaps, Elat, Ferr, Gels, Hell, Нер, Hyos, Ign, Ипес, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kreos, Lac-d, Lach, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Op, Petr, Phos, Plb, Podo, Psor, Puls, Реум, Сакх, Саник, Сеп, Сил, Страм, Сульф, Сульф-и, Таб, Тарент, Тер, Туй, Туб, Валер, Верат, Верат-в, Цинк, Цинк-с
Простуда	All-c, Apis, Ars, Bac, Bar-c, Bar-m, Bar-s, Brom, Bry, Calc, Calc-caust, Calc-p, Calc-sil, Caps, Carc, Cham, Dulc, Flav, Graph, Ign, Ипес, Jab, Jal, Kali-c, Kali-m, Lac-h, Mag-c, M-arct, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Ol-j, Phos, Psor, Puls, Rhus-t, Sep, Sil, Spong, Staph, Stict, Sulph, Sulph-i, Tarent, Tub, Tub-a, VAB, Zinc

Рожа	Ant-c, Apis, Bell, Bufo, Cham, Euphr, Graph, Kali-p, Lac-c, Lach, Rhus-t, Stram, Syph
Узловатая эритема	Ванна
Эритема	Аран, Кали-м
Экзантема	Acon, Apis, Bry, Euphr, Lach, Puls, Stram, Sulph, Zinc
Экзофтальм	Ars, Aur, Phos, Thuj
Экзостоз	Aur, Calc, Calc-f, Calc-p, Dulc, Kali-i, Lach, Merc, Nat-sil, Nit-ac, Phos, Puls, Ruta, Sil, Syph
Ф	
Опускание руки	Плб
Дальтонизм	Carbn-s, Merc, Santin
Непереносимость красителей	Thuj, Tub
Выкидыши	Сиф
Фиброз, кистозный см. кистозный фиброз	Бад, Бар-п, Буфо, Кальк-кауст, Граф, Тир
Высокая температура	Аброт, Акон, Аэт, Агар, Аил, Квасцы, Амбр, Ант-с, Муравей-т, Апис, Арг-н, Арн, Арс, Атра-р, Аур, Бапт, Бар-с, Белл, Белл-п, Бор, Брай, Буфо, Калад, Кальк, Кальк-п, Камф, Кэпс, Карб-в, Кауст, Чам, Чин, Хлор, Цик, Сина, Кофф, Кон, Сор, Крок, Супр, Еур-р, Ферр, Ferr-p, Gels, Glon, Graph, Hed, Hell, Нер, Hyos, Ign, Ипес, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-del, Lach, Лус, Mag-c, Med, Merc, Mosch, Mur-ac, Mygal, Nat-m, Nat-s, Нит-ак,
Лихорадка продолжалась	Nux-v, Ol-j, Op, Ph-ac, Phos, Plat, Plb, Podo, Psor, Puls, Pyrog, Rheum, Rhod, Rhus-t, Sabad, Samb, Sanic, Sec, Sep, Sil, Squil, Staph, Stram, Sulph, Syph, Tarent, Дорогой, Thuj, Tub, Verat, Zinc
Фебрильные судороги	Белл, Брай, Чам, Хелл, Хиос, Лах, Мигал, Оп, Страм, Тарент, Тер, Туй
Лобковые вши	Сосс, Sabad, Staph
Свищи	Агар, Амбр, Апис, Бар-с, Берб, Кальк, Кальк-м, Кальк-п, Кауст, Цист, Креос, Лах, Лик, Мерк, Нитац, Фос, Пульс, Сил, Станн, Стафилококк, Сульфат, Сиф, Туб
Метеоризм см. метеоризм	
Лишай парша	Арс, Бак
Роднички открыты	Ant-c, Ant-t, Apis, Aur, Bar-c, Bry, Calc, Calc-p, Ипес, Лус, Mag-c, Merc, Phos, Puls, Sep, Sil, Sulph, Sulph-i, Syph, Tub, Zinc
Синдром Фостера-Кеннеди	Aur, Syph, Thuj, Zinc Des-ac
Синдром ломкой X-хромосомы (синдром	

Переломы	Арн, Кальк, Кальк-п, Цик, Хед, Лах, Нит-ак, Рута, Сил, Симф, Туй, Тир
Ознобления	Agar, Bufo, Ign, Nit-ac, Petr, Puls
преждевременные роды	Муравей-т
Фурункулы см. абсцессы	
Г	
Атрезия желчных протоков	Aur, Lyc, Nat-s, Nux-v, Syph
Гангрена ганглия	Calc, Mag-m, Plb, Sil, Thuj Арс, Кэпс, Кали-хл, Кали-п, Лах, Мерс, Тарент, Си, Сил, Страм, Тарент
гастрит	Aeth, Ant-c, Bell, Bry, Phos, Psor, Цинк
гастроэнтерит	Aeth, Ant-t, Ars, Calc, Calc-p, Carc, Cupr, Cupr-ac, Elat, Ferr, Kali-p, Sal-ac, Verat
расщелина неба	Сиф
Сотрясение мозга	Carc, Cic, Cupr, Hyos, Kali-br, Nat-s
Желтуха см. Icterus	
Geni valgum	Агар, Кальций, Кок, Нукс-Ви, Туб
Geni varum	Кальций, Нукс-В
ячмень	Arap, Ant-t, Apis, Ars, Aur, Bar-c, Bry, Carbn-s, Carc, Caust, Con, Cupr, Ferr, Graph, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Ph-ac, Psor, Puls, Sep, Sil, Staph, Sulph, Thuj
Язвы	Aesc, Ail, Ant-c, Anthraci, Apis, Ars, Aur, Bac, Bapt, Bor, Bufo, Calc, Calc-m, Calc-sil, Caps, Carc, Cham, Kali-c, Kali-chl, Kali-p, Kreos, Lac-c, Med, Merc, Merc-cy, Merc-ir, Mez, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Нит-м-ак, Фосс, Псор, Пульс, Пирог, Рус-т, Сачч, Саник, Сен, Сил, Стафилококк, Страм, Сульфат, Сульф-и, Сиф, Тарент,
Лямблиоз см. Лямблиоз	
подагра	Abrot, Ant-c, Benz-ac, Calc, Lith-c, Lyc, Med,
Гигантизм	Nat-s Med
Гингивит	Aran, Aur, Bar-c, Bufo, Calc, Cham, Caps, Carc, Cupr, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Phos, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Tub
глаукома	Лак-с, пульс
Глиоматоз при нарушении	Вертолеты
равновесия	Bar-c, Bell, Plb, Syph
Глиомы головного мозга	Apis, Helo-s, Hyos
Гломерулонефрит	Apis, Ars, Bufo, Caps, Chin, Coli, Kali-p, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Nat-s, Phos, Plb, Sep, Stram, Tarent, Tub
Глоссит	Апис, Бор, Карк, Мерк, Сил, Сиф

Отек голосовой щели	Apis, Ars, Bell, Brom, Chin, Crot-h, Ign, Lach, Merc, Phos, Spong, Staph, Stram, Tub
Спазм голосовой щели (см. ларингизм) Непереносимость глютена Гонорея	Calc-p, Carc, Thuja
Грипп см. Грипп	Бенц-ак, Мед, Нат-с, Пульс, Туй
ЧАС	
Выпадение волос	Ant-c, Aur, Bac, Bufo, Carb-v, Chin, Graph, Ign, Lyc, Med, Nat-m, Nit-ac, Op, Ph-ac, Phos, Psor, Rhus-t, Sep, Sil, Staph, Vinc
Выпадение волос на ресницах	Apis, Ars, Aur, Bufo, Cali-c, Calc-s, Med, Merc, Rhus-t, Sel, Sil, Staph, Sulph, Syph.
Выпадение волос на бровях	Агар, Анан, Белл, Бор, Кауст, Мед, Мерк, Нит-ак, Фак, Плб, Саник, Сел, Сиф, Тудж
Чрезмерный рост волос	Aur, Calc, Carc, Ign, Lac-c, Med, Mygal, Nat-m, Phos, Psor, Puls, Sep, Sulph, Tarent, Thuja, Tub
Халязион	
Гемангиома Гемофилия	Abrot, Lach, Phos, Thuja
Геморрой	Ферр, Креос Abrot, Bac, Bar-s, Bufo, Caust, Lac-d, Nit-ac, Nux-v, Puls, Sulph, Thuja, Tub
Анкилостомы и глисты Боль в горле и тонзиллит, фарингит, ларингит	Chen-a, Ferr, Lyc, Phos, Expensive Apis, Ars, Bac, Bar-s, Bell, Calc, Hep, Lac-c, Lach, Merc, Sil, Staph, Sulph, Tub
больное горло	Аброт, Ает, Айл, Апис, Арс, Атра-р, Бак, Бад, Бапт, Бар-с, Бар-м, Белл, Белл-п, Брай, Кальк, Кальк-п, Кальк-сил, Капс, Карк, Чам, Чин, Кофф, Диф, Дифтокс, Элапс, Геп, Игни, Кали-с, Кали-м, Лак-с, Лак-дель, Лак-ч, Лак-лео, Лак, Лик, Маг-с, Мерк, Милосердие, Мерс-если, Нит-ак, Нукс-в, Фит, Сабад, Сен, Стафилококк, Сульф, Сульф-и, Сиф, Тарент, Ванночка Апис, Аран, Тудж
Тиреоидит Хашимото	Нер, Lac-leo, Led, Nit-ac, Sulph
Раздражение уретры	
Сужение уретры см. стриктура уретры	
задержка мочи	Bell, Borx, Bufo, Caust, Chin, Coff, Cop, Cupr, Hyos, Ign, Kali-c, Lach, Lyc, Merc, Nux-v, Op, Plb, Puls, Stram, Sulph, Verat
Инфекции мочевыводящих путей, такие как цистит, охриплость голоса	Коли, Коп, Кали-м, Стафилококк, Туй Ant-c, Ant-t, Ars, Arum-t, Bar-c, Bar-s, Bell, Bry, Bufo, Calc, Calc-caust, Calc-sil, Caps; Карб-в, Карк, Кауст, Чам, Хлор, Кофф, Медь, Дрос, Ферр,

	Graph, Hyos, Ipec, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lyc, Mang, Merc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plat, Plb, Psor, Puls, Rumx, Sacch, Sep, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Tarent, Thuj
Инфекция Helicobacter pylori	Ант-С, Бактерии, Биш, Цинк
Гемианопсия	Арс, Аур, Хиос, Лит-с, Лик, Мур-ак, Нат-м, Чад,
гепатит	Верат Ант-с, Арс, Чам, Чин, Креос, Лах, Мер-д, Нат-с, Нит-ак, Фос, Псор, Сил, Чад
Вакцинация против гепатита В	Ванна
Грыжи см. паховая грыжа	
Герпес	Агар, Анан, Бак, Бар-с, Кальк-м, Цик, Кали-п, Креос, Лак-с, Лак-ч, Нат-м, Пульс, Рус-т, Риб-ак, Сен, Сульф, Туй, Туб, Верат, Цинк
Сердечное заболевание	Муравей-т, Апис, Аран, Арс, Аур, Бор, Кальк, Диг, Джеб, Кали-с, Кали-м, Кальм, Лах, Лаур, Лик, Нат-м, Фосс, Псор, Пульс, Сакх, Сен, Сульфи, Туй
мерцательная аритмия	Аур
Гипертрофия сердца	Апис, Аур, Кальк, Плб, Псор, Пульс, Сульфат
Сердечная недостаточность	Муравей, Апис, Аур, Оп, Фос, Сакх
Остановка сердца	Ант-т, Арс, Карб-в, Гидрай, Лаур, Верат
Сенная лихорадка (сенная лихорадка)	Агар, Антип, Арс, Кальк-сил, Карк, Дульк, лод, Нафтин, Нат-сил, Нат-с, Нукс-в, Псор, Сил, Сквил, Туй, Тир, Туб
Абсцесс мозга Атрофия мозга	Апис
Кровоизлияние в мозг	Сиф Ars, Bar-c, Bell, Both, Bry, Cocc, Coff, Cupr, Hyos, Ipec, Kali-m, Kreos, Lach, Lyc, Merc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Stram, Sulph, Thuj, Verat
Менингит см. менингит	
паралич черепных нервов	Апис, Аур, Bell, Carbn-s, Caust, Crot-h, Gels, Lac-s, Lach, Lyc, Nux-v, Op, Plb, Sil, Syph, Thuj, Verat, Цинк
паралич	
отек мозга	Апис, Нат-с, Оп
инсульт см. инсульт	
опухоль мозга	Апис, Хело-с, Кали-бр, Кали-п, Сил
ВИЧ	Caust, Phos, Sacch
Неопущение яичек см. крипторхизм	
Орхит см. Орхит Болезнь	Кали-м, Туб, Цинк
Ходжкина Ячмень см. Синдром	
Горнера Абсцесс роговицы	Сентябрь, Сиф
Воспаление роговицы	Кальк-м Кали-м, сен

язва роговицы	Apis, Ars, Bac, Bar-c, Brom, Calc, Euphr, Kali-c, Kali-m, Kreos, Med, Merc, Nat-m, Nit-ac, Psor, Sanic, Sil, Syph, Thuj, Tub
Помутнение роговицы	Am-c, Arg-n, Ars, Aur, Bar-c, Bar-s, Bell, Calc, Calc-sil, Caust, Chin, Con, Ign, Kali-c, Kali-m, Mag-c, Нафтин, Nit-ac, Plb, Psor, Puls, Sil, Sulph, Tarent, Tub, Zinc, Zinc-s
Врожденный вывих бедра	Белл, Кальк, Кальк-п, Кауст, Сиф, Туй
Мозоли	Agar, Ant-c, Ars, Bar-c, Bar-s, Bry, Bufo, Calc-sil, Calc-s, Caust, Chin, Ign, Iod, Kali-c, Lyc, Med, Nit-ac, Nux-v, Phos, Puls, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Thuj
Кашель	Acon, Aeth, Agar, Ambr, Am-br, Anac, Antip, Ant-c, Ant-t, Apis, Aran, Arg-n, Arg-m, Arn, Ars, Bac, Bad, Bar-c, Bar-m, Bar-s, Bell, Bor, Brom, Bry, Bufo, Calc, Calc-act, Calc-p, Calc-sil, Camph, Caps, Carb-an, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chin, Chlor, Cina, Coc-c, Coff, Coloc, Con, Cor-r, Cupr, Diphtox, Dros, Eucal, Euphr, Ferr, Flav, Gels, Glon, Graph, Hep, Hyos, Ign, Iod, Ipec, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Лак-дель, Лак-ч, Lac-leo, Lach, Lact, Laur, Praise, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Merc-cy, Mosch, Naphtin, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nicc, Nit-ac, Nux-v, Oena, Ol-j, Op, Petr, Phos, Plat, Plb, Psor, Puls, Rheum, Rhus-t, Rumx, Sacch, Samb, Sang, Sanic, Sep, Sil, Spong, Squil, Stann, Staph, Stram, Sulph,
Гидроцеле	Abrot, Apis, Ars, Aur, Bry, Calc, Calc-sil, Calc-s, Kali-chl, Merc, Nux-v, Phos, Psor, Puls, Rhod, Sil, Sulph, Sulph-i, Syph
Гидроцефалия	Abrot, Apis, Apoc, Ars, Aur, Bac, Bar-c, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Calc-sil, Caust, Chin, Cina, Cupr, Ferr, Hed, Hyos, Ign, Iodof, Kali-p, Lyc, Merc, Nat-m, Nux-v, Op, Phos, Plat, Plb, Puls, Sil, Stram, Sulph, Syph, Thuj, Verat, Zinc
	Лайк
	Хёс
Гипербилирубинемия	Calc, Calc-sil, Caust, Chin, Hyos, Jab, Nux-v, Sep, Sil
Гиперкапния	
Гиперметропия	
Гипертелоризм см. аномалию черепа	Ant-t, Aur, Chlorpr, Lyc, Plb, Thuj, Цинк
Гипертония	Хёс
Гипогликемия	Лyc, Med
Гипогонадизм	Нep, Merc, Merc-c, Phos, Sil, Thuj
Гипопион	
Гипотиреоз	Кауст

Гиповодемический шок	Камф, Кант, Кофф, Купр, Хиос, Лах, Оп, Плб, См., Страм, Верат
Гипоксия	Bar-c, Hyos
Я	
Ихтиоз	Ars-i, Aur, Lac-c, Syph
Желтуха	Acon, Ars, Aur, Bov, Bry, Calc-m, Calc-sil, Caust, Cham, Chel, Chin, Chion, Cina, Cupr, Dig, Ferr, Ign, Iod, Kali-c, Lach, Lyc, Merc, Merc-d, Nat-c, Nat-s, Nux-v, Op, Phos, Plb, Podo, Puls, Rheum, Sep, Sulph, Syph
Илеус	Ars, Caust, Merc, Plb, Verat
Паралитическая кишечная непроходимость	Ars, Bry, Cham, Hyos, Kali-c, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Op, Plb, Rhus-t, Sil, Staph, Sulph, Thuj, Цинк
иммунодефицит	Apis, Ars, Bac, Carc, Chlorpr, Cop, Des-ac, Kali-c, Lach, Merc, Phos, Psor, Sacch, Saroth, Sep, Stram, Syph, Thuj, Tub, Tub-r, Цинк
импетиго	Ant-c, Ant-t, Ars, Bac, Bar-c, Calc, Calc-m, Calc-p, Caust, Cic, Graph, Crot-t, Cupr, Graph, Lach, Lyc, Maland, Med, Merc, Mez, Rhus-t, Sep, Tarent, Tub, Viol-t
Вакцинация, последствия	Abrot, Ant-t, Apis, Bapt, Bar-c, Calc, Calc-sil, Carc, Caust, Cic, Cupr, Diph, Ferr, Kali-m, Maland, Med, Merc, Mez, Nat-sil, Phos, Psor, Puls, Sars, Sep, Sil, Sulph, Thuj, Tub, Zinc
Грипп	Арс, Бри, Кальц-п, Карк, Кипр, Хиос, Креос, Псор, Туб, Верат
Оскорбление, цереброваск. см. инсульт опрелость	Aeth, Ambr, Ant-c, Ant-t, Ars, Bar-c, Bor, Calc, Calc-sil, Calc-s, Caust, Cham, Graph, Ign, Kali-c, Kali-m, Kreos, Merc, Petr, Plb, Sep, Sil, Sulph, Syph
Повышенное внутричерепное давление	Apis, Apom, Bell, Cocc, Hell, Hyos, Merc, Nit-ac, Op, Plb, Stram, Tub, Цинк
Инвагинация	Арс, Белл, Брай, Купр, Креос, Мерс, Нукс-в, Оп, Фос, Плб, Сульф, Тарент, Верат Ars, Atro-s, Cupr
Инвагинация иридоциклит	Bell, Bry, Merc-c, Plb, Thuj
ирит	Брай, Чин, Хеп, Кальм, Мерс, Мерс-с, Нит-ак, Сил, Спиг, Стафилококк, Сиф, Туй, Ванночка, Цинк
Дж.	Bell, Merc, Op, Phos
Йод, злоупотребление	Anth, Bad, Bar-c, Bar-s, Brom, Calc-p, Cocc, Coff, Fil, Oind, Psor, Sul-l, Expensive, Vinc, Viol-t
зуд	

К

катаракта

катар

Кауст, Джеб, Лик, Нафтин, Сач, Сил, Сиф
 Aeth, All-c, Ant-t, Apis, Asar, Arg-n, Ars, Aur, Bac,
 Bar-c, Bell, Brom, Bry, Calc, Calc-br, Calc-caust,
 Calc-hp, Calc-lac, Calc-m, Calc-p, Calc-sil, Caps,
 Caust, Cham, Cinnb, Cupr, Des-ac, Diph, Dulc,
 Eucal, Евфр, Фер, Ферр-п, Граф, Геп, Игни,
 Кали-би, Кали-бр, Кали-с, Кали-хл, Кали-и,
 Кали-м, Кали-с, Креос, Лак-дель, Лак-ч, Лак,
 Лик, Мед, Мерк, Мерк-д, Нат-м, Нит-ак, Нукс-в,
 Ол-дж, Фос, Плб, Псор, Пульс, Сач, Самб,
 Sanic, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph,

см. Гортань

Келоиды

Кератит

Кератоконъюнктивит Коклюш

см. Коклюш Кинетоз

Carc, Caust, Lach, Nit-ac, Sil, Tub Bell, Calc,
 Kali-m, Sep, Syph, Tub Calc, Merc, Merc-n,
 Ran-b

Арс, Кальк, Кальк-м, Кальк-п, Карк, Кофф,
 Кокк, Ферр, Петр, Сен, Тер

Церебеллит

Вертолеты

Опухоль мозжечка

Вертолеты

Карликовость

Bac, Bar-c, Bar-p, Bar-s, Bor, Calc, Calc-p, Carc,
 Med, Ol-j, Sil, Syph

клептомания

Белл, Кальк, Кауст, Хиос, Кали-бр, Лах, Оп,
 Пульс, Сен, Сил, Сульф, Сиф, Тарент, Верат
 Bry, Sil, Sulph-i, Tub

Выпот в коленном суставе

Воспаление костей (см.
остеомиелит)

Кариес костей

Asaf, Aur, Bac, Bufo, Calc, Caps, Chin, Fl-ac,
 Hecla, Merc, Nit-ac, Phos, Sep, Sil, Staph, Stram,
 Syph, Ther

Боль в костях

Эт, Аран, Асаф, Аур, Чин, Мерк, Нит-ак

Узелки на голосовых связках

Verb, Plat, Thu, Tub

колики

Аэт, Агар, Анис, Ант, Ант-с, Муравей-т, Арге,
 Арс, Атра-р, Атро-с, Аур, Белл, Бор, Бри,
 Кальк, Кальк-п, Шапки, Карб-в, Кастм, Кауст,
 Чам, Чин, Цик, Цина, Кофф, Колок, Крот-т,
 Купр, Фил, Граф, Хиос, Игни, Джал, Кали-бр,
 Кали-с, Креос, Лах, Лик, Маг-с, Мед, Мерк,
 Нат-с, Нат-с, Нукс-в, Плб, Пульс, Реум, Сенн,
 Сен, Сил, Стафилококк, Сульфат, Тер, Верат
 Карц, Сиф

Коллагеноз

крах

Aeth, Ant-c, Ant-t, Ars, Camph, Carb-v, Cupr,
 Hydr-ac, Hyos, Kali-br, Kali-p, Laur, Nux-v, Op,
 See, Таранто, Верат

кома

Acon, Ant-t, Ars, Atro, Bell, Bor, Bufo, Cic, Hyos,
 Lach, Op, Plb, Puls, Sep, Sulph, Verat

комедоны	Граф, Сульф, Туб
Кондиломы и бородавки	Sanic, Staph, Thuj
Конъюнктивит	Aeth, All-c, Ant-c, Ant-t, Apis, Arg-n, Ars, Bar-c, Bar-s, Bell, Bor, Bry, Calc, Cham, Chin, Dulc, Euphr, Graph, Ign, Kali-c, Lyc, Mag-c, Med, Merc, Merc-n, Nat-s, Nux-v, Psor, Puls, Ran-b, Rhus-t, Сен, Сил, Спиг, Стафилококк, Сульфат, Сиф, Таранто, Туй, Тир, Цинк
Контактный дерматит	Ars, Merc, Olnd, Pitu-a
Лихорадка непрерывности	Цинк
Судороги	Абсин, Эт, Агар, Муравей-т, Апис, Апок, Аран, Арг-н, Арн, Арт-в, Арс, Атра-р, Аур, Белл, Буфо, Кальк, Кальк-п, Камф, Карк, Кауст, Седр, Чам, Чин, Хион, Хпол, Цик, Цина, Кок-с, Кофф, Колок, Кон, Купр, Кур, Кипр, Ферр-п, Формы, Гели, Глон, Ад, Хиос, Гипер, Ign, Indg, Кали-бр, Кали-с, Кали-п, Креос, Лах, Лик, Лисс, Маг-с, Маг-п, Мед, Меф, Мерс, Милл, Мосх, Мигаль, Нат-м, Нат-с, Нит-ак, Нукс-в, Оена, Оп, Фос, Плат, Плб, Пульс, Ран-б, Реум, Скат, Сен, Сил, Станн, Стаф, Страм, Стрый, Сульф, Тарент, Туй, Тир, Верат, Верат-в, Цинк
Головная боль	Виол-т
Головная боль	Acon, Aeth, Agar, Agath-a, Aloe, Alum, AMP, Anac, Androc, Ant-c, Ant-t, Apis, Arg-n, Ars, Art-v, Asar, Atra-r, Aur, Bad, Bar-c, Bell, Bor, Brom, Bry, Bufo, Cact, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-sil, Cann-s, Carb-v, Carbn-s, Carc, Caust, Cham, Chin, Cina, Coff, Con, Cupr, Dulc, Ferr, Gels, Glon, Graph, Hep, Hyos, Hyper, Ign, Ind, Iodof, Ipec, Iris, Jab, Kali-ar, Kali-bi, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Lac-c, Lac-cp, Lac-d, Lac-f, Лак-ч, Лач, Led, Lyc, Mag-c, Mag-p, Med, Meli, Merc, Mez, Mill, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Oena, Ol-an, Op, Pall, Ph-ac, Phos, Pic-ac, Pitu-a, Plat, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Sacch-a, Sang, Sanic, Scut, See, Сенег, Сен, Сил, Спиг, Стафилококк, Стикт, Страм, Сульф, Сульф-и, Сиф, Тарент, Тойер, Тер, Туй, Туб, ВАБ, Виоло-о, Цинк
Травмы головы	Арт-в, Карк, Цик, Купр, Глон, Хед, Хиос, Кали-м, Кали-п, Лак-с, Мерк, Нат-с, Оэна, Оп, Цинк
Судорога, общая, см. тетания	
Чесотка см. Чесотка	
Рак	Alumn, Aur, Bar-s, Brom, Calc, Calc-ar, Calc-an, Calc-p, Carc, Con, Crot-h, Cund, Fl-ac, Kali-chl, Kreos, Lach, Med, Merc, Nat-ar, Nat-s, Ph-ac, Psor, Sacch, Scir, Staph, Sulph-i, Syph, Thuj
	Выпускник, бакалавр, специалист по математическому анализу, специалист по медицине
кретинизм	

Зоб с. Струма

Крупп

Calc, Chin, Chlorine, Cor-r, Cupr, Kali-m, Lach, Mosch, Nit-ac, Phos, Spong

Крипторхизм / задержка яичек

Аур, Бар-ц, Белл, Бор, Кальк, Кальк-п, Кауст, Чин, Клем, Купр, Лод, М-ауст, Пар, Питу-а, Плб, Псор, Пульс, Род, Сил, Страм, Сиф, Туй, Тир, Туб, Цинк

близорукость

Агар, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Bufo, Chin, Graph, Jab, Lys, Phos, Phys, Puls, Stram, Syph, Thuj, Tub

Кифоз

Аур, Кальк, Кальк-ф, Кальк-п, Лик, Псор

Кифосколиоз

Bac, Calc-p, Syph, Thuj, Tub

искривление позвоночника

Л

паралич

Агар, Апис, Арн, Арс, Арт-в, Аур, Бапт, Бар-с, Бар-с, Белл, Оба, Буфо, Кальц-п, Карбн-с, Кауст, Чен-а, Чин, Хлорпр, Цик, Крот-ч, Дульк, Гели, Хиос, Игни, Кали-и, Кали-п, Лак-с, Лах, Лик, Мерс, Морф, Мош, Мур-ак, Nat-m, Nux-v, Op, Phos, Plat, Plb, Puls, Rheum, Rhus-t, Sec, Seneg, Sil, Spig, Stram, Syph, Tarent, Thuj, Verat, Zinc

Паралич глаз
паралич

Агар, Апис, Арн, Аур, Бар-с, Белл, Буфо, Гели, Хиос, Кали-и, Кали-п, Мерк, Нат-м, Фосс, Плб, Пульс, Си, Сил, Сенег, Спиг, Страм, Сиф, Туй, Верат, Цинк

Паралич слухового нерва
вшиBar-c, Chen-a, Hyos, Op
Apis, Bac, Carb-ac, Cocc, Graph, Lys, Lach, Lys, Merc, Nit-ac, Psor, Sabad, Staph, Tub, Vinc

Непереносимость лактозы

Aeth, Bac, Calc, Lac-h, Lys, Mag-c, Mag-m, Nat-c, Nat-s, Pitu-a, Puls, Sulph, Thuj

Лямблиоз (лямблиоз)
язык карты

Кальци-п, Гамб, Нат-с, Нукс-в, Фос

Агар, Ant-c, Ant-t, Ars, Bac, Bor, Calc, Cham, Graph, Kali-m, Lach, Lys, Med, Merc, Nat-m, Nux-v, Pitu-a, Syph, Tarax, Thuj, Tub

ларингит

Ам-бр, Муравей-ц, Буфо, Кауст, Чам, Чин, Хлор, Кофф, Лах, Мерк, Фосс, Сен, Сульф-и, Туб

Ларингизмус стридулус

Bell, Bromine, Chlorine, Coff, Cor-r, Cupr, Gels, Hyos, Ign, Kali-br, Lach, Mosch, Op, Phos, Plat, Plb, Stram, Sulph-i, Tarent, Thuj, Verat
Страм

Паралич гортани

Стридор гортани

Агар, Ant-c, Ant-t, Ars, Bell, Cham, Chlor, Lach, Mosch, Nux-v, Op, Samb, Sil, Spong

Туберкулез гортани
Абсцесс печениКауст, Лод, Креос, Манг, Спонг, Станн, Сул-и
Bufo, Lys, Sil, Ther

Заболевания печени

Агар, Амбр, Ант-с, Муравей-т, Арс, Аур, Белл, Брай, Кальк, Кальк-м, Кальк-сил, Карк, Чам, Чин, Купр, Ферр,

	График, Ign, Iod, Kali-br, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Lach, Lyc, Mag-c, Mag-m, Merc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plb, Psor, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Tarent, Ther, Thuj, Tub, Zinc
Цирроз печени	Aur, Lach, Lyc, Nux-v, Op, Phos, Psor, Sep, Zinc
Родинки	Carc
Лизательная экзема	agar
Дислексия см. Дислексия	
Паховая грыжа	Amph, Apis, Ars, Aur, Bar-c, Bell, Bry, Caps, Carc, Cham, Cic, Cina, Guaj, Ign, Kali-c, Lach, Lyc, Mill, Mag-c, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plat, Plb, Psor, Puls, Rheum, Sil, Sulph, Tab, Thuj, Verat,
Паховая грыжа, ущемленная	Ars, Aur, Bell, Cham, Coff, Lach, Lyc, Nit-ac, Nux-v, Op, Plb, Sil, Sulph, Tab, Verat
лейкемия	Арс, Бар-п, Бен, Кальк-п, Карк, Чин, Ферр, Кали-п, Лак-с, Лах, Лик, Мерк, Нат-ар, Нат-с, Оп, Туб
Лейкорей	Ant-c, Ars, Bar-c, Bor, Calc, Calc-p, Cann-s, Carb-ac, Carb-an, Caust, Chlorpr, Cub, Ferr, Graph, Hydr, Iod, Kali-ar, Kali-bi, Kali-m, Kreos, Lyc, Med, Merc, Mill, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plat, Псор, Пульс, Саник, Сен, Стафилококк, Сиф, Туй, Виол-т
лейкоцитоз	Ant-c, Arn, Ars, Calc-sil, Caust, Ferr, Nux-v, Lach, Merc, Phos, Plb, Puls, Rheum, Verat
Простой лишай Красный	Ambr, Staph
плоский лишай Фотофобия см.	Апис
Фотофобия Спазм века	
Паралич век и паралич липом	Агар, Джаб, Нукс-в, Реум, Стафилококк
Трахеит абсцесс легкого	Апис, Белл, Кауст, Гели, Плб, Спиг, Верат,
Пневмония см. Пневмония	Цинк
Тромбоз эмболии легочной	Aur, Bar-c, Bell, Med, Thuj
артерии Эмфизема легких	Апис, Аран
Заболевания легких Отек	Фос, Псор, Страм
легких	Предательство пульс Укол
	Ant-ar, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Hyos, Kali-c, Kali-p, Lyc, Merc-sul, Op, Phos, Puls, Solin-act
Красная волчанка	
Лимфангит	Аран, Креос
лимфома Ходжкина	Apis, Ars, Bufo, Mygal Lac-c, Lyc, Merc, Plb, Tub

М

Острицы см. также черви

Аброт, Амбр, Ант-с, Арс, Бар-с, Бар-с, Кальк, Чен-а, Сина, Купр, Ферр, Хиос, Игн, Джатр-с, Кали-с, Кали-м, Лик, Маг-с, Милл, Нат-м, Нукс-в, Фосс, Плат, Сабад, Сен, Сил, Сквил, Сульф, Тойер, Туй, Туб

Тонзиллит см. Тонзиллит

Недоедание

Aeth, Ars, Bar-c, Calc-p, Caust, Ferr, Lac-c, Lyc, Merc, Pin-s, Psor, Sacch, Sulph

Желудочно-кишечное
воспаление см. гастроэнтерит
боль в желудке

Ambr, Ant-c, Asaf, Aur, Bell, Bism, Bry, Calc-sil, Carb-v, Carc, Caust, Chel, Cina, Colch, Coloc, Ferr, Graph, Hep, Nux-v, Op, Phos, Ptel, Puls, Staph, Tarent

Мальабсорбция

Бактерии, Кальций, Карбонат, Кауст, Ферро, Лак-ч, Лик, Нат-с, Псор, Сульф

малярия

Апис, Аран, Брай, Карк, Чин, Креос, Лах, Нукс-в, Псор, Верат

мания

Лак-ср

Маразм см. истощение

корь

Acon, Ail, Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Bapt, Bar-c, Bov, Bry, Carc, Caust, Cham, Chin, Chlor, Cina, Coff, Cupr, Dros, Euphr, Hyos, Ign, Kali-c, Lyc, Maland, Merc, Nat-m, Nit-ac, Psor, Puls, Squil, Stram, Sulph, Туй, Туб, Туб-а, Цинк

Разрушение сосцевидного
отростка

Aur, Caps, Hep, Nit-ac, Phos, Sil, Staph, Stram, Thuj

Мастоидит,

Caps, Kali-m, Merc, Phos

медулlobластома, мегаколон,
аспирация мекония, менингит

Вертолеты

Квасцы, Лах, Плб, Псор, Сиф, Тарент, Цинк
Ant-t, Kali-br

Abrot, Aeth, Agar, Ant-t, Apis, Ars, Art-v, Bac, Bar-c, Bell, Bry, Bufo, Calc, Cham, Cic, Cina, Cupr, Cupr-act, Gels, Glon, Graph, Hed, Hell, Hyos, Ign, Iodof, Kali-br, Kali-m, Kali-p, Lac-c, Lach, Lyc, Med, Merc, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Op, Phos, Plb, Puls, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Tarent, Ther, Thuj, Tub, Zinc

Менингомиелоцеле

Bell, Gels, Op, Syph, Thuj

Мигрень см. головная боль

Непереносимость молока

Aeth, Ambr, Ant-c, Ant-t, Ars, Bar-c, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Cham, Chin, Cupr, Ferr, Ipec, Kali-c, Lac-c, Lac-d, Lach, Lyc, Mag-c, Mag-m, Merc, Merc-d, Nat-c, Nat-s, Nit-ac, Rheum, Sanic, Sep, Sil, Sulph, Сульфиды, Туб, Валер

Колыбельная	Ambr, Ant-t, Calc, Dulc, Hep, Kali-chl, Kali-m, Mag-c, Mez, Olnd, Psor, Sep, Sil, Staph, Sulph-i, Tub, Vinc, Viol-t
пороки развития	Агар, Муравей, Аур, Буфо, Карк, Кауст, Ад, Мед, Мерк, Оп, Фос, Страм, Сиф, Туй
Инфекция среднего уха см. средний отит	
Митральная регургитация	
вакцинация КПК	Апис, Аур, Кали-с, Лах, Фос, Карк, Пульс, Туй
Контагиозный моллюск	Брай, Карк, Купр, Мед, Сил, Ваб Айл, Карк,
Мононуклеоз	Мерк, Туй
Болезнь Аспергера см. Синдром Аспергера	
Болезнь Гиршпрунга, см.	
мегаколон, кистозный фиброз,	Apis, Aran, Calc-p, Lac-h, Lyc
рассеянный склероз, свинка	Таранто Abrot, Ail, Bapt, Carc, Cham, Coc-c, Jab, Merc, Nat-m, Nux-v, Puls, Staph, Sulph, Tub
Воспаление слизистой оболочки полости рта см. стоматит	
Мышечная атрофия	Calc-p, Kali-p, Plb, Thuji
Мышечная дистрофия	Ambr, Calc-p, Plb
Мышечная боль	Белл-п
родинки	Аброт, Acet-ac, Carc, Fl-ac, Med, Nit-ac, Nux-v, Phos, Sil, Sulph, Thuji
Миастения гравис	Кальк-п
Миелит	Abrot, Cic, Op, Phos
Миопия см. близорукость	
Н	
Пупочная грыжа, пупочные язвы, куриная слепота, невусы,	Amph, Calc, Lach, Nux-v, Op, Plb, Thuji Апис
родинки, грызение ногтей	Сульф Am-br, Am-c, AMP, Ant-t, Ars, Arum-t, Bar-c, Brom, Calc, Carb-v, Carc, Castm, Caust, Cina, Hyos, Kali-br, Lyc, Med, Nit-ac, Plb, Sacch, Sanic, Staph, Verat
Грибковая инфекция ногтей	Анана
Носовые кровотечения	Абель, Аброт, Акон, Агар, Амбр, Муравей-с, Муравей-т, Арн, Арс, Аур, Бар-с, Бар-с, Белл, Белл-п, Бор, Брай, Буфо, Кальк-п, Кальк-с, Карб-в, Карк, Кауст, Чам, Чин, Цик, Цина, Кор-р, Крот-с, Купр, Дрос, Ферр, Ферр-акт, Ферр-п, Глон, Хиос, Игн, Ипек, Кали-би, Кали-с, Кали-м, Кали-н, Кали-п, Креос, Лах, Лик, Маг-с, Мели, Мерс, Мерс-си, Мельница

Носовые кровотечения (продолжение)	Мосх, Нат-м, Нат-с, Нит-ак, Оп, Фос, Питу-а, Плат, Плб, Псор, Пульс, Рус-т, Сел, Сен, Сил, Страм, Сульф, Сиф, Тарент, Туй, Туб, Верат,
Носовые полипы	Agra, Alumn, Apis, Aur, Bac, Bar-c, Bell, Calc, Galc-sil, Caust, Form, Lac-c, Lac-h, Lyc, Merc, Nit-ac, Phos, Psor, Puls, Sep, Staph, Expensive, Thuj, Tub, Tub-a
Искривление носовой	Lac-c, Thuj, Tub
Перфорация носовой	Alum, Kali-bi, Kali-i, Merc, Sil, Syph
Некроз (кости)	Amph, Aur, Bell, Caps, Hecla, Merc, Phos, Syph
Нефрит с. Гломерулонефрит Нефротический синдром	Ambr, Apis, Apoc, Calc, Carc, Chin, Kali-c, Kali-m, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Plb, Sulph, Syph, Tub
Крапивница см. крапивница	
Отслоение/дегенерация сетчатки	Бен-д, Мерк, Нафт, Нафтин, Пило, Фосс, Сиф
Воспаление сетчатки см.	
Асфиксия новорожденных	Acon, Ant-c, Ant-t, Bell, Bor, Camph, Chin, Hydr-ac, Hyos, Lach, Laur, Op
невралгия	Bry, Cham, Ferr-p, Med, Syph
неврит	Белл, Кофф, Лодоф, Лах, Плб, Сиф
Нейродермит с сыпью	Aeth, Agar, Ant-c, Ant-t, Apis, Bar-c, Bell-p, Bor, Bov, Calc, Calc-p, Carc, Caust, Cupr, Graph, Ipec, Lach, Lyc, Merc, Nat-m, Nit-ac, Olnd, Op, Petr, Psor, Rib-ac, Staph, Sulph, Thuj, Tub
Заусенцы	Carc, Nat-m, Nat-s, Sanic, Sil, Staph, Sulph,
Заболевания почек	Thui Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Aur, Colch, Jab, Lyc, Merc, Nit-ac, Oxyd, Phos, Plb, Sacch, Sal-ac, Solid
Камни в почках	Cupr, Chin, Lyc, Med, Sacch, Thuj
почечная недостаточность	Аур, Купр, Хиос, Джеб, Кали-бр, Лик, Сакч
Нистагм	Агар, Кальций, Медь, Гели, Нукс-Ви, Сульфид, Цинк

0

Кривые ноги см. Genu varum

Запор см. Запор Отёк

Отек глаз

Antip, Ant-ar, Ant-t, Apis, Ars, Aur, Bac, Bell, Brom, Bry, Chin, Colch, Crot-h, Ferr, Graph, Hell, Hyos, Ign, Jab, Kali-c, Kali-m, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lach, Lyc, Merc, Merc-sul, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Sacch, Sal-ac, Sep, Sil, Solid, Solin-ac, Spong, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Thuj, Tub
Apis, Ars, Ferr, Hep, Kali-c, Lach, Lyc, Phos, Psor, Puls, Rhus-t

Отек ног	Ant-t, Apis, Ars, Bry, Chin, Kali-c, Kali-m, Kreos, Lach, Nat-s, Puls, Sacch, Sil, Sulph, Sulph-i
Отек половых органов Отек лица	Apis, Ars, Graph, Nat-m, Nat-s, Rhus-t, Sep, Sulph Ant-t, Apis, Aur, Chin, Ferr, Graph, Sacch, Thuj, Verat
Отек периферический	Ant-t, Apis, Ars
Отек гортани см. отек голосовой щели	
Отек легких см. отек легких	
Паралич пищевода паралич	Квасцы, Арс, Бапт, Кауст, Гели, Оп, Плб, Страм, Верат
Спазмы пищевода	Квасцы, Ars, Bar-s, Caust, Cic, Cupr, гели, Nit-ac, Оп, Plb, Stram, цинк
Пищеводно-трахеальный свищ бессилие	Ambr, Caust Acon, Aeth, Ars, Asaf, Bar-c, Bry, Bufo, Cham, Chin, Coff, Cupr, Dig, Ferr, Hep, Hyos, Ign, Lach, Laur, Lyc, Mosch, Nux-v, Phos, Phyt, Sep, Tarent, Ther, Verat
боль в ухе	Агар, Анак, Арс, Бар-с, Бар-м, Бар-с, Белл, Бор, Кальк-п, Капс, Чам, Кауст, Дульк, Ферр-п, Геп, Кали-би, Кали-с, Кали-м, Лак-с, Манг, Мерк, Мигал, Нат-с, Нит-ак, Нукс-в, Пульс, Рус-т, Рута, Сен, Сил, Стафилококк, Тарент, Туб
Полипы уха	Кальк, Кальк-п, Кауст, Кали-м, Лах, Лус, Нит-ак, Фос, Сил, Стафилококк, Сульфат, Туй
Олигурия	Апис
Офтальмия воспаление глаз	Apis, Arg-n, Ars, Calc, Euphr, Hep, Kali-bi, Merc, Nit-ac, Puls, Rhus-t, Sacch, Sil, Sulph, Thuj
Орбитальный целлюлит	Ars, Merc, Sil
Орхит	Аур, Чин, Кали-м, Лик, Нукс-в, Пульс, Род, Рус-т, Стафилококк
Несовершенный остеогенез	Calc, Carc, Thuj
Остеокластома	Аур, Сиф
Остеомиелит	Асаф, Бак, Дрос, Лах, Сен, Сульф, Сиф, Тер, Туй
Остеосаркома	Сиф
Остеит	Аур, Бак
Средний отит	Выпускник, Апис, Атра-р, Аур, Бак, Бар-ц, Бар-м, Белл, Бор, Бов, Буфо, Кальк, Кальк-кауст, Кальк-хп, Кальк-м, Кальк-с, Шапки, Кауст, Чам, Чен-а, Чин, Цина, Флав, Граф, Геп, Гидр, Игни, лод, Кали-би, Кали-ц, Кали-хп, Кали-м, Кали-п, Креос, Лах, Лик, Мед, Мерк, Мерк-д, Нит-ак, Фосс, Псор, Пульс, Сакч, Саник, Сил, Спиг, Сульф, Сиф, Тойер, Туй, Туб, Туб-а, Виол-о

Оторея	Aeth, Ars, Bor, Bufo, Calc, Calc-sil, Caust, Kali-bi, Kali-s, Lyc, Merc, Psor, Sanic, Sil, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Zinc
Озена	Ars, Syph, Thuj

П

Панариций (кровообращение)	Апис, Буфо, Кальк-сил, Кауст, Сил, Псор, Пульс, Сакх, Сиф
Панэнцефалит, панкреатит	Bar-c, Hyos Ванна, Фос
Папиллома	Ant-t, Calc, Caust, Graph, Lyc, Nit-ac, Staph, Sulph-i, Thuj
Парафимоз	Арс, Лах, М-амбо, Мерк, Нат-м, Нит-ак, Нукс-в, Сен, Таранто, Туй
паротит	Ars, Aur, Bar-c, Bell, Calc-m, Calc-p, Kali-p, Lach, Lyc, Nat-m, Phos, Psor, Puls, Rhus-t, Sil, Stram
Власоглав (черви)	Чен-а
Перикардальный выпот	Апис, Аур, Псор, Сульф, Цинк
Перикардит	Апис, Арс, Аур, Псор, Спиг, Сульф
Периостит	Апис, Аур, Пульс, Сил, Сиф
Перитонит	Abrot, Apis, Ars, Bell, Bry, Kali-m, Lach, Lyc, Merc, Nux-v, Plb, Sulph, Tab, Verat
Болезнь Пертеса-Кальве-Легга	Bell, Calc-p, Thuj
Коклюш	Am-br, Arn, Bar-s, Carc, Chlor, Coc-c, Cor-r, Cupr, Kali-br, Kali-m, Kali-p, Merc, Meph, Mosch, Naphtin, Phos, Sep, Sulph, Syph, Tub, Verat
Петехии	Ars, Phos
Портальная гипертензия	Lyc, Sulph
Фарингит	Аил, Бар-м, Брай, Буфо, Кальк, Кальк-сил, Эвкал, Флав, Хиос, Кали-хл, Лак-с, Лах, Лик, Мерс, Мерс-си, Сен, Сил, Сиф, Тарент, Туб
Фенилкетонурия	Carc, Hyos
Фимоз	Calc, Cinnb, Lyc, M-ambo, Merc, Nit-ac, Sep, Sil, Sulph, Syph, Thuj
Фликтена	Кальций, Меркурий, Сульфид, Сильфид, Туй
Светобоязнь	Acon, Aeth, Agar, Ant-t, Apis, Ars, Bar-c, Bar-s, Bell, Bufo, Calc-p, Chin, Cina, Con, Ferr-p, Hyos, Ign, Kali-c, Kali-p, Lac-c, Lac-del, Lach, Lyc, Med, Merc, Nat-m, Nat-s, Nux-v, Ph-ac, Phos, Pitu-a, Плб, Пульс, Страм, Пульс, Саник, Сульф, Сиф, Тарент, Тер, Туй, Туб, Верат, Цинк
Пигментные пятна	Арс, Кали-с, Сен, Сил, Тарентум
Питириаз	Аран, Бак, Сен

Плевральный выпот	Ant-ar, Ars, Ars-i, Bac, Calc-m, Kali-m, Lyc, Nat-m, Sil, Sulph, Sulph-i, Tub, Verat, Zinc
плеврит	Calc-m, Kali-c, Nat-m, Nit-ac
Placa polonica	Ant-t, Bac, Bar-c, Boron, Fl-ac, Graph, Lyc, Psor, Tub, Vinc
Пневмококки	Calc-p, Hyos
Пневмония	Acon, Am-c, Ant-t, Arn, Ars, Aur, Bac, Bapt, Bar-c, Bry, Calc, Calc-sil, Camph, Carb-v, Carc, Chin, Coff, Ferr, Hell, Hep, Hyos, Ign, Ipesc, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lac-del, Lach, Laur, Lyc, Merc, Nat-m, Нит-ак, Нукс-в, Оп, Ф-ак, Фос, Фит, Псор, Пульс, Пирог, Сакч, Сеп, Сил, Спонг, Сквил, Страм, Сульф, Сульф-и, Тойер, Туй, Туб, Верат
Пневмония Вакцинация от	Сквил
полиомиелита Полиомиелит	Ванна
Полипы	Apis, Calc-p, Caust, Kali-p, Merc, Plb Agra, Apis, Aur, Bac, Bar-c, Bar-m, Bell, Calc, Calc-p, Calc-sil, Caust, Form, Kali-br, Kali-m, Lac-c, Lac-h, Lach, Lyc, Med, Merc, Nit-ac, Nux-v, Phos, Psor, Puls, Sep, Sil, Staph, Sulph, Syph, Expensive, Thuj, Tub
Синяки	Bell-p, Cic, Nit-ac
Псевдокруп	Предательство
псориаз	AMP, Apis, Aran, Aur-mn, Calc-sil, Chin, Graph, Kali-br, Kreos, Lyc, Mag-c, Nat-m, Phos, Psor, Staph, Thyr, Tub
Птериgium	Арс, Бак, Цинк
Птоз	Ars, Bar-c, Caust, Gels, Kali-p, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Rhus-t, Sep, Spig, Syph
Пурпура, пиелонефрит,	Белл, Кофф, Медь, Ферр, Хиос, Лакс, Фосс
пилоростеноз, пилоростеноз	Apis, Bry, Chin, Merc-c, Nux-v, Rhus-t, Sulph-i, Ter Phos Аброт, Эт, Диско, Креос, Лик, Сиф
В	
Отек Квинке	
(ангионевротический отек)	Агар, Антип, Апис
Р	
Боль в горле, см. фарингит	
рахит	Bar-c, Calc, Calc-hp, Calc-p, Caust, Cic, Ferr, Hed, Iod, Lac-c, Lac-h, Merc, Nat-m, Nit-ac, Ol-j, Op, Petr, Phos, Pin-s, Plb, Psor, Puls, Sacch, Sanic, Sep, Sil, Staph, Syph, Ther, Thuj, Tub
Ранула	Ambr, Calc

синдром Рейтера	Thuji, Tub
выздоровление	Арс, Бар-с, Бар-м, Кальк-п, Карк, Кауст, Ферр, Геп, Мерк, Нитак, Сил, Сульф, Туй, Туб
Полипы прямой кишки	Вас, Calc, Kali-br, Лус, Nit-ac, Nux-v, Phos, Psor, Syph.
Выпадение прямой кишки	Aesc, Aloe, Ant-c, Apis, Ars, Aur, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Carc, Caust, Cic, Ferr, Ign, Kali-c, Kali-p, Med, Merc, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Podo, Puls, Ruta, Sep, Sil, Sulph, Syph, Zinc
Кровоизлияние в сетчатку	Bell, Crot-h, Lach, Phos, Sulph
Ретинит	Кали-м, Кали-п, Лах, Нафтин, Плаб, Сульф, Туй
Ретинобластома	Аур, Сиф
Пигментный ретинит	Лак, Лайк
Трещины в уголках рта	Ambr, Ant-c, Arum-t, Graph, Nit-ac, Sil, VAB
Трещины в уголках глаз	Ant-c, Лус, Nat-m
Трещины между пальцами	Сульф
Ревматические заболевания	Аброт, Акон, Адон, Ант-с, Ант-т, Аран, Арс, Аур, Бенц-ак, Брай, Кальк, Кальк-п, Кауст, Чам, Чин, Дульк, Форма, Граф, Хеп, Хиос, Игни, Кали-и, Кали-м, Кали-с, Кальм, Лак-ак, Лак-с, Лах, Лаур, Лит-с, Лик, Lycps-v, Mag-p, Med, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Phyt, Plat, Psor, Puls, Rheum, Rhod, Rhus-t, Rib-ac, Sacch, Sanic, Sep, Sil, Spig, Cic, Plb, Stram, Tarentum
Сардоническая улыбка	
Риталин	Кофф
синдром Робертса	Аур
краснуха	Caust, Coff, Hyos, Thuji
Ротавирусы	Aeth, Ant-t, Ars, Вас, Bry, Cupr, Cupr-ar, Phos, Puls, Verat
с	
Сальмонелла	Гамб
саркома	Аур, Крот-х, Кали-хл, Кали-м, Мерк, Сиф
алый	Abrot, Apis, Bell, Coff, Stram
Косоглазие, страбизм	
Воспаление щитовидной	
бессонница	Агар, Апис, Аран, Арс, Аур, Бар-с, Бор, Брай, Кальк, Кальк-бр, Шапки, Карк, Кауст, Чам, Чин, Цик, Цина, Кофф, Колок, Купр, Кипр, Даф, Ферр, Хиос, Игнин, Кали-би, Кали-бр, Кали-с, Кали-п, Кальм, Креос, Лак-ч, Лак-лео, Lach, Лус, Mag-c, Merc, Mez, Mosch, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Scut, Sep, Sil, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent,

лунатизм	Чам, Хлол, Кали-бр, Кали-п, М-аркт, Мосх, Нитак, Фосс, Сульфат
Инсульт Икота	Бар-с, Белл, Сик, Кали-п, Лах, Лик, Плб, Сиф Aeth, Alum, Ant-t, Arg-n, Ars, Bar-s, Bor, Bry, Caust, Cham, Cic, Coff, Cycl, Cupr, Hyos, Ign, Kali-br, Kali-c, Kreos, Lac-h, Lys, Mag-m, Merc, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nicc, Nux-v, Phos, Plat, Psor, Puls, Ран-б, Крыса, Самб, Сен, Стафилококк, Страм, Сульф-и, Дорогой, Верат, Цинк
храп	Aeth, Apis, Ars, Bufo, Caps, Carb-v, Cham, Chin, Cupr, Des-ac, Hyos, Ign, Kali-c, Op, Puls, Rheum, Sil, Stram, Tub
порезы	Kali-m, Staph
Всхлипы	Aeth, Agar, All-c, Anac, Anth, Antip, Ant-c, Ant-t, Arg-n, Ars, Arum-t, Aur, Bac, Bapt, Bar-c, Bar-s, Bell, Bell-p, Bov, Bromine, Bry, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-s, Calc-sil, Caps, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chin, Хлор, Сина, Кок-с, Кор-р, Купр, Дифтокс, Дрос, Дульк, Эвкал, Юф, Гели, Глон, Граф, Геп, Хиос, Джеб, Кали-би, Кали-бр, Кали-с, Креос, Лак-с, Лак-д, Лак-дель, Лах, Лик, Маг-с, Манг, Мерс, Мерк-д, Мош, Нафтин, Нат-м, Нат-сил, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Pall, Phos, Plb, Psor, Puls, Rhus-t, Sacch, Samb, Sang, Sanic, Sep, Sil, Squil, Staph, Stict, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Teuer, Thuji, Tub
Шок, общий	Акон, Агар, Амбр, Ант-ар, Ант-т, Арс, Буфо, Камф, Кант, Карк, Чам, Кофф, Медь, Гели, Хиос, Кали-бр, Кали-п, Лах, Оп, Фос, Сек,
Шок, анафилактическая слабость	Аброт, Ант-т, Оп Abrot, Aeth, Agar, Ambr, Anac, Antip, Ant-c, Ant-t, Arn, Ars, Aur, Bar-c, Bell, Calc, Calc-p, Calc-sil, Caust, Cic, Cina, Cupr, Cypr, Dig, Diph, Elaps, Ferr, Ferr-act, Graph, Helo-s, Hyos, Ign, Ipec, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lac-c, Lac-del, Lac-leo, Lach, Laur, Lys, Mag-m, Merc, Merc-cy, Mosch, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Psor, Puls, Rheum, Sacch, Samb, Sep, Sil, Staph, Stram, Sulph, Sumb, Syph, Ther, Tub, Verat
потеря слуха	Agra, Calc-br, Calc-caust, Calc-hp, Chen-a, Merc-d, Thiosin
мозоли	Ант-с, Арс, Бар-с, Бор, Кальк, Граф, Лик, Нат-с, Септ, Сил, Сульф
головокружение	
Себорея	
Морская болезнь с кинетозом	Apis, Plb, Ther
Атрофия зрительного нерва	Thuji, Tub Calc, Sep, Ther Nux-v, Plb, Syph

Неврит зрительного нерва см.	
неврит	Бар-с, Белл, Гели, Кали-и, Мерк, Фосс, Пульс,
паралич зрительного нерва	Си, Сил, Страм, Туй, Верат
паралич	Сина, Джаб, Кали-п, Ол-ан, Сакч, Сеп, Сил,
плохое зрение	Сульф, Тир
Причинять себе вред	Ars, Lil-t, Lyss
Сепсис / Сепсис	Антип, Муравей-т, Апис, Арс, Белл, Крот-ч,
	Купр, Кали-п, Лах, Мерс, Оп, Плб, Пирог, Сакч,
	Сульф, Тарент, Верат
Шигеллы	Гамб
синусит	Агра, Квасцы, Арс, Бар-с, Кальк, Кальк-сил,
	Карк, Циннб, Флав, Игн, Кали-с, Кали-м, Лак-с,
	Лак-дель, Лак-ф, Лак-ч, Лах, Мерс, Нит-ак,
	Пульс, Сен, Тойер, Туй, Туб
синдром Шегрена	Ванна
чесотка	Ant-c, Ant-t, Ars, Bry, Bufo, Calc, Carb-v, Caust,
	Cupr, Ferr, Kali-s, Kreos, Lyc, Merc, Op, Psor,
	Sep, Sil, Staph, Sulph, Verat, Vinc
Склерит	Aur, Kalm, Sep, Thuј
Сколиоз	Аур, Бак, Буфо, Кальк-п, Псор, Сиф, Туй, Туб
цинга	Арс, Бри, Кэпс, Кауст, Кали-с, Кали-м, Кали-п,
	Креос, Лик, Мерк, Нукс-в, Плб, Сакх,
	Стафилококк, Сульфат
Скотомы изжога солнечный	Nat-m, Plb, Psor
удар	Ant-t, Calc-p, Carc, Kali-c,
дрозд	Arap, Alm-ns, Bell, Glon, Nat-c, Nat-m, Syph,
	Ther
	Ает, Ант-т, Арс, Бор, Брай, Калад, Кауст,
	Хлорпр, Кали-бр, Кали-хл, Мерк, Нит-ак, Псор,
	Сакх, Сеп, Стафилококк, Сульф, Сульфид-и,
	Carc, Med
Паукообразные невусы	Ars, Bac, Bar-c, Bell, Bry, Calc, Calc-p, Calc-s,
Расщелина позвоночника	Merc, Nit-ac, Phos, Psor, Sil, Staph, Sulph, Syph,
	Thuj, Tub
Спинальный менингит	Abrot, Apis, Ars, Bell, Cic, Gels, Hyos, Nat-s,
	Nux-v, Op, Plb, Tub
Осколочные травмы	Arn, Cic, Нер, Sil, Staph
Анкилозирующий спондилит	Туй
Спру см. Целиакия Круглые	
черви см. Глисты	Abrot, Anth, Ars, Bar-c, Bell, Bor, Calc, Caust,
	Cham, Chen-a, Cic, Cina, Ferr, Gran, Hyos, Ign,
	Jatr-c, Kali-c, Mag-c, Merc-d, Nat-m, Nit-ac, Nux-
	v, Phos, Pin-s, Psor, Scir, Sil, Spig, Staph, Sulph,
	Teuer, Thuj, Tub, Verat
	Ант-т, Арс, Кальк-сил, Кауст, Хиос, Креос, Лах,
Стафилококк Стафилома	Туй
	Туй

синдром Стилла	Abrot, Merc, Thuj, Tub
спазм голосовой щели, см.	
ларингизм	Туй
Метаболические нарушения	Астак, Бор, Буфо, Флор-п, Кали-и, Кали-п, Мед,
Стоматит	Мерк, Мерк-д, Нит-ак, Нукс-в, Псор, Сен, Сульф, Сиф, Туй
Косоглазие	Aeth, Agar, Ant-c, Ant-t, Apis, Bufo, Calc, Calc-p, Camph, Caust, Cic, Cina, Cycl, Hyos, Jab, Kali-br, Kali-p, Lyc, Nat-m, Nux-v, Op, Phos, Plb, Psor, Puls, Sil, Staph, Stram, Sulph, Syph, Тарент, Tub, Цинк
Стрептококки	Ail, Ant-t, Ars, Bapt, Calc-p, Cinnb, Hyos, Lac-c, Lyc, Merc-cy
Зоб	Apis, Aran, Aur, Bufo, Calc-sil, Iod, Kali-c, Lyc, Mag-c, Op, Phos, Plat, Psor, Sep, Sil, Spong, Staph, Stram, Sulph-i, Tub, Verat
ступор	Эт, Айл, Ант-т, Арс, Буфо, Цик, Диф, Хиос, лодоф, Лах, Плб, Реум, Страм, Тарент
	Carc, Lac-c
самоубийство	Мош
Синкопе как обморок	Apis, Berb, Bry, Caust, Hep, Lyc, Rhus-t, Sil,
Синовит	Sulph
Сирингомиелия	Фос, Плб
Т	
Tabes mesenterica	Abrot, Ars, Bac, Bar-c, Calc, Cina, Iod, Nux-v, Puls, Sil, Tub
Кисты, задерживающие салоотделение (атеромы)	Бар-с, Кальк, Кальк-сил, Граф, Кали-бр, Кали-
глухота	с, Лус, Сил Асар, Бор, Кальк, Кауст, Хело-с, Геп, Кали-м, Кали-п, Кальк-с, Лак-к, Лик, Мед, Нит- ак, Сульф, Сиф, Тудж, Туб, Виол-о
Телеангиэктазии	Плб
Тенезмы	Calc-p, Lac-c, Merc, Merc-d, Nat-s, Nux-v, Op, Rheum
Тетания	Аэт, Агар, Ант, Муравей-т, Аран, Арге, Арс, Апис, Бар-с, Белл, Бром, Бри, Буфо, Кальк, Кальк-п, Камф, Кант, Карк, Кауст, Чам, Хлор, Цик, Цина, Кофф, Купр, Ферр, Гели, Геп, Хиос, Игни, Джаб, Джатр-с, Кали-бр, Кали-с, Креос, Lac-c, Lac-del, Lac-leo, Lach, Lyc, Merc, Mosch, Mygal, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Op, Ph-ac, Plat, Plb, Puls, Rheum, Sacch, Sil, Staph, Stram, Sulph, Ther, Thuj, Verat
	Cic
	Ферр
Столбняк Талассемия Тромбоз	Сакх
Тромбоцитопения	Хлорпр, Ферр

ТИА (транзиторная ишемическая Атака)	Плб
Опоясывающий лишай,	Амбр, Бак, Белл, Кальк-м, Кант, Лах, Нат-ар, Нат-м, Сен, Стафилококк, Сульфат, Туй
Опоясывающий лишай головы	Вас, Bromine, Calc-m, Dulc, Graph, Med, Sulph, Part
Tinea circinata	Вас, Nat-ar, Tell, Sep
Паховая дерматомикоз	Амбр, Белл, Кант, Лах, Сен, Туй
Опоясывающий лишай стоп	Смех
Tinea tongualis	Нат-м
Звон в ушах	Кауст
бешенство	Арс, Хёс
Гипертрофия миндалин	Agra, Ail, Alumn, Aur, Вас, Bar-c, Bar-m, Bell, Calc, Calc-i, Calc-p, Carc, Gins, Graph, Kali-bi, Lac-c, Merc, Sil, Staph, Sulph-i, Syph, Thuj, Tub, Агар, Аил, Выпускник, Амф, Ант-т, Апис, Арс, Аур, Бад, Бапт, Бар-с, Бар-м, Бар-п, Белл, Бром, Бри, Кальк-п, Кальк-сил, Шапки, Карк, Чам, Чен-а, Циннб, Купр, Диф, Дифтокс, Дульк, Эвкал, Ферр, Геп, Игн, Лод, Кали-с, Кали-хл, Кали-м, Кали-п, Креос, Лак-с, Лак-дель, Лах, Лыс, Merc, Merc-су, Nat-s, Nit-ac, Phos, Plb, Psor, Puls, Sep, Sil, Staph, Sulph, Syph, Tarent, Thuj, Tub, Tub-a, VAB, Цинк
Тонзиллит	Caust, Cupr, Ign, Mygal, Nux-v, Op, Phos, Sulph
Кривошея Синдром Туретта	агар
Токсоплазмоз	Туй
Трахеомалация	Сиф
Трахеопищеводный свищ см.	Сиф
свищи Трахома Свищ	
слезной железы см. свищи	
Стриктур слезного протока	Апис, Арс, Аур, Белл, Кали-м, Пульс, Сен, Сульф, Туй
Воспаление слезного мешка	Агар, Апис, Calc, Креос, Lach, Лыс, Merc, Nit-ac, Puls, Sil, Stann, Sulph.
см. дакриоцистит	Сил, Тиозин
Трихомонады Трихофития	
Тризм Перфорация	
барабанной перепонки	Сиф
	Бак
	Aeth, Ambr, Cic, Nux-v, Op
	Аур, Буфо, Кальк, Кальк-и, Капс, Граф, Гидр, лод, Кали-би, Кали-м, Кали-п, Мерк, Мерк-д, Сил, Сульф, Сульф-и, Тудж, Туб
туберкулез	Аброт, Агар, Апис, Арс, Аур, Бак, Бар-к, Буфо, Кальк, Кальк-кауст, Кальк-хп, Кальк-Иак, Кальк-п, Кальк-сил, Карк, Кауст, Чин, Хлорпр,

Опухоль глаз
Опухоль мейбомиевой
железы
синдром Тернера
Тимпанит
тиф

Flor-p, Hyos, Iodof, Iod, Kali-c, Kali-p, Kreos, Lyc, Mag-c, Mang, Med, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Olnd, Ol-j, Phos, Pin-s, Psor, Puls, Sacch, Sil, Spong, Stann, Staph, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Ther, Thuj, Tub, Tub-a, Tub-m, VAB

Дорогой

Kreos, Дорогой

Карц

Эт, Агар, Белл, Брай, Карб-в, Чин, Лак, Лик

Ant-t, Apis, Arn, Ars, Bapt, Bry, Chin, Cic, Hyos, Kali-p, Lach, Lyc, Nat-m, Nit-ac, Op, Phos, Stram, Сульф, Туб, Верат, Цинк

ТЫ

тошнота

Aeth, Ambr, Androc, Ant-c, Ant-t, Apis, Arge, Ars, Asaf, Bar-c, Bell, Bism, Bor, Bry, Calc, Calc-m, Calc-p, Calc-sil, Camph, Carc, Caust, Cham, Cina, Cocc, Coff, Colch, Cupr, Des-ac, Dig, Ferr, Hyos, Ign, Ipec, Jab, Jatr-c, Kali-bi, Kali-c, Kreos, Lac-ac, Lac-c, Lac-d, Lac-del, Lac-h, Lac-leo, Lach, Lyc, Mag-c, Merc, Mosch, Mygal, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Op, Petr, Phos, Pitu-a, Plb, Puls, Rheum, Sacch, Сакча, Санич, Сеп, Сил, Таранто, Тер, Туб, Цинк

Изъязвление см. язвы

Кровообращение см.

Панариций

недостаточный вес

Урахус обнажен

Уремия

Стриктура уретры

уретральный клапан

Крапивница

Abrot, Kreos, Tub

Hyos, Thuj

Акон, Апис, Арс, Хиос, Мосх, Оп, Плб

Apis, Canth, Cic, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Plb, Puls, Stram

Сульф-і

Anan, Antip, Ant-c, Apis, Ars, Bar-s, Bov, Bry, Calc, Calc-p, Caust, Chlcl, Chlorine, Cop, Kreos, Lach, Lyc, Med, Nat-m, Nux-v, Puls, Staph, Thyр

В

Полипы влагалища

Дефект межжелудочковой
перегородки

Ожоги

Расстройство желудка

Псор, пульс

Аур, Лор

Апис, Арс, Кант, Кауст, Фос

Aeth, Ambr, Androc, Ant-c, Aran-ix, Ars, Bar-c, Bry, Calc, Calc-p, Cann-s, Caps, Carb-v, Carc, Caust, Cham, Chin, Cina, Coff, Colch, Cop, Cupr, Cypr, Ferr, Ferr-p, Graph, Hyos, Ign, Iod, Ipec, Jab, Kali-br, Kali-c, Кали-м, Лак-с, Лик, Маг-с, Маг-м,

Расстройство желудка (продолжение)	Merc, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Petr, Ph-ac, Phos, Psor, Ptel, Puls, Sacch, Sanic, Sep, Sil, Staph, Sulph, Symph, Tarent
искривление	Agn, Arn, Ars, Bell, Bry, Calc, Caust, Ign, Lyc, Nat-m, Nit-ac, Nux-v, Phos, Psor, Puls, Rheum, Rhus-t, Ruta, Sep, Sil, Staph, Sulph, Thuja
растяжение связок	Bell, Bry, Calc, Cic, Nat-m, Psor, Sil
запор	Аброт, Аэт, Агар, Алоэ, Квасцы, Квасцы, Амбр, АМП, Амф, Ант-с, Бак, Бар-с, Бар-с, Белл, Брай, Буфо, Кальк, Кальк-сил, Карк, Кауст, Чам, Хлорпр, Колл, Колок, Коп, Купр, Фил, Граф, Хиос, Игни, Индг, лод, Кали-бр, Кетоглак, Kreos, Lac-с, Lac-d, Lac-f, Lach, Lyc, Mag-с, Mag-m, Mag-s, Med, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Op, Phos, Plat, Plb, Psor, Pitu-a, Puls, Rhus-t, Sacch, Sanic, Senn, Sep, Sil, Staph, Sulph, Syph, Тарент, Тюб-м, Верат, Цинк
Витилиго	Ant-t, Calc-sil, Chlorpr, Ign Bor, Canth, Syph,
Вульвовагинит	Thuja
В	
Стойкое вегетативное состояние	Acon, Bell, Hyos, Lach, Op
Рост должен страдать	Aeth, Agar, Ap-g, Asaf, Aur, Bar-с, Calc-p, Caust, Conch, Ferr-act, Guaj, Hep, Hipp, Ictod, Lac-del, Lach, Mag-met, M-aust, Merc, Nit-ac, Ol-an, Ol-j, Ph-ac, Phos, Sil, Staph
Бородавки	Anac, Ant-с, Ant-t, Aur, Bar-с, Bar-s, Bell, Bufo, Calc, Calc-sil, Carc, Caust, Cina, Cupr, Dulc, Ferr, Hep, Kali-с, Kali-s, Lac-с, Lach, Lyc, Mag-с, Med, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nit-ac, Op, Psor, Рус-т, Сабин, Саник, Сапс, Сен, Сил, Стафилококк, Сиф, Туй
Задержка жидкости см. отёк	
Висцеральная коса см. рlса	
rolonica Гиперметропия см.	
гиперметропия Болезнь	Кальк-п
Верднига-Гоффмана Синдром	Муравей-т
Вильсона-Микити Пелёночный	Кант, Кауст, Кали-хл, Мерк, Туй
дерматит Ветряная оспа	Ail, Ant-с, Ant-t, Bapt, Bry, Calc, Coff, Hyos, Kali-m, Maland, Merc, Plat, Psor, Puls, Sep, Sulph, Thuja, Tub
Искривление позвоночника	Асаф, Аур, Бар-с, Белл, Буфо, Кальк, Кальк-ф, Кальк-п, Кауст, Кали-с, Лус, Мерс, Мерс-с, Оп, Фос, Плб, Псор, Пульс, Сен, Сил, Сульф, Сиф, Тарент, Тер, Туй, Туб, ВАБ

травма позвоночника	Арн, Цик, Гипер, Кали-с, Нат-сНит-ак, Таранто, Туй, Цинк
черви	Abrot, Ambr, Anis, Anth, Ant-c, Arge, Ars, Art-v, Atra-r, Bapt, Bar-c, Bar-s, Bell, Bor, Calad, Calc, Calc-caust, Calc-p, Carc, Caust, Cham, Chen-a, Chin, Cic, Cina, Coff, Coli, Cupr, Eucal, Ferr, Fil, Gran, Hyos, Ign, Indg, Jab, Kali-c, Kali-m, Lys, Mag-c, Med, Merc, Nat-m, Nat-s, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plat, Psor, Puls, Sabad, Sacch, Scir, Sep, Sil, Spig, Staph, Stram, Sulph, Sulph-i, Expensive, Thuj, Tub, Verat, Viol-o, Viol-t, Zinc

X

Х-образные колени см. Genu valgum

3

Скрежетание зубами	Ant-c, Ant-t, Apis, Ars, Bac, Bell, Bor, Bufo, Calc, Carc, Caust, Cic, Cina, Coff, Cop, Cupr, Ferr, Hell, Hyos, Ign, Kali-br, Kali-c, Kali-p, Lys, Merc, Mygal, Nux-v, Op, Plb, Psor, Stram, Sulph, Sulph-i, Syph, Tarent, Thuj, Tub, Zinc
Абсцесс зуба	Кальк, Чам, Мерк, Пульс, Сил, Стафилококк, Туй
Dental fistula sa fistulas	
Абсцесс десны	Bar-c, Sil, Staph, Sulph
	Bar-c, Bufo, Calc, Cham, Caust, Hecla, Нер, Lys, Med, Merc, Puls, Sil, Staph, Sulph
Кровоточивость десен	Агар, Амбр, Муравей-с, Апис, Аран, Арс, Аур, Бар-с, Бар-с, Белл, Бов, Буфо, Кальк, Кальк-сил, Карб-в, Карк, Кауст, Хлорпр, Цик, Граф, Хиос, Кали-с, Кали-м, Кали-п, Креос, Лак-с, Лак-ч, Лак, Лис, Мед, Мерс, Мерс-с, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Nux-v, Phos, Plb, Psor, Sep, Staph, Sulph, Sulph-i, Tarent, Thuj, Tub
Гингивит см. Гингивит Рецессия	
десен	Ant-c, Aur, Bry, Calc, Caps, Carb-v, Caust, Cic, Cupr, Kali-c, Kali-m, Lac-c, Lys, Merc, Nat-m, Phos, Plb, Psor, Staph, Sulph-i, Syph, Thuj, Tub, Verat
Кариес зубов	Am-c, Ambr, Amph, Ars, Bar-c, Bor, Calc, Calc-f, Calc-p, Calc-sil, Carc, Chin, Coff, Fl-ac, Hecla, Ign, Kreos, Lach, Mag-c, Med, Merc, Mez, Nat-m, Nat-sil, Nit-ac, Phos, Plan, Plat, Plb, Puls, Sep, Sil, Staph, Stram, Сульфид, Сиф, Туй, Ваниль, Цинк
зубная боль	Ant-c, Bar-c, Bor, Calc, Calc-sil, Cham, Coff, Ferr, Ign, Kali-c, Kreos, Lac-c, Lys, Mag-c, Mag-p, Merc, Nat-m, Nat-sil, Nat-s, Nux-v, Puls, Rheum, Sep, Sil, Staph, Sulph-i, Thuj
Положение зубов, нарушенное	Ванна

Проблемы с прорезыванием зубов	Агра, Ает, Ант-с, Муравей-т, Апис, Арс, Бак, Бар-с, Белл, Бисм, Бор, Брай, Кальк, Кальк-бр, Кальк-п, Кауст, Чам, Хлол, Хлор, Цик, Цина, Кофф, Купр, Кипр, Ферр, Фл-ак, Гели, Хиос, Игн, Ипека, Джал, Кали-бр, Кали-с, Кали-п, Креос, Лах, Маг-с, Мед, Мерк, Мерк-д, Нат-м, Нит-ак, Нукс-в, Оена, Олнд, Оп, Фос, Плат, Псор, Пульс, Реум, Скат, Сен, Сил, Стафилококк, Страм, Сульф, Сульф-и, Сиф,
Вросшие ногти на ногах	Caust, Kali-m, M-aust, Nat-m, Sil, Staph, Sulph, Sul-i, Expensive, Thuj
Детский церебральный паралич	Апис, Бар-с
Штаммы	Bry, Thuj
целиакия	Calc-p, Lac-h, Lyc, Psor
Прикус языка см. укушенные раны	
Воспаление языка см. глоссит	Агар, Оба, Кауст, Гиос, Оп, Плб, Ревень, Шрам
паралич языка	Arg-n, Ars, Carc, Cupr, Iod, Kali-c, Manc, Nat-m, Nat-sil, Nux-v, Plat, Psor, Sep, Sulph, Syph, Thuj, Tub
паралич	
Обсессивно-компульсивное расстройство	
Паралич диафрагмы см.	Медь, мох, сила
Паралич Карликовость см.	
Низкий рост Цианоз	Arap, Ant-t, Ars, Aur, Bell, Bor, Bry, Calc, Calc-p, Carb-v, Cic, Cina, Cupr, Dig, Hydr-ac, Hyos, Ipec, Kali-c, Lach, Lyc, Mosch, Nat-m, Nux-v, Oena, Op, Plb, Psor, Stram, Thuj, Verat
цистит	Apis, Bapt, Benz-ac, Cann-s, Carb-v, Chin, Coli, Cop, Dulc, Equis-h, Hep, Kali-m, Lach, Lyc, Med, Merc, Nit-ac, Puls, Sep, Staph, Tarent, Tub
Цитомегаловирус	Кауст, Туй



Генри Ньюэлл Гернси

ГОМЕОПАТИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВЕ

664 страницы, твердый переплет, 79 евро

Труд Генри Ньюэлла Гернси, вероятно, является наиболее полным стандартным трудом по гомеопатическому лечению в гинекологии и акушерстве.


У Гернси был богатый опыт работы в качестве руководителя крупной гомеопатической женской клиники. Он умел сводить описание симптомов к самому необходимому и считался мастером назначения лекарств на основе ключевых симптомов.

Возможен быстрый и целенаправленный выбор средств.

Чтобы пережить период беременности полностью физиологично, необходимо отказаться от всех нефизиологичных и нефилософских привычек и воздержаться от всех вредных практик.

Беременная женщина должна стремиться к достижению максимального покоя и бодрости духа, жить в мире с собой и миром, ибо её духовное и эмоциональное состояние, безусловно, передастся её потомству. Воспитание будущего поколения начинается ещё в утробе матери!

Генри Ньюэлл Гернси



Кейт Бирч

БЕЗ ВАКЦИН

Гомеопатическая профилактика и лечение инфекционных заболеваний

416 страниц, твердый переплет, 35 евро.

Практическое руководство по гомеопатическому лечению и профилактике инфекционных заболеваний.

В этой работе она дает четкое введение в основные принципы гомеопатии, а также всесторонний

обзор распространённых инфекционных заболеваний, их возбудителей, распространённых вакцинаций и методов лечения, а также возможных гомеопатических профилактики и терапии. Включает распространённые детские заболевания, такие как ветряная оспа, корь, краснуха и скарлатина, а также распространённые инфекционные заболевания, такие как средний отит, грипп, мононуклеоз и пневмония, и другие инфекции, такие как бешенство, столбняк, дифтерия и туберкулёз. Подробный раздел также посвящён заболеваниям, передающимся половым путём, таким как герпес, гонорея, сифилис, СПИД и гепатит.

Также подробно рассматриваются тропические болезни, такие как жёлтая лихорадка, лихорадка денге, малярия и тиф. Отдельный раздел посвящён лихорадке, её различным формам и гомеопатическому лечению, а ещё одна глава посвящена вреду вакцинации и его терапии. «Книга не перегружена подробностями, но и не слишком поверхностна — Кейт Бёрч удалось представить материал практически идеально. Я очень ценю практическую пользу книги. Она даёт точную и целенаправленную информацию даже для родителей, которые ещё не решили, делать ли прививки. Я настоятельно рекомендую эту книгу каждому гомеопату».

Доктор Й. Розенцвайг, Homeopathic Links



Фарох Мастер

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Учебник и Materia Medica — с более чем 150 кожными заболеваниями и многочисленными цветными иллюстрациями

568 страниц, твердый переплет, 69 евро.-

Вероятно, наиболее полный труд по гомеопатическому лечению кожных заболеваний. «Фарох Мастер» впечатляет ясностью изложения, глубокими клиническими знаниями и исключительно подробными описаниями дерматологических симптомов. В этой книге

он мастерски сочетает свой обширный клинический опыт с выдающейся гомеопатической наблюдательностью. В своей книге доктор Мастер описывает около 150 заболеваний кожи, волос и ногтей. Он рассматривает гомеопатические подходы к лечению острых состояний (например, ожогов, инфекционных дерматозов), а также хронических и тяжёлых дерматозов (например, экземы, зуда, микозов, проказы и туберкулёза).



Фарох Мастер

МОЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА В ГОМЕОПАТИИ

192 страницы, твердый переплет, 29 евро

Известный индийский врач представляет наиболее полный и клинически обоснованный труд о средствах на основе молока. Книга содержит 15 описаний препаратов, что делает её исчерпывающим сборником по этому семейству. Все представленные препараты обогащены клиническим опытом. В ней не только перечислены симптомы, но и объяснено их значение, а также даны рекомендации по дифференциальной диагностике.

Помимо общих тем о молочных средствах, следует описание лекарственных препаратов *Lac humanum* (человек), *Lac equinum* (лошадь), *Lac delphinum* (дельфин), *Lac caprinum* (коза), *Lac leoninum* (лев), *Lac caninum* (собака), *Lac felinum* (кошка), *Lac vaccinum defloratum* (обезжиренное коровье молоко), *Lac ovinum* (овца), *Lac suinum* (свинья), *Lac lupinum* (волк), *Lac asinum* (осел) и *Lac phoca vitulina* (тюлень).



Франс Куссе

ТИПЫ ДЕТЕЙ

56 гомеопатических конституционных средств

280 страниц, твердый переплет, 39 евро.

Проницательный и дружелюбный голландский врач Франс Куссе, опираясь на свой обширный клинический опыт, описывает 56 распространённых гомеопатических типов детей. Он мастерски описывает психологические особенности каждого препарата, создавая яркие, легко узнаваемые образы.

Книга поистине оригинальна и написана практикующим врачом. Помимо полихрестов, таких как *belladonna* и *pulsatilla*, он также описывает менее известные препараты, такие как *berill*, *литий*, *марганец*, *гелий*, *водород* и *сахар лекарственный*. Они очень часто показаны детям, но до сих пор описывались преимущественно только для взрослых, да и то лишь изредка в специализированных журналах.



Дидье Гранджорж

СПРАВОЧНИК ПО ДЕТСКОЙ ГОМЕОПАТИИ


Гомеопатическое лечение в острых случаях

344 страницы, твердый переплет, 39 евро

Дидье Гранджорж является одним из самых опытных гомеопатических педиатров в мире. В этой книге он делится своими обширными знаниями и рассказывает о проверенных средствах лечения самых разных детских заболеваний. Книга показывает весь спектр гомеопатического лечения детей. В этой книге он делится своими обширными знаниями и объясняет проверенные средства для лечения широкого спектра детских заболеваний. В книге представлен весь спектр

от беременности, родов и периода новорожденности до типичных детских болезней, доктор Гранджорж также объясняет более глубокий смысл симптомов, предоставляя ценные подсказки к основной проблеме.

Очевидно, что рекомендации по лечению основаны непосредственно на опыте выдающегося клинициста, что придаёт книге необычайную оригинальность. Знания из первых рук — настоящая сокровищница!



Патрисия Ле Ру

БАБОЧКИ В ГОМЕОПАТИИ

13 бабочек — Испытания, эссенции и случаи

152 страницы, твердый переплет, 28 евро

В этой работе известный французский педиатр Патрисия Ле Ру исследует почти неизведанную область бабочек в гомеопатии, открывая невообразимые терапевтические возможности.

В книге представлены испытания, случаи и эссенции 13 бабочек и мотыльков: калифорнийского зимородка, кудрявого зимородка, сиреневой пяденицы, полевой пяденицы, золотистой певчей птицы, серной змеи, бражника «мёртвая голова», голубоглазого бражника,

бабочка морфо, бабочка павлинья, бабочка-перламутровка, бабочка-капустница большая, бабочка-крапивница малая и огневка ежевичная.



Розина Зонненшмидт.

КОМПЛЕКТ СЕРИИ

«ОРГАН — КОНФЛИКТ — ИСЦЕЛЕНИЕ» в 12 ТОМАХ

С помощью гомеопатии, натуропатии и упражнений


1884 страницы, твердый переплет, 365 евро.

Согласно принципу резонанса, болезнь проявляется в соответствующем органе и служит посредником между конфликтом и его решением.

В серии «Орган-Конфликт-

Лечение с помощью уникального сочетания различных целостных подходов к лечению из гомеопатии, миазматика, китайской медицины, целевого питания, разрешения конфликтов и упражнений для создания концепции целостной терапии.

Комплект включает следующие 12 томов с указателем: Том 1: Кровь, Том 2: Печень и желчный пузырь, Том 3: Органы пищеварения, Том 4: Дыхательная система, Том 5: Почки и мочевой пузырь, Том 6: Сердце и кровообращение, Том 7: Эндокринные железы, Том 8: Женские и мужские половые органы, Том 9: Мозг и нервная система, Том 10: Органы чувств, Том 11: Система конечностей, Том 12: Мембраны и лимфатическая система. Все тома также доступны по отдельности.



Хельмут Леманн

ДЕТСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ СТАЛА ПРОЩЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Быстро найдите правильное средство от более чем 80 распространенных жалоб

208 страниц, твердый переплет, 19,90 евро

Название книги говорит само за себя: в книге «ДЕТСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ, ЛЕГКО ПОНЯТНАЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» доктор Хельмут Леманн предоставляет родителям важнейшую информацию о жалобах и заболеваниях младенцев и малышей. В своей практике врач общей практики, специализирующийся на детской гомеопатии

значительно развить гомеопатию.

Отличительной чертой этой книги является подробное описание различных гомеопатических средств и их ключевых симптомов, а также сравнение с аналогичными средствами для дифференциальной диагностики. Внимательные родители найдут здесь эффективные средства для мягкой поддержки, учитывающие особенности личности своего ребёнка.



Манфред фон Унгерн-Штернберг

О ЗНАЧЕНИИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

лечение скарлатины, кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы

296 страниц, твердый переплет, 29 евро.

Манфред фон Унгерн-Штернберг — один из самых опытных врачей - гомеопатов в Германии, за время своей практики он вылечил множество случаев детских болезней

Деятельность по развитию иммунитета и личности ребёнка. Он чётко и убедительно взвешивает преимущества и недостатки, содержательно обсуждает роль вакцинации.

Работа захватывает личным опытом этого великого гомеопата и вдохновляет на целостный подход к этому важному этапу развития ребенка.



Джудит Райхенберг-Ульман / Роберт Ульман / Ян Люпкер

ГОМЕОПАТИЯ ПРИ АУТИЗМЕ И СИНДРОМЕ АСПЕРГЕРА

320 страниц, твердый переплет, 24 евро

Расстройства аутистического спектра встречаются чаще, чем принято считать. В принципе, этот диагноз следует рассматривать в отношении любого замкнутого ребёнка, который выглядит исключительно умным, но не обладает нормальным чувством социального этикета и обладает уникальным талантом.

Известная американская пара писателей Райхенберг-Ульман и их коллега Люпкер посвятили себя именно таким детям.

В книге показано, что эти поведенческие расстройства можно успешно лечить гомеопатией. Сначала показано, как распознать расстройство поведения в спектре аутизма. Затем описывается новый гомеопатический метод Раджана Шанкарана, который делает акцент на «жизненно важных ощущениях» как на центральном нарушении и привлекает внимание во всем мире. Это делает книгу ценной не только для родителей, но и для всех, кто хочет познакомиться с этим новым методом.



Робин Мерфи

КЛИНИЧЕСКАЯ MATERIA MEDICA и КЛИНИЧЕСКИЙ РЕПЕРТОРИУМ

В УПАКОВКЕ

4704 страницы, твердый переплет, 263 евро

Цена комплекта включает 2-е переработанное издание «Клинической Материи Медики» (138 евро) и 3-е переработанное издание «Клинического реперториума гомеопатии» (125 евро). Стоимость каждого издания по отдельности составляет 263 евро.

«Клиническая Материя Медика» («Nature's Materia Medica») – третье издание «Lotus Materia Medica» Мёрфи, непревзойденное по полноте и краткости. В книге рассматривается более 1400 гомеопатических и фитотерапевтических средств. Мёрфи сочетает в себе

знание испытаний, включая историческое применение, фольклор, легенды, клинко-терапевтическое применение и токсикологию. Симптомы расположены в том же алфавитном порядке, что и в реперториуме. Это делает книгу идеальным справочником по фармакологии в сочетании с «Клиническим реперториумом» Мёрфи.

Клинический реперториум Мёрфи пользуется большой популярностью. Одним из его преимуществ является простая алфавитная структура, что делает его удобным в использовании и обеспечивает быстрый доступ даже для новичков. Многие гомеопаты подтверждают, что этот труд удобен и практичен, и что они используют его только с тех пор, как открыли для себя. По объёму он не уступает другим крупным реперториумам (более 2300 препаратов).



Кристиана Мауте

ГОМЕОПАТИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ – КЛАССИКА В

15-е ИЗДАНИЕ

Практическое руководство по комнатным, балконным и садовым растениям

С дополнениями Корнелии Мауте

244 страницы, твердый переплет, 28 евро.

Публикация книги «Гомеопатия для растений»

спровоцировала зелёную революцию. Книга была продана тиражом более 76 000 экземпляров и переведена на многие языки.

Это удобное руководство по наиболее распространённым болезням, вредителям и травмам растений, а также их гомеопатическому лечению. Кристиана Моте® — одна из пионеров, много лет применяющих гомеопатию для своих сельскохозяйственных культур и декоративных растений.

Будь то пятнистость листьев роз, бурая гниль томатов, бактериальный ожог плодовых деревьев, тля, курчавость листьев, язвенный стоматит, мучнистая роса, монилиоз плодов, нашествие слизней, черная пятнистость или замедленный рост, г-жа Моте объясняет - проверенные способы лечения самых распространённых заболеваний. Даже при последствиях заморозков, града, травм, порезов после обрезки деревьев и кустарников, повреждений от жары и пересадки инструкции понятны и просты для неспециалистов.

Большинство заболеваний проиллюстрированы иллюстрациями, что позволяет легко - определить заболевание и найти правильное лекарство. Дозировка и применение пересмотрены и сделаны предельно понятными благодаря удобной съёмной таблице. Краткая фармакологическая справка дополняет работу.



Фарох Мастер

Труд Фароха Мастера пользуется неизменной популярностью с момента его публикации и стал одним из основных стандартных трудов по гомеопатическому лечению детей.

Помимо «основных» детских средств, он также содержит «малые», менее известные средства, которые, согласно рекомендациям Фароха Мастера, особенно эффективны для детей. Фарох Мастер рекомендует *хвош.* как основное средство от ночного энуреза, *Alcoholus* при СДВГ, *Jaborandi* при эпидемиях свинки, *Magnetis poli ambo* при фимозе и *самбуке* от ночной астмы. Книга содержит более 180 описаний лекарственных средств и является одним из наиболее полных трудов по педиатрии.

Обширный опыт автора в педиатрии отражается в изложении препаратов, поскольку он описывает их, основываясь на собственных клинических наблюдениях.

Фарох Мастер также подробно описывает этапы развития ребенка и оказывает важную помощь в лечении новорожденных и младенцев, у которых зачастую можно обнаружить лишь несколько симптомов.

Заключительный раздел представляет собой подробный клинический реперторий, облегчающий поиск лекарственных средств. Это делает книгу полной и уникальной.

«Самая полная работа по гомеопатии в педиатрии, о которой я знаю». *Миша Норланд*

«Шедевр гомеопатической литературы». *Дидье Гранджорж*

В 4е издание добавлены следующие препараты:

Lac vaccinum defloratum, Folliculinum, Elaps corallinus, Naja tripudians u Palladium.