

DR. A. U. RAMAKRISHNAN

CANCER

MY HOMEOPATHIC METHOD



Доктор А.У. Рамакришнан

РАК

МОЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ МЕТОД



ДОКТОР А.У. РАМАКРИШНАН
РАК
МОЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ МЕТОД

978-3-95582-089-3

Первое английское издание 2015 г.

Второе английское издание 2017 г. © 2015 Narayana Verlag

Дизайн макета и обложки: Narayana Verlag

НАРАЯНА ВЕРЛАГ Блюменплац 2, 79400 Кандерн, Германия

Содержание

Преамбула.....	7
<i>Введение</i>	<i>9</i>
<i>Мой вид с высоты птичьего полета</i>	<i>10</i>
<i>Подтверждение</i>	<i>12</i>
<i>Краткое введение в гомеопатию</i>	<i>13</i>
<i>Указания для гомеопатов</i>	<i>15</i>
 Часть 1	 17
Часто излечимые виды рака -	
Основные средства и излеченные случаи	19
Мочевой пузырь	20
Кость	23
Мозг	27
Грудь	32
Шейка матки	41
Детский рак	44
Толстая кишка/прямая кишка	51
Желчный пузырь	57
Гортань и голосовые связки	59
Лейкемия	63
Печень	68
Легкое	71
Лимфома	75
Меланома	79
Рот	82
Пищевод	85
Яичник	87
Поджелудочная железа	96
Околоушная железа	99
Простата	102
Редко/Тимома	107
Прямая кишка (см. Толстая кишка)	109
Кожа	110
Желудок	113
Щитовидная железа	116
Матка	118

Часть 2.....	121
Паллиативная помощь в ситуациях, не поддающихся	лечению 122
<i>Кость</i>	124
<i>Грудь</i>	126
<i>Толстая кишка/прямая кишка</i>	128
<i>Лейкемия</i>	133
<i>Печень</i>	134
<i>Легкое</i>	136
<i>Рот</i>	138
<i>Пищевод</i>	141
<i>Яичник</i>	144
<i>Поджелудочная</i>	146
.....	<i>железа</i>
<i>Простата</i>	148
<i>Прямая кишка (см. Толстая кишка)</i>	151
<i>Желудок</i>	152
<i>Матка</i>	155
 Часть 3.....	 159
Смягчение конца жизни	160
<i>Веретеноклеточная карцинома</i>	161
<i>Рак легких</i>	162
<i>Плоскоклеточная карцинома головы и шеи</i>	163
Наиболее часто используемые средства	164
<i>Раковые нозоды</i>	164
<i>Специфика рака</i>	166
<i>Органоспецифичность</i>	167
Средства для облегчения состояния в конце жизни	174
Инструкции для Plussing	176
Гомеопатия с традиционной	178
Профилактика и рецидив	180
Статистика	181
Часто задаваемые вопросы с ответами	183
Заключение и будущее	190
 Приложение.....	 191
<i>Об авторе</i>	192
<i>Индекс средств правовой защиты</i>	196
<i>Общий индекс</i>	199

Преамбула

Введение

Мой отец, гомеопат и врач (MD), был моим наставником, вдохновив меня завершить свое традиционное медицинское образование. После получения степени доктора медицины я начал гомеопатическую подготовку у Марджери Блэки на Лондонском факультете гомеопатии. Мой отец также вдохновил мою сестру и брата пойти по медицинскому, гомеопатическому пути. Именно потеря моих братьев и сестер из-за рака заставила меня сосредоточиться на раке более 40 лет назад. Тогда, в моей собственной практике, я также не имел успеха в лечении рака. С годами, пробуя различные комбинации дозировок и потенций, родился мой метод Plussing. Я научился лечить и контролировать случаи рака, иногда с излечением, часто со стабилизацией и, при необходимости, с паллиативным облегчением.

За 14 лет с тех пор, как я впервые изложил свой метод лечения рака для гомеопатов и пациентов, мой метод претерпел изменения. За это время количество случаев рака, которые я вылечил, утроилось с 5000 до более чем 15000. Просматривая многие из моих старых случаев, я заметил, что с этим дополнительным опытом я усовершенствовал свой метод назначения лекарств и выбор лекарств. Я не собирался вносить изменения, но теперь, когда я их заметил, пришло время снова опубликовать обновления и представить ряд новых случаев.

Преобладание обнадеживающих результатов поддерживает мою мотивацию на пике, позволяя мне продолжать вносить коррективы по мере необходимости. Часто об этих успехах мне напоминает моя доверенная коллега и подруга Эйлин Изисон, которая снова решила, что нужна новая книга. Этот том должен прояснить метод, обратившись к проблемам, которые мы слышали на протяжении многих лет, и в то же время включив новые методы и варианты лечения.

Для тех, кто знаком с первой книгой, следует отметить, что по состоянию на 2012 год почти в каждом случае, представленном как излечение, пациент по-прежнему не имел рака.

Мой вид с высоты птичьего полета

Случайное событие около 17 лет назад побудило меня работать с доктором Рамакришнаном и на него. Это превратилось в уникальную работу, которую многие другие гомеопаты считают своей целью — пока не попробуют!

За эти годы у меня была уникальная возможность наблюдать за назначениями и успехами доктора Рамакришнана. Часто, когда коллеги посещают семинары, сообщают о блестящих случаях, но никогда не бывает долгосрочного подтверждения.

Вот где мой обзор не имеет себе равных.

Я брала много случаев в США для доктора Рамакришнана и помогала пациентам начать их путь. Я слышу от них напрямую, как у них идут дела, как удивительно, так и разочаровывающе. У тех, от кого мы ожидаем успеха, удивительные результаты намного превосшли разочарования. Тем не менее, пациенты заканчивают лечение или просто исчезают, когда думают, что им надоело бороться со своей болезнью. Я часто задаюсь вопросом, что происходит с этими людьми, и так же часто я узнаю об этом неожиданным образом.

Недавно мне позвонила женщина, которую направила к нам пациентка, лечившая у нас рак груди 4 стадии в 1998 году! (Сейчас 2012 год.) Как здорово знать, что она все еще здорова.

Иногда пациенты, которые давно были у меня, присылают мне записку с предложением прочитать определенную книгу или статью, а в последнее время они предлагают связаться со мной на LinkedIn. Когда эти люди пришли к нам, социальных сетей не было, так что это еще один способ узнать, что они все еще живут полной и насыщенной жизнью.

Хотя порой мы сталкиваемся лбами, это невероятный опыт — иметь дело с доктором Рамакришнаном, быть частью большого гомеопатического сообщества и многому научиться.

Часть обучения касается не только назначения лекарств, но и того, как помочь людям принять решение об окончании жизни.

Никогда не славясь своей тактичностью, я не ожидала, что это вызов. Я научилась сообщать плохие новости нестрашными, неугрожающими способами. Еще сложнее донести правду до

те, кто отчаянно надеется, что кто-то подтвердит то, во что они уже верят относительно безрадостности своего положения.

Когда я начал этот книжный проект, я просмотрел свои записи, чтобы определить, соответствует ли мое восприятие фактам в отношении успеха. Я осознаю свою предвзятость, полагая, что все больные раком должны следовать протоколу доктора Рамакришнана, потому что я считаю его таким блестящим.

Я был в шоке! Результаты даже лучше, чем я себе представлял. Мой отзыв меня полностью убедил.

Еще одним преимуществом работы с доктором Рамакришнаном является знакомство с некоторыми из многих превосходных гомеопатов в США. Часто я принимаю звонки от них, желающих получить ответы на вопросы о назначении и лечении, о том, как интегрировать лечение доктора Рама в их собственные стили назначения. Некоторые из тех, кто звонит, сами по себе знамениты, люди, чьи семинары я посещал и у которых учился в прошлом. Когда эти специалисты сохраняют открытость в отношении пациентов, которым они еще не смогли помочь, я знаю, что говорю с по-настоящему одаренным целителем, и что в результате работа доктора Рама будет иметь еще более широкий охват.

Эйлин Изисон

Гомеопат и консультант по холистическому лечению рака

eileen@isison.com

Признание

Чрезвычайная благодарность Мелиссе Фэрбенкс, RS Hom, за ее быстрое редактирование и разъяснение стольких моментов этой работы. Ее комментарии и исправления были бесценны. Когда я заблудился в лесу, она смогла увидеть деревья.

Я хотел бы выразить признательность и благодарность Кэтрин Р. Коултер, соавтору «Гомеопатического подхода к раку», которая недавно скончалась. Она использовала свои годы гомеопатического опыта, чтобы придать моим выводам систему и структуру; внесла много идей из собственного опыта ; блестяще создала метод представления случаев, который представлен в этом тексте, и привнесла свои редкие литературные навыки в написание книги.

Осторожность

Этот том предназначен как инструкция для обученных гомеопатов и как поощрение для онкологических больных рассмотреть этот вариант для их собственного лечения. **Это не руководство по уходу за собой.** Практикующие гомеопаты должны прочитать главу «Указания для гомеопатов». Пациенты должны обсудить содержание со своими врачами.

Краткое введение в гомеопатию

Читателям, незнакомым с философией, принципами и практикой гомеопатии, настоятельно рекомендуется обратиться к любой из множества вводных книг, доступных по этой теме. Их часто можно найти в магазинах здорового питания, библиотеках или в Интернете. Параметры этой книги допускают лишь минимальное введение.

Самуэль Ганеман был первым, кто разъяснил принципы гомеопатии в начале 1800-х годов. Основная предпосылка, основанная на законе подобия, наблюдалась гораздо дольше, начиная с Гиппократов. Ганеман наблюдал, что вещество, принимаемое - здоровым человеком, вызывало измеримые симптомы. Если те же симптомы наблюдались во время болезни, это же вещество могло их вылечить.

Исходя из этого основного принципа, Ганеман разработал строгие правила применения своего метода, включая «испытание» веществ, чтобы узнать, какие симптомы можно вылечить каждым конкретным веществом. Даже сегодня, когда наука открывает новые сущности, современные гомеопаты продолжают испытывать их и записывать информацию в справочные тексты, называемые *materia medica*.

В самой строгой классической традиции врач назначает одну дозу одного индивидуально подобранного лекарства (которое наиболее точно соответствует совокупности симптомов пациента), а затем ждет и наблюдает за эффектами дозы. Обзор на этом этапе необходим гомеопату для принятия решения о его или ее следующем шаге. У большинства пациентов «конституциональное » лекарство может быть определено на основе их физических, умственных, эмоциональных и личностных качеств.

Однако при острых заболеваниях (таких как укусы насекомых, ветряная оспа, лихорадка или грипп) ограниченное количество лекарств, по-видимому, работают лучше всего, независимо от типа личности. Они называются «специфическими средствами», поскольку они направлены на само конкретное заболевание, а не на комплекс физических, психических и эмоциональных симптомов пациента. Так и в

лечение рака. Тяжесть и часто срочность этого состояния требуют, чтобы индивидуальность пациента уступила «специфичности» самой болезни. При этой болезни, когда имеешь дело с измеримой - патологией, требуются менее тонкие методы назначения лекарств. Сама конкретность опухоли, как это часто бывает, в сочетании с гонкой со временем, требует более специализированного (а не индивидуального) способа назначения лекарств.

Гомеопатия настолько обширна и многогранна в своем лечебном воздействии, что большинство врачей разрабатывают свой собственный стиль назначения лекарств, обнаруживая, что определенные заболевания поддаются лечению разными методами.

Прежде всего, доктор Рамакришнан — классический гомеопат, получивший классическое образование, как описано во введении. Для всех распространенных жалоб он по-прежнему назначает лекарства именно так. В ситуациях, не представляющих угрозы для жизни, типичным назначением является одна доза хорошо подобранного средства с последующим ожиданием реакции. В случае рака это не вариант. Обычно нет времени ждать медленного ответа, поскольку рак, как правило, быстро прогрессирует. Поэтому нам пришлось выяснить, как ускорить процесс, чтобы заставить механизм исцеления организма работать быстрее, чем рак может распространяться. Имея более чем 40-летний опыт лечения рака и многочисленные испытания дозировки, выбора потенции и изучения *materia medica*, мы пришли к этому текущему протоколу лечения. Как учит Ганеман в «Органоне», «высшая и ЕДИНСТВЕННАЯ миссия врача — вернуть больному здоровье, вылечить, как это называется. Высший идеал лечения — быстрое, мягкое и постоянное восстановление здоровья в кратчайшие сроки, самый надежный и самый безвредный способ . Эти «правила» являются

необходимо было адаптировать назначение лекарств к срочности и тяжести состояния.

Отсюда этот метод, который включает в себя график частых повторений двух средств, чередующихся еженедельно. Цель этого чередования - не допустить утомления организма пациента средством, уменьшить возможность обострений и атаковать болезнь с двух сторон.

Инструкции для гомеопатов

У этого тома есть двойная цель. Во-первых, дать надежду и оптимизм пациентам и семьям, чья жизнь перевернулась с ног на голову из-за диагноза рака, и, во-вторых, научить и вдохновить других гомеопатов заняться этой работой.

Большинство гомеопатов, имеющих достаточно опыта, чтобы рассмотреть возможность взяться за случай с такой серьезной патологией, задаются вопросом о том, как они могут практиковать в привычном для них стиле с учетом полученного ими образования и знаний. Следует подчеркнуть, что доктор Рамакришнан не пытается изменить чей-либо стиль, а просто сообщает из своего обширного опыта, что работает лучше всего в большинстве случаев. Для тех, кто уверен, что получил истинное конституционное средство, которое они хотят назначить, редко есть причина не делать именно этого.

Однако следует помнить несколько вещей. Если пациент принимал это средство в прошлом или принимает его в настоящее время, и у него диагностирован рак, его следует серьезно пересмотреть как правильное средство. Иногда это действительно блестящее предписание, а рак своим коварным образом все же нашел хозяина, тогда это, скорее всего, будет средство, к которому следует вернуться, когда рак будет взят под контроль или устранен.

Стоит еще раз отметить, что доктор Рамакришнан — классический гомеопат и врач-терапевт. Его практика строго классическая, узнаваемо для всех других ситуаций.

При раке, если вы лечите его классическим способом, вы можете сидеть и смотреть, как сотни тысяч людей умирают классическим способом. Ганеман внес огромные изменения от своего 5-го Органона к 6-му. Это был большой шаг, и для этого потребовалось много мужества. Органон — это руководство, но не Библия. Только вечные ценности не могут быть изменены. Но научные исследования должны постоянно меняться. Единственное, что не меняется, — это то, что все меняется!

Итак, независимо от того, выбирает ли практикующий врач из описанного здесь набора средств или из своих личных знаний *Materia medica*, две самые важные детали — это использование «метода плюсования» чередования

конституциональное/органоспецифическое средство с нозодом и слегка изменяющимися часто повторяемыми дозами.

По причинам различий в практике гомеопаты являются одними из самых сложных пациентов, особенно когда сталкиваются с серьезной патологией. Если вы обученный гомеопат, ученик одного из «рок-звезд» в нашей области, и вы полностью уверены в их назначении, во что бы то ни стало позвольте им выписать вам лекарство. Затем принимайте его, следуя указаниям в этом томе, чередуя с правильным нозодом. Большинство гомеопатов сообщают о некоторых чудесных излечениях рака, но очень немногие имеют глубину последовательных результатов, показанных этим методом Plussing.

Некоторые из включенных случаев имеют особую учебную ценность для помощи практикующим врачам, которые должны назначать лекарства пациентам, которые также проходят аллопатическое лечение. Эти случаи охватывают весь спектр, показывая лечение всех стадий этого заболевания с химиотерапией, облучением или хирургией или без них.

Практикующие врачи заметят, что назначение лекарств в различных случаях не является последовательным. У некоторых есть примечания, объясняющие эти шаги на пути к текущему пути. Все случаи начинаются с обоих средств в потенции 200C. Органоспецифическая потенция средства увеличивается довольно рано, в то время как нозод остается в более низкой потенции в течение довольно долгого времени. Затем нозод обычно повышается до более высокой потенции, прежде чем органоспецифическая снова повышается. Если органоспецифическое средство необходимо изменить, новое средство дается в потенции 200C, в то время как нозод остается в той потенции, которой он достиг.

Важно подчеркнуть, что метод Plussing применяется только при лечении рака. Он ни в коем случае не должен использоваться при лечении других дегенеративных или хронических заболеваний.

Часть 1

Часто излечимые виды рака - Основные средства правовой защиты и Излеченные случаи

Следующие случаи представляют типы рака, которые дают стабильно хорошие результаты при лечении методом Plussing. Многие имеют чрезвычайно долгосрочное наблюдение.

Для ясности: месяц считается четырьмя неделями, что объясняет, почему некоторые временные рамки не совсем сходятся. Органоспецифическое лекарство всегда дается в нечетные недели, например, 1, 3, 5, 7, а нозод — в четные недели, 2, 4, 6, 8.

Плюсование всегда ежедневное.

Раздельные дозы всегда принимаются четыре раза в указанный день(дни), обычно утром, днем, вечером и ночью.

Частые повторные осмотры необходимы, всегда в течение 4-8 недель. Если предписание не изменилось, в следующих случаях для удобства отчетности указаны более длительные сроки.

Для часто задаваемого вопроса о показателях успешности см. главу о статистике. Другие часто задаваемые вопросы как практикующих врачей, так и пациентов рассматриваются в главе *«Часто задаваемые вопросы и ответы»*.

Для удобства основные средства для каждого типа рака перечислены перед случаями. Опять же, следует подчеркнуть, что перечисленные средства чаще всего назначаются с надежными результатами. Это никоим образом не должно ограничивать опытного гомеопата от принятия других решений.

Мочевой пузырь

Causticum, Conium, Staphysagria, Terebinthina oleum, Thuja.

Плоскоклеточный рак мочевого пузыря

случай 1 **мае 2002 года** 63-летний мужчина обратился за помощью по поводу плоскоклеточного рака мочевого пузыря 1 стадии. Его первоначальными симптомами были кровь в моче, болезненное мочеиспускание со жжением и о ...

случайная блокировка потока мочи. Он продержался так месяц, прежде чем обратиться за диагностикой. Наконец, цистоскопия выявила массу размером с лимон, находящуюся в мочевом пузыре, которая была биопсирована. КТ не показала метастазов. Не было обнаружено никаких пальпируемых желез. Была рекомендована операция, но он отказался, обратившись только к гомеопатии.

Обычно он был зябким, имел многочисленные бородавки по всему телу, страдал астмой с рождения и имел историю неоднократных прививок.

Рецепт

- ▶ *Туя* 200С Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Cantharis Q 15* следует принимать утром и вечером по мере необходимости, если жжение и кровотечение во время мочеиспускания были сильными.

Сонограмма в это время показала, что опухоль стала меньше.

Рецепт

- ▶ *Туя* 1М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

Никаких существенных изменений в симптомах, поэтому это предписание было продолжено еще на 16 недель. Тем не менее, повторяющееся жжение и кровотечение не ослабевали. Была назначена еще одна цистоскопия, и к удивлению всех врачей, опухоль теперь была размером с небольшой шарик.

Рецепт

- ▶ *Tua* 10M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карциозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Terebinthina oleum* 30C утром и вечером ежедневно в течение 16 недель (вместо *Cantharis* 0)

Все симптомы прекратились. Никакого жжения, кровотечения или затруднения мочеиспускания. Пациент набрал шесть фунтов. Он отказался от дальнейшего обследования, но продолжал Plussing еще шесть месяцев. Затем ему назначили дробные дозы тех же средств еще на шесть месяцев, после чего выписали.

Сейчас, в 2014 году, он чувствует себя хорошо, ему по-прежнему не нужно проходить дополнительные обследования, но он приводит своих многочисленных родственников для лечения их недугов.

Аденокарцинома мочевого пузыря

СЛУЧАЙ 2 Мужчина, 71 год, поступил на лечение аденокарциномы мочевого пузыря, стадия 3, в **январе 2001 года**. Диагностика с помощью КТ и цистоскопии выявила большое новообразование, похожее на цветную капусту.

в мочевом пузыре, с вовлечением лимфатических узлов в пресакральную область. Операция была исключена из-за распространения, поэтому ему назначили лучевую терапию с последующей химиотерапией. Он начал гомеопатию во время химиотерапии. Его первоначальными симптомами были гематурия с перерывами, сильное жжение во время мочеиспускания и потеря аппетита. Он потерял 6 1/2 фунтов за один месяц.

Рецепт

- ▶ *Terebinthina oleum* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Через восемь недель кровотечение, боль и жжение прекратились — он почувствовал себя лучше. КТ показало уменьшение массы мочевого пузыря, а также некоторых тазовых узлов. Химиотерапию прекратили.

Рецепт

- ▶ *Теребинтина обыкновенная* 1M плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Повторили КТ, объем мочевого пузыря составил 1/3 от первоначального размера, с уменьшением почти всех узлов. В течение последнего месяца этого рецепта появился тревожный симптом — недержание мочи, которое ухудшалось. Предположительно, это было из-за того, что некий «комочек клеток» давил на нерв шейки мочевого пузыря.

Рецепт

- ▶ *Causticum* 1M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 8 недель

Недержание почти исчезло.

Рецепт

- ▶ *Terebinthina oleum* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Все исследования были повторены. Результаты улучшились, но не были ясны. Тот же рецепт продолжался еще шесть месяцев.

Рецепт

- ▶ *Terebinthina oleum* 10M Дробная доза один раз в день в каждый нечетный месяц в течение 2 лет
- ▶ *Карцинозин* 1M дробная доза один раз в день в каждый четный месяц в течение 2 лет

Сейчас, спустя около десяти лет, в 2014 году, он все еще чувствует себя хорошо, но небольшая опухоль все еще там. Она проверяется раз в год и очень стабильна.

Кость

Aurum metallicum, Calcarea carbonica, Hekla lava, Symphytum, (кости включают: множественную миелому, саркому и саркому Юинга).

Множественная миелома

СЛУЧАЙ 3 31-летний мужчина обратился в **декабре 2010 года** с диагнозом множественная миелома. Его лечащий врач направил его в больницу с жалобами на боли в пояснице, которые длились шесть месяцев

длительность и неспособность ходить в течение последних двух недель. У него не было истории недержания кала или мочевого пузыря или любого другого очагового неврологического дефицита. МРТ грудного отдела позвоночника показала компрессионный перелом позвонка D7, легкую компрессию D10 ; множественные литические поражения были обнаружены в грудных и поясничных позвонках и ребрах. Исследование костного мозга предполагало нарушение плазматических клеток, а педикулярная биопсия под контролем КТ соответствовала плазмоцитоме. Ему посоветовали пройти химиотерапию для подготовки к необходимой трансплантации костного мозга. Он отказался от химиотерапии, обратившись вместо этого к гомеопатии.

Рецепт

- *Hekla lava* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Полный анализ крови и анализы на функцию печени повторялись ежемесячно. Боли уменьшились, и примерно через четыре месяца он мог сделать несколько шагов без особой боли.

Рецепт

- *Гекла лава* 1M плюс нечетные недели в течение 8 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

МРТ через шесть месяцев после начала гомеопатии показало, что все костные поражения были стабильными. В это время *Carcinosin* также был повышен до потенции 1M, а чередование Plussing продолжалось еще шесть месяцев.

На тот момент, спустя год после начала лечения, показатели МРТ, анализа крови и печеночных проб были стабильными.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 10М Плюс нечетные недели в течение 24 недель
- ▶ *Карцинозин* 10М плюс четные недели в течение 24 недель

За это время у мужчины не осталось никаких симптомов; литические поражения костей стабилизировались; все остальные параметры были в норме, и пациент вернулся к работе.

С июля 2012 года он был переведен на дробный прием один раз в месяц, чередуя те же два препарата в потенции 10М.

саркома Юинга

случай 4 Мужчине, 18 лет, диагноз поставлен **в январе 2003 года:** саркома Юинга (опухоль) вертлужной впадины. Биопсия, затем операция, затем химиотерапия и лучевая терапия -

Рецидив в октябре 2003 г., проведена дополнительная химиотерапия и лучевая терапия.

В ноябре 2003 года обратился к гомеопату, опухоль в кости 11 см, размером с апельсин.

Рецепт

- ▶ *Symphytum* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель
- ▶ *Симфитум* 1М попеременно с *Carcinosin* 200C в течение вторых 12 недель

КТ показало, что опухоль уменьшилась и стала нормальной в течение года.

Примерно через 18 месяцев (май 2005 г.) у него обнаружили вторичные метастазы в легких, когда он пожаловался на непрекращающийся кашель.

Рецепт

- ▶ *Kali carbonicum* 200C плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 12 недель

- ▶ *Кали карбоникум* 1M Plussing нечетные недели в течение вторых 8 недель чередуются с *Carcinosin* 1M Plussing в четные недели, затем
- ▶ *Natrum sulphuricum* 200C Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 8 недель

В ноябре 2005 года второстепенные объекты исчезли.

Гомеопатическое лечение продолжалось с помощью Plussing Doses, доведенных до потенции 10M. В июне 2006 года он был переведен на метод Split Dose, пока лечение не было завершено в июне 2007 года.

В настоящее время, в 2012 году, рецидива нет, и он по-прежнему чувствует себя хорошо.

саркома Юинга

СЛУЧАЙ 5 Родители 12-летнего мальчика привели его на лечение в **июле 1994 года** с диагнозом саркома Юинга. Было обнаружено костное разрастание в средней части 16 малоберцовой кости, 2 степени. Они

им посоветовали привезти его на химиотерапию и лучевую терапию, но они отказались.

Он был ярким, «веселым», полным энергии, гиперактивным и экстравертированным, боялся животных. История первичного комплекса, когда ему было три года. Один из его родителей болел туберкулезом пять лет назад.

Рецепт

- ▶ *Hekla lava* 200C Плюс нечетные недели до 24 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 24 недель

Полная регрессия всей опухоли произошла в течение шести месяцев. В марте 1995 г. КТ показала радиоактивность в правой латеральной лодыжке .

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1M плюс нечетные недели в течение 24 недель
- ▶ *Tuberculinum* 10M Plussing четные недели в течение 24 недель

Метастазы исчезли. Он снова явился на прием в июле 1996 года, и в течение нескольких лет *Туберкулинум* 10М принимался в дробной дозе один или два раза в год в качестве профилактики.

С тех пор он приходит на осмотр раз в полгода и сейчас, в 2012 году, здоров и не имеет признаков рака.

Его картина была *Tuberculinum bovinum*, но изначальное назначение было *Hekla lava* с ее специфичностью к костным поражениям. Когда были метастазы, вводили конституционный препарат.

Первичный комплекс — это реакция на туберкулез, встречающаяся только у детей и поражающая железы средостения, а не легкие.

Мозг

Aethusa cynapium, Baryta Carbonica, Baryta iodata, Calcareo Arsenicosa, Plumbum iodatum, Plumbum Metallicum, Zincum сульфурикум.

Диффузная внутренняя глиома моста (DIPG): Calcareo arsenicosa, Lachesis, Phosphorus, Selenium (при которой преобладает нечеткое зрение).

Мультиформная глиобластома

СЛУЧАЙ
6

36-летняя замужняя женщина, мать двоих детей, обратилась в **2005 году** с повторяющимися головными болями, которые становились все более частыми в течение 2-3 месяцев. Наконец она обратилась к неврологу

которая назначила МРТ, в результате которой был поставлен диагноз мультиформная глиобластома . Она отказалась от облучения, которое посоветовал невролог.

Она была тучной, зябкой, спокойной, но в то же время беспокойной, нетерпеливой , импульсивной, эмоциональной, сентиментальной и любящей поесть. Головная боль была на той стороне, на которой она не лежала.

Рецепт

- ▶ *Calcareo arsenicosa* 200C Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Ее ситуация проверялась ежемесячно, и симптомы значительно улучшались. После трех месяцев приема Plussing у нее было только одна или две легкие головные боли за последний месяц.

МРТ было проведено повторно, поражения мозга, безусловно, стали лучше; некоторые полностью исчезли, а большинство не увеличились в размерах.

Рецепт

- ▶ *Калькарея мышьяковая* 1M плюс нечетные недели в течение 24 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 24 недель

Ежемесячные осмотры показывали постоянное улучшение, поэтому чередование приема Плюссинга было продолжено до тех пор, пока не завершился годичный курс лечения.

Пациентка чувствовала себя абсолютно комфортно, а повторная МРТ показала исчезновение 75–80 % поражений.

Рецепт

- ▶ *Calcarea arsenicosa* 10М Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 12 недель

В этот момент ее перевели на дробные дозы, *Calcarea arsenicosa* 10М один раз в месяц, по нечетным месяцам и *Carcinosin* 1 М один день в каждый четный месяц в течение одного года. МРТ в этот период была такой же, как и в предыдущий, пациентка была стабильна и в хорошем самочувствии. Все активные назначения закончились через 2,5 года с начала. Сейчас, в 2012 году (семь лет), она продолжает быть в хорошем самочувствии.

Хотя конституционально женщина выглядела как *Calcarea carbonica*, известная эффективность *Calcarea arsenicosa* при объемных поражениях и специфический тип головной боли предложили это средство. С тех пор оно вошло в список «любимых» средств от опухолей мозга.

Мужчина, 53 года, у которого в декабре 2004 года была диагностирована злокачественная мультиформная глиобластома правой лобной области, обратился за гомеопатическим лечением в **феврале 2005 года**. Его симптомы

случай

7

были слабость правой руки, частые треморы и подергивания, которые могли быть в любой части правой руки. Также была слабость запястья, немного похожая на каплю. Эти симптомы продолжались даже после операции, которая была сделана в июне 2005 года.

Рецепт

- ▶ *Plumbum iodatum* 200С Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 16 недель

Он отчитался в это время, но никаких изменений не произошло. Когда 16 недель были завершены, тремор и подергивания уменьшились на 50 %.

Рецепт

- ▶ *Plumbum iodatum* 1М Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 16 недель

МРТ головного мозга показала чистоту.

Рецепт

- ▶ *Plumbum iodatum* 1М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

На этом этапе слабость в запястьях и подергивания уменьшились на 95%, поэтому он продолжил лечение по этому же рецепту еще 16 недель и был направлен на повторную МРТ, которая показала отсутствие каких-либо изменений.

Рецепт

- ▶ *Plumbum iodatum* 1М раздельная доза один раз в две недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 1М дробная доза один раз в две недели *Plumbum iodatum* в течение 6 месяцев

Рецепт

- ▶ *Plumbum iodatum* 1М разделенная доза один раз в нечетный месяц в течение 6 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 1М разделенная доза один раз в четный месяц в течение 6 месяцев

Еще одно МРТ в это время было все еще чистым, поэтому все средства были остановлены. Он ежегодно приходит на повторный осмотр, просто чтобы оставаться на связи. Он продолжает чувствовать себя хорошо и сейчас, в 2014 году.

Глиома

случай 8

Мужчина, 25 лет, диагноз поставлен в апреле 1994 года, глиома 2 стадии, обратился к гомеопатии **в июне 1994 года**. Сообщается о случаях судорог после операции на головном мозге

сер. Анамнез: После шести месяцев головных болей КТ выявила образование в левой теменной зоне.

Была проведена операция, гистопатология подтвердила наличие глиомы. Последовала лучевая терапия, у пациента начались судороги, поэтому лучевую терапию прекратили.

Рецепт

- *Hypericum* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Приступы прекратились на второй неделе, что объясняет, почему выбранные средства продолжались в течение 16 недель. Пациент чувствовал себя хорошо, но КТ показало рецидив роста в той же области. Хирург сказал, что опухоль слишком мала для операции и подождет, пока она не станет больше, прежде чем удалять ее.

Рецепт

- *Plumbum iodatum* 200C Plussing Дозы, нечетные недели
- *Carcinosin* 200C Plussing Дозы, четные недели

Это продолжалось с 17-й по 24-ю неделю, когда сканирование показало, что опухоль осталась прежних размеров.

Лечение теми же средствами было продолжено на 25-32 неделе, когда сканирование показало, что опухоль исчезла.

В настоящее время пациент периодически получает дробные дозы того и другого препарата и остается здоровым.

зверобой , поскольку это прекрасное средство от травм головы, операций на голове и послеоперационных осложнений, включая судороги.

Астроцитомы

СЛУЧАЙ 9 Девочка 5 1/2 лет, поступила в клинику в **мае 1996 г.**, астроцитомы зрительного нерва, МРТ показала опухоль 5 см в области зрительного перекреста , диагноз поставлен биопсией. Первоначальные симптомы: нус -

tagmus, сначала левый глаз, затем правый глаз. Ребенку назначили химиотерапию, всю массу удалить не удалось, поэтому операцию не делали. Гомеопатия началась одновременно с химиотерапией. Этот ребенок плохо переносил химиотерапию, поэтому дозировки были уменьшены по частоте и прекращены к ноябрю 1996 года.

Она была типичным ребенком *Phosphorus* : худощавая, умная, блестящая, ласковая, чувствительная, со страхами всех видов, особенно темноты.

Рецепт

- ▶ *Plumbum iodatum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Повторное МРТ в феврале 1997 г.: опухоль уменьшилась до 50%. Онкологи были удивлены, что опухоль смогла так сильно уменьшиться, несмотря на неполную химиотерапию.

Рецепт

- ▶ *Фосфор* 200C плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

В течение следующих 12 месяцев:

- ▶ *Plumbum iodatum* 1M Плюс
- ▶ *Карцинозин* 1M Плюс

В течение года их число было увеличено до 10 млн.

Сейчас ребенок полностью бессимптомен, нет нистагма, нет никаких жалоб . МРТ делают раз в полгода, и опухоль не меняется. Лечение продолжалось дробными дозами в течение трех лет, после чего все лекарства были отменены.

Девочка, 7 лет, перенесла операцию по удалению астроцитомы в июне 2003 года, затем последовало облучение. Опухоль рецидивировала в **январе 2005 года** , и родители отказались от дополнительного облучения, поэтому привезли ее на гомеопатию.

случай

10

Она была маленькой, тучной и ласковой, зябкой, но легко потела.

Рецепт

- ▶ *Calcarea arsenicosa* 200C Plussing нечетные недели в течение двух лет.
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение двух лет.

За этот период времени потенции постепенно увеличивались до 10M .

Дробные дозы назначались еще в течение двух лет, при этом каждое лекарство чередовалось ежемесячно в потенции 1M.

Блестящий ответ, через год поражение исчезло, рецидивов не было за последние девять лет. Она полностью здорова и сейчас растет нормально.

Грудь

Conium, Lapis albus (при метастазах в легкие), Phosphorus, Phytolacca, Pulsatilla, Sepia, Scrophularia nodosa.

Инфильтрирующая протоковая карцинома

СЛУЧАЙ
11 Женщина, 31 год, обратилась в **июне 2007 года** с диагнозом инфильтративная протоковая карцинома, степень 3. Была проведена лампэктомия левой груди. Хирург сообщил, что уплотнение было

большой и твердый, как стеклянный шарик. Гемоглобин был 8,3 г/дл, и у нее были периодические головные боли. Лампэктомия должна была сопровождаться химиотерапией, от которой она отказалась, выбрав гомеопатию в качестве единственного последующего наблюдения.

Рецепт

- *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Головные боли прекратились, гемоглобин составил 10,2 г/дл. Плановый осмотр у хирурга показал, что все хорошо, но он все еще настаивал на химиотерапии. Пациент продолжал отказываться.

Рецепт

- Продолжайте такое же чередование еще 16 недель.

Она продолжала чувствовать себя хорошо.

Рецепт

- *Кониум* 1М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Сейчас, спустя год после постановки диагноза, она прошла полное обследование, включая КТ шеи, груди и живота. Все результаты чистые.

Рецепт

- ▶ *Кониум* 1М плюс нечетные недели в течение 6 месяцев (24 недели)
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 6 месяцев

В январе 2009 года ее перевели на дробный режим приема лекарств.

Рецепт

- ▶ *Кониум* 10М, разделенная доза, один день каждого месяца в течение одного года
- ▶ *Карцинозин* 1М Split Dose 15-го числа каждого месяца в течение одного года

Она снова прошла весь набор тестов, включая еще одно КТ . Результаты были все чистыми, поэтому лечение было прекращено.

Сейчас, в 2014 году, она по-прежнему чувствует себя хорошо и у нее нет рака.

СЛУЧАЙ 12

Женщина, 47 лет, заметила уплотнение в правой груди, февраль 1994 г., диагноз: инфильтративная протоковая карцинома стадии 2В с помощью тонкоигольной биопсии. Лампэктомия и рассечение 16 подмышечных

железы (7 положительных), удаление обоих яичников и матки, так как у нее были огромные фибромиомы. Затем последовала химиотерапия и облучение. Это лечение было завершено к октябрю 1994 года, после чего ее ежемесячно обследовали. В январе 1995 года КТ выявило отложение в печени. Была сделана биопсия под контролем КТ, отчет по патологии показал, что это вторично. Было предложено провести еще одну химиотерапию, но она устала от побочных эффектов и отказалась. Она обратилась за гомеопатией **в марте 1995 года.**

Она была замужем 23 года, имела двоих детей и, по всей видимости, была конституциональным представителем соли *Calcarea* .

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 200C Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

По истечении восьми недель поражение выглядело примерно так же, определенно не хуже, возможно, немного меньше.

С 9 по 16 неделю продолжала принимать то же самое. Масса значительно уменьшилась.

С 17 по 24 неделю лечение продолжалось в том же духе, после чего поражение уменьшилось на 90%.

Следующие 16 недель:

- ▶ *Calcarea carbonica* 200C Плюс нечетные недели
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели

Следующие 4 месяца:

- ▶ *Калькарея карбоника* 1М чередуется с *Carcinosin* 1М

В течение года с марта 1995 года КТ повторялись каждые три месяца. В течение следующих двух лет они повторялись раз в шесть месяцев. В настоящее время она в отличном состоянии здоровья и с 2000 года получает дозу *Calcarea carbonica* 10М или *Carcinosin* 10М раз в шесть месяцев.

Когда необходимо быстро остановить метастазирование, часто эффективнее использовать органоспецифическое, а не конституциональное средство.

Аденокарцинома

СЛУЧАЙ 13 Женщина 56 лет, диагностирована аденокарцинома молочной железы, лампэктомия выполнена при обнаружении поражения во время плановой маммографии . Стресс, гнев, подавленные эмоции с сильным жадно -

Тяга к сладкому, предчувствие тревоги, страх высоты и клаустрофобия четко указывали на ее конституцию. Она пришла на лечение где-то в **1998 году**.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Жалобы на стресс, гнев и подавленные эмоции.

Argentum nitricum наблюдался некоторый прогресс, наиболее выраженными, по-видимому, были симптомы в психической сфере.

Рецепт

- ▶ *Staphysagria* 200C Plussing нечетные недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 200C плюс четное количество недель в течение 6 месяцев

После того, как мы обратились к ментальной сфере, мы вернулись к первоначальному рецепту.

г. - продолжил курс «Плюссинг», но вернулся к *Argentum nitricum* 1М, чередуя с *Carcinosin* 200С, концентрация которого в это время была повышена до 1М.

С января 2007 г. по декабрь 2008 г. продолжал принимать дробные дозы, ежемесячно чередуя одни и те же препараты.

По состоянию на лето 2012 года она все еще находится в хорошем состоянии здоровья.

СЛУЧАЙ 14 Женщина, 32 года. Рак груди 1 стадии был диагностирован после плановой маммографии. В **августе 2005 года** ей сделали лампэктомию. Образование было каменисто-твердым. От химиотерапии отказалась.

и облучение, решив после операции использовать только гомеопатию. Она была холодна, привередлива, напориста (доминантна) с пристрастием к мясу.

Рецепт

► *Sepia* 200С Plussing Дозы нечетные недели

► *Scirrhinum* 200С Plussing Дозы четные недели

Такое чередование продолжалось в течение года, при этом к тому времени потенции были увеличены до 1М для каждой.

Никаких признаков рака тогда не было, и рецидивов с тех пор не было. Она принимала Сплит-дозы поочередно ежемесячно еще несколько лет, завершив лечение в 2010 году. Она остается здоровой в 2014 году.

Она была типичной конституцией *Sepia*, в противном случае *Conium* были бы прописаны.

СЛУЧАЙ 15 Женщина, 48 лет, обратилась в **августе 2002 года** с низкодифференцированной инвазивной протоковой аденокарциномой стадии 2В. Два из 13 узлов были положительными, включая сторожевой. Люмпека -

Была сделана томия, но она отказалась от предложенной лучевой и химиотерапии. Анализ крови показал немного низкий уровень эритроцитов и лейкоцитов. СА 15-3 и печеночные ферменты в норме. Сильный семейный анамнез рака груди и яичников.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

КТ грудной клетки и живота не выявили злокачественных новообразований. Некоторые жалобы на сердцебиение и герпетические высыпания.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Через восемь недель для лечения язв во рту был добавлен *Natrum muriaticum* 6X два раза в день.

Через 12 недель уровень карцинозина был повышен до 1M.

Некоторые жалобы на пищеварение, а также герпес и стресс от Plussing — она думает, что могла загрязнить смесь. Покалывание в ногах от слишком долгого сидения.

Рецепт

- ▶ *Pulsatilla* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ Карцинозин 1M плюс четные недели в течение 12 недель
- ▶ *Natrum muriaticum* 6 раз утром и вечером ежедневно

Жалобы на повышенное потоотделение, неодинаковое на обеих руках, считает, что у нее лимфома.

В остальном чувствует себя очень хорошо.

Рецепт

- ▶ *Pulsatilla* 1M Plussing нечетные недели в течение 24 недель
- ▶ Карцинозин 1M плюс четные недели в течение 24 недель
- ▶ *Natrum muriaticum* 6 раз утром и вечером ежедневно

Через 12 недель уровень карцинозина был повышен до 10M.

Рецепт

Выполняя домашнюю работу, она придумала для себя рецепт, который показался ей интересным, поэтому ей разрешили испробовать его в концентрации 200С Plussing в течение одного месяца, продолжая прием *Carcinosin* 10М и *Natrum muriaticum* 6Х два раза в день.

У нее обнаружили серьезную зубную инфекцию, требующую лечения корневых каналов, поэтому ей дали несколько недель отпуска из Плюссинга, чтобы справиться с инфекцией.

Рецепт

- ▶ *Pulsatilla* 1М раздельная доза в 1-й и 15-й дни только в течение одного месяца
- ▶ *Carcinosin* 10М в 1-й и 15-й дни в течение второго месяца

Инфицированный зуб и герпес утихли.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 200С, разделенная доза в дни 1, 15, 30 и 45.
- ▶ *Natrum muriaticum* 6Х два раза в день

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 1М в разделенной дозе в дни 1, 15, 30 и 45.
- ▶ *Natrum muriaticum* 6Х два раза в день

Уровень энергии вернулся по крайней мере на 95% от нормы, все остальные жалобы легкие.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 1М Разделенная доза только один день в месяц
- ▶ Продолжайте принимать *Natrum muriaticum* 6 раз два раза в день.

Поскольку все исследования груди продолжали быть нормальными, а единственными жалобами были острые, пришло время прекратить ее лечение. Продолжала принимать *Natrum muriaticum* еще восемь недель.

Argentum nitricum — ее конституционное средство. В настоящее время, в 2014 году, спустя более десяти лет после начала гомеопатического лечения, она продолжает чувствовать себя хорошо.

16 СЛУЧАЙ Женщина, 50 лет, в **октябре 1998 года обратилась** с рецидивом рака груди. Первоначальный диагноз Стадия 1, эстрогеновый рецептор положительный осенью 1994 года, лечилась

Лампэктомия, облучение и три года тамоксифена. Это было небольшое и

Медленно растёт. Ей сказали, что вероятность рецидива составляет 90 %. В настоящее время у неё метастазы в позвоночнике и рёбрах с хронической болью, от которой она не принимает никаких наркотиков. После первоначального лечения она стала веганкой, занималась иглоукалыванием, китайскими травами, изменила свой образ жизни, восстановила интимные отношения и стала консультантом по поддержке больных раком. Боль от рецидива была настолько сильной, что потребовалось ещё семь недель облучения, за которыми последовала химиотерапия, которая повторяется каждые три недели.

Семейная история в основном неизвестна, она называет себя культурным пессимистом и тревожным человеком.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 200C Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Symphytum* 30C каждые полчаса при болях по мере необходимости

В целом чувствую себя лучше, после химиотерапии чувствую себя лучше, чем раньше, показатели крови также держатся лучше.

Рецепт

- ▶ *Symphytum* 200C Plussing нечетные недели в течение 6 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 6 недель

Она сообщает, что чувствует себя довольно хорошо, с едва заметной болью в некоторые дни. Тревога по поводу предстоящего сканирования костей, перед которым она медитирует. Все еще принимает немного Tylenol® от боли, но теперь ходит по 3 1/2 мили несколько раз в неделю.

Рецепт

- ▶ *Symphytum* 1M Plussing нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 4 недель

Сканирование костей показало стабильность, новых пятен нет, но и разрешения тоже нет. Уровень лейкоцитов крайне низкий 1685. Принимаю меньше обезболивающих.

Рецепт

- *Symphytum* 1M Plussing нечетные недели в течение 4 недель
- *Medorrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 4 недель

Через две недели (при выполнении плановых лабораторных исследований) WBC 2084. Она обеспокоена результатами теста СА 15-3, но мы не придаем большого значения этому конкретному тесту.

Рецепт

- *Symphytum* 1M Plussing нечетные недели в течение 4 недель
- *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 4 недель

Настоящий прорыв с болью. Хотя боль все еще присутствует, она достаточно слаба, чтобы ее можно было терпеть без обезболивающих. «Это волнительно».

Рецепт

- *Carcinosin* 1M Plussing только 1 и 3 недели, 2 и 4 недели без лечения

Чувствую себя хорошо, лучше переношу химиотерапию, уровень боли снова снизился за последние три недели.

Рецепт

- *Hekla lava* 1M Plussing недели 1 и 3, недели 2 и 4 нет средства

Чувствует себя хорошо, лучше всего после рецидива. Боль уменьшилась до двух из десяти, энергия и настроение тоже улучшились. Анализ крови (кроме СА 15-3) хороший, все результаты в норме, но абсолютное количество нейтрофилов 2345.

Рецепт

- *Arsenicum album* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- *Carcinosin* 1M Plussing четные недели в течение 12 недель, начиная с 5-й недели этого цикла.
- *Calcareo fluorica* 6X утром и вечером ежедневно

Чувствует себя хорошо, три раза в неделю занимаюсь силовыми тренировками, чередую с прогулками по 2-4 мили и йогой. Боль все еще на уровне «два». Опять боится предстоящего сканирования костей. Все анализы крови в порядке. Мы попросили ее узнать, разрешит ли ей онколог постепенно отказаться от химиотерапии, возможно, проводя ее только раз в шесть недель, а не каждые три.

Сканирование костей по-прежнему показывает стабильный результат, но на этот раз активности на уровне T10 нет.

Рецепт

- ▶ *Arsenicum album* 1M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Calcarea fluorica* 6X утром и вечером ежедневно

Собираюсь снова пройти химиотерапию после двухмесячного перерыва. «У меня грипп — кажется, когда я делаю перерыв в химиотерапии, я подхватываю все, что происходит вокруг».

Рецепт

- ▶ *Туя* 200C Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Medorrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель, - начиная с шестой недели

Энергия вернулась после гриппа, снова в спортзале. Беспокоюсь о стоимости всех альтернативных методов лечения, как узнать, работают ли они?

Март 2001 г., сканирование костей все еще стабильно, анализы крови и опухолевые маркеры тоже в норме. Попросила о шестинедельном перерыве от Plussing для «путешествия всей жизни», которое она хочет совершить. Мы попросили, чтобы перерыв не был длиннее поездки, но с этого момента она так нерегулярно отчитывалась, что лечение сошло на нет. У нас были направления от нее в 2004 г., последний контакт был в августе 2012 г.

И снова старый случай, отражающий обновленное назначение лекарств.

Шейка матки

Aurum muriaticum natronatum, Lilium tigrinum, Pulsatilla, Sepia.

Рак шейки матки

СЛУЧАЙ 17 Женщина, 53 года, в **августе 2008 года сообщила** о раке шейки матки . В анамнезе были кровоточащие фибромиомы в 1995 году, леченные гормонами; рак груди в 2000 году, затем лампэктомия

химиотерапией и облучением; в 2006 году злокачественный рак шейки матки лечили химиотерапией и облучением, которые дали хороший ответ. Рак шейки матки рецидивировал в 2008 году. Она отказалась от дополнительного облучения, обратившись вместо этого к гомеопатии.

Рецепт

- ▶ *Phytolacca* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Calcarea fluorica* 6X сухие дозы утром и вечером ежедневно

В течение 16 недель у нее были боли в мочевом пузыре, и она прошла курс антибиотиков . Через четыре месяца онколог был удивлен, увидев 90% заживления шейного поражения. КТ не показало распространения рака.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1M плюс нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 20 недель
- ▶ *Calcarea fluorica* 6X сухие дозы 4 раза в день

Физическое обследование показало, что поражение полностью исчезло.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1M раздельная доза один раз в две недели в течение 1 года
- ▶ *Карцинозин* 1M раздельная доза один раз в две недели поочередно в течение 1 года

Шесть лет спустя она по-прежнему чувствует себя хорошо, рецидива рака не было.

СЛУЧАЙ
18

Молодая женщина, 23 лет, обратилась за лечением рака шейки матки в **феврале 2003 года**. Первоначальным симптомом были обильные бели. При физикальном обследовании была обнаружена язва размером 2 см х 1 см с

вывернутый край, рыхлый и кровоточащий. Биопсия подтвердила злокачественность.

В анамнезе семь лет генитального герпеса, который лечили много раз противовирусными препаратами. Генитальные бородавки, которые прижигали три раза. Ее образ жизни был беспорядочным — сексуальная активность со многими мужчинами. Она боялась любой традиционной медицины или лечения.

Рецепт

- ▶ *Tuя* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Через восемь недель выделения сократились на 50 %, но физическое обследование не выявило никаких изменений в язве. Когда вторые восемь недель были завершены, бели прекратились, как и прерывистое кровотечение.

Рецепт

- ▶ *Tuя* 1M Плюс нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 20 недель

Гинекологический осмотр через девять месяцев после постановки диагноза был чистым, никаких поражений не обнаружено. Были сделаны подтверждающие сканирования, и отдаленные поражения также были исключены.

Рецепт

- ▶ *Thuja* 1M Split Dose поочередно в течение 1 года
- ▶ *Карцинозин* 1M дробная доза через неделю с *Tуей* в течение 1 года

Сейчас она чувствует себя хорошо уже десять лет.

СЛУЧАЙ
19

В ноябре 2004 года женщина, 69 лет, обратилась за гомеопатическим лечением рака шейки матки 3 стадии. Однажды у нее внезапно открылось обильное кровотечение, которое заставило ее обратиться к врачу. В

Оглядываясь назад, она поняла, что в течение последнего года у нее было небольшое подтекание вагинальной крови. Осмотр и обследование подтвердили диагноз.

Метастазы в паховых железах и брыжеечных узлах, вызвавшие легкий асцит и отек левой ноги.

В анамнезе гипертония в течение 30 лет; два незначительных эпизода сердечных заболеваний за последние три года.

Она была учителем на пенсии, властной, подавляющей, пользующейся уважением коллег и родственников; перфекционисткой, с приступами депрессии и холодности.

Рецепт

- *Sepia* 200C Плюс нечетные недели до 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Отек левой ноги прошел, асцит выглядел лучше, а язва шейки матки выглядела здоровой. Тот же рецепт был продолжен еще на 16 недель.

Абдоминальная КТ показала существенное уменьшение желез - левая паховая железа больше не пальпировалась. Затем ее госпитализировали из- за острой сердечной недостаточности, и все гомеопатические препараты были отменены. Гомеопатия возобновилась в октябре 2005 года.

Рецепт

- *Sepia* 1M Plussing нечетные недели в течение 20 недель
- *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 20 недель

После 12 недель этого рецепта она была образцом здоровья, но последующие тесты не проводились до 20-й недели. Сканирование показало, что язва полностью зажила и никаких признаков метастазов.

Она по-прежнему здорова, хотя ее здоровье замедляется с возрастом.

Sepia , поскольку он соответствовал ее конституции.

Рак у детей

Нейробластома: *Phytolacca*, *Scrophularia nodosa*.

При диффузной внутренней глиоме моста (DIPG): *Calcarea arsenicosa*, *Zincum sulphuricum*.

Обратите внимание, что в США и, возможно, в других странах лечение детей с серьезной патологией часто не разрешено законом и должно осуществляться исключительно по усмотрению родителей. Любое лечение в дополнение к общепринятому должно проводиться в сотрудичестве с западными протоколами.

Нейроэндокринный рак

Нейробластома — наиболее распространенный рак младенчества и детства, чаще всего встречается у детей младше двух лет. Опухоль может возникнуть из любого элемента нервного гребня симпатической нервной системы. Часто она возникает из надпочечников, но может также развиваться в нервных тканях шеи, груди, живота или таза. Этот конкретный вид рака является одним из самых сложных для лечения, и в настоящее время у нас все еще больше неудач, чем успехов. Ниже приведены несколько случаев ошеломляющего успеха .

случай 20 Пятилетняя девочка обратилась за гомеопатическим лечением нейробластомы в **мае 2006 года**. В 2003 году ей поставили диагноз: опухоль, окружающая левый надпочечник. Рак был

распространилась на окружающие ткани, включая нервы и кровеносные сосуды, что сделало операцию довольно сложной. После 11-часовой операции последовали химиотерапия и облучение, но рак рецидивировал в течение трех месяцев. Рецидив был отмечен, когда у ребенка появились сильные боли в животе, и была обнаружена масса размером 1 см x 1 см, давящая на левый мочеточник.

Поскольку отток мочи не был затруднен, ей давали только обезболивающие препараты.

Рецепт

- ▶ *Phytolacca* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

В течение первых восьми недель ребенок чувствовал себя довольно комфортно, только с управляемыми эпизодами боли. Через четыре месяца после начала гомеопатии опухоль оставалась того же размера, радуя ее родителей и онколога.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

В течение вторых 16 недель она жаловалась на сильную боль в груди, которая, как предполагалось, была следствием поражения средостения, но оно было настолько крошечным, что было определено как неокончательное. В конце 32 недель КТ показало незначительное уменьшение исходного пятна.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

Сейчас, спустя год после начала приема Plussing, она чувствует себя замечательно по сравнению с другими годами после постановки диагноза. Мы продолжили то же чередование лекарств еще шесть месяцев.

Сейчас у нее полностью отсутствуют симптомы, размер поражения уменьшился до 1/2 см x 3/4 см.

Рецепт

- ▶ *Phytolacca* 1М чередуется с отдельной дозой *Carcinosin* 1М.

С июня 2007 по 2010 год у нее не было никаких симптомов. КТ-сканирование показало, что поражение стало намного меньше и стало стабильным. Сканирования были прекращены после последнего в ноябре 2008 года. В 2014 году у нее по-прежнему не было никаких симптомов.

Фитолакка была выбрана, поскольку она является практически специфичным средством для почек и надпочечников.

СЛУЧАЙ 21

Молодая девочка, 3 1/2 лет, была доставлена на гомеопатическое лечение в феврале **2007 года**, у нее диагностировали нейробластому в возрасте 14 месяцев. Ее опухоль была в левом стороне живота, значительно выше почки, касаясь, но не вовлекая

поджелудочная железа. Ее перевезли из Италии в США (Нью-Йорк) для операции, которую провел специалист в ноябре 2004 года, уверенный в возможности полного удаления. Затем последовали девять месяцев химиотерапии и облучения.

В августе 2006 года рак рецидивировал, на этот раз в средостении. Операция была сложнее, но была проведена немедленно. В январе 2007 года у нее снова появились боли в груди и онемение левой руки. КТ подтвердило еще один рецидив. Это поражение было довольно маленьким и затрагивало нервы, идущие к левой руке, поэтому операция не была предложена. В этот момент родители привезли девочку из Италии в мою клинику в Индии.

Рецепт

► *Scrophularia nodosa* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Через восемь недель боль и онемение сохранялись, поэтому был добавлен *Naja* 30C, сухая доза каждое утро. Чередование плюсов осталось прежним. Было значительное облегчение боли и онемения от *Naja*.

Рецепт

► *Scrophularia nodosa* 1M Плюс нечетные недели в течение 8 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

► *Naja* 30C Сухие дозы утром и вечером

Компьютерная томография после шести месяцев курса «Плюссинг» не показала никаких изменений, что было воспринято всеми врачами как хорошая новость, а онколог сказал: «Невероятно».

Рецепт

► *Scrophularia nodosa* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Naja сняли с производства - ребенку стало комфортно.

активность *Scrophularia nodosa* была повышена до 10М , а *Carcinosin* оставался на уровне 1М в течение еще 16 недель.

КТ в мае 2008 года показало, что поражение, возможно, менее значительное. Плюссинг был прекращен, и ей давали разделенные дозы тех же двух средств, чередуя каждую неделю.

В настоящее время, в 2014 году, ее состояние остается стабильным, и она чувствует себя здоровой.

случай 22 Мальчик, почти 6 лет, поступил в **марте 2007 года**, диагноз поставлен в 2004 году (в возрасте 2 лет) 1/2) с нейробластомой. Правый надпочечник был настолько большим и инвазивным, что вся правая почка, мочеточник и надпочечник был удален с последующей химиотерапией и лучевой терапией.

Казалось, он чувствует себя хорошо до рецидива в январе 2007 года, включавшего левый надпочечник и почку с поражениями печени и поджелудочной железы. Была проведена вторая операция, в ходе которой было удалено все, что можно было удалить, но осталось много опухолевой массы. Это был момент, когда родители обратились к нашему лечению.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

После первых восьми недель он только немного улучшился, все еще имел симптомы болезни, все еще восстанавливался после операции и заразился множеством инфекций, одной за другой. За вторые восемь недель, в дополнение к вышесказанному, мы добавили:

- ▶ *Silicea* 6X Сухие дозы 4 раза в день

Значительно уменьшились тошнота, слабость и непереносимость пищи.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1М Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно
- ▶ *Silicea* 6X Сухие дозы 4 раза в день

КТ показало, что все поражения стабильны. Это считалось хорошей новостью. Лихорадки или инфекций не было.

В октябре 2007 года масса, окружающая левый мочеточник, вызвала полную обструкцию, которая потребовала открытия. Было проведено иссечение и пластика левого мочеточника.

Вскоре после этой процедуры *концентрация Карцинозина* была повышена до 1М, все остальное в последнем рецепте осталось прежним.

В январе 2008 года поражения печени и поджелудочной железы полностью исчезли, и органы выглядели здоровыми.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 7 месяцев
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 7 месяцев
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно
- ▶ *Phytolacca* 6X Сухие дозы два раза в день

В течение следующих четырех месяцев концентрация *Conium* была увеличена до 10М, чередуясь с *Carcinosin* 1М.

В этот момент его перевели на дробные дозы каждого препарата попеременно по неделям:

- ▶ *Кониум* 10М
- ▶ *Карцинозин* 1М

Сейчас, в 2014 году, этот мальчик чувствует себя хорошо, посещая онколога каждые шесть месяцев.

Диффузная внутренняя глиома моста (DIPG)

Диффузные внутренние понтинные глиомы редко подвергаются биопсии, но когда это происходит, часто обнаруживается степень 3 или 4. Обычно они прогрессируют как мультиформные опухоли глиобластомы, наиболее агрессивный вид астроцитарной опухоли. Опухоли DIPG поражают нормальную мозговую ткань, симптомы развиваются быстро, за три недели или три месяца до постановки диагноза. Распространенными симптомами являются отсутствие контроля за движениями глаз, выражением лица, речью, жеванием/глотанием (из-за проблем в черепной

нервы), слабость рук и ног, а также проблемы с ходьбой и координацией.

СЛУЧАЙ 23 Шестилетняя девочка была доставлена на лечение в **июне 2009 года** с диагнозом ДИПГ. В ноябре 2007 года у нее нарушилась походка, была обнаружена опухоль и частично удалена. Вторая

Операция в июне 2008 года удалила 90 % опухоли, оставив небольшой узелок. Патологоанатомическое заключение выявило пилоцитарную астроцитому. За обеими операциями последовали химиотерапия и облучение. В мае 2009 года МРТ показала рост узла. В то время врачи не хотели делать никакого дополнительного облучения и планировали наблюдать и рассматривать будущую операцию.

Она не любит сладкое, любит кислое и соленое, довольно пуглива и холодна. Она милая, очаровательная и артистичная с тонкими чертами лица. Она дарит и ждет привязанности.

Рецепт

- ▶ *Фосфор* 200С плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 16 недель

МРТ через 16 недель после курса Плюссинга показала, что узел уменьшился по сравнению с предыдущим.

Рецепт

- ▶ *Фосфор* 1М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 16 недель

Последующее МРТ показало продолжающееся сокращение.

Рецепт

- ▶ *Фосфор* 1М плюс нечетные недели в течение 24 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 24 недель

В это время рецепт был изменен на отдельные дозы, каждое лекарство попеременно по неделям в течение шести месяцев. Сейчас, в 2014 году, она абсолютно здорова во всех отношениях, посещает школу, участвует во всех своих мероприятиях, полностью свободна от симптомов. Больше никаких МРТ не проводилось.

СЛУЧАЙ 24 Молодой мужчина, 5 1 /2 лет, в **ноябре 2008 года был** поставлен диагноз DIPG. Первоначально у него было размытое зрение в левом глазу, которое периодически возникало в течение последнего месяца, а также онемение (покалывание) слева с головной болью, усиливающейся в положении стоя,

лучше от сидения или ходьбы. Операция была сделана в августе 2008 года, за ней последовали химиотерапия и облучение. Патологоанатомическое заключение поставило диагноз DIPG. Через два месяца симптомы возобновились - МРТ показала новый рост. Было рекомендовано больше облучения, но в этот момент родители отвели его на гомеопатию.

Рецепт

► *Calcarea arsenicosa* 200C Плюс нечетные недели в течение 12 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Через две недели после начала приема препарата Плюссинг его зрение стало менее размытым, а головные боли практически прекратились.

МРТ показала 10%-ное уменьшение последнего очага.

Рецепт

► *Calcarea arsenicosa* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель

► *Карцинозин* 200C плюс четные недели в течение 16 недель, затем

► *Calcarea arsenicosa* 10M плюс нечетные недели в течение 20 недель

► *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 20 недель

МРТ, проведенное в октябре 2009 года, показало, что поражение уменьшилось более чем на 75 %.

Прием той же дозы «плюссинг» продолжался еще шесть месяцев, а затем в течение еще года применялись дробные дозы тех же средств.

Родители по-прежнему приводят его на повторные консультации, и в конце 2012 года у него по-прежнему не было никаких симптомов, и он чувствовал себя нормально во всех отношениях.

Толстая кишка/прямая кишка

Алоэ сокотрина, *Arsenicum album*, *Lycopodium*, *Thuja*.

Аденокарцинома

25 СЛУЧАЙ Женщина, 53 года, обратилась за лечением рецидивирующей аденокарциномы толстой кишки в **августе 2004 года**. Зимой ранее она заметила резкую потерю веса с сильными коликами в животе.

и неустойчивый стул, часто смешанный с кровью. Тестирование показало наличие массы размером 5 см x 7 1/2 см в восходящей ободочной кишке с вовлечением некоторых брыжеечных желез. Гемиколэктомия была сделана немедленно, за ней последовала химиотерапия. Через три месяца после химиотерапии контрольное КТ показало вовлечение новых брыжеечных узлов.

Она отказалась от предложенной дополнительной химиотерапии, обратившись к гомеопатии.

Она была очень худой — истощенной, с анемией, потерей аппетита, крайней усталостью, тошнотой и метеоризмом. Она была раздражительной, властной и нетерпимой, с пристрастием к сладкому. Исторически все симптомы всегда были с правой стороны. В 30 лет была сделана операция по удалению полипа правой верхнечелюстной пазухи; в 25 лет — плеврит правого легкого; в настоящее время ожидает операции по удалению катаракты правого глаза.

Рецепт

- *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Через восемь недель она почувствовала себя лучше, все симптомы были лучше, и она немного набрала вес. Через 16 недель КТ показало, что узлы стали сравнительно лучше, абсолютно никаких ухудшений.

Рецепт

- *Lycopodium* 1M плюс нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Теперь она выглядела намного лучше и набрала в общей сложности почти девять фунтов. Она стала лучше есть и избавилась от боли, тошноты и метеоризма.

Рецепт

- ▶ *Ликоподиум* 1М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карциозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

КТ показало, что все узлы уменьшились на 90%, новых узлов не обнаружено, ее состояние считалось стабильным. Колоноскопия в это время была чистой.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 10M Plussing нечетные недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Карциозин* 1М плюс четные недели в течение 6 месяцев

Все тесты по-прежнему показывали хорошие результаты.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 10M Раздельная доза через неделю в течение 1 года
- ▶ *Карциозин* 1М разделенная доза между неделями в течение 1 года

Она ежегодно отчитывается и спустя десять лет чувствует себя хорошо.

Плоскоклеточная карцинома

случай В декабре 2004 года 41-летний мужчина обратился с
26 плоскоклеточным раком прямой кишки. Первым симптомом было кровотечение, которое предположительно было геморроем или трещиной.

Он обратился к врачу в течение десяти дней после появления первых симптомов. Пальцевое ректальное исследование обнаружило только язву, поэтому была проведена ректороманоскопия с биопсией. Патологоанатомическое заключение показало стадию 1, поэтому он отказался от операции, выбрав только гомеопатическое лечение.

В его анамнезе упоминается колит, перенесенный пять лет назад, в то время ему также удалили полип толстой кишки.

Рецепт

- ▶ *Ruta graveolens* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

В течение четырех недель кровотечение полностью прекратилось. Сигмовидная кишка - повторная копия через 16 недель, показывающая уменьшение язвы на 75%.

Рецепт

- ▶ *Ruta graveolens* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Язва полностью зажила. КТ также показала, что весь живот чистый.

Рецепт

- ▶ *Рута пахучая* 1M дробная доза один раз в день в каждый нечетный месяц в течение 1 года
- ▶ *Карцинозин* 1M дробная доза один раз в день в каждый четный месяц в течение 1 года

Сейчас, в 2014 году, он по-прежнему находится в прекрасном здравии.

Рак слепой кишки

СЛУЧАЙ
27

Мужчина 55 лет, диагностирован рак слепой кишки в июне 1995 года, когда колоноскопия показала опухоль размером 6 см. Он обратился за гомеопатическим лечением в **июле 1995 года**. У него были умеренные боли,

кровь в стуле, диарея, чередующаяся с запорами, а также потеря веса в 42 фунта за два месяца.

Проведена гемиколэктомия, удалено 23 брыжеечных железы, 15 злокачественных, рекомендовано пройти химиотерапию, от которой отказались. Направлен на гомеопатию.

Рецепт

- ▶ *Aloe socotrina* 200C Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Улучшилось состояние стула и уменьшились боли.

- ▶ *Aloe socotrina* 1M в той же дозировке, что и выше, в течение следующих 8 недель чередовать с *Carcinosin* 200C

Он набрал семь фунтов, поэтому ему прописали то же самое лекарство еще на восемь недель.

КТ показало отсутствие патологии, и он вернулся к работе.

Рецепт

- ▶ *Aloe socotrina* 1M Плюс нечетные недели еще 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Срок давности: март 1996 г.

- ▶ *Aloe socotrina* 1M дробная доза один раз в 15 дней в течение 8 недель, затем *Carcinosin* 1M дробная доза один раз в 15 дней в течение 8 недель.

Пациент чувствует себя хорошо, симптомов нет. КТ, сделанные раз в полгода, были в норме.

Прошло уже 19 лет с момента завершения лечения.

Метастатический рак толстой кишки

СЛУЧАЙ 28

Мужчина, 69 лет, пенсионер, в **ноябре 2004 года поступил** на гомеопатическое лечение после четырех операций и химиотерапии рака толстой кишки с распространением на мочевого пузыря. Первая операция была Декабрь 2000

для устранения значительной диареи, которая не прекращалась с осени. Он чувствовал себя ужасно из-за слабости от диареи и мочился «коричневой массой». К июню стало ясно, что химиотерапия не подействовала, поэтому в январе 2002 года ему сделали резекцию толстой кишки после того, как колоноскопия показала больше рака. У него не было симптомов до января 2004 года, когда у него развилась грыжа. Во время операции по удалению грыжи было обнаружено больше рака.

gerу, проблема с вставленной сеткой вызвала инфекцию, образовался свищ, открывающийся наружу, выпускающий фекалии. В октябре 2004 года ему сделали 14-часовую операцию, после которой он благополучно выздоровел. Его вес снизился на 28 фунтов.

Другие его жалобы: повышенный уровень ПСА (9), увеличенная простата, из-за которой он просыпался три раза за ночь и никогда не чувствовал себя опустошенным. Он отказался от биопсии простаты. Он также пограничный диабетик с проблемами эректильной дисфункции. Он несколько фаталист и пуглив.

Семейный анамнез различных видов рака и диабета.

Рецепт

- ▶ *Алоэ сокотрина* 200С Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Sabal serrulata* 0,6 капль утром и вечером ежедневно

Оба его хирурга дали хороший отчет, биопсия во время операции не показала рака, КТ-сканирование отрицательное. Он просыпается реже ночью, набирает вес, а дефекация выглядит более нормальной.

Рецепт

- ▶ *Алоэ сокотрина* 1М Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 12 недель (это было изменено на 1М через 4 недели)
- ▶ Продолжить *Sabal serrulata* 0 6 капль утром и вечером ежедневно

Поздней осенью 2005 года он отправился в Европу, чувствуя себя хорошо и жалуясь только на проблемы с простатой.

Рецепт

- ▶ *Туя* 200С Плюс нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 4 недель
- ▶ Продолжайте принимать *Sabal serrulata* по 0,6 капль утром и вечером ежедневно.

В декабре 2005 года все врачи выдали ему справку о том, что он здоров, анализы крови и сканирования дали отрицательный результат, кишечник функционирует нормально.

Рецепт

- ▶ *Туя* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ Продолжить *Sabal serrulata* 0 6 капель утром и вечером ежедневно
- ▶ *Calcarea fluorica* 6X утром и вечером ежедневно

Частота ночных мочеиспусканий снизилась после добавления *Calcarea fluorica* .

Рецепт (перерыв в приеме Plussing только на 4 недели)

- ▶ *Sabal serrulata* 0,6 капель два раза в день
- ▶ *Calcarea fluorica* 6X два раза в день

Анализ крови и сканирование в октябре 2006 года не выявили никаких признаков рака. Все еще жалуется на проблемы с простатой и упомянул, что перенес операцию на колене.

Рецепт

- ▶ *Thuja* 10М в 1-й и 15-й день ежемесячно в течение 6 месяцев
- ▶ *Sabal serrulata* 0,6 капель утром и вечером ежедневно
- ▶ *Calcarea fluorica* 6X утром и вечером ежедневно

Сейчас он едет играть в гольф, чувствует себя хорошо и счастливо. Он прекратил лечение самостоятельно, но при последнем контакте в 2010 году у него все еще не было рака.

Этот пациент никогда не был надежен в плане соблюдения графика приема лекарств, поэтому сроки выписки рецептов могли не совпадать.

Желчный пузырь

Carduus marianus, Chelidonium, Cholesterinum.

Рак желчного пузыря

СЛУЧАЙ 29 69-летний мужчина сообщил в **апреле 2009 года** о диагнозе рак желчного пузыря. В декабре 2008 года была сделана лапароскопическая холецистэктомия с положительным заключением по патологии на рак

Простатэктомия, проведенная в то же время, оказалась доброкачественной. КТ не показала никаких метастазов, но была рекомендована химиотерапия. Семейный анамнез нескольких членов семьи, страдающих раком. Его реакция на химиотерапию была плохой, он потерял почти десять фунтов; стал токсичным и его тошнило. У него упал уровень лейкоцитов в крови, и у него были рецидивирующие лихорадки, поэтому химиотерапию пришлось прекратить.

Рецепт

- ▶ *Холестерин* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Результаты КТ оказались чистыми.

- ▶ *Холестерин* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Он восстановил весь вес, потерянный во время химиотерапии, плюс еще несколько фунтов. Сейчас он выглядит здоровым и упитанным. Аппетит и пищеварение отличные; он ходит по пять миль в день и вернулся к своей работе.

- ▶ *Холестерин* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Все показатели были в норме, поэтому ему назначили дробные дозы на шесть месяцев, каждое лекарство чередовалось по неделям, а затем продолжили принимать *Chelidonium 0*.

Он по-прежнему чувствовал себя хорошо, последний раз его видели в 2012 году.

Холестерин — это экстракт здорового желчного пузыря.

Гортань и голосовые связки

Argentum nitricum, Causticum, Kali bichromicum, Lachesis, Phosphorus, Thuja.

Рак голосовых связок

СЛУЧАЙ
30

Мужчина, 45 лет, обратился в **мае 2003 года** с внезапным изменением голоса и хрипотой, которые, казалось, развились за одну ночь. Он был заядлым курильщиком и пришел ко мне в кабинет

до того, как он обратился к другим врачам. Сначала его отправили к специалисту на эндоскопию. На правой голосовой связке была обнаружена язва, связка не двигалась так же свободно, как левая, поэтому была сделана биопсия. Гистопатологический отчет подтвердил рак голосовой связки 1 стадии, без явного распространения и без узелков. Ему сказали бросить курить в ту же минуту, что он и сделал.

Рецепт

- ▶ *Causticum* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

В течение недели он мог заметить изменение в голосе. Охриплость всегда была безболезненной и была единственным симптомом. Через месяц ему стало на 50 % лучше. Эндоскопию повторили через три месяца, и хирург подтвердил, что язва исчезла на 95 %, а голосовая связка выглядит здоровой и подвижной.

Рецепт

- ▶ *Causticum* 1M Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Повторная эндоскопия показала, что все чисто.

Рецепт

- ▶ *Causticum* 1M Plussing нечетные недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 6 месяцев

Рецепт

- ▶ *Каустикум* 1М разделенных доз в 1-й и 15-й день нечетных месяцев
- ▶ *Карцинозин* 1М разделенных доз на 1-й и 15-й день четных месяцев

Все средства были прекращены через 18 месяцев. В настоящее время он в форме, нормальный, здоровый и без рака в 2014 году.

Рак гортани**СЛУЧАЙ
31**

80-летняя женщина обратилась за лечением гортани 4 стадии. рак в **марте 2009 г.** Рак был в надгортаннике¹ и голосовая зона гортани с поражением лимфатических узлов. Была проведена операция с последующим облучением.

В настоящее время наблюдается сильная боль в гортани с затрудненным глотанием жидкостей. Она может принимать их только по ложке за раз или срыгивает. Она чувствительна; ласкова; эмоциональна, легко плаксива и элегантна, выглядит скорее на 60, чем на 80. Никогда не любила сладкое, но любит соленое и острое.

Рецепт

- ▶ *Фосфор* 200С плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Боль в гортани прошла в течение двух недель, а глотание улучшалось с каждым днем. Глотание стало на 50 % лучше, она чувствовала себя лучше и выглядела здоровее.

Рецепт

- ▶ *Фосфор* 1М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Онкологи были рады увидеть, что ее сканы теперь были чистыми. Тот же рецепт продолжался еще 16 недель.

Рецепт

- ▶ *Фосфор* 10М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

После этого последнего цикла лечения плюсом ее перевели на дробные дозы на один год, каждое лекарство принималось поочередно один раз в две недели.

В настоящее время, в 2013 году, она находится в добром здравии.

Фосфор является ее конституциональным средством и также показан для лечения ее конкретного вида рака.

Рак голосовых связок

СЛУЧАЙ
32

60-летняя женщина обратилась в **марте 2010 года** с раком голосовых связок 3-й стадии. Нарастающая осиплость голоса привела ее к врачу с этим рецидивом. При первоначальном диагнозе в 2008 году осиплость голоса была вызвана узелком голосовой связки, при этом обе связки были вялыми. Поражение на правой связке было 2 см × 1 см, твердое, уплотненное, рыхлое с вывернутым краем. Биопсия подтвердила плоскоклеточную карциному. Было вовлечено три дополнительных узла. Рекомендованным лечением была химиотерапия с последующим хирургическим удалением гортани, от которого она отказалась.

Она была профессиональной певицей, которая практиковалась минимум два часа в день и курила в течение 20 лет. Диагноз заставил ее бросить эту привычку. Она была тревожной, любила сладкое и страдала диабетом.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 200C Plussing нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 20 недель

В течение первой недели приема Plussing она чувствовала усталость, затем изменение голоса и уменьшение осиплости. Уровень сахара в крови натошак при движении голосовых связок значительно улучшился, кашель уменьшился на 50 %.

Рецепт

- ▶ *Argentum нитрикум* 1М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Она сказала, что ее голос стал лучше, чем на 50 % от нормы. Три лимфатических узла (подчелюстной и шейный) были меньше. Ее отправили к специалисту, чтобы осмотреть голосовые связки. Вся язва размером 2 см х 1 см зажила более чем на 75 %, вывернутые края и затвердевшее основание исчезли. Теперь осталась только безобидная на вид поверхностная язва, и одна связка двигалась свободно, в то время как другая была все еще вялой.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 10М плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

Теперь после плюсинга в течение года ее перевели на отдельные дозы еще на год. После постановки диагноза она перестала петь и продолжает давать отдых своей гортани. Она отказывается от ларингоскопии для подтверждения своего излечения, настаивая на том, что она в норме. Она продолжает это кажущееся излечение в 2014 году.

Лейкемия

Ceanothus americanus, Hekla lava, Strontium carbonicum (при сильном заражении), Symphytum.

Острый миелоидный лейкоз

СЛУЧАЙ
33

Мужчина, 68 лет, сообщил в **марте 2009 года** после трех курсов химиотерапии острого миелоидного лейкоза. Хотя его отношение было в основном положительным, он не мог переносить эффекты

химиотерапии, впал в депрессию и решил перейти на - гомеопатическое лечение.

Рецепт

- ▶ *Hekla lava* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Анализы крови были обнадеживающими: уровень моноцитов снизился с 35 до 28; уровень бластных клеток — с 65 до 52; уровень тромбоцитов вырос с 22 000 до 35 000.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Картина крови осталась неизменной.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

В этот момент количество бластных клеток снизилось с 52 до 9.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

Онкологи остались очень довольны анализом крови: бластных клеток 8, моноцитов 10, тромбоцитов 72 000.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 10М Плюс нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 20 недель

В январе 2011 года закончил Plussing и перешел в Split Doses.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 10М Разделенная доза один раз в две недели попеременно
- ▶ *Карцинозин* 1М, разделенная доза один раз в две недели попеременно

Мужчина чувствует себя хорошо, у него по-прежнему ремиссия, и в 2014 году у него не было никаких симптомов.

Хронический миелоидный лейкоз

СЛУЧАЙ
34

В **сентябре 2009 года** мужчина 68 лет обратился с жалобами на слабость, лихорадку, запор, метеоризм и раздражительность. Все симптомы были сильнее с правой стороны. Анализ крови

бластных клеток 45%; миелограмма показала бластных клеток в позвоночнике 75% с двумя пятнами в легких (грибковый плеврит).
Диагноз - хронический миелоидный лейкоз.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scrophularia nodosa* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Лихорадка спала, и он смог отменить все антибиотики. Он принимал шесть разных препаратов в течение трех месяцев до гомеопатии.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1М Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scrophularia nodosa* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Рентгенограмма грудной клетки стала значительно более четкой, плеврит разрешился.

Бластные клетки 26 %.

Рецепт продолжался еще 16 недель. Бластные клетки теперь 23%.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scrophularia nodosa* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Plussing был остановлен через год. Бластные клетки остаются на уровне 15-25%, легкие полностью чисты, и у него полностью отсутствуют симптомы. Он продолжает принимать те же средства Plussing в виде разделенных доз, каждую раз в две недели. Его состояние здоровья по-прежнему превосходное в 2014 году.

Scrophularia nodosa специфична для грибковой инфекции легких.

Острый лимфоцитарный лейкоз

СЛУЧАЙ 35 Девочка 11,5 лет поступила в клинику в **январе 2003 года с диагнозом «острый лимфоцитарный лейкоз 2 стадии»**. Цитохимия выявила бластные клетки с мелкими черными гранулами.

Гемоглобин упал до 2,5 г/дл; тромбоциты 6000. Сделано переливание крови. Вид у нее был бледный и нездоровый.

Рецепт

- ▶ *Hekla lava* 200C Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Было некоторое улучшение.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1М Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 8 недель

Сейчас эта девочка выглядит совершенно нормально, мазок крови не выявил бластных клеток, атипичных клеток. Гемоглобин до 10,3 г/дл; тромбоциты 90 000.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1М Раздельная доза чередовать нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М, разделенная доза, чередующиеся четные недели в течение 20 недель

После этого она посещала врача ежемесячно и получала только конституционное или интеркуррентное средство *Pulsatilla* или *Tuberculinum*. Она остается в прекрасном здравии, теперь взрослая женщина, в 2014 году.

Это еще один пример суверенной роли *Hekla lava* в лечении - патологии костей и костного мозга. У детей, как только рак поддается лечению, его не нужно продолжать так долго, как у взрослых.

Хронический миелоидный лейкоз

СЛУЧАЙ 36 Мальчик, 6 лет, обратился за помощью с хроническим миелоидным лейкозом , стадия 2, в **августе 2001 года**. Было поражено большое количество желез , которые были необычно твердыми для этого типа заболевания .

Он был лихорадочным и не испытывал жажды, печень и селезенка были увеличены. Лицо было отечным, и он жаловался на боли в суставах.

Рецепт

- ▶ *Apis* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Scirrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Через четыре недели железы стали менее твердыми, новые железы, по-видимому, не были поражены, периодические лихорадки уменьшились, гемоглобин поднялся до 8 г/дл с 6 1/2. Через 12 недель железы уменьшились в размере на 25 %, и он был афебрилен. Лейкемическая картина крови не изменилась.

Рецепт

- ▶ *Symphytum* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scirrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Анализы крови полностью нормализовались.

Рецепт

► *Symphytum* 200C Разделенная доза по нечетным месяцам в течение 5 месяцев

► *Scirrhinum* 200C Разделенная доза по четным месяцам в течение 5 месяцев

Во время гомеопатического лечения каждые три месяца проводилась КТ печени и селезенки. На 9 и 12 месяце эти органы выглядели нормально, без признаков увеличения.

В течение еще одного года ему давали такое же ежемесячное чередование лекарств, но в потенции 1М.

Сейчас он молодой, здоровый и не имеющий рака человек (по состоянию на 2014 год).

Apis — одно из первых средств, которое следует рассмотреть при наличии отёков. *Scirrhinum* был выбран вместо *Carcinosin* из-за необычной твёрдости поражённых желез, а *Symphytum* — из-за периодических приступов воспаления суставов и артралгии.

Печень

Chelidonium, Hydrastis, Lycopodium, Natrum сульфурикум.

Хелидонииум 0 можно применять одновременно с другими средствами для облегчения боли.

Гепатоцеллюлярная карцинома

СЛУЧАЙ
37

Мужчина, 66 лет, в **июне 2004 года обратился за медицинской помощью** с диагнозом гепатоцеллюлярная карцинома (первичная), которая была диагностирована двумя месяцами ранее , когда он обратился в отделение неотложной помощи с внезапной болью.

в правом подреберье. Боль утихла, но исследование обнаружило уплотнение размером 7 1/2 см x 5 см в правой доле печени. Желтухи или отсутствия аппетита не было, но у него была прогрессирующая вялость, усталость и отсутствие мотивации. Показатели печеночных проб были лишь слегка повышены.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scirrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Cholesterinum* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Carduus marianus* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно

Первоначальное назначение было рассчитано на восемь недель, но поскольку симптомы по-прежнему отсутствовали, его продлили на следующие восемь недель.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 1M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Scirrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Cholesterinum* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Carduus marianus* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно

На этом этапе УЗИ показало значительное уменьшение уплотнения без новых очагов поражения.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scirrhinum* 1M Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Cholesterinum* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Carduus marianus* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно

Следующее УЗИ показало небольшое уменьшение очага поражения и снова отсутствие новых очагов.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scirrhinum* 1M Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Cholesterinum* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Carduus marianus* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно

Через год после начала гомеопатического Plussing КТ подтвердило, что все чисто, никаких признаков поражения. Для подтверждения последовало ПЭТ -сканирование, которое также оказалось чистым. Он продолжил тот же Plussing и назначение сухой дозы в течение следующего полного года, когда его перевели на Split Doses.

Рецепт

- ▶ *Чистотел* 10 млн. дробной дозы один раз в день в каждый нечетный месяц в течение одного года
- ▶ *Scirrhinum* 1M дробная доза один раз в четный месяц в течение одного года
- ▶ *Cholesterinum* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Carduus marianus* 3X 2 сухие дозы утром и вечером ежедневно

Ему сообщили, что лечение завершено и что ему следует прекратить прием лекарств через два года, но он продолжает принимать их самостоятельно. На сегодняшний день в 2012 году, в возрасте 76 лет, он все еще здоров.

СЛУЧАЙ 38 Мужчина, 68 лет, сообщил в **январе 2006 года** о диагнозе двух опухолей в печени, распространяющихся на воротные вены. Первые симптомы появились всего десять дней назад с некоторыми ребрами и Боль в желудке, снижение аппетита и тошнота. При пальпации печень

чувствовал себя твердым как скала. Он принимает таблетки для пероральной химиотерапии в дополнение к гомеопатии.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scirrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

В течение двух недель он заметил значительное улучшение аппетита. Он чувствовал голод и съедал хорошую порцию за каждым приемом пищи. В течение этих месяцев легкие отеки на ногах уменьшились, а печеночные ферменты, которые контролировались каждые две недели, улучшились. Через четыре месяца МРТ показала 25%-ное уменьшение обоих поражений печени, и никаких метастазов не было обнаружено.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scirrhinum* 1M Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Теперь после восьми месяцев приема Plussing небольшой оставшийся асцит исчез, увеличение печени значительно уменьшилось, болезненность исчезла. МРТ показала дальнейшее уменьшение поражений.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Scirrhinum* 10M Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

В этот момент мужчина почувствовал себя почти нормально и умолял прекратить Plussing. Он также отказался от дополнительных МРТ. Ему назначили раздельные дозы тех же двух лекарств, каждое раз в две недели, чередуя в течение второго года.

Сейчас, спустя семь лет, он все еще «в отличной форме!».

Легкое

Argentum nitricum, Kali bichromicum, Kali Carbonicum, Lachesis, Lapis albus, Lycopodium.

Рак легких с рубцеванием

Женщина 51 года обратилась в **марте 2003 года** с диагнозом: рак легкого, кальцинированные гранулемы с рубцами, узел размером 5 мм в верхней доле правого легкого и еще один в верхушке левого легкого. Диагноз

СЛУЧАЙ
39

был сделан по КТ, никакого лечения не было предложено, кроме как наблюдать и ждать. История туберкулеза, длительная стрептококковая инфекция (18 месяцев на антибиотиках), много близких родственников с раком, два сложных брака, четверо детей, младшему было семь на момент постановки диагноза. Она оптимистичная тревожная женщина, которая быстро принимает решения, как только соберется с мыслями.

Рецепт

► *Argentum nitricum* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Сон стал более спокойным, спит как убитая. Бегаёт по 3-5 миль в неделю, чувствует себя хорошо. Говорит, что у нее все хорошо.

Рецепт

► *Argentum nitricum* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Через восемь недель концентрацию *Карцинозина* изменили на 1M.

Чувствую себя так хорошо. Поменяла работу на ту, где стресса гораздо меньше, больше не нуждается и не жаждет вина, чтобы расслабиться. Обожает недели на *Карцинозине*. Чувствую некоторую скованность в легких, которая не мешает физическим упражнениям. Теперь бегаёт по три мили шесть дней в неделю. Имеет несколько болезненных кист в груди.

Полный комплекс тестов: рентген грудной клетки без изменений; УЗИ малого таза и колоноскопия чистые. Имеется остеопения.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 1M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Oophorinum* 30C Сухая доза каждое утро
- ▶ *Calcarea arsenicosa* 6C Сухие дозы AM и PM

Плотность костей улучшилась; тазовая сонограмма идеальна; маммография/сонография показали две небольшие кисты в левой груди, одну старую, одну новую — будут только наблюдать; легкие чистые, хотя рентген без изменений, узелки все еще есть, но она чувствует себя отлично. Была здорова всю зиму, даже не было ни одной инфекции околоносовых пазух. Начала просыпаться в 2 часа ночи, делала Plussing, потом не может снова заснуть. Хорошо справляется с пятичасовым сном в течение всего дня, пока не сядет и не уснет. В остальном чувствует себя отлично, приливы значительно уменьшились.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 10M Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Карцинозин* 10M плюс четные недели в течение 12 недель
- ▶ *Calcarea arsenicosa* 6C Сухие дозы AM и PM

Все идет очень хорошо. Пришлось прекратить бегать из-за боли в спине и онемения правой руки из-за грыжи межпозвоночного диска. Вместо этого ходить. Лучше, чем когда-либо в ее жизни. Не было ни одной простуды или острого заболевания с тех пор, как она начала принимать лекарства.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 10M дробные дозы один раз в неделю в течение 8 недель

Все по-прежнему хорошо, но теперь появился подошвенный фасциит.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 10M Разделенная доза через неделю в течение 4 недель
- ▶ *Carcinosin* 10M через неделю в течение следующих двух недель
- ▶ *Calcarea fluorica* 6C Сухие дозы AM и PM

Хотелось бы, чтобы она проходила сканирование каждые 2–3 года для проверки физического состояния.

КТ стабильная, без изменений. Анализы крови в порядке, дополнительной потери костной массы нет. Много занимаюсь спортом, чувствую себя вполне хорошо.

Рецепт

► *Argentum nitricum* 10M Разделенная доза через неделю в течение 8 недель

► *Calcarea fluorica* 6C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Полностью в порядке, была первая инфекция верхних дыхательных путей за почти четыре года, но она быстро прошла. Никаких жалоб или проблем.

Рецепт

► *Argentum nitricum* 10M Разделенная доза через неделю в течение 8 недель

► *Calcarea fluonca* 6C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Это последнее предписание, она была выписана и в настоящее время, в 2014 году, находится в хорошем состоянии здоровья.

Бронхогенный рак

СЛУЧАЙ 40

Мужчина 72 лет, обратился в **ноябре 1993 года** за помощью по поводу сильного кашля и кровавой мокроты. В 1992 году ему поставили диагноз бронхогенный рак, стадия 3, с левым

Проведена лобэктомия. В сентябре 1993 года был прооперирован рецидив в правой доле, после чего он обратился к гомеопатии.

Его дыхание было коротким и прерывистым, с острыми режущими болями в груди, которые отдавали либо вниз в живот, либо вверх в плечо. Малейший кашель или напряжение вызывали сильную одышку и цианоз.

Рецепт

► *Kisлота Oxalicum* 200C Плюс нечетные недели в течение 4 недель

► *Scirrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 4 недель

Некоторое улучшение после двух недель, к концу четвертой недели, огромное облегчение всех симптомов, нет кашля, меньше одышки, нет цианоза. Он также выглядел здоровее.

Рецепт

- То же, что и выше, в течение следующих восьми недель, улучшение продолжалось
- Недели 13-20 те же средства, но в потенции 1М - теперь он чувствовал себя совершенно хорошо.

Рецепт

- *Oxalicum acidum* 1М чередовался с *Scirrhinum* 1М, дробные дозы дважды в месяц в течение 18 месяцев, затем прекратился. После этого только изредка повторялось каждое лекарство. Ожидания излечения не было, так как у этого мужчины была явно 4 стадия, и он жил хорошо и комфортно более четырех лет.

Из-за специфических симптомов был назначен *Oxalicum acidum* , а *Scirrhinum* вместо *Carcinosinum*, поскольку хирургическое патологоанатомическое исследование показало, что опухоль твердая, как камень.

Лимфома

(включает ходжкинские и неходжкинские болезни) *Aurum Metallicum, Conium, Lodium, Phytolacca, Scrophularia nodosa, Spongia, Thuja.*

Средостение, Scrophularia nodosa, Spongia, Thuja.

Неходжкинская лимфома

случай
41

При третьем рецидиве неходжкинской лимфомы женщина 48 лет обратилась за гомеопатическим лечением в **августе 2005 года**. Первоначальный диагноз был поставлен в 2002 году, проводилось лечение химиотерапией .

терапия. Когда в 2004 году болезнь повторилась, она снова прошла курс химиотерапии. Она ослабела и ее тошнило, она потеряла аппетит и значительно потеряла вес. Ее выздоровление от этих симптомов было очень медленным. Этот рецидив включал два небольших узелка в нижней правой доле легкого с пневмонитом.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

КТ показала, что мелкие узлы не изменились.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Один узел исчез, а оставшийся узел стал меньше.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

КТ-сканирование теперь показало два небольших узла в брюшной полости. ПЭТ-сканирование показало, что они доброкачественные. К счастью, онколог не предложил никакого лечения.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Она чувствует себя очень хорошо, симптомов нет, поэтому никаких дополнительных сканирований не проводилось.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 10M Разделенная доза по нечетным месяцам в течение одного года
- ▶ *Карцинозин* 1M Разделенная доза по четным месяцам в течение одного года

В 2014 году она по-прежнему чувствует себя хорошо.

Лимфома желудка

Женщина 64 лет, поступила в **декабре 2006 года** с лимфомой желудка. Она страдала от повышенной кислотности, рефлюкса, регургитации и сильной боли, не связанной с приемом пищи.

СЛУЧАЙ
42

Первая эндоскопия была сделана только через три месяца, так как симптомы были похожи только на рефлюкс-эзофагит. Наконец, диагноз был поставлен с помощью ПЭТ-сканирования и аспирации костного мозга. Она отказалась от предложенной химиотерапии.

Рецепт

- ▶ *Hekla lava* 200C Плюс нечетные недели до 24 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 24 недель

За это время концентрации *Hekla lava* и *Carcinosin* были повышены до 1M.

Рецепт

- ▶ *Pulsatilla* 200C Plussing нечетные недели в течение 24 недель (ее конституционный)
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 24 недель

Затем вернуться к первоначальному рецепту.

- ▶ *Гекла лава* 10М Плюс нечетные недели еще 24 недели
- ▶ *Карцинозин* 10М плюс четные недели еще 24 недели

К моменту завершения 18-месячного курса лечения лимфомой произошло ее полное излечение, подтвержденное эндоскопией.

Рецепт

- ▶ *Pulsatilla* 1М, раздельная доза один раз в месяц
- ▶ *Карцинозин* 1М, разделенная доза один раз в месяц

Прием разделенных доз продолжался в течение 18 месяцев.

Часто разделенные дозы назначаются в более низкой концентрации, чем максимальная, достигнутая во время «плюсования».

Лимфомы могут возникнуть в любой части тела.

Лимфома Ходжкина

случай
43

Мужчина 33 лет обратился к гомеопатии для лечения рецидивирующей лимфомы Ходжкина в **марте 1995 года**, когда выяснилось, что традиционное лечение не помогает. В возрасте

22 у него был туберкулез, который лечили традиционными методами и вылечили. У него также были проблемы с кожей, такие как экзема и контактный дерматит. В 1994 году, когда он пожаловался своему врачу на легкую ежедневную лихорадку, были обнаружены аномальные железы в правой надключичной области, правой подмышечной впадине и левой паховой области. Эксцизионная биопсия и гистопатологическое заключение диагностировали лимфому Ходжкина 2 стадии. Он прошел интенсивную химиотерапию в течение шести месяцев, а затем долгосрочную поддерживающую химиотерапию. Во время этого лечения на левой щеке появились еще две аномальные железы, и тогда он решил дополнить химиотерапию гомеопатией.

Рецепт

- ▶ *Scrophularia nodosa* 200C Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Железы вернулись к нормальному размеру, он набрал вес и чувствовал себя нормально, поэтому химиотерапию прекратили. Пациент отказался от рекомендованной поддерживающей химиотерапии.

Рецепт

► *Scrophularia nodosa* 1М Плюс нечетные недели в течение 12 недель

► *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 12 недель

Плановые визиты к онкологу показали, что анализы крови за это время были в норме.

Рецепт

► *Scrophularia nodosa* 1М Раздельные дозы поочередно через месяц в течение одного года

► *Карцинозин* 1М раздельные дозы поочередно через месяц в течение одного года

На этом этапе все гомеопатические дозы были прекращены, и в 2012 году он продолжает чувствовать себя хорошо.

Scrophularia nodosa — «мощное лекарство при наличии увеличенных желез; при болезни Ходжкина» (Boericke). Другие основные показатели — туберкулез в анамнезе пациента или его семьи или мягкие и эластичные железы, похожие на те, что наблюдаются при *Spongia*.

Меланома

Arsenicum album, Arsenicum bromatum, Calcareo arsenicosa, Causticum.

Злокачественная меланома

СЛУЧАЙ
44

72-летний мужчина обратился за лечением злокачественной меланомы в мае **2003 года**. У него была привычка всю жизнь наслаждаться пляжами и загорать, а за год до этого у него развилась ле ...

sion на правой руке. Патологический отчет об удалении показал - злокачественность, но он отказался от дальнейшего лечения. В феврале 2003 года на его правой руке появилось еще одно поражение, почти в том же месте, вместе со вторичной меланомой в правом легком. На этот раз ему предложили химиотерапию, от которой он отказался.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Никаких изменений не наблюдалось в течение восьми недель, но после полного курса лечения у него появился сильный кашель, непрекращающийся, продуктивный и изнуряющий.

Было сделано КТ, удивившее всех результатом. Поражение легких было на 50 % меньше, с плевральным выпотом в правой стороне.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Kali carbonicum* 30C Сухая доза утром и вечером ежедневно в течение 8 недель

Кашель прошел, дыхание улучшилось, одышка стала меньше.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 8 недель

Кожное поражение полностью исчезло, поражение легких исчезло на 90%.

Рецепт

- ▶ *Lysorodium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

После года приема «Плюссинга» его перевели на дробные дозы.

Рецепт

- ▶ *Lysorodium* 10M Разделенная доза по нечетным месяцам в течение одного года
- ▶ *Карцинозин* 1М Разделенная доза по четным месяцам в течение одного года

Он по-прежнему ежегодно проходит осмотр и продолжает пребывать в добром здравии. Сейчас, в 2014 году, ему уже за восемьдесят.

Стоит отметить, что злокачественная меланома является наиболее тяжелым видом рака кожи, часто приводящим к летальному исходу.

случай 45 Мужчина 64 лет, ярый поклонник пляжного отдыха в течение десяти лет, обратился в **январе 2002 года** с диагнозом злокачественная меланома . Он обнаружил поражение кожи вокруг пупка который зудел, с приподнятыми краями, которые были толстыми и вывернутыми. Дерматолог сразу же заподозрил неладное, и биопсия после иссечения подтвердила диагноз. Было сделано сканирование, и никаких метастазов не было обнаружено. Шесть месяцев спустя еще одно похожее поражение появилось на левой груди. Опять же, злокачественная меланома была подтверждена при иссечении. На этот раз поражение было также обнаружено на мочевом пузыре. Последовала химиотерапия, но первое же вливание вызвало массивную реакцию: крах лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов с генерализованной аллергической сыпью, лихорадкой, тошнотой и рвотой. Его госпитализировали на неделю, чтобы вернуться к почти нормальным показателям, но показатели крови восстанавливались очень медленно. Именно тогда он обратился к гомеопатии.

Рецепт

- ▶ *Tuya* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Анализы крови теперь были в норме, симптомов со стороны мочевого пузыря не было, а поражение кожи на груди выглядело меньше и лучше.

Рецепт

- ▶ Туя 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Примерно через 12 недель у него развилась внезапная гематурия. К назначению была добавлена *Terebinthina oleum* 30C, сухая доза по утрам.

Через девять месяцев после начала приема препарата Plussing компьютерная томография показала, что поражение мочевого пузыря стало намного меньше.

Рецепт

- ▶ Туя 10М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Terebinthina oleum* 30C Сухая доза каждое утро

Поражения кожи и мочевого пузыря полностью исчезли.

Рецепт

- ▶ Туя 10М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 10М плюс четные недели в течение 16 недель

В это время его перевели на дробный прием в течение года, каждое лекарство принималось один раз в два месяца.

В 2014 году у него по-прежнему не было признаков рака.

Рот

(включая язык) *Aurum muriaticum*, *Baryta iodata*, *Hydrastis*, *Mercurius solubilis*, *Phytolacca*.

Плоскоклеточная карцинома

СЛУЧАЙ

46

Женщина 42 лет обратилась за лечением плоскоклеточного рака полости рта 1 стадии в **июле 2002 года**. Анамнез жевания табака в течение 20 лет. Шесть месяцев назад она не

обнаружила небольшую язву на щечной полости правой щеки, которую она игнорировала, пока она не выросла до 1 см в размере. Она обратилась к стоматологу, который направил ее к хирургу-стоматологу, который диагностировал поражение с помощью биопсии. Не было обнаружено никаких поражений желез или распространения. Она пошла на облучение, но после 15 сеансов не было особого ответа, кроме общего воспаления и изъязвления. На этом этапе облучение прекратилось, и она пришла на гомеопатическое лечение.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Через восемь недель воспаление во рту уменьшилось более чем на 50%. К концу 16 недель вывернутые края фактического поражения показывали признаки разрешения.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

К настоящему моменту язва зажила на 75%.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

На данный момент язва зажила на 95%.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum* 10M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

года принимала дробные дозы *Aurum muriaticum* 10M поочередно с *Carcinosin* 1M.

Сейчас она общается только с другими членами семьи, но и сегодня, в 2014 году, она по-прежнему в отличном состоянии здоровья.

**случай
47**

Мужчина, 65 лет, в **январе 2001 года обратился** с жалобой на диагноз плоскоклеточный рак полости рта, стадия 2. Первоначальным симптомом была боль в области правой миндалины, но ничего не изменилось.

видимый. Сканирование показало поражение за миндалиной. Биопсия, которая почти удалила миндалину, дала диагноз. Были затронуты подчелюстные и шейные железы, также с правой стороны. Была проведена операция, чтобы удалить все подозрительное. Для восстановления этой области необходима пересадка кожи. Онколог сообщил ему, что риск рецидива велик без химиотерапии или облучения, но пациент решительно отказался от такого лечения. Кроме того, этот человек был довольно раздражительным, привередливым и хотел сладкого.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 24 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 24 недель

Он продолжал оставаться стабильным после первых 16 недель, поэтому рецепт был продлен. После полных шести месяцев КТ показало чистоту.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Его состояние по-прежнему оставалось стабильным.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Повторная КТ-диагностика снова показала чистоту.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Поскольку все было чисто, симптомы отсутствовали, и с момента начала гомеопатии он набрал почти 18 фунтов, было решено не повторять КТ, если только не будет особых показаний.

Ему назначили дробные дозы *Lycopodium* 10M, чередующиеся еженедельно с *Carcinosin* 1M в течение года, затем прием всех лекарств был прекращен.

Сейчас, в 2014 году, он продолжает чувствовать себя хорошо.

Пищевод

Argentum nitricum, Arsenicum album, Causticum, Graphites, Silicea, Thuja.

Рак пищевода

СЛУЧАЙ
48

52-летний мужчина обратился за помощью с раком пищевода в **марте 2006 года**, вскоре после постановки диагноза. Когда он впервые заметил дисфагию, он сразу же помчался к врачу. Он был всего

может глотать немного жидкости. Эндоскопия выявила поражение на 20 см, давящее на трахею. Мы лечили его дядю от того же состояния 15 лет назад. Поскольку дядя все еще чувствует себя хорошо, этот человек отказался от всех западных методов лечения, выбрав вместо этого гомеопатию.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Его отправили на повторную эндоскопию к первоначальному врачу. Удивительно, но 60% поражения исчезло, и этот человек теперь мог принимать мягкую твердую пищу. (Гастроэнтеролог был настолько впечатлен, что за последние несколько лет он направил в нашу клинику дюжину сложных случаев).

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
 - ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель.
- Улучшение продолжалось.

Рецепт

- ▶ *Conium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

После плюсинга в течение года эндоскопия была на 90 % чистой, поэтому его перевели на дробные дозы. Весь круг его семьи теперь большие поклонники гомеопатии, и он продолжает чувствовать себя хорошо в 2014 году.

Плоскоклеточный рак пищевода

СЛУЧАЙ 49

Женщина, 61 год, обратилась в **мае 2009 года**, через шесть месяцев после постановки диагноза плоскоклеточный рак пищевода. Первоначальным симптомом была сильная дисфагия. Кроме того, наблюдалось

поражение печени размером 1 см x 2 см и рубцовая ткань в легком. Дисфагия 1 степени, эндоскопия выявила массу в средней трети пищевода (на 27-35 см), которая была биопсирована. Ей провели два курса химиотерапии.

Поражение пищевода удалось взять под контроль, но печень теперь имела три поражения, поэтому стала центром внимания. Она была зябкой, любила соленое и кислое, не любила сладкое; ласковая, нежная с болезненным страхом грома и молнии.

Рецепт

- ▶ *Phosphor* 200C плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Казалось, ей стало лучше, но повторное обследование еще не проводилось.

Рецепт

- ▶ *Phosphor* 1M плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Сканирование печени показало значительное уменьшение поражений.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

После этих 16 недель ее перевели на дробные дозы *Chelidonium* 1M и *Carcinosin* 1M, чередуя их раз в две недели в течение двух лет. *Chelidonium* 0 продолжается и сейчас, в 2014 году.

Яичник

Aurum muriaticum natronatum, Lilium tigrinum, Pulsatilla, Sepia, Thuja, Viburnum prunifolium.

Рак яичников

СЛУЧАЙ 50 Женщина, 51 год, в **марте 2000 года** поставлен диагноз рака яичников 3 стадии. В 1999 году была проведена гистерэктомия и химиотерапия. В анамнезе полиомиелит и эндометриоз. Основные жалобы

были боли в суставах, приливы и нарушение сна.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 200C Плюс нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 4 недель

Никакого отчета не последовало, похоже, она передумала насчет протокола. В октябре 2000 года она пожаловалась на вспышки, плохой сон и снижение гибкости. Анализ крови в июле прошлого года был хорошим, включая маркеры рака. Она никогда не принимала *Natrum muriaticum*. Трудно было определить, как она принимала *Карцинозин* и принимала ли вообще. Подчеркивалось, насколько срочно ей нужно было соблюдать предписания.

Рецепт

- ▶ *Viburnum prunifolium* 200C Плюсочка на 1-й и 3-й неделях
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing недели 2 и 4
- ▶ Сообщите результаты в течение 4-й недели.

В середине января 2001 года она сообщила, что выполнила четыре недели предписания правильно, хотя и с опозданием получила лекарства, а затем не принимала их во время праздников. Боли в ногах уменьшились, приливы и сон не изменились, спросила, можно ли улучшить сексуальную энергию. Снова было подчеркнуто, что соблюдение предписаний необходимо для предотвращения рецидивов, и только тогда можно предложить симптоматическое облегчение.

Рецепт

- ▶ *Viburnum prunifolium* 1M Плюсровка на 1-й и 3-й неделях
- ▶ *Carcinosin* 1M Plussing недели 2 и 4

Сообщает о трудностях с получением лекарств. Следующий отчет о последующем наблюдении в апреле, говорит, что она продолжала принимать рецепт с октября 2000 года, а не более поздний. Анализ крови и маркеры рака в норме, но запросила КТ брюшной полости. Энергия и боль в суставах улучшились.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200C Плюсровка на 1-й и 3-й неделях
- ▶ *Tuberculinum* 200C Plussing 2 и 4 недели

Сообщает, что она принимала этот рецепт долгое время и теперь, в январе 2003 года, наконец, обратилась. Анализы крови все еще в норме. Приливы и сон улучшились, но снова ухудшились. Более плаксивая и эмоциональная, чем обычно. Принимает некоторые травы, которые, по ее мнению, не являются эстрогенными. Боль в суставах полностью прошла, энергия вернулась к тому, что было раньше. Настаивает, что хочет принимать эти средства, пока ей не исполнится пять лет с момента постановки диагноза.

Рецепт

- ▶ *Sepia* 10M Plussing недели 1 и 3
- ▶ *Tuberculinum* 1M Plus, 2 и 4 недели

Апрель 2003 года сообщает о нормальных результатах анализа крови и сканирования. Меньше энергии, приливы жара то появляются, то исчезают, но больше не капает пот, но чувствует себя подавленным.

Рецепт

- ▶ *Sepia* 10M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Tuberculinum* 1M Plussing четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Oophorinum* 30C Сухая доза ежедневно утром

Июль 2003, снова просрочен повторный прием, *Oophorinum* так и не заказывал, потерял рецепт. В остальном чувствую себя хорошо.

Рецепт

- ▶ *Sepia* 10M Split Dose еженедельно в течение 4 недель
- ▶ *Oophorinum* 30C Сухая доза ежедневно утром

Ноябрь 2003 г., по-прежнему ночная потливость, йога от скованности, метеоризм, что бы она ни ела или ни от чего отказывалась. Настроение приподнятое.

Рецепт

- ▶ *Tuberculinum* 10M, разделенная доза, только дни 1 и 15
- ▶ *Oophorinum* 30C Сухая доза ежедневно утром

После перерыва в посещении контрольных осмотров в течение почти пяти лет, в апреле 2003 года она сообщает, что ее анализ крови показывает предрасположенность к миеломе. Все еще жалуется на боли в ногах от химиотерапии. Теперь приливы только от слишком большого количества кофе. Работает много часов, занимается спортом и йогой.

Рецепт

- ▶ *Symphytum* 200C Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Tuberculinum* 10M Plussing четные недели в течение 8 недель

Сообщалось о выявлении остеопороза во время приема этого рецепта, но лекарственные средства не были изменены.

В октябре 2008 года она сообщила, что ее статус по миеломе не изменился, другие анализы крови по-прежнему хорошие.

Рецепт

- ▶ *Symphytum* 1M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Tuberculinum* 10M Plussing четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Aurum metallicum* 30C Сухая доза ежедневно утром

Прошло уже более пяти лет с момента ее последнего официального контакта, но она по-прежнему направляет новых клиентов и, судя по ее отзывам на сайтах социальных сетей, чувствует себя хорошо.

Спорадическое согласие этой пациентки не было в ее интересах, хотя, к счастью, в целом она чувствует себя хорошо, 14 здоровых лет после серьезного диагноза. Проблемы, с которыми она столкнулась, были в основном ее собственными, поскольку средства всегда были вполне доступны, если не в одной аптеке, то в другой.

СЛУЧАЙ Женщина, 37 лет, впервые осмотрена **в мае 2004 г.**
51 Первоначальный диагноз — шоколадная киста яичника, сейчас сообщается о раке яичников, стадия 2. На тот момент лечение не предлагалось. В сторону

из диагноза она жаловалась на крайне болезненные менструации с обильным кровотечением и сгустками. Боль и кровянистые выделения во время овуляции.

Рецепт

- ▶ *Viburnum prunifolium* 200С Плюс нечетные недели
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели

КТ повторяли каждые четыре месяца.

Рецепт

- ▶ Через 6 месяцев *Viburnum prunifolium* был поднят до 1 млн.
- ▶ Через 9 месяцев уровень карцинозина был повышен до 1М.

В 2008 году ее выписали здоровой. По сообщениям членов семьи, в 2014 году она все еще здорова.

Рак эндометрия

СЛУЧАЙ **52** в сентябре 2006 года диагностирован рак эндометрия .
Метастазы не обнаружены, поэтому была проведена гистерэктомия с последующей химиотерапией и лучевой терапией, которые
она отказалась.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200С Плюс нечетные недели
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели

Эти два средства чередовались в течение двух лет с повышением потенций до 10М в зависимости от времени, а не от изменения симптомов. В течение этого времени регулярные проверки не показали, что рак обнаружен.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 1М дробная доза один раз в месяц в течение 2 лет
- ▶ Карцинозин 1М, дробная доза один раз в месяц в течение 2 лет

С 2010 года рецидивов не было.

О варианте рака

СЛУЧАЙ 53 Женщина, 56 лет, с диагнозом рак яичников 2 стадии, 3 степени обратилась за гомеопатическим лечением в **октябре 1999 года**. Диагноз был поставлен месяцем ранее. Она была вс -

уже прошла менопауза, поэтому согласилась на полную гистерэктомию и сейчас проходит курс химиотерапии. Семейный анамнез включал различные виды рака у родственников, которые дожили до 90 лет. У нее были проблемы с раздраженным кишечником 20 лет назад, которые она успешно вылечила иглоукалыванием и отказом от молочных продуктов. Ее дух мятежный, и она любит активный отдых.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 200C Плюс нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 4 недель

Анализ крови довольно хорошие, включая печеночные ферменты. Лейкоциты низкие из-за химиотерапии.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200C Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Анализ крови пока близок к норме. Химиотерапию отложили на неделю из-за низкого уровня лейкоцитов, поэтому сейчас делаю уколы Нейпогена®.

Рецепт (отклонение от обычного)

- ▶ *Arsenicum album* 200C Plussing в течение 2 недель
- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200C Плюс в течение следующих 2 недель

Прошла последний курс химиотерапии с уколами Neupogen®. Другие анализы крови все еще близки к норме. Она ежедневно ходила пешком и занималась цигун, но все еще говорит, что у нее снижен уровень энергии. Сообщает о беспокойстве о своем здоровье. Принимает противотревожные препараты от генерализованных страхов. Трудно заснуть, если просыпается ночью. Иммунная система сильно ослаблена, есть вспышки герпеса. Пищеварение беспокоит после последнего курса химиотерапии.

Рецепт

- ▶ *Arsenicum album* 200C Plussing в течение 2 недель
- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200C Плюс в течение следующих 2 недель

Прошла первый осмотр у гинеколога-онколога после окончания - химиотерапии. Никаких лабораторных исследований не проводилось, просто сказали прийти через три месяца. Тревога усилилась, больше подъемов и спадов, поэтому лекарства были заменены. Вес все еще не набирается.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение одного месяца
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение одного месяца

Развилась необъяснимая субфебрильная температура, поэтому был назначен *Natrumphosphoricum* 6X Dry Dose для приема шесть раз в день.

Во время следующего наблюдения всплыли многие обиды и подавленный гнев из событий двухлетней давности. Сканирование было отрицательным, причина лихорадки не найдена.

Рецепт

- ▶ *Staphysagria* 200C Plussing нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 4 недель

Лихорадка прошла, хотя причина так и не была установлена. Гинекологический онкологический осмотр был отрицательным. Энергия кажется сильнее, правая сторона челюсти болезненна, вес все еще немного снижен.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 4 недель
- ▶ *Natrumphosphoricum* 6X использовать только при «SOS» (неотложных острых симптомах)

Энергия все еще накапливается, но по утрам тяжело. Принимает противотревожные препараты и к вечеру чувствует себя лучше и энергичнее. Страх/тревога больше переходят в слезы. Аллергия закладывает нос. Это хуже, чем до химиотерапии. Планирует вернуться к преподаванию на постоянной основе в начале следующего учебного года. Анализы крови все еще хорошие.

Рецепт

- ▶ *Staphysagria* 1M Plussing нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 4 недель

Утром энергии все еще мало. Больше хожу. Тревога становится больше, страх рецидива и смерти. Вес теперь в норме.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 200C Плюс нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 4 недель

Возвращаясь в школу через две недели, спросил, можно ли изменить рецепт на сухие дозы. Пищеварение снова беспокоит, кишечник очень слабый, некоторый страх перед возвращением в класс. Энергия хорошая. Сейчас появляются некоторые страхи и обиды, но через несколько дней пойду к гинекологу-онкологу, а это всегда пугающая ситуация.

Рецепт

- ▶ *Кониум* 1M, раздельная доза, один раз в неделю в течение 2 недель
- ▶ *Carcinosin* 1M один день в неделю в течение следующих 2 недель

Обожает Сплит-дозы. Ходит быстрым шагом каждое утро перед школой, борется с вирусом, который ходит вокруг. Страх и напряжение утихли после первой недели преподавания. У нее был день рождения, и она ценит свое здоровье.

Рецепт

- ▶ *Кониум* 1M, раздельная доза, один раз в неделю в течение 2 недель
- ▶ *Carcinosin* 1M один день в неделю в течение следующих 2 недель

Стресс вернулся, и страх перед раком. Сняла с себя противотревожные препараты, теперь подавлена. Аппетита нет, вес снизился. Все еще ходит и учит. Слушает аудиокассеты, чтобы успокоиться.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200C Разделенная доза один день в неделю в течение первых и третьих 2 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M, разделенная доза, один день в неделю для второго и четвертого
2 недели

На прошлой неделе у нее случился приступ гнева: «Я устала заботиться о себе сама, хочу, чтобы это делал кто-то другой». Сейчас это прошло, но она все еще боится рака, рецидива и смерти, но иногда может выйти и повеселиться.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 200C Разделенная доза один день в неделю в течение первых и третьих 2 недель
- ▶ *Carcinosin* 1M один день в неделю в течение вторых и четвертых 2 недель
- ▶ Через четыре недели был добавлен *Calcarea fluorica* 6X для устранения проблем с пищеварением, метеоризма и отрыжки.

Только что выздоровел от вирусных «багов». Прошел обследование, анализы крови хорошие. Чувствую себя отдохнувшим после недельного отпуска.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 200C Разделенная доза один раз в неделю в течение первых 2 недель
- ▶ *Carcinosin* 1M один день в неделю в течение следующих 2 недель
- ▶ *Calcarea fluorica* 6X Сухие дозы два раза в день
- ▶ *Ferrum phosphoricum* 6X сухие дозы два раза в день

У меня был запор, и я очень боялась, что это сигнализирует о рецидиве. Врач сказал, что это из-за трав, которые она принимала. Аллергия усиливается, как и боль в спине, как от ударов током. Хватит жаловаться, на самом деле все отлично.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 1M, раздельная доза, один раз в неделю в течение трех недель
- ▶ *Карцинозин* 1M, разделенная доза, только четвертая неделя
- ▶ *Calcarea fluorica* 6X сухие дозы утром и вечером ежедневно

Недавний медицинский осмотр врача подтвердил, что она чувствует себя хорошо на всех уровнях. Конец учебного года изнурителен, как и до постановки диагноза.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200C разделенная доза один раз в неделю в течение 16 недель.

- ▶ *Calcarea fluorica* 6X сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Natrumphosphoricum* 6X сухие дозы утром и вечером ежедневно

Гинеколог-онколог в восторге, что ей почти два года, и все еще хорошо. Энергия улучшается, а гнева становится больше.

Рецепт

- ▶ *Medorrhinum* 200C Разделенная доза один раз в неделю в течение 16 недель
- ▶ *Calcarea phosphorica* 6X сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Natrumphosphoricum* 6X сухие дозы утром и вечером ежедневно

Все хорошо, за исключением желчного камня.

Aurum muriaticum natronatum 200C Разделенная доза один день через неделю в течение 16 недель, как указано выше. Кроме того: *Chelidonium* 6C и *Natrum sulphuricum* 6C в сухих дозах утром и вечером ежедневно.

Это было последнее, что мы слышали от нее за девять лет: она написала, что у нее все еще нет рака.

Поджелудочная железа

Arsenicum album, Baryta iodata, Ceanothus americanus, Chelidonium, Hydrastis, Spongia.

Поджелудочная железа

СЛУЧАЙ

54

В марте 2003 года 36-летний мужчина обратился за лечением злокачественной опухоли поджелудочной железы. Когда ему сказали, что операция — единственный выход, а прогноз неблагоприятный, он выбрал

одна только гомеопатия.

Он был болен в течение последних восьми лет, перенес операцию по удалению камней поджелудочной железы, а затем кисты в печени. В течение года ему была назначена консервативная линия лечения псевдокист в поджелудочной железе. У него не было ни одного дня без абдоминальных симптомов, которые заставили его отказаться от своей прибыльной карьеры. Затем он заболел диабетом из-за кист поджелудочной железы. Все это время он терял вес. Однажды сильные колики в животе отправили его в отделение неотложной помощи, где сканирование показало большую массу вокруг кисты. В этот момент биопсия под контролем КТ позволила поставить ему диагноз.

Дополнительный анамнез включал повторные приступы малярии - по крайней мере шесть рецидивов за последние десять лет. Это привело к легкой спленомегалии за эти годы. У него также были следы высокого уровня сахара в крови с пятилетнего возраста.

Рецепт

- ▶ *Natrum sulphuricum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Наконец, он избавился от боли, у него улучшился аппетит, он набрал почти пять фунтов. В то время, когда у него были колики, ему давали *Berberis vulgaris* 200C в воде каждые две минуты, пока не наступило облегчение.

Рецепт

- ▶ *Natrum sulphuricum* 1M плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Улучшение продолжалось.

Рецепт

- ▶ *Natrum sulphuricum* 10M плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Через год после начала Plussing он пошел на КТ, которая показала, что поражение на 99 % очищено. Возможно, осталась только остаточная видимость поражения.

Рецепт

- ▶ *Natrum sulphuricum* 10M плюс нечетные недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 10M плюс четные недели в течение 6 месяцев

Рецепт

- ▶ *Natrum sulphuricum* 10M Разделенная доза по нечетным месяцам в течение одного года
- ▶ *Карцинозин* 10M Разделенная доза по четным месяцам в течение одного года

Сейчас, в 2014 году, его здоровье по-прежнему превосходное.

Рак поджелудочной железы

СЛУЧАЙ 55 Мужчина 61 года обратился за лечением рака поджелудочной железы в **марте 2006 года**. Около полугода назад у него появились псевдокисты поджелудочной железы, не имевшие признаков злокачественности.

Затем острый приступ колик заставил его лечь в больницу, где сканирование показало подозрение на злокачественную опухоль. Была проведена лапаротомия, удалив только 75 % поджелудочной железы, поскольку часть ее приросла к желудку. После операции ему назначили химиотерапию, но он не смог ее переносить, поэтому обратился к гомеопатии.

Рецепт

- ▶ *Ceanothus americanus* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Через восемь недель у него не было никаких симптомов, и это продолжалось до окончания курса лечения.

Рецепт

- ▶ *Ceanothus americanus* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

После этих месяцев он выглядел бодрым и здоровым с хорошим цветом лица, энергией и аппетитом, который вернулся к норме. Он набрал около 25 фунтов.

Рецепт

- ▶ *Ceanothus americanus* 1M Плюс нечетные недели в течение 32 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 32 недель

В этот момент его перевели на дробные дозы.

Рецепт

- ▶ *Ceanothus americanus* 1M Разделенная доза нечетные месяцы
- ▶ *Карцинозин* 1M Разделенная доза по четным месяцам

Последнее КТ было сделано в апреле 2011 года, и показало, что поджелудочная железа в том же состоянии, не лучше и не хуже, а остальная часть поражения все еще прилипла к желудку. Физически он в необычайной форме и в остальном в полном здравии. Технически это считается полной ремиссией, а не излечением, которое продолжается и сейчас, в 2014 году, восемь лет с момента постановки диагноза.

околоушная железа

Iodium, Lachesis, Phytolacca (главным образом для околоушных желез),
Scrophularia nodosa, Spongia, Thuja.

Плоскоклеточная карцинома

случай 56 Мужчина в возрасте 64 лет обратился за лечением по поводу низкодифференцированного плоскоклеточного рака околоушной железы в **январе 2005 года**. Первоначальными симптомами были боль и отек, поэтому хирургическое вмешательство

Геон удалил всю железу. Другие железы не пальпировались, но химиотерапию все равно рекомендовали. Пациентка отказалась.

Рецепт

- ▶ *Phytolacca* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Пациентка чувствовала себя хорошо, но никаких других исследований не проводилось.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

В течение этих 16 недель у него развился непрекращающийся кашель без установленной причины. Из-за его онкологического анамнеза было проведено много тестов, включая КТ легких. Легкие были чистыми, это была просто небольшая инфекция, которая прошла через несколько дней приема *Bryonia* 30C, а затем *Kali carhonicum* 30C.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 10М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

Он продолжал чувствовать себя хорошо, поэтому прием этого рецепта был продлен еще на 16 недель.

В следующем новом рецепте ему назначили дробные дозы на один год: те же два средства в тех же потенциях по одному разу в день через неделю.

Опухоль околоушной железы

СЛУЧАЙ 57 Мужчина, 49 лет, обратился в **августе 2005 года, через** три месяца после постановки диагноза опухоли околоушной железы. Твердый комок был удален. За операцией последовал курс лучевой терапии

и один курс химиотерапии. Вскоре после этого лечения был замечен рецидив в подчелюстном лимфатическом узле. Было рекомендовано еще лучевая терапия и химиотерапия, но пациент отказался. В анамнезе травма головы в результате несчастного случая в 2004 году.

Рецепт

- ▶ *Phytolacca* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Опухоль в подчелюстной железе полностью исчезла, и он почувствовал себя очень хорошо.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Улучшение продолжалось.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

Плюсинг прекратился через год. Он до сих пор ходит на осмотры раз в полгода и в 2014 году был абсолютно здоров.

Аденокарцинома околоушной железы

СЛУЧАЙ
58

Одинокая женщина, 39 лет, не хотела делать рекомендованную операцию по поводу аденокарциномы околоушной железы, поэтому обратилась за лечением в **марте 2007 года**. Левая околоушная железа была опухшей.

и узловой без вовлечения лимфатических узлов. Слюноотделение и жевание были очень болезненными. Диагностическим тестом была тонкоигольная аспирационная цитология.

Рецепт

- ▶ *Phytolacca* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Узелковость околоушной железы выравнилась — хороший знак.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Улучшение продолжалось.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

В конце года опухоль железы прошла, и КТ показала норму. Она принимала те же два средства в разделенных дозах еще шесть месяцев и была выписана. Она продолжает чувствовать себя хорошо в 2014 году.

простата

Кониум, Lycopodium, Sabal serrulata, Туя.

Рак простаты

СЛУЧАЙ
59

Мужчина 49 лет обратился за гомеопатическим лечением рака простаты в **январе 2005 года**, сразу после операции по удалению органа. Его показатель Глисона составил 7 нг/мл, ПСА —

повышенный, хотя не было никаких симптомов, даже при физическом осмотре. Патология : аденокарцинома и карцинома. История алкоголизма и курения, хотя сейчас трезв более 20 лет. Сон всегда отличный, как и аппетит. Любит рыбу, молоко и горячие напитки. Характер был бурным, злым и предвзятым, пока религия не успокоила его, теперь его прозвали «Прозак Сэм» за его спокойствие и оптимизм. Любит высоту, боится змей.

Рецепт

- ▶ Туя 200С Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ Carcinosin 200С Plussing четные недели в течение 12 недель

Восстановление после операции хорошее, ПСА 2,0 нг/мл, мочеиспускание улучшается, но есть подтекание и импотенция. Селен 30С добавлен к назначению на восьмой неделе, раздельная доза еженедельно.

Принимал *Lycopodium* отдельно, который предпочитал *Selenium*. Все еще импотент даже при аллопатических рецептах. Пазухи забиты; дискомфорт под мошонкой. Эякулирует без эрекции, что очень болезненно.

Рецепт

- ▶ Туя 1М Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ Carcinosin 200С Plussing четные недели в течение 12 недель
- ▶ Селен 30С, раздельная доза, один раз в неделю

Через четыре недели после назначения этого рецепта уровень ПСА упал ниже 1 нг/мл. Сексуальная функция улучшилась совсем немного. Некоторое подтекание при эрекции

ций, которые все еще только частичные. Через восемь недель ПСА снизился до 0, но он все еще нервничает из-за импотенции. Переключил *Selenium* на *Lycopodium* 30C, раздельная доза еженедельно.

Говорит, что сейчас есть некоторое действие *Lycopodium*, но не вернулось к норме. Считает, что он полностью здоров во всех других областях, но его положение сидя все еще скомпрометировано.

Рецепт

- ▶ *Туя* 1М Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Lycopodium* 30C Разделенная доза один раз в неделю

Уехал в отпуск и сделал все, что мог, с Plussing. Паховая область кажется более чувствительной — ощущения возвращаются. Эрекции стали более частыми, их легче достигать и поддерживать.

Рецепт

- ▶ *Туя* 10М Плюс нечетные недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Lycopodium* 30C Разделенная доза еженедельно

В начале этого рецепта все еще жалуется на сексуальные проблемы и дополняет аллопатические рецепты. Все еще имеет некоторую болезненность в паху, но отказался от надувной подушки. ПСА незначительный, намного ниже единицы. Сейчас, спустя год после начала гомеопатии, он доволен ситуацией с раком, но очень обескуражен в сексуальной сфере. Если возбужден, есть подтекание, все еще может испытывать оргазм без эрекции. Оргазмы более интенсивные, чем до операции.

- ▶ *Natrum sulphuricum* 6X сухие дозы два раза в день, добавлено через 16 недель.
- ▶ На 20-й неделе дозу *Lycopodium* переводят на 200C дробными дозами один раз в день через неделю.

Он снова счастлив, нет недержания или весенней аллергии. Все еще принимает рецепты от импотенции.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Раздельная доза еженедельно в течение 4 недель
- ▶ *Natrum sulphuricum* 6X сухие дозы два раза в день

ПСА повторен и все еще ниже 1.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M раздельная доза один раз в день через неделю в течение 12 недель
- ▶ *Natrum sulphuricum* 6X сухие дозы два раза в день

Все идет хорошо.

Рецепт

- ▶ *Карцинозин* 1M, разделенная доза, один раз в день через неделю в течение 8 недель
- ▶ *Natrum sulphuricum* 6X сухие дозы два раза в день

Уровень ПСА по-прежнему ниже 1, по-прежнему принимает немного аллопатических препаратов, но теперь может заниматься сексом, когда захочет.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M раздельная доза один раз в неделю в течение 8 недель, затем,
- ▶ *Карцинозин* 1M, разделенная доза, один день через неделю в течение 8 недель
- ▶ Повторяйте вышеперечисленное еще 16 недель.
- ▶ *Natrum sulphuricum* 6X сухие дозы два раза в день

Во время вышеуказанного курса его физикальное обследование было в норме, уровень ПСА по-прежнему был ниже 1.

Лечение закончилось. Он сообщает о прекрасном здоровье в 2014 году, через девять лет после постановки диагноза.

**СЛУЧАЙ
60**

Мужчина 63 лет, в **январе 1996 года поступило сообщение** о том, что МРТ показала вторичные опухоли в мозге. Ему рекомендовали пройти лучевую терапию, которая его напугала, поэтому он обратился за гомеопатией.

В 1994 году ему сделали операцию по поводу диагностированного рака простаты 2 стадии. У него было два подтверждающих симптома для выбора лечения:

У него были невыносимые головные боли с крайним беспокойством, и он был вынужден постоянно вертеть головой в подушке; недержание мочи, ухудшающееся в положении сидя.

лучше стоя, за последние пять лет. Это началось до операции и продолжалось после операции, хотя он выздоровел от всех других проблем с простатой. Эти симптомы явно указывали на выбранное лекарство.

Рецепт

- ▶ *Zincum sulphuricum* 200C Plussing недели 1 и 3
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing недели 2 и 4

Через месяц он сообщил, что головная боль и недержание уменьшились более чем на 50%.

- ▶ С 5 по 8 неделю продолжала принимать то же самое лекарство.

МРТ головного мозга показала отчетливое уменьшение размера поражения.

Месяцы 2-4 продолжал принимать те же средства, чередуя в увеличивающихся дозах.

Через четыре месяца МРТ показало полное исчезновение отложений, и пациент сообщил об отсутствии симптомов на 90%.

Плюсинг продолжался целый год, затем перешел на отдельные дозы, чередующиеся ежемесячно еще на год. В 2014 году он остается свободным от рака.

Аденокарцинома простаты

СЛУЧАЙ 61 Мужчина, 67 лет, обратился в январе 2005 г. после того, как ему поставили диагноз аденокарцинома простаты. Уровень ПСА составил 12,7 нг/мл, степень по шкале Глисона %. КТ показало рост

и задержка мочи в мочевом пузыре. Он жаловался на частое мочеиспускание, высокий уровень холестерина, ишемическую болезнь сердца с тревогой и депрессией.

Рецепт

- ▶ *Aurum arsenicum* 200C Плюс нечетные недели
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели

Через 6 месяцев *Aurum arsenicum* был повышен до 1М.

Через 9 месяцев уровень *карцинозина* повысился до 1М.

ПСА неуклонно снижался и через год упал до 1,6 нг/мл. Симптомы со стороны сердца улучшились, холестерин снизился. Сейчас, в 2014 году, он продолжает находиться в отличном состоянии здоровья.

Редко/Тимома

Плевральный метастаз тимомы

случай 62 Женщина, 39 лет, диагностирована метастазами в плевру щитовидной железы. (Чрезвычайно редкая эпителиальная/миастения гравис, связанная с тимусом). Тимома была удалена, после чего была проведена химиотерапия, но реакции на плевре не было. Сообщил о гомеопатии в **январе 2008 года**.

Рецепт

- ▶ *Physostigma* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Потенции увеличены до 1М на дополнительные 12 недель. Плевра была полностью чистой на КТ после шести месяцев Plussing. Год спустя была обнаружена опухоль в грудине (в кости), а тромбоциты и эритроциты были низкими, поэтому Plussing был возобновлен.

Рецепт

- ▶ *Symphytum* 200C Plussing нечетные недели
- ▶ *Карцинозин* 1М Плюс четные недели
- ▶ *Spongia* 30C утром и вечером ежедневно для улучшения картины крови.

Она продолжала проходить КТ дважды в год и в последний раз сообщала о своем хорошем самочувствии в 2011 году.

Инвазивная тимома

случай 63 Женщина, 60 лет, обратилась в **январе 2010 года** по поводу рецидива инвазивной тимомы. При первоначальном диагнозе в 2005 году у нее была миастения гравис. В то время симптомы

были слабость челюсти, потеря двигательной функции, дисфагия и слабость с уменьшением подвижности рук.

Хирургическая резекция, стернотомия без облучения на тот момент. Последующее наблюдение было запланировано с помощью КТ. Плазмаферез потребовался дважды для стабилизации миастении. Несколько рецидивов привели к дополнительной операции вместе с химиотерапией и облучением.

Рецепт

- ▶ *Physostigma* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

На 16 неделе потенция *Physostigma* была повышена до 1М, и то же чередование было продолжено. Через 24 недели после начала Plussing ей сделали КТ, которая показала небольшое уменьшение массы переднего средостения, никаких изменений в плевральных узелках. Расположение опухоли около грудины указывало на возможную апластическую анемию.

Рецепт

- ▶ *Hekla lava* 200C Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Spongia* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1М Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Spongia* 200C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Анализ крови показывает гемоглобин сейчас 11,8 г/дл. Улучшение очень обнадеживающее.

Рецепт

- ▶ *Фосфор* 200C плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель

После этих 16 недель *Фосфор* был повышен до потенции 1М, *Карцинозин* продолжал в том же режиме, а *Spongia* 200C Dry Doses дважды в день был введен снова. Она оставалась на этом рецепте еще шесть месяцев.

С октября 2011 года состояние стабильное, в 2014 году болезнь не прогрессировала и не рецидивировала.

Прямая кишка (см. Толстая кишка)

Алоэ сокотрина, Lachesis, Nitricum acidum, Sulphur, Thuja.

Кожа

(базальный или чешуйчатый) *Arsenicum album*, *Arsenicum bromatum*, *Bacillinum*, *Euphorbium*, *Sulphur*.

Если показан *Bacillinum*, используйте его в качестве нозода в четные недели, чередуя с конституциональным средством.

Базальноклеточная карцинома

СЛУЧАЙ
64

В мае 2005 года женщина-пилот авиакомпании приехала на лечение базальноклеточной карциномы правой руки. Она организовала свой график полетов так, чтобы иметь возможность принимать пациентов в Ченнаи

каждые восемь недель. Поражение руки, подтвержденное биопсией, последовало за десятилетней историей красного плоского лишая. Начиная с 1995 года красный плоский лишай развился по всему ее телу, но в основном на более открытых участках. Он стихал при приеме стероидов, затем снова появлялся, распространялся и ужасно чесался. Когда появилось поражение кожи, она отказалась от любого западного лечения.

Она задавалась вопросом, не является ли причиной повышенное воздействие ультрафиолетовых лучей на пилотов. Все ее кожные симптомы усиливались от солнца, головных болей и усталости. Ей было хуже перед менструацией; хотелось соли; любила музыку и танцы.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

В течение этих четырех месяцев, пока заживала язва, состояние красного плоского лишая также улучшалось.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Теперь зажившее поражение кожи оставило темный след, довольно заметный, который не исчезал. Нозод был заменен, и ей назначили Сплит- дозы.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 1M раздельная доза, один день через неделю в течение 16 недель
- ▶ *Bacillinum* 200C, дробная доза, один день через неделю в течение 16 недель

Почти через год после начала лечения на ее лице появилась язва. Она была очень похожа на ту, что была на ее руке, и также оказалась базальноклеточной карциномой. Вместо того, чтобы вернуться в Plussing, потенции ее лекарств были повышены.

Рецепт

- ▶ *Natrum muriaticum* 10M раздельная доза, один день через неделю в течение 16 недель
- ▶ *Bacillinum* 1M, разделенная доза, один день через неделю в течение 16 недель

Поражение лица прошло. В течение следующих 16 недель она продолжала принимать те же два средства и потенции, но каждое только раз в две недели.

В настоящее время, в 2014 году, она чувствует себя хорошо: рак кожи и красный плоский лишай исчезли.

СЛУЧАЙ 65

55-летняя женщина обратилась в **октябре 2007 года** с базальноклеточной карциномой. В 2003 году ей удалили два очага на правой руке; в 2005 году очаги были удалены с лица и

6 месяцев спустя некоторые на ее шее. Все отчеты по патологии были положительными на базальноклеточную карциному. В сентябре 2007 года поражение появилось на ее левом плече. Рентген в это время показал затемнение в левом легком. Она не стала продолжать диагностику и решила выбрать гомеопатическое лечение. Она была одиночкой, любила сладкое и была раздражительной.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Поражение кожи полностью исчезло, поражение легких уменьшилось, но не исчезло.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

КТ показало, что легкое совершенно чистое.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Split Dose через месяц в течение 6 месяцев
- ▶ *Carcinosin* 200C Разделенная доза через месяц после *Lycopodium*

Сейчас, в 2014 году, рецидивов не было с момента начала гомеопатического лечения в 2007 году.

Желудок

Arsenicum album, Cadmium sulphuratum, Causticum, Condurango, Hydrastis, Kali bichromicum, Ornithogalum - Ornithogalum 0 часто используют одновременно со средствами для облегчения боли.

Аденокарцинома

СЛУЧАЙ
66

Мужчина, 43 года, в **2007 году диагностирована** аденокарцинома желудка.

В течение полугода у пациента беспокоили боли в эпигастрии с

потеря аппетита, но он справлялся с помощью антацидов, пока боль не стала достаточно сильной, чтобы направить его на эндоскопию и КТ. Эндоскопия показала массу в большой кривизне 3 x 3 1/2 см; КТ показала парааортальные узлы и отложения в печени. Хотя он хотел использовать только гомеопатию, мы посоветовали ему провести рекомендованную медиками операцию. Была проведена полная гастрэктомия вместе с удалением 14 видимых лимфатических узлов. После операции была предложена химиотерапия, но он отказался. В этот момент началось гомеопатическое лечение.

Рецепт

- ▶ *Condurango 200C* Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin 200C* Plussing четные недели в течение 8 недель

Пациент чувствовал себя очень комфортно, поэтому такое же чередование продолжалось в течение шести месяцев.

КТ через шесть месяцев показала небольшое уменьшение отложений в печени без каких-либо новых поражений лимфатической системы.

Рецепт

- ▶ *Condurango 1M* Plussing нечетные недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Carcinosin 200C* Plussing четные недели в течение 6 месяцев
- ▶ *Chelidonium* Ø 15 капель утром и вечером в течение 6 месяцев

Компьютерная томография через год после постановки диагноза показала 75%-ное уменьшение поражений печени и отсутствие новых поражений лимфатических узлов.

Рецепт

- ▶ *Condurango* 10M Plussing нечетные недели еще 6 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели еще 6 месяцев

Пациент чувствовал себя очень комфортно, ходил на работу как обычно и был достаточно активен.

Рецепт

- ▶ *Condurango* 10M Сплит-дозы поочередно в течение 6 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 1M раздельные дозы поочередно в течение 6 месяцев

На этом этапе гомеопатия была прекращена, и сейчас, в 2012 году, прошло уже более четырех лет, а он продолжает чувствовать себя хорошо.

Кондуранго был назначен исключительно как органоспецифическое средство.

Рак желудка

случай 67 Женщина 59 лет, замужем, имеет четверых детей, **в марте 2008 года диагностирована** ранняя стадия рака желудка. Была рекомендована операция, но она хотела только гомеопатию и с тех пор

рак не был запущен, ее случай был рассмотрен.

История: Она страдала рефлюкс-эзофагитом в течение последних пяти лет. За это время было проведено по крайней мере шесть или семь эндоскопий, которые не показали никаких признаков рака. Последняя не показала опухоли, но промывание желудка показало злокачественные клетки.

Рецепт

- ▶ *Condurango* 200C Plussing нечетные недели в течение 3 месяцев
- ▶ *Карцинозин* 200C Плюс дозы с четным числом недель в течение 3

месяцев. Эндоскопия была повторена, промывание желудка не выявило злокачественных клеток.

Рецепт

- Продолжайте чередование «плюссинга» еще три месяца.

Проведена еще одна эндоскопия, спустя шесть месяцев после начала гомеопатии, и снова никаких злокачественных клеток обнаружено не было.

КТ всего живота и грудной клетки показало чистоту.

Рецепт

- *Condurango* 1M Plussing нечетные недели в течение 6 месяцев
- *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 6 месяцев

У пациентки полностью исчезли симптомы, включая рефлюкс-эзофагит, который беспокоил ее последние пять лет.

Рецепт

- *Condurango* 1M, раздельная доза, поочередно в течение 6 месяцев
- *Карцинозин* 1M, дробная доза, через месяц в течение 6 месяцев

На этом лечение было прекращено, и в 2014 году у нее по-прежнему не было никаких симптомов.

Ни один из обычных фаворитов, таких как *Argentum nitricum*, *Lycopodium*, *Natrum Sulphuricum*, *Sulphur* или *Arsenicum album*, не был указан. Никаких подсказок не было, поэтому в качестве органоспецифического средства был выбран *Condurango*.

Щитовидная железа

Iodium, Lachesis, Phytolacca (главным образом для околушних желез), Scrophularia nodosa, Spongia, Thuja.

Папиллярная карцинома

68 СЛУЧАЙ Женщина, 38 лет, в **октябре 2007 года сообщила** о диагнозе папиллярная карцинома щитовидной железы. ТТГ был 14,7, УЗИ показало узел в правой доле. Диагноз поставлен на основании биопсии

отчет. Ей сказали сделать операцию, а затем лучевую терапию, от которой она отказалась, обратившись вместо этого к гомеопатии. Хотя мы рекомендовали только операцию, она упорно отказывалась. Мы согласились попробовать гомеопатию в течение четырех месяцев, а затем пересмотреть все варианты, если это необходимо .

У нее были запоры, озноб, тяжелая астма с детства и история полной вакцинации. У нее было много бородавок, выпадение волос, болезненные менструации и отеки тела при переутомлении.

Рецепт

- ▶ *Tua 200C* Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin 200C Plussing* четные недели в течение 16 недель

Это продолжалось в течение четырех месяцев, затем были повторены УЗИ и тонкоигольная биопсия. Узелок уменьшился более чем на 40%. ТТГ снизился до 11,3.

Рецепт

- ▶ *Tua 1M* Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin 200C Plussing* четные недели в течение 16 недель

Теперь узелок проявился только как остаток, все остальные параметры были в норме, поэтому рецепт был изменен на Раздельные дозы тех же двух средств и потенций, каждое раз в две недели, чередуясь в течение года. Она остается в прекрасном здравии и сейчас, семь лет спустя.

Рак щитовидной железы

случай 69 Мужчина 35 лет обратился в клинику в **сентябре 2007 года** с диагнозом рак щитовидной железы. Ядерное сканирование с радиоактивным йодом показало высокий уровень йода

поглощение, а также доказательство того, что узел был злокачественным. В правой доле щитовидной железы был твердый узел, который постоянно рос. У него была значительная потеря веса, он был легко подвержен стрессу, у него был учащенный пульс, сердцебиение и бессонница в течение нескольких месяцев.

Рецепт

- ▶ *Spongia* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *лодий* 30C сухая доза каждое утро

Симптомы улучшились, и узелок уменьшился в размере. Несмотря на этот хороший отчет, он заразился массивной инфекцией полости рта, которую не удалось объяснить. Для этого ему дали:

- ▶ *Baryta iodata* 30C Разделенная доза ежедневно в течение 8 недель

Рецепт

- ▶ *Spongia* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *лодий* 30C сухая доза каждое утро

Все симптомы улучшились, но он все еще не набирал потерянный вес.

Рецепт

- ▶ *Iodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Он восстановил вес и оставался в хорошем состоянии здоровья вплоть до 2013 года.

Матка

Aurum muriaticum natronatum, Lachesis, Lilium tigrinum, Sepia, Thuja, Viburnum prunifolium.

Папиллярная аденокарцинома матки

СЛУЧАЙ 70 Женщина, 41 год, обратилась в **июле 2005 года** для последующего лечения после тотальной гистерэктомии. Патологоанатомическое заключение: папиллярная аденокарцинома матки. Рекомендовано последующее лечение . назначено лечение химиотерапией и лучевой терапией, которое не было проведено.

История кровянистых выделений в течение 7-8 лет между сильными кровотечениями. Это лечилось симптоматически с некоторым облегчением. В мае 2005 года кровотечение было обильным и неконтролируемым, что привело к гистерэктомии.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

У нее не было никаких симптомов, и она чувствовала себя комфортно.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 1M Плюс нечетные недели в течение 4 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 4 недель

MPT всего тела не выявила метастазов.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 10M Плюс нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 20 недель

После 14 месяцев приема Plussing ее перевели на Split Doses, те же два средства, чередующиеся недели. Еще одно MPT было сделано через 18 месяцев после

начало гомеопатии. Это тоже было ясно, лечение было прекращено. Она все еще приходила на контрольные осмотры дважды в год еще пять лет, продолжая чувствовать себя хорошо.

Аденокарцинома матки

СЛУЧАЙ
71

Женщина, 60 лет, обратилась в **апреле 2009 года** с рецидивом аденокарциномы матки. Первоначальный диагноз ровно год назад был Стадия 2. Тотальная гистерэктомия с последующей химиотерапией

и была сделана лучевая терапия. Эти процедуры были завершены к осени 2008 года. В течение шести месяцев плановая КТ выявила - поражение тазовых лимфатических узлов, и была рекомендована дополнительная химиотерапия. Не желая снова проходить через это ради таких краткосрочных результатов, она обратилась к гомеопатии.

Она нежная, любящая, чувствительная, пухлая, плаксивая и послушная.

Рецепт

- *Pulsatilla* 200C Plussing нечетные недели в течение 20 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 20 недель

КТ показала небольшое уменьшение железы и отсутствие расширения в других местах.

Рецепт

- *Pulsatilla* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Рецепт

- *Pulsatilla* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

КТ-сканирование полностью чистое, никаких признаков злокачественных новообразований нет.

Рецепт

- *Pulsatilla* 10M Разделенная доза, чередующаяся еженедельно в течение 1 года
- *Карцинозин* 1M, разделенная доза, чередующаяся еженедельно в течение 1 года

В 2014 году у нее по-прежнему не было рака.

Часть 2

Паллиативная помощь в ситуациях, не поддающихся лечению

При лечении рака самые сложные ситуации возникают, когда пациенты приходят на лечение, когда болезнь уже достаточно запущена. Это происходит по многим причинам, чаще всего после того, как они прошли все, что могут предложить врачи-аллопаты.

В других случаях болезнь не обнаруживается до тех пор, пока она не перейдет в 4-ю стадию при первоначальной диагностике или пока не появятся метастазы из исходного места в область, более трудно поддающуюся лечению.

Распространенные вторичные локализации, такие как печень и легкие, а также глубокие внутренние органы, такие как желудок и поджелудочная железа, часто попадают в эту категорию. В этих локализациях рак имеет возможность укорениться, прежде чем вызвать какие-либо неприятные симптомы. Многие лейкомии также попадают в эту группу.

На этих поздних стадиях гомеопат все еще может предложить полезные результаты, чаще всего это уменьшение наиболее беспокоящих симптомов, снижение потребности в наркотических обезболивающих препаратах и довольно часто продление жизни.

Зачастую пациент восстанавливает некоторую силу и способности, как физические, так и эмоциональные, часто возобновляя работу на неполный рабочий день и улучшая качество своей жизни.

На поздних стадиях рака часто наблюдаются асцит и отеки. Их необходимо лечить для комфорта пациента, даже если источник накопления жидкости невозможно устранить.

Асцит, накопление перитонеальной жидкости в брюшной полости, - обычно происходит, когда рак метастазирует туда или в печень. Эти увеличенные поражения блокируют свободный поток перитонеальной жидкости, которая накапливается, вызывая отек, который в свою очередь давит на другие органы, вызывая сильную боль.

Наиболее часто используемые средства в этой ситуации: *Arsenicum album*, *Carbo vegetabilis*, *Apis*, *Apocynum* и *China*.

Отек, в некоторой степени схожий с отеком, представляет собой опухание какой-либо части тела из-за скопления жидкости.

Это либо лимфа, либо экставазация жидкости из кровеносного сосуда. На поздних стадиях рака это обычно происходит, когда сердце или почки плохо функционируют. При плохом венозном возврате жидкость накапливается. *Sulphur*, *Calcareo carbonica* и *Lycopodium* — трио средств, которые стали популярными благодаря Джеймсу Тайлеру Кенту, одному из старых мастеров гомеопатии. Они наиболее полезны при лечении отеков.

При асците и отеках, если пациенту по-прежнему помогают дозы Plussing, выбранное средство следует назначать в низкой концентрации, например, 30C 3–4 раза в день, пока продолжается прием Plussing.

Также на поздней стадии заболевания наблюдаются спайки, обычно являющиеся результатом грануляции или рубцовой ткани после множественных операций. Наиболее часто используемым средством для их устранения является *Graphites*, который назначается в дробных дозах. Если спайки заметны из-за коликообразных болей, которые они могут вызывать, можно использовать *Colocynthis*. Обычно его принимают в качестве SOS, часто потягивая из чашки воды, в которой растворена одна сухая доза. Глоток каждые пять минут до десяти глотков или меньше, как только наступит облегчение.

Чтобы увидеть положительные результаты, важно, чтобы дозы Plussing вводились как можно дольше, даже во время госпитализации или вместе с аллопатической медициной. Очевидно, что необходим преданный своему делу человек, осуществляющий уход.

Кость

СЛУЧАЙ 72 Молодой человек, 26 лет, в **январе 2009 года обратился** с остеосаркомой 4 стадии - опухолью Юинга, с метастазами в позвонках, печени и селезенке. Было объяснено, что мы попытались бы продлить качественное время, но не ожидали бы излечения.

Рецепт

- ▶ *Hekla lava* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Через восемь недель он снова набрал три фунта, его аппетит и энергия улучшились, и он был относительно свободен от боли. Таким образом, назначение продолжалось в течение следующих восьми недель.

После 16^{-й} недели на месте операции образовалась опухоль - рецидив .

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1М Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Эти четыре месяца прошли спокойно, без боли, и поражение оставалось стабильным .

После первых восьми месяцев и *Hekla lava* , и *Carcinosin* были увеличены до 10М. Они принимались без осложнений в течение следующих четырех месяцев. Затем начались проблемы. На месте поражения образовался абсцесс , из которого сочился гной.

Рецепт

- ▶ *Strontium carbonicum* 200C Плюс нечетные недели
- ▶ *Карцинозин* 10М плюс четные недели
- ▶ *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Инфекция была резко взята под контроль, гной прекратился, а боль уменьшилась . На данный момент прошел год и четыре месяца с момента начала гомеопатии . Тот же рецепт продолжался еще четыре месяца. На отметке в два года в легком образовалось новое поражение, которое спалось. Он умер в течение недели. Его кончина была мирной, и его семья была благодарна за комфортное время, которое ему подарила гомеопатия.

Грудь

Рак молочной железы на поздней стадии

СЛУЧАЙ 73 В январе 2005 года 45-летняя женщина обратилась с раком груди в терминальной стадии. Опухоль была твердой, уплотненной, с вывернутыми краями и вторичными опухольями в печени. Открытая

Поражение было массивно инфицировано густым зловонным гноем, который постоянно вытекал . У нее был полный коллапс правого легкого, а левое легкое функционировало только на 25 %.

Рецепт

► *Carbo vegetabilis* 200C 3 сухие дозы утром и вечером ежедневно в течение 12 недель

► *Silicea* 6X Сухие дозы 4 раза в день

Через четыре недели дыхание стало менее затрудненным, цвет лица улучшился , но выделения из очага не изменились. После следующих восьми недель улучшения были недостаточны.

Рецепт

► *Lapis albus* 200C Сухие дозы утром и вечером ежедневно в течение 12 недель

► *Silicea* 6X Сухие дозы 4 раза в день, ежедневно

Сейчас, спустя шесть месяцев после начала гомеопатии, она была в хорошем состоянии, за исключением поражения груди, которое все еще не отреагировало. Внезапно, однажды ночью она упала в обморок и ее не смогли привести в чувство. Причина внезапного обморока так и не была установлена.

Carbo vegetabilis был заменен на *Lapis albas*, который, как известно, оказывает глубокое воздействие на легочную паренхиму.

СЛУЧАЙ 74 53-летняя женщина, у которой в феврале 2002 года был диагностирован рак молочной железы, обратилась за гомеопатическим лечением в **ноябре 2007 года**. После постановки первоначального диагноза у нее была обнаружена опухоль -
томия, за которой последовали химиотерапия и облучение. Она появилась рак-

свободна в течение двух лет, когда были обнаружены небольшие метастатические отложения в крестце и позвонках, а также большое поражение в печени. Ее снова лечили химиотерапией и облучением, и она хорошо реагировала еще два года, когда было обнаружено новое поражение в печени. Были испробованы различные препараты химиотерапии, но безрезультатно, и она обратилась к гомеопатии .

Она была довольно зябкой и находилась в предменопаузальном периоде.

Рецепт

- ▶ *Chelidonium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carduus marianus* 3X Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Она казалась стабильной в течение этих четырех месяцев, затем однажды случилась внезапная кровавая рвота. Эндоскопия выявила большие варикозные вены пищевода, которые лечили в больнице. Три дня спустя случился еще один эпизод кровавой рвоты, и она упала в обморок в последний раз.

Толстая кишка/прямая кишка

Стадия 3, восходящая ободочная кишка

СЛУЧАЙ
75

В марте 2011 года 78-летний мужчина обратился за лечением 3 стадии аденокарциномы восходящей ободочной кишки. Операция не была вариантом из-за его возраста и состояния легких. Легочные

функция была плохой из-за туберкулеза в анамнезе десять лет назад.
Другое

История болезни включала несколько приступов кровавой рвоты за последние десять лет, возможно, из-за варикозного расширения вен пищевода из-за его печени, пораженной алкоголем. Ему посоветовали не проходить химиотерапию. У него была сильная тяга к мясу, специям и алкоголю, хотя он утверждал, что сократил - потребление алкоголя. Он был холодным и вспыльчивым.

Рецепт

- ▶ *Nux vomica* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Colocynthis* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Плановое сканирование выявило метастазы в поджелудочной железе и селезенке.

Рецепт

- ▶ *Nux vomica* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Colocynthis* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Ceanothus americanus* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно с интервалом в 30 минут между приемом и приемом *Colocynthis*.

КТ показало, что опухоль толстой кишки стабильна, метастазы в поджелудочной железе и селезенке немного уменьшились.

Рецепт

- ▶ *Nux vomica* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

- *Colocynthis* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно
- *Ceanothus americanus* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Почти через два года *Carcinosin* был поднят до 10M. *Colocynthis* был остановлен. Он продолжал оставаться стабильным в 2013 году, продолжая Plussing и посещая клинику для наблюдения.

Колоцинтис назначался при периодических, сильных коликах и запорах, чередующихся с диареей.

Инфильтрирующая аденокарцинома толстой и прямой кишки

СЛУЧАЙ 76 Мужчина, 61 год, в мае 2010 года обратился с недавним диагнозом : инфильтрирующая аденокарцинома толстой и прямой кишки; полипы толстой кишки с множественными поражениями печени. У него был метеоризм

с тяжелой тревогой ожидания, привередливый с пристрастием к сладкому, боялся высоты и клаустрофобии. План онколога состоял из четырех циклов химиотерапии с последующей операцией. Он закончил первые два цикла химиотерапии, когда пришел на - гомеопатическое лечение.

Рецепт

- *Argentum nitricum* 200C Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель
- *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

В это время были запланированы следующие два курса химиотерапии, и онколог решил, что перед операцией понадобится еще два. После приема лекарств Plussing у пациента больше не было головной боли или боли в животе, но в стуле было несколько капель крови и жжение в заднем проходе. Анализы крови, уровень глюкозы в крови и артериальное давление пришли в норму. Тот же рецепт был продлен еще на восемь недель.

Кровотечение из полипов и поражений прекратилось, была проведена операция гемиколэктомия. Через месяц гомеопатия возобновилась.

Рецепт

- *Argentum nitricum* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

После этих 16 недель *Argentum nitricum* был повышен до 10M, а *Carcinosin* до 1M. Плюсование в этих потенциях продолжалось еще восемь месяцев. Он чувствовал себя очень хорошо в течение восьми месяцев, затем у него случился массивный эпизод мелены и гематемезиса (кровь в стуле и рвоте) с внезапным коллапсом из-за поражений печени, вызвавших полный отказ механизма свертывания крови.

Аденокарцинома прямой кишки

случай 77 Мужчине, 53 года, обратился в **марте 2009 года** с аденокарциномой прямой кишки. Он жаловался на изменение стула с ректальным кровотечением. Колоноскопия и биопсия показали аденокарцинома -

Карцинома в 5 см от анального края. ПЭТ-КТ показала массу в ректосигмовидном отделе с метастазами в печень. Лапароскопия, проведенная под общим наркозом, показала рост в области тазового края, плотно прилегающего к стенке мочевого пузыря. Одиночное поражение над печенью было неоперабельным. Он также был гипертоником и диабетиком.

Рецепт

- *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 24 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 24 недель
- *Chelidonium* 0 15 капель утром и вечером ежедневно

Сканирование показало, что первичное поражение стабильно/не изменилось, ни лучше, ни хуже. Очаги поражения печени выглядели больше, а анализ крови был хуже: билирубин 8; SGOT 235; SGPT 337.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель
- ▶ *Хелидониум* 0 15 капель 4 раза в день
- ▶ *Cholesterinum* 3X сухие дозы утром и вечером ежедневно

За все это время на Plussing, при массивном ректальном поражении, касающемся мочевого пузыря, не было ни боли, ни кровотечения. Единственной жалобой был сильный запор, от которого использовали свечи.

Сканирование на тот момент не проводилось, но все параметры функции печени были немного хуже.

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 12 недель
- ▶ *Хелидониум* 0 15 капель 4 раза в день
- ▶ *Cholesterinum* 3X сухие дозы утром и вечером ежедневно
- ▶ *Natrum sulphuricum* 6X сухие дозы утром и вечером ежедневно

Затем он впал в печеночную кому и умер от болезни. Он чувствовал себя очень комфортно в течение года лечения, не нуждаясь ни в обезболивающих, ни в дополнительных операциях.

Для дополнительной поддержки печени был добавлен *Natrum sulphuricum*.

**СЛУЧАЙ
78**

53-летний мужчина обратился в **январе 2010 года** с хорошо дифференцированной аденокарциномой прямой кишки. Последние жалобы : потеря веса, гематурия с жжением (беспокойство по поводу мочевого пузыря -

der вовлечение), прерывистая кровь в стуле со жгучей болью в анусе, значительно лучше от холодных компрессов, жжение в языке, легкая боль в пальцах ног и общий озноб. Креатинин сыворотки 1,7.

Рецепт

- ▶ *Алоэ сокотрина* 200C Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Через четыре недели кровь в стуле стала появляться реже.

Рецепт

- ▶ *Алоэ сокотрина* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

КТ показывает ректальную массу, давящую на мочевой пузырь - жировая прослойка между ними истончена. Он набрал два фунта; кровь в стуле появлялась примерно раз в неделю.

Рецепт

- ▶ *Алоэ сокотрина* 10М плюс нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 20 недель

Все симптомы сейчас исчезли, он полностью доволен, кровотечения из прямой кишки и мочевого пузыря нет. КТ показывает, что поражение не изменилось, нет прогрессирования или регресса. Он продолжает то же чередование Plussing, и его состояние остается стабильным в конце 2013 года.

Лейкемия

Миеломоноцитарный лейкоз

СЛУЧАЙ 79 Мужчина, 42 года, в **сентябре 2008 года ему** поставили диагноз : тремя годами ранее миеломоноцитарный лейкоз 4 стадии. За эти годы он прошел все виды химиотерапии. возможно без признаков ремиссии. В настоящее время у него гепатомегалия и спленомегалия, настолько серьезные, что врачи хотят сделать спленэктомию, но сомневаются в ее пользе.

Рецепт

- ▶ *Hekla lava* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Анализ крови оказался обнадеживающим: уровень моноцитов снизился с 32 до 22; уровень бластных клеток — с 53 до 41; уровень тромбоцитов вырос с 22 000 до 51 000.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Результаты анализа крови показали улучшение, а не ухудшение.

Рецепт

- ▶ *Гекла лава* 10M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Печень и селезенка все еще не уменьшились в размерах, но за все десять месяцев он чувствовал себя гораздо лучше. Однажды утром он умер от внутреннего кровотечения.

Печень

Гепатоцеллюлярная карцинома

СЛУЧАЙ 80 Мужчина, 72 года, в **декабре 2010 года обратился** с недавним диагнозом гепатоцеллюлярная карцинома. Поражение в правой доле с метастазами в брюшину. Боль усиливалась при дыхании,

чихание, лежание и повороты с боку на бок. Жидкость под печенью, перианальная трещина с периректальным абсцессом. Он был диабетиком в течение нескольких лет, но принимал инсулин только три раза в день в течение последних трех месяцев. История желчных камней, сердечных приступов, высокого уровня холестерина и артериального давления, потери веса и шейного спондилита. Он был в дурмане от огромной любви к сладкому, раздражителен и замкнут в любое время, кроме рабочего времени в офисе.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 20 недель
- ▶ *Kali carbonicum* 30C сухие дозы утром и вечером ежедневно (при плевритических болях в печени)

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Kali carbonicum* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

В этот момент его правое легкое схлопнулось. Ему дали кислород, стероиды и антибиотики — Plussing прекратили на восемь недель. Как только он смог возобновить гомеопатические рецепты, он стал еще более бледным, задышающимся и отечным.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Arsenicum album* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Было проведено сканирование, его состояние было стабильным — без изменений.

Прием того же рецепта продолжался еще 16 недель, после чего его перевели на дробные дозы.

Рецепт

- ▶ *Lusopodium* 10M Разделенная доза один раз в две недели попеременно
- ▶ *Карцинозин* 1M, разделенная доза один раз в две недели попеременно

В 2014 году он продолжает чувствовать себя относительно комфортно, принимая это же лекарство.

Легкое

Рак легких, 4 стадия

СЛУЧАЙ

81

Женщина, 57 лет, в **июне 2009 года была** поставлена диагноз рака легких, 4 стадия, метастатические очаги аденокарциномы в печени. У нее был умеренно сильный кашель, одышка,

Отек правой ноги и стоматит. Отек ноги впервые заметили три месяца назад, примерно через месяц после кашля. Астма с детства, хуже от сырости.

Рецепт

► *Natrum sulphuricum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Состояние ее было стабильным.

Рецепт

► *Natrum sulphuricum* 1M плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

КТ-сканирование значительно улучшилось, узелки в легком значительно уменьшились. Опухшая нога теперь имеет черные пятна.

Рецепт

► *Natrum sulphuricum* 1M плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Состояние ее легких заметно улучшилось, но теперь на яичнике видна масса правого придатка с отеком правой стопы. Сейчас ведется наблюдение за возможной злокачественной кистой в мозге.

Рецепт

► *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель

► *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

МРТ головного мозга через четыре месяца показала, что поражение мозга полностью исчезло.

Она продолжает Plussing, и ее состояние во всех отношениях стабильно. Поражения легких все еще присутствуют. Она мобильна и активна в своем доме, выходя только для визитов к врачу в конце 2013 года.

Первичная аденокарцинома легкого, стадия 4

СЛУЧАЙ 82 Мужчина 67 лет обратился в **декабре 2005 года** с первичной аденокарциномой легкого, стадия 4. Поражение охватило всю правую нижнюю долю. Симптоматические жалобы на последний

Два месяца одышка при малейшем напряжении с сухим кашлем. У него были метастазы по всему телу, включая мозг, но тем не менее он выглядел здоровым и не испытывал боли.

До недавнего времени он был курильщиком; раздражительным; привередливым в любых отношениях; любил сладкое и имел семейную историю онкологических заболеваний.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Он чувствовал себя очень комфортно, кашель был минимальным, но одышка лишь немного улучшилась. Но одышка была его главной и единственной заботой. Он хорошо ел и переваривал пищу, у него хватало энергии сидеть за компьютером целый час за сеанс.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Вскоре после этих четырех месяцев у него случился сильный припадок во сне, и его срочно доставили в больницу, где он умер от метастазов в мозг. Его смерть была очень мирной, а качество его жизни в течение последних восьми месяцев было абсолютно хорошим, за исключением легкого истощения.

Рот

Плоскоклеточный рак языка

случай 83 Мужчина, 74 лет, обратился в **марте 2011 года** с плоскоклеточным раком языка. Это был рецидив на том же месте, где опухоль была удалена в марте 2010 года, после -

прошёл 25 циклов облучения. Последние два месяца он чувствовал утолщение языка с сильной болью, которая то появлялась, то исчезала, по несколько секунд каждый раз.

Рецепт

► *Aurum muriaticum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Острая, стреляющая, похожая на удар током боль прекратилась через две недели после начала приема Plussing. На 12 неделе на дне полости рта образовалась небольшая язва. Она стала заполненной гноем, похожей на абсцесс.

► К назначенному препарату был добавлен *препарат Silicea 6X в сухих дозах четыре раза в день в течение 2 недель*.

Язва полностью зажила.

Рецепт

► *Aurum muriaticum* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

И снова, до окончания приема этого рецепта, был обнаружен небольшой лимфатический узел в подчелюстной области.

► Добавлен *Scrophularia nodosa 30C, сухие дозы утром и вечером ежедневно*.

Эта новая железа выглядела больше и тверже.

Рецепт

- ▶ *Scrophularia nodosa* 200C Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Лимфатическая железа продолжала увеличиваться, но в остальном пациент чувствовал себя комфортно.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 200C Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 12 недель

Теперь железа стала на 50% меньше.

Рецепт

- ▶ *Фитолакка* 1М Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 8 недель

Железа уменьшилась настолько, что ее можно было удалить хирургическим путем, что и было сделано.

Патологоанатомическое исследование показало наличие злокачественного новообразования.

Он продолжает принимать *Фитолакку* 1М и *Карцинозин* 1М и в конце 2013 года его состояние по-прежнему стабильно.

Рак полости рта

СЛУЧАЙ 84 66-летний мужчина обратился за гомеопатическим лечением в **мае 2008 года**. Он жевал табак в течение 30 лет, пока в 1998 году у него не диагностировали рак полости рта. Лоскутная реконструкция

было сделано дважды, затем облучение. При текущем рецидиве у него метастазы в костях, в том числе в спине, с сильными болями.

Рецепт

- ▶ *Hekla lava* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель.

Боль уменьшилась всего на 10%, все остальное осталось прежним.

Рецепт

- ▶ *Strontium carbonicum* 200C плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Теперь он был на 90 % свободен от боли, и не было других серьезных проблем. Это чередование продолжалось еще 17 месяцев, пока он не умер от церебральной эмболии. *Strontium carbonicum* показан при наличии инфекции в кости.

Пищевод

Рак пищевода

СПУЧАЙ 85 Мужчина, 59 лет, обратился в **январе 2006 года** с недавним диагнозом рака пищевода. Была полная обструкция в 25 см от рта; операция и анастомоз были пер -

сформирован. Гистопатологический отчет показал 4 стадию с - вовлечением лимфатических узлов и распространением на щитовидную железу. Он был крайне слаб.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Phytolacca* 12X Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Казалось, ему стало немного лучше.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Phytolacca* 12X Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Через восемь месяцев размер узла щитовидной железы составил 10 % от исходного размера.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Phytolacca* 12X Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Были некоторые колющие боли. Рентген грудной клетки показал признаки плеврита, поэтому было сделано дополнительное назначение:

▶ *Kali carbonicum* 30C утром и вечером ежедневно в течение одного месяца. После целого года приема препарата Plussing полное сканирование тела оказалось чистым.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Раздельные дозы через неделю
- ▶ *Carcinosin* 1M Раздельные дозы чередуются с *Conium*

После этого он прожил очень комфортно шесть лет и умер в 2013 году от обширного перикардита.

Фитолакка была добавлена для лечения щитовидной железы, которая была губчатой и резиновой. На 4 стадии обычно нет возможности для хирургического вмешательства, но в этом случае операция с последующей гомеопатией, отказ от химиотерапии и облучения сработали в его пользу.

СЛУЧАЙ

86

Мужчина 71 года сообщил в **январе 2011 года** о раке пищевода. Дата первоначального диагноза неизвестна, но он перенес операцию в октябре 2010 года, за которой последовало

химиотерапия и облучение. В течение двух месяцев у него были метастазы в трех разных местах, включая мозг. Для этого ему сделали процедуру CyberKnife.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

В этот момент он впал в кому, и больница отказалась от лечения. В отчаянии рецептом стал *Arsenicum album* 30C, разведенный в чашке воды. Одна чайная ложка этого дается каждые пять минут десятью дозами, затем перерыв в два часа и повтор. Он пришел в сознание, а также к его когнитивным способностям, и был выписан через три дня.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Ближе к концу восьмой недели у него случился инсульт, от которого он так и не оправился.

Этот случай представляет собой еще один пример пациента, прожившего на шесть месяцев дольше, чем предполагали врачи. Он был в сознании, чувствовал себя комфортно, и окончание его жизни было, к счастью, коротким.

Аденокарцинома пищевода

СЛУЧАЙ 87 Мужчина, 65 лет, в **августе 2005 года** обратился с аденокарциномой пищевода, 4 стадия, с метастазами в легкие и позвонки. Он уже закончил курс химиотерапии и радиация. В настоящее время наиболее неприятными были симптомы, связанные с дыханием.

Рецепт

- ▶ *Kali carbonicum* 200C плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Symphytum* 6C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Почти сразу же его сон улучшился, и теперь он мог спать всю ночь. До этого он просыпался в 3 часа ночи, с затрудненным дыханием и колющей болью в боковых частях груди и позвоночника.

Сканирование грудной клетки показало, что легкие не изменились по сравнению с первоначальным осмотром.

Рецепт

- ▶ *Kali carbonicum* 1M плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Symphytum* 6C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

В этот момент он почувствовал себя настолько лучше, что не возвращался почти год. Он сделал этот перерыв в лечении самостоятельно, что привело к распространению вторичных опухолей. Теперь были затронуты оба легких и почти каждая кость с головы до ног.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели
- ▶ *Карцинозин* 10M плюс четные недели
- ▶ *Symphytum* 30C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Яичник

Аденокарцинома яичника со злокачественной эпителиальной опухолью

СЛУЧАЙ
88

Женщина 43 лет обратилась в **январе 2009 года** с диагнозом аденокарцинома яичника со злокачественной эпителиальной опухолью. Видны необычные, гигантские опухолевые клетки. Для

За шесть месяцев до постановки диагноза у нее были невыносимые боли. С момента полового созревания менструации были обильными, с большими сгустками, болезненными до недавнего времени. Прогноз был, что она проживет всего 2-3 недели.

Рецепт

- ▶ *Viburnum prunifblium* 200C Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Через четыре недели ей стало немного лучше, может быть, на 5%. После того, как восемь недель прошли, боль значительно уменьшилась, мочеиспускание и дефекация были хорошими. Сон был хорошим, и есть стало легче.

Рецепт

- ▶ *Viburnum prunifolium* 200C Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Однажды ее срочно отвезли в больницу с кровавым, болезненным мочеиспусканием. Ей прописали антибиотики, которые не помогли.

Рецепт

- ▶ *Terebinthina oleum* 30C, одна доза на стакан воды, выпитая десять раз в течение дня. (Распределить на весь день, а не в узком промежутке времени для дополнительных доз.) Это делалось время от времени

в течение нескольких дней ситуация была взята под контроль, и «Плюссинг» возобновился.

Рецепт

- ▶ *Viburnum prunifolium* 200C Plussing нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 20 недель

Пришло время сменить лекарство, не повышая потенцию.

Рецепт

- ▶ *Terebinthina oleum* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 12 недель

Ей было очень комфортно эти три месяца. Потом у нее случилась острая задержка мочи, гидронефроз, мочевины и креатинина резко подскочили, «зашкалили», она впала в кому и скончалась.

Этот случай является ярким примером того, как человек смог чувствовать себя лучше гораздо дольше, чем предполагалось, и, наконец, мирно уйти из жизни, используя метод «Плюссинга».

Поджелудочная железа

Злокачественная опухоль головки поджелудочной железы

СЛУЧАЙ
89

Мужчина с диагнозом злокачественная опухоль в головке поджелудочной железы сообщил о сильной рвоте черноватым веществом, похожим на кофейную гущу, и о сильных болях в животе. Общая сыворотка

билирубин 28 мг; СГOT 180; СГПТ 155; РП. сахар в крови 240 мг.

Операция позволила удалить только % массы, оставшаяся треть осталась.

Рецепт

- *Кадмий сернистый* 200С плюс нечетные недели в течение 12 недель
- *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 12 недель

Пациенту становилось все лучше и лучше, рвота уменьшилась, но он стал все более тревожным и зябким.

Рецепт

- *Arsenicum album* 200С Plussing нечетные недели 8 недель
- *Carcinosin* 200С Plussing четные недели 8 недель

В течение восьми недель наблюдалось быстрое ухудшение, пациент упал в обморок и умер. Хотя этот человек не прожил долго после постановки диагноза (около пяти месяцев), он чувствовал себя более комфортно и меньше блевал, поэтому его общие страдания уменьшились.

Рак поджелудочной железы

СЛУЧАЙ
90

Женщина, 81 год, обратилась за лечением рака поджелудочной железы в **январе 2011 года**.

Первоначальный диагноз был поставлен годом ранее: стадия 3В. У нее были метастазы в позвоночнике. Она потеряла

35 фунтов за год, боли в животе были прерывистыми, но боль в костях в поясничной области была невыносимой в приступах. Сначала пробовали химиотерапию, но она не подошла ей, поэтому единственным методом лечения было снятие боли из-за ее возраста.

Рецепт

- ▶ *Ceanothus americanus* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Symphytum* 6C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Боли в костях значительно уменьшились; боли в животе возникали реже и были менее сильными; аппетит и способность есть улучшились, и она набрала несколько фунтов.

Рецепт

- ▶ *Ceanothus americanus* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Symphytum* 6C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

Сканирование скелета показало, что ее состояние стабильное, очаги поражения стали менее выраженными.

Рецепт

- ▶ *Ceanothus americanus* 10M Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Symphytum* 6C Сухие дозы утром и вечером ежедневно

После года приема Plussing, регулярно приходя на повторный прием, ее перевели на Split Doses, те же самые средства чередуются еженедельно. Сейчас, спустя 2,5 года, ее состояние остается стабильным, хотя все поражения поджелудочной железы и костей все еще присутствуют.

Препарат Symphytum применялся в качестве дополнения к средствам Plussing для устранения вторичных болезненных ощущений в костях.

простата

Рецидивирующий метастатический рак предстательной железы, стадия 4

СЛУЧАЙ
91

Мужчина в возрасте 61 года обратился в **феврале 2008 года** с рецидивирующим метастатическим раком простаты, стадия 4. Первоначальный диагноз и операция были поставлены два года назад. Обширные метастазы в костях позвоночника

и грудная клетка. ПСА медленно повышался с 2,01 до 2,16 нг/мл. Он был нетерпелив и испытывал боли во всем теле, особенно в области ребер.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 24 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 24 недель
- ▶ *Symphytum* 6C Сухие дозы 4 раза в день

Через 12 недель боли намного уменьшились, около 75%. ПСА 2,18 нг/мл, похоже, рост был медленнее. Пациент был доволен, поэтому рецепт не меняли.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Symphytum* 12C Сухие дозы 4 раза в день

Симптоматически он все еще чувствует себя хорошо и клинически комфортно. ПСА 2,24нг/мл, метастазы в костях без изменений. Он продолжал Plussing в общей сложности два года.

Рецепт

- ▶ *Conium* 10M Разделенная доза через неделю
- ▶ *Карцинозин* 10M Разделенная доза через неделю
- ▶ *Symphytum* 12C Сухие дозы 4 раза в день

На данный момент он завершил пятилетний курс лечения, все поражения остались прежними, состояние стабильное, и никаких симптомов не наблюдается.

Рак простаты, 4 стадия

СЛУЧАЙ 92 61-летний мужчина обратился за помощью по поводу рака простаты 4 стадии в **июне 2011 года**. Рак был 4 стадии, когда его диагностировали примерно год назад. Лечение - химиотерапия

и облучение. Метастазы, обнаруженные в течение шести месяцев этих процедур, были в мозге, левом легком, печени и позвоночнике. Боль очень сильная в верхних ребрах и позвоночнике. После облучения у него слабость в мышцах рук и ног, и он больше не может опорожнять кишечник без посторонней помощи. Даже веки кажутся слишком тяжелыми, чтобы держать их открытыми. Наркотики помогают контролировать боль. Сильная семейная история рака.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Боль осталась прежней, облегчения не наступило, поэтому рецепт был изменен:

- ▶ *Plumbum iodatum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

В конце восьми недель он чувствовал себя намного более комфортно, у него было меньше боли, улучшился сон и аппетит. Опорожнение кишечника стало намного легче, а в ногах стало больше силы для стояния и ходьбы. После вторых восьми недель этого рецепта он продолжал то же самое, никаких дальнейших улучшений или ухудшений.

Тот же Плассинг продолжил: он прожил в относительном комфорте еще шесть недель, а затем мирно скончался.

В менее тяжелой ситуации сила действия *Plumbum iodatum* (который был выбран для лечения поражений мозга) была бы повышена после 16 недель. Учитывая обширное повреждение тканей и его относительный комфорт, этого не следовало делать в этом случае.

Папиллярная карцинома простаты, стадия 4

СЛУЧАЙ
93

55-летний мужчина обратился в **феврале 2008 года**, у него за год до этого диагностировали папиллярную карциному предстательной железы 4 стадии. Метастазы были в печени, парааортальных узлах, бедренной кости,

поясничные позвонки и череп. Симптомы начались с безболезненной гематурии и увеличенной, каменистой твердой простаты. Иссечение было проведено в ноябре 2007 года с последующей химиотерапией и облучением. Онкологи не давали больших надежд, поэтому он решил попробовать гомеопатию.

Рецепт

- ▶ *Conium* 200C Plussing нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Scirrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 20 недель

КТ показала драматический ответ. Отложения в печени уменьшились на 50%, лимфатические узлы стали меньше и, что самое важное, новых очагов не было.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 20 недель
- ▶ *Scirrhinum* 200C Plussing четные недели в течение 20 недель

Пациент, по всей видимости, чувствовал себя хорошо, но отказался от повторного сканирования для подтверждения диагноза.

Рецепт

- ▶ *Conium* 1M Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Scirrhinum* 1M Plussing четные недели в течение 12 недель

После почти года Plussing у него началась тяжелая дыхательная недостаточность, активное поражение было обнаружено на легком, что привело к перикардiallyному выпоту. Он умер от остановки сердца. Конец его жизни был мирным, и он чувствовал себя комфортно в течение всего времени гомеопатического лечения.

Прямая кишка (см. Толстая кишка)

Желудок

Рак желудка, аденокарцинома, 4 стадия

случай 94 Мужчина 37 лет, крайне слабый и истощенный, с постоянной рвотой черноватой, дурно пахнущей массой, обратился за гомеопатическим лечением в **январе 1995 года**. Текущая ком -

Пациент перенес обширную операцию 6 месяцев назад по поводу рака желудка, аденокарциномы 4 стадии. Ему удалили желудок, двенадцатиперстную кишку, девять дюймов тонкого кишечника, 3/4 поджелудочной железы, селезенку, сальник и 32 железы. Затем последовала химиотерапия.

Рецепт

- *Cadmium sulphuratum* 200C плюс дозы по нечетным неделям в течение 8 недель
- *Карцинозин* 200C плюс дозы четные недели в течение 8 недель

Рвота прекратилась в течение первых двух недель, и через четыре недели он все еще был слаб, но чувствовал себя комфортно. На второй месяц он больше не испытывал боли, его живот был мягким и нормальным, и он мог есть часто небольшими порциями и даже набрал один фунт.

Анализ крови показали рост опухолевого маркера — онколог хотел начать новый курс химиотерапии, но пациент отказался, решив использовать только гомеопатию. Он продолжал то же чередование Plussing еще месяц, чувствуя себя немного лучше, казалось бы, стабильно. На четвертый месяц он пожаловался на жжение, боли в животе.

Рецепт

- *Arsenicum album* 200C Plussing Дозы нечетные недели
- *Карцинозин* 200C плюс дозы по четным неделям

Через месяц симптомы не изменились, поэтому *Cadmium sulphuratum* был возвращен в потенции 1М, и он снова почувствовал себя лучше. Он принимал это лекарство в течение примерно трех месяцев, начиная с

каждую неделю по новой бутылке. На 9^{-м} месяце лечения у него началась рвота, на этот раз черноватым веществом. Он умер в течение недели.

Кадмий *серноокислый* был назначен только в качестве паллиативного лечения и поддерживал его в относительно комфортном состоянии в течение восьми месяцев.

СЛУЧАЙ 95

Мужчина 52 лет, у которого диагностирована аденокарцинома желудка 4 стадии, обратился в **ноябре 1980 года** за гомеопатическим лечением, отвергнув все варианты западного лечения.

Всю свою жизнь он был пугливым и импульсивным, тяготел к сладкому и соленому, но усугублялся сахаром. У него всегда были проблемы с пищеварением (жжение, грызение и вздутие), которые облегчались сильным давлением на желудок и свежим холодным воздухом.

Его текущими симптомами были крайняя слабость, постоянная тошнота и неспособность употреблять твердую пищу. Эндоскопия показала массу размером с лимон в верхней части дна желудка, почти блокирующую сердечное отверстие. Язвы были разбросаны по всей слизистой оболочке. Биопсия дала положительный результат на аденокарциному; КТ показала, что также затронуты селезенка и печень.

Рецепт

- ▶ *Argentum nitricum* 200C Разделенная доза еженедельно в течение 6 недель
- ▶ *Omithogalum* Ø, 10 капель в небольшом количестве воды, принимать по глотку несколько раз в день по мере необходимости.

Он почувствовал себя немного лучше, чем достиг плато, поэтому *Argentum nitricum* 1M был назначен в виде дробной дозы на следующие три недели. Снова медленный прогресс, перед новым плато. *Argentum nitricum* 10M был назначен на следующие 4 недели, *Omithogalum* Ø все еще потягивался с водой по мере необходимости. Еще одно небольшое улучшение, затем снова новое плато.

Он оставался на этом уровне стабильным и продолжал принимать дробные дозы *Argentum nitricum* 10M до своей смерти девять месяцев спустя.

Здесь мы видим хороший результат, когда конституционное назначение пациента также является органоспецифичным для типа вовлеченного рака, в данном случае рака желудка. В этой запущенной ситуации было необходимо часто повышать потенцию, поскольку каждая более низкая потенция переставала быть эффективной. *Omithogalum* часто оказывает очень успокаивающее действие, поэтому его используют вместе с лечением рака.

Рак желудка, 4 стадия

случай 96 В сентябре 2009 года мужчина, 37 лет, обратился за помощью с раком желудка 4 стадии. У него были вторичные опухоли в печени, живот был напряженным, а химиотерапия не помогла. Он был дис ...

Его выписали из больницы, сообщив, что он может прожить еще от недели до десяти дней.

Рецепт

- *Hydrastis* 200C Plussing нечетные недели в течение 12 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели 12 недель

Аппетит улучшился, пищеварение улучшилось, тошнота уменьшилась. Он даже набрал несколько фунтов.

Рецепт

- *Hydrastis* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- *Carcinosin* 200C Plussing четные недели 16 недель

Внезапно его состояние резко ухудшилось, и он скончался от обширного кровотечения из желудка.

Самым примечательным в этом случае является то, что он прожил безбедно семь месяцев, хотя ему сказали, что он может продержаться всего неделю.

Матка

Рак матки с вторичными опухолями в легких

СЛУЧАЙ
97

В **ноябре 2007 года** 57-летняя женщина обратилась за лечением рака матки с вторичными опухолями в легких. Девять месяцев назад она жаловалась на одышку, которая

Быстро ухудшилось. Рентген грудной клетки показал плевральный выпот в легких. Операция удалила жидкость и применила порошок, чтобы предотвратить рецидив. Затем она прошла химиотерапию, затем полную гистерэктомию, затем еще химиотерапию, затем облучение.

История диабета и гипертонии в течение как минимум 15 лет. Ламинэктомия в 2001 году позвонков L3 и L4. В течение двух лет она жаловалась на небольшую лихорадку, озноб в животе, белые выделения из влагалища и была напугана, но диагноз так и не был поставлен.

После этих процедур одышка возобновилась - было обнаружено поражение в правом легком. У нее была сильная одышка; кашель при малейшей попытке говорить, колющая боль в правой части груди и пожизненная любовь к сладкому.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 200C Plussing нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 8 недель

Кашель и одышка немного уменьшились.

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 1M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Кали карбоникум* 30C Сухая доза каждое утро

Рецепт

- ▶ *Lycopodium* 10M Plussing нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Карцинозин* 1М плюс четные недели в течение 16 недель
- ▶ *Кали карбоникум* 30С Сухая доза каждое утро

КТ показало, что поражение легких стабильно, без улучшений и ухудшений.

Такое же предписание сохранялось еще год, и следующее КТ-сканирование показало то же самое: поражения легких были спокойными, метастазов не было.

Она продолжает оставаться стабильной в 2013 году, поражение легких присутствует, но не вызывает симптомов. Ее активность и уровень энергии приемлемы, хотя и не полностью такие, какими они были до постановки диагноза.

Для устранения колющих болей справа был добавлен *препарат Kali carbonicum*.

Метастатический рак яичников

СЛУЧАЙ 98 57-летняя женщина обратилась в **марте 2009 года** с историей рака. В бифуркации ее аорты была масса, давившая на мочеточник, поэтому был установлен стент, чтобы позволить моче

поток. Мочевина и креатинин были повышены, и она хотела снова начать химиотерапию.

Первым диагнозом в 2006 году был рак яичников, который хорошо поддавался хирургическому вмешательству и химиотерапии. В течение двух лет ее тест на антиген рака (СА) 125 и сканирования были нормальными, но в 2008 году появились вторичные опухоли, и химиотерапию назначили снова.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200С Плюс нечетные недели в течение 16 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 16 недель

Мочевина и креатинин пришли в норму; гемоглобин 8,6 г/дл, боль при глотании, она очень устала, у нее были затруднения с дефекацией, кровь в стуле и жжение в животе.

Рецепт

► *Natrum sulphuricum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Carcinosin* 200C Plussing четные недели в течение 16 недель

Все симптомы стихли. Уровень СА 125 все еще повышен до 42,8, но стабилен с начала приема Plussing. Чувствует себя хорошо.

Рецепт

► *Aurum muriaticum natronatum* 1M Плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

MPT показывает распространение на парааортальные узлы; тромбоз глубоких вен левой ноги с сильной болью и отеком.

Рецепт

► *Secale cornutum* 200C Плюс нечетные недели в течение 16 недель

► *Карцинозин* 1M плюс четные недели в течение 16 недель

Боль в ноге и отек значительно уменьшились. За это время метастазы поразили обе почки, у нее развилась почечная недостаточность, и она упала в обморок.

В течение последнего года, находясь на гомеопатическом лечении, она вела совершенно нормальную жизнь. Вопреки всем советам она отправилась в паломничества, ела и пила все, что предлагалось, живя в свое удовольствие. Она была чрезвычайно благодарна за роль этого лечения.

Рак эндометрия

случай 99 46-летняя женщина обратилась за лечением рака эндометрия 4 стадии в **декабре 2010 года**. Диагноз ей поставили в июне 2010 года с помощью ПЭТ-КТ, выявившего первичный неопластический рак .

sion в эндометрии. Металлический стент был установлен в дистальном отделе общего желчного протока, после чего была проведена химиотерапия и облучение. Оба вида лечения не подошли ей, и они были прекращены на полпути к назначенному сроку, когда она обратилась к гомеопатии.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200С Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 8 недель

Ее вздутый живот стал менее болезненным, боль уменьшилась, но тошнота и потеря аппетита сохранились.

Рецепт

- ▶ *Aurum muriaticum natronatum* 200С Плюс нечетные недели в течение 8 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 8 недель
- ▶ *Chelidonium* Ø 15 капель утром и вечером ежедневно

К концу вторых восьми недель у нее развилась острая боль в животе, и ее срочно доставили в больницу. Сканирование показало большую массу поджелудочной железы.

Рецепт

- ▶ *Ceanothus americanus* 200С Плюс нечетные недели в течение 12 недель
- ▶ *Carcinosin* 200С Plussing четные недели в течение 12 недель
- ▶ *Chelidonium* Ø 15 капель утром и вечером ежедневно

Она чувствовала себя достаточно комфортно, поэтому потенция обоих средств была повышена до 1М, продолжая то же чередование. Она стала чувствовать себя более комфортно, немного набрала вес из-за улучшения аппетита.

После девяти месяцев приема Plussing у нее развилась сильная диарея и рвота. *Arsenicum album* 30С, выпитый из чашки воды, не принес облегчения, поэтому ее снова госпитализировали, где она потеряла сознание и умерла.

Часть 3

Смягчение конца жизни

В определенный момент становится ясно, что излечение уже невозможно. Часто это происходит, когда происходит очередной рецидив болезни, которая уже была на поздней стадии.

Иногда это происходит, когда онкологические больницы мирового класса отправляют пациента домой после того, как ему проведено максимальное количество курсов химиотерапии, лучевой терапии и хирургического вмешательства.

В других случаях пациент решает, что лечение слишком сложно выдержать снова. На этой самой последней стадии мы рассматриваем все виды рака как одинаковые, больше не принимая во внимание первоначальный диагноз при выборе средств.

На этом этапе гомеопатия все еще может помочь, даже если вылечить или стабилизировать заболевание невозможно.

Средства, направленные на устранение основных жалоб, могут принести некоторое облегчение.

Часто симптомы утихают. В других случаях средства позволяют использовать меньшие дозы аллопатических лекарств и наркотиков, чтобы пациенты оставались в сознании, чувствовали себя комфортно и, возможно, меньше страдали запорами. Если им удастся поддерживать себя таким образом в течение пары месяцев, то гомеопатия обычно смягчает конец жизни.

Многие семьи считают это невероятным даром, поскольку их близкий человек остается активным участником событий до тех пор, пока не угаснет, часто просыпаясь до конца жизни.

В этих следующих случаях назначаемые средства не указаны. «Рецепта» нет. Квалифицированный врач или лицо, осуществляющее уход, должны давать лекарство, необходимое в данный момент, меняя его по мере необходимости. Более низкие потенции часто показывают более быструю реакцию, но сначала используйте имеющуюся потенцию, а затем выбирайте разные потенции для каждой смены средства, когда это возможно. Теперь средства можно принимать в сухих дозах или смешивать в чашке воды и пить маленькими глотками. Если пациент больше не может глотать или в основном спит, несколько сухих гранул или капель можно поместить между деснами и зубами (оттянув губу).

Часто лекарство нужно повторять каждые 10-30 минут, пока не наступит облегчение. Если через несколько часов улучшения не наблюдается, рецепт следует изменить.

Веретенноклеточная карцинома

СЛУЧАЙ 100 Женщина, 23 года, с веретенноклеточной карциномой щек и горла, 4 стадия, после «излечения» от неуточненного детского рака. При первом осмотре у нее были множественные крупные видимые опухоли на шее. Ей сделали трахеотомию и установили зонд для кормления, и она все еще получала химиотерапию. Она могла только шептать - в нескольких словах, была высокой и худой, почти истощенной, но дружелюбной и полной надежд. Она любила свежий воздух и бывать на природе.

Она принимала дозы Plussing в течение двух недель, затем неделю проходила курс химиотерапии, а затем еще две недели принимала Plussing.

После четырех недель приема Plussing Doses, вместо того, чтобы ее мать сделала реальный звонок, она позвонила нам сама твердым голосом, сказав, что опухоли на шее были «крошечными», она ела твердую пищу, чувствовала себя отлично и больше не боялась. Она сообщила, что голодна, и что еда была вкусной! Она все еще была ограничена определенными текстурами, и большинство жидкостей все еще выходило из ее носа. Теперь она изучала здоровую диету и планировала пойти в место, где обучают такому приготовлению пищи.

Plussing продолжался (с другим рецептом) еще пять недель с перерывом на химиотерапию в середине недели. Несколько дней спустя она сообщает о боли в челюсти с еще большим отеком. Боль в левом глазу, которая распространяется от виска к челюсти, глубже в щеку. Отек и скованность прерывистые, с усиленной концентрацией ацетоминофена единственное, что она принимает от боли. Несмотря на боль, глотание продолжает улучшаться, так что она может проглатывать жидкости, не задыхаясь, если она держит подбородок в правильном положении. Ее самая большая жалоба - скованность в челюсти, за которой следует усталость. Когда боль усиливается, она «чувствует, как будто я скольжу». Она очень устает после хороших и напряженных дней, которые у нее часто бывают, и хочет всегда быть энергичной.

Через десять недель после первой консультации химиотерапию меняют, затем отменяют. Боль усиливается, анализы крови ухудшаются, и делают переливание.

Тем не менее, опухоли шеи изменчивы, но опухоль в задней части горла около язычка хуже, свисает вниз, грубая и желтоватая. Язык увеличен. Все еще открывает рот и ест — набрала 2-3 фунта. Теперь между языком и нёбом скопилось большое количество липкой белой слизи. Она думает, что она идет из горла. Она кашляет до рвоты, чтобы выгнать ее, но говорит, что средство помогает избавиться от слизи.

Поднимается температура до 104, ей дают антибиотики. Боль переместилась из челюсти в ухо и заставляет ее вставлять туда палец. Теперь ей приходится использовать наркотический пластырь от боли.

Боль в ухе уменьшается от растирания и прикосновения. Ее госпитализировали из-за целлюлита и назначили внутривенные антибиотики от стрептококковой инфекции. Она устала и вялая из-за наркотических обезболивающих, которые давали в больнице, а также напугана и встревожена. Она все еще борется и планирует свой сад к весне.

От метода «плюссинг» отказываются в пользу метода «сплит-доз», и инфекция отступает достаточно, чтобы ее можно было выписать из больницы домой.

Через несколько дней она мирно скончалась в окружении друзей.

Рак легких

СЛУЧАЙ 101

88-летний мужчина с раком легких, который был самым ответственным зрителем своей семьи, всегда обеспечивал их, никогда не позволяя себе никаких удовольствий, просто работал

постоянно поддерживая процветание дома. Даже когда ему поставили диагноз неизлечимой болезни, он был встревожен и обеспокоен, поскольку все меньше мог что-то делать для других. Семья была в полном шоке, когда через несколько дней после того, как он начал принимать гомеопатическое средство, он пошел и купил себе Walkman (до iPod), а затем каждый день часами сидел на крыльце, слушая классическую музыку. Он провел большую часть своих оставшихся дней, тихо наслаждаясь музыкой и наблюдая за прохожими, пока он угасал.

Плоскоклеточная карцинома головы и шеи

СЛУЧАЙ 102

Женщина, которой было чуть за 80, с энтузиазмом принимала все возможные западные вмешательства: хирургию, облучение, химиотерапию, еще больше облучения, «паллиативную химиотерапию», митинг -

после каждого и возобновляя как можно большую часть своего образа жизни, пока, наконец, химиотерапия не сделала ее слишком больной, чтобы продолжать. Она не была послушной гомеопатической пациенткой во время западного лечения, чувствуя, что оно отнимает слишком много времени, которое она могла бы посвятить своим делам. После того, как западное лечение было прекращено, она согласилась снова попробовать гомеопатию. В это время семье объяснили, что мы можем только надеяться помочь переходу от этой жизни. Вот комментарий дочери:

«Моя мама умерла несколько ночей назад около 3:00 утра. Это была самая мягкая и спокойная смерть, которую только можно себе представить. Мы начали слышать эти хрипы в ее груди несколько дней назад и не очень хорошо себя чувствовали. Она была так поглощена жизнью, знаете ли, до самого конца. В любом случае, мы только накануне отправили ее в хоспис. Она была буквально в хосписе один день, и небольшая доза морфина помогла ей дышать, и она сказала мне: «Пожалуйста, позвони детям, чтобы они смогли увидеть меня». Она уснула где-то в середине дня. Семья приехала тем вечером, и хотя она знала, что они приедут, она больше не проснулась. Так что большое спасибо за всю вашу помощь; все это время все было так, как вы сказали, гомеопатия точно помогла. Вы говорили мне, что так и будет, и так оно и было. Я так благодарна, это мое послание».

Чаще всего Использованные средства правовой защиты

Часто используемые средства для лечения рака делятся на три - категории: раковые нозоды, специфичные для рака и органоспецифичные. Сложная задача назначения облегчается выбором из этих средств с известной эффективностью. Все следующие средства готовятся в соответствии с указаниями Гомеопатической фармакопеи США (обозначаются как HPUS). Они являются законными, одобрены FDA и доступны без рецепта или по усмотрению аптек. Содержание каждого из них получено в основном из растительных, животных или минеральных веществ и может включать больные ткани или невесомые вещества, такие как рентгеновские лучи. Правила и доступность могут отличаться в других странах.

Materia medica (конкретная информация о каждом средстве), которая следует далее, делает акцент на более конкретных «средствах от рака» по сравнению с более известными средствами, называемыми полихрестами. Часто полихресты используются при лечении рака, но их основные симптомы общеизвестны, и нет необходимости повторять их здесь.

Раковые нозоды

Нозоды считаются более глубоко действующими, чем специфические для органа или рака препараты. Известно, что они влияют на наследственную восприимчивость или предрасположенность к определенным заболеваниям. Почти во всех случаях рака назначается один из следующих двух препаратов, хотя опытные гомеопаты могут изредка указывать один из других.

Наиболее часто используемое средство, *Carcinosin*, готовят из ткани опухоли груди, а иногда, в зависимости от аптеки, из клеток некоторых других видов рака (например, легких). Этот стандартный препарат используется во всех ситуациях. Не рекомендуется использовать конкретный

Карцинозин , изготовленный из диагностированного типа рака. Все препараты, похоже, работают и могут быть заменены в необычных обстоятельствах, когда стандартный препарат недоступен. Недавно некоторые препараты *Карцинозина* стали доступны для многих различных видов рака (более 100!). Их следует избегать.

Карцинозин, наиболее часто назначаемое средство для лечения рака, впервые был известен благодаря двум британским врачам, Дж. Комптону Бернетту и Джону Генри Кларку. Затем доктор Дональд Фубистер продолжил работу с раком, в основном леча детей. Их работа вдохновила на признание необычайной лечебной силы этого средства. Это нозод по умолчанию, когда другой конкретно не показан, и предпочтительный, когда в семейном анамнезе есть случаи рака.

Scirrhinum, второй по частоте назначения нозод, готовится из раковой ткани печени. Доктор Марджери Блэки (один из моих учителей) установила эффективность этого средства, когда пораженная часть (железа, опухоль или уплотнение) каменисто-твердая. Рак груди, легких, печени, прямой кишки и простаты часто демонстрирует такую твердость. Он также может быть показан при раке матки или лейкемии.

Кроме того, *Scirrhinum* часто выбирают вместо *Carcinosinum* , если у пациента наблюдается множество симптомов *Phosphorus* (конституциональных), но органное средство не является *Phosphorus*.

Гомеопат может перейти на *Scirrhinum* , если пациент недостаточно хорошо реагирует на *Carcinosin*. Если поражение или пораженный орган становится твердым или вовлекается печень, то переход также следует рассмотреть. Можно также перейти на *Carcinosin* , когда *Scirrhinum* не работает достаточно хорошо. Никогда не допускается чередование нозодов туда и обратно.

Эти два универсальных средства от рака назначаются только в «четные» недели или месяцы протокола Plussing. Выбранный нозод всегда чередуется с органоспецифическим или конституционным средством для борьбы с существующим раком, для предотвращения рецидива или для паллиативной помощи в ситуациях, которые не поддаются лечению. Нозоды часто используются без чередования для профилактики рака, когда известна семейная история заболевания, но до постановки диагноза.

Специфика рака

Дополнительные средства, которые часто используются при многих случаях рака, — это *Conium*, *Thuja*, *Arsenicum album*, *Aurum arsenicum* и *Sanguinaria*.

Conium, как и *Scirrhinum*, также показан при *каменистых твердых* опухолях или железах и доказал свою неоценимую ценность при раке *пищевода, груди, желудка, печени, простаты, спинного мозга и головного мозга*, а также *средостения, брюшины или сальника*, даже если твердость не имеет значения. Хотя твердость является типичным показателем для выбора *Conium*, она не может быть единственной причиной выбора. Он также очень полезен при любом раке, который является чрезвычайно агрессивным. В последнее время *Hydrastis* также все чаще используется в этих чрезвычайно агрессивных ситуациях.

Туя обычно вызывает появление различных грибковых и кожных новообразований (включая бородавки, родинки, кожные наросты, разрастания в виде цветной капусты...), поэтому она доказала свою эффективность при раковых опухолях, особенно в *желудке, толстой кишке, прямой кишке, мочевом пузыре, яичниках и матке*.

Arsenicum album — одно из главных средств для лечения рака. Важность этого средства указана в *Repertory и Materia Medica Берике*, где утверждается, что *Arsenicum album* «поддерживает систему в состоянии стресса злокачественности независимо от локализации». Это единственное средство в *Materia medica*, которое является полихрестом, глубоким конституционным, а также острым средством. Помимо его целебных свойств на ранних стадиях, большинство случаев запущенного рака при систематическом гомеопатическом лечении в какой-то момент потребуют *Arsenicum album* для облегчения боли или дискомфорта, особенно на терминальной стадии.

Aurum arsenicum в первую очередь известен своей полезностью в лечении сердечных заболеваний. При раке он охватывает часто наблюдаемые симптомы ревматических поражений и опухание суставов, отек с сосудистым наполнением, боль по всему телу, особенно в затылке, ухудшающуюся от холодных сквозняков, боль за грудиной и затвердевшую и увеличенную печень. Чаще всего некоторые из распространенных психических симптомов депрессии, раздражительности, самоупрека будут наблюдаться с желанием свежего воздуха.

Sanguinaria — одно из самых редко назначаемых средств. Его ценность велика при различных кровотечениях, которые он помогает контролировать, чаще всего при раке прямой и толстой кишки. Он может облегчить боли в любом месте, независимо от стороны, действуя как противовоспалительное средство. Он также помогает при проблемах с пищеварением, диспепсии, метеоризме и сильной рвоте.

Органоспецифичность

Клинический опыт и гомеопатические испытания учат нас, что определенные гомеопатические средства имеют сильное сродство с определенным органом или первичным местом рака. Они успешно использовались в своих «специфических» ролях. Кроме того, включены некоторые полезные средства, которые не совсем специфичны для определенных органов, наряду с теми, которые наиболее известны для паллиативного лечения в конце жизни. Эти «органоспецифичные» средства следуют в алфавитном порядке.

Прувинги — это метод определения лечебных свойств большинства гомеопатических средств. Здоровый человек принимает небольшие дозы лекарственного вещества, а затем регистрирует симптомы и реакции.

Aconitum для всего острого и тяжелого недавнего происхождения: боль, лихорадка, рвота, головная боль, свежая красная кровь, травма или шок. Одно из небольшой группы средств для состояния страха или симптомов, возникающих из страха, вместе с *Opium*, *Phosphorus* и *Veratrum album*.

Aethusa cynapium часто используется при состояниях, связанных с мозгом, с характерными признаками отворачивания и ухудшения от молока, потери сознания после припадка с закатыванием глаз, что особенно необычно. Также могут быть головные боли и плохая память.

Aloe socotrina при раке толстой и прямой кишки. Показательные - симптомы: кровотечение из прямой кишки и/или кровь в стуле; стул желеобразный или смешанный со слизью, возможно, с кровью; режущие или жгучие боли. Сильное давление и чувство вздутия в животе, спазмы — часто

от газов; но пациент не уверен, выйдут ли газы или стул. Частые испражнения, не всегда может вовремя дойти до туалета; геморрой, жжение при котором уменьшается от брызг холодной воды, ухудшается от горячей. Хуже рано утром, от тепла; лучше от прохладного воздуха.

Apis — отек и припухлость, особенно конечностей, часто на поздней стадии заболевания, ярко-красное окрашивание кожи, отсутствие жажды.

Апоцину́м, асцит, отек, задержка жидкости, плевральный выпот, подавленное мочеиспускание.

Argentum nitricum, крайняя любовь к сладкому заставляет вспомнить это средство, но оно должно включать дополнительные симптомы, чтобы быть полезным. Тревожное ожидание, часто перед приемом у онколога или тестами, а также раком пищевода, гортани, легких и голосовых связок.

Arsenicum bromatum при раке кожи, обычно используется при плоскоклеточном и базальноклеточном раке, меланоме, воздействии радиации на кожу, а также при наличии симптомов сильного покраснения или жжения, изъязвления, но без инфекции.

Arsenicum iodatum при инфицированных поражениях кожи, приводящих к отторжению некроза в месте опухоли или вокруг него, а также когда кожная инфекция становится системной, с изменением общего количества лейкоцитов, лейкоцитарной формулы и скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Кроме того, *Arsenicum iodatum* можно назначать в сочетании с другими противораковыми средствами при инфекциях мочевыводящих путей, абсцессах, тяжело инфицированных легких и т. д. В этих случаях предпочтительная потенция — 6X, назначаемая несколько раз в день в течение нескольких недель. Это фантастический антисептик для борьбы с инфекцией, если использовать его в низких потенциях для лечения септицемии, некроза и гангрены.

Aurum muriaticum чаще всего предпочитают при раке полости рта, в первую очередь раковых язвах на внутренней стороне щек или на языке и небе. Язвы имеют вывернутые края, уплотненное основание, с подчелюстным/шейным лимфаденитом; также может быть избыточное выделение слюны

вания и неприятный запах. Это средство также оказалось полезным для некоторых женщин, которые подверглись сексуальному насилию.

Aurum muriaticum natronatum при раке матки, яичников и шейки матки. Основные симптомы — изъязвления и уплотнения. Опухоли матки, как доброкачественные фибромиомы, так и злокачественные опухоли, а также уплотнения яичников. Опухоли матки могут быть настолько большими, что заполняют всю тазовую полость, затрудняя функцию мочевого пузыря и кишечника. Также могут быть пролапс, бели, водянка яичников и оссифицированная матка.

Кроме того, *Aurum* и его соли играют роль в лечении различных злокачественных новообразований: костей (*Aur*, *Aur-ar*, *Aur-i*, *Aur-mn*); носовые ходы (*Aur*, *Aur-m*); горло (*Aur*); рак яичка (*Aur*), кожи (*Aur*, *Aur-ar*), раковые язвы (*Aur*, *Aur-mn*, *Aur-s*;) и карцинома мочевого пузыря (*Aur-ar*).

Baryta iodata при заболеваниях желез, лимфатической и эндокринной систем. И *Baryta*, и *Iodium* имеют сродство к этим областям, что делает это средство очень полезным. Уплотнение желез, особенно миндалин и молочных желез (увядшие). Рак горла, глотки. Рак поджелудочной железы (основное средство, наряду с *Hydrastis*, *Ceanothus americanus* и *Cadmium sulphuratum*) Опухоли мозга, астроцитомы, ангиомы и глиомы.

Bellis perennis — превосходное средство от поражений мозга, а также от травматических повреждений головы. Оно бесценно до и после операции, ускоряя заживление и уменьшая боль. Перед операцией оно успокаивает пациента и уменьшает панику. До и после операции его часто используют вместе с *Arnica*.

Ceanothus americanus при раке селезенки и поджелудочной железы. Яркими симптомами являются увеличение селезенки и боль, которая усиливается в положении лежа на левом боку или при движении. Использование этого средства излечило множество случаев кист поджелудочной железы, камней поджелудочной железы и рака поджелудочной железы, который является одним из самых трудноизлечимых видов рака.

Chelidonium при раке печени и желчного пузыря - как первичных, так и вторичных отложениях. Боль усиливается, когда лежишь на правом боку. Тошнота, с рвотой или без нее, лучше от приема небольшого количества пищи или от

горячая вода; моча с ярко выраженным цветом и стул цвета глины. Это средство можно принимать в виде настойки как общее тонизирующее средство для поддержки печени или в Plussing Doces, если есть фактическое поражение.

Crotalus horridus (см. *Lachesis*).

Euphorbium officinarum при заболеваниях кожи и костей, включая саркомы, базальноклеточные карциномы, гангрену и рожистое воспаление. Показания: жгучие боли, облегчающиеся от холода (в отличие от *Arsenicum album*) , а также боли в костях, облегчающиеся от движения и холода (в отличие от *Rhus toxico dendron*).

Hekla lava при раке костей и крови. *Hekla lava* — основное средство при раке (как первичном, так и вторичном) костей: саркоме , остеокластоме, миеломе, саркоме Юинга и других костных опухолях. Оно также бесценно при острых и хронических миелоидных лейкозах. Практикующий врач часто должен рассмотреть *Symphytum* и здесь.

Hippozaeninum, «новое» средство, полезное при многих симптомах инфекции, особенно рака на поздней стадии СПИДа.

Hydrastis при раке желудка, поджелудочной железы и верхнего отдела кишечника. Это средство также используется при раковых поражениях брыжеечных желез и слизистых оболочек в целом, включая легкие и пищевод. За последние несколько лет мы увеличили назначение этого средства, используя его больше при любом раке брюшной полости. Результаты (не только для этого средства) намного лучше при использовании при раке выше диафрагмы, чем ниже. Характеристики этого средства включают желтые , густые, тягучие выделения, вздутие живота, обильное потоотделение, крайнюю слабость и сильную боль.

Лодий бесценен для лечения узлов щитовидной железы и злокачественных - новообразований. Обычно пациенты выглядят истощенными, хотя едят огромное количество пищи, будучи обманчиво худыми (гипертиреоз). Пациенты обычно горячие.

соли кали имеют утренние ухудшения, слабость и бессилие и принимаются здесь как группа. На терминальных стадиях раковые боли реагируют на *Kali carbonicum* или *Kali bichromicum*, психическая раздражительность — на *Kali carbonicum* и *Kali iodatum*.

Lachesis и **Crotalus horridus** при раке матки, яичников и шейки матки. Психически пациент более болтлив, агрессивен и требователен, с обостренным воображением. Эти средства также имеют сильное сродство с областью горла и кровью. При раке в этих областях, особенно когда включены симптомы крови, средства из змей особенно полезны.

Lapis albus при раке легких и груди. Могут быть жгучие и колющие боли в области молочных желез, а также поражения соединительной ткани вокруг желез.

Lycopodium при раке легких. Обычно это средство показано, когда у пациента наблюдается конституциональная картина, хотя часто оно показано как при первичных, так и при вторичных отложениях в легких, при раке печени, толстой кишки и простаты. Симптомы, как правило, правосторонние (это не является обязательным условием для использования этого средства), часто наблюдается ухудшение в конце дня или ранним вечером (с 16:00 до 20:00) и пристрастие к сладкому.

Medorrhinum — еще один полезный нозод, который можно использовать в качестве интеркуррентного средства, если он соответствует конституции.

Nitricum acidum при раке прямой кишки. Другие раковые области, которым помогает это средство, — это слизисто-кожные соединения, такие как рот, губы, анальный край, уретра, влагалище и края вульвы. Симптомами являются язвенные высыпания и колющие боли, похожие на иголки.

Ornithogalum при раке желудка и толстой кишки, применяется в Plussing Doses. Симптомы: постоянная боль в желудке, которая усиливается во время еды; вздутие; зловонная отрыжка, рвота кофейной гущей.

Phosphorus играет особую роль в лечении раковых опухолей или язв, которые кровоточат, или для остановки любого внутреннего или внешнего кровотечения. Он часто требуется при раке горла или женских органов. При кровотечениях его часто следует сравнивать с *Sanguinaria*.

Phytolacca при раке груди и околоушной железы. Имеет большое сродство к железам, будь то простой лимфаденит, вызванный инфекцией или метастатический. Пораженные железы отекают и уплотняются. Также полезен при лимфоме Ходжкина и неходжкинских лимфомах.

Plumbum iodatum при раке мозга, в частности астроцитоме и глиоме. Он особенно полезен при любых объемных поражениях мозга, как первичных, так и вторичных, с особой ценностью, когда раковые поражения возникают из нервных клеток. Он предпочтительнее *Plumbum metallicum*, поскольку йодидный компонент полезен при новообразованиях и инфекциях.

Pulsatilla nigricans и *Sepia* при раке груди, матки, яичников и шейки матки. Каждое из этих средств известно своим действием на женские - репродуктивные органы, но при обследовании пациента часто выявляется сильная конституциональная картина. Один специфический и менее известный симптом, указывающий на *Pulsatilla*, — это полезность для освобождения от застрявших газов, которые не могут выйти.

Radium bromatum можно использовать при базальноклеточной карциноме, но основное применение — предотвращение побочных эффектов облучения. Его можно давать как во время, так и после облучения, обычно в дозе 30С ежедневно в течение всего периода плюс еще два месяца. Его эффективность намного превосходит эффективность потенцированного **рентгеновского излучения** для этой цели.

Sabal serrulata при раке простаты. Симптомы: увеличение простаты и потеря сексуального желания, постоянные позывы к мочеиспусканию, особенно ночью, с трудностями начала мочеиспускания, а затем ощущением, что оно никогда не заканчивается. Он полезен в качестве профилактического средства в разделенных дозах, когда уровень ПСА повышен, но нет других признаков заболевания, или для лечения при использовании в плюсовых дозах в установленных случаях.

Scrophularia nodosa в первую очередь при раке груди, средостения или лимфоме Ходжкина. Железистые области, как правило, мягкие, эластичные и губчатые; у пациента может быть семейный анамнез туберкулеза.

Сепия: см. Пульсатилла.

Strontium carbonicum чрезвычайно эффективен при инфицированных состояниях рака костей. Применять при туберкулезной конституции. Отлично подходит при злокачественных новообразованиях костей, как первичных, так и вторичных, и хроническом остеомиелите.

Symphytum при саркоме и различных лейкомиях. Поскольку он известен почти чудесным исцелением переломов, мы попробовали его при лейкомиях, поскольку патология исходит из костного мозга. Теперь были сотни успешных случаев. Он оказался ценным даже при острой лейкомии. Он также полезен при потере костной массы из-за остеопороза или метастатического заболевания. Он особенно показан, когда в анамнезе есть боли в суставах и воспаление.

Terebinthina oleum: Все кондиломатозные, похожие на цветную капусту злокачественные новообразования мочевого пузыря. Хотя его обычно используют как паллиативное средство при симптомах мочевыводящих путей, это средство следует всегда иметь в виду при раке мочевого пузыря. Симптомы: кровь в моче (гематурия), жгучие боли с затрудненным, скудным, болезненным мочеиспусканием (цистит и странгурия).

Tuberculinum bovinum используется вместо *Carcinosin* при наличии в анамнезе тяжелого туберкулеза или серьезных конституциональных показаний .

Приведенный выше список лишь в минимальной степени описывает симптомы, необходимые для назначения конкретного средства, уделяя особое внимание симптомам, связанным с раком. Дополнительную информацию можно найти в любом количестве гомеопатических справочных текстов. Для гомеопатов-практиков предоставляется достаточно информации, чтобы решить, что исследовать дальше, но ее недостаточно для самостоятельного лечения, которое мы не рекомендуем.

Средства паллиативного облегчения в конце жизни

Ниже перечислены наиболее часто используемые паллиативные средства для конца жизни. В описаниях подчеркиваются острые аспекты использования/паллиативности каждого из них, которые не были упомянуты в разделе «Орган-специфические».

Aconitum: Внезапные, продолжительные стреляющие боли, сопровождающиеся психическим и физическим беспокойством. Симптомы обычно усиливаются ночью или в душных помещениях. Невралгические боли облегчаются от тепла. Страх смерти настолько сильный, что может перерасти в паническую атаку, часто в полночь или позже.

Arsenicum album: уже упоминалось, что это средство можно использовать во всех представленных категориях средств. Вероятно, это наиболее часто назначаемое паллиативное средство от рака, и почти все пациенты нуждаются в нем в какой-то момент во время лечения. Ключевым симптомом является крайнее беспокойство на всех уровнях, умственное (от страха и тревоги) или физическое с истощением и слабостью. Никакого облегчения невозможно, поэтому пациент ходит из одной комнаты в другую или складывает подушки просто так, а затем немедленно ищет другое место. Жгучие боли, которые улучшаются от тепла, сухость во рту с жаждой, которая не утихает от глотков жидкости. Человек, нуждающийся в этом средстве, находится в критическом состоянии, давая указания окружающим, пока он может говорить. Опекун может захотеть уйти, но этот пациент боится остаться один, смерти и приема лекарств.

Aurum metallicum: чаще всего используется при невыносимых болях в костях, обычно связанных с депрессией, усиливающихся ночью и от холода, хотя уменьшающихся на свежем воздухе и в тепле.

Cadmium sulphuratum: Отлично помогает при постоянной, жгучей рвоте - черным веществом, похожим на кофейную гущу. Большинство болей, требующих этого средства, исходят от желудка. Для облегчения может потребоваться повторение дозы каждые 10-30 минут. (Часто используется во время химиотерапии).

Chelidonium: Рак поражает печень, вызывая боли.

Euphorbium: Интенсивные, жгучие боли при раке, лучше от холодных компрессов, но не от прохладного воздуха. Беспокойство, похожее на *Arsenicum album*, но отличающееся улучшением от холода.

Гидрастис: На терминальной стадии заболевания, часто, когда никакие другие средства не помогают, запор может сопровождаться сильной болью и упадком сил.

Magnesiumphosphoricum: Судороги или мышечные спазмы, лучше от давления, например, сгибаясь пополам. Боль распространяется и лучше от тепла. Обычно требует частого повторения дозы.

Nux vomica: Ключевой симптом этого средства — «хочет, но не может», обычно связанный с рвотой. Тошнота сильная, и рвота приносит облегчение. Пациент придирается к лицам, осуществляющим уход, и посетителям, раздражителен и нервозен, гиперчувствителен к свету, шуму и запахам и плохо переносит боль. Жалобы усиливаются утром и после еды. Дневной сон и теплые аппликации облегчают боли.

Опиум: (Напоминание, это гомеопатически приготовленное вещество, доступное только в Европе и Индии, а не в Соединенных Штатах.) Пациенту, нуждающемуся в этом средстве, хуже от тепла и сна, лучше от свежего воздуха, холодных компрессов, небольших порций пищи и ходьбы. Полезно при вздутии живота из-за задержки жидкости. Депрессия от болей, хотя большинство жалоб безболезненны. Также полезно при упорном запоре, обычном результате приема наркотических обезболивающих. Пациент не реагирует, почти ступорозный. В более высоких потенциях это может пробудить пациента от милосердной комы, предшествующей смерти.

Plumbum iodatum: в первую очередь при болях, вызванных неврологическими или внутричерепными опухольями, которые могут быть в позвоночнике, головном мозге, щитовидной железе или гипофизе.

Общие указания по дозировке этих средств в период приближения конца жизни приведены в главе: Облегчение конца жизни.

Из перечисленных средств наиболее часто для снятия боли используются: *Aconitum*, *Arsenicum album*, *Aurum metallicum*, *Cadmium sulphuratum*, *Chelidonium* (в потенции и/или в виде материнской настойки), *Euphorbium*, *Hydrastis*, *Magnesiumphosphoricum*, *Nux vomica*, *Ornithogalum* (в виде материнской настойки), *Opium* и *Plumbum iodatum*.

Инструкции по Plussing

Корни этого протокола находятся в работе Ганемана с потенциями LM. Для назначения LM доза выбранного средства растворяется в воде, и ложка принимается по повторяющемуся графику. Раствор перемешивается между дозами. Plussing развился из этого метода, который (как упоминалось ранее) минимизирует риск обострений, одновременно усиливая воздействие рецепта.

При использовании метода Plussing пациенту дается «рецепт» смешивания сухих гранул лекарственного средства с определенным количеством воды. (Выбор воды обсуждается в разделе «Вопросы и ответы»).

В частности, три гранулы (или количество, которое ваш врач называет одной дозой) растворяются в 11 чайных ложках родниковой воды в одобренной бутылке.

Добавляется небольшое количество воды, чтобы облегчить фактическую дозировку. Примерно каждые 10 минут пациент принимает чайную ложку или глоток. Между каждой дозой пациент осторожно размешивает или полоскает смесь.

Таким образом принимают десять чайных ложек в течение примерно полутора часов.

Оставшаяся сумма переносится на следующий день.

После завершения приема десяти дневных доз или непосредственно перед началом приема на следующий день к исходной смеси добавляют еще десять чайных ложек свежей воды.

Никаких дополнительных гранул препарата не добавляется.

Это продолжается в течение семи дней.

В последний день принимается одиннадцатая чайная ложка.

На восьмой день процедура начинается снова с альтернативным средством, свежей водой и новой бутылкой.

Каждая неделя начинается со свежей воды, разовой дозы лечебных гранул и неиспользованной бутылки.

Особенно важно использовать новый флакон при любой смене лекарственного средства или его потенции.

Лекарства всегда назначаются с органоспецифическим или конституционным средством в первую и все «нечетные» недели, за которым следует указанный нозод на второй неделе и далее во все «четные» недели. Хотя это может показаться сложным на первый взгляд, через неделю или две подготовка и прием доз становятся второй натурой. Нет необходимости следовать указаниям настолько точно, чтобы нужна была химическая лаборатория, а время между дозами может варьироваться от 10 до 20 минут (но не менее десяти).

Все десять доз необходимо принять последовательно, их нельзя делить на пять утром и пять вечером, однако их можно принимать в разное время каждый день в зависимости от графика или предпочтений.

Важно, чтобы пациент старался поддерживать как можно более обычный график жизни, а не отказывался от всех удовольствий, придерживаясь строгого протокола.

Пока есть хоть какой-то «рецепт» Plussing, который можно перенести на следующий день, сделать это неправильно практически невозможно.

Как только у пациента в течение достаточно долгого времени не будет выявлено признаков рака, что будет подтверждено западными тестами, курс «Плюссинг» будет остановлен и переведен на дробные дозы.

Этот метод разделенной дозы подразумевает прием трех гранул одного лекарства утром, днем, вечером и ночью либо один день в неделю, либо через неделю, либо через месяц. Опять же, принимаемое лекарство обычно чередуется с нозодом.

Лечение никогда не начинается с метода дробной дозы, даже если пациент поступает к нам, казалось бы, без рака после завершения аллопатического лечения.

Гомеопатия с Традиционная медицина

Почти каждый пациент с раком, обращающийся за гомеопатическим лечением, приходит с диагнозом, основанным на западном тестировании. Важность этих диагностических процедур невозможно переоценить.

Сканирование, биопсия и анализ крови дают врачу-гомеопату информацию для направления лечения, а также надежный метод мониторинга - результатов. Эти тесты не только информируют врача-гомеопата о состоянии пациента, но и держат онкологов в курсе прогресса. Если пациент одновременно проходит западное лечение, эта информация становится еще более важной.

После постановки диагноза пациент сталкивается с выбором лечения. Как правило, если рак не находится на самой ранней стадии, если предлагается операция, мы рекомендуем ее. Наши тела хорошо заживают после большинства операций на ранней стадии, особенно с помощью гомеопатических средств, принимаемых непосредственно перед операцией и в течение нескольких дней после нее. Удаление начальных раковых поражений дает гомеопатии «фору» в предотвращении дальнейшего роста рака без необходимости удалять то, что присутствует в данный момент.

Неотложное назначение хирургических препаратов

Общие указания по использованию гомеопатических средств для ускорения заживления, уменьшения кровотечения, боли и эффекта анестезии следующие:

Арника три раза в день в течение одного-двух дней до операции и, по возможности, непосредственно перед процедурой.

Сразу после операции *Arnica* чередуется с *Bellis perennis*, каждый из них 3 раза в день в течение трех дней. *Bellis* обычно необходим только после операций, которые являются глубоко внутренними, а не местными иссечениями.

Часто бывает полезно иметь под рукой препарат *Phosphorus*, если требуется помощь при выходе из наркоза.

Эти три можно принимать в концентрации 30С или 200С в зависимости от того, что предлагает ваш врач или что доступно. Хотя эти средства чаще всего назначают из-за их известных острых действий, предпочтительнее, чтобы врач сделал выбор средства, дозировки и потенции.

Многие пациенты выбирают следовать советам онкологов и принимать химиотерапию вместе с гомеопатией. Понятно, что пациенты предпочитают использовать более одного метода лечения. В более ранние годы гомеопатическая дозировка была ограничена днями, когда не проводилась химиотерапия. В настоящее время Plussing разрешено продолжать без перерывов. Пациентам стало легче следовать ежедневному режиму, и некоторая польза все еще заметна, хотя очевидно, что химиотерапевтические агенты снижают эффективность гомеопатического назначения.

То же самое теперь применимо к облучению — Plussing можно принимать напрямую. Этот метод больше всего подрывает гомеопатические рецепты, но они все равно приносят пользу. Когда это возможно, мы призываем пациентов не прибегать к лучевой терапии, за исключением очень поздних стадий, когда она обеспечивает значительный контроль боли. Средства, используемые как перорально, так и в форме мази, приносят огромную пользу в предотвращении боли и дискомфорта от ожогов кожи.

При обработке кожи во время облучения важно выяснить у рентгенолога, какие ингредиенты не допускаются в состав местных препаратов, поскольку некоторые из них могут мешать лечению.

В основном лучше всего подходят продукты, которые продаются в магазинах органических/здоровых продуктов. Чтобы предотвратить ожоги от радиации, лучше всего обработать пораженный участок средством *Urtica urens* крем до и после каждой процедуры. Многие также применяют Алоэ *Bepa* попеременно, используя каждый продукт 2-3 раза в день. Они помогают коже сохранять мягкость и справляться с жжением, когда оно возникает. Если этого недостаточно, *Cantharis* 30С можно принимать ежедневно, или несколько гранул *Cantharis* можно растворить в стакане воды и нанести с помощью марлевой повязки. Если крем *Urtica urens* недоступен, на рынке есть несколько других натуральных кремов от ожогов.

Информацию о применении конституциональных назначений при раке см. в разделе: Указания для гомеопатов.

Профилактика и рецидивы

Члены семей больных раком часто беспокоятся о себе, гадая, не поразит ли их эта болезнь. Таким пациентам, у которых нет никаких признаков заболевания, мы часто назначаем *Carcinosin 200C* в виде одной дробной дозы каждые три или четыре месяца в качестве профилактики. Конечно, нет определенного подтверждения этих результатов. Чаще всего пациенты обращаются за гомеопатическим лечением, когда у них случается рецидив ранее вылеченного рака. В этой области результаты поддаются проверке. Многие примеры из предыдущих случаев демонстрируют, как Plussing используется для лечения рецидива, а затем предотвращает возникновение другого.

Статистика

Статистика, представленная ниже, содержит только жизнеспособные случаи, пролеченные методом Plussing с 1993 года. Жизнеспособные случаи исключают те, где не было ожиданий излечения на момент начала гомеопатического лечения. Показатель успешности означает, что пациент был свободен от рака в течение как минимум пяти лет, даже если лечение продолжалось после того, как отчеты о патологии были ясны. Во многих из этих видов рака показатели успешности были бы выше, если бы пациенты обращались за гомеопатическим лечением во время постановки диагноза, независимо от стадии. Другие факторы, которые следует учитывать при рассмотрении этих цифр, заключаются в том, что многие пациенты не обращаются к гомеопатии, пока не исчерпают все традиционные западные методы лечения. Это значительно затрудняет лечение, поскольку их ситуации более устоявшиеся и продвинутые . Кроме того, многие пациенты не полностью соблюдают предписанный протокол, и это препятствует результатам.

	Количество жизнеспособ ных случаев	Количеств о успехов	Успех Ставка
Рак костей	203	165	81%
Рак мозга	435	361	83%
Рак молочной железы	824	709	86%
Рак мочевого пузыря	117	91	78%
Рак шейки матки	192	146	76%
Рак толстой кишки	406	272	67%
Лимфома Ходжкина	198	160	81%
Гортань и голосовые связки	336	272	81%
Лейкемия	276	204	74%
Рак печени	208	96	46%
Рак легких	369	244	66%
Рак средостения	53	41	77%

	Количество жизнеспособ ных случаев	Количес т во успехов	Показатель успешности
Меланома	72	56	78%
Пищевод	303	258	85%
Полость рта	312	278	89%
Рак яичников	173	126	73%
Рак поджелудочной железы	206	161	78%
рак простаты	453	380	84%
Рак прямой кишки	283	238	84%
Рак кожи	214	184	86%
Рак желудка	192	117	61%
Щитовидная и околоушная железы	73	57	78%
Рак матки	82	43	52%

Часто задаваемые вопросы

Вопросы с ответами

1 В: Все это кажется таким сложным. Можете ли вы сказать, сколько времени займет лечение и какие вольности можно себе позволить при использовании Plussing?

А: Восемнадцать месяцев — это минимум для взрослых, обычно для тех, кто начинает лечение уже «без рака». Это может продлиться до нескольких лет для тех, у кого болезнь прогрессировала, у кого был рецидив или более сложный диагноз. У детей, как только рак отреагировал на лечение, его не нужно продолжать так долго, как у взрослых.

Прекращение лечения до того, как врач скажет, что оно завершено, настраивает пациентов на рецидив, тогда как продолжение лечения дольше не может навредить. К сожалению, многие случаи наблюдаются после того, как лечение другим врачом было прекращено слишком рано.

Plussing звучит сложно, и, возможно, действительно таковым является в течение первой или двух недель, затем он превращается в часть вашего обычного дня, как и все другие ежедневные привычки. В метод встроена значительная гибкость. 10 доз можно принимать в любое удобное для вас время каждый день, и оно может меняться изо дня в день. Пока 10 доз принимаются в течение 90-120 минут, точный интервал не имеет решающего значения. Примерно 10 минут — идеальный вариант, но если несколько доз принимаются в течение 15 или 20 минут, это допускается. Важно не сокращать общий временной интервал и не делить его на 5 доз утром и 5 вечером. 10 доз должны быть последовательными.

Пока у вас есть некоторая смесь, которую можно перенести на следующий день, вы больше ничего не можете сделать, чтобы сделать дозировку неправильной. В конце недели оставшиеся

Жидкость принимается как 11^{-я} доза. Каждую неделю используется совершенно новая смесь. Обратите внимание, что само лекарство добавляется только в 1^{-й} день каждой недели.

2 В: Разрешено ли есть или пить во время приема препарата?

О: Еда не допускается, но при необходимости разрешается пить нелекарственные чаи или прозрачные жидкости, однако для утоления жажды во время Плюссинга предпочтительнее пить воду.

3 В: Что произойдет, если обстоятельства заставят день или два быть пропущенный?

А: Если Plusing полностью установлен, и изредка жизнь становится слишком загруженной, приходится путешествовать или выпадает изнурительный день медицинских процедур, и день заканчивается до приема доз, то никаких последствий не будет, просто будьте особенно бдительны в последующие дни. Если пропущен только один день, а мы подчеркиваем важность того, чтобы это был только один день, пациент может наверстать упущенное или просто пропустить день. Для многих пациентов соблюдение регулярного графика еженедельной смены препарата имеет первостепенное значение.

4 В: Допускаются ли перерывы в этом интенсивном режиме?

А: Время от времени допускается кратковременный перерыв в строгом режиме. Это происходит только в том случае, если пациент больше не находится в критическом состоянии, а причина запроса важна и улучшает качество жизни пациента (например, ребенок заканчивает учебу или женится в другой части страны). В противном случае перерыва в режиме не будет, пока не будет установлено, что пациент достаточно здоров, чтобы перейти на менее частый режим дозирования. Если такой перерыв разрешен, крайне важно, чтобы пациент вернулся для последующего наблюдения по окончании согласованного времени отдыха.

5 В: Как часто пациент должен посещать врача?

А: Последующее наблюдение требуется каждые 8 недель в течение начальной фазы лечения. Этот период времени продлевается, как только пациент здоров и отвыкает от всего лечения. Различные - врачи могут иметь разные временные рамки, и все они должны строго соблюдаться.

Обратите внимание, что в упомянутых случаях упоминаются более длительные промежутки времени между контрольными осмотрами. Это сделано для удобства сообщения о случае, но на самом деле каждый пациент наблюдался часто.

6 В: Как хранится лекарство с одного дня до следующего?

А: Если возможно, в закрытой банке или бутылке, на столе или в холодильнике, если вам так больше нравится. Обязательно используйте новую банку для каждой смены лекарства или потенции, даже если старая банка была вымыта.

7 В: Что произойдет, если острая ситуация потребует администрирования?
другого средства или аллопатического лекарства?

А: Plussing продолжается в течение всего острого состояния, так как в течение оставшейся части дня есть достаточно времени, чтобы принять острый рецепт. Лучше всего, чтобы острый рецепт имел другую (предпочтительно более низкую) потенцию, чем доза Plussed. Если острое лечение должно быть аллопатическим лекарством, гомеопату следует сообщить об этом, чтобы он мог сделать все возможное для работы с этими лекарствами. Часто аллопатические лекарства могут мешать гомеопатии (никогда наоборот), поэтому их следует использовать только в случае крайней необходимости. Часто на поздних стадиях они незаменимы и не должны избегаться на этом этапе лечения.

8 В: Часто в сухих дозах назначают несколько лекарств.
Можно ли их принимать вместе?

А: Поскольку препараты с низкой потенцией часто назначают вместе с увеличивающимися дозами, применяются следующие правила:

Низкие потенции (например, 3X, 6X, 12X) можно принимать одновременно.

Более высокую концентрацию (30C) и низкую, например, 6X, можно принимать вместе.

Два разных средства в потенциях (например) 30C и 200C следует принимать с интервалом не менее 15 минут.

9 В: Каков размер дозы, поскольку средства поставляются в много разных форм и размеров?

А: Стандартная дозировка — 3 глобулы или гранулы, или 15-20, если это гранулы размером с маковое зерно. Для гранул лучше всего высыпать немного в воду, а не брать их в руки, чтобы получить точное количество. Точное количество гранул не имеет значения. Если это таблетки, похожие по размеру на детский аспирин, принимайте указанное количество. Лучше немного расслабиться относительно размера дозы, чем создавать стрессовую ситуацию.

10 В: Вы когда-нибудь использовали препарат, приготовленный из крови пациента?
собственная опухоль?

А: Этот вопрос задают многие пациенты, потому что он звучит разумно — как будто это должно работать. Доктор Рамакришнан не назначает лекарства, изготовленные из фактического источника опухоли, по нескольким причинам, в первую очередь потому, что они никогда не были продемонстрированы как работающие. Во-вторых, эти лекарства не проверены в соответствии с гомеопатической методологией, и их использование было бы изопатическим (таким же) назначением, а не правильным гомеопатическим подобным назначением.

11 В: Применяется ли метод «Плюссинга» при других серьезных заболеваниях?

А: Фактический метод Plussing используется только для лечения рака. Это относится к указаниям, указанным в этом томе для частого - повторения слегка измененных доз. Часто другие болезни лечатся средствами, растворенными в воде, но они применяются по-другому.

12 В: Разрешены ли какие-либо другие альтернативные методы лечения во время

протокол Плюссинга?

А: Большинство практикующих (любой модальности) предпочитают, чтобы их лечение проводилось самостоятельно, поскольку это облегчает определение эффективности. При этом большинство больных раком чувствуют, что они никогда не смогут сделать достаточно, чтобы выздороветь, поэтому разрешены иглоукалывание, хиропрактика, массаж и все другие внешние, мануальные методы лечения (но не с электростимуляцией). Кроме того, разрешены аюрведические лекарства, диеты и добавки. Это включает витамины, минералы, продукты питания, но не травяные продукты. Не разрешены китайские и тибетские травы, западные травы и магниты.

Пациентам рекомендуется изучить различные альтернативы, которые можно использовать как по отдельности, так и в сочетании с западным лечением. Это включает в себя выбор следовать - протоколу Plussing доктора Рамакришнана. Тогда пациенту будет наиболее полезно прекратить искать или принимать предложения от благонамеренных друзей и должным образом следовать выбранным методам лечения. Поиск постоянного следующего или дополнительного лечения слишком стрессовый. Желательно, чтобы пациент сохранял как можно больше нормальности в это время, когда почти ничего не нормально. Это способствует его эмоциональному благополучию, отказываясь позволять болезни и ее лечению доминировать.

13 В: А как насчет кофе, алкоголя и диеты?

А: В большинстве случаев умеренное употребление кофе разрешено пациентам, которые уже пьют кофе. Тех, кто пьет его в больших количествах, просят сократить его употребление, а тем, кто не пьет, не следует его употреблять. Что касается алкоголя, умеренное употребление разрешено, если нет проблем с печенью. Что касается диеты, то предпочтительнее, чтобы пациент придерживался максимально здоровой диеты, которую он может соблюдать, с «баловствами» и дозволенными иногда угощениями. Некоторые крайне ограничительные диеты дают болезни слишком большую власть над повседневной жизнью, поэтому рекомендуется умеренность.

14 В: Может ли гомеопатия влиять на подавление иммунитета?

вызванные химиотерапией при трансплантации органов и стволовых клеток ? Мы всегда слышим, как гомеопатия пытается оживить иммунитет.

А: Гомеопатические лекарства не ускоряют выработку иммуноглобулинов. Они просто обеспечивают динамическую защиту для оптимального функционирования метаболизма. Вот почему мы можем давать это во время подготовки к трансплантации стволовых клеток, а также в других ситуациях, например, в случае трансплантации почки. После того, как пациенту назначают долгосрочный, если не пожизненный, иммунодепрессант, мы продолжаем лечить его гомеопатически, и нет даже отдаленной возможности отторжения органа от гомеопатических средств.

15 В: Какой тип бутылки предпочтительнее для смешивания Plussing? рецепт?

А: Это один из самых спорных вопросов. Рекомендуются небольшие пластиковые бутылки с родниковой водой, такие, которые подают авиакомпании. Они легко доступны в большом количестве, гарантируя новую и свежую бутылку к началу каждой недели. Многие выступают против использования пластика и, безусловно, могут использовать стекло, если они будут заменять его по мере необходимости. Самая большая - проблема со стеклянными бутылками — это ограничение, которое они накладывают на то, чтобы брать средство с собой из дома. Пластиковая бутылка может иметь спортивную крышку, чтобы вы могли сделать глоток (вместо ложки) во время шопинга, прогулки или похода в кино. Пока вы используете свежую бутылку, тип действительно зависит от личных предпочтений. Обратите внимание, что предпочтительнее родниковая вода, в то время как вода, очищенная обратным осмосом, дистиллированная и городская вода не должны использоваться. (Водопроводная вода не допускается из-за добавок, таких как хлор и фторид, вода, очищенная обратным осмосом и дистиллированная вода, не содержит полезных природных минералов).

16 В: Теперь, когда безопасность в аэропорту стала настолько строгой, как мне сохранить

увеличить дозы Plussing, если мне придется путешествовать?

А: Теперь это всего лишь небольшая проблема. Самый простой — принять ваши обычные дозы за день до поездки, затем вылить остаток (11^{-ю} чайную ложку) в маленькую бутылочку и положить ее в разрешенный вам пакет с квартой жидкостей. Пройдя контроль безопасности, вы можете наполнить свою пустую бутылку водой из недавно купленной бутылки и принять эту дневную дозу, ожидая свой рейс.

17 В: Как можно лечить заболевание на поздней стадии или во время нахождения в больнице?

Плюсовать ли продолжать?

А: Как упоминалось в тексте, крайне важно иметь преданного опекуна или члена семьи, который поможет в это время. В больнице жизненно важно иметь собственную бутылку, желательно отличительного вида, с этикеткой и именем пациента. Сообщите всему персоналу, что вы хотите пить только воду марки «XYZ», которая находится в личной бутылке, поэтому персонал больницы не забирает ее. Введите 10 доз как можно лучше. Если пациент спит, вялый, не реагирует или есть медицинское оборудование, которое мешает глотать, опекун может использовать пипетку, чтобы поместить часть лекарства между зубами и губой. Глотать не обязательно. Пока это заранее оговорено с пациентом, он не возражает и его не беспокоят. Убедитесь, что пациент ожидает этого, так как было бы довольно ошеломляюще, если бы кто-то тянул его за рот и впрыскивал лекарство в противном случае.

18 В: Можно ли использовать метод «Плюссинг» для домашних животных?

А: Хотя доктор Рамакришнан не лечит домашних животных, многие гомеопатические пути адаптировали метод для использования с домашними животными, и многие послушные «родители» домашних животных соблюдают график Plussing. Мы не можем проверить результаты, но получили много сообщений об успешном лечении, уменьшении опухолей, излечении, продлении жизни и паллиативном облегчении.

Заключение и будущее

Эта работа с раком теперь используется для лечения рака СПИДа, и первые результаты обнадеживают. До сих пор было много случаев, когда рак был достаточно взят под контроль, чтобы продлить жизнь этим пациентам. Похоже, это будущее моей работы.

Как было показано, результаты лечения некоторых «неизлечимых» видов рака у детей почти чудесны.

Цель этой книги многогранна: научить гомеопатов браться за эту работу и давать надежду, исцеление и поддержку пациентам с этой коварной болезнью. Мы надеемся, что практикующие врачи объединят этот часто успешный метод со своими собственными знаниями, в результате чего протокол Plussing станет доступен все большему числу пациентов. Всем читателям следует помнить, что индивидуальность гомеопатических рецептов имеет первостепенное значение, что ни один из представленных случаев не представляет собой формулу для всех подобных случаев.

Приложение

Об авторе

Доктор А.У. Рамакришнан усердно работал над тем, чтобы распространить преимущества гомеопатии на все слои общества. Он лечил и консультировал по вопросам образования тысячи людей в Индии, Европе, Ирландии, Гонконге, Сингапуре и Соединенных Штатах.

Доктор Рамакришнан — автор книги *«Гомеопатический подход к раку»*.

Образование

MBBS, Мадрасский медицинский колледж; MF Hom. Факультет гомеопатии, Лондон; Присуждена степень доктора философии за гомеопатическое лечение диабета в Дании

Назначения

- ▶ Почетный врач-гомеопат при президенте Индии
- ▶ Научный консультативный совет, CCRIMH, правительство Индии, Нью-Дели (1973)
- ▶ Почетный советник правительства Тамил Наду (1978)
- ▶ Национальный институт гомеопатии, Калькутта (1979)
- ▶ Президент Ассоциации гомеопатических врачей Индии, отделение штата Тамилнад (1979)
- ▶ Комитет по гомеопатической фармакопее, правительство Индии (1982)
- ▶ Учебный совет Университета Мадурая Камараджа, Тамил Наду (1985 г.)
- ▶ Руководящий орган Национального института гомеопатии (1985)
- ▶ Председатель Совета по исследованиям, доктор медицинских наук, Мадрасский медицинский университет (1989, 1994)
- ▶ Научно-консультативный комитет, CCRH, Нью-Дели (1993)
- ▶ Главный врач-гомеопат Всемирного медицинского факультета и старший эксперт его Международного совета по медицинским научным исследованиям (1994)
- ▶ Генеральный директор OMH (Швейцария)

Делегации, консультации и лекции

- ▶ Гомеопатические клинические исследовательские проекты CCRIMH (1974)
- ▶ Национальный институт гомеопатии, Калькутта (1978)
- ▶ Институт исследования рака Арлесхайм, Швейцария (1978)
- ▶ Семинар по преподаванию гомеопатии, Франция (1985)

Представлены важные доклады

- ▶ Международный конгресс, Рим (1981)
- ▶ Международный конгресс, Университет Сассекса, Брайтон, Англия (1982)
- ▶ Международный конгресс, Вена (1983)
- ▶ Всемирный конгресс альтернативной медицины, Стокгольм, Швеция (1984 г.);
- ▶ Всемирный конгресс, Копенгаген, Дания (1984)
- ▶ Международный конгресс, Аргентина (1984)
- ▶ Международная гомеопатическая медицинская лига, Женева (1985)
- ▶ Международная гомеопатическая медицинская лига, Рио-де-Жанейро, Бразилия (1986)
- ▶ Семинар, спонсируемый ВОЗ CCRH, Нью-Дели (1987) Ежегодная конференция Национального центра гомеопатии, Вашингтон, округ Колумбия, США (1987)
- ▶ Британский гомеопатический конгресс, Ливерпуль, Англия (1987)
- ▶ Конференция Азиатской гомеопатической медицинской лиги, Куала-Лумпур, Малайзия (1990)
- ▶ Конгресс OMH1, Мехико, Мексика (1990)

Семинары по гомеопатическому подходу к лечению рака и других заболеваний

- ▶ Сан-Франциско, Бостон, Питтсбург, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Денвер, Торонто, Ванкувер, Дублин, Лондон, Брайтон, Ньюкасл, Амстердам, Берн и Кётен

Аспирантура по гомеопатии

- ▶ Лондон, Ньюкасл, Дублин, Колорадо, Финикс, Аризона и Нью-Йорк

Фонд гомеопатического образования и исследований (HEAR)

HEAR стремится продвигать науку гомеопатии из статуса «альтернативной медицины» в качестве важной и дополнительной ветви лечения. HEAR содействует образованию во всем мире, проводя исследования многих заболеваний, которые являются проблемой для медицинского сообщества.

Головной офис и почтовый адрес:

22 Раджаратнам Стрит, Килпаук

Мадрас 600 010 Индия

Телефон: 91-44-26412400 91-44-26412533

Факс: 91-44-26612122 Веб-сайт: www.drrama.krishnan.com

электронная почта: draurama@gm.ail.com

Контакты клиник и министерства иностранных дел:

Бангалор: 91-80-22261430

Сингапур: 65-8123 2992

Нью-Йорк: 212-535-4584

Лондон: 1628-4277779

Для записи на прием обращайтесь по адресу draurama@gm.ail.com

Индекс средств правовой защиты

А

Аконит 167, 174-175
Aethusa cynapium 27, **167**
Алоэ сокотрина 51, 54-55, 109, 131- 132, 167
Алоэ вера **179**
Пчелы 66-67, 122, **168**
Апоцинум 122, **168**
Азотная кислота 34-35, 37, 59, 61-62, 71-73, 85, 115, 129-130, 153, 168
Арника 169, 178
Белый мышьяк 39-40, 51, 79, 85, 91-92, 96, 110, 113, 115, 122, 134, 142, 146, 152, 158, 166, **168**, 170, **174-175**
Бромистый мышьяк 79, 110, **168**
Йодид мышьяка **168**
Золото мышьяк 105, **166**
Металлическое золото 23, 75, 89, **174- 175**
Соляно-серное золото 41, 82-83, 87- 88, 90-95, 118, 138, 156-158, **168-169**
Солянокислое золото с натрием 41, 87-88, 90-95, 118, 156-158, 169

Б

Бацилла 110-111
Барита карбоника 27
Барита иодат 27, 82, 96, 117, **169**
Многолетние войны **169, 178**
Барбарис обыкновенный 96
Бриония 99

С

Сульфат кадмия 113, 146, 152-153, 169, 174-175
Calcareea arsenicosa 27-28, 31, 44, 50, 72, 79
Калькарея карбоника 23, 28, 34, 123
Calcareea fluorica 39-41, 56, 72-73, 94-95
Калькарея фосфорика 95
Кантарис 20-21, **179**
Растительный углерод 122, 126
Карцинозин* **164-165, 180**
Расторопша пятнистая 57, 68-69, 127
Каустик 20, 22, 59-60, 79, 85, 113
Краснохвостый цеанотус американский 63, 96, 98, 128-129, 147, 158, 169
Чистотел 33, 47-48, 57-58, 68- 70, 86, 95-96, 113, 124, 127, 129- 131, 158, 169, 174-175
Китай 122
Холестерин 57-58, 68-69, 131
Колоцинтис 123, 128-129
Кондуранго 113-115
Кониум 20, 32-33, 35-36, 47-48, 75, 85, 92-93, 102, 130-131, 136, 141-142, 148-150, 166.
Кроталус ужасный **171**

Э

Эуфорбиум 110, **170, 175**

Карцинозин используется настолько часто, что нет необходимости перечислять все упоминания этого средства.

Ф

Феррум фосфорикум 94

Г

Графиты 85, 123

ЧАС

Гекла мыть 23-26, 39, 63-66, 76-77, 108,

124, 133, 139, **170**

Гидры 68, 82, 96, 113, 154, **166**, 169-170, 175

Зверобой 30

я

иодий 75, 99, 116-117, 169-170

К

Кали бихромикум 59, 71, 113, **171**

Калий карбоний 24-25, 71, 79, 99, 134, 141,

143, 155-156, **171**

Калий йодистый **171**

50

Лахезис 27, 59, 71, 99, 109, 116, 118, 170-171.

Белый камень 32, 71, 126, **171**

Тигровая лилия 41, 87, 118

Ликоподий 51-52, 64-65, 68, 71, 75-76, 79-80,

83-84, 102-104, 111-112, 115, 123, 134-

135, 137, 143, 155-156, **171**

М

Магний фосфорикум **175** Медорринум 39-40, 95, **171** Ртуть солюбилис 82

Н

Наджа 46

Соляная кислота 36-38, 87, 91, 93-94, 110-111

Натрий фосфорикум 92, 95

Натрий серноокислый 25, 68, 95-97, 103-104, 115, 131, 136, 157

Азотная кислота 109, **171**

Нукс вомика 128, 175

Ой

Оофорин 72, 88-89

Опиум 167, 175

Орнитогалум 113, 153, **171**, 175

Щавелевая кислота 73-74

П

Фосфор 27, 30-32, 49, 59-61,

86, 108, 165, 167, **172**, 179

Физостигма 107-108

Фитолакка 32, 41, 44-45, 48, 75, 82, 99-101, 116, 139, 141-142, **172**

Plumbum iodatum 27-31, 149, **172**, **175**

Plumbum metallicum 27, 172

Пульсатилла 32, 36-37, 41, 66, 76-77, 87, 119, **172**

Р

Радий бромистый **172**

Рус токсикодендрон 170

Рута пахучая 53

С

Сабаль зубчатый 55-56, 102 172

Сангвинария **166-167**, 172

Скирринум 35, 66-70, 73-74, 150, **165-166**.

198 ИНДЕКС СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Scrophularia nodosa 32, 44, 46-47, 64-65, 75,
77-78, 99, 116, 138-

139, **173**

Корнус 157

Селен 27, 102-103

Сепия 32, 35, 41, 43, 87-88, 118, 172

Кремний 47, 85, 126, 138

Губки 75, 78, 96, 99, 107-108, 116-117

Стафизагрия 20, 34, 92-93

Стронций карбоникум 63, 124,

140, **173**

Сера 109-110, 115, 123

Симфитум 23-24, 38-39, 63, 66- 67, 89, 107,

143, 147-148, 170, **173**

Т

Скипидарное масло 20-22, 81, 144- 145, **173**

Туя 20-21, 40, 42, 51, 55-56, 59, 75, 80-81,
85, 87, 99, 102-103, 109, 116, 118, 166.

Туберкулинум 25-26, 66, 88-89, **173**

У

Urtica urens 179

В

Чемерица альбом 167

Калина сливолистная 87-88, 90, 118, 144-
145

З

Цинкум сульфурикум 27, 44, 105

Общий индекс

А

Рак брюшной полости 170
Острые и хронические миелоидные лейкозы 170
Острый лимфобластный лейкоз 65
Острый миелоидный лейкоз 63
Аденокарцинома 21,34-35,51, 101- 102, 105, 113, 118-119, 128-131, 136-137, 143-144, 152-153
Аденокарцинома молочной железы 34
Аденокарцинома восходящей ободочной кишки 128
Аденокарцинома мочевого пузыря 21
Аденокарцинома толстой и прямой кишки 129
Аденокарцинома легкого 137
Аденокарцинома пищевода 143
Аденокарцинома яичника 144
Аденокарцинома околоушной железы 101
Аденокарцинома прямой кишки 130-131
Аденокарцинома желудка 113, 153
Аденокарцинома матки 118- 119
СПИД 170, 190
Ангиома 169
Астроцитомы 30-31, 49, 169, 172
Астроцитомы зрительного нерва 30

Б

Базальноклеточная карцинома 110-111, 168, 170, 172
Рак мочевого пузыря 173, 181
Рак мочевого пузыря 169
Рак костей и крови 170
Рак костей 173, 181
Рак мозга 181
Опухоли головного мозга 169
Рак молочной железы 10, 35, 38, 41, 126, 181
Бронхогенный рак 73

С

Рак слепой кишки 53
Рак легких и груди 171
Рак груди 173
Рак толстой и прямой кишки 167
Рак полости рта 168
Рак простаты 172
Рак прямой кишки 171
Рак селезенки и поджелудочной железы 169
Рак желудка 170
Рак матки, яичников и шейки матки 169, 171
Раковые язвы 168-169
Рак молочной железы и околоушной железы 172
Рак молочной железы, матки, яичников и шейки матки 172
Рак пищевода, гортани, легких и голосовых связок 168

200 ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Карцинома 20, 32-33, 52, 68, 82-83, 86, 99,
102, 110-111, 116, 134, 138, 150, 161,
169

Церебральная эмболия 140

Рак шейки матки 41-42, 181

Хронический миелоидный лейкоз 66

Хронический миелоидный лейкоз 64

Колит 52

Рак толстой кишки 54, 171, 181

Д

Депрессия 175

Дерматит 77

Диабет 55, 155

Диффузная внутренняя глиома моста
(DIPG) 27,44,48-50

Э

Экзема 77

Рак эндометрия 90, 157

Эндометриоз 87

Рожа 170

Саркома Юинга 23-25, 170

Опухоль Юинга 124

Ф

Миомы 33,41, 169

Г

Рак желчного пузыря 57, 169

Гангрена 168, 170

Генитальный герпес 42

Мультиформная глиобластома 27-28, 48

Глиома 27, 29, 44, 48, 169, 172

ЧАС

Кровотечение 154, 172

Гепатоцеллюлярная карцинома 68, 134

Герпес 36-37,42,91

Ходжкинская и неходжкинская болезнь
лимфомы 172

Лимфома Ходжкина 75, 77, 173,
181

Гипертония 43

я

Инфильтрирующая протоковая карцинома
32-33

Л

Гортань и голосовые связки 181

Рак гортани 60

Поражения головного мозга 169

Лейкемия 63-66, 122, 133, 170,
173, 181

Красный плоский лишай 110-111

Рак печени и желчного пузыря 169

Рак печени 181

Рак легких 71, 136, 162, 171, 181

Метастазы в легких 32

М

Злокачественное новообразование
поджелудочной железы 96

Злокачественная опухоль в головке
поджелудочная железа 146

Рак средостения 181

Меланома 79-80, 168, 182

Язвы во рту 36

Множественная миелома 23

Миастения гравис 107-108

Миелома 23, 89, 170

Миеломоноцитарный лейкоз 133

Н

Некроз 168

Нейробластома 44, 46-47

Неходжкинская лимфома 75

Нистагм 30-31

О

Отеки 43, 67, 70, 122-123, 166, 168

Рак пищевода 85, 141-142

Пищевод 85-86, 141, 143, 182

Полость рта 182

Рак полости рта 139

Остеокластомы 170

Остеосаркома 124

Рак яичников 35, 87, 89, 91, 156, 182

П

Рак поджелудочной железы 97, 146, 169, 182

Псевдокисты поджелудочной железы 97

Папиллярная карцинома простаты 150

Опухоль околоушной железы 100

Перикардит 142

Пилоцистная астроцитомы 49

Подожженный фасциит 72

Плевральный выпот 79, 155, 168

Плевральный метастаз тимомы 107

Полиомиелит 87

Рак простаты 102, 104, 148, 182

Р

Рак прямой кишки 182

Рефлюкс-эзофагит 76, 114-115

С

Саркома 23-25, 170, 173

Септицемия 168

Рак кожи 111, 168, 182

Веретенноклеточная карцинома 161

Плоскоклеточный и базальноклеточный рак 168

Плоскоклеточный рак 20, 52, 82-83, 86, 99, 138

Плоскоклеточный рак головы и шеи 163

Плоскоклеточный рак пищевода 86

Плоскоклеточный рак околоушной железы 99

Плоскоклеточный рак языка 138

Рак желудка и толстой кишки 171

Рак желудка 114, 152-154, 182

Стрептококковая инфекция 71

Т

Рак яичек 169

Рак горла 169

Тимомы 107

Щитовидная и околоушная железы 182

Рак щитовидной железы 117

Узлы щитовидной железы 170

Туберкулез 25-26, 71, 77-78, 128, 173

Опухоли печени 69

У

Язва 42-43, 52-53, 59, 62, 82-83, 110-111, 138

Рак матки 155, 182

Опухоли матки 169

В

Рак голосовых связок 59, 61



Доктор А.У. Рамакришнан

Наконец-то появился метод повышения уверенности в лечении и ведении случаев рака.

Доктор А. У. Рамакришнан, автор книги «Гомеопатический подход к раку», является одним из самых известных специалистов в области лечения рака во всем мире. За последние тридцать лет он вылечил более 15 000 онкологических больных и разработал высокоспецифичный гомеопатический метод лечения различных видов опухолей, включая его знаменитый метод «плюссинга».

За свою многолетнюю практику доктор Рамакришнан вносил коррективы в свои назначения, когда это было необходимо. В этом томе он делится усовершенствованиями своего протокола. Например, ранее редко используемое средство показывает эффективность в повторных случаях или, возможно, одновременное изменение вносится для индивидуальных обстоятельств конкретного пациента, а затем оказывается эффективным для других.

Это систематическое и простое в использовании практическое руководство, описывающее гомеопатическое лечение более 25 видов рака. Оно также включает более 100 примеров случаев вместе со стратегиями для лечения многих стадий, которые может принимать эта болезнь, включая терминальные состояния. Книга также содержит обновления ранее опубликованных случаев.

Надежда заключается в том, что врачи-гомеопаты и практикующие врачи смогут чувствовать себя комфортно, леча случаи с серьезной патологией. Пациенты также должны ознакомиться с вариантами своего собственного лечения, которые могут использоваться исключительно или вместе с их обычным лечением. Здесь даны ответы на многие из наиболее часто задаваемых вопросов, чтобы помочь пациентам и практикующим врачам принимать наилучшие решения в каждой ситуации.

Метод доктора Рамакришнана доказал свою эффективность во многих случаях, и этот новый том, несомненно, поможет углубить знания об этом многообещающем подходе.